

ICS 65.020.20

CCS B 22

DB4401

广 州 市 地 方 标 准

DB4401/T 262—2024

增城丝苗水稻生产技术规程

Technical code of practice for the production of Zengcheng simiao rice

2024-04-18 发布

2024-05-18 实施

广州市市场监督管理局 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广州市农业农村局提出并归口。

本文件起草单位：广州市增城区农业科学研究所、广州绿聚来农业发展有限公司。

本文件主要起草人：姚建秋、陈荣发、曹春如、肖旭林、刘成枝、张文彬、刘志强、彭绍辉、刘文超、郭日潮、黄江燕、顾文芳、周文婷、钟丽芳、姚达行、谢耀均、陈石纯、谢铜波、朱文忠。

增城丝苗水稻生产技术规程

1 范围

本文件规定了增城丝苗水稻生产的术语和定义、一般要求、栽培技术措施、有害生物综合防治、收获、追溯。

本文件适用于增城丝苗水稻的生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件，不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 4404.1 粮食作物种子 第1部分：禾谷类
- GB/T 8321（所有部分） 农药合理使用准则
- GB/T 23402 地理标志产品 增城丝苗米
- GB 38400 肥料中有毒有害物质的限量要求
- GH/T 1278 农民专业合作社 农场质量追溯体系要求
- NY/T 496 肥料合理使用准则 通则
- NY/T 1276 农药安全使用规范总则
- NY/T 5010 无公害农产品 种植业产地环境条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

增城丝苗水稻 Zengcheng simiao rice

增城丝苗水稻是用于生产增城丝苗米的水稻品种。

[来源：GB/T 23402—2009，3.1，有修改]

4 一般要求

4.1 产地环境

应符合 NY/T 5010 的规定。

4.2 品种选择

选用的水稻品种应符合 GB/T 23402 的规定；早造用全生育期 120 d~130 d 的品种；晚造用全生育期 100 d~120 d 的品种。种子质量应符合 GB 4404.1 的规定。

4.3 肥料使用准则

4.3.1 肥料使用应符合 GB 38400、NY/T 496 的规定。

4.3.2 施肥后 5 d~7 d 内不排水，让田水自然落干，防止肥料流失。

4.4 农药使用准则

4.4.1 农药使用应符合 GB/T 8321（所有部分）、NY/T 1276 的规定。

4.4.2 施药后 5 d~7 d 内不排水。

5 栽培技术措施

5.1 栽培方式

宜采用抛秧栽培或机插秧栽培。

5.2 育苗

5.2.1 育苗方式

抛秧、机插秧栽培用塑料盘育秧。

5.2.2 播期

早造宜 3 月上旬播种，晚造宜 7 月中旬播种。

5.2.3 播种

抛秧每 667 m² 本田用种量约 1.5 kg，按常规做好晒种、精选、浸种和消毒，催芽至破胸露白即可播种。每 667 m² 本田播种用 434 孔塑料秧盘约 40 片，需要苗床约 10 m²，播种前放约 0.5 kg 复合肥（N、P₂O₅、K₂O 各含量为 15%）作基肥，放好塑料秧盘装入营养土，撒种后埋芽并扫平盘面防止串根。

机插秧每 667 m² 本田用种量约 2 kg，按常规做好晒种、精选、浸种和消毒，催芽至破胸露白即可播种。每 667 m² 本田用 60 cm×30 cm 机插专用秧盘 16 片~18 片，装入育秧基质播种。应根据茬口、插植进度分期播种。

5.2.4 秧苗管理

早造育秧采用农膜覆盖小拱棚保温保湿，若小拱棚内气温高于 35℃ 应及时揭开两头通风降温，防止高温伤苗；移植前根据天气情况适时揭膜炼苗；晚造播种后至齐苗用遮阳黑纱覆盖，防高温暴雨；若育秧期间撒施化肥需要保持浅水层。

5.3 移植

5.3.1 本田要求

及早沤田、办田，做到“田等秧”，田面耙烂整平，保持浅水层。机插秧前要适当沉实土壤，沙壤土沉实 0.5 d~1 d，壤土沉实 1 d~2 d，黏土沉实 2 d~3 d。

5.3.2 移植期

早造宜 3 月下旬至“清明”前后，晚造宜 7 月下旬至“立秋”前后，秧苗在 3 叶~4 叶时移植。应选择适宜天气及时移栽，北风天或大雨天不宜移植。

5.3.3 移植方法

移植前 1 d~2 d 排清秧田渍水，使盘土干爽、结实，便于起秧移植。

5.3.4 移植密度

适宜密度为每亩抛（插）秧 15000 科~18000 科，机插秧规格 30 cm×12 cm~30 cm×16 cm。

5.4 本田栽培管理

5.4.1 管理目标

前期早生快发稳长，争取早造抛后 20 d、插后 25 d，晚造抛后 15 d、插后 20 d 够苗，苗数为每 667 m² 20 万条~25 万条。中期壮蘖壮茎，控制苗峰，提高成穗率，增加有效穗，控水制肥，促使叶色转赤，适施中期肥，促进幼穗分化，减少颖花退化，增加每穗粒数。后期养根保叶，防止早衰，青枝腊秆，青叶数 2 片以上，结实率高，充实度好。

5.4.2 平衡施肥

5.4.2.1 施肥总量

提倡测土配方施肥，有机肥占总施肥量 30% 以上，氮（N）、磷（P₂O₅）、钾（K₂O）比例为 1: 0.3: 0.8。中等地力的田每 667 m² 本田施肥总量为早造纯氮（N）8 kg~10 kg，磷（P₂O₅）2 kg~3 kg，钾（K₂O）6.5 kg~8 kg；晚造纯氮、磷、钾各可增加 1 kg~1.5 kg、0.3 kg~0.5 kg、0.8 kg~1.2 kg。

5.4.2.2 施肥方法

5.4.2.2.1 水稻控释肥

在基肥每 667 m² 施腐熟有机肥 200 kg~250 kg 的基础上，最后一次耙田前每 667 m² 用总含量 40%~50% 的水稻控释肥 30 kg~35 kg 一次性均匀撒施；沙质田分两次均匀撒施，50% 作基肥，50% 在移植后 7 d~10 d 追施。

5.4.2.2.2 测土配方施肥

方法如下：

- a) 基肥每 667 m² 施有机肥（氮磷钾含量 5%，有机质 40%）200 kg~250 kg，过磷酸钙（有效成分 12%~14%）15 kg；
- b) 回青肥：早造移植后约 5 d，晚造移植后约 3 d，每 667 m² 施尿素 5 kg；
- c) 分蘖肥：早造移植后约 15 d，晚造移植后约 12 d，每 667 m² 施尿素 5 kg，氯化钾 3 kg 或施水稻配方肥[24-7-19（N-P₂O₅-K₂O）或相近配方肥]5 kg~8 kg；
- d) 分化肥：早造移植后 35 d，晚造移植后 30 d 左右，禾苗转赤，每 667 m² 施水稻配方肥 10 kg，氯化钾 4 kg。叶色浓或天气差应推迟或减量施；
- e) 齐穗肥：早造一般不施，晚造视禾苗及天气情况可酌情每 667 m² 补施水稻配方肥 3 kg~5 kg。

5.4.3 本田水分管理

泥皮水移植；浅水分蘖，移植后遇阴雨天气宜排水，以露田为主，促新根和分蘖；够苗即露晒田，至幼穗分化，回浅水施分化肥后自然落干；剑叶全出灌回浅水至齐穗，之后保持田间湿润；收获前 5 d~

7 d 灌一次跑马水，保持泥土湿润；切忌过早断水，防止后期高温迫熟及禾苗早衰。

6 有害生物综合防治

6.1 有害生物控制原则

预防为主，综合防治。密切关注有害生物的测报，综合应用“农业防治、生物防治、物理防治和化学防治”等措施，尽量减少化学农药使用，保护稻田生态环境，有效控制有害生物的发生与为害。

6.2 农业防治

选用抗性较强的品种；提倡合理耕作制度，轮作换茬，推行健身栽培等农艺措施，减少有害生物的发生。

6.3 生物防治

通过准确测报，利用及释放天敌和使用生物农药控制有害生物的发生，保护稻田生态。

6.4 物理防治

利用针对性强的性诱捕器分别诱杀钻蛀性螟虫、稻纵卷叶螟；利用黑光灯、频振式杀虫灯、色光板、防虫网等物理装置诱杀害虫。

6.5 化学药剂防治

6.5.1 基本要求

在落实非化学防治技术的基础上，抓住关键时期实施化学药剂防治。主要有害生物防治安全药剂及施药方法参见附录A。

6.5.2 主要病害防治

6.5.2.1 稻瘟病防治

叶瘟防治应在田间初见急性病斑或出现发病中心时，可选用三环唑等药剂防治；破口抽穗初期可选用春雷霉素、咪鲜胺或稻瘟灵等预防穗瘟，齐穗期如遇天气适宜病害流行时应再补防1次。

6.5.2.2 纹枯病防治

分蘖末期至孕穗抽期丛发病率达到20%以上的田块，选用丙环·嘧菌酯、苯甲·丙环唑或井冈霉素等药剂防治。

6.5.2.3 白叶枯病防治

白叶枯病：发病初期、洪涝等灾害叶片受损伤后或台风暴雨前2 d~3 d，选用三氯异氰尿酸等药剂防治。

6.5.2.4 水稻细菌性条斑病防治

台风暴雨前2 d~3 d，选用三氯异氰尿酸等药剂防治。

6.5.3 主要虫害防治

6.5.3.1 稻飞虱防治

根据预测预报,当分蘖百丛虫量达1000 头,或抽穗期百丛虫量达1500 头,或齐穗后百丛虫量达2000 头时,可选用呋虫胺、烯啶虫胺、吡蚜酮等药剂防治。

6.5.3.2 稻纵卷叶螟防治

根据预测预报,当分蘖期百丛水稻束叶尖150个,孕穗后百丛水稻束叶尖60个时,可选用苏云金杆菌、氯虫苯甲酰胺等药剂防治。

6.5.3.3 钻蛀性螟虫防治

根据预测预报,分蘖期枯鞘丛率达8%~10% 或枯鞘株率3%时施药,穗期在幼虫孵化高峰期施药,可选用苏云金杆菌、氯虫苯甲酰胺等药剂防治。

6.5.4 化学除草

结合移植后追施回青肥,可用苯·丁或丁草胺乳油等除草剂混肥施防除杂草。

6.5.5 农田灭鼠

在春、秋、冬季用敌鼠钠盐或杀鼠醚等高效安全鼠药统一灭鼠。露晒田及孕穗期视情况灭鼠。

6.5.6 螺害防治

移植前或分蘖期福寿螺害发生期,可选用杀螺胺乙醇胺盐、四聚乙醛等药剂防治。

7 收获

早造成熟度达 80%时应及时收割,防止台风雨造成倒伏及穗上发芽。晚造成熟度 90%以上适时收割,以提高稻米品质。稻谷宜在晒场进行适温晾晒或采用稻谷烘干装置进行较低温度(炉温 52 ℃、粮温 35 ℃)烘干。

8 追溯

应按 GH/T 1278 的规定开展追溯管理。建立追溯种植、灌溉、施肥、农药、有害生物防治等管理过程的信息,记录样式见附录 B;所有记录应真实、准确、规范,并具有可追溯性;追溯档案应有专人专柜保管,至少保存 2 年。宜采用二维码追溯系统对增城丝苗水稻的种植、灌溉、投入品使用等相关信息进行追溯管理。

附 录 A

(资料性)

增城丝苗水稻主要有害生物化学防治药剂推荐表

增城丝苗水稻主要有害生物化学防治药剂推荐见表 A.1。

表 A.1 增城丝苗水稻主要有害生物化学防治药剂推荐表

防治对象	推荐药剂			施用方法	推荐制剂用药量 (每 667 m ²)	安全间隔期 (d)	每季最多使用次数
	通用名	有效成分含量	剂型				
稻瘟病	咪鲜胺	25%	水乳剂	喷雾	80 ml~100 ml	30	2
	春雷霉素	6%	可湿性粉剂	喷雾	31 g~36.7 g	21	3
	肟菌·戊唑醇	75%	水分散粒剂	喷雾	15 g~20 g	7	2
	稻瘟灵	40%	乳油	喷雾	75 ml~110 ml	28	2
水稻纹枯病	井冈霉素	5%	可溶粉剂	喷雾	20 g~30 g	/	/
	苯甲·丙环唑	300 g/L	乳油	喷雾	13.3 ml~26.6 ml	40	2
水稻白叶枯病	三氯异氰尿酸	36%	可湿性粉剂	喷雾	60 g~90 g	7	3
	噻菌铜	20%	悬浮剂	喷雾	100 g~130 g	15	3
	氯溴异氰尿酸	50%	可溶粉剂	喷雾	40 g~60 g	7	3
水稻细菌性条斑病	三氯异氰尿酸	36%	可湿性粉剂	喷雾	60 g~90 g	7	3
	噻菌铜	20%	悬浮剂	喷雾	100 g~130 g	15	3
	氯溴异氰尿酸	50%	可溶粉剂	喷雾	40 g~60 g	7	3
稻飞虱	呋虫胺	20%	可溶粒剂	喷雾	30 g~40 g	21	3
	烯啶虫胺	50%	可溶性粉剂	喷雾	5 g~6 g	14	3
	吡蚜酮	50%	可湿性粉剂	喷雾	10 g~12 g	14	2
	三氯苯嘧啶	10	悬浮剂	喷雾	10 ml~16 ml	21	1
稻纵卷叶螟	苏云金杆菌	16000 IU/mg	可湿性粉剂	喷雾	250 g~400 g	/	/
	氯虫苯钾酰胺	300 g/L	悬浮剂	喷雾	5 ml~10 ml	7	2
	溴氰虫酰胺	10%	可分散油悬浮剂	喷雾	20 ml~26 ml	21	2
	乙基多杀菌素	60 g/L	悬浮剂	喷雾	20 ml~30 ml	14	3
钻蛀性螟虫	甲氧虫酰胺	24%	悬浮剂	喷雾	19.4 ml~27.8 ml	45	2
	甲氨基阿维菌素苯钾酸盐	1%	乳油	喷雾	50 ml~100 ml	/	2
	苏云金杆菌	16000 IU/mg	可湿性粉剂	喷雾	250 g~400 g	/	/
	氯虫苯钾酰胺	300 g/L	悬浮剂	喷雾	5 ml~10 ml	7	2
	溴氰虫酰胺	10%	可分散油悬浮剂	喷雾	20 ml~26 ml	21	2
杂草	苯·丁	35%	可湿性粉剂	撒施	100 g		1
	丁草胺	60%	乳油	撒施	100 ml~150 ml		1

表 A.1 增城丝苗水稻主要有害生物化学防治药剂推荐表（续）

防治对象	推荐药剂			施用方法	推荐制剂用药量 （每 667 m ² ）	安全间隔期 （d）	每季最多使用次数
	通用名	有效成分含量	剂型				
福寿螺	杀螺胺乙醇胺盐	70%	可湿性粉剂	撒施	30 ml～45 ml	52	2
	四聚乙醛	6%	颗粒剂	撒施	24 ml～36 ml	70	2
注 1：所推荐的农药药剂的其它剂型亦可以使用。							
注 2：所推荐的农药均为中国农药信息网中在水稻上登记的农药品种。							

附 录 B
(资料性)
记录参考样式

B.1 种植记录样式见表 B.1。

表 B.1 种植记录样式

品种名称	种植面积	种植日期	土地位置	签名	备注

B.2 灌溉记录样式见表 B.2。

表 B.2 灌溉记录样式

灌溉水来源	灌溉方法	灌溉量	灌溉日期	土地位置	签名	备注

B.3 施肥记录样式见表 B.3。

表 B.3 施肥记录样式

肥料名称	供应商	有效成分	施肥方法	施肥 用量	施肥 日期	土地 位置	签名	备注
注：施肥方法包括基肥和追肥等。								

B.4 有害生物防治记录样式见表 B.4。

表 B.4 有害生物防治记录样式

农药 名称	供应商	有效 成分	防治 对象	施药 方法	施药 用量	施药 日期	土地 位置	安全间 隔期	签名	备注
注：施药方法包括喷雾、喷粉、熏烟、浇泼、撒施等。										