

DB46

海 南 省 地 方 标 准

DB 46/ T 240—2017
代替 DB46/T 240-2013

定安水稻生产操作规程

2017 - 12 - 20 发布

2018 - 02 - 20 实施

海南省质量技术监督局 发布

前 言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

- 标准名称改为：定安水稻生产技术规程；
- 更新了规范性引用文件；
- 删除了“术语和定义”；
- 修改了“一般要求”的内容；
- 修改了“栽培技术”的内容；
- 第五章题目改为“有害生物防控技术”；
- 修改了“严格控制施氮和施肥总量”的内容；
- 删除了附录 A、附录 B、附录 C、附录 D；

本标准由定安质量技术监督局、定安县农业技术推广中心提出。

本标准由海南省质量技术监督局归口。

本标准起草单位：海南省产品质量监督检验所、定安质量技术监督局。

本标准主要起草人：吴毓炜、赵宏亮、黄健泓、蒙长就、李山丹、黄泽蓝、李声崎、陈慧玲、张文彬、郑立创。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- DB46/T 240-2013

定安水稻生产技术规程

1 范围

本标准规定了定安水稻种植的一般要求、栽培技术、有害生物防控技术及收获、运输、贮藏及副产品处理要求。

本标准适用于国家质量监督检验检疫行政主管部门根据《地理标志产品保护规定》批准的定安水稻的生产。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4404.1 粮食作物种子 第1部分：禾谷类
GB/T 8321 (所有部分) 农药合理使用准则
GB/T 15792 水稻二化螟测报调查规范
GB/T 15793 稻纵卷叶螟测报技术规范
GB/T 15794 稻飞虱测报调查规范
GB/T 23349 肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标
NY/T 59 水稻二化螟防治标准
NY/T 496 肥料合理使用准则 通则
NY/T 1276 农药安全使用规范总则
NY/T 2156 水稻主要病害防治技术规程
NY/T 5010 无公害农产品 种植业产地环境条件

3 一般要求

3.1 产地环境

在定安大米地理标志产品保护范围内选择符合 NY/T 5010 规定的土壤。

成土母质为：花岗岩、玄武岩、火山灰玄武岩、浅海沉积物、砂质岩 5 类。

3.2 品种选择

选用通过当地示范成功的优质、高产、抗性好的水稻品种。种子质量应符合 GB 4404.1 的规定。

3.3 有害生物控制原则

贯彻“预防为主，综合防治”的植保方针，从稻田生态系统的稳定性出发，综合应用“农业防治、生物防治、物理防治和化学防治”等措施，控制有害生物的发生和危害。

3.4 肥料使用准则

3.4.1 肥料使用原则应符合 NY/T 496 和 GB/T 23349 的规定。

3.4.2 不应使用未经国家或省级农业部门登记的化学和生物肥料。

3.4.3 不应使用硒肥。

3.4.4 安全排水期 7d。

3.5 农药使用准则

3.5.1 农药使用应符合 NY/T 1276、GB/T 8321（所有部分）、《2017 年国家禁用和限用的农药名录》和《海南经济特区禁止生产、运输、储存、销售、使用的农药名录》的规定。

3.5.2 合理混用、轮换交替使用不同作用机制或具有负交互抗性的药剂，克服和推迟病虫害抗药性的产生和发展。

4 栽培技术

4.1 选用抗性强水稻品种

选用优质、抗性强水稻品种（组合），并注意定期更换。

4.2 种植

4.2.1 育秧

按以下方法实施：

——移栽稻育秧技术，手工移栽，可采用湿润育秧或旱育秧技术育秧；

——机械插秧移栽，应采用机械化播种育秧生产线进行工厂化育秧。

4.2.2 大田耕整

按以下步骤实施：

——第一次耕整：在播种或移栽秧苗前 35 天左右，先在田间施用有机肥，然后以机械全层翻耕或旋耕土壤表层约 30cm、铲、碎、压杂草一次，再灌浅水（3cm-5cm）旋耕耙碎耙平一次，然后灌深水 15cm 左右泡田，淹灭杂草和田泥，使杂草腐烂；

——第二次耕整：泡田 15 天后，保持浅水（3cm-5cm）旋耕耙碎耙平土壤表层约 20cm，然后灌深水 15cm 左右再泡田 15 天左右，并检除稻田福寿螺（或放鸭吃螺）；

——第三次耕整：在播种或移栽秧苗前 1-2 天，灌浅水（3cm-5cm）旋耕耙碎耙平土壤表层约 20cm，然后可以分厢直接播种或移栽秧苗。

4.2.3 直播稻

直播稻播种量常规稻为每 667 m²（每亩，下同）3kg-4kg，杂交稻 2kg-2.5kg。提倡采用生物种衣剂包衣的种子，以防地下害虫危害。应注意播种质量，确保全苗。播种出苗后应及时疏密补空。

4.2.4 移栽稻

早、晚稻种植密度常规稻一般为每 667 m² 2 万穴，每穴 3-4 本，杂交稻为每 667 m² 1.8-2.0 万穴，每穴 1-2 本；单季稻为每 667 m² 1.2-1.7 万穴，常规稻每穴 3-4 本，杂交稻 1-2 本。提倡宽行窄株或宽窄行种植，移栽规格早、晚稻为 25.0cm × 13.3cm-16.7cm 或 (33.3cm+16.7cm) × 13.3cm-16.7cm，

即行距 25.0cm, 株距 13.3cm-16.7cm 或宽行 33.3cm、窄行 16.7cm、株距 13.3cm-16.7cm。超级稻优质稻起畦超稀植栽培, 移栽规格 33.3cm×20.0cm-25.0cm, 每 667 m² 0.8-1.0 万穴, 每穴 2 本。

4.3 平衡施肥

4.3.1 有机、无机结合, 氮、磷、钾配合施用

提倡测土配方施肥, 一般有机肥占总施肥量的 40%以上, 氮: 磷: 钾 (N: P₂O₅: K₂O) 一般为 1: 0.5: 1。

4.3.2 严格控制施氮和施肥总量

每 667 m² 大田施有机 500kg-800kg。施肥总量为早、晚稻控制在纯氮 (N) 8kg-12kg, 磷 (P₂O₅) 4kg-5kg, 钾 (K₂O) 8kg-12kg。

4.3.3 施肥方法

施足基面肥, 适施分蘖肥和穗肥。一般氮肥用 50%-70%作基面肥, 20%-30%作分蘖肥, 10%-20%作穗肥; 磷肥全部作基肥施用; 钾肥基、蘖肥各占 50%。

也可采用一次性全层施肥, 将专用复配肥料在平田时一次性施入耕作层土壤, 但在砂壤田不宜采用。

4.4 合理灌溉

4.4.1 灌溉水质要求

应符合 NY/T 5010 的规定。

4.4.2 灌溉方法

4.4.2.1 移栽稻返青期保持浅水层, 分蘖期湿润灌溉, 苗数达到穗数的 80%-90%时开始露田和晒田, 采取多次轻晒, 以控制无效分蘖, 促进根系下扎生长和壮秆健株。孕穗至抽穗扬花期田间应保持浅水层。灌浆成熟期间歇灌溉、干湿交替。收获前 7d 左右断水。

4.4.2.2 直播稻 1-3 叶期秧厢以保持湿润为主, 不宜淹水, 3 叶期后按 5.4.2.1 执行。

5 有害生物防控技术

5.1 农业防治

5.1.1 选用抗性强的品种。品种定期轮换, 保持品种抗性, 减轻病虫害的发生。

5.1.2 采用合理耕作制度、轮作换茬、种养 (稻鸭、稻鱼、稻蟹等) 结合等农艺措施, 减少有害生物的发生。

5.1.3 直播田杂草防治于播种后 0d-10d, 每 667 m² 用杀草丹乳油 100g-125g、禾草敌乳油 96g-140g 或丁草胺 30g 或苄嘧磺隆 1.5g-2g 兑水 30kg 喷雾。

5.1.4 本田杂草防治于移栽后 5d-10d, 每 667 m² 用禾草丹乳油 100g-125g 或吡嘧磺隆 6.25g 或田草光 (苄嘧磺隆与丁草胺复配剂) 25g-30g 拌化肥或细泥土 30 kg 撒施。

5.2 生物防治

创造适宜自然天敌繁殖的环境等措施，保护天敌；利用及释放天敌控制有害生物的发生。

5.3 物理防治

采用黑光灯、震频式杀虫灯、色光板等物理装置诱杀鳞翅目、同翅目等害虫。

5.4 药剂防治

5.4.1 主要病害的防治

根据当地植保部门病虫测报，参照NY/T 2156规定执行。

5.4.2 主要虫害的防治

5.4.2.1 二化螟

依据 GB/T 15792 及 NY/T 59 的规定，在稻苗枯鞘高峰期，每 667 m²用杀虫双 36g-45g 或杀虫单 45g-55g 或三唑磷 20g 兑水 50kg 喷雾，但蚕桑养殖地区不宜使用杀虫双、杀虫单。

5.4.2.2 三化螟

根据虫情预报，掌握在螟卵孵化初盛期，每 667 m²卵块发生量在 50 块以上的田块进行药剂防治，药剂种类同二化螟。

5.4.2.3 稻纵卷叶螟

依据 GB/T 15793 的规定，掌握在主害代 1、2 龄幼虫盛发期（稻叶初卷期）。当分蘖期百丛幼虫 65-85 头、孕穗期 40-60 头以上时，进行药剂防治，药剂杀虫双、杀虫单；此外，也可用毒死蜱 32 g-40g 兑水 50kg 喷雾稻株中、上部。

5.4.2.4 稻飞虱

依据 GB/T 15794 的规定，当百丛虫量达 1500-2000 头，每 667 m²用噻嗪酮 7g-10g 或吡虫啉 1.5g-2g 兑水 50kg，针对稻株中下部喷雾。

5.4.2.5 稻蓟马

在苗期出现叶尖卷曲率在 10%以上、百株虫量 300-500 头时，用杀虫双 27g-36g 或丁硫克百威或吡虫啉 1.5g-2g 兑水 50kg 喷雾。

6 收获、运输、贮藏及副产品处理要求

6.1 收获

实行富硒稻谷与普通稻谷分收、分晒。不应在公路、沥青路面及粉尘污染严重的地方脱粒、晒谷。

6.2 运输

运输工具应清洁、干燥、有防雨设施。不应与有毒、有害、有腐蚀性、有异味的物品混运。

6.3 贮藏

在避光、常温、干燥和有防潮设施的地方贮藏。贮藏设施应清洁、干燥、通风、无虫害和鼠害。

不应与有毒、有害、有腐蚀性、易发霉、发潮、有异味的物品混存。若进行仓库消毒、熏蒸处理，所用药剂应符合国家有关食品卫生安全的规定。

6.4 副产品处理

副产品处理应符合国家及海南省政府相关的环保要求。提倡秸秆还田；不应焚烧、胡乱堆放、丢弃和污染环境。
