

DB6105

渭南市地方标准

DB6105/T 208.4-2024

瑞阳苹果生产技術规程 第4部分：花果期管理

2024-05-14 发布

2024-06-14 实施

渭南市市场监督管理局 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则编写。

本文件由渭南市农业农村局提出并归口。

本文件主要起草单位：陕西美好家园农业科技发展股份有限公司、白水县苹果产业发展中心、白水县凤翔科苑苹果专业合作社、白水县龙泉苹果技术协会。

本文件起草人：赵淑珍、赵淑芹、闵艳娥、田禾、刘艳艳、李瑶、栾洲栋、张田龙、岳刚、张团委。
本文件首次发布。

瑞阳苹果生产技术规程

第4部分：花果期管理

1 范围

本文件规定了瑞阳苹果花果管理中花前复剪、授粉、霜冻防控、疏花疏果和保花保果、套袋摘袋、铺反光膜、病虫害防治、果实采收等技术要求。
本文件适用于渭南市区域内瑞阳苹果矮砧密植苹果园花果期管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 8321 农药合理使用准则
- NY/T 1505 水果套袋技术规程 苹果
- NY/T 1555 苹果育果纸袋
- NY/T 3684 矮砧苹果栽培技术规程

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义

4 花前复剪

根据当年树体成花情况，提早复剪。按照因树定产原则，短截部分长果枝，缩剪部分串花枝，减少花量，增加预备枝量，确保适宜枝果比。

5 授粉

果园授粉树配置不当或异常天气条件下，应采用花期放蜂、人工授粉等必要辅助授粉技术。

5.1 昆虫授粉

非正常天气情况下，可利用蜜蜂、壁蜂进行授粉。

5.2 人工授粉

可采用人工点授、无人机授粉方式。花粉用量 $10\text{g}/667\text{m}^2 \sim 20\text{g}/667\text{m}^2$ 。

5.3 喷硼

花期用0.2%~0.3%硼砂、0.3%~0.5%蔗糖、0.2%~0.3%尿素水溶液，喷施1次~2次。

6 霜冻防控

霜冻来临前，在果园上风口处熏烟或喷施植物生长调节剂等防冻措施。

7 疏花疏果和保花保果

瑞阳苹果坐果率高，以人工疏花疏果为主。

7.1 疏花

7.1.1 人工疏蕾

根据花果间距进行疏蕾疏花，注意保护叶片。花序分离期，保留强壮花，疏去弱蕾弱花。疏后花序间距20cm~25cm。

7.1.2 化学疏蕾

大面积应用前需进行1y~2y小面积试验。

7.2 疏果

花后15d~30d，分1次~2次进行，选留健壮果，疏除其余幼果。

7.3 定果

根据树龄大小、树势强弱和肥水条件等合理确定留果量，盛果期留果量1.0万个/667m²~1.5万个/667m²，果园产量控制在2500kg/667m²~3000kg/667m²。

8 套袋摘袋

6月份疏果后套袋。选袋套袋参照NY/T 1555和NY/T 1505 执行。9月20日前后摘袋。套袋和摘除外袋前，全园喷施一次杀菌剂，内外袋摘除时间间隔5d~7d。

9 铺反光膜

摘除内袋后3d~5d，行间树下铺设反光膜。

10 病虫害防治

参照NY/T 3684执行。遵循“预防为主，综合防治”的植保工作方针，重视农业防治，加强生物防治和物理防治措施，辅以化学防治。农药选用参照GB/T 8321 执行。主要病虫害防治技术见附录A。

11 果实采收

果实成熟后，适时采收。

附录 A

(资料性)

瑞阳苹果花果期主要病虫害防治技术

表A.1瑞阳苹果花果期主要病虫害防治技术

防治时期	选用药物	防治对象
萌芽期	3° Be~5° Be 石硫合剂	腐烂病、白粉病 早期落叶病、叶螨
露红期	苯醚甲环唑、阿维高氯、多抗霉素	白粉病、蚜虫
盛花期	硼砂+蔗糖+尿素+多抗霉素	霉心病
谢花后	农抗 120、苯醚甲环唑 噻虫高氯氟、糖醇钙	白粉病、锈病、星毛虫
幼果期	苦参碱、苯醚甲环唑、多抗霉素、阿维菌素、吡虫啉、氯虫苯甲酰胺、硝酸钙	白粉病、锈病、早期落叶病 叶螨、蚜虫、金纹细蛾
果实膨大期	波尔多液	早期落叶病
果实成熟期	戊唑醇、腈菌唑 高效氯氰菊酯、螺螨酯、硝酸钙	早期落叶病、苦痘病 轮纹病、叶螨、卷叶蛾