

TUTORIAL 06

Notiztitel



06.06.2014

Outline:

- PCA
- Linear Discriminant Analysis (LDA)

EXERCISE 16

a)



b) Statistical features:

$$\underline{m}_x = E\{\underline{x}\} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \underline{x}(k) \quad (\text{Eq. 2.64})$$

$$\underline{m}_x = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

$$\underline{c}_x = E\left\{ \left(\underline{x} - \underline{m}_x \right) \cdot \left(\underline{x} - \underline{m}_x \right)^T \right\} =$$

$$= \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \left[\underline{x}(k) \cdot \underline{x}(k)^T \right] - \underline{m}_x \underline{m}_x^T \quad (\text{Eq. 2.65})$$

$$\begin{aligned}
 \zeta_{\Omega} = & \frac{1}{8} \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} + \right. \\
 & + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \\
 & \left. + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 & 0.5 \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

= Eigen - values and Eigen - vectors of ζ_{Ω}

$$\det(\zeta_{\Omega} - \lambda I) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\det \begin{bmatrix} 0.25 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0.25 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0.25 - \lambda \end{bmatrix}$$

$$\lambda_1 = 0.25$$

$$\lambda_2 = 0.25$$

$$\lambda_3 = 0.25$$


- Transform according to Eq. 2.21

$$y(k) = \underline{\underline{U}} \left(\underline{\underline{x}}(k) - \underline{\underline{m}}_x \right)$$

$$\underline{\underline{e}}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\underline{e}}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\underline{e}}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$



c) The patterns cannot be separated
in the reduced feature space.

$\times \Omega_1$
 $\circ \Omega_2$

d) LDA processing - statistical features.

• a priori - probability (2.78) $p_m = \frac{K_m}{K}$

$$p_{\Omega_1} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \quad p_{\Omega_2} = \frac{1}{2}$$

• class - centre (2.79) $\underline{m}_m = \frac{1}{K_m} \sum_{k=1}^{K_m} \underline{x}(k)$

$$\underline{m}_{\Omega_1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \underline{m}_{\Omega_2} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

• Class - covariance matrix (2.80)

$$\underline{C}_{\Omega_m} = \frac{1}{K_m} \sum_{k=1}^{K_m} \underline{x}(k) \cdot \underline{x}(k)^T - \underline{m}_m \underline{m}_m^T$$

$$C_{\Omega_1} = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$C_{\Omega_2} = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

- Overall centre for all patterns: (2.81)

$$\underline{m} = \sum_{n=1}^N p_n \cdot \underline{m}_n \Rightarrow \underline{m}_{\Omega} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

— instruction for LDA - procedure (pp. 37 - 38)

Step 1

- Intra class scattering matrix (2.82)

$$C_{\Omega} = \sum_{n=1}^N p_n \cdot C_{\Omega_n}$$

$$C_{\Omega} = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

• Inter class scattering matrix (2.83)

$$C_b = \sum_{m=1}^N p_m \left(\underline{m}_m - \underline{m} \right) \left(\underline{m}_m - \underline{m} \right)^T$$

$$C_b = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Step 2

Eigen-values and Eigen-vectors of C_a

$$\underline{\Lambda}_a = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\underline{\Phi}_a = \underline{\Lambda}_a^{-\frac{1}{2}} \underline{U}_a$$

$$\underline{U}_a = \begin{bmatrix} -0.52 & -0.15 & 0.80 \\ 0.58 & -0.77 & 0.22 \\ 0.52 & 0.62 & 0.54 \end{bmatrix}$$

(2.92)

$$\bar{\Phi}_a = \begin{bmatrix} -2.31 & -0.62 & 3.21 \\ 1.16 & -1.54 & 0.54 \\ 1.16 & 1.23 & 1.07 \end{bmatrix}$$