

ZADANIA PRZYKŁADOWE

„RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE”

ZAD 1

Wyznaczyć rozwiązania poniższych równań różniczkowych (podane rozwiązania dokładne y_{sol} należy traktować jako odniesienie i wykorzystać do określania błędów).

$$\frac{dy}{dt} + 2yt = 0, \quad y_{sol} = e^{-t^2}; \quad \frac{dy}{dt} = \frac{4-2y}{3}, \quad y_{sol} = 2(1 - e^{-2t/3}) + y_0 e^{-2t/3}$$

Należy użyć podanych metod stałokrokowych.

- a) Eulera otwartej (EO): $y_{n+1} = y_n + hf_n$;
- b) Eulera zamkniętej: $y_{n+1} = y_n + hf_{n+1}$;
- c) Trapezów (Adamsa-Multona rzędu 2): $y_{n+1} = y_n + h \frac{f_{n+1} + f_n}{2}$;
- d) Heuna (Rungego-Kutty rzędu 2): $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f_n + f(t_{n+1}, y_n + hf_n))$;
- e) Zmodyfikowanej metody Eulera : $y_{n+1} = y_n + hf\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}f_n\right)$;
- f) Adamsa-Bashfortha rzędu 2: $y_{n+1} = y_n + h \frac{3f_n - f_{n-1}}{2}$;
- g) Adamsa-Multona rzędu 3: $y_{n+1} = y_n + h \frac{5f_{n+1} + 8f_n - f_{n-1}}{12}$;
- h) Otwartej metody Geara rzędu 2: $y_{n+1} = 2hf_n + y_{n-1}$;
- i) Otwartej metody Geara rzędu 4: $y_{n+1} = 4hf_n - \frac{10}{3}y_n + 6y_{n-1} - 2y_{n-2} + \frac{1}{3}y_{n-3}$;
- j) Zamkniętej metody Geara rzędu 2: $y_{n+1} = \frac{2hf_{n+1} + 4y_n - y_{n-1}}{3}$;
- k) Zamkniętej metody Geara rzędu 4: $y_{n+1} = \frac{12hf_{n+1} + 48y_n - 36y_{n-1} + 16y_{n-2} - 3y_{n-3}}{25}$

Przyjęte oznaczenia: $y_n = y(t_n)$; $y_{n+1} = y(t_{n+1})$; $f = \frac{dy}{dt}$; $f_n = f(t_n, y_n)$; $f_{n+1} = f(t_{n+1}, y_{n+1})$.

Przedział całkowania $T=[0,10]$, punkt startowy $y_0=1$. W metodach, które wymagają więcej niż jednego poprzednika, wyznaczyć pierwszy (pierwsze) punkt (punkty) metodą EO. Przyjąć kolejno długość kroku całkowania: $h=1, 1e-1, 1e-2, 1e-3$ i wykreślić otrzymane rozwiązania razem z rozwiązaniem dokładnym y_{sol} . Na oddzielnym rysunku wykreślić zależność błędów maksymalnych badanych metod w funkcji h (**loglog**).

ZAD 2

Dla drugiego równania z zad.1 i metod Eulera otwartej (EO) oraz Adamsa-Bashfortha rzędu 2 określić (z dokładnością 0,1 s) długość kroku, dla której metoda staje się niestabilna (h_{gr}). W celu ilustracji granicy niestabilności należy znaleźć i przedstawić graficznie numeryczne rozwiązania równania różniczkowego w przedziale całkowania $[0:120]$ za pomocą podanych metod dla trzech długości kroku całkowania: $h_{gr} - 0,1s$, h_{gr} i $h_{gr} + 0,1s$ (wszystkie rozwiązania na oddzielnych rysunkach, na których dodatkowo powinno być wrysowane rozwiązanie dokładne). Krok graniczny h_{gr} dla każdej z metod można wyznaczyć albo na podstawie teorii albo eksperymentalnie – wykonując różniczkowanie dla