

# Matematická analýza III

Stručné výpisky  
z materiálů p. doc. Klazara

Letní semestr 2020/2021

**Viktor Soukup**

Tyto poznámky jsem sepsal pro přípravu na zkoušku z přednášek pana doc. Klazara. Neprošly zatím žádnou korekcí, budou tedy pravděpodobně obsahovat mnoho chyb. Pokud v poznámkách najdete chybu, nebo pokud budete mít nějakou připomínku k tomu, jak jsou psané, kontaktujte mě prosím na Discordu, nebo mi dejte pull-request na <https://github.com/3011/ma3-poznamky>. Ke většině vět jsem vynechal důkazy, psal jsem je téměř výhradně k větám/tvrzením, která spadají k otázkám vypsáním ke zkoušce.

# Obsah

<b>1</b>	<b>Metrické prostory</b>	<b>3</b>
1.1	Definice	3
1.2	Euklidovský prostor, Sférická metrika	3
1.3	$p$ -adické metriky	4
1.4	Kompaktnost množin v metrických prostorech	5
1.5	Topologická spojitost	7
1.6	Heine-Borelova věta	7
1.7	Souvislé množiny a metrické prostory	7
1.8	Základní věta algebry	8
1.9	Úplné množiny a metrické prostory	9
1.10	Baireova věta	9
<b>2</b>	<b>Řady</b>	<b>9</b>
2.1	Definice	9
2.2	Fourierova řada funkce	10
2.3	Basilejský problém	12
2.4	Divergentní řady	13
2.5	Konvergence řad	13
2.5.1	Absolutní konvergence	13
2.5.2	Stejněměrná a bodová konvergence	14
2.6	Mocninné řady	15
2.6.1	Pólyova věta o náhodných procházkách	17
<b>3</b>	<b>Komplexní analýza</b>	<b>18</b>
3.1	Holomorfní funkce	18
3.2	Póly funkcí	18
3.3	Aplikace	18
<b>4</b>	<b>Úvod do diferenciálních rovnic</b>	<b>18</b>
4.1	Rovnice se separovanými proměnnými	18
4.2	Lineární rovnice	18
4.3	Věta o existenci	18

# 1 Metrické prostory

## 1.1 Definice

**Definice** (Metrický prostor): Metrický prostor je dvojice  $(M, d)$  množiny  $M \neq \emptyset$  a zobrazení

$$d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$$

zvaného metrika či vzdálenost, které  $\forall x, y, z \in M$  splňuje:

1.  $d(x, y) = 0 \iff x = y$
2.  $d(x, y) = d(y, x)$
3.  $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$

Z těchto podmínek plyne i  $d(x, y) \geq 0$ .

**Definice** (Podprostor): Každá podmnožina  $X \subset M$  určuje nový metrický prostor  $(X, d')$ , tak zvaný podprostor metrického prostoru  $(M, d)$ . Pro  $x, y \in X$  klademe  $d'(x, y) := d(x, y)$ . Obě metriky označíme stejným symbolem a máme  $(X, d)$ .

**Definice** (Izometrie): Izometrie  $f$  dvou metrických prostorů  $(M, d)$  a  $(N, e)$  je bijekce  $f : M \rightarrow N$ , jež zachovává vzdálenosti:

$$\forall x, y \in M : d(x, y) = e(f(x), f(y))$$

Existuje-li  $f$ , prostory  $M$  a  $N$  jsou izometrické. Znamená to, že jsou fakticky nerozlišitelné.

## 1.2 Euklidovský prostor, Sférická metrika

**Příklad** (Euklidovský prostor): Euklidovský prostor  $(\mathbb{R}^n, e_n)$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , s metrikou  $e_n$  danou pro  $\bar{x}, \bar{y}^1 \in \mathbb{R}^n$  formulí

$$e_n(\bar{x}, \bar{y}) := \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

Geometricky je  $e_n$  délka úsečky určené body  $\bar{x}$  a  $\bar{y}$ . Euklidovským prostorem pak rozumíme obecněji každý podprostor  $(X, e_n)$ , když  $X \subset \mathbb{R}^n$ .

**Příklad** (Sférická metrika): Jako

$$S := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\}$$

si označíme jednotkovou sféru v euklidovském prostoru  $\mathbb{R}^n$ . Funkci  $s : S \times S \rightarrow [0, \pi]$  definujeme pro  $\bar{x}, \bar{y} \in S$  jako

$$s(\bar{x}, \bar{y}) = \begin{cases} 0 \dots \bar{x} = \bar{y} \\ \varphi \dots \bar{x} \neq \bar{y} \end{cases}$$

kde  $\varphi$  je úhel sevřený dvěma polopřímkami procházejícími počátkem  $\bar{0}$  a body  $\bar{x}$  a  $\bar{y}$ . Tento úhel je vlastně délka kratšího z oblouků mezi body  $\bar{x}$  a  $\bar{y}$  na jednotkové kružnici vytknuté na  $S$  rovinou určenou počátkem a body  $\bar{x}$  a  $\bar{y}$ . Funkci  $s$  nazveme sférickou metrikou.

**Tvrzení:**  $(S, s)$  je metrický prostor.

**Definice** ((Horní) hemisféra): (Horní) hemisféra  $H$  je množina

$$H := \{(x_1, x_2, x_3) \in S \mid x_3 \geq 0\} \subset S$$

---

<sup>1</sup> $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n), \bar{y} = (y_1, \dots, y_n)$

**Věta** ( $H$  není plochá): *Metrický prostor  $(H, s)$  není izometrický žádnému Euklidovskému prostoru  $(X, e_n)$  s  $X \subset \mathbb{R}^n$*

**Důkaz: TODO** □

**Definice** (Ultrametrika): Metrika  $d$  v metrickém prostoru  $(M, d)$  je ultrametrika (nearchimédovská metrika), pokud splňuje silnou trojúhelníkovou nerovnost

$$\forall x, y, z \in M : d(x, y) \leq \max(d(x, z), d(z, y))$$

Protože  $\max(d(x, z), d(z, y)) \leq d(x, z) + d(z, y)$ , je každá ultrametrika metrika. V ultrametrických prostorech nefunguje intuice založená na Euklidovských prostorech.

**Tvrzení** (Trojúhelníky v ultrametrickém prostoru): *V ultrametrickém prostoru  $(M, d)$  je každý trojúhelník rovnoramenný, to jest má dvě stejně dlouhé strany.*

**Definice** (Otevřená koule): (Otevřená) koule v metrickém prostoru  $(M, d)$  se středem v  $a \in M$  a poloměrem  $r > 0$  je podmnožina

$$B(a, r) := \{x \in M \mid d(x, a) < r\} \subset M$$

Vždy  $B(a, r) \neq \emptyset$ , protože  $a \in B(a, r)$ .

### 1.3 $p$ -adické metriky

**Definice** ( $p$ -adický řád): Nechť  $p \in \{2, 3, 5, 7, 11, \dots\}$  je prvočíslo a nechť  $n \in \mathbb{Z}$  je nenulové celé číslo. Jako  $p$ -adický řád čísla  $n$  definujeme

$$\text{ord}_p(n) := \max(\{m \in \mathbb{N}_0 : p^m \mid n\})^2$$

Dále ještě  $\forall p$  definujeme  $\text{ord}_p(0) := +\infty$ .

**Poznámka** (Rozšíření  $\text{ord}_p(\cdot)$  na zlomky): Pro nenulové  $\alpha = \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$  definujeme

$$\text{ord}_p(\alpha) := \text{ord}_p(a) - \text{ord}_p(b)$$

Jinak opět  $\text{ord}_p(0) = \text{ord}_p(\frac{0}{b}) := +\infty$ .

**Tvrzení** (aditivita  $\text{ord}_p(\cdot)$ ): *Platí, že*

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{Q} : \text{ord}_p(\alpha\beta) = \text{ord}_p(\alpha) + \text{ord}_p(\beta)$$

*kde  $(+\infty) + (+\infty) = (+\infty) + n = n + (+\infty) := +\infty$ , pro každé  $n \in \mathbb{Z}$ .*

**Definice** ( $p$ -adická norma): Fixujeme reálnou konstantu  $c \in (0, 1)$  a definujeme funkci  $|\cdot|_p : \mathbb{Q} \rightarrow [0, +\infty)$  jako

$$\left| \frac{a}{b} \right|_p := c^{\text{ord}_p(\frac{a}{b})}$$

kde klademe  $|0|_p = c^{+\infty} := 0$

**Tvrzení** (multiplikativita  $|\cdot|_p$ ): *Pro každé  $p$  a každé dva zlomky  $\alpha, \beta$  (a každé  $c \in (0, 1)$ ) je*

$$|\alpha\beta|_p = |\alpha|_p |\beta|_p$$

---

<sup>2</sup>.  $|\cdot|$  značí relaci dělitelnosti.

**Definice** (Normované těleso): Normované těleso  $F = (F, 0_F, 1_F, +_F, \cdot_F, |\cdot|_F)$ , psáno zkráceně  $(F, |\cdot|_F)$ , je těleso vybavené normou  $|\cdot|_p : \mathbb{Q} \rightarrow [0, +\infty)$ , jež splňuje tři následující požadavky

1.  $\forall x \in F : |x|_F = 0 \iff x = 0_F$
2.  $\forall x, y \in F : |x \cdot_F y|_F = |x|_F \cdot |y|_F$
3.  $\forall x, y \in F : |x +_F y| \leq |x|_F + |y|_F$

**Tvrzení:** Pro každé normované těleso  $(F, |\cdot|_F)$  je funkce  $d(x, y) := |x - y|_F$  metrika na  $F$ . Pokud  $|\cdot|_F$  splňuje silnou trojúhelníkovou nerovnost, pak je  $d$  ultrametrika.

**Tvrzení** (o  $|\cdot|_p$ ): Pro každé prvočíslo  $p$  a každé  $c \in (0, 1)$  je  $(\mathbb{Q}, |\cdot|_p)$  normované těleso. Příslušný metrický prostor  $(\mathbb{Q}, d)$  ( $d(x, y) := |x - y|_F$ ) je ultrametrický prostor.

**Definice** (Triviální norma): Triviální norma na libovolném tělese  $F$  je funkce  $\|\cdot\|$  s  $\|0_F\| = 0$  a  $\|x\| = 1$  pro  $x \neq 0_F$ .

**Tvrzení** (Mocnění obvyklé absolutní hodnoty): Pro  $c > 0$  je  $|\cdot|^c$  norma (na  $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$  a  $\mathbb{C}$ ), právě když  $c \leq 1$ .

**Definice** (Kanonická  $p$ -adická norma): Pro  $\alpha \in \mathbb{Q}$  a prvočíslo  $p$  je kanonická  $p$ -adická norma  $\|\cdot\|_p$  definovaná jako

$$\|\alpha\|_p := p^{-\text{ord}_p(\alpha)}$$

to jest v obecné  $p$ -adické normě  $\|\cdot\|_p$  klademe  $c := \frac{1}{p}$ .

**Věta** (A. Ostrowski): Nechť  $\|\cdot\|$  je norma na tělese racionálních čísel  $\mathbb{Q}$ . Pak nastává jedna ze tří následujících možností.

1. Je to triviální norma.
2. Existuje reálné  $c \in (0, 1]$  takové, že  $\|x\| = |x|^c$ .
3. Existuje reálné  $c \in (0, 1)$  a prvočíslo  $p$ , že  $\|x\| = |x|_p = c^{\text{ord}_p(x)}$  (kde  $c^\infty := 0$ ).

Modifikovaná absolutní hodnota a  $p$ -adické normy jsou tedy jediné netriviální normy na tělese racionálních čísel.

**Důkaz:** TODO □

## 1.4 Kompaktnost množin v metrických prostorech

**Poznámka** (Konvence):  $\varepsilon > 0$  a  $\delta > 0$  jsou reálná čísla a  $n, n_0 \in \mathbb{N}$ . Limitu píšeme jako  $\lim a_n = a$  nebo  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ .

**Definice** (Limita): Nechť je  $(M, d)$  metrický prostor,  $(a_n) \subset M$  je posloupnost bodů v něm a  $a \in M$  je bod.  $(a_n)$  má limitu v  $(M, d)$ , pokud

$$\forall \varepsilon \exists n_0 : n \geq n_0 \Rightarrow d(a_n, a) < \varepsilon$$

.

**Definice** (Konvergence, Divergence): Pokud má  $(a_n)$  limitu, řekneme, že je konvergentní. Pokud limitu nemá, je divergentní.

**Definice** (Kompaktní metrický prostor): Buď  $(M, d)$  metrický prostor a  $X \subset M$ . Řekneme, že  $X$  je kompaktní, pokud

$$\forall (a_n) \subset X \exists (a_{m_n}) \exists a \in X : \lim_{n \rightarrow \infty} a_{m_n} = a.$$

Jinak řečeno, každá posloupnost bodů množiny  $X$  má konvergentní podposloupnost s limitou v  $X$ . Metrický prostor  $(M, d)$  je kompaktní, pokud  $M$  je kompaktní.

**Definice** (Spojité zobrazení mezi Metrickými prostory): Buďte  $(M, d)$  a  $(N, e)$  metrické prostory a buď  $f : M \rightarrow N$  zobrazení mezi nimi.  $f$  je spojitý v  $a \in M$ , pokud

$$\forall \varepsilon \exists \delta \forall x \in M : d(x, a) < \delta \Rightarrow e(f(x), f(a)) < \varepsilon$$

Zobrazení  $f$  je spojitý, pokud je spojitý v každém bodě  $a \in M$ .

**Věta** (Princip maxima): *Nechť  $(M, d)$  je metrický prostor,*

$$f : M \rightarrow \mathbb{R}$$

*je funkce z  $M$  do reálné osy a  $X \subset M$  je neprázdná kompaktní množina. Pak*

$$\exists a, b \in X \forall x \in X : f(a) \leq f(x) \leq f(b)$$

*Funkce  $f$  tedy na  $X$  nabývá svou nejmenší hodnotu  $f(a)$  a největší hodnotu  $f(b)$ .*

**Definice** (Součin metrických prostorů): Pro metrické prostory  $(M, d)$  a  $(N, e)$  definujeme jejich součin  $(M \times N, d \times e)$  tak, že  $M \times N$  je kartézský součin množin  $M$  a  $N$  a metrika  $d \times e$  je na něm dána jako

$$(d \times e)((a_1, a_2), (b_1, b_2)) := \sqrt{d(a_1, b_1)^2 + e(a_2, b_2)^2}$$

**Definice** (Otevřená množina): Množina  $X \subset M$  v metrickém prostoru  $(M, d)$  je otevřená, pokud

$$\forall a \in X \exists r > 0 : B(a, r) \subset X.$$

**Definice** (Uzavřená množina): Množina  $X$  je uzavřená, pokud  $M \setminus X$  je otevřená.

**Definice** (Omezená množina): Množina  $X$  je omezená, pokud

$$\exists a \in M \exists r > 0 : X \subset B(a, r)$$

**Definice** (Diametr): Diametr (průměr) množiny  $X$  je s  $V := \{d(a, b) | a, b \in X\} \subset [0, +\infty)$  definovaný jako

$$\text{diam}(X) := \begin{cases} \sup(V) & \dots \text{množina } V \text{ je shora omezená} \\ +\infty & \dots \text{množina } V \text{ není shora omezená} \end{cases}$$

**Věta** (Kompaktní  $\Rightarrow$  uzavřená a omezená, součin): *Platí následující:*

1. *Když  $X \subset M$  je kompaktní množina v metrickém prostoru  $(M, d)$ , pak  $X$  je uzavřená a omezená. Opačná implikace obecně neplatí.*
2. *Jsou-li  $(M, d)$  a  $(N, e)$  dva kompaktní metrické prostory, pak i jejich součin  $(M \times N, d \times e)$  je kompaktní metrický prostor.*

**Věta** (Kompaktní množina v  $\mathbb{R}^n$ ): *V každém Euklidovském metrickém prostoru  $(\mathbb{R}^n, e_n)$  je množina  $X \subset \mathbb{R}^n$  kompaktní, právě když je omezená a uzavřená.*

## 1.5 Topologická spojitost

**Tvrzení** (Topologická spojitost): *Nechť  $f : M \rightarrow N$  je zobrazení mezi metrickými prostory  $(M, d)$  a  $(N, e)$ . prostorem*

$$f \text{ je spojité} \iff \forall \text{ OM } A \subset N : f^{-1}[A] = \{x \in M \mid f(x) \in A\} \subset M \text{ je OM.}^3$$

Toto tvrzení platí i pro uzavřené množiny.

**Tvrzení** (Topologická spojitost pro podprostory): *Nechť  $(M, d)$  a  $(N, e)$  jsou metrické prostory,  $X \subset M$  je neprázdna množina a  $f : X \rightarrow N$ . prostorem*

$$f \text{ je spojité zobrazení definované na } (X, d) \iff \forall \text{ OM } A \subset N : \exists \text{ OM } B \subset M : f^{-1}[A] = X \cap B.$$

Topologickou definici spojitosti jsme rozšířili na podprostory.

**Tvrzení** (Spojitý obraz kompaktu): *Nechť  $(M, d)$  a  $(N, e)$  jsou metrické prostory,  $X \subset M$  je neprázdna kompaktní množina a*

$$f : X \rightarrow N$$

*je spojitá funkce. Pak obraz  $f[X] \subset N$  je kompaktní množina.*

**Tvrzení** (Spojitost inverzu): *Nechť  $f : X \rightarrow N$  je spojité zobrazení z neprázdne kompaktní množiny  $X \subset M$  v metrickém prostoru  $(M, d)$  do  $(N, e)$ . Potom inverzní zobrazení*

$$f^{-1} : f[X] \rightarrow X$$

*je spojité.*

**Definice** (Homeomorfismus): Zobrazení  $f : M \rightarrow N$  mezi metrickými prostory  $(M, d)$  a  $(N, e)$  je jejich homeomorfismus, je-li  $f$  bijekce a jsou-li  $f$  a  $f^{-1}$  spojitá zobrazení. Pokud mezi  $(M, d)$  a  $(N, e)$  existuje homeomorfismus, jsou homeomorfní.

## 1.6 Heine-Borelova věta

**Definice** (Topologická kompaktnost): Podmnožina  $A \subset M$  metrického prostoru  $(M, d)$  je topologicky kompaktní, pokud každý systém otevřených množin  $\{X_i \mid i \in I\}$  v  $M$  platí:

$$\bigcup_{i \in I} X_i \supset A \Rightarrow \exists \text{ konečná množina } J \subset I : \bigcup_{i \in J} X_i \supset A.$$

**Věta** (Heine-Borelova): *Podmnožina  $A \subset M$  metrického prostoru  $(M, d)$  je kompaktní, právě když je topologicky kompaktní.*

**Důkaz: TODO**

□

## 1.7 Souvislé množiny a metrické prostory

**Definice** (Obojetná množina): Podmnožina  $X \subset M$  v metrickém prostoru  $(M, d)$  je obojetná<sup>4</sup>, je-li současně otevřená i uzavřená, jako jsou například množiny  $\emptyset$  a  $M$ .

**Definice** (Souvislý prostor): Prostor  $(M, d)$  je souvislý, pokud v něm neexistuje netriviální<sup>5</sup> obojetná podmnožina. Jinak, má-li  $M$  obojetnou podmnožinu  $X \subset M$  s  $X \neq \emptyset$ , je nesouvislý.

<sup>3</sup>OM zkracuje sousloví „otevřená množina“.

<sup>4</sup>anglicky *clopen*

<sup>5</sup>Různou od  $M$  a  $\emptyset$ .



**Definice** (Souvislá podmnožina): Podmnožina  $X \subset M$  je souvislá, je-li podprostor  $(X, d)$  souvislý. Pokud podprostor  $(X, d)$  souvislý není, je nesouvislá.

**Definice** (Trhání množiny): Necht  $(M, d)$  je metrický prostor a  $X, A, B \subset M$ . Řekneme, že množiny  $A$  a  $B$  trhají množinu  $X$ , pokud  $A$  a  $B$  jsou otevřené a platí všechna následující

- $X \subset A \cup B$
- $X \cap A \neq \emptyset \neq X \cap B$
- $(X \cap A) \cap (X \cap B) = \emptyset$

**Tvrzení:** Podmnožina  $X \subset M$  je nesouvislá množina v metrickém prostoru  $(M, d)$ , právě když existují  $A, B \subset M$ , které ji trhají.

## 1.8 Základní věta algebry

**Věta** (Základní věta algebry): Každý nekonstantní komplexní polynom má kořen, tedy

$$(n \in \mathbb{N}) \wedge (a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}) \wedge (a_n \neq 0) \Rightarrow \exists \alpha \in \mathbb{C} : \sum_{j=0}^n a_j \alpha^j = 0$$

**Věta** (Souvislost intervalů): Každý interval  $[a, b] \subset \mathbb{C}$ , kde  $a, b \in \mathbb{R}$  a  $a \leq b$ , je souvislá množina.

**Věta** (souvislost a spojitost): Necht  $f : X \rightarrow N$  je spojitě zobrazení ze souvislé množiny  $X \subset M$  v metrickém prostoru  $(M, d)$  do metrického prostoru  $(N, e)$ . Potom

$$f[X] = \{f(x) \mid x \in X\} \subset N$$

je souvislá množina.

**Poznámka:** Komplexní jednotková kružnice

$$S := \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\} \subset \mathbb{C}$$

je souvislá množina.

**Tvrzení:** Pro každé nezáporné  $x \in \mathbb{R}$  a každé  $n \in \mathbb{N}$  existuje nezáporné  $y \in \mathbb{R}$  takové, že  $y^n = x$ .

**Tvrzení** (Druhá odmocnina v  $\mathbb{C}$ ):  $\forall a + bi \in \mathbb{C}$  máme pro vhodnou volbu znamének v reálných číslech

$$c := \pm \frac{\sqrt{\sqrt{a^2 + b^2} + a}}{\sqrt{2}} \quad a \quad d := \pm \frac{\sqrt{\sqrt{a^2 + b^2} - a}}{\sqrt{2}},$$

že  $(c + di)^2 = a + bi$ .

Z předchozích dvou tvrzení lze dokázat, že pokud pro každé  $u \in S$  a pro každé liché  $n \in \mathbb{N}$   $\exists v \in S : v^n = u$ , pak platí následující věta.

**Věta** ( $n$ -té odmocniny v  $\mathbb{C}$ ): Komplexní čísla obsahují všechny  $n$ -té odmocniny, tedy

$$\forall u \in \mathbb{C} \forall n \in \mathbb{N} \exists v \in \mathbb{C} : v^n = u.$$

**Důkaz:** TODO

□

**Tvrzení** (Redukce na  $n$ -té odmocniny): Když  $\mathbb{C}$  obsahuje všechny  $n$ -té odmocniny, pak platí Základní věta algebry a každý nekonstantní komplexní polynom má kořen.

## 1.9 Úplné množiny a metrické prostory

**Definice** (Cauchyova posloupnost): Cauchyova posloupnost  $(a_n)$  splňuje, že

$$\forall \varepsilon \exists n_0 : m, n \geq n_0 \Rightarrow d(a_m, a_n) < \varepsilon$$

**Definice** (Úplný metrický prostor): Metrický prostor  $(M, d)$  je úplný, je-li každá Cauchyovská posloupnost  $(a_n) \subset M$  konvergentní.

**Definice** (Úplná množina): Množina  $X \subset M$  je úplná, je-li podprostor  $(X, d)$  úplný.

**Tvrzení** (úplnost uzavřených podprostorů): V úplném metrickém prostoru  $(M, d)$  je každá uzavřená množina  $X \subset M$  úplná.

## 1.10 Baireova věta

**Definice** (Řídká a hustá množina): Množina  $X \subset M$  v metrickém prostoru  $(M, d)$  je řídká(v  $M$ ), pokud

$$\forall a \in M \forall r > 0 \exists b \in M \exists s > 0 : B(b, s) \subset B(a, r) \wedge B(b, s) \cap X = \emptyset$$

Každá koule v  $(M, d)$  tedy obsahuje podkouli disjunktní s  $X$ . Podobně množina  $Y \subset M$  v metrickém prostoru  $(M, d)$  je hustá(v  $M$ ), pokud

$$\forall a \in M \forall r > 0 : B(a, r) \cap Y \neq \emptyset$$

**Tvrzení** (hustota a spojitost): Nechť  $(M, d)$  a  $(N, e)$  jsou metrické prostory,  $X \subset M$  je hustá v  $M$  a

$$f, g : M \rightarrow N$$

jsou taková spojitá zobrazení, že  $f|_X = g|_X$ <sup>6</sup> Potom  $f = g$ .

**Definice** (Uzavřená koule): Pro  $a \in M$  a reálné  $r > 0$  rozumíme v metrickém prostoru  $(M, d)$  uzavřenou kouli  $\overline{B}(a, r)$  množinu

$$\overline{B}(a, r) := \{x \in M \mid d(a, x) \leq r\}.$$

Uzavřená koule je uzavřená množina a pro každé  $a \in M$  a kladná čísla  $r, s \in \mathbb{R}$  t.ž.  $r < s$  je  $\overline{B}(a, r) \subset B(a, s)$ .

**Věta** (Baireova): Nechť  $(M, d)$  je úplný metrický prostor a

$$M = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n.$$

Pak některá množina  $X_n$  není řídká.

**Důsledek** (o úplném metrickém prostoru): Každý úplný metrický prostor  $(M, d)$ , který neobsahuje izolované body, je nespočetný.

## 2 Řady

### 2.1 Definice

**Definice** (Řada, konvergence a divergence řady): Řada  $\sum a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$  je posloupnost  $(a_n) \subset \mathbb{R}$ , které je přiřazena posloupnost částečných součtů

$$(s_n) := (a_1 + \cdots + a_n) \subset \mathbb{R}.$$

<sup>6</sup>Zúžení obou funkcí na množinu  $X$  se shodují.

Pokud posloupnost  $(s_n)$  má limitu, řekneme, že řada má součet. Je-li tato limita vlastní ( $\in \mathbb{R}$ ), pak řada konverguje, jinak (součet je  $\pm\infty$  nebo neexistuje) diverguje. Součet řady se označuje stejným symbolem jako řada sama, takže také

$$\sum a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n := \lim s_n = \lim(a_1 + \dots + a_n).$$

**Tvrzení** (Nutná podmínka konvergence): *Když řada  $\sum a_n$  konverguje, pak  $\lim a_n = 0$ .*

**Tvrzení** (Harmonická řada):

$$\sum \frac{1}{n} = +\infty$$

**Tvrzení:**

$$\sum \frac{1}{(n+1)n} = \frac{1}{n^2} = 1$$

**Tvrzení** (Geometrická řada): *Pro každé  $q \in (-1, 1)$  je*

$$\sum_{n=1}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$$

**Tvrzení** (Leibnizovo kritérium): *Když  $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq 0$  a  $\lim a_n = 0$ , pak řada  $\sum (-1)^{n-1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - \dots$  konverguje.*

## 2.2 Fourierova řada funkce

**Definice** (Trigonometrická řada): Trigonometrická řada je řada

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)),$$

kde  $a_n, b_n$  jsou její koefficienty a  $x \in \mathbb{R}$  je proměnná.

Trigonometrická řada je fakticky parametrický systém řad parametrizovaný proměnnou  $x$ . Chceme odvodit vyjádření široké třídy funkcí  $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ , pomocí trigonometrických řad.

**Definice** (Skoro skalární součin): Nechť  $\mathcal{R}(-\pi, \pi)$  je množina všech funkcí  $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ , které mají na  $[-\pi, \pi]$  Riemannův integrál. Pro  $f, g \in \mathcal{R}(-\pi, \pi)$  definujeme

$$\langle f, g \rangle := \int_{-\pi}^{\pi} fg \in \mathbb{R}.^7$$

Pro tento skoro skalární součin platí následující

**Tvrzení** (Symetrie, nezápornost a linearita skoro skalárního součinu):

1.  $\langle f, g \rangle = \langle g, f \rangle$
2.  $\langle f, f \rangle \geq 0$
3.  $\langle af + bg, h \rangle = a \langle f, h \rangle + b \langle g, h \rangle$

ale

<sup>7</sup>Z teorie Riemannova integrálu plyne, že pokud  $f, g \in \mathcal{R}(-\pi, \pi)$ , pak i  $fg \in \mathcal{R}(-\pi, \pi)$ .

**Tvrzení:** *Ekvivalence  $\langle f, f \rangle = 0 \iff f \equiv 0$  neplatí.*

**Definice** ( $2\pi$ -periodická funkce): Funkce je  $2\pi$ -periodická, když pro každé  $x \in \mathbb{R}$  je  $f(x + 2\pi) = f(x)$ .

**Tvrzení** (Ortogonalita sinů a cosinů): *Pro každá dvě celá čísla  $m, n \geq 0$  je*

$$\langle \sin(mx), \cos(nx) \rangle = 0.$$

*Pro každá dvě celá čísla  $m, n \geq 0$ , kromě  $m = n = 0$ , je*

$$\langle \sin(mx), \sin(nx) \rangle = \langle \cos(mx), \cos(nx) \rangle = \begin{cases} \pi & \dots & m = n \\ 0 & \dots & m \neq n. \end{cases}$$

*Konečně*

$$\langle \sin(0x), \sin(0x) \rangle = 0 \quad a \quad \langle \cos(0x), \cos(0x) \rangle = 2\pi.$$

**Definice** (Kosinové a sinové Fourierovy koeficienty): Pro každou funkci  $f \in \mathcal{R}(-\pi, \pi)$  definujeme její kosinové Fourierovy koeficienty

$$a_n := \frac{\langle f(x), \cos(nx) \rangle}{\pi} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) \, dx, \quad n = 0, 1, \dots$$

a sinové Fourierovy koeficienty

$$b_n := \frac{\langle f(x), \sin(nx) \rangle}{\pi} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) \, dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

**Definice** (Fourierova řada funkce): Fourierova řada funkce  $f \in \mathcal{R}(-\pi, \pi)$  je trigonometrická řada

$$F_f(x) := \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)),$$

kde  $a_n$  a  $b_n$  jsou po řadě její kosinové a sinové Fourierovy koeficienty.

Geometricky nahlíženo, pracujeme v nekonečně rozměrném vektorovém prostoru se (skoro) skalárním součinem  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ , v němž jsou „souřadnými osami“ (prvky ortogonální báze) funkce

$$\{\cos(nx) \mid n \in \mathbb{N}_0\} \cup \{\sin(nx) \mid n \in \mathbb{N}\}$$

V kontrastu s kartézskými souřadnicemi bodů v  $\mathbb{R}^n$  se ale zdaleka ne každá funkce rovná součtu své Fourierovy řady.

**Věta** (Besselova nerovnost): *Pro Fourierovy koeficienty  $a_n$  a  $b_n$  funkce  $f \in \mathcal{R}(-\pi, \pi)$  platí nerovnost*

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{\langle f, f \rangle}{\pi} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2.$$

**Důkaz:** TODO □

**Tvrzení** (Riemannovo-Lebesgueovo lemma): *Pro každou funkci  $f \in \mathcal{R}(-\pi, \pi)$  je<sup>8</sup>*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) \, dx = 0$$

---

<sup>8</sup>Lze dokázat pomocí Besselovy nerovnosti.

**Definice** (Po částech hladká funkce): Funkce  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , kde  $a < b$  jsou reálná čísla, je po částech hladká, když existuje takové dělení

$$a = a_0 < a_1 < a_2 < \dots < a_k = b, k \in \mathbb{N},$$

intervalu  $[a, b]$ , že na každém intervalu  $a_{i-1}, a_i, i = 1, 2, \dots, k$ , má spojitou derivaci  $f'$  a pro každé  $i = 1, 2, \dots, k$  existují vlastní jednostranné limity

$$f(a_i - 0) := \lim_{x \rightarrow a_i^-} f(x) \quad \text{a} \quad f'(a_i - 0) := \lim_{x \rightarrow a_i^-} f'(x)$$

a pro každé  $i = 0, 1, \dots, k - 1$  existují vlastní jednostranné limity

$$f(a_i + 0) := \lim_{x \rightarrow a_i^+} f(x) \quad \text{a} \quad f'(a_i + 0) := \lim_{x \rightarrow a_i^+} f'(x)$$

Po částech hladká funkce tedy může být v několika bodech intervalu  $[a, b]$  nespojitá, ale v bodech nespojitosti má vlastní jednostranné limity a má v nich definované jednostranné nesvislé tečny.

**Tvrzení** (O Dirichletově jádře): Nechť  $n \in \mathbb{N}$  a

$$J_n(x) := \frac{1}{2} + \cos(x) + \cos(2x) + \dots + \cos(nx).$$

Pak pro každé  $x \in \mathbb{R} \setminus \{2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$  máme

$$J_n(x) = \frac{\sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)x\right)}{2 \sin\left(\frac{x}{2}\right)}.$$

také

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 J_n(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} J_n(x) dx = \frac{1}{2}.$$

**Věta** (Dirichletova): Nechť  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  je taková  $2\pi$ -periodická funkce, že její zúžení na interval  $[-\pi, \pi]$  je po částech hladké. Pak její Fourierova řada  $F_f(x)$  má pro každé  $a \in \mathbb{R}$  součet

$$F_f(a) = \frac{f(a+0) + f(a-0)}{2} = \frac{\lim_{x \rightarrow a_i^+} f(x) + \lim_{x \rightarrow a_i^-} f(x)}{2}$$

V každém bodu spojitosti  $a \in \mathbb{R}$  funkce  $f(x)$  tedy její Fourierova řada má součet rovný funkční hodnotě,  $F_f(a) = f(a)$ .

**Definice** (Hladká funkce): Řekneme, že funkce  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  je hladká, když má na intervalu  $(a, b)$  spojitou derivaci  $f'$  a v krajních bodech  $a$  a  $b$  mají  $f(x)$  a  $f'(x)$  vlastní jednostranné limity.

**Důsledek** (O hladké funkci): Nechť  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  je  $2\pi$ -periodická a spojitá funkce, jejíž zúžení na interval  $[-\pi, \pi]$  je hladké. Potom pro každé  $a \in \mathbb{R}$  je

$$F_f(a) = f(a).$$

Spojitá a hladká funkce se tedy rovná součtu své Fourierovy řady.

## 2.3 Basilejský problém

**Příklad** (Basilejský problém): TODO

## 2.4 Divergentní řady

Řadě  $\sum a_n$ , to jest posloupnosti  $(a_n) \subset \mathbb{R}$ , lze přiřadit její „součet“ i mnoha jinými způsoby, než jen jako limitu

$$\lim s_n = \lim(a_1 + \cdots + a_n)$$

posloupnosti částečných součtů. Jako ilustrace jsou uvedeny dvě sumační metody.

**Fakt** (Abelovský součet):

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = s \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n = s.$$

**Fakt** (Cesàrovský součet):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{s_1 + s_2 + \cdots + s_n}{n} = s \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n = s$$

## 2.5 Konvergence řad

### 2.5.1 Absolutní konvergence

**Definice** (Absolutní konvergence): Řekneme, že řada  $\sum a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$  absolutně konverguje (je to absolutně konvergentní řada), pokud konverguje řada  $\sum |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  tedy

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < +\infty.$$

**Definice** (Obecná absolutní konvergence): Nechť  $A$  je nekonečná spočetná množina.

Pak řadou  $\sum_{x \in A} a_x$  (na  $A$ ) budeme rozumět každou funkci  $a : A \rightarrow \mathbb{R}$ , kde pro  $x \in A$  místo  $a(x)$  stále píšeme  $a_x$ . Řekneme, že tato řada je obecná absolutně konvergentní řada, když

$$\exists c > 0 \forall \text{ konečnou množinu } B \subset A : \sum_{x \in B} |a_x| < c$$

**Věta** (O absolutně konvergentních řadách): *Nechť  $\sum_{x \in A} a_x$  je řada na  $A$ . Pak  $\sum_{x \in A} a_x$  je obecná absolutně konvergentní řada, právě když pro libovolnou bijekci  $\pi : \mathbb{N} \rightarrow A$  je klasická řada*

$$B(\pi) = \sum_{n=1}^{\infty} b(\pi)_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n, \quad b := a_{\pi(n)},$$

*absolutně konvergentní řada. Všechny řady  $B(\pi)$  jsou pak absolutně konvergentní a mají též součet, nezávislý na bijekci  $\pi$ .*

**Definice** (Součet obecné absolutně konvergentní řady): Pro obecnou absolutně konvergentní řadu  $\sum_{x \in A} a_x$  tak definujeme její součet jako součet  $\sum b_n$  řady  $\sum b_n$  s  $b_n := a_{\pi(n)}$  pro libovolnou bijekci  $\pi : \mathbb{N} \rightarrow A$ .

**Definice** (Součin řad): Buďte  $\sum_{x \in A} a_x$  a  $\sum_{x \in B} b_x$  dvě obecné řady. Jejich součin, či součinná řada, je řada

$$\sum_{(a,b) \in A \times B} a_x b_x.$$

**Věta** (Součin absolutně konvergentních řad): *Nechť  $\sum_{x \in A} a_x$  a  $\sum_{x \in B} b_x$  jsou obecné absolutně konvergentní řady se součty*

$$r := \sum_{x \in A} a_x \in \mathbb{R} \quad a \quad \sum_{y \in B} b_y \in \mathbb{R}.$$

*Pak i jejich součin je obecná absolutně konvergentní řada, která má součet  $rs$ .*

**Tvrzení** (Exponenciála): Pro  $x \in \mathbb{R}$  nechť

$$\exp(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \dots$$

Pak pro každé  $x, y \in \mathbb{R}$  platí identita

$$\exp(x + y) = \exp(x) \exp(y).$$

**Tvrzení** (Prvočísel je  $\infty$  mnoho): Množina prvočísel

$$\mathbb{P} := \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, \dots\}$$

je nekonečná.

## 2.5.2 Stejněměrná a bodová konvergence

**Definice** (Stejněměrná konvergence): Nechť  $M \subset \mathbb{R}$  je neprázdná množina a  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  a  $f_n : M \rightarrow \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots$ , jsou na ní definované funkce. Řekneme, že  $f_n$  konvergují (na  $M$ ) stejněměrně k  $f$ , symbolicky

$$f_n \rightrightarrows f \quad (\text{na } M)$$

když ( $\varepsilon > 0$ )

$$\forall \varepsilon \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \forall x \in M : n \geq n_0 \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

**Definice** (Bodová konvergence): Nechť  $M \subset \mathbb{R}$  je neprázdná množina a  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  a  $f_n : M \rightarrow \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots$ , jsou na ní definované funkce. Pokud

$$\forall \varepsilon \forall x \in M \exists n_0 = n_0(\varepsilon, x) : n \geq n_0 \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon,$$

řekneme, že  $f_n$  konvergují (na  $M$ ) k  $f$  bodově, symbolicky

$$f_n \rightarrow f \quad (\text{na } M)$$

Jinými slovy,  $\forall x \in M : \lim f_n(x) = f(x)$ . Stejněměrná konvergence implikuje bodovou, ale ne naopak.

**Definice** (Supremová norma): Pro funkci  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  definujeme její supremovou normu  $\|f\|_{\infty}$  jako

$$\|f\|_{\infty} := \sup(\{|f(x)| \mid x \in M\}) \in [0, +\infty],$$

s hodnotou  $+\infty$  pro shora neomezenou množinu  $\{\dots\}$ .

**Tvrzení** (Kritérium  $\Rightarrow$ ): Nechť  $M \subset \mathbb{R}$  je neprázdná množina a  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  a  $f_n : M \rightarrow \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots$ , jsou na ní definované funkce. Pak

$$f_n \rightrightarrows f \quad (\text{na } M) \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \|f - f_n\|_{\infty} = 0.$$

**Definice** (Lokálně stejněměrná konvergence): Nechť  $M \subset \mathbb{R}$  je neprázdná množina a  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  a  $f_n : M \rightarrow \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots$ , jsou na ní definované funkce. Lokálně stejněměrná konvergence  $f_n$  k  $f$  (na  $M$ ), symbolicky  $f_n \rightrightarrows^{\text{loc}} f$  (na  $M$ ), znamená, že

$$\forall a \in M \exists \delta > 0 : f_n \rightrightarrows f \quad (\text{na } M \cap (a - \delta, a + \delta)).$$

**Věta** ( $\Rightarrow^{\text{loc}}$  zachovává spojitost): Nechť  $M \subset \mathbb{R}$ ,  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f_n : M \rightarrow \mathbb{R}$  pro  $n \in \mathbb{N}$ , každá funkce  $f_n$  je spojitá a

$$f_n \rightrightarrows^{\text{loc}} f \quad (\text{na } M).$$

Pak i  $f$  je spojitá.

**Důkaz:** Nechť  $a \in M$  a buď dáno  $\varepsilon > 0$ . Vezmeme  $\delta > 0$ , že  $f_n$  konvergují na  $N := M \cap (a - \delta, a + \delta)$  stejnoměrně. Vezmeme  $n_0$ , že  $n \geq n_0 \wedge x \in N \Rightarrow |f(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$ . Vezmeme libovolné  $n_1 \geq n_0$  a pak, díky spojitosti  $f_{n_1}$ , takové  $\delta \in (0, \delta)$ , že

$$x \in M \cap (a - \delta_0, a + \delta_0) \subset N \Rightarrow |f_{n_1}(a) - f_{n_1}(x)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Pak pro každé  $x \in M \cap (a - \delta_0, a + \delta_0) \subset N$  máme, že

$$|f(a) - f(x)| \leq |f(a) - f_{n_1}(a)| + |f_{n_1}(a) - f_{n_1}(x)| + |f_{n_1}(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

Funkce  $f$  je spojitá v bodě  $a$ . □

**Tvrzení** (Weierstrassův test): *Nechť  $M \subset \mathbb{R}$  je neprázdná množina,  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f_n : M \rightarrow \mathbb{R}$  a  $\sum f_n \rightarrow f$  (na  $M$ ). Pak*

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n \Rightarrow f \quad (\text{na } M), \text{ pokud } \sum_{n=1}^{\infty} F_n := \sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_{\infty} < +\infty.$$

## 2.6 Mocninné řady

**Definice** (Mocninná řada): Mocninná řada se středem  $a \in \mathbb{R}$  a koeficienty  $a_n \in \mathbb{R}$  (a proměnnou  $x \in \mathbb{R}$ ) je funkční řada

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^n.$$

**Definice** (Poloměr konvergence): Poloměr konvergence  $R$  mocninné řady

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

je nezáporné reálné číslo nebo  $+\infty$ :

$$R := \frac{1}{\limsup |a_n|^{\frac{1}{n}}} \in [0, +\infty],$$

kde  $\frac{1}{0} = +\infty$  a  $\frac{1}{+\infty} := 0$ . S těmito konvencemi máme i ekvivalentní vztah  $\limsup |a_n|^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{R}$ .

**Věta** (O konvergencích mocninných řad): *Nechť*

$$F(x) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

*je mocninná řada s poloměrem konvergence  $R$ . Pak pro každé reálné  $x$  s  $|x| < R$  řada  $F(x)$  absolutně konverguje a pro  $|x| > R$  diverguje. Když  $R > 0$ , pak na intervalu  $(-R, R)$  řada  $F(x)$  konverguje lokálně stejnoměrně ke svému (bodovému) součtu.*

**Věta** (Počítání s mocninnými řadami): *Nechť*

$$A(x) := \sum_{n \geq 0} a_n x^n \quad \text{a} \quad B(x) := \sum_{n \geq 0} b_n x^n$$

*jsou mocninné řady konvergující na nějakém intervalu  $I := (-a, a)$ , kde  $a > 0$ . Označme stejně i odpovídající funkce  $A, B : I \rightarrow \mathbb{R}$ . Pro jejich (formální) součet, součin, podíl a derivaci platí následující.*



## 1. Mocninná řada (Formální součet)

$$C(x) := \sum_{n \geq 0} (a_n + b_n) x^n$$

konverguje na  $I$  a pro každé  $x \in I$  je  $C(x) = A(x) + B(x)$ .

## 2. Mocninná řada (Formální součin)

$$C(x) := \sum_{n \geq 0} \left( \sum_{k=0}^n a_n b_{n-k} \right) x^n$$

konverguje na  $I$  a pro každé  $x \in I$  je  $C(x) = A(x) \cdot B(x)$ .

3. Nechť  $b_0 \neq 0$  a  $d_n := -\frac{b_n}{b_0}$ . Pak existuje  $b > 0$ , že mocninná řada (Formální podíl)

$$C(x) = \sum_{n \geq 0} c_n x^n = \frac{A(x)}{B(x)} := \frac{1}{b_0} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \sum_{n=0}^{\infty} (d_1 x + d_2 x^2 + \dots)^n$$

konverguje na intervalu  $J := (-b, b)$  a pro každé  $x \in J$  je  $C(x) = \frac{A(x)}{B(x)}$ .

## 4. Mocninná řada (Formální derivace)

$$C(x) := \sum_{n \geq 1} n a_n x^{n-1}$$

konverguje na  $I$  a pro každé  $x \in I$  je  $C(x) = A'(x)$ .

Ve třetí části je použita formální geometrická řada:

$$\frac{1}{1 - (d_1 x + d_2 x^2 + \dots)} = \sum_{n=0}^{\infty} (d_1 x + d_2 x^2 + \dots)^n.$$

**Tvrzení** (Abelova nerovnost): Pro  $i = 1, 2, \dots, n$  nechť  $a_i \in \mathbb{C}, b_i \in \mathbb{R}$  s  $b_1 \geq b_2 \geq \dots \geq b_n \geq 0$ ,  $A_i := a_1 + a_2 + \dots + a_i$  a  $A[n] := \max(|A_1|, |A_2|, \dots, |A_n|)$ . prostorem

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i b_i \right| \leq A[n] \cdot b_1.$$

**Věta** (Abelova): Nechť

$$A(x) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

je mocninná řada s poloměrem konvergence  $R \in (0, +\infty)$  a označme stejně odpovídající funkci  $A : (-R, R) \rightarrow \mathbb{R}$ . Když řada  $\sum_{n \geq 0} a_n R^n$  konverguje a má součet

$$S := \sum_{n \geq 0} a_n R^n,$$

pak je limita zleva v  $R$  funkce  $A(x)$  rovna  $S$ :

$$\lim_{x \rightarrow R^-} A(x) = \lim_{a \rightarrow R^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n = S.$$

### 2.6.1 Pólyova věta o náhodných procházkách

**Definice (Graf):** Graf  $G = (V, E)$  sestává z množiny vrcholů  $V$  a množiny hran  $E \subset \binom{V}{2}$ . Zde

$$\binom{V}{2} := \{A \mid A \subset V \wedge |A| = 2\}$$

je množina všech dvouprvkových podmnožin množiny  $V$ .

**Definice ( $d$ -regulární graf):** Graf  $G = (V, E)$  je  $d$ -regulární,  $D \in \mathbb{N}$ , má-li každý vrchol  $d$  sousedů, to jest

$$\forall v \in V : |\overbrace{\{u \in V \mid \{u, v\} \in E\}}^{N(v)}| = d.$$

**Definice (Lokálně konečný graf):** Graf  $G$  je lokálně konečný, má-li každý vrchol  $v \in V$  jen konečně mnoho sousedů, tj. množina  $N(v)$  je konečná.

**Definice (Procházka):** Procházka  $w$  v grafu  $G = (V, E)$  je taková konečná,  $w = (v_0, v_1, \dots, v_n)$  s délkou  $|w| := n \in \mathbb{N}_0$ , či nekonečná,  $w = (v_0, v_1, \dots)$ , posloupnost vrcholů  $v_i \in V$ , že pro každé  $i \in \mathbb{N}_0 (< n)$  je  $\{v_i, v_{i+1} \in E\}$ . Vrchol  $v_0$  pojmenujeme jako start procházky  $w$ .

**Definice (Počet procházek):** Definujeme

$$d_n(v_0, G) := |\{w \mid w \subset V \text{ je procházka se startem } v_0 \text{ a } |w| = n\}|,$$

počet procházek v grafu  $G$  s daným startem  $v_0$  a s délkou  $n$ .

**Definice (Rekurentní procházka):** Rekurentní procházka  $w = (v_0, v_1, \dots, v_n)$  opětovně prochází startem: existuje  $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ , že  $v_i = v_0$

**Definice (Počet rekurentních procházek):** Jako

$$a_n(v_0, G) := |\{w \mid w \subset V \text{ je rekurentní procházka se startem } v_0 \text{ a } |w| = n\}|$$

označíme počet rekurentních procházek v grafu  $G$  s daným startem  $v_0$  a s délkou  $n$ .

**Definice (Automorfismus):** Automorfismus grafu  $G = (V, E)$  je taková bijekce  $f : V \rightarrow V$ , že

$$\forall u, v \in V : \{u, v\} \in E \iff \{f(u), f(v)\} \in E.$$

**Definice ((Vrcholově) tranzitivní graf):** Graf  $G = (V, E)$  je (vrcholově) tranzitivní, když

$$\forall u, v \in V \exists F : F \text{ je automorfismus } G \wedge F(u) = v.$$

**Tvrzení (Procházky v grafech):** *Počet procházek, popř. rekurentních procházek, dané délky v tranzitivním grafu nezávisí na startu: když je  $G = (V, E)$  tranzitivní a lokálně konečný, pak pro každé  $n \in \mathbb{N}_0$  a každé dva vrcholy  $u, v \in V$  je*

$$d_n(u, G) = d_n(v, G), \quad \text{popř.} \quad a_n(u, G) = a_n(v, G).$$

V tranzitivních grafech  $G$  budeme stručně označovat počty procházek, resp. rekurentních procházek, s délkou  $n$  jako  $d_n(G)$ , resp.  $a_n(G)$ .

**Příklad (Nekonečná cesta):** Nekonečná cesta

$$P = (\mathbb{Z}, \{\{n, n+1\} \mid n \in \mathbb{Z}\})$$

je tranzitivní a 2-regulární.

**Definice** (Zobecněná nekonečná cesta): Zobecněním nekonečné cesty je pro  $d \in \mathbb{N}$  graf

$$\mathbb{Z}^d := \left( \mathbb{Z}^d, \left\{ \{\bar{u}, \bar{v}\} \mid \sum_{i=1}^d |u_i - v_i| = 1 \right\} \right),$$

kde píšeme  $\bar{u} = (u_1, \dots, u_d) \in \mathbb{Z}^d$ .

**Tvrzení:** Grafy  $\mathbb{Z}^d$  jsou tranzitivní a  $2d$ -regulární.

**Věta** (Slabá Abelova): Když mocninná řada

$$U(x) := \sum_{n=0}^{\infty} u_n x^n \in \mathbb{R}[[x]]$$

konverguje pro každé  $x \in [0, R)$ , kde  $R \in (0, +\infty)$  je reálné číslo, a má všechny koeficienty  $u_n \geq 0$ , pak následující limita a suma jsou definované a rovnají se -

$$\lim_{x \rightarrow R^-} U(x) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n R^n \quad (= U(R))$$

- bez ohledu na to, zda jsou konečné nebo  $+\infty$ .

**Věta** (Stirlingův vzorec):

**Věta** (Pólya): Pro  $d = 1$  a  $2$  je

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n(\mathbb{Z}^d)}{d_n(\mathbb{Z}^d)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n(\mathbb{Z}^d)}{(2d)^n} = 1$$

a pro  $d \geq 3$  je

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n(\mathbb{Z}^d)}{d_n(\mathbb{Z}^d)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n(\mathbb{Z}^d)}{(2d)^n} < 1$$

Důkaz: **TODO**

□ Důkaz: **TODO**

□

## 3 Komplexní analýza

### 3.1 Holomorfní funkce

### 3.2 Póly funkcí

### 3.3 Aplikace

## 4 Úvod do diferenciálních rovnic

### 4.1 Rovnice se separovanými proměnnými

### 4.2 Lineární rovnice

### 4.3 Věta o existenci

The End