

Bundles of Care of Critically Ill Patients

حزم الرعاية للمرضى ذوي الحالات الحرجة

The bundles included are:

تشمل حزم الرعاية ما يلي:

- **Ventilator associated pneumonia (VAP) bundles**
حزمة الوقاية من الالتهاب الرئوي المرتبط بجهاز التنفس الصناعي
- **Catheter associated urinary tract infection (CAUTI) bundles**
حزمة الوقاية من عدوى المسالك البولية المرتبطة بالقسطرة
- **Center line associated blood stream infection CLABSI Bundles**
حزمة الوقاية من عدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية المركزية

1. VAP Bundle (Ventilator-Associated Pneumonia)

حزمة الوقاية من الالتهاب الرئوي المرتبط بجهاز التنفس الصناعي

Daily Assessment Schedule

جدول التقييم اليومي

Time	Intervention	Rationale
Every Shift كل نوبة	Assess readiness for extubation تقييم جاهزية المريض لإزالة أنبوبة التنفس	Early liberation reduces VAP risk إزالة الأنبوبة مبكراً تقلل خطر حدوث الالتهاب الرئوي
Every Shift كل نوبة	Elevate head of bed 30-45° رفع رأس السرير بزاوية 30-45 درجة	Prevents aspiration of secretions يمنع شطف الإفرازات إلى الرئة
Every Shift كل نوبة	Assess sedation level & daily sedation vacation تقييم مستوى المهدئ وإعطاء راحة يومية من المهدئات	Reduces ventilator days يقلل عدد أيام استخدام جهاز التنفس
Every 2-4 Hours كل 2-4 ساعات	Oral care with chlorhexidine 0.12% العناية بالفم باستخدام كلور هيكسيدين 0.12%	Reduces bacterial colonization يقلل نمو البكتيريا في الفم

Time	Intervention	Rationale
Every 4 Hours كل 4 ساعات	Suction only when needed (not routine) الشفط عند الحاجة فقط وليس بشكل روتيني	Prevents trauma and colonization يمنع إصابة الأنسجة ونمو البكتيريا
Every Shift كل نوبة	Check ET tube cuff pressure (20-30 cm H ₂ O) – 20 فحص ضغط بالون أنبوبة التنفس (30 سم ماء)	Prevents aspiration يمنع دخول الإفرازات إلى الرئة
Daily يومياً	Spontaneous breathing trial (if appropriate) تجربة التنفس التلقائي إذا كان المريض مناسب	Assesses extubation readiness لتقييم جاهزية إزالة الأنبوبة
Every Shift كل نوبة	DVT prophylaxis الوقاية من الجلطات الوريدية العميقة	Prevents complications يمنع حدوث مضاعفات
Every Shift كل نوبة	Peptic ulcer prophylaxis الوقاية من قرحة المعدة	Prevents stress ulcers يمنع قرح الإجهاد

VAP Bundle Checklist

VAP قائمة التحقق لحزمة

- HOB elevated 30-45°
رفع رأس السرير 30–45 درجة
- Daily sedation vacation/assessment
راحة يومية من المهدئات مع التقييم
- Daily extubation assessment
تقييم يومي لإزالة أنبوبة التنفس
- Oral care with antiseptic
العناية بالفم بمطهر
- DVT prophylaxis
الوقاية من الجلطات
- Peptic ulcer prophylaxis
الوقاية من قرحة المعدة

- Verify ET tube position and cuff pressure
التأكد من مكان الأنبوبة وضغط البالون

2. CAUTI Bundle (Catheter-Associated Urinary Tract Infection)

حزمة الوقاية من عدوى المسالك البولية المرتبطة بالقسطرة

Daily Assessment Schedule

جدول التقييم اليومي

Time	Intervention	Rationale
At Insertion عند التركيب	Use sterile technique for insertion استخدام تقنية معقمة أثناء التركيب	Prevents initial contamination يمنع التلوث من البداية
At Insertion عند التركيب	Use smallest appropriate catheter size استخدام أصغر مقاس مناسب من القسطرة	Reduces urethral trauma يقلل إصابة مجرى البول
Every Shift كل نوبة	Assess continued need for catheter تقييم الحاجة المستمرة للقسطرة	Early removal reduces infection risk الإزالة المبكرة تقلل خطر العدوى
Every Shift كل نوبة	Maintain closed drainage system الحفاظ على نظام تصريف مغلق	Prevents bacterial entry يمنع دخول البكتيريا
Every Shift كل نوبة	Keep drainage bag below bladder level إبقاء كيس البول أسفل مستوى المثانة	Prevents backflow of urine يمنع رجوع البول
Every Shift كل نوبة	Secure catheter to prevent movement تثبيت القسطرة لمنع الحركة	Reduces urethral trauma يقلل إصابة مجرى البول
Every Shift كل نوبة	Perform perineal hygiene العناية بنظافة منطقة العجان	Maintains cleanliness يحافظ على النظافة
Every Shift كل نوبة	Empty drainage bag regularly (do not touch spout) تفريغ كيس البول بانتظام دون لمس الفتحة	Prevents bacterial growth يمنع نمو البكتيريا
Daily يومياً	Document indication for catheter توثيق سبب استخدام القسطرة	Ensures appropriate use يضمن الاستخدام الصحيح

CAUTI Bundle Checklist

CAUTI قائمة التحقق لحزمة

- Catheter only if indicated (appropriate use)
استخدام القسطرة عند وجود داعٍ طبي فقط
- Sterile insertion technique used
استخدام تقنية معقمة أثناء التركيب
- Maintain closed drainage system
الحفاظ على نظام مغلق
- Bag below bladder level always
الكيس دائماً أسفل مستوى المثانة
- Catheter secured properly
تثبيت القسطرة جيداً
- Perineal care performed
إجراء العناية بمنطقة العجان
- Daily assessment for removal
تقييم يومي لإمكانية إزالة القسطرة

3. CLABSI Bundle (Central Line-Associated Bloodstream Infection)

حزمة الوقاية من عدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية المركزية

Daily Assessment Schedule

جدول التقييم اليومي

Time	Intervention	Rationale
At Insertion عند التركيب	Use maximal sterile barrier precautions استخدام أقصى احتياطات التعقيم	Prevents contamination during placement يمنع التلوث أثناء التركيب
At Insertion عند التركيب	Use chlorhexidine skin antisepsis تطهير الجلد بالكور هيكسيدين	Superior antiseptic for skin prep أفضل مطهر لتحضير الجلد

Time	Intervention	Rationale
At Insertion عند التركيب	Select optimal catheter site (avoid femoral) اختيار أفضل مكان للقسطرة (تجنب الفخذي)	Subclavian preferred, then IJ يفضل تحت الترقوة ثم الوداجي
Every Shift كل نوبة	Assess continued need for central line تقييم الحاجة المستمرة للقسطرة المركزية	Early removal reduces infection risk الإزالة المبكرة تقلل خطر العدوى
Every Shift كل نوبة	Perform hand hygiene before accessing line غسل اليدين قبل التعامل مع القسطرة	Prevents pathogen transmission يمنع انتقال الميكروبات
Every Shift كل نوبة	Inspect insertion site فحص مكان الإدخال	Early detection of complications اكتشاف المضاعفات مبكراً
Every Shift كل نوبة	Scrub the hub 15 seconds before access فرك مدخل القسطرة لمدة 15 ثانية قبل الاستخدام	Reduces microbial contamination يقلل التلوث الميكروبي
Every 5-7 Days كل 5-7 أيام	Change transparent dressing تغيير الضمادة الشفافة	Maintains sterile environment يحافظ على بيئة معقمة
Every 24 Hours كل 24 ساعة	Change gauze dressing تغيير الشاش	If used instead of transparent إذا كان مستخدم بدلاً من الشفاف
Every Shift كل نوبة	Change needleless connectors per protocol تغيير الوصلات بدون إبرة حسب البروتوكول	Reduces biofilm formation يقلل تكوّن الغشاء البكتيري
Every 24-96 Hours كل 24-96 ساعة	Change IV tubing per protocol تغيير أنابيب المحاليل حسب البروتوكول	Prevents bacterial growth يمنع نمو البكتيريا
Daily يومياً	Review labs for signs of infection مراجعة التحاليل لعلامات العدوى	Early detection of CLABSI الاكتشاف المبكر للعدوى

CLABSI Bundle Checklist

CLABSI قائمة التحقق لحزمة

- Hand hygiene performed
تم غسل اليدين
- Maximal sterile barriers during insertion
استخدام أقصى احتياطات التعقيم أثناء التركيب
- Chlorhexidine skin prep used (>0.5%)
%استخدام كلورهيكسيدين بتركيز أكبر من 0.5
- Optimal site selection (avoid femoral)
اختيار المكان المناسب وتجنب الفخذي
- Daily review of line necessity
مراجعة يومية للحاجة للقسطرة
- Dressing clean, dry, and intact
الضمادة نظيفة وجافة وسليمة
- Hub scrubbed 15 seconds before access
فرك المدخل 15 ثانية قبل الاستخدام
- Needleless connectors changed per policy
تغيير الوصلات حسب السياسة
- No signs of infection at site
لا توجد علامات عدوى في مكان الإدخال