

Acute Viral Hepatitis (التهاب الكبد الفيروسي الحاد)

Definition (التعريف)

Acute hepatitis means short-term inflammation or damage in liver cells.

التهاب الكبد الحاد يعني التهابًا أو ضررًا مؤقتًا في خلايا الكبد.

It causes an increase in liver enzymes in blood tests.

يسبب ارتفاع إنزيمات الكبد في تحاليل الدم.

If it lasts less than six months and liver returns to normal, it's called **acute hepatitis**.

إذا استمر أقل من ستة أشهر وعاد الكبد طبيعيًا، يُسمى **التهاب كبد حاد**.

If it lasts more than six months, it becomes **chronic hepatitis**.

أما إذا استمر أكثر من ستة أشهر، فيُعتبر **التهاب كبد مزمن**.

Epidemiology (الوبائيات)

Viral hepatitis is more common in poor areas and less common in rich countries.

التهاب الكبد الفيروسي شائع في المناطق الفقيرة ونادر في الدول الغنية.

Recently, cases increased because of contaminated food, drug use, and homelessness.

في السنوات الأخيرة زادت الحالات بسبب الطعام الملوث، وتعاطي المخدرات، والتشرد.

In high-risk areas, over 90% of children get **Hepatitis A** before age 10.

قبل سن العاشرة **A** في المناطق عالية الخطورة، يُصاب أكثر من 90% من الأطفال بـ **التهاب الكبد**.

Causes (الأسباب)

Acute viral hepatitis is mainly caused by five viruses: **A, B, C, D, and E**.

E, D, C, and B: يحدث التهاب الكبد الحاد بسبب خمسة فيروسات رئيسية.

🤒 Symptoms (الأعراض)

Symptoms can range from mild flu-like illness to **severe liver failure**.

الأعراض قد تتراوح من تعب بسيط مثل الإنفلونزا إلى فشل كبدي خطير.

Sometimes there are no symptoms at all.

أحياناً لا تظهر أي أعراض.

Severity and recovery depend on the type of virus and body response.

شدة المرض وسرعة الشفاء تعتمد على نوع الفيروس واستجابة الجسم.

Hepatitis A and C usually cause mild or no symptoms.

غالبًا يسببان أعراضًا خفيفة أو لا يسببان أعراضًا و **A** التهاب الكبد و **C**.

Hepatitis B and E may cause stronger symptoms.

قد يسببان أعراضًا أشد و **B** التهاب الكبد و **E**.

Symptoms often start suddenly.

تبدأ الأعراض غالبًا بشكل مفاجئ.

They include loss of appetite, tiredness, nausea, vomiting, and fever.

تشمل الأعراض فقدان الشهية، التعب، الغثيان، القيء، والحمى.

After a few days, urine becomes dark and stool becomes pale.

بعد عدة أيام يصبح البول داكنًا والبراز فاتح اللون.

Jaundice (yellowing of skin and eyes) may appear with itching.

قد يظهر اليرقان (اصفرار الجلد والعينين) مع حكة أحيانًا.

The liver may become enlarged and painful.

قد يتضخم الكبد ويصبح مؤلمًا.

Usually, early symptoms disappear within a week, even if jaundice increases.

عادة تختفي الأعراض الأولى خلال أسبوع حتى لو زاد الاصفرار.

Rarely, it may turn into **fulminant hepatitis**, which causes liver failure and may need transplant.

نادرًا ما يتطور المرض إلى التهاب كبدي خبيث يؤدي إلى فشل الكبد وقد يحتاج إلى زراعة كبد.

Most people recover in 4–8 weeks without treatment.

يتعافى معظم المرضى خلال 4 إلى 8 أسابيع بدون علاج.

But some with **Hepatitis B or C** develop chronic infection.

قد يصابون بعدوى مزمنة **C أو B** لكن بعض المصابين بـ

Diagnosis (التشخيص)

Diagnosis is done by **blood tests**.

يتم التشخيص عن طريق تحاليل الدم.

These tests measure liver enzymes and detect virus parts or antibodies.

تقيس هذه التحاليل إنزيمات الكبد وتكشف وجود الفيروس أو الأجسام المضادة له.

◆ **Hepatitis A:**

IgM anti-HAV appears at the start and stays positive for 3–6 months.

في بداية العدوى وتظل إيجابية من 3 إلى 6 أشهر **A لفيروس IgM** تظهر الأجسام المضادة

IgG anti-HAV appears later and stays for life, giving long protection.

لاحقًا وتبقى لسنوات طويلة، مما يمنح مناعة دائمة **IgG** تظهر.

◆ **Hepatitis B:**

Tests include **HBsAg** and **HBc Ab IgM**.

لتشخيص العدوى **HBc Ab IgM** و **HBsAg** تُستخدم تحاليل

HBV DNA (PCR) is the most accurate test.

هو الأدق للكشف عن الفيروس **PCR** بتقنية **HBV DNA** تحليل

◆ **Hepatitis C:**

Test for **Anti-HCV**, but it cannot show if it's acute or chronic.

لا يميز بين العدوى الحدية والمزمنة **Anti-HCV** تحليل.

PCR test detects viral RNA and is most accurate.

يكشف عن الحمض النووي للفيروس وهو الأدق **PCR** تحليل.

◆ Hepatitis E:

Tests for **Anti-HEV IgM** (acute) and **IgG** (chronic).

على المزمنة **IgG** يدل على العدوى الحدية و **Anti-HEV IgM** تحليل.

PCR can also detect the virus.

اكتشاف الفيروس مباشرة **PCR** كما يمكن لـ.

🛡️ Prevention (الوقاية)

Because treatment is only partly effective, prevention is very important.

لأن العلاج ليس فعالاً تماماً، فالوقاية مهمة جداً.

🧬 1. Vaccines (اللقاحات)

There are vaccines for **Hepatitis A and B**.

A و **B** تتوفر لقاحات لـ التهاب الكبد.

A vaccine for **Hepatitis E** exists only in China.

متوفر فقط في الصين **E** لقاح التهاب الكبد.

There are no vaccines for **Hepatitis C or D**,

D، أو **C** لا يوجد لقاح لـ.

but vaccination against **B** also protects from **D**.

D يحمي أيضاً من **B** لكن لقاح.

Vaccines are given by injection and need time to become effective.

تُعطى اللقاحات بالحقن وتحتاج وقتاً لتكوين المناعة.

Children and people at high risk should be vaccinated.

يجب تطعيم الأطفال والأشخاص الأكثر عرضة للعدوى

2. Immune globulin (الغلوبولين المناعي)

If someone is exposed to **Hepatitis B** and not vaccinated,

ولم يكن مطعماً، B إذا تعرّض شخص لفيروس

they receive **hepatitis B immune globulin** and the vaccine.

مع اللقاح B يُعطى غلوبولين مناعي لفيروس

Babies born to infected mothers also get both at birth.

الرضع المولودون لأمهات مصابات يحصلون على الاثنين بعد الولادة

Other preventive measures (إجراءات أخرى للوقاية)

- Wash hands before eating or cooking.
- غسل اليدين جيداً قبل الأكل أو إعداد الطعام
- Do not share needles, toothbrushes, or razors.
- عدم مشاركة الإبر أو فرشاة الأسنان أو شفرات الحلاقة
- Practice safe sex and use condoms.
- ممارسة الجنس الآمن واستخدام الواقي الذكري
- Donated blood is screened, but transfusions should be limited to need.
- الدم المتبرع به يتم فحصه، ومع ذلك يجب إعطاء نقل الدم فقط عند الضرورة
- People can donate their own blood before surgery to avoid infection.
- يمكن للشخص التبرع بدمه قبل العملية لتجنّب نقل دم من مصدر خارجي

Treatment (العلاج)

Most cases need only **supportive care** (rest and fluids).

معظم الحالات تحتاج فقط إلى رعاية داعمة مثل الراحة والسوائل.

Severe cases may need hospitalization.

الحالات الشديدة قد تحتاج إلى دخول المستشفى.

If **fulminant hepatitis** is suspected, doctors monitor the patient closely.

إذا اشتبه الأطباء بوجود التهاب كبدى خبيث، تتم مراقبة المريض بدقة.

Sometimes **liver transplant** is needed if failure develops.

في بعض الأحيان تُجرى زراعة كبد عند حدوث فشل كبدى.

Patients can return to work after jaundice improves.

يمكن للمريض العودة لعمله بعد تحسن الاصفرار.

No need for strict diets or vitamin supplements.

لا حاجة لحمية صارمة أو مكملات فيتامين.

Avoid alcohol completely until full recovery.

يجب تجنب الكحول تمامًا حتى الشفاء الكامل.

Doctors may stop or reduce some medicines because the liver can't process them well.

قد يوقف الطبيب بعض الأدوية لأن الكبد لا يستطيع التعامل معها جيدًا أثناء المرض.

If there is itching, **cholestyramine** can help.

في حالة الحكة، يمكن استخدام دواء كوليسترامين.

If **Hepatitis B** causes severe liver failure, antivirals may help but **liver transplant** is the best option.

فشلًا كبديًا شديدًا، قد تساعد الأدوية المضادة للفيروسات، لكن زراعة الكبد تظل الحل الأفضل B إذا سبب فيروس.