

Intravenous Therapy (IV Infusion)

العلاج الوريدي (الحقن الوريدي)

Definition:

Giving fluids or medicines directly into the vein.

إعطاء السوائل أو الأدوية مباشرة داخل الوريد.

Purpose (الأهداف):

1. Give fluids and medicines when the patient can't take them by mouth.
إعطاء السوائل والأدوية عندما لا يستطيع المريض تناولها بالفم.
2. Restore fluid and electrolyte balance.
تعويض نقص السوائل والأملاح في الجسم.
3. Give blood or blood products if needed.
نقل الدم أو مكوناته عند الحاجة.

Indications (الاستخدامات):

- Dehydration (vomiting, diarrhea, burns).
الجفاف بسبب القيء أو الإسهال أو الحروق.
- Blood transfusion.
نقل الدم.

Contraindications (موانع الاستخدام):

- Allergy, infection at site, poor veins, bleeding problems.
الحساسية، عدوى بالمكان، ضعف الأوردة، اضطرابات نزيف.

Complications (المضاعفات):

- Pain or swelling at site.
ألم أو تورم في مكان الإبرة.

- Infiltration or extravasation (fluid leakage).

تسرب السائل إلى الأنسجة.

- Phlebitis (vein inflammation).

التهاب الوريد.

- Air embolism or overload.

دخول هواء أو زيادة سوائل في الدم.

- Infection or bleeding.

عدوى أو نزيف.

Equipment (الأدوات):

- IV tray, catheter, tubing set, IV stand, gloves, prescribed fluid.

صينية وريدية، قنية (كانيولا)، أنبوب التوصيل، حامل المحلول، قفازات، محلول موصوف.

Types of IV Solutions (أنواع المحاليل):

Type	Function	Example	الوظيفة	مثال
Isotonic	Keeps balance	Normal saline, Ringer's	يحافظ على توازن السوائل	محلول ملحي عادي، رينجر
Hypotonic	Moves water into cells	0.45% saline	يدخل الماء إلى الخلايا	محلول ملحي مخفف
Hypertonic	Pulls water out of cells	5% dextrose in saline	يسحب الماء من الخلايا	جلوكوز مع محلول ملحي

 IV Therapy Procedure (خطوات إجراء العلاج الوريدي)

Step / الخطوة	English Explanation / الشرح بالإنجليزية	Arabic Explanation / الشرح بالعربية
1. Review the medication order and physician's instructions.	Ensure the correct solution, dose, and flow rate are prepared.	مراجعة أوامر الطبيب والتأكد من نوع المحلول والجرعة ومعدل التدفق.
2. Perform hand hygiene and wear gloves.	Prevent transmission of infection.	غسل اليدين وارتداء القفازات لمنع العدوى.
3. Prepare the environment and provide privacy.	Close the curtain and ensure proper lighting.	تجهيز المكان وغلق الستارة لتوفير الخصوصية والإضاءة الجيدة.
4. Prepare equipment and verify solution (five rights).	Check color, clarity, and expiry date of IV solution.	تجهيز الأدوات وفحص لون ووضوح وتاريخ صلاحية المحلول الوريدي.
5. Prime the IV tubing: close clamp → insert spike into IV bag → fill drip chamber halfway → flush tubing to remove air.	To prevent air embolism and ensure fluid flow.	تجهيز الأنبوب بإزالة الهواء منه لمنع دخول فقاعات الهواء إلى الوريد.
6. Identify the patient using at least two identifiers.	Ensures correct patient and avoids errors.	التأكد من هوية المريض باستخدام طريقتين على الأقل (الاسم – رقم الملف).
7. Explain the procedure to the patient.	Reduces anxiety and gains cooperation.	شرح الخطوات للمريض لتقليل القلق وكسب التعاون.
8. Assist the patient into a comfortable position with arm extended.	Allows easy vein access and prevents strain.	وضع المريض في وضع مريح مع مد الذراع لتسهيل الوصول إلى الوريد.
9. Select a suitable vein (non-dominant arm preferred).	Choose a visible, straight, elastic vein; avoid flexion points.	اختيار وريد مستقيم ومرن في الذراع غير المهيمنة وتجنب مناطق الثني.

Step / الخطوة	English Explanation / الشرح بالإنجليزية	Arabic Explanation / الشرح بالعربية
10. Apply a tourniquet 10–15 cm above the chosen site.	Distends the vein for easier puncture.	وضع الرباط الضاغط أعلى موقع الحقن بـ 10 إلى 15 سم لتوسيع الوريد.
11. Ask the patient to open and close the fist several times.	Promotes venous filling and vein visibility.	مطالبة المريض بفتح وغلق يده عدة مرات لتوسيع الوريد.
12. Clean the insertion site with antiseptic swab (center → outward) and let it dry.	Removes microorganisms and prevents infection.	تنظيف موقع الإدخال بمسحة مطهرة من المركز إلى الخارج وتركها لتجف لمنع العدوى.
13. Stretch the skin taut and stabilize the vein.	Prevents vein movement during needle insertion.	شد الجلد وتثبيت الوريد لتسهيل إدخال الإبرة بدون انزلاق.
14. Insert IV catheter bevel up at a 20–30° angle, then lower to 10° as you enter the vein.	Allows smooth entry and minimizes trauma.	إدخال الإبرة بزاوية 20–30 درجة ثم خفضها إلى 10 درجات عند دخول الوريد لتقليل الأذى.
15. Observe for “flashback” of blood in the catheter hub.	Confirms entry into the vein.	ملاحظة رجوع الدم داخل الإبرة للتأكد من الدخول الصحيح في الوريد.
16. Release the tourniquet and advance the plastic catheter fully into the vein.	Prevents vein rupture and ensures stability.	فك الرباط الضاغط ودفع القنية البلاستيكية داخل الوريد لتثبيتها.
17. Apply gentle pressure above insertion site and remove the needle.	Prevents blood leakage.	الضغط الخفيف فوق موقع الإدخال أثناء سحب الإبرة لمنع تسرب الدم.
18. Connect the IV tubing to the catheter hub.	Establishes connection for fluid infusion.	توصيل أنبوب المحلول بالقنية الوريدية لبدء عملية الحقن.
19. Open roller clamp slowly and start the flow at the prescribed rate.	Prevents sudden fluid overload.	فتح منظم التدفق تدريجيًا لبدء المحلول بالمعدل الموصوف لتجنب زيادة السوائل المفاجئة.

الخطوة / Step	English Explanation / الشرح بالإنجليزية	Arabic Explanation / الشرح بالعربية
20. Secure the catheter with sterile tape or transparent dressing.	Prevents movement and contamination.	تثبيت القنية باستخدام شريط طبي معقم أو لاصق شفاف. لتجنب الحركة أو التلوث.
21. Dispose of used sharps and materials safely.	Prevents needle-stick injuries and infection.	التخلص من الأدوات الحادة والمستخدمات بطريقة آمنة لتجنب الإصابة أو العدوى.
22. Label the IV site with date, time, and initials.	For identification and documentation.	وضع ملصق على موقع الحقن يوضح التاريخ والوقت والتوقيع لتوثيق الإجراء.
23. Observe the IV site and flow every 30–60 minutes.	Detect early signs of infiltration, infection, or phlebitis.	مراقبة موقع الحقن وتدفق المحلول كل 30–60 دقيقة لاكتشاف أي تسرب أو التهاب مبكر.
24. Document the procedure completely.	Records solution type, rate, site, time, and patient response.	تدوين جميع تفاصيل الإجراء: نوع المحلول، معدل الضخ، الموقع، الوقت، واستجابة المريض.