


Restraints

تقييد حركة الطفل (الريسترينتس)

Pediatric Nursing – Practical Lecture

تمريض الأطفال – محاضرة العملي



Examples of pediatric restraints: jacket, wrist tie, mummy wrap, and body restraint
أمثلة لوسائل تقييد الأطفال: الجاكيت، رباط الرسغ، لفة الموميا، وتقييد الجسم


Bilingual simplified study guide | English (main) + Arabic

ملخص مبسط للمذاكرة / الإنجليزي (الأساس) + العربي

١. التعريف	1. Definition
الريستريكتس (وسائل التقييد) طرق أو أدوات مؤقتة بنستخدمها عشان نحدّ من حركة الطفل أو من وصوله لجسمه (زي إنه يمस्क الكانيولا أو الوش).	Restraints Temporary methods or devices used to limit a child's movement or access to his body.
٢. الأهداف	2. Purposes
عشان نعمل الإجراءات التشخيصية والعلاجية بأمان.	To perform diagnostic and therapeutic procedures safely.
عشان نمنع تعطيل الإجراء (الفحص أو أخذ العينات) أو العلاج، زي شد الكانيولا أو الغيارات.	To prevent disruption of a procedure (physical examination, specimen collection) or treatment, such as pulling IV lines or dressings.
عشان نمنع الطفل من الوقوع.	To prevent the child from falling.
عشان نخلي الطفل في الوضع المطلوب.	To maintain the child in the required position.
٣. المبادئ (القواعد الأساسية)	3. Principles
اشرح سبب التقييد للأهل والطفل.	Explain the purpose of the restraint to the parents and the child.
ممنوع نستخدمه كعقاب.	Never use it as punishment.
التقييد آخر اختيار، ومحتاج أمر مكتوب من الدكتور.	Restraints are the last choice and need a written doctor's order.
راع سن الطفل وحالته.	Consider the child's age and condition.
اربط الأشرطة في هيكل السرير، مش في الحواجز الجانبية.	Secure the ties to the bed frame, not the side rails.
بطّن وسائل التقييد (حط تحتها حشو) وتأكد إنها مش ضيقة قوي.	Pad the restraints and make sure they are not too tight.
غيّر وضع الطفل وافحص الجلد كل ساعتين.	Change the child's position and check the skin every 2 hours.
حرّك الأطراف المقيّدة وادّي تمارين حركة المفاصل (ROM).	Exercise the restrained limbs and give range-of-motion exercises.
شيل التقييد بفك العقدة، مش بالقص.	Remove restraints by untying, not cutting.
٤. المضاعفات	4. Complications
تأخر نمو العضلات بسبب قلة الحركة.	Delayed muscular development due to lack of movement.
التقييد الضيق ممكن يسبب ضعف الدورة الدموية واحمرار.	Tight restraints may cause poor circulation and redness.
خلع الكتف لما الطفل يقاوم وهو متقيّد من الذراعين.	Shoulder dislocation when the child struggles with arm restraints.
قرح الفراش (الضغط) من التقييد لفترة طويلة وقلة العناية بالجلد.	Pressure sores from prolonged restraint and poor skin care.

• Psychological injury , e.g., the child feels punished.		• أذى نفسي ، زي إن الطفل يحس إنه بيتعاقب.		
5. Types of restraints		٥. أنواع التقييد		
1. Mummy restraint		١. تقييد الموميا (Mummy)		
2. Modified mummy restraint		٢. الموميا المعدلة (Modified mummy)		
3. Elbow restraint		٣. تقييد الكوع (Elbow)		
4. Clove restraint (wrist / ankle)		٤. تقييد الكلوف للرسغ/الكاحل (Clove – عقدة الكلوف)		
5. Jacket restraint		٥. تقييد الجاكيت (Jacket)		
6. Mitt / hand restraint		٦. تقييد اليد / القفاز (Mitt)		
6. Mummy restraint		٦. تقييد الموميا (Mummy)		
What is it? Wrapping the infant in a blanket like a mummy to limit the movement of the whole body while keeping the head and neck free . Used for infants up to 6 months .		إيه هو؟ لفّ الرضيع في بطانية زي الموميا عشان نحدّ من حركة الجسم كله مع ترك الرأس والرقبة حرّين. بنستخدمه للرضع لحد ٦ شهور.		
Indications		دواعي الاستخدام		
• Scalp vein puncture		• وخز وريد فروة الرأس (كانيولا في الرأس)		
• ENT (ear, nose, throat) examination		• فحص الأنف والأذن والحنجرة		
• Gavage feeding (feeding by tube)		• التغذية بالأنبوب (Gavage)		
• Eye or ear examination		• فحص العين أو الأذن		
Equipment		الأدوات		
• Large sheet or blanket		• ملاية أو بطانية كبيرة		
• Safety pins		• دبابيس أمان		
Procedure		خطوات الإجراء		
#	Step	الخطوة	Rationale (Why?)	السبب (ليه؟)
1	Hand washing and prepare the equipment.	اغسل إيديك وجهّز الأدوات.	To prevent the spread of infection and to save time.	لمنع انتقال العدوى وتوفير الوقت.
2	Explain the procedure to the parents.	اشرح الإجراء للأهل.	To reduce the parents' stress and gain their cooperation.	لتقليل توتر الأهل وكسب تعاونهم.
3	Place the blanket flat on the bed in a diamond shape .	افرد البطانية على السرير على شكل معين (Diamond) .	So the corners can be folded easily over the infant.	عشان نقدر نثني الأركان بسهولة على الرضيع.

#	Step	الخطوة	Rationale (Why?)	السبب (ليه؟)
4	Fold down the upper corner and place the infant in the supine position , with the shoulders near the upper fold .	اثنى الركن العلوي لتحت وحط الرضيع نائم على ظهره، والكتفين قريبين من الثنية العلوية.	To keep the head and neck free and the blanket at the right level.	عشان الراس والرقبة يفضلوا حرّين والبطانية في المستوى الصحيح.
5	Keep the arms in an anatomical position and bring one corner across the infant and secure it under the body.	خلى الذراعين في وضعهم الطبيعي (Anatomical) وهات ركن البطانية عبر الرضيع وثبته تحت الجسم.	To prevent discomfort and strain on the arms and joints.	لمنع عدم الراحة والتشد على الذراعين والمفاصل.
6	Fold up the lower corner and tuck it around the infant, then secure it with a safety pin or adhesive tape , leaving enough space for leg movement .	اثنى الركن السفلي لفوق وشده حولين الرضيع وثبته بدبوس أمان أو شريط لاصق، مع ترك مساحة كافية لحركة الرجلين.	To provide comfortable wrapping while allowing leg movement.	لتوفير لفّة مريحة مع السماح بحركة الرجلين.
7	Bring the second corner across the infant and secure it with safety pins.	هات الركن الثاني عبر الرضيع وثبته بدبابيس الأمان.	To complete the wrap so the arms and body cannot move.	لإكمال اللفة بحيث الذراعين والجسم ميتحركوش.



Mummy restraint steps (A → F)
خطوات تقييد الموميا (من A إلى F)

7. Modified mummy restraint


٧. الموميا المعدلة (Modified mummy)

What is it?

Like the mummy wrap, but the **chest is left exposed**.
Used for **chest examination**.

إيه هو؟

زي الموميا بس الصدر بيفضل مكشوف. بنستخدمه في فحص الصدر.




Modified mummy restraint (A → C)
الموميا المعدلة (من A إلى C)

Procedure

خطوات الإجراء

#	Step	الخطوة	Rationale (Why?)	السبب (ليه؟)
1	Hand washing and prepare the equipment.	اغسل إيديك وجهز الأدوات.	To prevent the spread of infection and to save time.	لمنع انتقال العدوى وتوفير الوقت.
2	Explain the procedure to the parents.	اشرح الإجراء للأهل.	To reduce parental anxiety and gain cooperation.	لتقليل قلق الأهل وكسب تعاونهم.
3	Place the blanket flat on the bed.	افرد البطانية مفرودة على السرير.	To prepare a smooth base for wrapping.	لتجهيز سطح مستوي لللف.
4	Fold down one corner and place the infant in the supine position with the shoulders at the fold .	اثنى ركن لتحت وحط الرضيع نائم على ظهره والكتفين عند الثنية.	So the head and neck stay free and the blanket starts at the right level.	عشان الرأس والرقبة يفضلوا حزين والبطانية تبدأ من المستوى الصحيح.
5	Position the infant's arm comfortably at the side .	حط ذراع الرضيع في وضع مريح على جنبه.	To avoid strain on the arm and shoulder joint.	لتجنب الشد على الذراع ومفصل الكتف.
6	Fold the blanket over the arm and tuck it under the infant's back .	اثنى البطانية فوق الذراع وحشرها تحت ظهر الرضيع.	To hold the arm securely against the body.	لتنبيت الذراع على الجسم.
7	Repeat for the opposite arm.	كرر نفس الخطوة للذراع الثاني.	To restrict both arms equally.	لتنقييد الذراعين بالتساوي.
8	Fold the lower corner over the abdomen , leaving the chest exposed .	اثنى الركن السفلي فوق البطن مع ترك الصدر مكشوف.	To allow chest examination while the lower body is held.	عشان نقدر نفحص الصدر وباقي الجسم منتبته.
9	Secure the blanket sides behind the infant's back with safety pins.	ثبّت جوانب البطانية وراء ظهر الرضيع بدبابيس الأمان.	So the pins do not touch or hurt the infant's skin.	عشان الدبابيس متلمش جلد الرضيع ولا تأذيه.

8. Elbow restraint	٨. تقييد الكوع (Elbow)
What is it? A cloth with pockets holding tongue depressors that keeps the elbow straight (no flexion) , so the child cannot reach the head or face.	إيه هو؟ قماشة فيها جيوب بنحط فيها أعواد خشبية (Tongue depressors) بتخلّي الكوع مفروود (من غير ثني)، فالطفل ميقدش يوصل لراسه أو وشه.
Indications	دواعي الاستخدام
Prevents elbow flexion and access to the head or face.	بيمنع ثني الكوع والوصول للراس أو الوش.
Scalp IV therapy.	العلاج الوريدي في فروة الرأس.
NG tube protection.	حماية أنبوب الأنف (NG tube).
Equipment	الأدوات
Tongue depressors	أعواد خشبية (Tongue depressors)
Cloth	قماشة



Elbow restraint cloth with tongue depressors
قماشة تقييد الكوع بالأعواد الخشبية

Procedure		خطوات الإجراء		
#	Step	الخطوة	Rationale (Why?)	السبب (ليه؟)
1	Prepare the cloth and insert tongue depressors into the pockets .	جهّز القماشة وحط الأعواد الخشبية في الجيوب.	To prevent elbow flexion.	لمنع ثني الكوع.
2	Wrap a small dressing around the child's arm.	لف غيار صغير حوالين ذراع الطفل.	To prevent direct pressure and tissue or nerve damage.	لمنع الضغط المباشر وتلف الأنسجة أو الأعصاب.
3	Wrap the cloth around the arm.	لف القماشة حوالين الذراع.	To provide proper immobilization.	لتوفير تثبيت مناسب.
4	Secure the cloth around the arm with tape or pins .	ثبّت القماشة حوالين الذراع بشريط لاصق أو دبائيس.	To keep the restraint in place.	عشان التقييد يفضل مكانه.

#	Step	الخطوة	Rationale (Why?)	السبب (ليه؟)
5	Frequently assess finger color, sensation, and movement.	افحص باستمرار لون الأصابع والإحساس والحركة.	To detect possible nerve damage from pressure on the brachial area.	لاكتشاف أي تلف محتمل في الأعصاب من الضغط على منطقة العضد.

9. Clove restraint (wrist / ankle)		٩. تقييد الكلوف للرسغ أو الكاحل (Clove)		
What is it? A figure-of-eight gauze loop (clove hitch) that limits limb movement during procedures.		إيه هو؟ حلقتين من الشاش على شكل رقم ٨ (عقدة الكلوف) بتحدّ من حركة الطرف أثناء الإجراءات.		
Indications – to limit limb movement in:		دواعي الاستخدام – لتقليل حركة الطرف في:		
Exposed burns of the chest or abdomen.		الحروق المكشوفة في الصدر أو البطن.		
Eczema.		الإكزيما.		
Maintaining IV infusion or NG tube.		الحفاظ على المحلول الوريدي أو أنبوب الأنف (NGT).		
Equipment		الأدوات		
Gauze		شاش		
Dressing (padding)		غيار (حشو)		
Adhesive tape		شريط لاصق		
Procedure		خطوات الإجراء		
#	Step	الخطوة	Rationale (Why?)	السبب (ليه؟)
1	Hand washing and prepare the equipment.	اغسل إيديك وجهّز الأدوات.	To prevent the spread of infection and to save time.	لمنع انتقال العدوى وتوفير الوقت.
2	Pad the wrist or ankle with a dressing.	بطّن الرسغ أو الكاحل بغيار.	To prevent skin irritation caused by the restraint.	لمنع تهيج الجلد بسبب التقييد.
3	Make two loops of gauze in a figure-of-eight shape.	اعمل حلقتين من الشاش على شكل رقم ٨.	To form the clove-hitch shape that holds the limb.	لتكوين شكل عقدة الكلوف اللي بتمسك الطرف.
4	Hold the two loops together.	امسك الحلقتين مع بعض.	To facilitate proper application of the restraint.	لتسهيل تركيب التقييد صح.
5	Insert the wrist or ankle through the loops.	دخّل الرسغ أو الكاحل في الحلقتين.	To ensure secure placement around the wrist or ankle.	لضمان تثبيت آمن حوالين الرسغ أو الكاحل.
6	Tie the restraint to the bed frame .	اربط التقييد في هيكل السرير.	The frame is fixed; side rails move and may tighten the restraint when lowered.	الهيكل ثابت، أما الحواجز الجانبية بتتحرك ويمكن تشدّ التقييد لما تنزل.
7	Check the limb every 2 hours.	افحص الطرف كل ساعتين.	To prevent circulatory impairment and maintain skin and joint function.	لمنع اضطراب الدورة الدموية والحفاظ على وظيفة الجلد والمفاصل.

10. Jacket restraint

١٠. تقييد الجاكيت (Jacket)

What is it?

A jacket designed for restraining children. Its **sleeves/straps are tied to the bed frame**.

إيه هو؟

جاكيت مخصوص لتقييد الأطفال، أكمامه/أشريطه بتتربط في هيكل السرير.



Jacket restraint
جاكيت التقييد

Uses

الاستخدامات

- Prevent **falling due to climbing**.
- Keep the patient **lying on his back** following **chest surgery**.

• منع الوقوع بسبب التسلق.

• إبقاء المريض نائم على ظهره بعد جراحة الصدر.

Procedure

خطوات الإجراء

#	Step	الخطوة	Rationale (Why?)	السبب (ليه؟)
1	Put the jacket on the child with the ties at the back .	لبس الطفل الجاكيت والأشرطة ناحية الظهر.	To keep the child from untying it.	عشان الطفل ميقدش يفك الأشرطة.
2	Tie the straps to the bed frame, not to the side rails .	اربط الأشرطة في هيكل السرير، مش في الحواجز الجانبية.	To prevent excess tightening if the bed rail is lowered.	لمنع الشد الزايد لو الحاجز اتنزل.
3	Observe the child closely and change the child's position frequently .	راقب الطفل عن قرب وغيّر وضعه باستمرار.	To prevent injury and complications of prolonged immobility.	لمنع الإصابة ومضاعفات عدم الحركة لفترة طويلة.

١١. تقييد اليد / القفاز (Mitt)

11. Mitt or hand restraint

What is it?

It allows movement of the child's limb while protecting the upper body and head from finger activity.

إيه هو؟

يبيح بحركة طرف الطفل مع حماية الجزء العلوي من الجسم والراس من حركة الصوابع.



Commercially prepared mitt
(Mitt) قفاز جاهز

Indications

دواعي الاستخدام

- Prevent **scratching** (eczema).
- Prevent pulling **IV tubes, NG tubes or scalp-vein IV**.

- منع الحكّ (الإكزيما).
- منع شد المحلول الوريدي، أنبوب الأنف، أو كانيولا الراس.

Equipment

الأدوات

- Large dressing
- Gauze bandage
- Adhesive tape
- Commercially prepared mitt

- غيار كبير
- رباط شاش
- شريط لاصق
- قفاز جاهز

Procedure

خطوات الإجراء

#	Step	الخطوة	Rationale (Why?)	السبب (ليه؟)
1	Wash your hands.	اغسل إيديك.	To prevent the spread of infection.	لمنع انتقال العدوى.
2	Prepare the equipment.	جهّز الأدوات.	To save time and make the procedure smooth.	لتوفير الوقت وتسهيل الإجراء.
3	Explain the procedure to the mother.	اشرح الإجراء للأم.	To reduce the parents' stress and gain their cooperation.	لتقليل توتر الأهل وكسب تعاونهم.
Put the dressing:		حط الغيار:		
4	In the palm of the hand.	في كف اليد.	To protect the palm and prevent pressure.	لحماية الكف ومنع الضغط.

#	Step	الخطوة	Rationale (Why?)	السبب (ليه؟)
5	Between the fingers.	بين الأصابع.	To protect the fingers and prevent friction.	لحماية الأصابع ومنع الاحتكاك.
6	Around the whole hand.	حوالي اليد كلها.	To protect the fingers and prevent friction.	لحماية الأصابع ومنع الاحتكاك.
7	Cover the hand with gauze, then secure it with adhesive tape.	غطّي اليد بالشاش وبعدين تثبته بالشريط اللاصق.	To keep the dressing in place and protect the hand.	لتنشيط الغيار في مكانه وحماية اليد.
8	Change the mitt every 12–24 hours.	غيّر القفاز كل ١٢–٢٤ ساعة.	To check the skin and keep the hand clean and dry.	لفحص الجلد وإبقاء اليد نظيفة وناشفة.
9	Record any observations.	سجّل أي ملاحظات.	To document the child's condition and follow up.	لتوثيق حالة الطفل والمتابعة.

12. Checklists		١٢. قوائم التقييم (Checklists)		
Mummy restraint		تقييد الموميا		
#	Action	الإجراء	Done تم	Not done لم يتم
1	Hand washing and prepare equipment.	غسل الإيديين وتجهيز الأدوات.		
2	Explain the procedure to the parents.	شرح الإجراء للأهل.		
3	Place the blanket flat on the bed.	فرد البطانية على السرير.		
4	Fold down one corner and place the infant in supine position, with the shoulders near the upper edge.	ثني ركن لتحت ووضع الرضيع نائم على ظهره والكنتفين قريبين من الحافة العلوية.		
5	Bring one corner across the infant and secure it under the body, keeping the arms in an anatomical position.	تمرير ركن عبر الرضيع وثبتيته تحت الجسم مع إبقاء الذراعين في وضعهم الطبيعي.		
6	Fold the lower corner up, tuck it around the infant, and pin it, leaving enough space for leg extension.	ثني الركن السفلي ل فوق وشده حول الرضيع وثبتيته بدبوس مع ترك مساحة لفرد الرجلين.		
7	Bring the second corner across the infant and secure it with safety pins.	تمرير الركن الثاني عبر الرضيع وثبتيته بدبابيس الأمان.		
Modified mummy restraint		الموميا المعدلة		
#	Action	الإجراء	Done تم	Not done لم يتم
1	Hand washing and prepare equipment.	غسل الإيديين وتجهيز الأدوات.		
2	Explain the procedure to the parents.	شرح الإجراء للأهل.		
3	Place the blanket flat on the bed.	فرد البطانية على السرير.		
4	Fold down one corner and place the infant in supine position with the shoulders at the fold.	ثني ركن لتحت ووضع الرضيع نائم على ظهره والكنتفين عند الثنية.		
5	Position the infant's arm comfortably at the side.	وضع ذراع الرضيع بشكل مريح على جنبه.		
6	Fold the blanket over the arm and tuck it under infant's back.	ثني البطانية فوق الذراع وحشرها تحت الظهر.		
7	Repeat for the opposite arm.	تكرار نفس الخطوة للذراع الثاني.		
8	Fold the lower corner over the abdomen, leaving the chest exposed.	ثني الركن السفلي فوق البطن مع ترك الصدر مكشوف.		
9	Secure blanket sides behind infant's back with safety pins.	تثبيت جوانب البطانية ورا الظهر بدبابيس الأمان.		

Clove restraint (wrist / ankle)		تقييد الكلوف (الرسغ / الكاحل)		
#	Action	الإجراء	Done تم	Not done لم يتم
1	Hand washing and prepare equipment.	غسل الإيديين وتجهيز الأدوات.		
2	Pad the wrist or ankle with a dressing.	تبطين الرسغ أو الكاحل بغيرار.		
3	Make two loops of gauze as eight shape.	عمل حلقتين من الشاش على شكل ٨.		
4	Hold the two loops together.	مسك الحلقتين مع بعض.		
5	Slip the wrist or ankle through the loops.	تمرير الرسغ أو الكاحل في الحلقتين.		
6	Tie the restraint to the bed frame.	ربط التقييد في هيكل السرير.		
7	Check the limb every 15 minutes.	فحص الطرف كل ١٥ دقيقة.		

Mitt or hand restraint		تقييد اليد / القفاز		
#	Action	الإجراء	Done تم	Not done لم يتم
1	Wash your hands.	غسل الإيديين.		
2	Prepare the equipment.	تجهيز الأدوات.		
3	Explain the procedure to the mother.	شرح الإجراء للأم.		
4	Put dressing: (1) in the palm of the hand, (2) between the fingers, (3) around the whole hand.	وضع الغيرار: (١) في كف اليد، (٢) بين الأصابع، (٣) حول اليد كلها.		
5	Cover the hand with gauze, then secure it with adhesive tape.	تغطية اليد بالشاش وثبتيته بالشريط اللاصق.		
6	Remove the mitt every 12–24 hours.	فك/تغيير القفاز كل ١٢–٢٤ ساعة.		
7	Record any observations.	تسجيل أي ملاحظات.		