

 Arterial Puncture (ABG Sampling) — سحب غازات الدم الشريانية

#	Step (English)	الترجمة بالعربي	 Simplified Explanation (تبسيط)
1	Verify order & indications (ABG reason, FiO ₂ /vent settings).	تأكد من طلب التحليل والسبب وإعدادات الأوكسجين.	عشان تكون العينة في الوقت والموقف الصحيح للتحليل.
2	Identify patient using 2 identifiers.	تأكد من هوية المريض بطريقتين.	منع أي خطأ أو خلط بين المرضى.
3	Review contraindications/risks (negative Allen's test, infection at site, AV fistula, severe PAD, coagulopathy/anticoagulants, thrombocytopenia).	راجع موانع السحب Allen مثل اختبار السلبي أو العدوى أو مشاكل التجلط.	تجنب حدوث مضاعفات.
4	Check recent medications (anticoagulants, antiplatelet) & platelets/INR if available.	راجع الأدوية الحديثة وفحوصات التجلط.	تحديد طريقة الضغط المناسبة وتقليل النزيف.
5	Explain the procedure (brief pain, pressure after, keep still). Obtain consent per policy.	اشرح للمريض الخطوات وخذ موافقته.	تقليل التوتر وتحقيق تعاون المريض.
6	Hand hygiene & appropriate PPE.	اغسل يديك وارتيدي معدات الوقاية.	منع انتقال العدوى.
7	Gather equipment: heparinized ABG syringe/needle, alcohol/chlorhexidine swabs, sterile gauze, tape/occlusive dressing, sharps container, labels/ice, local anesthetic (optional), rolled towel.	جهز جميع الأدوات المطلوبة.	تجهيز مسبق لتسهيل الإجراء.
8	Position patient supine or semi-Fowler; extend wrist ~30° with a rolled towel under it; palm up.	ضع المريض في وضع مناسب ومدد المعصم.	تسهيل الوصول للشريان.

#	Step (English)	الترجمة بالعربي	 Simplified Explanation (تبسيط)
9	Perform Allen's test (for radial site).	اختبر الدورة الدموية في اليد (اختبار Allen).	ضمان وجود تدفق دم بديل.
10	Prepare the syringe: expel excess heparin, ensure needle secure, remove air.	جهز السرنجة وتخلص من الهواء.	منع أخطاء في نتائج التحليل.
11	Skin antisepsis: vigorous friction with alcohol or chlorhexidine; allow to dry completely.	نظف الجلد جيدًا واتركه يجف.	تقليل خطر العدوى.
12	Optional local anesthesia: 1% lidocaine without epinephrine.	استخدم مخدر موضعي (اختياري).	تقليل الألم أثناء السحب.
13	Palpate and locate the point of maximal radial pulse.	حدد مكان النبض الأقوى.	تحديد دقيق لمكان السحب.
14	Stabilize artery, insert needle bevel up at 30–45° toward pulse.	ثبت الشريان وأدخل الإبرة بزاوية 30–45°.	دخول سلس وتقليل الضرر.
15	Do NOT aspirate; allow arterial pressure to fill the syringe.	لا تسحب المكبس، اترك الدم يملأ السرنجة.	تجنب تكسير خلايا الدم.
16	If no flash/flow, withdraw slightly or change angle minimally.	إذا لم يظهر دم، عدل الزاوية قليلاً.	تجنب جرح الشريان أو تكرار الطعن.
17	Withdraw needle smoothly and apply firm pressure with sterile gauze for ≥5 minutes (≥10–15 min if anticoagulated).	اسحب الإبرة واضغط جيدًا لمدة كافية.	منع النزيف أو الورم الدموي.
18	Expel air bubbles from syringe; cap/secure needle.	تخلص من فقاعات الهواء وأمن الإبرة.	دقة النتائج + السلامة.

#	Step (English)	الترجمة بالعربي	 Simplified Explanation (تبسيط)
19	Gently roll/invert syringe to mix blood with heparin.	لف السرنجة برفق لخلط العينة.	منع التجلط داخل السرنجة.
20	Assess patient during/after puncture for pain, pallor, numbness, paresthesia, or color change distally.	راقب المريض لأي ألم أو تغيرات في اللون أو الإحساس.	اكتشاف مبكر لأي مضاعفات.
21	Label the sample at bedside with 2 identifiers, date/time, site, FiO ₂ /vent settings, and patient position.	ضع ملصق العينة فوراً بالمعلومات الكاملة.	ضمان صحة بيانات العينة.
22	Place on ice or send immediately according to lab policy.	ضع العينة على ثلج أو أرسلها فوراً.	الحفاظ على دقة نتائج الغازات.
23	Check the puncture site before releasing pressure; apply occlusive dressing.	افحص موقع السحب وضع لاصق بعد التأكد من توقف النزيف.	منع النزيف المتأخر.
24	Reassess distal perfusion (capillary refill, warmth, color, pulse) and document.	افحص الدورة الدموية الطرفية وسجل الملاحظات.	اكتشاف أي انسداد أو خلل.
25	Dispose of sharps and waste properly; hand hygiene.	تخلص من الإبر والنفايات بأمان واغسل يديك.	الوقاية من العدوى والإصابات.
26	Document: site, side, number of attempts, patient tolerance, complications, post-procedure assessment, oxygen/vent settings, and whether ice was used.	وثق جميع تفاصيل الإجراء.	سجل طبي قانوني وواضح.
27	Monitor the patient for ongoing bleeding, hematoma, numbness, increasing pain, or color change for at least 10–15 minutes.	راقب المريض بعد السحب لأي مضاعفات لمدة 10–15 دقيقة.	التدخل المبكر في حالة حدوث أي مشكلة.

