Nursing Procedures

الإجراءات التمريضية

Each procedure step by step, in English and Arabic

Contents

Restraints | **التقييد**

- Mummy Restraint | تقييد المومياء (لفّة البطانية)
- Modified Mummy Restraint | تقييد المومياء المعدّل
- Clove Restraint (Wrist / Ankle) | تقييد المعصم / الكاحل (Clove)
- Mitt (Hand) Restraint | تقييد اليد بالقفاز

Growth Measurements | **قياسات الجسم**

- Weight | الوزن
- Length (infant lying down) | الطول (للرضيع وهو نايم)
- Height (child standing) | الطول (للطفل وهو واقف)
- Head Circumference | محيط الراس
- Chest Circumference | محيط الصدر
- Mid-Arm Circumference | محيط منتصف الدراع

Neonatal Care | **العناية بالمولود**

- Phototherapy | العلاج بالضوء (لأطفال اليرقان)
- Incubator Care | العناية بالحضانة

Medication Administration | **إعطاء الأدوية**

- Before You Start: The First Five Steps | قبل ما تبدأ: الخمس خطوات الأولى
- Intradermal (ID) Injection | الحقن داخل الجلد (ID)
- Subcutaneous (SQ) Injection | الحقن تحت الجلد (SQ)
- Intramuscular (IM) Injection | الحقن في العضل (IM)
- Intravenous (IV) Injection | الحقن في الوريد (IV)
- Oral Medication: Dropper / Oral Syringe Method | الدوا بالفم: طريقة القطّارة / سرنجة الفم
- Oral Medication: Cup Method (toddlers and children) | الدوا بالفم: طريقة الكوب (للأطفال الصغيرين والأكبر)
- Oral Medication: Spoon Method | الدوا بالفم: طريقة الملعقة
- Ear Drops | نقط الودن
- Nasal Drops | نقط الأنف
- Eye Drops | نقط العين

Restraints

التقييد

Mummy Restraint | تقييد المومياء (لفّة البطانية)

#	English	بالعربي
1	Wash your hands and prepare the equipment.	اغسل إيديك وجهّز الأدوات
2	Explain the procedure to the parents.	اشرح الإجراء للأهل
3	Spread the blanket flat on the bed.	افرد البطانية على السرير
4	Fold one corner down. Lay the infant on his back with his shoulders near the top edge.	اطوي ركن للتحت وحط الطفل نايم على ضهره وكتافه قريبة من الحافة العلوية
5	Bring one side of the blanket across the infant and tuck it under his body. Keep his arms in a natural position.	هات ركن البطانية على الطفل وثبّته تحت الجسم، وخلّي الدراعات في وضعها الطبيعي
6	Fold the bottom corner up and tuck it around the infant. Pin it, leaving enough room for the legs to stretch.	اطوي الركن السفلي لفوق، وحطه حوالين الطفل، وثبّته بدبوس، وسيب مساحة تكفي لفرد الرجلين
7	Bring the other side of the blanket across the infant and secure it with safety pins.	هات الركن التاني على الطفل وثبّته بدبابيس الأمان

Modified Mummy Restraint | تقييد المومياء المعدّل

#	English	بالعربي
1	Wash your hands and prepare the equipment.	اغسل إيديك وجهّز الأدوات
2	Explain the procedure to the parents.	اشرح الإجراء للأهل
3	Spread the blanket flat on the bed.	افرد البطانية على السرير
4	Fold one corner down. Lay the infant on his back with his shoulders at the fold.	اطوي ركن للتحت وحط الطفل نايم على ضهره وكتافه عند الطية
5	Place the infant's arm comfortably at his side.	حط دراع الطفل براحة جنب جسمه
6	Fold the blanket over that arm and tuck it under the infant's back.	اطوي البطانية على الدراع وحطها تحت ضهر الطفل
7	Repeat the same for the other arm.	كرّر ده مع الدراع التانية
8	Fold the lower corner over the abdomen, leaving the chest uncovered.	اطوي الركن السفلي على البطن وسيب الصدر مكشوف
9	Secure the sides of the blanket behind the infant's back with safety pins.	ثبّت جوانب البطانية ورا ضهر الطفل بدبابيس الأمان

Clove Restraint (Wrist / Ankle) | تقييد المعصم / الكاحل (Clove)

#	English	بالعربي
1	Wash your hands and prepare the equipment.	اغسل إيديك وجهّز الأدوات
2	Pad the wrist or ankle with a dressing.	بطّن المعصم أو الكاحل بشاش/ضماد
3	Make two loops of gauze in a figure-eight shape.	اعمل حلقتين من الشاش على شكل رقم 8

#	English	بالعربي
4	Hold the two loops together.	امسك الحلقتين مع بعض
5	Slip the wrist or ankle through the loops.	دخّل المعصم أو الكاحل جوه الحلقتين
6	Tie the restraint to the bed frame.	اربط التقييد في إطار السرير
7	Check the limb every 15 minutes.	افحص الطرف كل 15 دقيقة

Mitt (Hand) Restraint | تقييد اليد بالقفاز

#	English	بالعربي
1	Wash your hands.	اغسل إيديك
2	Prepare the equipment.	جهّز الأدوات
3	Explain the procedure to the mother.	اشرح الإجراء للأم
4	Pad the hand with dressing: • in the palm of the hand • between the fingers • around the whole hand	حط الشاش: • في كف اليد. • بين الصوابع. • حوالين اليد كلها
5	Cover the hand with a gauze bandage and secure it with adhesive tape.	غطّي اليد بالشاش وبعدين ثبّته بشريط لاصق
6	Remove the mitt every 12–24 hours.	شيل التغطية كل 12 لـ 24 ساعة
7	Record any observations.	سجّل أي ملاحظات

Growth Measurements

قياسات الجسم

Weight | الوزن

#	English	بالعربي
For infants | للرضّع		
1	Wash your hands.	اغسل إيديك
2	Prepare the equipment.	جهّز الأدوات
3	Explain the procedure to the parents.	اشرح الإجراء للأهل
4	Keep privacy.	حافظ على الخصوصية
5	Wipe the scale with an alcohol swab and put a paper pad on it.	امسح الميزان بسواب كحول وحط عليه ورقة
6	Remove extra clothes and check that the diaper is dry. Place the infant on the scale, lying on his back or sitting.	شيل الهدوم الزيادة، اتأكد إن الحفاضة جافة، وحط الطفل على الميزان نايم على ضهره أو قاعد
7	Keep one hand just above the infant without touching the infant or the scale.	سيب إيد واحدة فوق الطفل من غير ما تلمسه أو تلمس الميزان
8	Wait until the reading is stable, then read the weight.	استنى لما القراءة تثبت واقرا الوزن
9	Take the infant off the scale and return him to the bed.	شيل الطفل من الميزان وارجّعه السرير
10	Remove the paper, clean the scale, and return everything to its place.	شيل ورقة الميزان، نضّف الميزان، وارجّع كل حاجة مكانها
11	Document on the child's chart.	سجّل في ملف الطفل
For older children | للأطفال الأكبر		
1	Do steps 1–5 above.	اعمل الخطوات من 1 لـ 5 اللي فوق
2	Help the child stand still in the center of the scale, arms at his sides, facing forward.	ساعد الطفل يقف ثابت وإيديه جنبه في نص الميزان ووشه قدام
3	Wait until the reading is stable, then read the weight.	استنى لما القراءة تثبت واقرا الوزن
4	Do steps 10–11 above (clean up and document).	اعمل الخطوتين 10 و11 اللي فوق (نضّف وسجّل)

Length (infant lying down) | الطول (للرضيع وهو نايم)

#	English	بالعربي
1	Wash your hands.	اغسل إيديك
2	Prepare the equipment.	جهّز الأدوات
3	Explain the procedure to the parents.	اشرح الإجراء للأهل
4	Keep privacy.	حافظ على الخصوصية
5	Lay the infant on his back. Gently hold his knees together and press them down flat.	حط الطفل نايم على ضهره. امسك ركبتيه مع بعض بلطف واضغط عليهم لتحت

#	English	بالعربي
6	If using a measuring board: put the paper on the board, then place the infant: • head against the fixed board • legs against the movable board	لو بتستخدم لوح القياس: حط الورقة على اللوح وبعدين حط الطفل: • الراس عند اللوح الثابت • الرجلين عند اللوح المتحرك
7	If using a measuring tape: mark the top of the head and the heels, then measure between the two marks.	لو بتستخدم شريط القياس: علّم نقطتين، فوق الراس وعند الكعبين، وقِس المسافة بينهم

Height (child standing) | الطول (للطفل وهو واقف)

#	English	بالعربي
1	Wash your hands.	اغسل إيديك
2	Prepare the equipment.	جهّز الأدوات
3	Explain the procedure to the parents.	اشرح الإجراء للأهل
4	Keep privacy.	حافظ على الخصوصية
5	Remove the child's shoes and cap.	شيل الجزمة والطاقية من الطفل
6	Ask the child to stand straight against a wall, hands beside the body, head in the midline, looking straight ahead.	خلّي الطفل يقف معدول على الحيطة، إيديه جنب جسمه وراسه في النص وعينه قدام
7	The child's back must touch the wall at 4 points: head, shoulders, buttocks, and heels.	ضهر الطفل لازم يلمس الحيطة في 4 نقط (الراس، الكتفين، المؤخرة، الكعبين)
8	Place a book on top of the head and make a mark on the wall.	حط الكتاب فوق الراس وعلّم علامة
9	Measure the distance between the mark and the floor.	قيس المسافة بين العلامة والأرض
10	Document it on the growth chart.	سجّل ده على منحنى النمو
★	**Note:** Length (lying down) is about 2 cm more than height (standing) because the muscles relax.	**ملحوظة:** في وضع النوم: الطول (Length) أكبر من طول الوقوف (Height) بحوالي 2 سم (بسبب ارتخاء العضلات).

Head Circumference | محيط الراس

#	English	بالعربي
1	Wash your hands.	اغسل إيديك
2	Prepare the equipment.	جهّز الأدوات
3	Explain the procedure to the parents.	اشرح الإجراء للأهل
4	Place the infant in a sitting position or lying on his back.	حط الطفل قاعد أو نايم على ضهره
5	Pass the tape around the head: just above the eyebrows, above both ears, and around the most prominent part of the back of the skull.	مرّر الشريط من منطقة الجبهة فوق الحواجب وفوق صيوان الودان، وحوالين النتوء القذالي (أبرز نقطة) في ورا الجمجمة
6	Read the measurement.	اقرا القياس

#	English	بالعربي
7	Record it on the growth chart.	سجّل القراءة على منحنى النمو

Chest Circumference | محيط الصدر

#	English	بالعربي
1	Wash your hands.	اغسل إيديك
2	Prepare the equipment.	جهّز الأدوات
3	Explain the procedure to the parents.	اشرح الإجراء للأهل
4	Lay the infant on his back on a flat table.	حط الطفل نايم على ضهره على سطح مستوي
5	Place the tape at the center of the chest, across the nipple line, passing under both armpits.	حط الشريط في نص الصدر وعلى خط الحلمتين، وخلّيه يعدّي تحت الإبطين
6	Measure during inspiration and during expiration. Final measurement = (inspiration reading + expiration reading) ÷ 2.	خد القياس وقت الشهيق ووقت الزفير. القياس النهائي = قراءة الشهيق + قراءة الزفير ÷ 2
7	Record the value.	سجّل القيمة

Mid-Arm Circumference | محيط منتصف الذراع

#	English	بالعربي
1	Wash your hands.	اغسل إيديك
2	Prepare the equipment.	جهّز الأدوات
3	Explain the procedure to the parents.	اشرح الإجراء للأهل
4	Ask the child to bend his arm at a 90° angle at the elbow.	اطلب من الطفل يثني دراعه بزاوية 90 درجة عند الكوع
5	Place the zero mark of the tape on the tip of the shoulder (acromion) and run it down to the elbow.	حط علامة الصفر في الشريط على نتوء الكتف (الأخرم) ونزّل لحد الكوع
6	Measure the total length and divide it by 2. This is the midpoint.	قيس الطول الكلي وقسّمه على 2، ده هو المنتصف
7	Wrap the tape around the arm at the midpoint.	لف شريط القياس حوالين الدراع عند نقطة المنتصف
8	Read the measurement and record it on the growth chart.	اقرا القياس وسجّله على منحنى النمو
★	**Note:** Mid-arm circumference is an indirect way to measure total muscle mass and nutritional status.	**ملحوظة:** محيط منتصف الدراع طريقة غير مباشرة لقياس الكتلة العضلية الكلية والمستوى الغذائي.

Neonatal Care

العناية بالمولود

Phototherapy | العلاج بالضوء (لأطفال اليرقان)

#	English	بالعربي
1	Wash your hands.	اغسل إيديك
2	Check the neonate's record for the prescription.	راجع ملف المولود للتأكد من الأمر الطبي
3	Prepare the equipment and supplies.	جهّز الأدوات والمستلزمات
4	Check that the device works well, and read its counter to know how long it has been used.	تأكد إن الجهاز شغّال كويس، واقرا العدّاد بتاعه عشان تعرف اتستخدم قد إيه
5	Check the position of the lights: about 10 cm from the neonate in an open bassinet, or 38–46 cm from the infant in an isolette.	اتأكد إن مكان الأضواء متظبط: في السرير المفتوح حوالي 10 سم من المولود، وفي الحضانة (isolette) من 38 لـ 46 سم من الطفل
6	Undress the neonate, leaving a diaper on to cover the genitals.	اقلع هدوم المولود وسيب الحفاضة عشان تغطي الأعضاء التناسلية
7	Keep the skin clean, especially the diaper area. Do not use oily products on the skin (to prevent tanning and burns).	حافظ على نضافة الجلد خصوصًا منطقة الحفاضة. متستخدمش كريمات أو زيوت على الجلد عشان متسببش سمار أو حروق
8	Make sure the eyelids are closed, then cover the eyes completely with protective eye shields. Do not block the nose.	اتأكد إن جفون المولود مقفولة، وغطّي العينين بالكامل بواقي العين بحرص، وخلّي بالك إنك متسدش الأنف
9	Change the neonate's position every 2 hours. Check skin condition, hydration, and neurological status.	غيّر وضع المولود كل ساعتين، وقيّم سلامة الجلد والترطيب والحالة العصبية
10	Check the temperature every 2–3 hours. It should stay between 36.7°C and 37.8°C.	راقب درجة حرارة المولود كل 2 لـ 3 ساعات. لازم الحرارة تبقى بين 36.7 و37.8 درجة مئوية أثناء العلاج بالضوء
11	Feed the neonate (breast or formula) every 2–3 hours. Remove the eye shields and stop phototherapy during feeding and care.	ادّي المولود رضاعة طبيعية أو صناعية كل 2 لـ 3 ساعات، وشيل واقي العين ووقّف العلاج بالضوء وقت الرضاعة والعناية بالمولود
12	Make sure fluid intake is enough to prevent dehydration.	اتأكد من كمية سوائل كافية لمنع الجفاف
13	Monitor the bilirubin level in the blood.	تابع مستوى البيليروبين في الدم
14	Turn phototherapy off when taking blood for bilirubin, because the light breaks down unconjugated bilirubin.	اتأكد إن جهاز العلاج بالضوء مطفي وقت سحب الدم لقياس البيليروبين، لأن البيليروبين غير المرتبط بيتأكسد بالضوء لما يتعرض لضوء الجهاز
15	Watch for side effects: loose green stools, hyperthermia, and dehydration.	افحص الأعراض الجانبية للعلاج بالضوء زي البراز الأخضر السايب وارتفاع الحرارة والجفاف
16	If hyperthermia happens: stop phototherapy or move it to a cooler place, lower the room temperature, and recheck the temperature every 15 minutes.	في حالة ارتفاع الحرارة: وقّف العلاج بالضوء أو انقله لمكان أبرد، وقلّل حرارة الأوضة، وأعد قياس حرارة المولود كل 15 دقيقة
17	Check the eyes every shift for discharge or irritation.	افحص العينين في كل وردية للتأكد من عدم وجود إفرازات أو تهيج

#	English	بالعربي
18	Stop the therapy when the doctor orders it.	وقّف العلاج لما الدكتور يأمر بكده

Incubator Care | العناية بالحضانة

#	English	بالعربي
1	Wash your hands.	اغسل إيديك
2	Prepare the necessary equipment.	جهّز الأدوات اللازمة
3	Keep privacy during the procedure.	وفّر الخصوصية أثناء الإجراء
4	Keep the environment clean and safe.	حافظ على البيئة نضيفة وآمنة
5	Wear gloves.	البس جوانتي
6	Check the expiry date and instructions of the disinfectant before use.	اتأكد من تاريخ الصلاحية وشروط التشغيل للمطهرات النهائية قبل الاستخدام
7	Take the neonate out of the incubator if his condition allows.	شيل المولود من الحضانة لو حالته تسمح
8	Wet a sterile towel sponge with distilled water.	بلّل إسفنجة/فوطة معقمة بالمية المقطّرة
9	Remove any dirty items. Clean the inside of the incubator from far to near and from top to bottom, in one direction, from the cleanest area to the dirtiest.	شيل أي أدوات متسخة ونضّف جوه الحضانة من البعيد للقريب ومن فوق لتحت في اتجاه واحد، وابدأ من الأنضف للأوسخ
10	Dry the inside with a dry sterile towel, from far to near and top to bottom, in one direction.	نشّف جوه الحضانة بفوطة معقمة ناشفة من البعيد للقريب ومن فوق لتحت في اتجاه واحد
11	Clean the outer walls with an approved disinfectant every 8 hours. Always wipe from top to bottom in one direction.	استخدم مطهر معتمد ونضّف الجدران الخارجية للحضانة كل 8 ساعات. امسح دايمًا من فوق لتحت في حركة باتجاه واحد
12	Wipe the plastic cover of the mattress with disinfectant.	امسح الغطا البلاستيك بتاع المرتبة بالمطهر
13	Change the bed sheet.	غيّر ملاية السرير
14	Change the distilled water in the humidifier tank and fill it to the right level.	غيّر المية المقطّرة في خزان المرطّب واملا الخزان للمستوى المناسب بمية مقطّرة
15	Monitor the oxygen flow rate and concentration as prescribed.	راقب معدل تدفق الأكسجين وتركيزه زي ما هو موصوف
16	Set and monitor the humidity at 55%–65%.	اضبط وراقب تحكم الرطوبة في الحضانة للحفاظ على بيئة مثالية بين 55% و65%
17	Keep the temperature between 32°C and 36°C.	حافظ على درجة الحرارة في النطاق المستهدف من 32 لـ 36 درجة مئوية
18	Return the neonate to the incubator and make sure he is comfortable and safe.	رجّع المولود للحضانة مع التأكد من راحته وسلامته
19	Clean the reused equipment and return it to its place.	رجّع ونضّف الأدوات اللي اتستخدمت تانيبخط اليد
20	Remove your gloves.	اقلع الجوانتيبخط اليد
21	Wash your hands.	اغسل إيديكبخط اليد

Medication Administration

إعطاء الأدوية

Before You Start: The First Five Steps | قبل ما تبدأ: الخمس خطوات الأولى

Do these five steps before every method below. | اعمل الخمس خطوات دي قبل أي طريقة من اللي جاية.

#	English	بالعربي
1	Check the doctor's order.	راجع أمر الدكتور
2	Wash your hands.	اغسل إيديك
3	Bring all the needed equipment to the patient's bedside.	هات كل الأدوات المطلوبة لجنب سرير المريض
4	Check the medicine bottles on the cart.	افحص زجاجات الدوا اللى على العربية
5	Explain the procedure honestly and in a simple way to the child, and reassure him.	اشرح الإجراء للطفل بصدق وبطريقة بسيطة وطمّنه

Intradermal (ID) Injection | الحقن داخل الجلد (ID)

#	English	بالعربي
1	Do the First Five Steps.	اتبع الخمس خطوات اللي قبل كده
2	Position the inner forearm: arm relaxed, palm facing up.	وضّع الجزء الداخلي من الساعد: حط الدراع مرتخي وكف اليد لفوق
3	Clean the site with an alcohol swab in a circular motion, then let it air dry.	عقّم مكان الحقن بسواب كحول بحركة دائرية، وسيبه يجف في الهوا
4	Remove the needle cap and expel air bubbles.	شيل غطا الإبرة وطلّع فقاقيع الهوا
5	Pull the skin tight: use your non-dominant thumb to press down just below the site.	شدّ الجلد: استخدم إبهام اليد غير المسيطرة واضغط لتحت تحت مكان الحقن مباشرة
6	Insert the needle with your dominant hand, bevel up, at a 10–15° angle.	دخّل الإبرة: امسك السرنجة باليد المسيطرة، وفتحة الإبرة لفوق، بزاوية 10 لـ 15 درجة
7	Inject the medication. A small raised bump (wheal) should appear. If no wheal appears, withdraw the needle and repeat at a new site.	احقن الدوا وراقب ظهور بقعة منتفخة واضحة في الجلد ملحوظة: لو البقعة المنتفخة معملتش، اسحب الإبرة وكرر في مكان جديد
8	Withdraw the needle quickly at the same angle.	اسحب الإبرة بسرعة بنفس زاوية الدخول
9	Cover the site lightly. Do not press, rub, or massage.	غطّي المكان بخفة من غير ضغط ولا دعك ولا تدليك
10	Put the uncapped needle and syringe directly into the puncture-resistant safety box.	تخلّص من الإبرة والسرنجة من غير غطا مباشرة في صندوق أمان مقاوم للثقب
11	Tell the patient or caregiver not to rub or scratch the site.	وجّه المريض/مقدم الرعاية إنه ميدعكش ولا يحكّ
12	Clean the equipment, dispose of waste safely, and wash your hands.	نضّف الأدوات، وتخلّص من المخلفات بأمان، واغسل إيديك
13	Record the reaction. For allergy tests, note the immediate reaction (within minutes) or schedule a follow-up check.	قيّم وسجّل رد الفعل لاحظ الاستجابة الفورية لاختبارات الحساسية (خلال دقايق) أو حسب الجدول الزمني

Subcutaneous (SQ) Injection | الحقن تحت الجلد (SQ)

#	English	بالعربي
1	Do the First Five Steps.	اتبع الخمس خطوات اللي قبل كده
2	Make sure the medication is at room temperature.	اتأكد إن الدوا في درجة حرارة الأوضة قبل الحقن
3	Expose the injection site (upper arm, upper leg, or abdomen).	اكشف مكان الحقن المستهدف (أعلى الدراع، أعلى الرجل، أو البطن)
4	Clean the skin with an alcohol swab and let it air dry.	عقّم الجلد بسواب كحول وسيبه يجف في الهوا
5	Pinch a fold of skin at the site.	اقرص ثنية من الجلد في مكان الحقن
6	Insert the needle into the base of the skin fold at a 45° angle.	دخّل الإبرة في قاعدة ثنية الجلد بزاوية 45 درجة
7	Aspirate briefly. If blood appears, withdraw the needle and start again with new equipment. Do not aspirate for insulin or heparin.	اسحب شفط قصير (لو ظهر دم اسحب الإبرة وابدأ من الأول بأدوات جديدة، ومتسحبش شفط مع الأنسولين أو الهيبارين)
8	Inject the medication slowly.	احقن الدوا ببطء
9	Wait 10 seconds (count 1 to 10) before removing the needle.	استنى 10 ثواني أو عدّ من 1 لـ 10 قبل سحب الإبرة
10	Withdraw the needle quickly at the same angle. Do not recap it.	اسحب الإبرة بسرعة بنفس الزاوية ومتغطيهاش تاني
11	Place a sterile dry cotton ball over the site and fix it with adhesive tape.	حط قطنة جافة معقمة على المكان وثبتها بلاصق
12	Assess the child's reaction and reassure him.	قيّم رد فعل الطفل وطمّنه
13	Clean up the equipment, dispose of waste safely, and wash your hands.	نضّف الأدوات وتخلّص من المخلفات بأمان واغسل إيديك
14	Document: time, dose, route, site, patient reaction, and your signature.	سجّل التفاصيل: الوقت، الجرعة، الطريق، المكان، رد فعل المريض، وتوقيع الممرض

Intramuscular (IM) Injection | الحقن في العضل (IM)

#	English	بالعربي
1	Do the First Five Steps.	اتبع الخمس خطوات اللي قبل كده
2	Expose the injection site.	اكشف مكان الحقن
3	Clean the skin with an alcohol swab in a circular motion, from inside to outside.	نضّف الجلد بسواب كحول بحركة دائرية من جوه لبرة
4	Encourage the child to relax the muscle (if age-appropriate).	شجّع الطفل إنه يرخّي العضلة (لو سنه يسمح)
5	Insert the needle quickly at a 90° angle.	دخّل الإبرة بسرعة بزاوية 90 درجة
6	Aspirate for blood. If blood appears, remove and discard the needle immediately and start again with new equipment.	اسحب شفط وشوف لو في دم، ولو ظهر دم اسحب الإبرة وارميها فورًا وابدأ من الأول بأدوات جديدة
7	Inject the medication slowly, then withdraw the needle at the same angle.	احقن الدوا ببطء، وبعدين اسحب الإبرة بنفس الزاوية

#	English	بالعربي
8	Press lightly with a dry sterile cotton ball and put on a Band-Aid.	اضغط بخفة بقطنة جافة معقمة وحط بلاستر
9	Put the syringe and uncapped needle immediately into the safety box.	تخلّص من السرنجة والإبرة من غير غطا فورًا في صندوق الأمان
10	Comfort the child, clean up the equipment, and wash your hands.	طمّن الطفل، ونضّف الأدوات، واغسل إيديك
11	Document: time, drug name, dose, route, site, and your signature.	سجّل التفاصيل: الوقت، اسم الدوا، الجرعة، الطريق، المكان، وتوقيع الممرض

Intravenous (IV) Injection | الحقن في الوريد (IV)

#	English	بالعربي
1	Do the First Five Steps.	اتبع الخمس خطوات اللي قبل كده
2	Place the arm or leg in a relaxed, supported position and select the vein.	وضّع الطرف المستهدف في وضع مريح ومسنود، واختار الوريد
3	Clean the site with an alcohol swab in a circular outward motion and let it air dry.	عقّم مكان الحقن بسواب كحول بحركة دائرية لبرة، وسيبه يجف في الهوا
4	Apply a tourniquet 5–6 inches above the selected site.	حط رباط ضاغط (تورنيكيه) فوق مكان الدخول المختار بـ 5 لـ 6 بوصة
5	Fix the vein: pull the skin down below the site with your non-dominant thumb.	ثبّت الوريد: اشدّ الجلد بإيدك تحت المكان بإبهام اليد غير المسيطرة
6	Remove the needle cap and expel air bubbles from the syringe.	شيل غطا الإبرة وطلّع فقاقيع الهوا من السرنجة
7	Insert the needle, bevel up, at a 15°–30° angle into the vein.	دخّل الإبرة وفتحتها لفوق بزاوية 15 لـ 30 درجة في الوريد
8	Look for blood return and aspirate gently to confirm the needle is in the vein.	راقب رجوع الدم واسحب شفط بلطف للتأكد إن الإبرة جوه الوعاء الدموي
9	Release the tourniquet.	فُك الرباط الضاغط
10	Inject the medication very slowly. Watch for pain, swelling, or hematoma (aspirate again if you are not sure the needle is in the vein).	احقن الدوا ببطء جدًا وأنت بتراقب الألم أو التورم الموضعي أو تكوّن كدمة (اسحب شفط تاني لو مش متأكد إن الإبرة في الوريد)
11	Withdraw the needle quickly and press firmly and continuously with a dry sterile cotton ball. Secure it with tape.	اسحب الإبرة بسرعة واضغط بقوة ومن غير انقطاع بقطنة جافة معقمة، وثبّتها بلاصق
12	Reassure the patient and watch for immediate adverse reactions.	طمّن المريض وراقب أي أعراض جانبية فورية
13	Put the uncapped needle and syringe into the puncture-resistant safety box, clean the equipment, and wash your hands.	تخلّص من الإبرة والسرنجة من غير غطا في صندوق أمان مقاوم للثقب، ونضّف الأدوات، واغسل إيديك

Oral Medication: Dropper / Oral Syringe Method | الدوا بالفم: طريقة القطّارة / سرنجة الفم

#	English	بالعربي
1	Do the First Five Steps.	اتبع أول خمس خطوات

#	English	بالعربي
2	Give the medication at room temperature.	ادّي الدوا في درجة حرارة الأوضة
3	Raise the infant's head and gently press his chin down with your thumb.	ارفع راس الرضيع واضغط دقنه لتحت بلطف بإبهامك
4	Give the medication along the side of the tongue.	ادّي الدوا على جنب اللسان
5	Wait until the infant swallows all the medicine, then return his head to its normal position.	استنى لحد ما الرضيع يبلع الدوا كله، وبعدين رجّع راسه لوضعها الطبيعي

Oral Medication: Cup Method (toddlers and children) | الدوا بالفم: طريقة الكوب (للأطفال الصغيرين والأكبر)

#	English	بالعربي
1	Do the First Five Steps.	اتبع أول خمس خطوات
2	Give the medication at room temperature.	ادّي الدوا في درجة حرارة الأوضة
3	Place the child in a sitting or upright position.	حط الطفل قاعد أو في وضع مستقيم
4	If the child is old enough, encourage him to hold the cup and drink.	شجّع الطفل لو كبير كفاية إنه يمسك الكوب ويشرب
5	If the child cannot use the cup, use a dropper or oral syringe instead and give the medication along the side of the tongue.	لو الطفل مش قادر يستخدم الكوب، استخدم قطّارة أو سرنجة فم بدله وادّي الدوا على جنب اللسان
6	Wait until the child swallows all the medicine.	استنى لحد ما الرضيع يبلع الدوا كله، وبعدين رجّع راسه لوضعها الطبيعي

Oral Medication: Spoon Method | الدوا بالفم: طريقة الملعقة

#	English	بالعربي
1	Do the First Five Steps.	اتبع أول خمس خطوات
2	Give the medication at room temperature.	ادّي الدوا في درجة حرارة الأوضة
3	Put the medicine into the medication spoon.	حط الدوا في ملعقة الدوا
4	Raise the child's head and gently press his chin down with your thumb to open his mouth.	ارفع راس الطفل واضغط دقنه لتحت بلطف بإبهامك عشان يفتح بقه
5	Give the medication along the side of the tongue.	ادّي الدوا على جنب اللسان
6	Make sure the child swallows all the medicine before putting him back in bed.	اتأكد إن الطفل بلع الدوا كله قبل ما ترجّعه السرير

Ear Drops | نقط الودن

#	English	بالعربي
1	Do the First Five Steps.	اتبع الخمس خطوات اللي قبل كده
2	Give the medication at room temperature.	ادّي الدوا في درجة حرارة الأوضة
3	Place infants and toddlers on their side.	حط الرضّع والأطفال الصغيرين على جنبهم

#	English	بالعربي
4	Clean the ear with cotton soaked in water.	نضّف الودن بقطنة مبلولة بمية
5	Straighten the ear canal by pulling the ear (pinna): • young children (under 3 years): pull down and back • older children (over 3 years): pull up and back	عدّل قناة الودن بشدّ صيوان الودن: • الأطفال الصغيرين (أقل من 3 سنين): اشدّه لتحت ولورا • الأطفال الأكبر (أكتر من 3 سنين): اشدّه لفوق ولورا
6	Put the warm ear drops into the ear canal and gently massage the area, unless it is not allowed.	حط نقط الودن الدافية في قناة الودن ودلّك المنطقة بلطف، إلا لو ممنوع
7	Place a small cotton at the ear opening so the medicine does not leak out.	حط قطنة صغيرة عند فتحة الودن عشان الدوا ميسيلش بره
8	Remove and clean the equipment.	شيل ونضّف الأدوات
9	Wash your hands.	اغسل إيديك
10	Record the date, medicine name, dose, route, and your signature on the chart.	سجّل التاريخ واسم الدوا والجرعة والطريق والتوقيع في الملف

Nasal Drops | نقط الأنف

#	English	بالعربي
1	Do the First Five Steps.	اتبع أول خمس خطوات
2	Give the medication at room temperature.	ادّي الدوا في درجة حرارة الأوضة
3	Position the child and tilt the head back: • Infant: hold him in the cradle position and support his head. • Young child: lay him on his back with a pillow under his neck. • Older child: let his head hang back over the edge of the bed.	وضّع الطفل صح وميّل الراس لورا: • للرضيع: امسكه في وضع المهد وسند راسه • للطفل الصغير: حطه على ضهره ووسادة تحت رقبته • للطفل الأكبر: مدّ راسه بره حافة السرير
4	Clean the nostrils with cotton and water.	نضّف فتحتين الأنف بقطنة ومية
5	Put the prescribed drops into each nostril. Keep the child in the same position for at least one minute.	حط النقط الموصوفة في كل فتحة أنف وسيب الطفل في نفس الوضع دقيقة على الأقل
6	Record the date, medicine name, dose, route, and your signature on the chart.	سجّل التاريخ واسم الدوا والجرعة والطريق وتوقيعك في الملف

Eye Drops | نقط العين

#	English	بالعربي
1	Do the First Five Steps.	اتبع الخمس خطوات اللي قبل كده
2	Place the child on his back. Restrain him gently if needed.	حط الطفل نايم على ضهره وقيّده بلطف لو احتجت
3	Clean each eye with cotton soaked in water, from the inner corner to the outer corner.	نضّف كل عين بقطنة مبلولة بمية، من الزاوية الداخلية للخارجية

#	English	بالعربي
4	Pull the lower eyelid down and out to form a small pocket.	اشدّ الجفن السفلي لتحت ولبرة عشان يتكوّن جيب صغير
5	Put the eye drops into the pocket (conjunctival sac).	حط نقط العين في الكيس الملتحمي
6	Close the eye gently and keep it closed for a few seconds.	اقفل العين بلطف وسيبها مقفولة كام ثانية
7	If using ointment, apply it from the inner corner outward.	لو بتستخدم مرهم، حطه من الزاوية الداخلية للخارج
8	Do not touch the tip of the dropper or ointment tube to the eye or skin.	متلمسش طرف القطّارة أو أنبوبة المرهم لا العين ولا الجلد
9	Remove and clean the equipment.	شيل ونضّف الأدوات
10	Wash your hands.	اغسل إيديك
11	Record the date, medication name, dose, and your signature on the chart.	سجّل التاريخ واسم الدوا والجرعة والتوقيع في الملف