

Question 1: Explain the basic anatomy of the large intestine.

السؤال 1: اشرح التشريح الأساسي للأمعاء الغليظة.

- It is a 150–180 cm tube from the small intestine to the anus.
هي أنبوب طوله 150–180 سم من الأمعاء الدقيقة إلى الشرج.
- Parts: cecum, colon (ascending, transverse, descending), sigmoid, rectum, anal canal.
أجزاؤها: الأعور، القولون (الصاعد، المستعرض، النازل)، السيني، المستقيم، القناة الشرجية.
- Ileocecal valve prevents backflow from colon to small intestine.
الصمام اللفائفي الأعوري يمنع رجوع البراز للأمعاء الدقيقة.
- The anal canal has internal (involuntary) and external (voluntary) sphincters.
القناة الشرجية بها عاصرة داخلية لا إرادية، وخارجية إرادية.

Question 2: List four factors influencing bowel elimination and explain one.

السؤال 2: اذكر أربعة عوامل تؤثر على إخراج البراز وشرح واحداً.

- Age, diet, fluid intake, physical activity.
العمر، النظام الغذائي، تناول السوائل، النشاط البدني.
- Diet: High fiber helps normal elimination.
النظام الغذائي: الألياف تساعد على إخراج طبيعي.

- Gas-producing foods increase peristalsis.
الأطعمة المنتجة للغازات تحفز الحركة الدودية.
 - Spicy food may cause diarrhea or indigestion.
الأطعمة الحارة قد تسبب إسهال أو عسر هضم.
-

Question 3: Define constipation and list two causes.

السؤال 3: عرف الإمساك واذكر سببين.

- Constipation: dry, hard stool from delayed passage.
الإمساك: براز جاف وصلب بسبب تأخير الإخراج.
 - Causes: ignoring urge to defecate, low fiber diet.
الأسباب: تجاهل الرغبة في التبرز، نظام غذائي قليل الألياف.
-

Question 4: What is fecal impaction and how is it managed?

السؤال 4: ما هو الانحشار البرازي وكيف يتم تديره؟

- Hard mass of stool stuck in rectum.
كتلة صلبة من البراز عالقة في المستقيم.
 - Treated with oil enema, cleansing enema, or manual removal.
يُعالج بحقنة شرجية زيتية، مطهرة، أو إزالة يدوية.
-

Question 5: Two signs and symptoms of diarrhea.

السؤال 5: علامتان وأعراض للإسهال

- Spasmodic abdominal pain.
ألم بطني تشنجي.
 - Frequent, watery stool.
براز مائي متكرر.
-

Question 6: Define flatulence and give one cause.

السؤال 6: عرف انتفاخ البطن واذكر سبباً

- Gas buildup causing bowel distension.
تراكم غازات يسبب تمدد الأمعاء.
 - Caused by surgery, anesthesia, or low activity.
يسببه الجراحة أو التخدير أو قلة الحركة.
-

Question 7: What are hemorrhoids and what causes them?

السؤال 7: ما هي البواسير وما الذي يسببها؟

- Swollen veins in rectal lining.
أوردة منتفخة في بطانة المستقيم.
 - Caused by straining, pregnancy, heart or liver issues.
بسبب الإجهاد، الحمل، أمراض القلب أو الكبد.
-

Question 8: Describe urination (micturition).

السؤال 8: صف عملية التبول.

- Emptying bladder when it fills with 250–450 mL.
إفراغ المثانة عند امتلائها بـ 250–450 مل
 - Triggered by stretch receptors in bladder wall.
يُحفز بواسطة مستقبلات التمدد في جدار المثانة
-

Question 9: How does age affect urination?

السؤال 9: كيف يؤثر العمر على التبول؟

- Infants: no control or concentration.
الرضع: لا تحكم ولا تركيز للبول
 - Control develops by age 5.
يتحسن التحكم حتى سن ٥ سنوات
 - After 50: kidney function drops, bladder weakens.
بعد سن ٥٠: تنخفض وظيفة الكلى وتضعف المثانة
-

Question 10: Three factors affecting urination besides age/disease.

السؤال 10: ثلاث عوامل تؤثر على التبول بخلاف العمر أو المرض.

- Stress/anxiety.
التوتر/القلق

- Fluid and food intake.
تناول السوائل والأطعمة.
 - Medications and surgery.
الأدوية والجراحة.
-

Question 11: What is urinary retention? Mention two causes.

السؤال 11: ما هو احتباس البول؟ اذكر سببين.

- Inability to empty bladder fully.
عدم القدرة على إفراغ المثانة تماماً.
 - Causes: enlarged prostate, surgery.
الأسباب: تضخم البروستاتا، الجراحة.
-

Question 12: Three signs of urinary tract infection (UTI).

السؤال 12: ثلاث علامات لعدوى المسالك البولية.

- Pain or burning while urinating (dysuria).
ألم أو حرقه أثناء التبول (عسر التبول).
- Fever or chills.
حمى أو قشعريرة.
- Frequent urgent urination.
تكرار وإلحاح في التبول.

Question 13: Two nursing interventions to promote urination.

السؤال 13: تدخلان تمريضيان لتعزيز التبول.

- Normal position: sitting/squatting (female), standing (male).
الوضع الطبيعي: جلوس/قرفصاء للنساء، وقوف للرجال.
- Use sound of running water.
استخدام صوت الماء الجاري.

Question 14: Three ways to prevent UTI.

السؤال 14: ثلاث طرق لمنع عدوى المسالك البولية.

- Drink enough fluids, especially acidic juices.
شرب سوائل كافية، خصوصاً العصائر الحمضية.
- Urinate every 2–4 hours.
التبول كل ٢–٤ ساعات.
- Wipe front to back; wear cotton underwear.
المسح من الأمام للخلف؛ ارتداء ملابس قطنية.