

Management of Patient with Deep Venous Thrombosis (DVT)

إدارة مريض الجلطة الوريدية العميقة

Outlines

المقدمة – Introduction

آلية المرض – Pathophysiology

عوامل الخطورة – Risk factors

الأعراض – Clinical manifestation

المضاعفات – Complications

التشخيص – Diagnosis

العلاج الطبي – Medical management

العلاج الجراحي – Surgical management

التمريض – Nursing management

Introduction

Deep vein thrombosis (DVT) is an obstructive disease hindering venous reflux mechanism.

الجلطة الوريدية العميقة مرض انسدادى يعيق رجوع الدم الوريدي.

It usually affects the lower limb venous system.

غالبًا تصيب أوردة الأطراف السفلية.

Clot formation starts in deep calf veins and propagates proximally.

تبدأ الجلطة في أوردة الساق العميقة وتمتد لأعلى.

Definition

DVT is the development of thrombosis within deep veins of the pelvis or lower limbs.

الجلطة الوريدية العميقة هي تكوّن جلطة داخل الأوردة العميقة بالحوض أو الساقين.

Thrombophlebitis: inflammation of vein wall.

التهاب الوريد المصحوب بجلطة.

Phlebothrombosis: clot formation without inflammation.

تكوّن جلطة بدون التهاب بالوريد.

Risk Factors (Virchow's Triad)

1. Endothelial Damage

Trauma

إصابة

Surgery

جراحة

Pacing wires

أسلاك تنظيم ضربات القلب

Central venous catheter

قسطرة وريدية مركزية

Dialysis access catheter

قسطرة غسيل كلوي

Local vein damage

تلف موضعي بالوريد

Repetitive motion injury

حركات متكررة

2. Venous Stasis

Bed rest or immobilization

راحة طويلة أو عدم حركة

Obesity

السمنة

History of varicosities

تاريخ مرضي للدوالي

Spinal cord injury

إصابة الحبل الشوكي

Age > 65 years

كبار السن

3. Altered Coagulation

Cancer

السرطان

Pregnancy

الحمل

Oral contraceptives

حبوب منع الحمل

Hyperhomocysteinemia

ارتفاع الهوموسيستين

Elevated clotting factors

زيادة عوامل التجلط

Antithrombin III deficiency

نقص مضاد الثرومبين

Polycythemia

كثرة كرات الدم

Septicemia

تسمم دم

Clinical Manifestations

Symptoms vary and may be symptomatic or asymptomatic.

الأعراض قد تكون ظاهرة أو بدون أعراض.

Edema of the affected extremity is a common symptom.

تورم الطرف المصاب عرض شائع.

Pain: aching discomfort aggravated by exercise.

ألم بالساق يزيد مع الحركة.

Dilated superficial veins

توسع الأوردة السطحية

Redness or bluish discoloration

احمرار أو تغير لون الجلد

Warmth of the area

سخونة بالمنطقة

Calf tenderness (important sign)

ألم عند الضغط على الساق

Feeling of tightness or heaviness

إحساس بالشّد أو الثقل

Functional impairment

صعوبة الحركة

Complications

1. Pulmonary Embolism (PE)

أخطر وأهم مضاعفات الجلطة الوريدية

Chest pain, dyspnea, cough

ألم صدر، ضيق نفس، كحة

May cause shock and death

قد يؤدي لصدمة ووفاة

May occur without DVT symptoms

قد يحدث بدون أعراض سابقة

Nurse must assess cardiopulmonary and neurological signs continuously.

يجب على الممرضة متابعة العلامات العصبية والقلبية باستمرار

2. Recurrent DVT

تكرار الجلطة خلال سنة بسبب تلف الأوعية

3. Post-thrombotic syndrome

ألم - تورم - دوالي - قرح

4. Chronic venous insufficiency

فشل وريدي مزمن بسبب تلف صمامات الأوردة

Diagnosis

Coagulation profile (PT, APTT)

تحاليل التجلط

D-dimer

تحليل دي دايمر

Venous ultrasonography

موجات صوتية

Duplex Doppler

دوبلر

MRI

رنين مغناطيسي

Venography

صبغة وريدية

CT venography

أشعة مقطعية

Prevention

Elastic compression stockings

شرابات ضاغطة

Pneumatic compression devices

أجهزة ضغط هوائي

Positioning & exercises

وضعية وتمارين

Heparin (UFH / LMWH)

الهيبارين

Goals of DVT Management

Prevent clot growth

منع زيادة حجم الجلطة

Prevent embolization

منع انتقالها للرئة

Prevent long-term complications

منع المضاعفات

Prevent recurrence

منع التكرار

Medical Management

Anticoagulants (Blood thinners)

مضادات التجلط.

Heparin

الهيبارين

Warfarin (Coumadin)

الوارفارين

Thrombolytic therapy

إذابة الجلطة في الحالات الشديدة.

Surgical Management

Venous thrombectomy

إزالة الجلطة جراحياً

Catheter-directed thrombolysis

إذابة الجلطة بالقسطرة

Inferior vena cava filter

فلتر الوريد الأجوف السفلي

Nursing Management

Elevation and Compression

رفع الطرف المصاب + شرايات ضاغطة

Anticoagulant Therapy

متابعة PT, PTT, Hb, Platelets, Fibrinogen.

Observe for Bleeding

ملاحظة أي نزيف وإبلاغ الطبيب فوراً

Providing Comfort

Bed rest

راحة

Elevation

رفع الطرف

Analgesics

مسكنات

Warm moist packs

كمادات دافئة

Mobility

Walking preferred

المشي أفضل

Avoid long standing or sitting

تجنب الجلوس أو الوقوف الطويل

Monitoring Complications

Bleeding

نزيف.

Thrombocytopenia

نقص الصفائح بسبب الهيبارين.

Drug interactions

Increase effect: aspirin, vitamin E, green tea

تزيد تأثير الوارفارين

Decrease effect: vitamin C, estrogen

تقلل التأثير