

Домашнее задание

Индивидуальный вариант для *Золкин А.Н.*

Количество баллов: 0

Сложность: 1.0

Задание: Оформить документ в \LaTeX , все формулы, которые встречаются, должны быть оформлены в математическом режиме (через `equation`). Если формула имеет номер и на неё есть ссылка, то необходимо также проставить метку для формулы и ссылаться по этой метке. Все сноски должны быть оформлены в виде сносок. Рисунки повторены при помощи пакета `TikZ`.

и достаточно $B \gg$), которое истинно, когда высказывания A и B истинны или ложны одновременно.

Наряду с $A \Leftrightarrow B$ в эквиваленции используется запись: $A = B$.

Итак, при помощи логических операций построено множество высказываний, которое называют *алгеброй высказываний*.

Основные формулы алгебры высказываний следующие:

- 1) $\neg(\neg A) = A$;
- 2) законы *дистрибутивности* (распределительные законы):
 $A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$;
 $A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$;
- 3) законы де Моргана²:
 $\neg(A \wedge B) = (\neg A) \vee (\neg B)$;
 $\neg(A \vee B) = (\neg A) \wedge (\neg B)$;
- 4) $A \Rightarrow B = (\neg A) \vee B$;
- 5) $\neg(A \Rightarrow B) = A \wedge (\neg B)$.

Эти формулы могут быть доказаны сравнением соответствующих таблиц истинности.

Пример 1.2. Докажем формулу 5). Таблица истинности для утверждения в левой части имеет вид:

A	B	$A \Rightarrow B$	$\neg(A \Rightarrow B)$
\mathcal{U}	\mathcal{U}	\mathcal{U}	\mathcal{L}
\mathcal{U}	\mathcal{L}	\mathcal{L}	\mathcal{U}
\mathcal{L}	\mathcal{U}	\mathcal{U}	\mathcal{L}
\mathcal{L}	\mathcal{L}	\mathcal{U}	\mathcal{L}

² *Огастес де Морган* (1806–1871) – шотландский математик, логик, основоположник логической теории отношений.

А таблица истинности для утверждения в правой части имеет вид:

A	B	$\neg B$	$A \wedge (\neg B)$
u	u	$л$	$л$
u	$л$	u	u
$л$	u	$л$	$л$
$л$	$л$	u	$л$

Сравнивая эти таблицы, видим, что утверждения в правой и левой части принимают одинаковые значения.

Упражнение. С помощью таблиц истинности докажите формулы 1)–4).

Следующие импликации носят названия:

$T = (A \Rightarrow B)$ – *прямая теорема*,

$T = (B \Rightarrow A)$ – *теорема, обратная к предыдущей*.

Справедлива формула:

$$(A \Rightarrow B) = ((\neg B) \Rightarrow (\neg A)),$$

которая служит основой для распространенного в математике доказательства методом «от противного». Действительно, левая часть формулы ложна тогда и только тогда, когда $A = u$, а $B = л$. Но и правая часть ложна тоже только в этом случае.

Следует отметить, что из истинности прямой теоремы еще не следует истинность обратной к ней теоремы, как это видно из примера 1.1: в разобранном примере из утверждения B не следует утверждение A , потому что, как известно, существуют четные числа, не кратные четырем (например, 2).

Предикаты и кванторы

Определение 1.6. Суждение, зависящее от переменной величины, которое при подстановке значений переменного становится высказыванием, называют *предикатом*.

Пример 1.3. $A(x)$ = «студент x учится на физическом факультете» есть предикат, зависящий от одного переменного x . Здесь $A(x)$ – одноместный предикат. Неравенство $B(x, y) = x^2 + y^2 \geq 0$ представляет собой двуместный предикат.

Как и для высказываний, с помощью логических операций \wedge , \vee , \neg , \Rightarrow , \Leftrightarrow можно строить новые предикаты, и мы получим *алгебру предикатов*. Новые предикаты и высказывания можно строить из предикатов также с помощью символов, называемых *кванторами*:

\exists – *квантор существования* (читается: «существует», «найдется»),

\forall – *квантор всеобщности* (читается: «для любого», «для всякого», «для всех»).

Определение 1.7. $\forall x : A(x)$ (читается: «для всех x $A(x)$ ») – высказывание, которое истинно, если предикат $A(x)$ истинен для всех x из его области определения, и ложно – в противном случае.

Пример 1.4. Утверждение «любой студент УрФУ учится на физическом факультете (ФФ)», которое формально можно записать в виде:

$$\forall x \in \text{УрФУ} : \{\text{студент } x \text{ учится на ФФ}\},$$

есть ложное высказывание.

Утверждение «квадрат действительного числа есть число неотрицательное», формально записываемое в виде:

$$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 0,$$

есть истинное высказывание.

Определение 1.8. $\exists x : A(x)$ (читается: «*существует x , $A(x)$* ») – высказывание, которое истинно, если предикат $A(x)$ истинен на каком-то конкретном x из его области определения, и ложно, если предикат $A(x)$ ложен при всех x из его области определения.

Пример 1.5. Утверждение «на физическом факультете учатся девушки», которое формально записывается в виде

$\exists x : \{\text{девушка } x \text{ учится на физическом факультете}\}$
есть истинное высказывание, так как, конечно, на физическом факультете учится хотя бы одна девушка.

Высказывание $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 + 1 \leq 0$ – ложное.

Построим отрицание высказывания $\forall x : A(x)$. Если данное утверждение не имеет места, то суждение $A(x)$ имеет место не для всех x , т. е. существует элемент x , для которого $A(x)$ не имеет места:

$$\neg(\forall x : A(x)) = (\exists x : \neg A(x)).$$

Пример 1.6. Один маленький мальчик очень грамотно построил отрицание утверждения «Все дети любят кашу». Он подумал и, решительно отодвинув от себя тарелку, сказал: «Не все».

Совершенно аналогично

$$\neg(\exists x : A(x)) = (\forall x : \neg A(x)).$$

Таким образом, чтобы построить отрицание логической формулы, содержащей кванторы, необходимо квантор \forall заменить на квантор \exists , а квантор \exists заменить на квантор \forall и предикат заменить на его отрицание.

Пример 1.7.

$$\begin{aligned}\neg(\forall x : \{\exists y : [\forall z : A(x, y, z)]\}) &= \\ &= \exists x : \neg\{\exists y : [\forall z : A(x, y, z)]\} = \\ &= \exists x : \{\forall y : \neg[\forall z : A(x, y, z)]\} = \\ &= \exists x : \{\forall y : [\exists z : \neg A(x, y, z)]\}.\end{aligned}$$

Заметим, что скобки и двоеточия можно частично или вовсе опускать при записи такого рода логических формул, если не возникает разночтений.

2. Элементы теории множеств

2.1. Понятие множества

Понятие множества в математике рассматривается как первичное, неопределяемое понятие.

Под *множеством* будем понимать совокупность (или семейство, или собрание, или класс) объектов, обладающих определенным признаком. Например, множество деревьев в парке, множество звезд на небе, множество студентов в аудитории, множество натуральных чисел, множество корней уравнения $x^2 - 3x + 2 = 0$, множество треугольников на плоскости и т.д.

Объекты, обладающие этим признаком, называются *элементами множества*. Множества будем обозначать заглавными буквами A, B, C, \dots , а элементы этих множеств – строчными буквами a, b, c, \dots . Множество *содержит* элементы, а элементы *принадлежат* множеству. Для обозначения принадлежности используется знак \in . Если a есть элемент множества A , то этот факт записывается так: $a \in A$. Запись $b \notin A$ означает, что элемент b не принадлежит множеству A . Так, имеем $3 \in \mathbb{Z}$ и $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$.

Множества делятся на *конечные* и *бесконечные*. Например, множества $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ бесконечны, а множество корней уравнения $x^2 - 5x + 6 = 0$ конечно. Множество, не содержащее элементов, называется *пустым*. Пустое множество обозначается символом \emptyset . Запись

$$C = \{x \in B \mid P(x)\}$$

обозначает множество, состоящее из всех тех и только тех элементов множества B , которые обладают свойством $P(x)$.

Например, $\{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 1\}$ – множество тех дей-

ствительных чисел, которые обладают свойством быть не меньше нуля и не больше единицы.

Определение 2.1. Множество Y называется *подмножеством* множества X , если любой элемент множества Y является элементом множества X . Это обозначается записью $Y \subseteq X$.

В кванторах это определение можно записать следующим образом:

$$\forall y \in Y : y \in X.$$

Например, $\{1, 2\} \subseteq \{1, 2, -\frac{1}{2}\}$, $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$, $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$, $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$.

Из определения подмножества следует, что всякое множество является подмножеством самого себя, а пустое множество является подмножеством любого множества.

Пример 2.1. Решим следующую простую задачу: найти все подмножества множества $\{1, 2, 3\}$. Очевидно, что это множество имеет восемь подмножеств: \emptyset , $\{1\}$, $\{2\}$, $\{3\}$, $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$ и $\{1, 2, 3\}$.

Определение 2.2. Множество X *равно* множеству Y , если любой элемент множества X является элементом множества Y и любой элемент множества Y является элементом множества X . Другими словами, если X и Y состоят из одних и тех же элементов. На письме это обозначается обычным образом: $X = Y$.

Из определений следует, что множества X и Y равны тогда и только тогда, когда $X \subseteq Y$ и $Y \subseteq X$.

Пример 2.2. Множество корней уравнения

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$$

равно множеству $\{1, 2, 3\}$, а множество $\{51, 2, 3\}$ равно множеству $\{3, 2, 51, 2\}$.

Заметим, что, перечисляя элементы множества, принято записывать каждый из них только один раз. Подчеркнем, что по определению равенства неважно, в каком порядке перечисляются элементы.

2.2. Операции над множествами

Рассмотрим следующие операции над множествами: пересечение, объединение, дополнение и разность. Эти операции называются *булевыми*. Установим основные свойства булевых операций.

Определение 2.3. Пусть X и Y – некоторые множества. Тогда *пересечением* множеств X и Y называется множество

$$X \cap Y = \{x \mid x \in X \text{ и } x \in Y\},$$

объединением множеств X и Y называется множество

$$X \cup Y = \{x \mid x \in X \text{ или } x \in Y\}.$$

Например, если $X = \{2, 4, 6, 8, 9\}$, $Y = \{1, 3, 6, 9\}$, то $X \cap Y = \{6, 9\}$, а $X \cup Y = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 9\}$.

Отметим основные свойства введенных операций:

- 1) $X \cap X = X$ – *идемпотентность пересечения*;
- 2) $X \cup X = X$ – *идемпотентность объединения*;
- 3) $X \cap Y = Y \cap X$ – *коммутативность пересечения*;

- 4) $X \cup Y = Y \cup X$ – коммутативность объединения;
- 5) $(X \cap Y) \cap Z = X \cap (Y \cap Z)$ – ассоциативность пересечения;
- 6) $(X \cup Y) \cup Z = X \cup (Y \cup Z)$ – ассоциативность объединения;
- 7) $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$ – дистрибутивность пересечения относительно объединения;
- 8) $X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z)$ – дистрибутивность объединения относительно пересечения;
- 9) $X \cap \emptyset = \emptyset$;
- 10) $X \cup \emptyset = X$.

Доказательство отмеченных свойств продемонстрируем на примере тождества 8). Надо доказать, что любой элемент множества $X \cup (Y \cap Z)$ принадлежит множеству $(X \cup Y) \cap (X \cup Z)$, и обратно.

Пусть $a \in X \cup (Y \cap Z)$. Тогда $a \in X$ или $a \in Y \cap Z$. Если $a \in X$, то $a \in X \cup Y$ и $a \in X \cup Z$, и поэтому a принадлежит их пересечению, т. е. правой части. Если же $a \in Y \cap Z$, то $a \in Y$ и $a \in Z$. Отсюда следует, что $a \in X \cup Y$ и $a \in X \cup Z$, т. е. a принадлежит и их пересечению.

Докажем обратное включение. Пусть теперь $a \in (X \cup Y) \cap (X \cup Z)$. Тогда $a \in X \cup Y$ и $a \in X \cup Z$. Если $a \in X$, то $a \in X \cup (Y \cap Z)$. Если же $a \notin X$, то из условий $a \in X \cup Y$ и $a \in X \cup Z$ следует, что $a \in Y$ и $a \in Z$, а значит, $a \in Y \cap Z$, следовательно, $a \in X \cup (Y \cap Z)$. \square