

Questões-aula

7. Resolução de equações do 2.º grau incompletas

Nome da Escola _____	Ano letivo 20____-20____		Matemática 9.º ano
Nome do Aluno _____	Turma _____	N.º _____	Data _____
Professor _____	_____	_____	_____-_____-20____

Questão-aula 13

- 1 Completa a tabela.

Forma canônica	Coeficiente do termo em x^2	Coeficiente do termo em x	Termo independente	Completa (C) / Incompleta (I)
$x^2 - 2x + 3 = 0$				
$3x^2 + 1 = 0$				
$-\frac{x^2}{2} + 2x = 0$				
	-2	0	5	
	$\frac{2}{3}$	7	-2	

- 2 Para cada número real k , a equação $2x^2 + k - 2 = 0$ é uma equação do 2.º grau em x .

Indica um valor de k de modo que a equação:

2.1. tenha duas soluções;

2.2. tenha uma solução;

2.3. seja impossível.

Questão-aula 14

- 1 Resolve cada uma das seguintes equações.

1.1. $7x^2 - 14 = 0$

1.2. $x^2 + 3 = 0$

1.3. $2x + \frac{x^2}{2} = 0$

1.4. $x^2 = -\frac{1}{2}\left(x^2 - \frac{4}{3}\right)$