PERÚ | Ministerio de Salud

NTS N°121-MINSA/DGIESP V.01
"NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA LA ATENCIÓN DEL PARTO VERTICAL EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS CON PERTINENCIA INTERCULTURAL"

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 1 11/12/2020 12:22:37 p.m.

Catalogación hecha por la Biblioteca del Ministerio de Salud

NTS N°121-MINSA/DGIESP V.01 "NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA LA ATENCIÓN DEL PARTO VERTICAL EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS CON PERTINENCIA INTERCULTURAL" (R.M. Nº 518-2016/MINSA) Ministerio de Salud. Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, Dirección de Salud Sexual y Reproductiva (MINSA, DGIESP, DSARE). Lima: Ministerio de Salud; 2020 85p Ilus.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2020-XXXXXX

NTS N°121-MINSA/DGIESP V.01 "NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA LA ATENCIÓN DEL PARTO VERTICAL EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS CON PERTINENCIA INTERCULTURAL"
Resolución Ministerial N° 518-2016/MINSA

Ministerio de Salud del Perú - Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, Dirección de Salud Sexual y Reproductiva (MINSA, DGIESP, DSARE)

Responsable de Elaboración

Lucy del Carpio Ancaya - DSARE –MINSA
Alfonso Villacorta Bazán - DSARE –MINSA
Alberto Zapata Herrera - DSARE –MINSA
Bacilia Vivanco Garfías, Consultora de PARSALUD II

Coordinador de Edición:
Yesenia Monteza Facho

Revisor:
Lucy del Carpio Ancaya. Equipo técnico –DSARE –MINSA
Alfonso Villacorta Bazán. Equipo técnico –DSARE –MINSA
Alberto Zapata Herrera. Equipo Técnico-DSARE-MINSA
Ulalia Cárdenas de Torres. Equipo técnico –DSARE –MINSA
Bacilia Vivanco Garfías , Consultora de PARSALUD II

Equipo Técnico de apoyo de DSARE
Daniel Aspilcueta Gho
José Caderón Ibérico
Ulalia Cárdenas de Torres
Marysol Campos Fanola
Patricia Bravo Chávez de Romani
Zoila Almonacid Estrella
Yesenia Monteza Facho
Sonia Rodriguez Soto
Lily Alva Tarazona
John Richard Muñoz Reaño

Diseño y Diagramación
Cadillo Editorial Imprenta

MINSA, Noviembre del 2020
Av. Salaverry N° 801, Jesús Maria –Lima Perú
Central Telefónica: Telf.: (51-1) 315-6600
https://www.gob.pe/minsa

Primera Edición Noviembre del 2020
Tiraje: 3000 unidades
Se Termino de imprimir en Noviembre 2020
Imprenta Cadillo Editorial Imprenta SRL
Versión digital disponible: htp/

PERÚ | Ministerio de Salud

ALTA DIRECCIÓN

Pilar Elena Mazzetti Soler
Ministra de Salud

Luis Antonio Nicolás Suárez Ognio
Viceministro de Salud Pública

Victor Freddy Bocangel Puclla
Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Silviana Gabriela Yancourt Ruiz
Secretario General

Aldo Javier Lucchetti Rodriguez
Director General
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

Guillermo Luis Atencio La Rosa
Director Ejecutivo de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 3 11/12/2020 12:22:39 p.m.

Agradecimientos por la colaboración en la revisión, aportes y validación de la presente Norma Técnica de Salud

Ministerio de Salud
Alberto Zapata Herrera
Lucy del Carpio Ancaya
Mario Tavera Salazar
Alfonso Villacorta Bazán
Daniel Aspilcueta Gho
José Caderón Ibérico
Jessica Graña Espinoza
Ulalia Cárdenas de Torres
Marysol Campos Fanola
Ulalia Cárdenas de Torres
John Richard Muñoz Reaño
Patricia Bravo Chávez de Romani
Zoila Almonacid Estrella
Yesenia Monteza Facho
Sonia Rodriguez Soto
Milagros Guzmán Narciso

Dirección Regional de Ayacucho
Víctor Hugo Salcedo Escobar
Janeth Peñaloza Vargas

Dirección Regional de Cusco
Elsa Díaz Rojas
Nadia Cuentas Nieto

Dirección Regional de Huancavelica
Oscar Luis Chagua Pariona
Rosa A. Paredes Chanhualla

Dirección Regional de Ucayali
Katia Miluska Sarmiento Casavilca
Víctor Joel Nieto Custodio

Hospital Nacional Hipólito Unanue
Daniel Tello Santa Cruz
Jennifer Sara Soto Taboada

Hospital Carlos Lanfranco la Hoz
Ana Robles Favian

Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé
Janet de Jesús Romero Malpartida

Hospital Nacional María Auxiliadora
Tula Zegarra Zamamé

Colegio Nacional de Obstetras del Perú
Joel Mota Rivera

Colegio Regional de Obstetras del Perú
Cristina Minaya León

Instituto Nacional Materno Perinatal
Luis Meza Santibañez
Lucinda Ameli Vegas Yachez
Irma Teresa Callahui Ortíz
Jenny Elenisse Zavaleta Lujan
John Percy Silva Zuñiga

MEDICOS MUNDI
Fernando Carbone Campoverde

PARSALUD II
Raquel Hurtado la rosa
Alcedo Nimer Jorges Melgarejo
Carlos Raúl Yataco Levano
Alfredo Asto Parco
Bacilia Vivanco Garfías

Universidad Alas Peruana
Johana Milagritos Ramírez Cerna
Juan Trelles Yenque

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Emma Salazar Salvatierra

UNFPA
Gracia Subira Franco
Pedro Marchena Reátegui

OPS
Alfredo Guzmán Changanaqui

MINISTERIO DE SALUD

No. 518-2016/MINSA

REPUBLICA DEL PERU

Resolución Ministerial

A. Velásquez

P. GRILLO

E. GOZZER

P. MINAYA

C. CAVAGNARO P

N. Zerpa T.

J. Zavala S.

Lima, 21 de Julio del 2016

Visto el Expediente Nº 15-050911-001, que contiene el Memorándum Nº 216-2016-DGIESP/MINSA, de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública;

CONSIDERANDO:

Que, los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud disponen que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, por lo que la protección de la salud es de interés público, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla;

Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, establece que el Sector Salud, está conformado por el Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas de nivel nacional, regional y local, y personas naturales que realizan actividades vinculadas a las competencias establecidas en la presente Ley, y que tienen impacto directo o indirecto en la salud, individual o colectiva; .

Que, los literales a} y b} del artículo 5 de la precitada Ley, contemplan como función rectora del Ministerio de Salud formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de Promoción de la Salud, Prevención de Enfermedades, Recuperación y Rehabilitación en Salud, dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y · supervisión de las políticas nacionales y sectoriales, la gestión de los recursos del sector; así como para el otorgamiento y reconocimiento de derechos, fiscalización, sanción y ejecución coactiva en las materias de su competencia;

Que, en ese contexto mediante Resolución Ministerial 598-2005/MINSA, se· aprobó la Norma Técnica para la Atención de Parto Vertical con adecuación Intercultural, con la finalidad de mejorar el acceso de la población andina y al to amazónica a los servicios de salud para la atención de calidad del parto vertical con adecuación intercultural;

Que, el artículo 71 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2016-SA, señala que la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública· es el órgano técnico responsable de dirigir y coordinar las intervenciones estratégicas en Salud Pública en materia de Prevención de Enfermedades No Transmisibles y Oncológicas Salud Mental; Prevención y Control de la Discapacidad; Salud de los Pueblos Indígenas; Salud Sexual y Reproductiva; así como las correspondientes por Etapas de Vida;

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 5 11/12/2020 12:22:46 p.m.

Que, con el documento del visto, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, ha propuesto la Norma Técnica de Salud para la Atención del Parto Vertical en el Marco de los Derechos Humanos cori Pertinencia Intercultural; con la finalidad de contribuir a la parto en posición vertical, considerando las evidencias científicas y el enfoque de permanencia intercultural en todas las gestantes en el ámbito urbano, urbano marginal y rural;

Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica, emitió opinión legal con el Informe Nº 581-016-2OGAJ/MINSA;

Estando a lo propuesto por !a Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública;

P. GRILLO

Con el visado de la Directora General de la Dirección General de Intervenciones estratégicas en Salud Pública, de la Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del Viceministro de Salud Pública, del Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud y del Jefe del Instituto Nacional de Salud; y,

E. GOZZER

De conformidad con lo dispuesto en e! Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2016-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la NTS N'121-MJNSA/DGIESP-V.01: Norma Técnica de Salud para la Atención del Parto Vertical en el Marco de los Derechos Humanos con Pertinencia lntercultural, que forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Encargar a la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud pública la difusión y seguimiento de lo establecido en la citada Norma Técnica de Salud.

Artículo 3.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial Nº 598-2005/MINSA, que aprobó la Norma Técnica para la Atención de Parto Vertical con adecuación lntercultural.

C. CAVAGNARO P

Artículo 4.- Encargar a la Oficina General de Comunicaciones la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal Institucional del Ministerio de Salud, en la dirección electrónica: http://www.minsa.gob.pe/trans arencia/index.asp?op=115.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

N. Zerpa T.

ANÍBAL VELÁSQUEZ VALDIVIA
Ministro de Salud

J. Zavala S.

Índice

Resolución..... **5**

I. Finalidad..... **9**

II. Objetivos..... **9**

III. Ámbito de aplicación..... **9**

IV. Base Legal..... **9**

V. Disposiciones Generales..... **11**

VI. Disposiciones Especificas..... **15**

VII. Responsabilidades..... **49**

VIII. Disposición Final..... **50**

IX. Anexos..... **50**

X. Bibliografía **82**

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 8 11/12/2020 12:22:53 p.m.

I. FINALIDAD

Contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna perinatal, a través de la institucionalización del parto en posición vertical en el marco de derechos humanos, considerando las evidencias científicas y el enfoque de pertinencia intercultural en todas las gestantes a nivel nacional (ámbito urbano, urbano marginal y rural).

II. OBJETIVOS:

2.1. OBJETIVO GENERAL

Establecer los criterios técnicos para el manejo estandarizado y de calidad en la atención integral de parto vertical en el marco de los derechos humanos, basado en las evidencias científicas y el enfoque de pertinencia intercultural.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer los procedimientos técnicos necesarios que permitan la atención de calidad del parto en posición vertical basados en la evidencia científica.
- Determinar los procesos de gestión requeridos para asegurar la disponibilidad e idoneidad de los recursos que permitan el acceso oportuno y el manejo adecuado de la atención del parto vertical en el marco de los derechos humanos con pertinencia intercultural.
- Establecer los requisitos de organización de los establecimientos de salud para la atención del parto en posición vertical de acuerdo a las costumbres de cada zona, contribuyendo al incremento del parto institucional a nivel nacional.
- Fomentar en todos los establecimientos de salud a nivel nacional el protagonismo de la parturienta en todas las etapas del trabajo de parto, brindándole la opción de elegir la posición de dar a luz, con el acompañamiento de su pareja u otro familiar.

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente Norma Técnica de Salud es de alcance nacional y de aplicación en la Dirección de Salud de Lima Metropolitana, las Direcciones Regionales de Salud, Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces en el ámbito regional, así como en los establecimientos de salud a cargo del Instituto de Gestión de Servicios de Salud-IGSS, de los Gobiernos Regionales, de los Gobiernos Locales, del Seguro Social de Salud - EsSalud, de las Sanidades de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa y la Sanidad de la Policía Nacional del Perú del Ministerio del Interior, y en los establecimientos de salud privados interesados en desarrollar el procedimiento.

IV. BASE LEGAL

- Ley N° 26842, Ley General de Salud.
- Ley N° 27604, Ley que modifica la Ley General de Salud N° 26842, respecto de la Obligación de los Establecimientos de Salud a dar atención médica en casos de Emergencia y Partos.
- Ley N° 27853, Ley de Trabajo de la Obstetriz.
- Ley N° 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 9 11/12/2020 12:22:53 p.m.

- Decreto Legislativo Nº 559, Ley de Trabajo del Médico.
- Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.
- Decreto Supremo Nº 008- 2003-SA, que aprobó el Reglamento de la Ley de Trabajo de la Obstetriz.
- Decreto Supremo Nº 008-2010-SA, que aprobó el Reglamento de la Ley Nº 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.
- Decreto Supremo Nº 020-2014-SA, que aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud.
- Decreto Supremo N° 007-2016-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.
- Resolución Ministerial N° 008-2000-SA-DM, que aprobó la Historia Clínica Materno Perinatal y su Aplicativo Analítico de Indicadores de Producción y Calidad de Servicios Materno Perinatales.
- Resolución Ministerial N° 668-2004/MINSA, que aprobó el Documento "Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva".
- Resolución Ministerial 751-2004/MINSA, que aprobó la NT Nº 018-MINSA/ DGSP-V.01 Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud.
- Resolución Ministerial N° 638-2006/MINSA, que aprobó la Norma Técnica de Salud para la Transversalización de los Enfoques de Derechos Humanos, Equidad de Género e Interculturalidad en Salud.
- Resolución Ministerial N° 695-2006/MINSA, que aprobó las Guías de Práctica Clínica para la Atención de las Emergencias Obstétricas Según Nivel de Capacidad Resolutiva.
- Resolución Ministerial N° 792-2006/MINSA, que aprobó el Documento Técnico: "Enfoque de Derechos Humanos, Equidad de Género e Interculturalidad - Marco Conceptual".
- Resolución Ministerial N° 1112-2006/MINSA, que aprobó la Directiva Administrativa Nº 102-MINSA/DGPS-V.01 "Directiva Administrativa para la Implementación de la Norma Técnica para la Transversalización de los Enfoques de Derechos Humanos, Equidad de Género e Interculturalidad en Salud.
- Resolución Ministerial N° 278-2008/MINSA, que aprobó el Documento Técnico: Adecuación Cultural de la Orientación/Consejería en Salud Sexual y Reproductiva.
- Resolución Ministerial N° 223-2009/MINSA, que aprobó el Documento Técnico: Modelo de Intervención para Mejorar la Disponibilidad, Calidad y Uso de Establecimientos que cumplen Funciones Obstétricas y Neonatales.
- Resolución Ministerial N° 478-2009/MINSA, que aprobó la NTS Nº 081-MINSA/ DGSP-V.01. Norma Técnica de Salud de los Equipos de Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas.
- Resolución Ministerial N° 361-2011/MINSA, que aprobó la Guía Técnica para la Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal.
- Resolución Ministerial N° 464-2011/MINSA, que aprobó el Documento Técnico Modelo de Atención Integral en Salud Basado en Familia y Comunidad.
- Resolución Ministerial N° 526-2011/MINSA, que aprobó las Normas para la Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud y sus modificatorias.
- Resolución Ministerial N° 546-2011-MINSA, que aprobó la NTS Nº 021- MINSA/ DGSP-V.03 Norma Técnica de Salud "Categorías de Establecimientos del Sector Salud".
- Resolución Ministerial N° 853-2012/MINSA, que aprobó la Directiva Sanitaria Nº 001-MINSA/DGSP-V.02 Directiva Sanitaria para la Evaluación de las Funciones Obstétricas y Neonatales en los Establecimientos de Salud.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 10 11/12/2020 12:22:54 p.m.

- Resolución Ministerial N° 827-2013/MINSA, que aprobó la NTS Nº 105-MINSA/DGSP-V.01 Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Materna y su modificatoria.
- Resolución Ministerial No. 828-2013/MINSA, que aprobó la NTS Nº 106-MINSA/DGSP-V.01Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Neonatal.
- Resolución Ministerial Nº 124-2015-MC que aprobó la Guía de Lineamientos denominada "Servicios Públicos con Pertinencia Cultural. Guía para la Aplicación del Enfoque Intercultural en la Gestión de los Servicios Públicos".

V. DISPOSICIONES GENERALES.

5.1 DEFINICIONES OPERATIVAS

PERTIENENCIA INTERCULTURAL
En los servicios de salud, es la construcción dialogada, consensuada de manera bidireccional, es decir, entre el personal de la salud con las y los usuarios, quienes plantean como quieren recibir los servicios de salud basándose en sus creencias, entorno, necesidades y demandas[1].

ADECUACIÓN CULTURAL EN SALUD
Proceso por el cual los servicios y actividades integrales de atención de la salud, se estructuran sobre la base de la cultura comunal, respetando sus valores y concepciones relacionados a la salud y enfermedad. En este marco, el servicio deberá disponer de material educativo comunicacional, información verbal, escrita o visual completa, en lenguaje comprensible para usuarias y usuarios, respetuoso de su visión del mundo en la redacción y representación gráfica[2].

AGENTE DE MEDICINA TRADICIONAL O ANCESTRAL
Personas que ejercen la medicina tradicional y que son reconocidas en su comunidad por el conocimiento que poseen de saberes ancestrales en el campo de la atención de salud que han servido para restablecer la salud de las personas integrantes de su pueblo. Éstos pueden haber sido aprendidos de sus antepasados o de otras persona integrantes de la comunidad, a través de la transmisión oral o de una práctica permanente. Las personas agentes de medicina tradicional o ancestral tienen diversas denominaciones según las actividades que desempeñan y la cultura a la que pertenecen. Así tenemos: huesero, partera, hierbero, curandero, chaman, altomisayoc, yatiri, colliri, vegetalista, vaporador, entre otros[3].

ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA[4]
Es la vigilancia y evaluación integral de la gestante y el feto, idealmente antes de las 14 semanas de gestación, para brindar un paquete básico de intervenciones que permita la detección oportuna de signos de alarma, factores de riesgo y brindar la educación para el autocuidado con participación de la familia. Para el

1 Atención en Salud con Pertinencia Intercultural, Primera Edición 2011.
2 Adecuación cultural de la orientación / consejería en salud sexual y reproductiva: documento técnico / Ministerio de Salud. Dirección General de Salud de las Personas. Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva - Lima: Ministerio de Salud; 2008.
3 Política Nacional de Salud Intercultural MINSA-2015.
4 Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Materna, Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva - Lima: Ministerio de Salud; 2013.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 11 11/12/2020 12:22:54 p.m.

manejo adecuado de las complicaciones con enfoque de género e interculturalidad en el marco de los derechos humanos, debe contar con mínimo de seis atenciones prenatales.

CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD

Atender las necesidades de salud sexual y reproductiva del usuario o usuaria de una manera segura y duradera, en todos los aspectos y las veces que sea necesario. La atención debe ser la que necesita y espera el usuario o usuaria. Si una persona es bien atendida y se siente satisfecha, hablara bien del servicio, lo promoverá y lo recomendará[5].

CAPACIDAD RESOLUTIVA DE EN ESTABLECIMIENTO[6]

Es la capacidad que tienen los establecimientos de salud de producir el tipo de servicios necesarios de acuerdo a su nivel de suficiencia, para responder y/o solucionar las diversas necesidades de salud de la gestante y del/de la recién nacido/a en forma oportuna e integral (incluye la satisfacción de los usuarios), permitiendo diagnosticar y dar tratamiento efectivo según grado de complejidad de daño.

Se mide en base a tres parámetros:

- Estructura: Recursos humanos y materiales.
- Procesos: Procedimientos para cumplir las actividades de las funciones obstétricas y neonatales.
- Resultados: Indicadores de resultado por cada actividad de las funciones obstétricas y neonatales.

DERECHOS HUMANOS[7]

Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a individuos y grupos contra acciones que interfieran en sus libertades fundamentales y en la dignidad humana. Los derechos humanos se caracterizan fundamentalmente porque:

- Están avalados por normas internacionales.
- Gozan de protección jurídica.
- Se centran en la dignidad del ser humano.
- Son de obligado cumplimiento para los Estados y los agentes estatales.
- No pueden ignorarse ni abolirse.
- Son interdependientes y están relacionados entre sí, y son universales.

DERECHOS HUMANOS EN SALUD[8]

Considera vigilar el cumplimiento de los siguientes criterios[9]:

- Disponibilidad: referida al número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de programas.

5 Ministerio de Salud. Guía de Salud Sexual y Reproductiva, para el Promotor, Lima – Perú 2001, pag.18.
6 Directiva Sanitaria Nº 001-MINSA/DGSP-V.02 "Directiva Sanitaria para la Evaluación de las Funciones Obstétricas y Neonatales en los Establecimientos de Salud", Resolución Ministerial N° 853-2012/MINSA.
7 Sistema de las Naciones Unidas y Derechos Humanos: Directrices e información para el Sistema de Coordinadores Residentes, marzo de 2000.
8 UNICEF. La Política Social con un Enfoque de Derecho, una Reflexión a partir del caso Costarricense, L. Guendel, M. González, F. Carrera, R. Osorio.
9 Las observaciones generales sirven para aclarar la naturaleza y el contenido de los derechos individuales y las obligaciones de los Estados Partes, de aquellos que han ratificado los instrumentos correspondientes. La Observación General 14 adoptada en mayo del 2000 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 12 11/12/2020 12:22:54 p.m.

- Accesibilidad: es decir que los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos, en la jurisdicción del Estado Parte, considerando las siguientes dimensiones: no discriminación, accesibilidad física, económica y acceso a la información.
- Aceptabilidad: referido al respeto a la ética médica, la confidencialidad, culturalmente apropiados y que consideren la perspectiva de género y el ciclo vital.
- Calidad: significa personal de la salud capacitado, medicamentos y equipamiento científicamente aprobados y en buen estado, agua limpia y potable, y condiciones sanitarias adecuadas.

ENFOQUE DE GÉNERO[10]

El género es la categoría de análisis socio cultural por la cual se interpreta los roles y características diferenciados por sexo. Los roles pueden ser similares, diferentes, complementarios y conflictivos.

Enfoque de género significa "analizar los significados, prácticas, símbolos, representaciones, instituciones y normas que las sociedades y grupos humanos elaboran a partir de la diferencia biológica entre varones y mujeres. Tener una mirada crítica de las relaciones entre hombres y mujeres, como se ponen de manifiesto las jerarquías de género expresadas en una desigual valoración de los femenino y lo masculino y en una desigual distribución del poder."

De esta forma debemos favorecer una mayor participación del hombre y la mujer en la responsabilidad del cuidado y promoción de la salud individual, familiar y comunal, así como las relaciones con igualdad de oportunidades en el escenario público y privado, como es el espacio familiar.

PARTO VERTICAL

Es el parto en el cual la gestante se coloca en posición vertical (parada, sentada, de rodillas o de cuclillas), mientras que el profesional de la salud, se coloca delante o detrás de la gestante para atender el parto. Esta posición permite que el/la recién nacido/a actúe como vector final resultante de las fuerzas del expulsivo, orientándose principalmente al canal del parto y de esta manera facilita el nacimiento, disminuyendo los traumatismos en el/la recién nacido/a.[11].

PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA[12]

Es un proceso educativo para la preparación integral de la mujer gestante que le permita desarrollar hábitos y comportamientos saludables, así como una actitud positiva frente al embarazo, parto, puerperio, producto de la concepción y al/la recién nacido/a convirtiendo este proceso en una experiencia feliz y saludable, tanto para ella como para su bebé y su entorno familiar.

Contribuye a la disminución de complicaciones obstétricas pre y pos natales al preparar física y psicológicamente a la gestante para un parto sin temor.

10 Módulo de Capacitación para Sectores "Diseño de políticas de igualdad de oportunidades con equidad de género" del Proyecto Impacto en las Políticas Públicas Sectoriales sobre el avance de las mujeres, dentro del marco del Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y varones, MIMDES- FNUAP, Lima 2004.

11 Norma Técnica para la Atención de! Parto Vertical con Adecuación Intercultural, Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva, Lima – Perú 2005.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 13 11/12/2020 12:22:54 p.m.

Contribuye a la disminución de complicaciones perinatales al acortar el tiempo del proceso del parto y mejorar la oxigenación de la madre y el feto.

TECNICAS COMPLEMENTARIAS EN LA ATENCIÓN DEL PARTO EN POSICIÓN VERTICAL

- MASOTERAPIA

El masaje es la aplicación de una influencia mecánica efectuada con las manos sobre la piel, brindando una experiencia relajante y terapéutica produciendo equilibrio emocional, paz, tranquilidad y confianza. Permite tratar y prevenir enfermedades[13].

- MUSICOTERAPIA

Es el uso de la música o de los elementos musicales, el sonido, el ritmo, la melodía y la armonía para facilitar y promover la comunicación, el aprendizaje y la expresión con el objeto de atender las necesidades físicas, emocionales y sociales y cognitivas[14].

5.2 El IGSS, DISA LM/DIRESAs/GERESAs o las que hagan sus veces remitirán mensualmente los informes sobre los partos verticales atendidos[15]

5.3 La red de salud, debe tener en cuenta lo siguiente[16]:

- Las redes de salud, deben garantizar que todos los establecimientos de su jurisdicción, según nivel de complejidad, brinden atención de parto vertical por profesional de la salud calificado: médico gíneco obstetra o médico cirujano u obstetra. Su implementación será progresiva y bajo responsabilidad del IGSS, DISA LM/ DIRESAs/ GERESAs según corresponda.

- Asegurar que los establecimientos de salud usen obligatoriamente el plan de parto, incluyendo la orientación/consejería en las ventajas del parto en posición vertical y brinde la atención a la gestante y refiriendo oportunamente a las gestantes con factores de riesgo o complicada a un establecimiento de mayor complejidad.

5.4 Todo establecimiento de salud debe[17]:

- Contar en cada establecimiento de salud según su nivel de atención con profesional de la salud: médico gíneco obstetra, médico cirujano u obstetra, para la atención del parto en posición vertical, garantizando la identificación, diagnóstico, estabilización, manejo y/o referencia oportuna en el caso de

12 Ministerio de Salud. Guía Técnica para la Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal. Dirección General de Salud de las Personas. Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva, Lima – Perú 2011.
13 Guía Técnica para la Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal, MINSA - Lima – Perú 2011.
14 Definición oficial de la Federación Mundial de Musicoterapeutas reconocido por la OMS.
15 Norma Técnica de Salud "Categorías de Establecimientos del Sector Salud", Resolución Ministerial N° 546-2011-MINSA-V.03.
16 Documento de Trabajo Definiciones Operacionales y Criterios de Programación de los Programas Estratégicos (PpR), Lima – Perú 2014.
17 "Directiva Sanitaria para la Evaluación de las Funciones Obstétricas y Neonatales en los Establecimientos de Salud", Resolución Ministerial N° 853- 2012/MINSA. Aprobar la Directiva Sanitaria N° 001-MINSA/DGSP-V.02.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 14 11/12/2020 12:22:54 p.m.

presentarse alguna complicación.

- Disponer el cumplimiento del registro de todas las atenciones de parto vertical que se realicen en el establecimiento de salud; con el Código HIS correspondiente 08000[18].
- Asegurar la entrega gratuita y oportuna del certificado del/de la recién nacido/a vivo/a, siendo pasible de sanción administrativa quien contravenga lo dispuesto.
- Asegurar la elaboración del plan de parto, que incluya la orientación/ consejería en las ventajas del parto vertical, a fin de promover el parto institucional.
- Garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos para la atención del parto vertical y de las complicaciones que se puedan presentar.
  Su implementación será progresiva y bajo responsabilidad del IGSS, DISA LM/ DIRESAs/ GERESAs según corresponda.

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1 COMPONENTE DE PRESTACIÓN

La atención del parto en posición vertical, es aquella en la cual el torso de la mujer y su canal pelviano oscilan dentro de un ángulo de 45 º y 90º con respecto al plano horizontal.[19,20] Comprende las atenciones siguientes: dilatación o primer periodo del trabajo de parto, expulsivo o segundo periodo del trabajo de parto, alumbramiento o tercer periodo del trabajo de parto y el puerperio inmediato.

El responsable de la atención del parto en posición vertical es el médico gíneco obstetra o médico cirujano u obstetra, profesionales competentes, para la atención materna durante el embarazo, parto, puerperio y sus complicaciones.

6.1.1 ATENCIÓN DEL PARTO INSTITUCIONAL

RECEPCIÓN DE LA GESTANTE[21] (Servicio de Emergencia Obstétrica)
El primer contacto entre el personal de la salud y la gestante es de suma importancia, que determinará la confianza y colaboración de la gestante y sus acompañantes en las diferentes etapas del parto y durante su permanencia en el establecimiento de salud. El profesional de la salud que recepciona a la gestante para la atención en emergencia debe realizar los siguientes procedimientos:



18 Manual de registro de codificación de la atención de consulta externa, Estrategia Sanitaria Nacional Salud Sexual y Reproductivo Ministerio de Salud 2012.
19 Bernardo Amaila. Parir como diosas: recuperando el parto vertical. Suplemento triple jornada México No 69-2004.
20 Secretaria de Salud. La Atención Intercultural del Trabajo de Parto en Posición Vertical en los Servicios de Salud. Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, México 2007- 2012.
21 Documento de Trabajo Definiciones Operacionales y Criterios de Programación de los Programas Estratégicos

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 15 11/12/2020 12:22:54 p.m.

1) Brindar a la gestante una cálida bienvenida, identificándose y llamándola por su nombre, el mismo trato se le brindará a los familiares o personas que la acompañan, con empatía y calidez resaltando la participación de la pareja y la familia.

2) Explicar a la gestante y a su acompañante los procedimientos a seguir de forma clara evitando términos técnicos. Considere, respete y concerte las prácticas habituales de su cultura que no sean nocivas para su salud relacionadas a la atención del parto (creencias, idioma y costumbres), escuche y responda atentamente sus preguntas e inquietudes usando términos fáciles de entender.

3) Si la gestante no cuenta con atenciones prenatales previas, explicarle el proceso del parto para disminuir el temor a lo descocido, en lo posible, muestre los ambientes físicos del establecimiento donde será atendida, asimismo presentar al equipo que le brindará la atención, todo ello, en dependencia del flujo de las emergencias obstétricas.

4) Revisar su Documento Nacional de Identidad, Ficha del Seguro Integral de Salud, Carné Perinatal, Historia Clínica Perinatal Base (HCPB), hoja de referencia y el Plan de Parto a fin de detectar cualquier exclusión o necesidad no incluida; si la gestante no cuenta con dichos instrumentos, elaborar de manera completa o actualice si lo tuviera, explicándole brevemente las diferentes posiciones para el parto promoviendo la posición vertical.

5) Preguntar a la gestante sobre la presencia de signos de alarma, precisar las circunstancias en la que el parto se ha iniciado: si hubo pérdidas de tapón mucoso, características de las contracciones uterinas, ingesta de alguna infusión y prácticas propias de la localidad.

6) Indique y verifique la evacuación de la vejiga con regularidad durante todo el trabajo de parto.

7) Cumplir con los estándares de la seguridad del paciente.[22,23]

8) Controlar los signos vitales: temperatura, pulso, frecuencia respiratoria y presión arterial de ingreso.

9) Realizar de forma obligatoria la evaluación del estado clínico general de la gestante, así como la evaluación obstétrica que incluya: Maniobras de Leopold (situación, posición, presentación, altura de presentación), altura uterina, ponderado fetal, edad gestacional, movimiento fetal, frecuencia cardiaca fetal y dinámica uterina.

22 Ministerio de la Protección Social, Lineamientos para la Implementación de la Política de Seguridad del Paciente, Dirección General de Calidad de Servicios, Colombia 2008.
23 Ministerio de Salud. Seguridad del Paciente. Dirección General de Salud de las Personas, Dirección de Calidad en Salud, Lima – Perú

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 16 11/12/2020 12:22:55 p.m.

- Examen externo:
  Inspección de los genitales externos (lesiones, elasticidad del periné, presencia de sangrado, tapón mucoso, leucorrea, condiloma acuminado, varices, tumores, vesículas herpéticas, ladillas, entre otros).

- Examen interno:
  - Características de la vagina. (tabique vaginal, quistes, otros)
  - Consistencia del cuello uterino.
  - Posición del cuello uterino.
  - Dilatación cervical.
  - Incorporación cervical.
  - Estado de membranas.
  - Características del líquido amniótico.
  - Altura de la presentación fetal.
  - Variedad de presentación fetal.
  - Moldeamiento fetal.
  - Características de la pelvis.

12) Determinar el diagnóstico del trabajo de parto incluye:

- El diagnóstico y la confirmación del trabajo de parto.
- El diagnóstico del período y la fase del trabajo de parto.
- La evaluación del encajamiento y descenso del feto.
- La identificación de la presentación y la posición del feto (ANEXO N° 7).

6.1.2 ATENCIÓN POR PERIODOS DEL PARTO

La atención del pato vertical debe realizarse teniendo en cuenta lo señalado a continuación, según periodos del parto, y las circunstancias individuales de cada gestante:

a) PRIMER PERIODO: DILATACIÓN Centro Obstétrico (Sala de Dilatación).

PROCEDIMIENTO:

1) Recepción y presentación a la gestante del equipo profesional de la salud encargado de la atención. Explicar a la gestante sobre los profesionales de la salud que atenderán su parto y familiar preparado que la acompañe según costumbres y cultura de la zona.

2) Elaborar el partograma de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a partir de los 4 cm de dilatación (ANEXO N° 6).

3) Antes de que el acompañante ingrese a centro obstétrico/sala de parto, deberá lavarse las manos para apoyar en todo el proceso del trabajo de parto, que incluye atenciones a la madre y al/la recién nacido/a de acuerdo a sus respectivas costumbres.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 18 11/12/2020 12:22:55 p.m.

4) Invitar a la gestante a que se realice el aseo perineal con agua tibia o fría; explicándole la importancia de la disminución de infecciones, y que lo puede hacer reiteradamente de acuerdo a la necesidad y costumbres de cada zona durante el proceso del trabajo de parto[28].

5) Respetar el uso de ropa según costumbres de la zona u ofrecer a la gestante y al acompañante ropa adaptada para este tipo de atención que dispone el establecimiento de salud.

6) Asegurar el acompañamiento de una persona relacionada afectivamente con la gestante, esto será sumamente importante, ya que establece un vínculo de apoyo tanto físico y psicológico, aumenta la seguridad, confianza de la gestante, disminuye las alteraciones en el trabajo de parto, disminuye el tiempo de duración del trabajo de parto, evita la ansiedad materna en todos los periodos del parto, neutraliza la adrenalina y favorece la producción de la oxitocina incrementando las contracciones uterinas[29].

7) Brindar terapias alternativas para el manejo del dolor del trabajo de parto, con apoyo emocional del acompañante elegido por la gestante, respetando el derecho de libertad de expresión y de libre tránsito (de acuerdo a las pautas de la institución), respetando sus costumbres[30].

8) Aplicar las técnicas de psicoprofilaxis para el manejo del dolor del parto[31].

9) Permitir a la gestante la ingesta de alimentos y líquidos azucarados de alto contenido calórico, preparados o infusiones que favorezcan el trabajo de parto de acuerdo a sus costumbres.[32,33,34]

10) Cumplir las normas de asepsia en concordancia con las normas de bioseguridad, lavado de manos antes y después de cada procedimiento.

11) Solo en caso necesario canalizar vía segura con solución salina:
    - Seleccionar una vena de buen calibre y no zona de flexión.
    - Colocación de un catéter dentro de una vena periférica N°18 corto por 1 ¼ de pulgada.
    - CINa al 9%.

---

28 Ministerio de Salud. Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Materna, Dirección General de Salud de las Personas. Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Lima – Perú 2013

29 Ministerio de Salud Pública. Guía Técnica para la Atención del Parto Culturalmente Adecuado Sistema Nacional de Salud/ Ministerio de Salud Pública/ Ecuador – 2008.

30 Ministerio de Salud. Modelo de Atención con Adecuación Intercultural en Salud Materna Perinatal Consorcio Madre Niño, Churcampa - Huancavelica - Perú 2007.

31 Guía Técnica para la Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal/Ministerio de Salud/Dirección General de Salud de la Personas – Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, aprobada con Resolución Ministerial N° 361-2011.

32 Ministerio de Salud Pública. Guía Técnica para la Atención del Parto Culturalmente Adecuado. Sistema Nacional de Salud, Ecuador – 2008.

33 Ministerio de Salud. Norma Técnica para Atención de Parto Vertical con Adecuación Intercultural. Dirección General de Salud de las Personas. Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Lima – Perú 2005.

34 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Normas con Pertinencia Cultural hacia la Interculturalidad Guatemala - 2011.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 19 11/12/2020 12:22:55 p.m.

12) Registrar los hallazgos del progreso de trabajo de parto en la historia clínica y el partograma de acuerdo al horario establecido por la OMS, instrumento manejado por el médico u obstetra, que permitirá tomar las decisiones inmediatas en caso de diagnosticar desviaciones en la evolución del trabajo de parto.



13) Realizar tacto vaginal, sólo si la gestante tiene deseo de pujar o si apreciamos perdida de líquido amniótico, ello nos permitirá verificar ruptura espontánea de membranas, la OMS recomienda realizar cuatro tactos como máximo durante el periodo de dilatación.

14) No realizar rotura artificial de membrana cuando la evolución del parto es normal (las membranas permanecen intactas hasta que la dilatación este completa, lo que ocurre en el 75% de los casos)[35].

15) NO REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE RUTINA, las evidencias médicas consideran perjudiciales para la gestante en el trabajo de parto[36]: el rasurado púbico, la posición decúbito dorsal en el periodo expulsivo, episiotomía, el enema en el trabajo de parto, el pujo forzado sin que la gestante este en la fase avanzada expulsiva, la restricción de los alimentos y líquidos durante el trabajo de parto, entre otras.

16) Identificar signos de peligro del trabajo de parto y realizar el tratamiento según patología; si no es posible, diagnosticar, estabilizar y referir (DER) a la gestante conforme a las "Guías de Práctica Clínica para la Atención de Emergencias Obstétricas Según Nivel de Capacidad Resolutiva". En este proceso la parturienta debe estar acompañada del personal médico u obstetra y su acompañante (potencial donante de sangre), llevando consigo la hoja de referencia, carné perinatal, Documento Nacional de Identidad, ficha del Seguro Integral de Salud, partograma (copia) e Historia Clínica Perinatal Base (HCPB).

35 Obstetricia/Ricardo Leopoldo Schwartz, Ricardo Fescina y Carlos Duverges, 6ta. Edición Buenos Aires/junio 2005.
36 Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP), de Montevideo – Uruguay.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 20 11/12/2020 12:22:55 p.m.

17) Diagnosticar la dilatación completa y trasladar a la gestante a sala de parto, para su atención con el acompañante elegido.

b) SEGUNDO PERIODO: EXPULSIVO
Centro Obstétrico (Sala de Parto).
Se debe esperar a que la gestante sienta ganas de pujar, hay casos que estando con dilatación completa no siente la necesidad de pujar (etapa temprana no expulsiva) , bastará esperar entre 10 a 30 minutos y la sensación de pujo se inicia (etapa avanzada expulsiva)[37].

POSICIONES DE LA GESTANTE EN EL TRABAJO DE PARTO - PERIODO EXPULSIVO [38,39,40]

En las posiciones verticales, la intervención del profesional de la salud debe estar basada en sus competencias durante la fase temprana no expulsiva y avanzada expulsiva del segundo periodo del trabajo de parto, atendiendo cualquier complicación que pudieran surgir en el momento.



- **POSICIÓN DE CUCLILLAS:**

Es una de preferencia las posiciones de mayor por las mujeres de nuestro país, ya que facilita la separación de las articulaciones entre los huesos pelvianos, lo cual aumenta los diámetros pélvicos favoreciendo el descenso del feto por el canal del parto.



- El profesional de la salud que atiende el parto deberá realizar los procedimientos obstétricos del periodo expulsivo adoptando una posición cómoda (arrodillado, en cuclillas o sentado en un banco).

- Se debe verificar que la gestante mantenga las piernas hiperflexionadas y separadas para mejorar la amplitud de los diámetros transversos y anteroposterior de

37 IMPAC, Manejo de las complicaciones del embarazo y el parto; Guía Para Obstetrices y Médicos, Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas, Organización Mundial de la Salud, Ginebra - 2002.
38 Ministerio de Salud. Norma Técnica para Atención de Parto Vertical con Adecuación Intercultural. Dirección General de Salud de las Personas. Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Lima – Perú 2005.
39 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Manual de Adecuación Cultural del Parto Natural/Vertical y sus Distintas Posiciones en el Marco Multicultural, Guatemala - 2011.
40 Revista Cubana de Ginecología y Obstetricia 2012; 38 (1):134-145.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 21 11/12/2020 12:22:56 p.m.

la pelvis, posteriormente adecuar la posición de la parturienta para realizar el alumbramiento dirigido.

- El acompañante actúa como el soporte de la parturienta, dicha persona puede estar por detrás o frente a la paciente.

VENTAJAS[41,42]

- Diámetros pélvicos aumentados.
- El tronco presiona sobre el fondo uterino y promueve el descenso del bebé.
- Aumento de presión en suelo pelviano.
- Promueve el deseo de pujo.
- Disminuye el dolor de espalda y cadera.
- Se puede dar soporte a los músculos abdominales.
- Se puede atender el parto por delante facilitando el contacto precoz piel a piel.
- Participación más activa del acompañante.
- Menos riesgo de laceraciones perineales.
- Luego del parto la mujer se puede acostar con facilidad.

- **POSICIÓN DE RODILLAS**
  - El profesional de la salud que atiende el parto se ubicará delante o detrás de la gestante para así proteger el periné en todo momento y evitar que se desgarre. Posteriormente se adecuará para realizar el alumbramiento dirigido.
  - El acompañante puede estar al frente o detrás de la paciente, dicha persona deberá abrazar a la gestante por la región del tórax permitiendo a la usuaria apoyarse en los muslos del acompañante.



VENTAJAS:

- Al estar de rodillas le facilitará sentarse entre contracciones sobre sus pantorrillas protegiendo su intimidad.
- Puntos de apoyo múltiple y seguro.
- Facilidad para la protección pasiva.
- No existe riesgo de caída brusca del bebé la distancia entre la pelvis y el suelo es menor, además quien atiende el parto está preparado para recibir al/la recién nacido/a.

41 Secretaría de Salud. La Atención Intercultural de las Mujeres: el trabajo de parto en posición vertical en los servicios de salud, Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, México 2008.

42 Módulo para capacitadores en atención del parto en posición vertical con enfoque intercultural. Ministerio de Salud. Dirección General de Salud de las Personas. Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Lima - Perú 2010.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 22 11/12/2020 12:22:56 p.m.

- Puede pasar rápidamente a la posición de gatas que es una variedad de la posición de rodilla que tiene la ventaja de permitir una mayor oxigenación y mayores diámetros óseos.

- **POSICIÓN SENTADA**[43]
  - El profesional de la salud que atiende el parto se colocará delante de la gestante y realizará los procedimientos obstétricos del periodo expulsivo adoptando una posición cómoda que le permita proteger el periné y posteriormente se adecuará para realizar el alumbramiento dirigido.



  - El acompañante debe estar sentado en una silla o en la camilla con las piernas separadas abrazando a la gestante por la región del tórax, permitiendo a la gestante apoyarse en los muslos o sujetarse del cuello del acompañante. En esta posición la gestante se encontrará sentada en una silla de partos al mismo nivel en el que se encuentra el acompañante.

  - La gestante en trabajo de parto en posición semisentada se apoyará en el acompañante. Esta posición relaja y permite que aumenten los diámetros de la pelvis.

VENTAJAS:
- Promueve el descanso y la relajación.
- Ventaja de la fuerza de gravedad.
- Permite el monitoreo fetal continuo.
- Se pueden realizar exámenes vaginales.
- Disminuye dolor de espalda y cadera.
- Posición favorable para recibir un masaje (lumbosacro).
- Buena visibilidad y movilización para la madre.
- Cómoda para la recepción del bebé y de la placenta.
- Facilita el contacto precoz.

- **POSICIÓN PARADA O SOSTENIDA DE UNA SOGA**
  - El profesional de la salud se colocará frente a la gestante en trabajo de parto. Realizará los procedimientos obstétricos del periodo expulsivo y posteriormente se adecuará para realizar el alumbramiento dirigido. El acompañante se colocará detrás y tendrá que sostener a la paciente para que no se mueva.

  - La gestante en trabajo de parto deberá sujetarse de una soga suspendida de una viga del techo. Al hacer esto el feto es favorecido, ya que la fuerza

43 Manuel Gallo Vallejo, Médico Gineco Obstetra Ventajas de la Posición Vertical de la Madre en el Parto ante otras Posiciones/Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano y la posición materna y el parto, España - 1980.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 23 11/12/2020 12:22:56 p.m.





de gravedad le ayuda a avanzar por el canal del parto de manera suave y calmada.

- Esta posición podría dificultar las maniobras correspondientes cuando hay circular de cordón, o para detectar cualquier complicación que pudiera surgir en el momento.

VENTAJAS:
- Total libertad de movimiento.
- Contracciones menos dolorosas y más efectivas.
- Ayuda al encajamiento y acelera el trabajo de parto.
- Aumenta la urgencia del deseo de pujo durante el expulsivo.
- Mejora la oxigenación fetal.

- **POSICIÓN EN CUATRO PUNTOS (pie, rodillas y manos).**
  - Es preferida por algunas mujeres, especialmente por las que experimentan dolor en la parte baja de la espalda.
  - El profesional de la salud que atiende el parto se colocará detrás de la gestante cuidando el periné para evitar los desgarros, realizará los procedimientos obstétricos del periodo expulsivo y posteriormente se adecuará para realizar el alumbramiento dirigido.
  - Algunas gestantes prefieren arrodillarse sobre una colchoneta, apoyarse hacia delante en su acompañante o en la cama. Probablemente en el momento del parto adoptará una posición más reclinada con el fin de

Recuerde pinzar el cordón umbilical luego de esperar 2 a 3 minutos después del nacimiento o cuando deje de latir, esta regla se debe practicar en todas las posiciones de atención del parto vertical u horizontal; siendo el objetivo, lograr un/a recién nacido/a con mayor hemoglobina.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 24 11/12/2020 12:22:56 p.m.

facilitar el control del parto, la recepción del bebé se realiza por detrás de la mujer.

- El profesional de la salud que atiende el parto vertical deberá instruir a la parturienta en trabajo de parto para que realice la respiración jadeante, relajar el cuerpo y respirar por la boca; y en el momento del pujo, hacerlo con la boca cerrada, para incrementar la fuerza de los músculos del abdomen.



PROCEDIMIENTOS:

1) Una vez identificada la posición elegida por la gestante, verificar la logística a utilizar entre ellos los instrumentos, medicamentos e insumos que se encuentren ubicados adecuadamente para la atención del parto en posición vertical:

- Mantener las puertas y las ventanas cerradas (que no permitan el ingreso de corrientes de aire).
- La luz deberá ser tenue, de acuerdo a las costumbres de cada zona.
- Acondicionar la temperatura ambiental de la sala de partos de acuerdo a cada región entre 24 a 26°C. La temperatura debe mantenerse las 24 horas del día y en las diferentes estaciones del año.
- Soga, cortina o manta colgada de una viga de acuerdo a las costumbres de la zona.
- Camilla o banco adecuado para el parto vertical.
- Colchoneta o tarima cubierta con campos estériles o pellejos limpios de acuerdo a costumbres de cada región.
- Paquete de ropa de parto vertical y equipo de parto, verificar proceso de esterilización (cinta de control externo y tira de control interno).
- Medicamentos e insumos para este propósito.



2) Acceder a que la gestante cambie de posiciones durante este periodo; por lo que el personal de la salud deberá realizar una asistencia permanente a fin de evitar la salida intempestiva del/ de la recién nacido/a lo que podría ocasionar desgarro del canal del parto y daño neonatal.

3) Orientar la participación activa del acompañante.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 25 11/12/2020 12:22:57 p.m.

4) El profesional de la salud que atiende el parto debe estar convenientemente ubicado, en una posición que le permita tener estabilidad, comodidad y celeridad de movimientos.

5) En este periodo se deben controlar los latidos cardiacos fetales cada cinco minutos.

6) El profesional de la salud a cargo de la atención del parto debe realizar técnicas de prevención de infecciones:
   - Lavado de mano quirúrgico.
   - Vestirse con mandilón o delantal de plástico, botas, gorro, mascarilla y lentes protectores limpios.
   - Abrir el paquete de ropa de atención de parto vertical, vestirse con el mandilón estéril y calzarse los guantes estériles.
   - Realizar el aseo perineal de la parturienta de acuerdo a las costumbres de la zona.
   - Colocarle la bata, faldón y botas estériles de acuerdo al diseño de cada zona, se debe contar con dos toallas de textura suave y absorbente para la atención inmediata del recién nacido.

7) Para las posiciones sentadas y semisentadas, durante el periodo expulsivo, mientras la cabeza fetal corona, se debe proteger el periné con la mano dominante de manera firme y sostenida (con gasa o apósito estéril); con la otra mano se presiona muy suavemente la cabeza fetal a efectos de controlar la velocidad de salida del feto (maniobra de Ritgen).

8) Esperar una nueva contracción, a fin de que la gestante recupere sus fuerzas y facilite la salida del resto del cuerpo del/de la recién nacido/a. Una técnica que motiva a pujar a la parturienta es facilitando un contacto táctil de la madre a la cabeza del bebé.

9) Evitar maniobras de estimulación en la horquilla vaginal (maniobra de Ferguson), ya que puede desgarrar la mucosa vaginal y el periné ocasionado edema y sangrado durante el parto[44].

10) En caso de contaminación con heces durante el periodo expulsivo, el proveedor que atiende debe proceder a cambiarse de guantes y el campo contaminado, cuantas veces sea necesario, para mantener la asepsia.

11) Evaluar la necesidad de una episiotomía y para el caso de la atención del parto en la posición vertical la evidencia científica demuestra que generalmente no es necesaria[45].

12) Evitar ordenes innecesarias e irrespetuosas en el periodo expulsivo ("puja de una vez", "tu bebé puede morir", "de una vez saca a tu bebé porque está

44 Consejería de Salud y Política Social. Estrategia de Atención al Parto Normal, Servicio Extremeño de Salud, 1era. Edición - España 2013.

45 Carroli G, Belizan J. Episiotomía en el parto vaginal (Revisión Cochrane traducida). En la Biblioteca Cochrane plus, 2005 número 4. Oxoford: Update Softwar Ltd.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 26 11/12/2020 12:22:57 p.m.

sufriendo", "no grites, concéntrate", entre otras.), teniendo en cuenta que este es un momento en que la parturienta se encuentra en un estado de trance, y que pueden resultar ofensivas y frustrantes para la parturienta.



13) Verificar la presencia de cordón umbilical al rededor del cuello, de acuerdo a la posición de la parturienta indicar para que se recline al acompañante y lograr mayor visibilidad, en caso de encontrarse flojo el cordón umbilical deslícelo por encima de la cabeza, si se encuentra ajustado pinzar y cortar de inmediato.

14) Dejar que la cabeza fetal gire espontáneamente en su movimiento de rotación externa, después que haya girado, coloque una mano a cada lado de la cabeza a nivel de los parietales, luego ejerza una tracción delicada y descendiente para permitir que el hombro anterior se deslice por debajo de la sínfisis del pubis; luego guíe la cabeza y el tronco hacia una curvatura ascendente para permitir la salida del hombro posterior y salida del resto del cuerpo.



15) En la posición parada, de rodillas o cuclillas, realizar con la mano más diestra una protección sostenida y firme del periné, esperando la salida de la cabeza del feto, con la otra mano debe sostener la salida del resto del cuerpo.

16) Dependiendo en la posición en que se encuentra la parturienta, solicitar que se recline hacia el acompañante y colocar al/la recién nacido/a sobre su vientre. Todos los recién nacidos requieren una evaluación rápida en los primeros treinta (30) segundos de vida, realizar el secado inmediato con suavidad y firmeza utilizando una toalla estéril y tibia, determinar hora del parto y mostrar el sexo a la madre. Si el recién nacido presenta buen tono muscular y buen esfuerzo respiratorio se sigue los procedimientos de rutina (apego precoz y lactancia materna) con la participación de la madre y el acompañante.

17) La atención inmediata del/de la recién nacido/a se debe efectuar de acuerdo a la Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Neonatal.

18) Estimar el APGAR al minuto y a los cinco minutos de vida, mientras espera que

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 27 11/12/2020 12:22:57 p.m.

el cordón umbilical deje de latir en coordinación con el equipo de atención neonatal.[46,47]

19) Prevenir la perdida de calor por contacto y evaporación, coloque al recién nacido sobre el pecho o vientre materno (la piel de la mamá contribuye en mantener la temperatura del/de la recién nacido/a).



20) Realizar el contacto piel a piel, procedimiento que se aplica si la madre y el/la recién nacido/a se encuentran en buen estado y si las condiciones ambientales lo permiten de acuerdo a la norma; el tiempo debe ser no menor de 45 a 60 minutos.[48,49]

21) Respetar la práctica de costumbres ancestrales en el parto. (uso de pañuelos, fajas, bebidas, y otros) según sus creencias de la zona.

22) Realizar el pinzamiento y corte del cordón umbilical.[50,51]

- Pinzamiento tardío (2 a 3 minutos): indicado para recién nacidos vigorosos, este procedimiento es de vital trascendencia en la salud del/de la recién nacido/a, la transfusión placentaria tiene dos fines: completar el volumen sanguíneo y suministrar las reservas de hierro para los primeros seis (06) meses de vida, lo cual ha demostrado ser muy importante, para prevenir la deficiencia de hierro y la anemia durante la infancia. De esta manera se contribuirá a la reducción de los altos índices de anemia en nuestro país. El corte del cordón umbilical será realizado por el profesional de la salud que atiende el parto, puede también permitirse que el corte del cordón umbilical lo realice el padre o familiar presente.
- Pinzamiento inmediato: indicado en recién nacido/a deprimido/a, con líquido amniótico meconial, circular irreductible, sangrado placentario grave, en el recién nacido/a de madre con VIH, se tiene que pinzar y cortar el cordón umbilical (sin ordeñar), inmediatamente producido el parto, entre otras[52].

46 Ministerio de Salud. Modelo de Intervención para Mejorar La Disponibilidad, Calidad y Uso de los Establecimientos que Brindan Funciones Obstétricas y Neonatales, Dirección General de Salud de las Personas, Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Lima – Perú 2010.

47 Ministerio de Salud. Documento de Trabajo, Definiciones Operacionales y Criterios de Programación de los Programas Estratégicos (PpR), Lima- Perú

48 Ministerio de Salud. Marco de Derechos y Deberes del Usuario para el Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de Salud, Lima- Perú 2006.

49 Ministerio de Salud. Un buen nacimiento para una vida mejor. Hospital Nacional Santa Rosa y Caritas del Perú, Lima 2012.

50 Efecto del Momento de Pinzamiento del Cordón Umbilical en Recién Nacidos a Término Sobre los Resultados en la Madre y el Neonato (Revisión Cochrane traducida). Cochrane base de datos Revisiones Sistemáticas 2013 publicado 7. Art. No: CD004074. DOI: 10.1002/14651858.CD004074.

51 Ministerio de Salud. Guías de práctica clínica y guías de procedimiento, Departamento de Neonatología INMP, Lima- Perú 2007.

52 Ministerio de Salud. Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Neonatal, Aprobada por R.M. N°827-2013/MINSA, y precisada por R.M. N° 159-2014/MINSA, Dirección General de Salud de las Personas,-strategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Lima – Perú 2013.-2014

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 28 11/12/2020 12:22:57 p.m.

23) El profesional de la salud que atiende el parto es el responsable de la identificación de la madre (huella índice derecho) y del/de la recién nacido/a (huella plantar y brazalete), antes de salir de sala de partos.



c) TERCER PERIODO: ALUMBRAMIENTO[53] Centro Obstetrico (Sala de Parto).

La atención del parto en posición vertical, concluye con el nacimiento del recién nacido; prosigue la atención del alumbramiento (manejo activo del tercer periodo del parto), que debe atenderse en posición horizontal debido al aumento del sangrado vaginal[54]. El manejo activo del tercer periodo del parto incluye:

- Uso de oxitocina.
- Tracción controlada del cordón umbilical (TCC).
- Compresión bimanual externa - CBE (ANEXO N° 8).



PROCEDIMIENTOS

1) Después de un parto vertical, dependiendo en la posición en que se encuentre la parturienta, solicite que se acueste en la camilla o colchoneta o que se recline sobre el acompañante para realizar el manejo activo del alumbramiento.

2) Asegurar que la vejiga esté vacía.

3) El profesional de la salud que atiende el parto solicita al personal de apoyo. Dentro



53 Ministerio de Salud. Guía de Práctica Clínica, para la Atención de Emergencias Obstétricas Según Nivel de Capacidad Resolutiva. Dirección General de las Personas – Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Lima- Perú 2007.

54 Lavender T y Mlay R. Posición en el período expulsivo del trabajo de parto de las mujeres sin anestesia peridural: Comentario de la BSR (última revisión: 15 de diciembre de 2006). La Biblioteca de Salud Reproductiva de la OMS; Ginebra: Organización Mundial de la Salud.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 29 11/12/2020 12:22:58 p.m.

del primer minuto después del nacimiento, administrar una ampolla de 10 UI de oxitocina Intra Muscular (IM), previamente se debe descartar la presencia de un segundo feto.



4) Permitir que la parturienta reciba algún mate caliente de parte de sus familiares, de acuerdo a sus costumbres o preferencias, previo control del personal de la salud (té de algodón, sharamasho, anís, muña, ajenjo, manzanilla orégano, ruda u otros).

5) La parturienta en este periodo se encuentra recostada con él/ la recién nacido/a en el vientre materno sin pinzar el cordón umbilical (momento en que se está produciendo la transfusión placentaria); luego de dos a tres minutos pinzar y cortar el cordón umbilical (recuerde que el corte puede realizarlo el padre)[55,56]



6) Verificar el eje del útero con el eje de la vagina, estabilizar el útero, colocar firmemente la mano sobre la cara anterior del útero y realizar la contracción para evitar la inversión uterina.

7) Con la otra mano, mantener una tracción firme, controlada y sostenida del cordón umbilical, este procedimiento se ejecuta cuando el útero se encuentra contraído (maniobra de Brandt Andrews).

8) Verificar cuidadosamente si existe signos de desprendimiento de la placenta (signo de Kushner y Ahlfeld).

9) Permitir el uso de técnicas que faciliten la expulsión de la placenta según las costumbres y creencias, (soplar una botella, pinzar el cordón o amarrarlo al pie o pierna de la mujer para evitar que se introduzca de nuevo).

10) Al ser expulsada la placenta, las membranas pueden desgarrarse sostenga la placenta con las dos manos y hágala girar con delicadeza hasta que las membranas se expulsen lentamente (maniobra de Dublín).

11) Expulsada la placenta, inmediatamente se debe realizar la compresión bimanual externa (CBE) en forma continua, por un tiempo aproximado de tres a cinco minutos.

55 Efecto del momento de pinzamiento del cordón umbilical en recién nacidos a término sobre los resultados en la madre y el neonato (Revisión Cochrane traducida). Cochrane Database of Systematic Reviews 2013 Issue 7. Art. No.: CD004074. DOI: 10.1002/14651858.CD004074.

56 Ministerio de Salud. Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Neonatal, Dirección General de Salud de las Personas, Lima – Perú 2013.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 30 11/12/2020 12:22:58 p.m.

12) Revisar el canal del parto, de haber algún desgarro de las partes blandas manejar según Guía de Práctica Clínica para la Atención de Emergencias Obstétricas Según Nivel de Capacidad Resolutiva del Ministerio de Salud, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 695-2006/MINSA.

13) Examinar la placenta minuciosamente, para comprobar la integridad del cordón y las membranas. De igual manera se deberá verificar que los cotiledones estén completos.

14) Reparar si hubo desgarro o episiotomía (excepcional), considerando las medidas de bioseguridad y prevención de infecciones intrahospitalarias.



15) Registre la cuantificación de la pérdida sanguínea en (ml) y los datos del control de signos vitales.

16) En caso de una emergencia, canalizar otra vía segura y manejar de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica para la Atención de Emergencias Obstétricas según Nivel de Capacidad Resolutiva del Ministerio de Salud.



17) Instruir a la puérpera para el masaje uterino externo y control de sangrado vaginal.

18) El personal de la salud debe preguntar a los familiares si se desean llevar la placenta, respetando el destino final de la misma[57] de acuerdo a sus costumbres; salvo situaciones en que la placenta constituya un factor de riesgo de infección (VIH- Sida, infecciones de transmisión sexual u otras).

19) Luego de la atención del parto, antes de quitarse los guantes, eliminar los materiales de desecho o contaminados colocando en un recipiente a prueba de filtraciones o en una bolsa de plástico de color rojo (residuo sólido biocontaminado); asimismo, los materiales quirúrgicos utilizados en la atención del parto, se depositarán en un contenedor de plástico para el proceso de descontaminación con detergente enzimático, luego realizar la limpieza, el enjuague, secado, preparación y empaque de los materiales para su esterilización en el autoclave o calor húmedo; utilizar o almacenar de acuerdo a lo establecido en el Documento Técnico: Manual de Desinfección y Esterilización Hospitalaria aprobado por Resolución Ministerial Nº 1470-2002-SA/DM.

57 Ministerio de Salud. Norma Técnica para Atención de Parto Vertical con Adecuación Intercultural. Dirección General de Salud de las Personas. Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Lima – Perú 2005.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 31 11/12/2020 12:22:58 p.m.

20) Anotar en el libro de atención de parto los datos de la gestante: diagnóstico de ingreso, antecedentes de la madre, tipo de parto, tipo de alumbramiento, desprendimiento de placenta, cordón umbilical, cantidad de sangrado, datos de la recién nacido/a, APGAR, personal de la salud que atendió y supervisó el parto, diagnóstico de egreso, acompañamiento, certificado de nacido/a vivo/a on line y observaciones[58].

6.1.3 ATENCIÓN DEL PUERPERIO: Centro Obstétrico (Sala de Puerperio Inmediato).

a) PUERPERIO INMEDIATO

Comprende las primeras 24 horas post parto, lo realiza el equipo de atención del parto. El 50% de muertes maternas se registran en este periodo como consecuencia de las hemorragias post parto siendo las principales causas: atonía uterina, retención de placenta, retención de restos o alumbramiento incompleto, lesión del canal del parto (laceraciones o desgarros y hematomas), inversión uterina y coagulación intravascular diseminada. La conducta del profesional de la salud que atiende el parto en este periodo, debe ser expectante y proceder de inmediato ante cualquier complicación.



PROCEDIMIENTOS:

- **DURANTE LAS SEIS PRIMERAS HORAS**

1) Asegurar en todo momento el trato con calidad y calidez a la puérpera promoviendo la participación de un familiar.

2) Iniciar el alojamiento conjunto[59], y promover la lactancia materna temprana exclusiva con la técnica correcta manteniendo una temperatura adecuada. Asegurarse que la puérpera haya entendido los signos de alarma del puerperio y del/de la recién nacido/a.

3) Realizar el monitoreo del puerperio inmediato, estrictamente de acuerdo a la norma vigente, registrando los hallazgos en la historia clínica, en la hoja de monitoreo materno, en la hoja del partograma.

PARÁMETROS

- Verificar que las vías aéreas estén permeables.
- Control de signos vitales (temperatura, pulso, presión arterial, respiración)
- Sangrado genital.
- Consistencia del útero.
- Verificar sutura de desgarros y la episiotomía con la finalidad de descartar la formación de hematomas y/o ademas.

58 Ministerio de Salud. Modelo de Intervención para Mejorar la Disponibilidad, Calidad y Uso de los Establecimientos que Brindan Funciones Obstétricas y Neonatales, Dirección General de Salud de las Personas, Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Lima – Perú 2010.

59 Ministerio de Salud. Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Neonatal, Dirección General de Salud de las Personas, Lima – Perú 2013.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 32 11/12/2020 12:22:58 p.m.

FRECUENCIA

- Las dos primeras horas. : cada 15 minutos
- La tercera hora. : cada 30 minutos
- Desde la cuarta, quinta y sexta hora. : cada hora.
- Desde la séptima hora, hasta el día del alta. : cada 6 horas

4) En caso de haber realizado la sutura o episiorrafía, evaluar a la puérpera con la finalidad de descartar la formación de hematomas y/o edemas.

5) Si se da el caso facilitar la colocación de la faja o del chumpi y el rollete como mecanismo de compresión, prácticas tradicionales no nocivas de acuerdo a sus costumbres de cada zona (el acompañante apoya colocándole la faja a la altura del fondo uterino).



6) Inmediatamente después del parto, indicar una dieta completa hiperprotéica respetando aspectos culturales de alimentación que no impliquen riesgos para la madre y el/la recién nacido/a.

7) Trasladar a la puérpera de centro obstétrico al ambiente de hospitalización con su respectiva historia clínica obstétrica, correctamente llenada donde permanecerá hasta el momento del alta.

- **POSTERIOR LAS SEIS HORAS POST PARTO HASTA EL DIA DEL ALTA**
  (Hospitalización - Sala de Puerperio).

1) Brindar comodidad y confort a la puérpera ubicándola en una habitación acondicionada con temperatura adecuada y luz tenue de acuerdo a su preferencia.



2) Acomodar a la puérpera y al/la recién nacido/a en una cama de 60 cm de altura para su reposo, puede estar acompañada de su acompañante, pareja o familiar en la hora de visita.

3) Registrar los hallazgos de la madre y el/la recién nacido/a en la historia clínica obstétrica en cada turno establecido.

4) Controlar a la puérpera: los signos vitales, las mamas, altura uterina, estado de

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 33 11/12/2020 12:22:59 p.m.

hidratación, edemas, reflejos osteo- tendinosos, genitales externos, características de los loquios y funciones biológicas (heces y orina); asimismo, indicarle a la puérpera que miccione antes de cada visita médica para su evaluación.

b) PUERPERIO MEDIATO (omprende desde las 24 horas hasta los 7 días posparto).

PROCEDIMIENTOS: (Hospitalización - Sala de Puerperio).

1) Realizar la higiene perineal con agua tibia y/o fría de acuerdo a la zona, la higiene lo realiza la misma puérpera, sólo cuando amerita, lo realiza el personal de la salud.

2) La puérpera y su pareja deben recibir información clara en su idioma respecto a los siguientes temas:

- Lavado de manos antes y después de cada actividad que realice.
- Lactancia materna temprana y exclusiva a libre demanda (imprescindible).
- Técnicas de amamantamiento.
- Higiene de mamas antes y después de dar de lactar.
- Cuidado y limpieza del cordón umbilical
- Higiene diaria del/de la recién nacido/a.
- Alimentación balanceada y adecuada para la madre.
- Administración de micronutrientes.
- Importancia del control del puerperio.
- Informar las señales de peligro de la madre y el/la recién nacido.
- Paternidad responsable.
- Métodos Anticonceptivos (MAC).
- Importancia del calendario de vacunación del/de la recién nacido/a.
- Importancia del control de crecimiento y desarrollo.



3) Entregar contenidos educativos necesarios de acuerdo a la zona en forma apropiada y de fácil entendimiento.

4) Estimular el fortalecimiento de los vínculos afectivos, autoestima y autocuidado, como factores protectores contra la violencia intrafamiliar.

5) Solo está prohibida la lactancia materna a todo/a hijo/a nacido/a de madre infectada por el VIH, según norma vigente.
6) Entregar el certificado de nacido/a vivo/a a la madre para su trámite respectivo ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC.
7) Al momento del alta, entregar el carné de control materno perinatal a

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 34 11/12/2020 12:22:59 p.m.

la puérpera con los datos completos de la atención del parto, en casos de referencia, realizar la contrarreferencia oportuna al establecimiento de salud de procedencia.



8) Programar las fechas de control puerperal en consultorio externo a los siete (7) y treinta días (30) después del alta en los cuales simultáneamente se debe evaluar al/la recién nacida.

9) Indicar el alta en caso de evolución satisfactoria de la puérpera cuando hayan transcurrido al menos 48 horas de observación posparto.

10) Anotar minuciosamente en la historia clínica obstétrica todos los datos de la madre y el/la recién nacido/a de la atención del parto en posición vertical y del alta.

11) Registrar a la puérpera y al/la recién nacido/a en el libro de altas de servicio de hospitalización.

12) Aplicar la encuesta la satisfacción del usuario (equipo responsable- calidad).

c) PUERPERIO TARDÍO:[60] (Consultorio Externo).

Este período comprende después de los 7 días hasta los 42 días posparto, cuya atención se realiza por consulta externa por un profesional de la salud competente quien debe realizar las actividades siguientes:

- Resaltar en todo momento la participación de la pareja.
- Evaluación de la puérpera.
- Control de signos vitales.
- Psicoprofilaxis puerperal.
- Informar sobre el reinicio de la actividad sexual.
- Administración de micronutrientes.



- Orientación/consejería sobre signo de alarma del puerperio y RN.
- Importancia de la vacuna.
- Reforzamiento de la importancia de la lactancia materna.
- Orientación/consejería en uso de métodos de Planificación Familiar.
- Inicio o seguimiento del método

60 Ministerio de Salud. Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva, Dirección General de Salud de las Personas. Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Lima – Perú 2004.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 35 11/12/2020 12:22:59 p.m.

anticonceptivo elegido.
- Orientación/consejería en la importancia del Papanicolaou.
- Orientación/consejería sobre la nutrición en este periodo


6.1.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN DEL PARTO VERTICAL

Los profesionales de la salud deberán observar las indicaciones clínicas para proceder a la atención del parto vertical tomando en cuenta lo siguiente:

En el marco de esta norma es de suma importancia la decisión informa- da desde la primera atención prenatal, sobre la posición en la que desea dar a luz la gestante. Por lo tanto, la presente norma propone con carácter obligatorio la información sobre las ventajas del parto en posición vertical para la madre y el/la recién nacido/a, a partir de las evidencias científicas internacionales y nacionales.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 36 11/12/2020 12:22:59 p.m.

FLUJOGRAMA DE LA ATENCIÓN DEL PARTO VERTICAL



PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 37 11/12/2020 12:22:59 p.m.

- Gestantes sin complicación obstétrica, incluye las adolescentes y mujeres jóvenes.
- Presentación cefálica del feto.
- Compatibilidad feto pélvica.
- Pelvis ginecoide.
- Gestación a término.

6.1.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DEL PARTO VERTICAL:

Las indicaciones que determinan una cesárea también determinan la imposibilidad de un parto vertical u horizontal, entre ellas, las más frecuentes son:

- Cesáreas iterativas (más de dos).
- Cirugía uterina previa (miomectomías).
- Incompatibilidad feto pélvica.
- Embarazo gemelar.
- Feto en presentación podálica.
- Falta de colaboración de la gestante para el trabajo de parto y la atención del mismo (problemas psiquiátricos).
- Distocia de presentación.
- Distocia de cordón.
- Distocias de contracción.
- Prematuros.
- Sufrimiento fetal.
- Hemorragia del III trimestre (placentaprevia o desprendimiento prematuro de placenta).
- Ruptura prematura de membranas solo con presentación alta.
- Pre eclampsia severa (dependiendo del periodo y fase que se encuentre).
- Eclampsia.
- Luxación traumática de caderas.
- Macrosomía fetal con diagnóstico clínico y ecográfico previo.
- Madre HIV positiva.



6.1.5. POSIBLES COMPLICACIONES.

En la atención del parto en posición vertical pueden presentarse las siguientes complicaciones:

- Laceraciones a nivel del periné.
- Salida brusca del feto.
- Prolapso de cordón.
- Prolapso de miembros superiores.
- Distocia de hombros.

En caso de presentarse alguna complicación realizar el manejo adecuado según nivel de complejidad.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 38 11/12/2020 12:23:00 p.m.

6.1.6. ORIENTACIÓN / CONSEJERÍA DESPUÉS DEL PARTO

El profesional de la salud debe brindar la información, orientación/ consejería a la madre y a la familia sobre temas relacionados a la atención del recién nacido/a y la salud sexual y reproductiva tomando los temas siguientes:

- Lactancia materna exclusiva enfatizando sus beneficios y enseñando la técnica.
- Planificación familiar.
- Higiene de la madre y el niño.
- Vacunación del/de la recién nacido/a.
- Identificación de signos de alarma en el puerperio.
- Identificación de signos de alarma del/de la recién nacido/a.
- Cuidados del/de la recién nacido/a.



- Alimentación de la madre.

6.1.7. CRITERIOS DE ALTA

- Sin complicaciones al segundo día.
- Con complicaciones de acuerdo a evolución e indicación médica.
- Cita a los 7 días.
- Reingreso en caso de complicaciones

6.2 COMPONENTE DE GESTIÓN

La redes de salud, micro redes y los establecimientos de salud deben incluir en el Plan Operativo Anual y en la programación del Presupuesto por Resultados del Programa de Salud Materno Neonatal, las actividades correspondientes en la atención de parto en posición vertical en el marco de los derechos humanos con pertinencia intercultural. Gestionando su inclusión en el presupuesto y evaluando a través de indicadores de proceso, resultado e impacto.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 39 11/12/2020 12:23:00 p.m.

6.2.1. PLANIFICACIÓN LOCAL DE LA ATENCIÓN MATERNA

CRITERIOS PARA LA PLANIFICACIÓN[61]

- Evolución histórica de la demanda.
- Recursos disponibles.
- Factores socioeconómicos, geográficos y culturales.

RESULTADOS ESPERADOS

- Disminuir la incidencia de cesáreas.
- Incrementar la cobertura de partos en posición vertical institucionales.
- Disminuir los partos domiciliarios.
- Incrementar el inicio de la lactancia materna temprana y exclusiva en la primera hora del post parto.
- Disminuir la morbilidad materna y perinatal.
- Disminuir los casos de muerte por hipoxia neonatal.
- Disminuir la letalidad materna <1%.
- Disminuir los casos de mortalidad materna (N° MM).
- Disminuir los casos de mortalidad perinatal (N° MP).

RECURSOS NECESARIOS

- Sala de partos adecuada para la atención del parto en posición vertical, brindando comodidad a la usuaria y al proveedor.
- Historia Clínica Materno Perinatal.
- Carné Perinatal.
- Partograma OMS.
- Paquete de ropa estéril para la atención del parto.
- Disponibilidad de sangre segura.
- Contar con el paquete completo de insumos de laboratorio.
- Sistema de registro de hechos vitales (certificado de nacimiento).
- Paquete de medicinas e insumos para las principales emergencias obstétricas: clave roja, azul y amarilla según norma vigente.
- Medidas de bioseguridad.

6.2.2. MONITOREO, SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA.[62,63]



- El monitoreo de la atención de parto vertical, debe ser de manera continua e integral siendo de responsabilidad del Coordinador de Salud Sexual y Reproductiva del nivel local.
- Las actividades de supervisión a las distintas redes, microrredes

61 Ministerio de Salud. Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Materna, Dirección General de Salud de las Personas, Lima – Perú 2013.

62 Ministerio de Salud. Guías para la Implementación del Sistema de Vigilancia y Monitoreo de la Mortalidad Materna en base a la Implementación de los Equipos de Inteligencia Sanitaria en las DISAs priorizadas, PARSALUD – OGE – MINSA.

63 Ministerio de Salud. Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Materna, Dirección General de Salud de las Personas, Lima – Perú 2013.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 40 11/12/2020 12:23:00 p.m.

y hospitales, son de responsabilidad de los Coordinadores de Salud Sexual y Reproductiva o quien haga sus veces a nivel regional.

- Las actividades de asistencia técnica es de responsabilidad del nivel regional y/o nacional a través de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública
- La periodicidad de las actividades de monitoreo, supervisión y asistencia técnica se realizará de la siguiente manera:
  - Del nivel nacional al nivel regional mínimo una vez al año.
  - Del nivel regional a los Hospitales y redes cada trimestre.
  - De Red a micro red y establecimientos del primer nivel en forma mensual o según necesidad y accesibilidad.

6.2.3. EVALUACIÓN[64,65]

- Cumplir con los criterios establecidos en los estándares e indicadores de calidad de la atención de parto vertical en los establecimientos de salud que cumplen funciones obstétricas y neonatales.
- Evaluar los indicadores de proceso, resultado e impacto de la estrategia implementada.
- La evaluación se realizará con una periodicidad anual a nivel nacional, semestral a nivel regional y trimestral en el nivel local teniendo en cuenta el corto, mediano y largo plazo para el cumplimiento de metas y aplicar las estrategias de trabajo.

6.2.4. INDICADORES[66]

a) INDICADORES DE ESTRUCTURA[67]

INDICADOR	FÓRMULA
% de Establecimientos de Salud (EESS) con infraestructura adecuada para realizar la atención de parto vertical.	N° Establecimientos de Salud (EESS) con infraestructura adecuada que atienden parto vertical / N° total EESS que atienden partos X 100

64 Ministerio de Salud. Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Materna, Dirección General de Salud de las Personas, Lima – Perú 2013.

66 Ministerio de Salud. Estándares e Indicadores de Calidad en la Atención Materna y Perinatal en los Establecimientos que Cumplen con Funciones Obstétricas y Neonatales, Dirección de Calidad en Salud, Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Lima – Perú 2007.

67 Ministerio de Salud. Modelo de Intervención para Mejorar la Disponibilidad, Calidad y Uso de los Establecimientos que Brindan Funciones Obstétricas y Neonatales, Dirección General de Salud de las Personas, Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Lima – Perú 2010.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 41 11/12/2020 12:23:00 p.m.

% de Establecimientos de Salud (EESS) con equipamiento completo para la atención de parto vertical con pertinencia intercultural.	N° Establecimientos de Salud (EESS) con equipamiento completo para parto vertical con pertinencia intercultural / N° total de Establecimientos de Salud (EESS) que atienden parto vertical.

b) INDICADORES DE PROCESO

INDICADOR	FÓRMULA
% de gestantes que fueron atendidas en la posición de parto vertical con registro de partograma según la norma.	N° de gestantes que fueron atendidas en la posición de parto vertical con registro de partograma según la norma / N° total de gestantes de parto vertical X 100
% de gestantes de parto vertical con registro de HIS según la norma.	N° de gestantes de parto vertical con registro de HIS según la norma / N° total de gestantes de parto vertical X 100
% de gestantes de parto vertical con manejo activo del tercer periodo.	N° de gestantes de partos vertical que reciben (10 UI de oxitocina IM dentro del minuto después del nacimiento del bebé y luego de tener la seguridad que no exista otro feto)/ N° total de gestantes de partos verticales X 100
% de puérperas de parto vertical y son controladas cada 15 minutos durante las dos primeras horas, según norma.	N° de puérperas de parto vertical y son controladas cada 15 minutos durante las dos primeras horas, según norma/ N° total puérperas de partos verticales X 100
% de parturientas con pinzamiento tardío del cordón umbilical de parto vertical.	N° de parturientas con pinzamiento tardío del cordón umbilical de parto vertical/ N° total de parturientas de parto vertical X 100
% de Recién Nacidos/as de parto vertical con APGAR mayor de 7 al minuto.	N° de Recién Nacidos/as de parto vertical con APGAR mayor de 7 al minuto/ N° total de RN de parto vertical X 100

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 42 11/12/2020 12:23:00 p.m.

%	de puérperas de parto vertical que egresan habiendo recibido orientación y consejería sobre los métodos de planificación familiar de acuerdo a la norma.	N°	de puérperas de parto vertical que egresan habiendo recibido orientación/consejería sobre los métodos anticonceptivos de planificación familiar / N° total de puérperas que egresan de parto vertical X 100

c) INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR		FÓRMULA	
%	de Establecimientos de Salud (EESS) que atienden parto vertical.	N°	de Establecimientos de Salud (EESS) que atienden parto vertical / N° total de Establecimientos de Salud (EESS) X 100
%	de gestantes con plan de parto, quienes recibieron orientación / consejería y culminan su gestación en parto vertical.	N°	de gestantes con plan de parto, quienes recibieron orientación/ consejería y culminan su gestación en parto vertical / N° total de gestantes que culminan su gestación en un parto vertical
%	de parto vertical atendido en el mes/año, en el Establecimiento de Salud.	N°	de parto vertical atendido en el mes/ año, en el Establecimiento de Salud (EESS) / N° total de parto vertical atendido en el Establecimientos de Salud (EESS)X 100

6.2.5. INFORMACIÓN

FUENTES DE INFORMACIÓN[68].

- Sistema de información del HIS.
- Egresos.
- Aplicativo Analítico SIP 2000.
  - Historia clínica materna perinatal.
  - Carné de atención materno perinatal.
  - Reportes del sistema del SIP 2000, que será analizado en forma mensual por el servicio de gíneco obstetricia y presentar los resultados a la Dirección del establecimiento de salud.
- Informes de Gestión de Servicios Maternos.
  - Reporte mensual de la producción de servicios de la salud materna perinatal.
  - Reporte de estándares de calidad en la atención materno y perinatal en establecimientos de salud que cumplen funciones obstétricas y neonatales

68 Ministerio de Salud. Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Materna, Dirección General de Salud de las Personas, Lima – Perú 2013.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 43 11/12/2020 12:23:00 p.m.

(FON).

- Sistema de referencia y contrarreferencia.
  - Ficha de referencia.
  - Ficha de contrarreferencia.
  - Ficha de monitoreo de paciente durante la referencia.
  - Formato de Historia Clínica Materno Perinatal.
  - Documento Nacional de Identidad (DNI) de la paciente.
  - Ficha del Seguro Integral de Salud (SIS).
- Registros básicos.
  - Historia clínica perinatal base.
  - Plan de parto.
  - Libro de registro de hospitalización de pacientes obstétricas.
  - Libro de registro de atención de parto.
- Libro de registro de emergencias obstétricas.
  - Historia Clínica Neonatal.
  - Certificado de nacimiento.
  - Certificado de defunción.
  - Libro de registro de egresos.

6.2.6 PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN[69]

Los jefes/responsables de los departamentos/servicios de atención gíneco-obstétrica y los coordinadores Regionales de Salud Sexual y Reproductiva en coordinación con la Oficina General de Comunicaciones del Ministerio de Salud implementarán planes de Información, Educación y Comunicación (IEC) sobre los beneficios del parto en posición vertical, dirigidos a personal de los servicios de salud, centros educativos, redes sociales y a los decisores políticos de los sectores de educación, salud, protección social, entre otros, aprovechando las distintas instancias de participación.

Los coordinadores Regionales de Salud Sexual y Reproductiva en coordinación con la Dirección General de Promoción de la Salud y Gestión Territorial en Salud, promoverán el auto cuidado de la salud fortaleciendo el empoderamiento y la autonomía de la mujer para un ejercicio responsable y placentero de la sexualidad, maternidad/paternidad responsable, voluntaria y sin riesgos.

6.2.7 GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN EN PARTO VERTICAL[70,71]

En el marco de los procesos de mejora de la calidad de atención, las regiones deben fortalecer competencias (CDC) y/o sedes de pasantía de parto vertical, que les permita tener personal de la salud actualizado y calificado para la atención del parto en posición vertical y sus posibles complicaciones.

En el marco de los derechos sexuales y reproductivos, así como el derecho a una maternidad saludable y segura el Ministerio de Salud, el Instituto de Gestión de

69 Ministerio de Salud. Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Materna, Dirección General de Salud de las Personas, Lima – Perú 2013.

70 Ministerio de Salud. Modelo de Intervención para Mejorar la Disponibilidad, Calidad y Uso de los Establecimientos que brindan funciones Obstétricas y Neonatales, Dirección General de Salud de las Personas, Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Lima – Perú 2010.

71 Ministerio de Salud. Modulo para Capacitadores en Atención del Parto en Posición Vertical con Enfoque Intercultural. Dirección General de Salud de las Personas. Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual Reproductiva, Lima – Perú 2010.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 44 11/12/2020 12:23:00 p.m.

Servicios de Salud, las Direcciones Regionales de Salud, Gerencias Regionales de Salud, o quien haga sus veces a nivel regional, deben promover iniciativas ante las universidades del país para que las facultades de formación profesional de medicina y obstetricia incorporen en el plan de estudios la atención de parto vertical.

- Las sedes de pasantía para la atención de parto vertical deberán ubicarse en establecimientos de salud que cumplen FONB, FONE o FONI.

- El equipo de gestión, los jefes de los servicios y los trabajadores de las sedes de capacitación son responsables de ofrecer servicios de capacitación y asistencia técnica.

El Instituto de Gestión de Servicios de Salud, las Direcciones Regionales de Salud, o las Gerencias Regionales de Salud o quien haga las veces a nivel regional, las Redes y Micro redes, deben contar un Plan de Capacitación Anual aprobado mediante resolución del titular en la cual debe incluirse el tema de atención del parto vertical en el marco de los derechos humanos con pertinencia interculturalidad, que igualmente debe estar considerado en el programa presupuestal de salud materna neonatal.

- Determinar la modalidad de capacitación:

  - Talleres regionales o locales según nivel de atención.
  - Capacitación en servicio (Educación Permanente en Salud).
  - Capacitación bajo la modalidad de pasantía en establecimientos de salud calificados por el Ministerio de Salud, como sede de pasantías.

6.2.8. INVESTIGACIÓN EN TEMAS DE PARTO VERTICAL

El Instituto de Gestión de Servicios de Salud, las Direcciones y Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces, la Dirección de Salud de Lima Metropolitana, las Redes y Hospitales en coordinación con las Direcciones y/o Unidades de Investigación, y con el apoyo de las universidades, sociedades científicas y/o colegios profesionales deben promover el desarrollo de investigaciones operativas en temas relacionados al parto en posición vertical.

6.3. COMPONENTE DE ORGANIZACIÓN[72,73]

El Instituto de Gestión de Servicios de Salud, las Gerencias Regionales de Salud, las Direcciones Regionales de Salud o quien haga sus veces, debe organizar la red de atención obstétrica, para ofertar prestaciones de calidad y calidez en la atención del parto en posición vertical, respetando las costumbres y creencias de la población.

6.3.1. ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN

72 Directiva Sanitaria Nº 001-MINSA/DGSP-V.02 "Directiva Sanitaria para la Evaluación de las Funciones Obstétricas y Neonatales en los Establecimientos de Salud", Resolución Ministerial N° 853-2012/MINSA.

73 Ministerio de Salud. Norma Técnica de Salud "Categorías de Establecimientos del Sector Salud. Dirección General de Salud de las Personas, Lima – Perú 2011.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 45 11/12/2020 12:23:00 p.m.

La atención del parto en posición vertical, se realiza a partir de los establecimientos de salud con funciones obstétricas y neonatales básicas (FONB) y en establecimientos de salud estratégicos que atienden las 24 horas del día.

6.3.2. INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO

Los instrumentos y seguimiento de registro de la atención de parto en posición vertical son los siguientes:

- Historia Clínica Materna Perinatal (HCPB).
- Plan de Parto.
- Carné de Atención Materno Perinatal.
- Reportes del SIP 2000.
- Ficha de referencia.
- Ficha de contrarreferencia.
- Historia clínica obstétrica estandarizada que incluye:
  - Orden de hospitalización.
  - Hoja de emergencia obstétrica.
  - Hoja de signos vitales.
  - Historia clínica materna perinatal básica.
  - Hoja de evolución médica.
  - Hoja de terapéutica.
  - Hoja de evolución Obstétrica.
  - Partograma de la OMS.
  - Hoja de pelmatoscopía.
  - Hoja de monitoreo de puerperio inmediato.
  - Exámenes complementarios.
  - Epicrisis.
- Ficha de tamizaje de violencia familiar.
- Ficha de Plan de Parto.
- Libro de registro de atención de parto[74].
- Libro de registro de seguimiento / padrón nominado de la gestante y puérpera.
- Libro de registro de hospitalización de pacientes obstétricas.
- Libro de registro de emergencias obstétricas.
- Historia clínica neonatal.
- Libro de registro de egresos.
- Formato de atención de acuerdo al sistema de aseguramiento que garantice el financiamiento.
- Sistema de registro de hechos vitales: certificado de nacimiento.

6.3.3. AMBIENTE Y EQUIPAMIENTO

Para realizar la atención de parto en posición en posición vertical, es necesario contar con uno o más ambientes debidamente acondicionados y equipados con camillas ginecológicos adaptadas para parto vertical, sillas para parto con enfoque

74 Ministerio de Salud. Modelo de Intervención para Mejorar la Disponibilidad, Calidad y Uso de los Establecimientos que Brindan Funciones Obstétricas y Neonatales, Dirección General de Salud de las Personas, Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Lima – Perú 2010.

75 Directiva Sanitaria Nº 001-MINSA/DGSP-V.02 "Directiva Sanitaria para la Evaluación de las Funciones Obstétricas y Neonatales en los Establecimientos de Salud", Resolución Ministerial N° 853-2012/MINSA.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 46 11/12/2020 12:23:01 p.m.

intercultural de acuerdo a las costumbres de la zona. Esto es necesario para establecer una convivencia adecuada dentro de una perspectiva de derechos, ya que vivimos en un país pluricultural y multiétnico.

6.3.4. RECURSOS MATERIALES[75]

Establecidos en la directiva para la evaluación de las funciones obstétricas y neonatales en los establecimientos de salud.

- Equipos.
- Instrumental.
- Medicamentos e insumos.
- Ropa en función al número de procedimientos.
- Set para sutura perineal.
- Set para la atención de partos.
- Set para revisión del cuello uterino y canal vaginal.
- Soluciones.



6.3.5. RECURSOS HUMANOS[76]

- Para la atención del parto en posición vertical cada establecimiento de salud debe contar las 24 horas del día con profesionales de la salud como: médicos, gíneco obstetras, médicos cirujano u obstetras capacitados en parto vertical y que respeten las costumbres y creencias de la población en los casos que amerite.
- Para la atención del/de la recién nacido/a,[77] médicos pediatras/neonatólogos o médico cirujano y enfermeras con competencias en la atención neonatal.
- Técnico en enfermería capacitado en la atención obstétrica y atención neonatal.

6.3.6. REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS[78,79]

El sistema de referencia y contra referencia debe estar operativo en todos los niveles de atención según normatividad vigente (N.T N° 018 MINSA/DGSP – V.01-2004, Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 751-2004/ MINSA).

a) MEDIOS DE COMUNICACIÓN

- Garantizar que en los establecimientos de salud se cuente con los medios de comunicación con los que se cuentan: radio, teléfono fijo, celulares y otros se

76 Ministerio de Salud. Documento de Trabajo, Definiciones Operacionales y Criterios de Programación de los Programas Estratégicos (PpR), Lima- Perú 2013.
77 Ministerio de Salud. Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Neonatal, Dirección General de Salud de las Personas, Lima – Perú 2013.
78 Ministerio de Salud. Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Neonatal, Dirección General de Salud de las Personas, Lima – Perú 2013.
79 Ministerio de Salud. Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud. Dirección General de Salud de las Personas. Dirección Ejecutiva de Servicios de Salud, Lima-Perú 2004.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 47 11/12/2020 12:23:01 p.m.

mantengan operativos las 24 horas del día.



b) TRANSPORTE

- Realizar requerimientos necesarios a los Gobiernos Regionales para el fortalecimiento e implementación del sistema de transporte en los Establecimientos de Salud – EESS.
  Promover políticas públicas (Ordenanzas Regionales, Municipales y otras Resoluciones) comprometiendo a los propietarios de vehículos de instituciones públicas, privadas y sociedad civil, para el traslado de las gestantes en trabajo de parto. Dicha acción debe replicarse en el nivel de capitales de provincias, distritos y comunidades, según Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 751-2004/ MINSA.

c) CONTRARREFERENCIA

- Entregar a la puérpera en el momento del alta la epicrisis y la ficha de contrarreferencia para su devolución al establecimiento de origen.
- Comunicar al establecimiento de origen el alta de la puérpera a fin de que se haga el seguimiento respectivo.



d) ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD FRENTE A LAS EMERGENCIAS DE ATENCIÓN DEL PARTO VERTICAL.[80,81]

Implementar acciones de vigilancia comunitaria con enfoque territorial de acuerdo al Modelo de Atención Integral Basado en Familia y Comunidad que permita:

- Coordinar con las autoridades regionales y locales para contar con medios de comunicación (celulares y radios), así como el transporte en camilla artesanal.
- Coordinar y promover un plan para la donación de sangre en caso de

80 Ministerio de Salud. Manual del Agente Comunitario en Salud-Preparando al Agente Comunitario de Salud, para el Cuidado Integral de la Salud y Nutrición de las Gestantes y de las Niñas/os Menores de 5 Años. Dirección General de Promoción de la Salud, Lima – Perú 2009.

81 Ministerio de Salud. Guía de Salud Sexual y Reproductiva para el Promotor. Dirección General de Salud de las Personas – Ministerio de Salud, Lima – Perú 2001.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 48 11/12/2020 12:23:01 p.m.

emergencias obstétricas mayores.
- Operativizar los comités de evacuación de emergencias obstétricas comunales.

e) CASAS DE ESPERA MATERNA PARA GESTANTES CON FECHAS CERCANAS AL PARTO[82,83]

- Las Direcciones Regionales de Salud y quien haga sus veces, deberán coordinar con las autoridades regionales, locales y comunales la construcción e instalación de las casas maternas en capitales de regiones, provincias y distritos
- Las atenciones en las casas maternas estarán dirigidas y monitoreadas por el profesional de la salud responsable de salud materna del establecimiento de salud, que cumplirá las funciones siguientes:
  - Visitar la casa de espera a la entrada y salida de cada turno.
  - Promover el consumo de multimicronutrientes.
  - Promover una nutrición y alimentación saludable.
  - Enseñarle manualidades: bordados, tejidos, hilados durante su permanencia.
  - Garantizar el mantenimiento de limpieza y orden de la casa materna.
  - Organizar las actividades de la pareja y familia durante la estancia.
  - Implementar huertos de plantas medicinales principalmente de las que son usadas durante la labor de parto y el puerperio.

6.4. COMPONENTE DE FINANCIAMIENTO

El financiamiento para el desarrollo de las actividades de atención del parto vertical se programa anualmente a nivel de cada región de acuerdo al Programa Presupuestal de Salud Materno Neonatal.
6.4 DE
Las Direcciones de Salud o las que hagan sus veces deben asegurar la planificación presupuestal en cada una de sus unidades ejecutoras.
La prestación que brinda el Seguro Integral de Salud a sus aseguradas gestantes y puérperas incluye el traslado del domicilio a la casa de espera materna, la alimentación diaria a la beneficiaria y a su acompañante en la casa de espera, de acuerdo al tarifario vigente.

VII. RESPONSABILIDADES.

7.1. NIVEL NACIONAL

El Ministerio de Salud a través de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, es responsable de difundir la presente Norma Técnica de Salud hasta el nivel regional, así como de brindar asistencia técnica para su implementación y evaluación de su cumplimiento.

7.2. NIVEL REGIONAL

El Instituto de Gestión de Servicios de Salud, las Direcciones Regionales de Salud o

82 Ministerio de Salud. Documento Técnico, Casas de Espera Materna, Modelo para la Implementación, Dirección General de Promoción de la Salud, Lima - Perú - 2006.
83 Ministerio de Salud. Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Neonatal, Dirección General de Salud de las Personas, Lima – Perú 2013

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 49 11/12/2020 12:23:01 p.m.

las que hagan sus veces son responsables de difundir y de implementar la presente Norma Técnica de Salud en sus redes, microrredes y establecimientos de salud de su ámbito, brindando asistencia técnica y supervisando su cumplimiento.

7.3. NIVEL LOCAL

Las redes, microrredes y establecimientos de salud son responsables de aplicar la presente Norma Técnica de Salud, según corresponda.

VIII. DISPOSICIÓN FINAL.

El Ministerio de Salud a través de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, el Ins- tituto de Gestión de Servicios de Salud, las Direcciones Regionales de Salud, las Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces en el ámbito regional, elaborarán el plan de implementación de la presente Norma Técnica de Salud para los establecimientos de salud públicos de su jurisdicción, para su incorporación en los correspondientes planes operativos.

IX. ANEXOS

- Anexo Nº 1: Plan de Parto.
- Anexo N° 2: Fundamentos históricos y científicos de la atención de parto vertical.
- Anexo Nº 3: Ambiente y equipamiento de sala atención de parto vertical.
- Anexo Nº 4: Mitos y verdades de la atención del parto vertical.
- Anexo Nº 5: Historia Clínica Materno Perinatal .
- Anexo Nº 6: Partograma de la OMS.
- Anexo Nº 7: Diagnóstico del trabajo de parto.
- Anexo Nº 8: Comprensión bimanual externa.
- Anexo Nº 9: Hierbas utilizadas en el trabajo de parto y post parto.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 50 11/12/2020 12:23:01 p.m.

ANEXO Nº 1

PLAN DE PARTO.[84,85]

Es una herramienta efectiva que busca planificar, organizar y movilizar los recursos institucionales, comunitarios y familiares, para la atención oportuna de la gestante, la puérpera y el/la recién nacido/a, para lo cual, se consignan acuerdos previos de alternativas de solución ante eventualidades de momento; garantizando en caso necesario la referencia oportuna a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva; en el Plan de Parto se incluye la decisión de la gestante, sobre la posición en la que desea dar a luz, para ello se le entrega a la gestante y acompañante la hoja del Plan de Parto en la primera entrevista, subsecuente- mente se prosigue con el procedimiento siguiente:

- La primera entrevista se realiza en el consultorio materno, en la cual se le explica la importancia de los datos a consignar en la hoja del Plan de Parto.
- La segunda entrevista se realiza en el domicilio de la gestante.
- La tercera entrevista se realiza en la comunidad con participación de autoridades locales.

El Plan de Parto debe elaborarse con la participación de la gestante, para lograr que ella y su familia se interesen en dar soluciones a los aspectos críticos que pueden enfrentar durante el embarazo y el parto, contando con los recursos familiares y comunitarios disponibles.

La información de la ficha de Plan de Parto debe contener los siguientes datos:

¿Ha decidido dónde atenderá su parto?.
¿Quién atenderá su parto?.
¿En qué posición preferiría dar a luz?.
¿Qué necesito para mi parto?.
¿Sabe cuándo ir a la casa de espera?.
¿Aceptaría ir a la casa de espera cerca al establecimiento de salud?. Acuerde con sus familiares el medio del transporte.
¿Qué tiempo tarda en llegar al establecimiento de salud?. Datos de filiación de la gestante.
Fecha probable de parto.
Establecimiento en la que realiza su atención prenatal. Resultados de los análisis.
Personas que la ayudarán en el traslado.
En caso de requerir sangre quién hará la donación.

84 Ministerio de Salud. Norma Técnica para Atención de Parto Vertical con Adecuación Intercultural. Dirección General de Salud de las Personas. Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Lima – Perú 2005.
85 Ministerio de Salud. Modelo de Intervención para Mejorar la Disponibilidad, Calidad y Uso de los Establecimientos que Brindan Funciones Obstétricas y Neonatales, Dirección General de Salud de las Personas, Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Lima – Perú 2010.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 51 11/12/2020 12:23:01 p.m.

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DE LAS PERSONAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD MATERNO, INFANTIL Y ADOLESCENTE
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

FICHA DE PLAN DE PARTO

Nombre de la gestante : .....
Nombre del responsable de CPN/ visita domiciliaria : .....
Dirección o Referencia : .....
.....
Nombre de pareja/acompañante : .....
Establecimiento de salud : .....
Mes de embarazo : .....
Red / microred : .....
Tipo de sangre : .....
Fecha de llenado de Plan de Parto : .....
Fecha probable de parto : .....
Fecha de actualización de Plan de Parto : .....

1 ¿ Ha decidido dónde atenderá su parto ?

Hospital ☐ Centro de salud ☐ Puesto de salud ☐ Domicilio ☐ otro ☐ especificar .....

.....

2 ¿ En que posición preferiría dar a luz ?

Echada ☐ cuclilla ☐ otros ☐ especificar .....

.....

3 Acuerde con la familia : medio de transporte, lugar de ubicación, el tiempo y el costo que significaría utilizar este transporte desde la vivienda hasta el establecimiento de salud.

Transporte	¿ A quiénes pertenece ?	¿ Dónde se encuentra ?	Horas en llegar a casa	Horas en llegar al establecimiento	Costo	Información adicional (*)
Carro						
Acémila						
Camilla						
Canoa						
Mototaxi						
Otros (Especificar)						

(*) Disponibilidad, características particulares, otros.

4 Registre el nombre de las personas que ayudarían en el traslado de la gestante/puérpera/recién nacido hacia el establecimiento de salud. Debe comprometerlas, registrando su dirección y el establecimiento de salud al cual acudirán.

Nombre completo del colaborador(a)	Domicilio o referencia	Tipo de ayuda
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 52 11/12/2020 12:23:02 p.m.

COMUNICAR EN EL PLAN DE PARTO

Las ventajas del parto en posición vertical, ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud, siendo hoy parte de las recomendaciones de esta organización sobre parto y nacimiento.



PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 53 11/12/2020 12:23:02 p.m.

Ministerio de Salud
Personas que atendemos personas
REGIÓN CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

ESPERANDO MI PARTO

ATENCIÓN INTEGRAL ADULTO MUJER

NOMBRE DE LA GESTANTE:_____

EDAD:____ COMUNIDAD:_____ Dirección de Referencia:_____

GRUPO SANGUÍNEO:_____ FECHA PROBABLE DE PARTO:_____

ESTABLECIMIENTO:_____ RED:_____ MICRO RED:_____

TELEFONO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD:_____ TELÉFONO ALTERNATIVO:_____

	FECHA		1° ENTREVISTA (I TRIMESTRE)	2° ENTREVISTA (II TRIMESTRE)	3° ENTREVISTA (III TRIMESTRE)
1	EDAD GESTACIONAL				
2	¿DÓNDE SE ATENDERÁ SU PARTO?	HOSPITAL			
		C.S.			
		P.S.			
		DOMICILIO			
		OTRO			
3	¿QUIÉN ATENDERÁ SU PARTO?				
4	¿EN QUÉ POSICIÓN PREFIERE DAR A LUZ?	ECHADA			
		CUCLILLAS			
		ASHUTURADA			
		OTRO			
5	¿CÓMO SE VA A TRANSPORTAR EN EL MOMENTO DEL PARTO O EN CASO DE EMERGENCIA?	CARRO			
		ACÉMILA			
		CAMILLA			
		OTRO			
6	¿QUÉ TIEMPO TARDA EN LLEGAR AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD?				
7	¿QUIÉN AVISARÁ AL PERSONAL DE SALUD EN EL MOMENTO DEL PARTO U EMERGENCIA?				
8	¿QUIÉN CUIDARÁ DE SUS HIJOS, SU CASA Y ANIMALES DURANTE SU AUSENCIA?				
9	¿ACEPTARÍA IR A LA CASA DE ESPERA U OTRA CERCA AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD?				
10	¿SABE CUÁNDO DEBE IR A LA CASA DE ESPERA?	SI (FECHA)			
		NO			
11	FIRMA DE LA GESTANTE				
12	FIRMA DE LA PAREJA ACOMPAÑANTE O FAMILIAR				
13	FIRMA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA VISITA				



¿QUÉ PERSONAS LA ACOMPAÑARIAN O AYUDARIAN EN SU TRASLADO AL ESTABLECIMIENTO PARA EL PARTO O EN CASO DE EMERGENCIA?

NOMBRE	PARENTESCO	¿DONARÍA SANGRE SI FUESE NECESARIO? (SI) (NO)	DNI	FIRMA

¿QUÉ NECESITO PARA MI PARTO?



NOTA: Este plan deberá aplicarse en el 1er. Control pre natal y monitorearse mensualmente en las visitas domiciliarias, para tener el Plan de Parto final en el tercer trimestre.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 54 11/12/2020 12:23:02 p.m.

ANEXO Nº 2

FUNDAMENTOS HISTÓRICOS Y CIENTÍFICOS DE LA ATENCIÓN DEL PARTO VERTICAL

a) ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ATENCIÓN DEL PARTO EN POSICIÓN VERTICAL[86,87,88]

Desde el inicio de la humanidad, el parto se ha realizado en distintas variantes de posición erguida aún antes del advenimiento de la escritura, tal como se muestran en los grabados o esculturas. Existen ilustraciones de mujeres que durante siglos eligieron sentarse o ponerse en cuclillas para pujar, así lo demuestran diferentes diseños de sillas arqueológicas usadas para el parto a lo largo de la edad antigua, media y el renacimiento. Entre de ellas se puede señalar cronológicamente a los siguientes:



- Con seis mil años de antigüedad, muestra a la Gran Diosa de Catal Hüyük (Anatolia, hoy Turquía) pariendo desnuda sentada en un trono, flanqueada por dos leopardos sobre los que apoya sus manos mientras su vagina comienza a dilatarse dejando ver la coronación de la cabeza fetal. El trono de gobierno de esta primigenia Diosa de la vida es la silla de parto de la mujer prehistórica del neolítico agrícola.



- En África, la cultura Luba nos muestra una atención de parto vertical muy estilizada, donde el contacto de la partera con la mujer refleja el vínculo extraordinario de esta noble misión.




- Estas prácticas persistieron en las primeras sociedades patriarcales de occidente como eran la griega y la romana. La diosa Ilitia, patrona de las parturientas y las parteras griegas, suele aparecer arrodillada representando tanto a la partera como a la parturienta en una variante de la posición en cuclillas.

86 Revista Cubana de Ginecología y Obstetricia 2012; 38 (1):134-145.
87 Ministerio de Salud. Norma Técnica para Atención de Parto Vertical con Adecuación Intercultural. Dirección General de Salud de las Personas. Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Lima – Perú 2005.
88 Secretaría de Salud. La Atención Intercultural del Trabajo de Parto en Posición Vertical en los Servicios de Salud/ Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural México 2007- 2012.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 55 11/12/2020 12:23:02 p.m.

- En Mesoamérica, los aztecas esculpieron una escultura de Tlazolteotl (la diosa luna de la fértil tierra, patrona del erotismo, del parto y del destino) pariendo desnuda en cuclillas, las manos sobre sus nalgas y la boca abierta mostrando los dientes y gritando mientras emerge un bebé hacia abajo y mirando hacia adelante de entre sus piernas. Tlazolteotl apoya sus pies sobre unos tacos de pocos centímetros elevando los talones para así estabilizar la postura[89].



- En las crónicas sobre el Buda, que se remontan al siglo V - A.C, encontramos a la reina Maya (madre de Buda), pariendo parada. Ella viajaba con su cortejo y a medio caminocomenzó el trabajo de parto. El cortejo se detuvo y la reina se adentró en el bosque junto con sus doncellas, que formaron un círculo en torno a ella. Maya tomó con sus dos manos la rama flexible de un árbol y comenzó a parir en forma vertical al pequeño príncipe. Una estatuilla procedente de la India del siglo XVI sigue mostrando esta forma de dar a luz.



- Durante el imperio Romano, se tallaron frisos que muestran la forma en que parían las mujeres, sentadas en un sillón mientras que la partera espera arrodillada y otra mujer sostiene a la parturienta por debajo de los brazos.

- Cuando Cristóbal Colón descubre América, los españoles y portugueses observaron que la atención del parto en las diversas culturas precolombinas, entre ellas la civilización azteca, maya e incaica, la realizaban en posición vertical.

- En el Perú, existen diferentes manifestaciones artísticas y culturales que muestran la manera en que los incas y las culturas preincas daban a luz en posición erguida.

- Vemos una escultura Mochica que representa un parto en el contexto de la época, como sabemos la costumbre persiste en todas las culturas del ámbito peruano.

¿POR QUÉ SE POSTERGÓ EL PARTO VERTICAL?

- Fue en el siglo XVII (1673), cuando el famoso obstetra François Mauriceau de la Corte Francesa, cambio la posición del parto acostando a las mujeres para poder

89 Colección Robert Wood Bliss.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 56 11/12/2020 12:23:03 p.m.

aplicar el instrumento de moda en esa época: el fórceps. De ello se colige que a forma de moda se implantó el parto horizontal, para facilitar la exploración y la atención de la embarazada y no porque esta posición signifique un beneficio para la madre y el/la recién nacido/a, desestimando importantes aspectos fisiológicos, sociales, culturales y tradicionales. Por lo tanto el parto vertical fue reemplazado por el parto horizontal (posición ginecológica), por priorizar la comodidad del que atiende el parto.



- En la década del 70, con el uso de la anestesia peridural, como un intento de solucionar el dolor del parto se favoreció aún más el uso de la posición horizontal, ya que prácticamente no se le podía pedir otra postura diferente a la horizontal a una mujer bajo efectos anestésicos.[90] Desde entonces esta postura empezó a ser común en el mundo moderno, institucionalizándose el parto en posición horizontal y abandonando la asistencia tradicional de la ventajosa atención del parto en posición vertical.

- La posición vertical es utilizada desde siempre por diversas culturas y numerosos grupos étnicos. Finalmente comienza a difundirse en países del occidente: EE.UU. (Howard, 1958); así como en la región de América Latina Uruguay (Caldeiro Barcia, 1974); Brasil (Paciornik.1979) etc. y más recientemente a partir de la consideración de sus ventajas. Por la OMS (WHO, 1996).

- Desde el enfoque biomédico de la atención de la salud, la formación académica en las universidades, así como la influencia de la cultura occidental y urbana, consolidan la convicción de las mujeres en cuanto a la conveniencia de la atención de parto en posición horizontal, reconociéndola como una tecnología más avanzada. Sin embargo, dicha práctica ocasiona un "desencuentro cultural" entre el profesional de la salud que atiende el parto con el protocolo biomédico y las gestantes principalmente residentes del ámbito rural, que prefieren la atención del parto tradicional (intimo, acompañada, posición vertical, alimentación, uso de hierbas medicinales, apego, disposición de la placenta).



90 François Mauriceau, incluyó en su libro el dibujo de un hombre sometido a una litotripsia. (posición de litotomía).

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 57 11/12/2020 12:23:03 p.m.


- La mayoría de las gestantes peruanas son atendidas en posición horizontal (echada en posición ginecológica), porque no conocen otra forma de atención de parto. Modificar esta situación no sólo corresponde al Ministerio de Salud, a las universidades del país, y a los demás actores involucrados, sino también a todas las mujeres en edad reproductiva, así como a su entorno familiar a nivel nacional (urbano, urbano marginal, rural), quienes tienen que empezar a valorar el saber tradicional para la atención del parto en posición vertical, que además a la fecha, cuenta con probada evidencia científica nacional.

- En el Perú, la práctica de la atención de parto vertical ha sido normada oficialmente en el año 2005, a través de la R.M. 598-2005/MINSA, que aprueba la "Norma Técnica para la Atención de Parto Vertical con Adecuación Intercultural", con alcance a todos los establecimientos de salud como una estrategia para facilitar el acceso a los servicios de atención materna.

b) EVIDENCIAS CIENTÍFICAS DEL PARTO EN POSICIÓN VERTICAL

ASPECTOS FISIOLÓGICOS

- La inclinación hacia delante de la parturienta permite que el útero se aleje de la columna vertebral y de los grandes vasos pélvicos liberando el nervio pre sacro lo que disminuye la sensación de dolor. Presenta además mayor apertura en la articulación de la cadera, la cual facilita los movimientos de rotación fetal.[91]



- La liberación de la vena cava en la fase de dilatación favorece la oxigenación fetal; asimismo, al descomprimir la aorta, se mejora la irrigación de la placenta contribuyendo al bienestar fetal con una mejor oxigenación.

- Permite mejor equilibrio del ácido base en los recién nacidos.[92]

- Efectos respiratorios: El peso acumulado del bebé (2,800 a 3,200grs), útero (1,100grs), placenta (600grs), líquido amniótico (900grs) y flujo sanguíneo útero placentario (650grs) favorecen a que el útero descienda sin ejercer presión sobre los pulmones de la gestante. Este proceso aumenta la capacidad respiratoria en la gestante y así mejora la oxigenación para el feto.[93]

- La inspiración profunda que realiza la parturienta provoca el descenso del

91 Méndez Bauer C, Arroyo J, García Ramos C, Menéndez A, Lavilla M, Izquierdo F, Villa Elizaga I, Zamaniego J: Efectos de la Posición de Pie Sobre la Contractibilidad Uterina Espontánea y otros Aspectos de Trabajo del Parto 1976.
92 Arbues,1982/Gallo, 1992/Caldeiro Barcia, 1987/ Sabatino, 1992
93 Secretaria de Salud. La Atención Intercultural del Trabajo de Parto en Posición Vertical en los Servicios de Salud/ Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, México 2007- 2012.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 58 11/12/2020 12:23:03 p.m.

diafragma, que sumado a la prensa abdominal, impulsan al feto hacia la abertura vulvar como única salida.



- La curva en forma de S de la columna vertebral, en posición horizontal, se simplifica a la forma de C en la posición vertical, permitiendo que la parte superior del tronco materno ejerza presión sobre el fondo uterino.
- Favorece a un mejor acomodo del feto para su paso a través del eje pélvico o la curva de carus.
- La posición vertical determina que el ángulo de encaje aumente desde 90 a 180° y determina que éste ángulo sea menos agudo (más abierto), lo que favorece al encaje y la progresión del feto, los miembros inferiores constituyen un punto de apoyo que facilita el mecanismo del pujo[95].
- Al asumir las posiciones en cuclillas y de rodillas, hay un aumento de los diámetros del canal de parto: 2 cm en sentido antero posterior y 1 cm en el transverso[96].
- El polo fetal presiona al cuello uterino y favorece el incremento de la producción de oxitocina, lo que ayuda a la dilatación.
- Efectos mecánicos y de la gravedad.[97] La acción positiva de la fuerza de la gravedad favorece el encaje y descenso del feto, estimándose que la gestante gana entre 30 a 40 mmHg. en valores de presión intrauterina cuando adopta la posición vertical.




- El feto, una vez iniciado su descenso estimulado por las contracciones uterinas y por su propio peso, no puede retroceder. Las curvaturas de la columna vertebral forman parte de éste mecanismo.
- En la posición vertical la presión se reparte en todo el periné, lo cual disminuye el riesgo de desgarros durante el parto, reduciendo también el número de episiotomías.

95 Caldeyro Barcia R. Bases fisiológicas y Psicológicas para el Manejo Humanizado del Parto Normal. Simposio sobre recientes adelantos en Medicina Perinatal. Tokio Japón, oct 21 y 22, 1979. Publicación científica No 858 del Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano.
96 Borrel, 1957; Russell, 1969
97 Méndez Bauer C, Arroyo J, García Ramos C, Menéndez A, Lavilla M, Izquierdo F, Villa Elizaga I, Zamarriego J: Efectos de la Posición de Pie Sobre la Contractibilidad Uterina Espontánea y otros Aspectos de Trabajo del Parto 1976.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 59 11/12/2020 12:23:03 p.m.

- El tener los talones sobre un punto de apoyo permite el trabajo de los músculos abductores que van desde el pubis hasta la cara interna de la rodilla para abrir el canal del parto (apertura de la sínfisis pubiana, ampliando el canal vaginal y la vulva); cuando la mujer está acostada se anula la acción fisiológica de estos músculos al tener las piernas colgando sobre los estribos.



- Menor duración del periodo de dilatación y el expulsivo durante el trabajo de parto.[99]

- Mayor eficiencia de las contracciones uterinas durante el periodo de dilatación y el período expulsivo, estas contracciones suceden con menor frecuencia pero con más intensidad, lo que provoca menos intervenciones obstétricas, menor uso de oxitocina y menos riesgo de alteraciones en los latidos cardíacos fetales.[100,101]

- La amniorresis espontánea se produce más tardíamente, la integralidad de la bolsa del líquido amniótico disminuye las posibilidades de riesgo para el feto, además le permite adaptarse mejor al canal del parto.

EVIDENCIAS NACIONALES

- M. Martina (1993, Hospital la Oroya), demostró en una muestra de 35 gestantes que dieron a luz en posición vertical versus 35 en posición ginecológica, que la duración del expulsivo y la incidencia de desgarros perineales fue significativamente menor en el grupo de parto vertical. Asimismo, esta posición estuvo asociada a contracciones uterinas más intensas, eficaces y menos dolorosa. No se encuentra ninguna alteración en los recién nacidos de madres cuyo parto fue en posición sentada[102].



- E. Ojeda (2006, Hospital ESSALUD Cusco), en una muestra de 65 partos en cada modalidad demuestra un mayor tiempo de expulsivo y del alumbramiento para el parto horizontal. Asimismo mayor riesgo de sangrado (>200 cc) y de cesárea

99 Díaz AG, Schwarcz R, Fescina R, Caldeyro-Barcia R: Posición vertical durante la primera etapa del curso del trabajo, y el resultado neonatal. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2005

100 Lawrence A, Lewis L, Hofmeyr G, Styles C. Posición y movilidad de la madre durante el período dilatante del trabajo de parto. Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas 2013, cuestión 10. Art. No.: CD003934. DOI: 10.1002/14651858.CD003934

101 Méndez Bauer, 1975.

102 M. Martina (La Oroya), Julio-Agosto de 1993.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 60 11/12/2020 12:23:03 p.m.

(el doble para las que dieron a luz en parto horizontal), comparada con el parto vertical[103].



- J. Calderón (2008, HERM-ESSALUD-Lima), en una muestra de 80 partos en posición vertical versus 80 partos horizontal corrobora que el tiempo de expulsivo fue menor para el parto vertical. Asimismo, demostró ventajas significativas frente al parto horizontal, ofreciéndole a la parturienta un expulsivo más cómodo, menos doloroso y más satisfactorio[104]

- V. Zorrilla (2013, Hospital Regional de Ayacucho), en una muestra de 20 parturientas demuestra que la posición vertical es más cómoda, fácil y rápida para el periodo expulsivo. Además la gestante refiere mayor libertad de movimiento que le permite una participación activa durante el parto y disfrutar del nacimiento de su niño[105].

- R. Hurtado (2014, HERM-ESSALUD Lima), a través de una evaluación económica demuestra el costo efectividad del parto vertical en la muestra del estudio clínico del Dr. J. Calderón (2008).

c) ASPECTOS PSICOAFECTIVOS

- El parto vertical proporciona beneficios psico-afectivos que incluyen la búsqueda de métodos alternativos, menos dolor o ausencia del mismo, sensación de libertad y mayor satisfacción luego del parto[106].

- El parto vertical permite a la mujer, la pareja y su familia una mayor participación en el nacimiento del nuevo ser motivando a la mujer a pujar en forma más efectiva.

- "Parto institucional, implica, no solo la vigilancia estrictamente de la parturienta, sino que también considera a igual nivel los aspectos psico-afectivos, culturales y sociales relacionados con la maternidad, teniendo en cuenta que es un proceso natural y lleno de amor y de vida. (Ricardo Schwarcz).

- Se considera muy importante el impacto psicoemocional logrado con el acompañamiento durante todo el trabajo de parto de su familiar y el que se haya

103 E. Ojeda (Hospital Nacional Essalud (Cusco) 2006.
104 Jorge Calderón, José Bravo, Roberto Albinegra, Patricia Rafael, Antonio Laura, Carlos Flores. Parto vertical, Retornando a una Costumbre Ancestral, Departamento de Obstetricia y Ginecología, Hospital Nacional Edgardo Regalito Martins /EsSalud Perú 2008.
105 Vilma Zorrilla Delgado sobre ventajas del parto vertical en parturientas y sus recién nacidos en el servicio de Gíneco Obstetricia del Hospital Regional de Ayacucho, entre los meses de enero a diciembre del 2013.
106 Sabatino José Hugo. Salinas M. e col. (BRASIL-1992

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 61 11/12/2020 12:23:04 p.m.

facilitado el apego y lactancia inmediata con el/la recién nacido/a, todo lo cual trascendió en una satisfacción emocional muy claro de parte de la madre. Es muy probable que esto influya en evitar la depresión postparto y el rechazo madre hijo, lo cual requiere mayor investigación.

d) FUNDAMENTOS CULTURALES[107]

La competencia cultural en las instituciones de salud pretende desarrollar las habilidades institucionales y personales para establecer relaciones respetuosas, horizontales y empáticas con todos los usuarios que acuden a los servicios de salud promoviendo lo siguiente:

- La escucha de las gestantes desde su manera de percibir el mundo.
- La indagación de sus expectativas.
- La comprensión de sus códigos culturales.
- La modificación de procedimientos y espacios para favorecer la satisfacción de las gestantes desde su cultura.
- La sensibilización y capacitación intercultural promoviendo el trato digno con todas las gestantes culturalmente diferentes.
- La detección y eliminación de las barreras culturales existentes.

La atención del parto en posición vertical, además de poseer ventajas fisiológicas, actualmente es un elemento de competencia cultural que puede disminuir barreras culturales y favorecer el acercamiento de la población, de todo el territorio peruano, a los servicios de salud cuyo rechazo o alejamiento de los servicios puede significar riesgos y complicaciones con subsecuente morbilidad y muerte materna y perinatal.

107 Secretaria de Salud. Proyecciones de indígenas de México y de las Entidades Federativas 2000 – 2010. Colección Prospectiva. CONAPO, México - 2005.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 62 11/12/2020 12:23:04 p.m.

ANEXO N° 3

AMBIENTE Y EQUIPAMIENTO DE SALA ATENCION DE PARTO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS, CON PERTINENCIA INTERCULTURAL[108,109,110,111]

- Todos los establecimientos de salud a nivel nacional, con funciones obstétricas y neonatales, incluido los establecimientos estratégicos, deben acondicionar los servicios de emergencia obstétrica, centro obstétrico y hospitalización, de acuerdo a la Directiva Sanitaria N° 001-MINSA/ DGSP-V.01 tomando en cuenta la opinión de las gestantes y su entorno social. La ambientación de este lugar debe presentar características propias de la zona.

- La sala de partos debe ser implementada y ambientada para ambas modalidades del parto: vertical y horizontal. Los equipos e instrumentos que implica el parto vertical deben compartirse adecuadamente mostrando un aspecto natural de la zona y de no discriminación ya que vivimos en un país pluricultural y multiétnico.





DESCRIPCION DE LA IMPLEMENTACION DE SALAS DE PARTO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO Y EL CENTRO DE SALUD CHURCAMPA – HUANCAVELICA

- Una base de cemento o madera de 20 cm. de altura cubierta con colchoneta sintética en cuya parte superior se aprecia las sillas para el parto y del acompañante.
- Silla de parto de 40cm. de altura, cuyo asiento tiene la forma de media luna tapizada con marroquín.
- Silla de 30cm de altura rodante para el proveedor.
- Silla de 37cm de altura y 33cm de respaldar para el acompañante.

---

108 Ministerio de Salud. Documento de Trabajo, Definiciones Operacionales y Criterios de Programación de los Programas Estratégicos (PpR), Lima- Perú 2013.
109 Ministerio de Salud. Norma Técnica de Salud "Categorías de Establecimientos del Sector Salud. Dirección General de Salud de las Personas, Lima – Perú 2011.
110 Ministerio de Salud. Directiva Sanitaria de Evaluación de las Funciones Obstétricas y Neonatales en los Establecimientos de Salud, Dirección General de Salud de las Personas. Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Lima – Perú 2006.
111 Ministerio de Salud. Norma Técnica para Atención de Parto Vertical con Adecuación Intercultural. Dirección General de Salud de las Personas. Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Lima – Perú 2005

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 63 11/12/2020 12:23:04 p.m.

- Soga gruesa de 5 metros empotrada al techo del ambiente.
- Pellejos de carnero.
- Mesa pequeña de 40cm de altura donde se coloca el instrumental y materiales necesarios para la atención del parto.
- Batas y botas de tela para gestante y acompañante.
- Bolsas de agua caliente.
- Reloj de pared.
- Rollete de tela u ovillo de lana de 10 x 5cm de ancho.
- Faja (chumpi), cojines de 40 x 50 cm de diámetro.
- Pañoleta para amarrar la cabeza.
- Paquete de ropa de parto vertical.
- Horno microondas.
- Termos.
- Jarras.
- Estufa de calefacción.
- Termómetro ambiental.
- Medicamentos.
- Hierbas caseras.
- Maletines que contienen las claves (roja, azul y amarilla), para la atención de las emergencias obstétricas.









PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 64 11/12/2020 12:23:04 p.m.

DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SALAS DE PARTO EN EL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACOCHA – UCAYALI Y EL CENTRO DE SALUD BELEMPAMPA - CUSCO.

- Camilla de madera o metal, con una colchoneta impermeable o acolchada y tapizada al metal, de 42cm de altura; 56cm de ancho y 155cm de largo, con respaldar de 50cm de altura.
- Silla de partos de 40cm de altura; 56cm de ancho y 50cm de largo, cuyo asiento tiene la forma de "U", tapizado con marroquín, para mejor comodidad de la parturienta.
- Una mesa pequeña de 40 cm. de altura donde se coloca el instrumental y materiales necesarios para la atención del parto.
- Una silla de 30 cm de altura rodante, para el proveedor.
- Se requiere construir una base fija de cemento o madera de 20 cm. de altura cubierta con material impermeable en cuya parte superior debe descansar la camilla y la silla de partos.
- Una soga empotrada al techo del ambiente, en caso necesario de acuerdo a las costumbres de la zona.
- Bolsas de agua caliente.
- Rollete de tela u ovillo de lana de 10 x 5cm de ancho y estufas de acuerdo a la zona.
- Faja (chumpi).
- Cojines de 40 x 50 cm de diámetro.
- Punta para amarrar la cabeza.
- Paquete de ropa de parto vertical.
- Maletines que contienen las claves (roja, azul y amarilla), para la atención de las emergencias obstétricas.
- Medicamentos y hierbas caseras.
- Horno microondas.
- Termos, Jarra.
- Reloj de pared.
- Termómetro ambiental.











PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 65 11/12/2020 12:23:05 p.m.

EXPERIENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL (INMP) EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ATENCIÓN DEL PARTO EN POSICIÓN VERTICAL [112]

Desde el año 2009, el Servicio de Ginecología Obstetricia del Instituto Nacional Materno Perinatal, incorporó la modalidad de atención del parto en posición vertical, además del parto con acompañante con el fin de responder a la demanda potencial de las mujeres que conocen esta opción y las ventajas de dar a luz bajo esta modalidad que le devuelve el protagonismo a la mujer en un proceso histórica y tradicional- mente natural, íntimo, familiar y no necesariamente medicalizado. Esta experiencia ha significado la adquisición de 10 camillas ginecológicas especiales, según modelo mostrado.



La implementación para la atención del parto en la posición de libre elección de la gestante, ya tenía a favor los ambientes adecuados para un parto donde se asegure privacidad y reducción de estrés. Asimismo, cada sala de labor de parto individual mantiene temperaturas adecuadas temperatura de 24°C a 26°C, iluminación graduable, un ambiente agradable similar a su habitación y libre de grandes ruidos.



Dar paso a la atención del parto en posición vertical ha ido más allá de las pertinencias culturales, pues aborda el tema de derecho, el enfoque de género y ha tenido que contemplar las necesidades culturales del prestador del servicio de salud.





112 Revista Actualidad Materna Perinatal N° 11 http://issuu.com/inmp/docs/revista_actualidad_2013_ok/23?e=1653193/3783147 http://inmp.gob.pe/noticiasDetalle.php?idPagina=111

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 66 11/12/2020 12:23:05 p.m.

DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SALA DE PARTO EN EL HOSPITAL REZOLA DE CAÑETE – LIMA.

- Silla de partos BIRTHEZ o BIRTHING CHAIR (Silla de Partos) de origen canadiense, mide 160 cm. de alto, 160 cm de largo, 95.25 cm de ancho, soporta un peso de 206 kg, cuyo material es un sintético duro, cómodo para el cuerpo, tiene dos controles, uno para elevar y otro para reclinarla.
- Una mesa pequeña de 50 cm. de altura donde se coloca el instrumental y materiales necesarios para la atención del parto.
- Una silla de 45 cm de altura giratoria para comodidad del proveedor.
- Bolsas de agua caliente.
- Rollete de tela u ovillo de lana de 10 x 5cm de ancho, utilizar de acuerdo a costumbres.
- Faja (chumpi), cojines de 40 x 50 cm de diámetro.
- Punta para amarrar la cabeza, utilizar de acuerdo a costumbres.
- Paquete de ropa de parto vertical.
- Maletines que contienen las claves (roja, azul y amarilla), para la atención de las emergencias obstétricas.
- Medicamentos.
- Hierbas caseras.
- Reloj de pared.
- Jarra de plástico para agua tibia.
- Termos ambientales.
- Horno microondas.
- Ventiladores de acuerdo a la zona.
- Cojines de 40 x 50 cm de diámetro.







PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 67 11/12/2020 12:23:05 p.m.

ANEXO N° 4

MITOS Y VERDADES DE LA ATENCIÓN DEL PARTO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS CON PERTINENCIA INTERCULTURAL[113,114]



En el Perú, algunas mujeres de zonas alto andinas y amazónicas aún mantienen ideas y leyendas ancestrales respecto al trata- miento de las enfermedades, situación que las obliga a tratarse primero en el hogar con medicamentos caseros entre ellos las hierbas, animales y otros, recurriendo a curanderos de la comunidad, en caso de agravarse, recién acuden a los establecimientos de salud.

La misma idea aún permanece para el proceso del parto, muchas mujeres creen que en los establecimientos de salud, las gestantes terminan agravándose, atribuyendo al hecho de administrarle sueros e inyectables, un riesgo latente para sus vidas, por considerar elementos sumamente fríos que significan la descompensación y la subsecuente muerte.

El proceso del parto en este sector de la población aún mantiene características y costumbres innatas, entre ellos se puede señalar los siguientes:



- Uso de pañoletas, en la creencia que disminuye el dolor de cabeza generada por las contracciones uterinas.
- Algunas gestantes acuden a los establecimientos de salud acompañadas de una partera de la comunidad a quien le tienen confianza sobre el avance de la dilatación mediante el pulso y presagiando un buen parto con las hojas de coca.
- Persiste la idea en ellas de que la sala de partos es muy fría y puede producir hipotermia a la madre e inhibir con ello las contracciones uterinas que para ellas son calientes.
- Consumir productos viscosos como el olluco para facilitar el descenso del feto.

113 Secretaría de Salud. La atención intercultural del Trabajo de Parto en Posición Vertical en los Servicios de Salud. Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural México 2007- 2012.

114 Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Ventajas del Parto Vertical en Parturientas y sus Recién Nacidos, Servicio de Gineco Obstetricia. Hospital Regional de Ayacucho – 2013.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 68 11/12/2020 12:23:06 p.m.

- Mantienen la idea que la sangre producida por el parto no debe llegar al suelo porque les puede dar pacha (enfermedad de la tierra), para ello utilizan pellejos de carnero que absorbe la sangre.

- Utilizan tapones de hierbas o algodón en el oído en la idea que los protege de los malos vientos.
- Soplar botella vacía en la idea que apura la salida de la placenta.

- Los familiares entierran la placenta, en la creencia que tuvo vida en similitud al/la recién nacido/a, de no hacerlo puede provocar un sobre parto (recaída).

- Se alimentan con caldos de tres tipos de animales con la idea de que les repone las fuerzas.

- La utilización del cuero negro (zonas alto andinas): para evitar el paso del frío del suelo cuando la mujer se encuentra de cuclillas o de rodillas. Esta superficie como otras, deberá ser cubierta por campos estériles si es utilizada en el momento del parto. Luego de cada parto deberá ser lavada antes de volverse a usar.


- La utilización de frotaciones o masajes en el cuerpo: para soltar el miedo o la mulla (termino quechua) es muy útil para relajar a la gestante en trance de parto, sobre todo a aquella que se siente insegura o desconfiada. Los masajes provocan relajamiento muscular y mejoran la producción de endorfinas naturales. Se puede utilizar algún tipo de crema o aceite para la frotación.

115 ODENT. M. Birth reborn. Londres. Souvenir Press. (1984).

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 69 11/12/2020 12:23:06 p.m.

ANEXO Nº 5


HISTORIA CLÍNICA MATERNO PERINATAL




PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 70 11/12/2020 12:23:06 p.m.

ATENCIONES PRENATALES	ATENCIÓN 1	ATENCIÓN 2	ATENCIÓN 3	ATENCIÓN 4	ATENCIÓN 5	ATENCIÓN 6	ATENCIÓN 7	ATENCIÓN 8	ATENCIÓN 9
Fecha y hora atención (a/m/d hh:mm)	/ / :	/ / :	/ / :	/ / :	/ / :	/ / :	/ / :	/ / :	/ / :
Edad Gest. (semanas)									
Peso madre (kg)									
Temperatura (° C)									
Presión arter.(mm. Hg)									
Pulso materno (por min.)									
Altura Uterina (cm)									
Situación (L/T/NA)									
Presentación (C/P/NA)									
Posición (D/I/NA)									
F.C.F. (por min./NA)									
Mov.fetal (+/++/+++/SM/NA)									
Proteinuria Cualitativa (+/++/+++/NSH)									
Edema (+/++/+++/SE)									
Reflejo Osteotendinoso (0, + / ++ / +++)									
Examen de Pezón (Formado/ No Form /Sin Exam)									
Indic.Fierro /Ac Fólico (mayor o igual a 16 sem)									
Indic. Calcio (mayor o igual a 20 sem)									
Indic. Ac. Fólico									
Orient.Consej.(PF/ITS/Nut/ Inm/VIH/TBC/No se hizo/NA									
EG de Eco.Control (Sem/No se hizo/NA)									
Perfil Biofísico (4, 6, 8, 10 de 10 /NSH /NA)									
Cita (a/m/d)									
Visita domicil. (SI/No/NA)									
Plan Parto (control/visita/No se hizo/ NA)									
Estab. de la atención									
Responsable atención									
Nro Formato SIS									

L = Longitudinal T =Transversa C = Cefálica P = Pélvica D = Derecha I = Izquierda SM =SinMovimiento SE = Sin Edema NA = No Aplica NSH=No se Hizo





Patologías Maternas (CIE 10) Diagnosticadas

Sin patologías ☐ Fecha:

1. _____ ___/___/___
2. _____ ___/___/___
3. _____ ___/___/___

Otras patologías (CIE 10):

1: ☐☐☐☐☐

2: ☐☐☐☐☐


Referencia - Consulta Externa Si ☐ No ☐ No Aplica ☐ Fecha ___/___/___ Establ.Trasl :_____

Referencia - Emergencia Si ☐ No ☐ No Aplica ☐ Fecha ___/___/___ Establ.Trasl :_____

Referencia - Apoyo al Diagnost. Si ☐ No ☐ No Aplica ☐ Fecha ___/___/___ Establ.Trasl :_____

PSICOPROFILAXIS ☐☐ ESTIMULACIÓN PRENATAL ☐☐ PLAN DE PARTO Si ☐ No ☐ No Aplica ☐ ALOJADA EN CASA DE ESPERA Si ☐ No ☐ No Aplica ☐

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 71 11/12/2020 12:23:07 p.m.



PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 72 11/12/2020 12:23:07 p.m.

INDICACIONES AL ALTA:

FIRMA DEL RESPONSABLE

EPICRISIS:

Los códigos que se presentan corresponden a la Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión 10 (CIE 10)

KERNICTERUS	P57
LABIO LEPORINO	Q36
MALFORMACIONES ORGANOS GENITALES	Q50
MALFORMACIONES SIST CIRCULATORIO	Q20
MALFORMACIONES SIST DIGESTIVO	Q39
MALFORMACIONES SIST RESPIRATORIO	Q30
MALFORMACIONES SIST URINARIO	Q60
MEMBRANA HIALINA	P22
MENINGITIS	G00
NEUMONIA CONGENITA	P23
ONFALITIS RN C/S HEMORRAG LEVE	P38
OTRA PATOLOGIA DEL RN	
OTRAS AFECC DE PIEL FETO/RN	P83
OTRAS AFECC DEL PERIODO PERINAT	P96
OTRAS ALTERA METAB-ELECTROL RN	P74
OTRAS APNEAS DEL RN	P284
OTRAS ENF INFECC-PARASIT CONGEN	P37
OTRAS HEMORRAGIAS NEONATALES	P54
OTRAS MALFORMACIONES	Q99
OTRAS OBSTRUCC. INTESTINALES RN	P76
OTROS TRANST ENDOCR TRANSIT	P72
OTROS TRANST HEMATOL PERINAT	P61
OTROS TRANST PERINAT DIGESTIVOS	P78
OTROS TRAUMATISMOS DEL NACIM.	P15
PERDIDA DE SANGRE FETAL	P50
PROBLEM DE INGESTION ALIMENTOS	P92
REACC E INTOXICAC X DROGAS	P93
RETARDO CRECIM Y DESNUT FETAL	P05
RETINOPATIA DEL PREMATURO	H35
SEPSIS BACTERIANA DEL RN	P36
SIFILIS CONGENITA	A50
SINDROME DE DOWN	Q90
SINDROMES DE ASPIRACION NEONATAL	P24
TAQUIPNEA TRANSITORIA	P221
TETANOS NEONATAL	A33
TRANS RELAC CON BPN	P07
TRANS X EMB PROLONG Y SOBREPESO	P08
TRANST CARDIOVASC PERINATAL	P29
TRANST TONO MUSCULAR RN	P94
TRAUMA CUERO CABELLUDO AL NACER	P12
TRAUMA ESQUELETO AL NACER	P13
TRAUMA SIST NERVIOSO PERIFERICO	P14

Los códigos corresponden a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10)

PATOLOGÍA	CÓDIGOS	PATOLOGÍAS	CÓDIGOS
ABORTO COMPLETO	O0295	HERPES GESTACIONAL	O264
ABORTO INCOMPLETO	O0290	HIPEREMESIS GRAVIDICA LEVE	O210
ABORTO NO ESPECIFICADO(INCL A.INDUC)	O06	HIPEREMESIS GRAVIDICA- TRANST.METABOL	O211
ABORTO RETENIDO	O021	HTA PREEXISTENTE EMB-PART-PUER	O10
ABORTO SEPTICO	O080	INCOMPETENCIA DEL CUELLO UTERINO.	O343
ABORTO TERAPEUTICO	O04	INFEC DEL TRACTO GENITAL	O235
AMENAZA DE ABORTO	O200	INFECC.BOLSA AMNIOT O MEMBRANAS	O411
ANEMIA EN EMB-PART-PUER	O990	INFECC.DEL TRACTO URINARIO	O23
ANOMALIA CONGENITA DEL UTERO	O340	INFECC.MAMA ASOCIAD C/PARTO	O91
ANORM.DINAM.DEL TDP	O62	INFECCIONES PUERPERALES	O86
BACTERIURIA ASINTOMATICA DEL EMB	R827	INTENTO FALLIDO DE ABORTO	O07
CANCER CUELLO UTERINO	C53	INVERSION DEL UTERO	O712
CANCER DE MAMA	C50	ISOINMUNIZACION RHESUS	O360
CARDIOPATIA	Z867	MALARIA	B50
CITOLOGIA ANORMAL EN CPN	O282	MOLA HIDATIFORME	O01
COMP ANESTES.EN PUERPERIO	O89	MUERTE INTRAUTERINA	O364
COMP ANESTES.EN TDP/PARTO	O74	MUERTE OBST X CAUSA NO ESPECIF	O95
COMPLIC. ANESTESIA EN EL EMB	O29	OLIGOHIDRAMNIOS	O410
COMPLIC. ESPECIFICAS DEL EMB.MULTIP	O31	OTRA PATOLOGIA MATERNA	
COMPLIC.VENOSAS EMBARAZO	O22	OTRAS COMP X TDP/PARTO	O75
COMPLIC.VENOSAS PUERPERIO	O87	OTRAS ENF MAT EMB-PART-PUER	O99
DEFUNCION MATERNA TARDIA	O96	OTRAS OBSTRUCC. DEL TDP	O66
DEHISCENCIA DE EPISIOTOMIA	O901	OTROS TRANS LIQ.AMNIOTICO Y MEMB	O41
DEHISCENCIA DE SUTURA DE CESAREA	O900	PARTO PREMATURO (INCL AMENAZA)	O60
DEPENDENCIA DE DROGAS	F10	PLACENTA PREVIA	O44
DESGARRO OBST. DEL CUELLO UTERINO	O713	POLIHIDRAMNIOS	O40
DESGARRO PERINEAL EN EL PARTO	O70	PREECLAMPSIA LEVE	O13
DESNUTRICION EN EL EMBARAZO	O25	PREECLAMPSIA MODERADA	O140
DESPREN PREMAT DE LA PLACENTA	O45	PREECLAMPSIA SEVERA	O141
DIABETES MELLITUS EN EL EMBARAZO	O24	PREECLAMPSIA, NO ESPECIFICADA	O149
DISTOCIA DE HOMBROS	O660	RADIOLOGIA ANORM EN CPN	O284
ECLAMPSIA	O15	RCIU	P05
EDEMA Y PROTEINURIA X GESTA S/HTA	O12	RETEN PLACENTA/MEMB, S/=HEMORRAG	O73
EMBARAZO DOBLE	O300	RUPTURA PREMATURA MEMBRANAS	O42
EMBARAZO ECTOPICO	O00	RUPTURA UTERO EN TDP	O711
EMBARAZO PROLONGADO	O48	SEPSIS PUERPERAL	O85
EMBARAZO TRIPLE	O301	SIDA	B20
EMBOLIA OBSTETRICA	O88	SIFILIS COMPLICANDO EMB-PART-PUER	O981
ENF MATER INFECC-PARAS EMB-PART-PUER	O98	TBC EMB-PART-PUER	O980
FALSO TRABAJO DE PARTO	O47	TDP OBSTRU X MAL POSIC FETAL	O64
FRACASO DE LA INDUCCION DEL TDP	O61	TDP OBSTRU X PELVIS ANORMAL	O65
GONORREA EMB-PART-PUER	O982	TDP PROLONGADO	O63
HEMATOMA OBST. PELVIS	O717	TDP/PARTO COMPLIC X CORD UMBIL	O69
HEMORR ANTEPARTO, NO CLASIF	O46	TDP/PARTO COMPLIC X SUFRIM.FET	O68
HEMORR POR ATONIA UTERINA	O721	TOLERANC. GLUCOSA ANORMAL	R730
HEMORR POST/PARTO/RETENC.PLACENTA	O720	TRANSTORNOS PLACENTARIOS	O43
HEMORR X ABORTO,ECTOPICO O MOLAR	O081	TUMOR DEL CUERPO DEL UTERO	O341
HEPATITIS VIRAL	O984	ULTRASONIDO ANORMAL EN CPN	O283

INDICACIÓN PRINCIPAL POR LO QUE SE REALIZÓ LA CESÁREA

Sin Dato
CESÁREA ANTERIOR
SUFRIMIENTO FETAL AGUDO
DESPROPORCIÓN FETO-PÉLVICA
ALTERACIÓN DE LA CONTRACTILIDAD
PARTO PROLONGADO
FRACASO DE INDUCCIÓN
DESCENSO DETENIDO DE PRESENTAC.
EMBARAZO GEMELAR
VIH

RETARDO CRECIMIENTO INTRAUTERINO
PRETÉRMINO
POSTÉRMINO
PRESENTACIÓN PODÁLICA
VARIEDADES POSTERIORES
SITUACIÓN TRANSVERSA
ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS
SOSP. O CERTEZA INFECCION OVUL
PLACENTA PREVIA

DESPREND. PLACENTA NORMO INSERTA
ROTURA UTERINA
TOXEMIA (EPH/GESTOSIS)
HERPES GENITAL
CONDILOMATOSIS GENITAL
OTRA ENFERMEDAD MATERNA
MORTINATO
AGOTAMIENTO MATERNO
OTRA

MEDICACIÓN	MEDICAMENTOS
ANESTESIA LOCAL	BUPIVACAÍNA
	LIDOCAÍNA Y SIMILARES
ANESTESIA REGIONAL	BUPIVACAÍNA
	LIDOCAÍNA Y SIMILARES
	LIDOCAÍNA-BUPIVACAINA
ANESTESIA GENERAL	ÉTER
	HALOTANO
	KETAMINA CLORHIDRATO
	ÓXIDO NITROSO
	TIOPENTAL SÓDICO
ANALGES. TRANQUIL.	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO
	CODEÍNA
	DIAZEPAM
	IBUPRUFENO
	METAMIZOL
	MORFINA
	PARACETAMOL
	PETIDINA (MEPERIDINA)
OXITOCINA	OXITOCINA

MEDICACIÓN	MEDICAMENTOS
ANTIHIPERTENSIVO	ANTAGONISTAS DEL CALCIO
	ATENOLOL
	CAPTOPRIL
	HIDRALAZINA
	METILDOPA
	NITROPRUSIATO DE SODIO
ANTIBIÓTICO	AMIKACINA
	AMOXICILINA
	AMPICILINA
	AMPICILINA-GENTAMICINA
	CEFALOSPORINAS
	CEFALOSPORINAS-AMINOGLUCOC.
	CLORANFENICOL
	ERITROMICINA
	GENTAMICINA
	METRONIDAZOL
	PENICILINA
	PENICILINA-GENTAMICINA
	PENICILINA-GENTAMICINA-CLORANFE

MEDICACIÓN	MEDICAMENTOS
SANGRE	PAQUETE GLOBULAR
	PLAQUETAS
	PLASMA
ANTICONVULSIVANTE	DIFENILHIDANTOINA
	SULFATO DE MAGNESIO
OTRA MEDICACIÓN	AMINAS SIMPATICOMIMÉTICAS
	AMINOFILINA
	ANTIESPASMÓDICOS
	ANTIPROSTAGLANDINAS
	BETA BLOQUEANTES
	BETA MIMETICOS
	BLOQUEANTES MUSCULARES
	CARDIOTÓNICOS
	CORTICOIDES
	DIURÉTICOS
	HEPARINA
	INSULINA
	PROSTAGLANDINAS

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 73 11/12/2020 12:23:08 p.m.


ANEXO Nº 6

PARTOGRAMA DE LA OMS MODIFICADO[116,117]

El uso del partograma es OBLIGATORIO para el profesional de la salud en todo trabajo de parto independientemente de la posición que la usuaria elija. El re- gistro gráfico en el partograma empieza en la fase activa cuando el cuello uterino tiene 4 cm de dilatación. Registre lo siguiente en el partograma:

a) Información sobre la paciente: nombre completo, gravidez, paridad, número de historia clínica, tiempo transcurrido desde la rotura de membranas, fecha y hora de ingreso.


b) Frecuencia cardiaca fetal (FCF): registre cada 30 minutos con un punto, que luego serán unidos para evaluar evolución teniendo en cuenta que el rango varía entre 120 a 160 latidos por minuto.



c) Líquido amniótico: Registre el color del líquido amniótico en cada examen vaginal:
I: membranas intactas.
C: membranas rotas, líquido claro.
M: líquido con manchas de meconio.
S: líquido con manchas de sangre.

d) Moldeamiento:
1: suturas lado a lado.
2: suturas superpuestas, pero reducibles.
3: suturas superpuestas y no reducibles.

e) Dilatación del cuello uterino: Evalúe en cada examen vaginal y marque con una equis cruz (X). Sobre la línea de alerta a partir de los 4 cm de dilatación comience el registro en el partograma.



116 Lavender T, Hart A, Smyth R. Efecto del uso del partograma en los resultados para pacientes con trabajo de parto espontáneo a término. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013 Issue 7. Art.


117 IMPAC, Manejo de las Complicaciones del Embarazo y el Parto; Guía para Obstetrices Y Médicos, Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas, Organización Mundial de la Salud, Ginebra - 2002.


PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 74 11/12/2020 12:23:08 p.m.

f) Línea de alerta: Se inicia la línea a partir de los 4 cm de dilatación del cuello uterino hasta el punto de dilatación total esperado, a razón de 1 cm por hora.

g) Línea de acción: Es paralela a la línea de alerta y 4 horas a la derecha de la misma.

h) Evaluación del descenso fetal mediante palpación abdominal: Se refiere a la parte de la cabeza (dividida en 5 partes) palpable por encima de la sínfisis del pubis; se registra como un círculo (0) en cada examen vaginal. De acuerdo al descenso de la cabeza empezarán a disminuir las partes sobre el pubis.






i) Horas: Tiempo transcurrido desde que se inició la fase activa del trabajo de parto (observado o extrapolado).

j) Tiempo: Registre el tiempo real.

k) Contracciones: Registre gráficamente cada media hora, palpe el número de contracciones a los 10 minutos y la duración de las mismas en segundos.



l) Oxitocina: Cuando se utiliza, registre la cantidad de oxitocina por volumen de líquidos IV en gotas por minuto cada 30 minutos.


m) Medicamentos administrados: Registre cualquier medicamento adicional que se administre.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 75 11/12/2020 12:23:09 p.m.

n) Pulso: Registre cada 30 minutos y marque con un punto.

o) Presión arterial: Registre cada 4 horas y marque con flechas.
p) Temperatura: Registre cada 2 horas.


q) Proteína, acetona y volumen: Registre cada vez que se produce orina para así determinar volumen de orina y obtener una muestra al ingreso para detectar proteinuria y cetonuria.[118,119]



118 Ministerio de Salud. Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva/ Ministerio de Salud. Dirección General de Salud de las Personas. Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Lima – Perú 2004.

119 Ministerio de Salud. Guía Práctica Clínica para la Atención de Emergencias Obstétricas Según Nivel de Capacidad Resolutiva. Dirección General de Salud de las Personas. Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Lima – Perú 2007.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 76 11/12/2020 12:23:09 p.m.



PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 77 11/12/2020 12:23:09 p.m.

ANEXO Nº 7

DIAGNÓSTICO DEL TRABAJO DE PARTO.

EL DIAGNÓSTICO DEL TRABAJO DE PARTO INCLUYE[120,121]

a) El diagnóstico y la confirmación del trabajo de parto.
b) El diagnóstico del período y la fase del trabajo de parto.
c) La evaluación del encajamiento y descenso del feto.
d) La identificación de la presentación y la posición del feto.

a) EL DIAGNÓSTICO Y LA CONFIRMACIÓN DEL TRABAJO DE PARTO.

SOSPECHE TRABAJO DE PARTO SI LA GESTANTE PRESENTA:
- Dolor abdominal intermitente después de las 22 semanas de gestación.
- Dolor a menudo asociado con secreción mucosa con manchas de sangre (eliminación de tapón mucoso).
- Secreción vaginal acuosa o un chorro súbito de agua.

CONFIRME EL INICIO DE TRABAJO DE PARTO SI HAY:
- Borramiento del cuello uterino.
- Dilatación del cuello uterino.

b) EL DIAGNÓSTICO DEL PERÍODO Y LA FASE DEL TRABAJO DE PARTO.


SIGNOS Y SÍNTOMAS	PERIODO	FASE
• Cuello uterino no dilatado.	Trabajo de parto falso/ No hay trabajo de parto.	
• Cuello uterino dilatado menos de 4 cm.	Primer	Latente
• Cuello uterino dilatado de 4–10 cm. • Tasa de dilatación característica de 1 cm por hora o más. • Comienza el descenso fetal.	Primer	Activa
• Cuello uterino totalmente dilatado (10 cm). • Continúa el descenso fetal. • No hay deseos de pujar.	Segundo	Temprana (no expulsiva)
• Cuello uterino totalmente dilatado (10 cm). • La parte fetal que se presenta llega al piso de la pelvis. • La mujer tiene deseos de pujar.	Segundo	Avanzada (expulsiva)
• El tercer período del trabajo de parto comienza con el parto del bebé y termina con la expulsión completa de la placenta.		

120 IMPAC, Manejo de las Complicaciones del Embarazo y el Parto; Guía para Obstetrices y Médicos, Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas, Organización Mundial de la Salud, Ginebra - 2002.
121 Ministerio de Salud. Conceptos actuales en la atención del embarazo – parto y puerperio, Hospital Santa Rosa, Lima – Perú 2005

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 78 11/12/2020 12:23:09 p.m.

c) LA EVALUACIÓN DEL ENCAJAMIENTO Y DESCENSO DEL FETO.

Mediante palpación abdominal, evalúe el descenso en términos de quintos de cabeza fetal palpable por encima de la sínfisis del pubis:



A. La cabeza está flotante por encima de la sínfisis del pubis = 5/5

B. La cabeza se palpa acomodada en el ancho de cinco dedos por encima de la sínfisis del pubis

C. La cabeza está 2/5 por encima de la sínfisis del pubis

D. La cabeza se palpa acomodada en el ancho de dos dedos por encima de la sínfisis del pubis

- Una cabeza que está enteramente por encima de la sínfisis del pubis es cinco quintos (5/5) palpable.
- Una cabeza que está enteramente por debajo de la sínfisis del pubis es cero quintos (0/5) palpable.

d) LA IDENTIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN Y LA POSICIÓN DEL FETO.

DETERMINE LA PARTE QUE SE PRESENTA.

- El vértice de la cabeza fetal es la parte que se presenta más comúnmente. Si el vértice no es la parte que se presenta, maneje como si se tratara de una anomalía de presentación.

- Si el vértice es la parte que se presenta, use los puntos de referencia del cráneo fetal para determinar la posición de la cabeza del feto en relación con la pelvis de la gestante.

DETERMINE LA POSICIÓN DE LA CABEZA FETAL.

- La cabeza fetal se encaja normalmente en la pelvis materna en una

UN DIAGNÓSTICO INCORRECTO DEL TRABAJO DE PARTO PUEDE CONDUCIR A ESTADOS DE ANSIEDAD E INTERVENCIONES INNECESARIAS

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 79 11/12/2020 12:23:09 p.m.

ANEXO Nº 8

COMPRESION BIMANUAL EXTERNA.[122,123]

Esta técnica consiste en colocar una mano en la cara anterior del útero a nivel supra púbico y la otra mano en el fondo uterino a cara posterior y entre las dos manos tomar el cuerpo uterino y realizar la compresión en forma continua, (ma- niobra que permite la expulsión de coágulos o sangrado retenido, permite una mejor contracción y hemostasia del cuerpo uterino).



122 Ministerio de Salud. Guía de Atención de Emergencias Obstétricas, tercera edición, Ayacucho – Perú 2004.
123 Guías para el Continuo de Atención de la Mujer y el Recién Nacido Focalizadas en EPS, CLAP/SMR Publicación Científica N° 1573-2010

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 80 11/12/2020 12:23:10 p.m.

HIERBAS UTILIZADAS EN EL PARTO Y POST PARTO

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	PROPIEDADES	MODO DE PREPARACIÓN	MOMENTO DE USO
Albahaca	Ocinum basilicun	Apura el parto	Infusión y tomarla caliente	Dilatación
Ajenjo	Artemisia bsinthium	Apurar el parto	Infusión y tomarla caliente	Dilatación
Cola de caballo	Equisetum elmatera	Amaciza los huesos	Infusión y tomarla caliente	Dilatación y parto
Chiche (huacatay)	Lageter minuta	Apurar el parto	Infusión y tomarla caliente	Dilatación
Capulí (guinda)	Prunus	Apurar el parto	Comerlo como uva	Dilatación parto y puerperio
Matico	Launetortia polystachys	Antiséptico, Cicatrizante	Higiene genital	Dilatación parto y puerperio
Manzanilla	Matricaria chamonilla	Antiséptico, cicatrizante	Higiene de genitales	Puerperio
Malva	Malvas silvestres	Antiséptico, cicatrizante	Higiene de genital	Puerperio
Orégano		Apurar el parto	Infusión y tomarla caliente	Dilatación
Perejil	Petrocilinum	Aumentar la temperatura corporal	Hervido y combinado con algarrobina	Dilatación
Quinua del monte		Sirve para amacizar los huesos	Hervir y tomar como agua de tiempo	Puerperio
Ruda	Ruta graveumens	Apurar el parto		Dilatación
Tuna		Aumenta la temperatura (apresura el parto)	Hervir una ramita y tomar bien caliente	Dilatación y parto
Toronjil y colcas, melis	Melissa officionalis	Aumenta la temperatura (apresura el parto, abre los huesos)	Poner la ramita de toronjil en Infusión.	Dilatación y parto
Congona	Rosa verde	Antiinflamatorio, analgésico	Calentar las hojas	Calma el dolor de oído Ocasionado por el parto

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 81 11/12/2020 12:23:10 p.m.

X. BIBLIOGRAFÍA

1) Hurtado La Rosa, R. Con los Pies en la Tierra, un estudio sobre las ventajas del parto en posición vertical, primera edición Lima – Perú 2014.

2) Lavender T, Hart A, Smyth R. Efecto del Uso del Partograma en los Resultados para Pacientes con Trabajo de Parto Espontáneo a Término. Cochrane of Systematic Reviews 2013.

3) Lawrence A, Lewis L, Hofmeyr G, Styles C. Posición y movilidad de la madre durante el período dilatante del trabajo de parto. Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas 2013 cuestión 10. Art. No.: CD003934. DOI: 10.1002/14651858. CD003934.

4) Ministerio de Salud. Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Materna, Dirección General de Salud de las Personas. Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva, Lima – Perú 2013.

5) Ministerio de Salud. Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Neonatal. Dirección General de Salud de las Personas, Lima – Perú 2013.

6) Ministerio de Salud. Documento de Trabajo, Definiciones Operacionales y Criterios de Programación de los Programas Estratégicos (PpR), Lima- Perú 2013.

7) Efecto del Momento de Pinzamiento del Cordón Umbilical en Recién Nacidos a Término Sobre los Resultados en la Madre y el Neonato (Revisión Cochrane traducida). Cochrane base de datos Revisiones Sistemáticas 2013 publicado 7. Art. No.: CD004074. DOI: 10.1002/14651858.CD004074.

8) Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Ventajas del Parto Vertical en Parturientas y sus Recién Nacidos, Servicio de Gineco Obstetricia. Hospital Regional de Ayacucho – 2013.

9) Directiva Sanitaria N° 001-MINSA/DGSP-V.02 "Directiva Sanitaria para la Evaluación de las Funciones Obstétricas y Neonatales en los Establecimientos de Salud", aprobada por Resolución Ministerial N° 853- 2012/MINSA

10) HELPING Babies Breathe. Guía para la implementación de Ayudando a los Bebes a Respirar, http://www.helpingbabiesbreathe.org/ 2012.

11) Secretaria de Salud. La Atención Intercultural del Trabajo de Parto en Posición Vertical en los Servicios de Salud. Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, México 2007- 2012.

12) Revista Cubana de Ginecología y Obstetricia 2012; 38 (1):134-145.

13) Academia Americana de Pediatría- Quinta Edición – 2011.

14) Centro Latinoamericana de Perinatología - Organización Panamericana de la Salud - Organización Mundial de la Salud: Guías para el Continuo de Atención de la Mujer y el Recién Nacido Focalizadas en APS. Publicación Científica N° 1577, Montevideo-Uruguay - 2011

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 82 11/12/2020 12:23:10 p.m.

15) Hurtado La Rosa, Raquel Elizabeth: Evaluación Económica de la Posición en la Atención del Parto, en el Hospital de EsSalud Edgardo Rebagliati Martins Perú/2007-2011.

16) Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Manual de Adecuación Cultural del Parto Natural/Vertical y sus Distintas Posiciones en el Marco Multicultural, Guatemala - 2011.

17) Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Normas con Pertinencia Cultural hacia la Interculturalidad Guatemala - 2011.

18) Ministerio de Salud. Norma Técnica de Salud "Categorías de Establecimientos del Sector Salud. Dirección General de Salud de las Personas, Lima – Perú 2011.

19) Ministerio de Salud. Guía Técnica para la Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal. Dirección General de Salud de las Personas. Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva, Lima – Perú 2011.

20) Modelo de Atención Integral en Salud Basado en Familia y Comunidad, Lima – Perú 2011.

21) Salud Sin Límites. Atención en Salud con Pertinencia Intercultural/Primera Edición: hecho el depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2011.

22) Ministerio de Salud. Modelo de Intervención para Mejorar la Disponibilidad, Calidad y Uso de los Establecimientos que Brindan Funciones Obstétricas y Neonatales, Dirección General de Salud de las Personas, Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Lima – Perú 2010.

23) Ministerio de Salud. Modulo para Capacitadores en Atención del Parto en Posición Vertical con Enfoque Intercultural. Dirección General de Salud de las Personas. Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual Reproductiva, Lima – Perú 2010.

24) Ministerio de Salud. Guías Clínicas y Procedimientos para la Atención Obstétrica. Instituto Nacional Materno Perinatal, Lima – Perú 2010.

25) Ministerio de Salud. Atención Materna y Neonatal con Equidad de Género e Interculturalidad en el Marco de los Derechos Humanos en Salud. Dirección General de Salud de las Personas. Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva, Lima – Perú 2010.

26) Fondo de Población de las Naciones Unidas. Atención en Salud con Pertinencia Intercultural, Lima – Perú 2010.

27) Ministerio de Salud Pública. Guía Técnica para la Atención del Parto Culturalmente Adecuado Sistema Nacional de Salud, Ecuador – 2008.

28) Ministerio de la Protección Social, Lineamientos para la Implementación de la Política de Seguridad del Paciente, Dirección General de Calidad de Servicios, Colombia 2008.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 83 11/12/2020 12:23:10 p.m.

29) Ministerio de Salud. Documento Técnico Adecuación Cultural de la Orientación/ consejería en Salud Sexual y Reproductiva, Dirección General de Salud de las Personas. Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Lima – Perú 2008.

30) Ministerio de Salud. Norma técnica de transporte asistido de pacientes por vía aérea – Ambulancia Aéreas, aprobada con RM Nº 336-2008 /MINSA.

31) Ministerio de Salud. Norma técnica de transporte asistido de pacientes por la vía acuática, aprobada con RM Nº 337-2008 /MINSA.

32) Jorge Calderón, José Bravo, Roberto Albinagorta, Patricia Rafael, Antonio Laura, Carlos Flores. Parto vertical, retornando a una costumbre ancestral, Departamento de Obstetricia y Ginecología, Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins /EsSalud Perú 2008.

33) Secretaria de Salud. La Atención Intercultural de las Mujeres: el trabajo de parto en posición vertical en los servicios de salud, Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, México 2008.

34) Una Visión de Salud Intercultural para los Pueblos Indígenas de las Américas, D.C: OPS, © 2008.

35) Ministerio de Salud. Guías de Práctica Clínica y Guías de Procedimiento, Departamento de Neonatología INMP, Lima- Perú 2007.

36) Ministerio de Salud. Guía de Práctica Clínica, para la Atención de Emergencias Obstétricas Según Nivel de Capacidad Resolutiva. Dirección General de las Personas – Estrategia Sanitaria Nacional de la Salud Sexual y Reproductiva, Lima- Perú 2007.

37) Ministerio de Salud. Estándares e Indicadores de Calidad en la Atención Materna y Perinatal en los Establecimientos que Cumplen con Funciones Obstétricas y Neonatales, Dirección de Calidad en Salud, Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Lima – Perú 2007.

38) Ministerio de Salud. Modelo de Atención con Adecuación Intercultural en Salud Materna Perinatal Consorcio Madre Niño, Churcampa - Huancavelica - Perú 2007

39) Ministerio de Salud. Marco de Derechos y Deberes del Usuario para el Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de Salud, Lima- Perú 2006.

40) Ministerio de Salud. Documento Técnico, Casas de Espera Materna, Modelo para la Implementación, Dirección General de Promoción de la Salud, Lima - Perú – 2006.

41) Ministerio de Salud. Norma técnica de transporte asistido de pacientes por vía terrestre, aprobado con RM Nº 953-2006 /MINSA

42) Lavender T y Mlay R. Posición en el Período Expulsivo del Trabajo de Parto de las Mujeres sin Anestesia Peridural: Comentario de la BSR (última revisión: 15

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 84 11/12/2020 12:23:10 p.m.

de diciembre de 2006). La Biblioteca de Salud Reproductiva de la OMS; Ginebra: Organización Mundial de la Salud

43) Ministerio de Salud. Norma Técnica para Atención de Parto Vertical con Adecuación Intercultural. Dirección General de Salud de las Personas. Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Lima – Perú 2005.

44) Carroli G, Belizan J. Episiotomía en el parto vaginal (Revisión Cochrane traducida). En la Biblioteca Cochrane plus, 2005 número 4. Oxoford: Update Softwar Ltd.

45) Díaz Ag, Schwarcz R, Fescina R, Caldeyro-Barcia R: Posición vertical durante la primera etapa del curso del trabajo, y el resultado neonatal. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2005.

46) Secretaria de Salud. Proyecciones de Indígenas de México y de las Entidades Federativas 2000 – 2010. Colección Prospectiva. CONAPO, México - 2005.

47) Ministerio de Salud. Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva, Dirección General de Salud de las Personas. Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Lima – Perú 2004.

48) Ministerio de Salud. Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud. Dirección General de Salud de las Personas. Dirección Ejecutiva de Servicios de Salud, Lima- Perú 2004.

49) Ministerio de Salud. Guía de Atención de Emergencias Obstétricas, tercera edición, Ayacucho – Perú 2004.

50) MIMDES- FNUAP, Módulo de Capacitación para Sectores "Diseño de políticas de igualdad de oportunidades con equidad de género" del Proyecto Impacto en las Políticas Públicas Sectoriales sobre el avance de las mujeres, dentro del marco del Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y varones, Lima 2004.

51) Naciones Unidas. Los Derechos Humanos y la Reducción de la Pobreza: Un Marco Conceptual. Ginebra - 2004.

52) Secretaria de Salud. El enfoque intercultural: Herramienta para apoyar la calidad de los servicios de salud/Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural México - 2003.

53) Ministerio de Salud. Guía de Salud Sexual y Reproductiva para el Promotor. Dirección General de Salud de las Personas – Ministerio de Salud, Lima – Perú 2001.

54) SABATINO José Hugo. SALINAS M. e col. Parto fisiológico: La posición vertical es la fisiológica para el parto. Universidad de Campiña Sao Pablo Brasil; 1992.

55) Caldeyro Barcia R. Bases fisiológicas y Psicológicas para el Manejo Humanizado del Parto Normal. Simposio sobre Recientes Adelantos en Medicina Perinatal. Tokio Japón, oct 21 y 22, 1979. Publicación científica No 858 del Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano.

PS 9097 Parto Vertical en el marco de los derechos humano.indd 85 11/12/2020 12:23:10 p.m.