

第一章 事件与概率

第一节 随机现象与随机试验

一. 随机现象

在一定条件下,必然发生或必然不发生的现象,称为确定性现象。

例1: 在平面上给一个三角形,则三个内角之和为180度。

例2: 在一个大气压下, 水没有加热到100度不会沸腾。

高等数学是研究确定性现象, 主要研究函数

$$y = f(x)$$

注: 本课程主要工具是微积分, 如极限, 连续, 导数, 偏导数, 级数, 定积分, 二重积分等

在一定条件下,可能出现这个结果,也可能出现那样结果,而且不能事先确定出现哪一个结果的现象,称为随机现象。

例1:抛一枚硬币。

例2:从一工厂的某种产品中抽出 n 件产品,观察次品个数。

随机现象又分为个别随机现象和大量性随机现象。

个别随机现象:原则上不能在不变的条件下重复出现。例如历史事件。

大量性随机现象:可以在完全相同的条件下重复出现。例如抛硬币。

概率论只研究大量性随机现象在完全相同的条件下重复出现时所表现出来的规律性。

以后随机现象都是指大量性随机现象。

问题:随机现象难道还有规律性吗?

例如,抛一枚硬币。

随机现象所表现出来的规律性称为
统计规律性。

概率论和数理统计的研究对象：

概率论和数理统计是研究(大量性)随机现象统计规律性的数学学科。

概率论和数理统计的研究方法：

概率论研究方法是提出数学模型,然后研究它们的性质,特点和规律性。

数理统计是以概率论的理论为基础,利用对随机现象的观察所取得的数据资料来提出数学模型,并加以应用。例如控制和预测等。

二. 随机试验

观察一定条件下发生的随机现象称为随机试验,还必须满足下述条件:

- 1.试验可以在相同的条件下重复进行;
- 2.试验之前能确定所有可能发生的结果,并且规定每次试验有且仅有一个结果出现;
3. 试验之前不能确定将会出现哪一个结果。

例1:抛一枚硬币。

例2:从一工厂的某种产品中抽出 n 件产品。

条件实现一次就是一次试验。

第二节 样本空间和随机事件

杨勇制作

一. 样本空间

随机试验的所有可能的结果放在一起组成的集合称为样本空间。记为 Ω 。

样本空间的每一个元素称为样本点。
记为 ω 。

在概率论中讨论一个随机试验时,首先要求明确它的样本空间。

样本空间可以根据随机试验的内容来决定。但写法不一定惟一。

鉴于写出样本空间的重要性,举一些例子。

例1:抛一枚硬币观察正反面出现的情况。

$$\Omega = \{\text{正面}, \text{反面}\}$$

正面 $\leftrightarrow Heads$ 反面 $\leftrightarrow Tails$


$$\Omega = \{H, T\}$$

例2:抛二枚硬币观察它们正反面出现的情况。

$$\Omega = \{(\text{二个}H), (\text{一个}H, \text{一个}T), (\text{二个}T)\}$$

$$\Omega = \{(H, H), (H, T), (T, H), (T, T)\}$$

注：大家要熟悉这样的方法来表示样本点
抛掷3个硬币,把3个硬币编号,



$$\Omega = \left\{ (H, H, H), (H, H, T), (H, T, H), (T, H, H), \right. \\ \left. (H, T, T), (T, H, T), (T, T, H), (T, T, T) \right\}$$

1个硬币抛掷3次,样本空间一样。

抛掷3个骰子也是这样表示。

例3: 从一工厂的某种产品中抽出 n 件产品, 观察次品个数。

$$\Omega = \{0, 1, \dots, n\}。$$

例4: 从包含两件次品 (记作 a_1, a_2) 和三件正品 (记作 b_1, b_2, b_3) 的五件产品中, 任取两件产品。

$$\Omega = \left\{ (a_1, a_2), (a_1, b_1), (a_1, b_2), (a_1, b_3), (a_2, b_1), \right. \\ \left. (a_2, b_2), (a_2, b_3), (b_1, b_2), (b_2, b_3), (b_1, b_3) \right\}$$

$$C_5^2 = 10$$

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{l} (a_1, a_2), (a_2, a_1), (a_1, b_1), (b_1, a_1), (a_1, b_2), \\ (b_2, a_1), (a_1, b_3), (b_3, a_1), (a_2, b_1), (b_1, a_2), \\ (a_2, b_2), (b_2, a_2), (a_2, b_3), (b_3, a_2), (b_1, b_2), \\ (b_2, b_1), (b_2, b_3), (b_3, b_2), (b_1, b_3), (b_3, b_1) \end{array} \right\}$$

$$A_5^2 = P_5^2 = 20$$

例5: 向某一目标发射一发炮弹, 观察落点与目标的距离。

$$\Omega = \{d \mid d \geq 0\} = [0, +\infty)$$

例6: 向某一目标发射一发炮弹, 观察落点的分布情况。

$$\Omega = \{(x, y) \mid -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty\} = \mathbb{R}^2$$

二. 随机事件

例7: 从包含两件次品 (记作 a_1, a_2) 和三件正品 (记作 b_1, b_2, b_3) 的五件产品中, 任取两件产品, 观察次品个数。

$$\Omega = \left\{ (a_1, a_2), (a_1, b_1), (a_1, b_2), (a_1, b_3), (a_2, b_1), \right. \\ \left. (a_2, b_2), (a_2, b_3), (b_1, b_2), (b_2, b_3), (b_1, b_3) \right\}$$

$$A_0 = \text{“没有抽到次品”}$$

$$= \{(b_1, b_2), (b_2, b_3), (b_1, b_3)\},$$

$A_1 = \text{“抽到一个次品”}$

$$= \left\{ (a_1, b_1), (a_1, b_2), (a_1, b_3), \right. \\ \left. (a_2, b_1), (a_2, b_2), (a_2, b_3) \right\},$$

$A_2 = \text{“抽到两个次品”}$

$$= \{(a_1, a_2)\},$$

注意：它们都是样本空间 Ω 的子集。

样本空间的子集称为随机事件,简称事件。

常用 A, B, C, A_i, B_j 表示随机事件。

这个定义要注意的是样本空间确定后,随机事件所包含的样本点只能在这个样本空间中找。

规定:随机事件 A 发生当且仅当随机事件 A 中有某一个样本点出现。

记作: A 发生 $\Leftrightarrow \omega \in A$

这样集合论就和概率论联系起来了。

例5: 向某一目标发射一发炮弹, 观察落点与目标的距离。

$$\Omega = \{d \mid d \geq 0\} = [0, +\infty)$$

随机事件 $A =$ “距离目标不超过100 米”,

$$A = \{d \mid 0 \leq d \leq 100\} = [0, 100] \subset \Omega$$

例6: 向某一目标发射一发炮弹, 观察落点的分布情况。

$$\Omega = \{(x, y) \mid -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty\} = R^2$$

随机事件 A = “距离目标不超过100 米”,

$$A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 100^2\} \subset R^2$$

考虑两个特殊的随机事件：

由于 $\Omega \subset \Omega$ ，所以样本空间 Ω 也是随机事件。

但每做一次随机试验，样本空间 Ω 必然发生，
又称样本空间 Ω 为必然事件。

由于 $\emptyset \subset \Omega$ ，所以空集 \emptyset 也是随机事件。

但每做一次随机试验，空集 \emptyset 一定不发生，
又称空集 \emptyset 为不可能事件。

三. 随机事件的关系和运算

为了简单事件表示复杂事件,需要研究随机事件的关系和运算。

下面的讨论都是在同一个样本空间 Ω 上,即 $A, B, A_i, i = 1, 2, \dots$ 都是 Ω 的子集。


1. 包含

若随机事件 A 发生必然导致随机事件 B 发生,则称随机事件 B 包含随机事件 A ,或者称随机事件 A 包含在随机事件 B 中。

记为 $B \supset A$,或者 $A \subset B$ 。

用集合论语言,

$$\forall \omega \in \Omega, \omega \in A \Rightarrow \omega \in B$$



$$A \subset B$$

维恩(Venn)图

若 $B \supset A$, 且 $A \supset B$, 则称随机事件 A 与随机事件 B 相等, 记为 $A = B$ 。


2. 交（积）

“随机事件 A 与随机事件 B 同时发生” 是一个随机事件, 则称此随机事件为随机事件 A 与随机事件 B 的交（积）, 记为

$$A \cap B, \text{或者} AB$$

用集合论语言,


$$\forall \omega \in \Omega, \omega \in A, \omega \in B \Rightarrow \omega \in A \cap B$$



“ n 个随机事件 A_1, A_2, \dots, A_n 同时发生”
是一个随机事件,则称此随机事件为 n
个随机事件 A_1, A_2, \dots, A_n 的交 (积),记为
 $A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$ 或 $A_1 A_2 \dots A_n$,简记为 $\bigcap_{i=1}^n A_i$ 。

若随机事件 A 与随机事件 B 不能同时发生,则称随机事件 A 与随机事件 B 互不相容或互斥。

用集合论语言, $A \cap B = \emptyset$ 。




$$A \cap B = \emptyset$$

若 n 个随机事件 A_1, A_2, \dots, A_n 中任意两个随机事件都不能同时发生,则称 n 个随机事件 A_1, A_2, \dots, A_n 两两互不相容或两两互斥。

用集合论语言,

$$A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, n。$$




3. 并

“随机事件 A 与随机事件 B 至少有一个发生”是一个随机事件,则称此随机事件为随机事件 A 与随机事件 B 的并,记为 $A \cup B$ 。

用集合论语言,

$$\forall \omega \in \Omega, \omega \in A \text{ 或 } \omega \in B \Rightarrow \omega \in A \cup B$$



“ n 个随机事件 A_1, A_2, \dots, A_n 至少有一个发生”是一个随机事件,则称此随机事件为
 n 个随机事件 A_1, A_2, \dots, A_n 的并,记为

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n, \text{简记为 } \bigcup_{i=1}^n A_i,$$

若 n 个随机事件 A_1, A_2, \dots, A_n 两两互不相容,称并 $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ 为 n 个随机事件
 A_1, A_2, \dots, A_n 的和,记为

$$A_1 + A_2 + \dots + A_n, \text{简记 } \sum_{i=1}^n A_i。$$


4. 对立事件（逆事件）

每次试验随机事件 A 与随机事件 B 有且仅有一个发生,则称随机事件 B 为随机事件 A 的对立事件(逆事件),记为 $B = \bar{A}$ 。

随机事件 A 也为随机事件 B 的对立事件(逆事件),记为 $A = \bar{B}$ 。

用集合论语言,

$$A + B = \Omega$$



$$\overline{\overline{A}} = A, \quad A + \overline{A} = \Omega,$$


$$\overline{\Omega} = \emptyset, \quad \overline{\emptyset} = \Omega.$$

5. 差

“随机事件 A 发生,且随机事件 B 不发生”
是一个随机事件,则称此随机事件为随机
事件 A 与随机事件 B 的差,记为 $A - B$,或者
 $A \setminus B$ 。

用集合论语言,

$$\forall \omega \in \Omega, \omega \in A, \text{ 且 } \omega \notin B \Rightarrow \omega \in A - B$$



$$\bar{A} = \Omega - A$$

$$(A - B) + B = A \cup B$$

$$\text{差化积: } A - B = A - AB = A\bar{B}$$

三. 运算规律

1. 吸收律: $A \cup \Omega = \Omega, A \cap \Omega = A$

$$A \cup \emptyset = A, A \cap \emptyset = \emptyset$$

2. 幂等律:

$$A \cup A = A, A \cap A = A$$

3. 交换律: $A \cup B = B \cup A$

$$A \cap B = B \cap A$$

4. 结合律:

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

5. 分配律:

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

6. 德莫根 (De Morgan) 律:

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

$$\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i, \quad \overline{\bigcap_{i=1}^n A_i} = \bigcup_{i=1}^n \bar{A}_i$$

$$\overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i} = \bigcap_{i=1}^{\infty} \bar{A}_i, \quad \overline{\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i} = \bigcup_{i=1}^{\infty} \bar{A}_i$$

运算顺序：逆交并差, 括号优先

注：“和”与“并”一样处理。

例1: 在图书馆中随意抽取一本书, 随机事件 A 表示数学书, B 表示中文书, C 表示平装书,

则 $ABC\bar{C}$

表示抽取的是精装中文版数学书,

$\bar{C} \subset B$ 表示精装书都是中文书,

$\bar{A} = B$ 表示非数学书都是中文版的书,
且中文版的书都是非数学书。

例2: 若 A_i 表示第 i 个射手击中目标($i = 1, 2, 3$),
则

3个射手都击中目标: $A_1 A_2 A_3$

3个射手都未击中目标: $\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3$, $\overline{A_1 \cup A_2 \cup A_3}$

3个射手中至少有一个击中目标: $A_1 \cup A_2 \cup A_3$

3个射手中至少有一个未击中目标:

$$\bar{A}_1 \cup \bar{A}_2 \cup \bar{A}_3, \quad \overline{A_1 A_2 A_3}$$

3个射手中至少有二个击中目标:

$$A_1 A_2 \bar{A}_3 + A_1 \bar{A}_2 A_3 + \bar{A}_1 A_2 A_3 + A_1 A_2 A_3, \quad A_1 A_2 \cup A_2 A_3 \cup A_1 A_3$$

3个射手中恰好有二个击中目标:

$$A_1A_2\bar{A}_3 + A_1\bar{A}_2A_3 + \bar{A}_1A_2A_3$$

还可以写最多1个,最多2个,恰好1个,⋯,
只要你想得出来都可以写。

第三节 频率与概率

如果随机事件 A 在 n 次试验中发生了 m 次, 称比值 m/n 为随机事件 A 的频率, 记为

$$F_n(A) = \frac{m}{n}。$$

随机事件 A 发生可能性大小的数值称为随机事件 A 发生的概率(probability), 记为 $P(A)$ 。

频率具有稳定性。

概率是客观存在的！

例如：测量木棒长度

真实的长度 \leftrightarrow 概率

测量的长度 \leftrightarrow 频率

木棒的真实长度永远不会知道,但是不能因为不知道真实的长度,就说木棒的长度不存在。

我们只知道测量的长度。

第四节 古典概型与几何概率

一. 古典概型

一个随机试验的样本空间为 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$, 满足以下性质:

- (1) 样本点总数有限, 即 n 有限;
- (2) 每个样本点出现的概率相等, 即

$$P(\{\omega_1\}) = P(\{\omega_2\}) = \dots = P(\{\omega_n\}) = \frac{1}{n},$$

称满足以上2个性质的模型为古典概型。

随机事件 $A \subset \Omega$, $A = \{\omega_{i_1}, \omega_{i_2}, \dots, \omega_{i_m}\}$,

其中 i_1, i_2, \dots, i_m 为 $1, 2, \dots, n$ 中的 m 个数,

定义
$$P(A) = \frac{A \text{ 所包含样本点个数}}{\Omega \text{ 所包含样本点总数}} = \frac{m}{n},$$

称此概率为随机事件 A 的古典概率。

$$0 \leq m \leq n, 0 \leq P(A) \leq 1,$$

$$P(\Omega) = 1, P(\emptyset) = 0。$$

注: $A = \{\omega_{i_1}, \omega_{i_2}, \dots, \omega_{i_m}\}$

$$= \{\omega_{i_1}\} + \{\omega_{i_2}\} + \dots + \{\omega_{i_m}\},$$

$$P(A) = P(\{\omega_{i_1}\}) + P(\{\omega_{i_2}\}) + \dots + P(\{\omega_{i_m}\})$$

$$= \underbrace{\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{n}}_m = \frac{m}{n} \circ$$

例1: 将一枚均匀对称的硬币抛3次, 观察正反面,

(1) 写出样本空间;

(2) 设事件 A_1 为“恰有一次出现正面”,
求 $P(A_1)$;

(3) 设事件 A_2 为“至少有二次出现正面”,
求 $P(A_2)$ 。

$$\Omega = \left\{ (H, H, H), (H, H, T), (H, T, H), (T, H, H), \right. \\ \left. (H, T, T), (T, H, T), (T, T, H), (T, T, T) \right\}$$

例2: 任取一个正整数, 求它是奇数的概率。

设 $A = \text{“它是奇数”}$,

说明有限性

例3: 掷两颗骰子, 求它们点数之和为3
的概率。

设 $A = \text{“它们点数之和为3”}$,

说明等可能性

例4: P10例1-12(不放回的抽签问题)

袋中有 a 个白球和 b 个黑球,每次从袋中任取一球,取出的球不再放回去,求第 k 次取到白球的概率。

$A =$ “第 k 次取到白球”,

说明用不同的样本空间解决问题

解法一： 白球之间可以区分,黑球之间也可以区分,可以理解为都编号了。

把球随机地一个一个取出排成一排,这样一个排列就是一个样本点。

$$\underbrace{\text{O} \quad * \quad * \quad \text{O} \quad * \quad \dots \quad \text{O} \quad \dots \quad \text{O} \quad *}_{a+b}^k$$

$$P(A) = \frac{a(a+b-1)!}{(a+b)!} = \frac{a}{a+b}。$$

注： $\Omega = \{\omega | \omega \text{ 为一个排列}\}$

解法二：白球之间不可以区分,黑球之间也不可以区分,白球和黑球当然可以区分,把球随机地一个一个取出排成一排,这样一个组合就是一个样本点,

$$\underbrace{\text{O} \quad * \quad * \quad \text{O} \quad * \quad \dots \quad \overset{k}{\text{O}} \quad \dots \quad \text{O} \quad *}_{a+b}$$

$$P(A) = \frac{C_{a+b-1}^{a-1}}{C_{a+b}^a} = \frac{a}{a+b}。$$

注： $\Omega = \{\omega | \omega \text{ 为一个组合}\}$

解法三:仅考虑第 k 个位置的情况,

白球分别用 $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_a$ 表示,

黑球分别用 $\omega_{a+1}, \omega_{a+2}, \dots, \omega_{a+b}$ 表示,

$$\Omega = \{ \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_a, \omega_{a+1}, \dots, \omega_{a+b} \},$$

$$A = \{ \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_a \},$$

$$P(A) = \frac{a}{a+b} .$$

例5: P9例1-10

某批产品共 N 件,其中有 M 件次品,从中每次任意取1件检查,共取 n 次,求恰好有 k 件次品的概率。如果(1)每次检查后的产品不放回;(2)每次检查后的产品放回。

$A = \text{“恰好有} k \text{件次品”}$,

注:这是二个重要模型

解：(1)

$$P(A) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n},$$

(2)

$$P(A) = \frac{C_n^k M^k (N-M)^{n-k}}{N^n} = C_n^k \left(\frac{M}{N} \right)^k \left(1 - \frac{M}{N} \right)^{n-k} \circ$$

注:对不放回的情况说明

(一)上面的解法是没有次序的,也可以考虑次序的解法

$$P(A) = \frac{C_n^k A_M^k A_{N-M}^{n-k}}{A_N^n} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$$

$O \quad O \quad * \quad O \quad * \quad \dots \quad O \quad *$

挑 k 个位置放次品

用比较好理解的方法做

(二) 对不放回情况的推广

某批产品共 N 件,其中 M_1 件车间1生产, M_2 件车间2生产,其余车间3生产,从这批产品中不放回地取出 n 件,求恰好车间1生产 k_1 件和车间2生产 k_2 件的概率。


$A =$ “恰好车间1生产 k_1 件和车间2生产 k_2 件”,

$$P(A) = \frac{C_{M_1}^{k_1} C_{M_2}^{k_2} C_{N-M_1-M_2}^{n-k_1-k_2}}{C_N^n}$$

例6: 任取一个正整数, 求该数的平方末位数为1的概率。

设 $A =$ “该数的平方末位数为1”,

二. 几何概率



$$P(A) = 0 \stackrel{?}{\Rightarrow} A = \emptyset$$

设有一个有界区域 Ω ,区域中的每个点出现的可能性相等, $D \subset \Omega$,事件 A 表示点落在 D 中,则定义

$$P(A) = \frac{D \text{ 的长度 (面积, 体积)}}{\Omega \text{ 的长度 (面积, 体积)}}$$

为事件 A 的几何概率。

例1:P12例1-13（会面问题）


两人约定于0到 T 时内在某地会面,先到者等 $t(t \leq T)$ 时后离开,假定两人在0到 T 时内各时刻到达的可能性相等,求两人能会面的概率。

解： $A = \text{“两人能会面”},$

以 x, y 分别表示两人到达的时刻,

$$\Omega = \{(x, y) | 0 \leq x \leq T, 0 \leq y \leq T\},$$


$$A = \{(x, y) | |x - y| \leq t\},$$



$$P(A) = \frac{T^2 - (T - t)^2}{T^2}。$$

例2: P13例1–15 (蒲丰投针问题)

平面上画有等距离为 $a(a > 0)$ 的一组平行线,向该平面上任意投一长为 $l(l < a)$ 的针,试求针与一平行线相交的概率。




解： $A = \text{“针与一平行线相交”},$

x 表示针的中点与最近的一条平行线的距离,

φ 表示针与此线的夹角,

$$\Omega : 0 \leq x \leq \frac{a}{2}, 0 \leq \varphi \leq \pi,$$

$$A : x \leq \frac{l}{2} \sin \varphi,$$



$$P(A) = \frac{\int_0^\pi \frac{l}{2} \sin \varphi d\varphi}{\frac{a\pi}{2}} = \frac{-\frac{l}{2} \cos \varphi \Big|_0^\pi}{\frac{a\pi}{2}} = \frac{2l}{\pi a}。$$

n 次抛掷针, 针与平行线相交 m 次,

由频率具有稳定性,

当 n 较大时, $\frac{2l}{\pi a} \approx \frac{m}{n}$ 。

P16习题15


在一张画有方格的纸上投一枚直径为1的硬币,方格要多小才能使硬币与方格的边不相交的概率小于1%?

解: $A =$ “硬币与方格的边不相交”,

l 表示方格的边长(显然应该大于1),

x 表示硬币圆心与方格上下近的边的距离,

y 表示硬币圆心与方格左右近的边的距离,



$$\Omega : 0 \leq x \leq \frac{l}{2}, 0 \leq y \leq \frac{l}{2},$$


$$A : x > \frac{1}{2}, y > \frac{1}{2},$$

$$P(A) = \frac{\left(\frac{l}{2} - \frac{1}{2}\right)^2}{\left(\frac{l}{2}\right)^2} < \frac{1}{100},$$

$$1 - \frac{1}{l} < \frac{1}{10},$$

$$l < \frac{10}{9}.$$


另解：



$$P(A) = \frac{(l-1)^2}{l^2} < \frac{1}{100}, \quad l < \frac{10}{9}.$$

习题集P10填空题10

在长为 l 的线段 AB 上任意地投两点 L 和 M ,求 LM 的长度小于 AL 的概率。



$C = \text{“}LM \text{ 的长度小于} AL \text{”},$

$$\Omega: 0 \leq x \leq l, 0 \leq y \leq l,$$

$$C: |x - y| < x.$$

概率论试卷


2018-2019学年第1学期

2019年1月3日

2.在边长为1的正方形区域内任取一点,则
该点到每个顶点的距离均大于 $\frac{1}{2}$ 的概率
为_____。

解:

$$p = \frac{1 - 4 \times \frac{\pi \left(\frac{1}{2}\right)^2}{4}}{1} = 1 - \frac{\pi}{4}。$$



第五节 概率的公理化定义和性质

一. 概率的公理化定义

古典概率的基本性质：

1. (非负性) 对任何事件 A , $P(A) \geq 0$;
2. (规范性) $P(\Omega) = 1$;
3. (有限可加性) 若事件 A_1, A_2, \dots, A_n 两两互不相容, 则

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n),$$

$$\text{或者 } P\left(\sum_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{k=1}^n P(A_k)。$$

证明: 只要证明 (3) 即可,

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\},$$

先证 $m = 2$,

$$A_1 = \{\omega_{i_1}, \dots, \omega_{i_p}\}, P(A_1) = \frac{p}{n},$$

$$A_2 = \{\omega_{j_1}, \dots, \omega_{j_q}\}, P(A_2) = \frac{q}{n},$$

A_1 和 A_2 互不相容,

$$A_1 + A_2 = \{\omega_{i_1}, \dots, \omega_{i_p}, \omega_{j_1}, \dots, \omega_{j_q}\}, P(A_1 + A_2) = \frac{p + q}{n},$$

$$P(A_1 + A_2) = P(A_1) + P(A_2)。$$

归纳假设:若事件 A_1, A_2, \dots, A_{m-1}

两两互不相容,则

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_{m-1}) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_{m-1}),$$

再证:若事件 A_1, A_2, \dots, A_m 两两互不相容,则

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_m) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_m)。$$

$$\begin{aligned}P(A_1 + A_2 + \cdots + A_{m-1} + A_m) &= P((A_1 + A_2 + \cdots + A_{m-1}) + A_m) \\&= P(A_1 + A_2 + \cdots + A_{m-1}) + P(A_m) \\&= P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_{m-1}) + P(A_m),\end{aligned}$$

其中 $(A_1 + \cdots + A_{m-1})A_m = A_1A_m + \cdots + A_{m-1}A_m = \emptyset$,

由归纳法知,结论成立。

几何概率的基本性质：

1. (非负性) 对任何事件 A , $P(A) \geq 0$;
2. (规范性) $P(\Omega) = 1$;
3. (可列可加性) 若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 两两互不相容, 则

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n + \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) + \dots,$$

$$\text{或者 } P\left(\sum_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k) \text{。}$$

一般概率的定义,即概率公理化定义:

随机事件A发生可能性大小的数值称为随机事件A发生的概率(probability),记为 $P(A)$,还必须满足以下3条公理:

1. (非负性) 对任何事件A, $P(A) \geq 0$;
2. (规范性) $P(\Omega) = 1$;
3. (可列可加性) 若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 两两互不相容, 则

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n + \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) + \dots,$$

$$\text{或者 } P\left(\sum_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k) \text{。}$$

柯尔莫哥洛夫 Kolmogorov, A.N.



柯尔莫哥洛夫, A. H.

最为人所道的是对概率
论公理化所作出的贡献

1903年4月25日生于俄国坦波夫

1987年10月20日卒于苏联莫斯科

1939年,他被选为苏联科学院数理部院士。

1980年鉴于他“在调和分析、概率论、遍历论和动力系统深刻而开创性的发现”而获得沃尔夫(Wolf)奖。

他一生共写学术论文(包括合作)488篇。

他是20世纪苏联最有影响的数学家,也是20世纪世界上为数极少的几个最有影响的数学家之一。

他研究的领域非常广泛,几乎遍及一切数学领域。

二. 一般概率的性质

性质1: $P(\emptyset) = 0$ 。

证明: $\Omega, \emptyset, \emptyset, \dots, \emptyset, \dots$ 两两互不相容,

由可列可加性,

$$P(\Omega + \emptyset + \emptyset + \dots) = P(\Omega) + P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots,$$

$$P(\Omega) = P(\Omega) + P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots,$$

再由规范性,

$$P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots = 0,$$

最后由非负性,

$$P(\emptyset) = 0。$$

性质2: (有限可加性) 设 A_1, A_2, \dots, A_n

两两互不相容, 则

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)。$$

证明: $A_1, A_2, \dots, A_n, \emptyset, \emptyset, \dots$ 两两互不相容,

由可列可加性,

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n + \emptyset + \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) + P(\emptyset) + \dots,$$

由性质1,

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)。$$

性质3: $P(A) + P(\bar{A}) = 1$ 。

证明: $A + \bar{A} = \Omega$,

由有限可加性,

$$P(A + \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A}) = P(\Omega),$$

再由规范性,

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1。$$

例1: 有4张壹分,3张贰分,2张肆分和1张捌分的邮票,任取其中3张,求

- (1) 取出的3张邮票的总值为壹角的概率;
- (2) 取出的3张邮票中至少有2张邮票的面值相同的概率。

解: (1)

A = “取出的3张邮票的总值为壹角”,

A_1 = “3张邮票中,二张壹分,一张捌分”,

A_2 = “3张邮票中,二张肆分,一张贰分”,

$$A = A_1 + A_2,$$

$$P(A) = P(A_1 + A_2) = P(A_1) + P(A_2)$$

$$= \frac{C_4^2 C_1^1 C_3^0 C_2^0}{C_{10}^3} + \frac{C_2^2 C_3^1 C_4^0 C_1^0}{C_{10}^3}$$

$$= \frac{3}{40};$$

(2)

B = “取出的3张邮票中至少有2张邮票的面值相同”，

考虑 B 的对立事件,

\bar{B} = “取出的3张邮票的面值都不相同”,

$$\bar{B} = B_1 + B_2 + B_3 + B_4,$$

$$P(\bar{B}) = P(B_1) + P(B_2) + P(B_3) + P(B_4)$$


$$= \frac{C_4^1 C_3^1 C_2^1}{C_{10}^3} + \frac{C_4^1 C_2^1 C_1^1}{C_{10}^3} + \frac{C_4^1 C_3^1 C_1^1}{C_{10}^3} + \frac{C_3^1 C_2^1 C_1^1}{C_{10}^3}$$

$$= \frac{5}{12}, \quad P(B) = 1 - P(\bar{B}) = \frac{7}{12}.$$

性质4: 设 $A \subseteq B$, 则

$$P(B - A) = P(B) - P(A)。$$

证明:



$$A \subset B$$

$$B = A + (B - A),$$

由有限可加性,

$$P(B) = P(A) + P(B - A),$$

即 $P(B - A) = P(B) - P(A)。$

推论：设 $A \subseteq B$, 则 $P(A) \leq P(B)。$

反之不成立。

因为, $\emptyset \subseteq A \subseteq \Omega$,

所以, $0 \leq P(A) \leq 1。$

推广： $P(B - A) = P(B) - P(AB)。$

证明：


$$P(B - A) = P(B - AB) = P(B) - P(AB)。$$

性质5: (加法定理, 其实应该叫并的定理)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)。$$

推论: $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)。$

证明:



$$A \cup B = A + (B - A),$$

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B - A) \\ &= P(A) + P(B) - P(AB) . \end{aligned}$$

例2: 袋中装有红,黄,白色球各一个,每次抽取一球,有放回地抽三次,求抽出球中无红色或无黄色的概率。

解: $A =$ “抽出球中无红色”,

$B =$ “抽出球中无黄色”,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$= \frac{2^3}{3^3} + \frac{2^3}{3^3} - \frac{1^3}{3^3} = \frac{5}{9}。$$

习题集P13, 计算题第4题

从0~9这十个数字中任意选出三个不同的数字, 试求下列事件的概率。

(1) 三个数字中不含0与5;

(2) 三个数字中不含0 或者不含5;

(3) 三个数字中含0但不含5。

解: $A = \text{“不含0”}, B = \text{“不含5”},$

$$(1) \quad P(AB) = \frac{C_8^3}{C_{10}^3},$$

$$(2) \quad P(A) = P(B) = \frac{C_9^3}{C_{10}^3},$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB),$$

$$(3) \quad P(\bar{A}B) = P(B) - P(AB),$$

或者

$$\frac{C_8^2}{C_{10}^3}.$$

习题集14页计算题14

从1~9这九个正整数中,有放回地取3次,每次任取一个,求所得到的三个数之积能被10整除的概率。

解: $A = \text{“三个数中有5”}$, $B = \text{“三个数中有偶数”}$,

$$P(AB) = 1 - P(\overline{AB}) = 1 - P(\overline{A} \cup \overline{B})$$

$$= 1 - \left(P(\overline{A}) + P(\overline{B}) - P(\overline{A}\overline{B}) \right)$$

$$= 1 - \left(\frac{8^3}{9^3} + \frac{5^3}{9^3} - \frac{4^3}{9^3} \right) \approx 0.214。$$

推广：

从1~9这九个正整数中,有放回地取 n 次,每次任取一个,求所得到的 n 个数之积能被10整除的概率。


并且讨论 $n \rightarrow \infty$ 的情况。

解： $A = “n个数中有5”$, $B = “n个数中有偶数”$,

$$\begin{aligned} P(AB) &= 1 - P(\overline{AB}) = 1 - P(\overline{A} \cup \overline{B}) \\ &= 1 - \left(P(\overline{A}) + P(\overline{B}) - P(\overline{A}\overline{B}) \right) \\ &= 1 - \left(\frac{8^n}{9^n} + \frac{5^n}{9^n} - \frac{4^n}{9^n} \right), \end{aligned}$$

$$n \rightarrow \infty, P(AB) \rightarrow 1。$$

例3: 平面上画有等距离为 a ($a > 0$) 的一组平行线, 向该平面上任意投一直径为 l ($l < a$) 的半圆, 试求半圆与一平行线相交的概率。



解：设想有另一个半圆和题目中所考虑的半圆恰好构成一个圆。

$$E = \{\text{半圆与一直线相交}\},$$

$$F = \{\text{另一个半圆与一直线相交}\},$$


$$E \cap F = \{\text{长为} l \text{ 的针与一直线相交}\},$$

$$E \cup F = \{\text{直径为} l \text{ 的圆与一直线相交}\},$$

$$P(E \cap F) = \frac{2l}{\pi a}, P(E \cup F) = \frac{l/2}{a/2},$$

根据对称性知,

$$P(E) = P(F),$$



$$0 \leq x \leq \frac{a}{2}, \text{相交为 } 0 \leq x \leq \frac{l}{2}$$

由加法定理知,

$$P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F),$$



$$P(E) = \frac{l\pi + 2l}{2\pi a}.$$

推广：

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) \\ - P(BC) - P(AC) + P(ABC)。$$

证明：

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P((A \cup B) \cup C) \\ &= P(A \cup B) + P(C) - P((A \cup B)C) \\ &= P(A \cup B) + P(C) - P(AC \cup BC) \\ &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) \\ &\quad - P(BC) - P(AC) + P(ABC)。 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
& S_A + S_B + S_C - S_{AB} - S_{BC} - S_{AC} + S_{ABC} \\
&= (S_1 + S_2 + S_6 + S_7) + (S_2 + S_3 + S_4 + S_7) \\
&+ (S_4 + S_5 + S_6 + S_7) - (S_2 + S_7) - (S_4 + S_7) \\
&- (S_6 + S_7) + S_7 \\
&= S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5 + S_6 + S_7 \\
&= S_{A \cup B \cup C}
\end{aligned}$$

注：多退少补

Jordan公式

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) \\ &+ \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) - \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n) \end{aligned}$$

归纳法证明

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) = P\left(\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \cup A_{n+1}\right)$$

$$= P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) + P(A_{n+1}) - P\left(\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \cap A_{n+1}\right)$$

$$= P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) + P(A_{n+1}) - P\left(\bigcup_{i=1}^n (A_i A_{n+1})\right)$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) \\
&\quad - \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n) + P(A_{n+1}) \\
&\quad - \left\{ \sum_{i=1}^n P(A_i A_{n+1}) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j A_{n+1}) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k A_{n+1}) \right. \\
&\quad \left. - \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n A_{n+1}) \right\} \\
&= \sum_{i=1}^{n+1} P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n+1} P(A_i A_j) \\
&\quad + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n+1} P(A_i A_j A_k) - \cdots + (-1)^n P(A_1 A_2 \cdots A_n A_{n+1})
\end{aligned}$$

P15例1-16匹配问题

某人写了 n 封信,又写了 n 个信封,将 n 封信任意地装入 n 个信封,求至少有一封信与信封匹配的概率。

解: $A_i =$ “第 i 封信与信封匹配”, $i = 1, 2, \dots, n$,

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) \\ &+ \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) - \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n) \end{aligned}$$

$$P(A_i) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n},$$

$$P(A_i A_j) = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)},$$

...

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = \frac{1}{n!},$$

由加法定理 (*Jordan*公式)

$$\begin{aligned}
 P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= C_n^1 \cdot \frac{1}{n} - C_n^2 \cdot \frac{1}{n(n-1)} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!} \\
 &= 1 - \frac{1}{2!} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!},
 \end{aligned}$$

其中 $\sum_{1 \leq i < j \leq n} 1 = \underbrace{(1+1+\cdots+1)}_{n-1} + \underbrace{(1+1+\cdots+1)}_{n-2} + \underbrace{(1+1)}_2 + 1$

$$= (n-1) + (n-2) + \cdots + 2 + 1 = \frac{n(n-1)}{2} = C_n^2 \circ$$

19.(收集问题) 某品牌的啤酒举行有奖销售活动,每瓶啤酒在瓶盖内放置一张奖券, n 张不同的奖券为一套,收集齐一套方可获奖,求购买 k 瓶啤酒能收集齐奖券的概率。

解:

$A_i =$ “ k 瓶啤酒中有编号为 i 奖券”, $i = 1, 2, \dots, n$,

$$P(A_1 \cdots A_n) = 1 - P(\bar{A}_1 \cup \cdots \cup \bar{A}_n)$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n \bar{A}_i\right) = \sum_{i=1}^n P(\bar{A}_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(\bar{A}_i \bar{A}_j)$$

$$+ \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(\bar{A}_i \bar{A}_j \bar{A}_k) - \cdots + (-1)^{n-1} P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_n),$$

$$P(\bar{A}_i) = \frac{(n-1)^k}{n^k}, P(\bar{A}_i \bar{A}_j) = \frac{(n-2)^k}{n^k}, \dots \circ$$

