

## 10.5 对坐标的曲面积分

### 10.5.1 对坐标的曲面积分的概念和性质

#### 曲面的侧

设连通曲面  $\Sigma$  上到处都有连续变动的切平面 (或法线),  $M$  为曲面  $\Sigma$  上的一点, 曲面在  $M$  处的法线有两个方向: 当取定其中一个指向为正方向时, 则另一个指向就是负方向.

设  $M_0$  为  $\Sigma$  上任一点,  $L$  为  $\Sigma$  上任一经过点  $M_0$ , 且不出  $\Sigma$  边界的闭曲线. 又设  $M$  为动点, 它在  $M_0$  处与  $M_0$  有相同的法线方向, 且有如下特性: 当  $M$  从  $M_0$  出发沿  $L$  连续移动, 这时作为曲面上的点  $M$ , 它的法线方向也连续地变动. 最后当  $M$  沿  $L$  回到  $M_0$  时,

- 若这时  $M$  的法线方向仍与  $M_0$  的法线方向相一致, 则说曲面  $\Sigma$  是双侧曲面;
- 若与  $M_0$  的法线方向相反, 则说曲面  $\Sigma$  是单侧曲面.

单侧曲面的例子: 莫比乌斯 (Möbius) 带

通常我们遇到的曲面都有两个侧. 对封闭曲面而言, 有外侧和内侧; 又如旋转抛物面  $z = x^2 + y^2$  或者用  $z = f(x, y)$  表示的曲面, 有上侧和下侧.

所谓取定曲面的侧, 就是指定曲面上各点处的法向量的指向. 比如

- 对于曲面  $z = f(x, y)$ , 如果取定的法向量是朝上的, 则就取定曲面的上侧;
- 对于封闭曲面, 如果取定的法向量是由内指向外的, 则就取定曲面的外侧.

这种指定了法向量指向的曲面就称为有向曲面.

#### 流体流向曲面一侧的流量

设  $\Sigma$  是一有向曲面, 某不可压缩的流体 (假设密度为 1) 以流速

$$\mathbf{v}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$$

通过  $\Sigma$ , 求在单位时间内流过  $\Sigma$  指定侧的流体质量, 即流量  $\Phi$ .

由于流体流经  $\Sigma$  上各点处的速度是不同的, 且  $\Sigma$  为一曲面, 因此采用定积分的思想方法来解决该问题.

$$\begin{aligned}\Phi &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \mathbf{v}(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \mathbf{n} \Delta S_i \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{yz} + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{zx} + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{xy}],\end{aligned}$$

其中  $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Delta S_i$ , 曲面在该点处的单位法向量

$$\mathbf{n} = (\cos \alpha_i)\mathbf{i} + (\cos \beta_i)\mathbf{j} + (\cos \gamma_i)\mathbf{k},$$

$(\Delta S_i)_{yz} = (\cos \alpha_i) \Delta S_i$ ,  $(\Delta S_i)_{zx} = (\cos \beta_i) \Delta S_i$ ,  $(\Delta S_i)_{xy} = (\cos \gamma_i) \Delta S_i$  分别称为有向小曲面  $\Delta S_i$  在  $yOz$  面,  $zOx$  面和  $xOy$  面上的投影.

**定义 5.1** (对坐标的曲面积分的定义). 设  $\Sigma$  为光滑 (或逐片光滑) 的有向曲面, 函数  $R(x, y, z)$  在  $\Sigma$  上有界. 把  $\Sigma$  任意分成  $n$  块小曲面  $\Delta S_i$  ( $\Delta S_i$  同时又表示第  $i$  块小曲面的面积),  $\Delta S_i$  在  $xOy$  面上的投影为  $(\Delta S_i)_{xy}$ ,  $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$  是  $\Delta S_i$  上任意取定的一点. 如果当各小块曲面的直径的最大值  $\lambda \rightarrow 0$  时, 极限

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{xy}$$

存在, 则称此极限为函数  $R(x, y, z)$  在有向曲面  $\Sigma$  上对坐标  $x, y$  的曲面积分, 并记作  $\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy$ , 即

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{xy},$$

其中  $R(x, y, z)$  称为被积函数,  $\Sigma$  称为 (有向) 积分曲面,  $R(x, y, z) dx dy$  称为被积表达式,  $dx dy$  称为有向曲面  $\Sigma$  在  $xOy$  面上的投影微元.

类似地可以定义函数  $P(x, y, z)$  在有向曲面  $\Sigma$  上对坐标  $y, z$  的曲面积分  $\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz$  及函数  $Q(x, y, z)$  在有向曲面  $\Sigma$  上对坐标  $z, x$  的曲面积分  $\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx$ , 分别为

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{yz},$$

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{zx}.$$

以上三个曲面积分也称为第二类曲面积分.

当  $P(x, y, z)$ ,  $Q(x, y, z)$ ,  $R(x, y, z)$  在有向光滑曲面  $\Sigma$  上连续时, 对坐标的曲面积分是存在的.

在应用上出现较多的是以上三种积分合并起来的形式

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz + \iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx + \iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy,$$

为简便起见上式又写成

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz + Q(x, y, z) dz dx + R(x, y, z) dx dy.$$

如果  $\Sigma$  是封闭曲面, 通常记为

$$\oint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz + Q(x, y, z) dz dx + R(x, y, z) dx dy.$$

上述流向  $\Sigma$  指定侧的流量  $\Phi$  可表示为

$$\Phi = \iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz + Q(x, y, z) dz dx + R(x, y, z) dx dy.$$

## 对坐标的曲面积分的性质

(1) 如果把  $\Sigma$  分成  $\Sigma_1$  和  $\Sigma_2$ , 则

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz + Q(x, y, z) dz dx + R(x, y, z) dx dy \\ &= \iint_{\Sigma_1} P dy dz + Q dz dx + R dx dy + \iint_{\Sigma_2} P dy dz + Q dz dx + R dx dy. \end{aligned}$$

(2) 设  $\Sigma$  是有向曲面,  $-\Sigma$  表示与  $\Sigma$  取相反侧的有向曲面, 则

$$\begin{aligned} & \iint_{-\Sigma} P(x, y, z) dy dz + Q(x, y, z) dz dx + R(x, y, z) dx dy \\ &= - \iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz + Q(x, y, z) dz dx + R(x, y, z) dx dy. \end{aligned}$$

关于对坐标的曲面积分, 必须要注意积分曲面所取的侧.

### 10.5.2 对坐标的曲面积分的计算

设有向光滑曲面  $\Sigma$  是由方程  $z = z(x, y)$  给出的曲面的上侧,  $\Sigma$  在  $xOy$  面上的投影区域为  $D_{xy}$ , 函数  $R(x, y, z)$  在  $\Sigma$  上连续, 则有

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy;$$

若  $\Sigma$  是由方程  $z = z(x, y)$  给出的曲面的下侧, 则有

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = - \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy.$$

类似地, 若  $\Sigma$  由方程  $x = x(y, z)$  给出, 则有

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz = \pm \iint_{D_{yz}} P(x(y, z), y, z) dy dz,$$


等式右端的符号这样确定: 若积分曲面  $\Sigma$  是由方程  $x = x(y, z)$  所给出的曲面的前侧, 则符号取正; 反之, 若  $\Sigma$  取后侧, 则符号取负.

若  $\Sigma$  由方程  $y = y(z, x)$  给出, 则有

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx = \pm \iint_{D_{zx}} Q(x, y(z, x), z) dz dx,$$

等式右端的符号这样确定: 若积分曲面  $\Sigma$  是由方程  $y = y(z, x)$  所给出的曲面的右侧, 则符号取正; 反之, 若  $\Sigma$  取左侧, 则符号取负.

**例 5.1.** 计算  $\iint_{\Sigma} z dx dy$ , 其中  $\Sigma$  为半球面  $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$  的上侧.



解: 曲面  $\Sigma$  在  $xOy$  面上的投影为

$$D_{xy} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq a^2\}.$$

因此

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} z \, dx \, dy &= \iint_{D_{xy}} \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \, dx \, dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r \sqrt{a^2 - r^2} \, dr \\ &= 2\pi \int_0^a r \sqrt{a^2 - r^2} \, dr = \frac{2}{3} \pi a^3. \end{aligned}$$

例 5.2. 计算

$$\iint_{\Sigma} xyz \, dx \, dy,$$

其中  $\Sigma$  是球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  在  $x \geq 0, y \geq 0$  部分并取球面外侧.

解: 将曲面  $\Sigma$  分为上侧  $\Sigma_1: z_1 = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$  和下侧  $\Sigma_2: z_2 = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}$ . 它们在  $xOy$  面上的投影区域都是单位圆在第一象限部分. 于是

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} xyz \, dx \, dy &= \iint_{\Sigma_1} xyz \, dx \, dy + \iint_{\Sigma_2} xyz \, dx \, dy \\ &= \iint_{D_{xy}} xy \sqrt{1 - x^2 - y^2} \, dx \, dy - \iint_{D_{xy}} -xy \sqrt{1 - x^2 - y^2} \, dx \, dy \\ &= 2 \iint_{D_{xy}} xy \sqrt{1 - x^2 - y^2} \, dx \, dy \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^3 \cos \theta \sin \theta \sqrt{1 - r^2} \, dr = \frac{2}{15}. \end{aligned}$$

例 5.3. 计算  $\iint_{\Sigma} x^2 \, dy \, dz + y^2 \, dz \, dx + z^2 \, dx \, dy$ , 其中  $\Sigma$  为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  在第一象限部分, 取上侧.

解: 由对称性得

$$\iint_{\Sigma} x^2 \, dy \, dz + y^2 \, dz \, dx + z^2 \, dx \, dy = 3 \iint_{\Sigma} z^2 \, dx \, dy.$$

由于曲面  $\Sigma$  在  $xOy$  面上的投影为

$$D_{xy} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\},$$

因此

$$\begin{aligned} 3 \iint_{\Sigma} z^2 dx dy &= 3 \iint_{D_{xy}} (1 - x^2 - y^2) dx dy = 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r(1 - r^2) dr \\ &= \frac{3}{2} \pi \int_0^1 r(1 - r^2) dr = \frac{3}{8} \pi. \end{aligned}$$

例 5.4. 计算  $\oint_{\Sigma} (x+y) dy dz + (y-z) dz dx + (z+3x) dx dy$ , 其中  $\Sigma$  为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$  的外侧.

解:

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} (x+y) dy dz &= \iint_{\Sigma_{\text{前}}} (x+y) dy dz + \iint_{\Sigma_{\text{后}}} (x+y) dy dz \\ &= \iint_{D_{yz}} (\sqrt{R^2 - y^2 - z^2} + y) dy dz - \iint_{D_{yz}} (-\sqrt{R^2 - y^2 - z^2} + y) dy dz \\ &= 2 \iint_{y^2 + z^2 \leq R^2} \sqrt{R^2 - y^2 - z^2} dy dz \\ &= 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^R r \sqrt{R^2 - r^2} dr = \frac{4}{3} \pi R^3. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} (y-z) dz dx &= \iint_{\Sigma_{\text{右}}} (y-z) dz dx + \iint_{\Sigma_{\text{左}}} (y-z) dz dx \\ &= \iint_{D_{zx}} (\sqrt{R^2 - z^2 - x^2} - z) dz dx - \iint_{D_{zx}} (-\sqrt{R^2 - z^2 - x^2} - z) dz dx \\ &= 2 \iint_{z^2 + x^2 \leq R^2} \sqrt{R^2 - z^2 - x^2} dy dz = \frac{4}{3} \pi R^3. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} (z+3x) dx dy &= \iint_{\Sigma_{\text{上}}} (z+3x) dx dy + \iint_{\Sigma_{\text{下}}} (z+3x) dx dy \\ &= 2 \iint_{x^2 + y^2 \leq R^2} \sqrt{R^2 - z^2 - x^2} dx dy = \frac{4}{3} \pi R^3. \end{aligned}$$

综上所述可得

$$\oint_{\Sigma} (x+y) dy dz + (y-z) dz dx + (z+3x) dx dy = 4\pi R^3.$$

### 10.5.3 思考与练习

练习 270. 计算  $\oint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$ , 其中  $\Sigma$  是长方体  $\Omega$  的整个表面的外侧,  $\Omega = \{(x, y, z) | 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b, 0 \leq z \leq c\}$ .

解: 把有向曲面  $\Sigma$  分成以下六部分:

$\Sigma_1: z = c (0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b)$  的上侧;

$\Sigma_2 : z = 0 (0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b)$ 的下侧;

$\Sigma_3 : x = a (0 \leq y \leq b, 0 \leq z \leq c)$ 的前侧;

$\Sigma_4 : x = 0 (0 \leq y \leq b, 0 \leq z \leq c)$ 的后侧;

$\Sigma_5 : y = b (0 \leq x \leq a, 0 \leq z \leq c)$ 的右侧;

$\Sigma_6 : y = 0 (0 \leq x \leq a, 0 \leq z \leq c)$ 的左侧.

除  $\Sigma_3, \Sigma_4$  外, 其余四片曲面在  $yOz$  面上的投影为零, 因此

$$\oiint_{\Sigma} x^2 dy dz = \iint_{\Sigma_3} x^2 dy dz + \iint_{\Sigma_4} x^2 dy dz = \iint_{D_{xy}} a^2 dy dz - \iint_{D_{xy}} 0^2 dy dz = a^2 bc.$$

类似地可得

$$\oiint_{\Sigma} y^2 dz dx = b^2 ac, \quad \oiint_{\Sigma} z^2 dx dy = c^2 ab.$$

于是所求曲面积为  $(a + b + c)abc$ .