

## 第四章

# 向量间的线性关系 与线性方程组



## 本章主要内容:

- ① 向量空间的定义;
- ② 向量空间中向量之间的线性关系;
- ③ 向量空间的基与维数;
- ④ 矩阵的秩;
- ⑤ 线性方程组解的结构.

## § 4.1 向量空间和 子空间的定义

一、向量空间 $\mathbf{R}^n$

二、 $\mathbf{R}^n$ 的子空间

# § 4.1 向量空间与子空间

## 一、向量空间 $\mathbf{R}^n$

记 $\mathbf{R}$ 为所有实数组成的集合,  $n$ 为正整数. 设所有 $n$ 元有序实数组组成的集合为:

$$\mathbf{R}^n = \left\{ (a_1, a_2, \cdots, a_n) \mid a_i \in \mathbf{R}, i = 1, 2, \cdots, n \right\}.$$

在 $\mathbf{R}^n$ 上定义加法和数乘:

设 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 与 $(b_1, b_2, \cdots, b_n)$ 为 $\mathbf{R}^n$ 中两个元素,  $k$ 为实数, 则

$$\begin{aligned} & (a_1, a_2, \cdots, a_n) + (b_1, b_2, \cdots, b_n) \\ &= (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \cdots, a_n + b_n); \end{aligned}$$

$$k(a_1, a_2, \cdots, a_n) = (ka_1, ka_2, \cdots, ka_n).$$

## § 4.1 向量空间与子空间

显然, 上述定义的加法和数乘也满足矩阵加法和数乘的8条运算规律(参见定理2.1.1).

定义4.1.2 集合 $\mathbf{R}^n$ 搭配如上定义的加法和数乘, 称为 **$n$ 维(实)向量空间**.

$\mathbf{R}^n$ 的元素称为 **$n$ 维向量**; 设向量 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ , 称 $a_i (i=1, 2, \dots, n)$ 为该向量的第 **$i$ 个分量**, 或第 **$i$ 个坐标**.

当 **$n$ 元有序数组**被写成一行 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 时, 称为 **$n$ 维行向量**; 而被写成一列 $(a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 时, 称为 **$n$ 维列向量**.

## § 2.1 矩 阵



### 2. 运算性质

定理2.1.1 设 $A, B, C, O$ 是同型矩阵,  $k$ 和 $l$ 是任意常数, 则以下运算规律成立:

- 1)  $A + B = B + A$  (加法交换律);
- 2)  $(A + B) + C = A + (B + C)$  (加法结合律);
- 3)  $A + O = A$ ;
- 4)  $A + (-A) = O$ ;
- 5)  $1A = A$ ;
- 6)  $k(lA) = (kl)A$ ;
- 7)  $(k + l)A = kA + lA$ ;
- 8)  $k(A + B) = kA + kB$ .





## § 4.1 向量空间与子空间

可定义减法:

零向量:  $\mathbf{O} = (0, 0, \dots, 0)$ ,

负向量:  $-(a_1, a_2, \dots, a_n) = (-a_1, -a_2, \dots, -a_n)$ ,

减法:  $(a_1, a_2, \dots, a_n) - (b_1, b_2, \dots, b_n)$   
 $= (a_1, a_2, \dots, a_n) + [-(b_1, b_2, \dots, b_n)]$   
 $= (a_1 - b_1, a_2 - b_2, \dots, a_n - b_n).$

还可定义向量的相等.

没有定义向量的乘法!

## § 4.1 向量空间与子空间

### 二、 $\mathbf{R}^n$ 的子空间

定义4.1.3 设 $W$ 是 $\mathbf{R}^n$ 的一个非空子集. 如果

(1) 对任意 $\alpha, \beta \in W$ , 有 $\alpha + \beta \in W$ ;

(2) 对任意 $\alpha \in W$ 及任意 $k \in \mathbf{R}$ , 有 $k\alpha \in W$ ,

则称 $W$ 是 $\mathbf{R}^n$ 的一个子空间.

注1 定义4.1.3中条件(1)(2)表明:  $W$ 对 $\mathbf{R}^n$ 上定义的加法和数乘运算, 是封闭的.

注2 容易验证:  $\mathbf{R}^n$ 和 $\{O\}$ 是 $\mathbf{R}^n$ 的子空间, 称为 $\mathbf{R}^n$ 的平凡子空间.

注3  $\mathbf{R}^n$  ( $n=1, 2, \dots$ )及其子空间均称为向量空间.



## § 4.1 向量空间与子空间

例4.1.1 证明: 如果 $W$ 是 $\mathbf{R}^n$ 的一个子空间,  
则 $\mathbf{0} \in W$ .

$$\exists \alpha \in W,$$

$$(-1)\alpha = -\alpha \in W,$$

$$\mathbf{0} = \alpha + (-\alpha) \in W.$$

另证:

$$\mathbf{0} = 0\alpha \in W.$$

## § 4.1 向量空间与子空间

例4.1.2 设 $W$ 是 $\mathbf{R}^2$ 中所有形如

$$\begin{bmatrix} a \\ 3a \end{bmatrix} \quad (a \text{ 为任意实数})$$

的向量组成的集合. 验证 $W$ 是 $\mathbf{R}^2$ 的一个子空间.

## § 4.1 向量空间与子空间

例4.1.3 对正整数  $n \geq 2$ , 令

$$S = \left\{ (a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, 0) \mid a_1, a_2, \dots, a_{n-1} \in \mathbf{R} \right\}.$$

验证  $S$  是  $\mathbf{R}^n$  的一个子空间.

## § 4.1 向量空间与子空间

例4.1.4 设

$$T = \{(a_1, a_2, 1) \mid a_1, a_2 \in \mathbf{R}\}.$$

验证 $T$ 不是 $\mathbf{R}^3$ 的子空间.

## § 4.1 向量空间与子空间

**总结** 验证 $W$ 是否是 $\mathbf{R}^n$ 的子空间的步骤:

1. 集合 $W$ 非空(看看是否 $\mathbf{0} \in W$ );
2.  $W$ 对 $\mathbf{R}^n$ 上定义的加法封闭;
3.  $W$ 对 $\mathbf{R}^n$ 上定义的数乘封闭.



# § 4.1 向量空间与子空间



课堂练习 P93: 1

作 业 P93: 2, 3(1)





## § 4.2 线性组合 与线性表出

- 一、线性组合与线性表出
- 二、生成子空间

## § 4.2 线性组合与线性表出

### 一、线性组合与线性表出

定义4.2.1 设  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in \mathbf{R}^n$ ,  $k_1, k_2, \dots, k_m$  为实数, 称向量

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_m \alpha_m$$

为向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  的一个**线性组合**.

定义4.2.2 设  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta \in \mathbf{R}^n$ . 若**存在** 实数  $l_1, l_2, \dots, l_m$ , 使得

$$\beta = l_1 \alpha_1 + l_2 \alpha_2 + \dots + l_m \alpha_m,$$

则称向量  $\beta$  **可由** 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  **线性表出**.

**定理** 向量  $\beta$  **可由** 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  线性表出, 当且仅当: 向量  $\beta$  是向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  的一个**线性组合**.

## § 4.2 线性组合与线性表出

例4.2.2 判断向量 $\beta=(1, 2, 0, -2)^T$ 是否可由  
向量组

$$\alpha_1=(1, 1, 1, 0)^T, \alpha_2=(1, 1, 0, 1)^T,$$

$$\alpha_3=(1, 0, 1, 1)^T, \alpha_4=(0, 1, 1, 1)^T$$

线性表出.

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4 = \beta$$

$$x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$$

## § 4.2 线性组合与线性表示

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_4 = 2 \\ x_1 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + x_3 + x_4 = -2 \end{cases}$$

判断线性方程组是否有解？

不必求出具体的解！

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$$

# 回顾


$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4 = \beta$$

$$x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_4 = 2 \\ x_1 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + x_3 + x_4 = -2 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$$







## § 4.2 线性组合与线性表出

### 二、生成子空间

设  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in \mathbf{R}^n$ , 记  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  的所有线性组合构成的集合为  $\text{Span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ , 即

$$\text{Span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) \\ = \{k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m \mid k_i \in \mathbf{R}, i = 1, 2, \dots, m\}.$$

定理4.2.1 设  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  是  $\mathbf{R}^n$  中的一组向量, 则  $\text{Span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$  是  $\mathbf{R}^n$  的一个子空间.

**定义** 称  $\text{Span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$  是由向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  **生成的子空间**, 称  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  是 **生成元**.

**定理** 向量  $\beta$  可由向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  线性表出, 当且仅当:  $\beta \in \text{Span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ .

## § 4.2 线性组合与线性表示

课堂练习

P94: 5(1)

作 业

P94: 5(2)

思 考 题

P93: 3(2)

# 回顾

## 第四章 向量与线性方程组

1.  $n$ 维(实)向量空间 $\mathbf{R}^n$
2.  $\mathbf{R}^n$ 的子空间
3. 线性组合
4. 线性表出
5. 生成子空间



## § 4.3 线性相关 与线性无关

一、定义

二、性质



## § 4.3 线性相关与线性无关

### 一、定义

定义4.3.1 设  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in \mathbf{R}^n$ . 如果存在不全为零的一组实数  $k_1, k_2, \dots, k_m$ , 使得

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_m \alpha_m = \mathbf{0}, \quad (4.3.1)$$

则称向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  线性相关; 否则, 称向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  线性无关.

**注** 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  线性无关的充要条件是:  $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_m \alpha_m = \mathbf{0}$  仅当  $k_1 = k_2 = \dots = k_m = 0$  时成立.



## § 4.3 线性相关与线性无关

特殊情形:

(1) 向量组  $\alpha$  线性相关, **当且仅当**  $\alpha$  为零向量.

(2) 向量组  $\alpha_1, \alpha_2$  线性相关, **当且仅当**  $\alpha_1$  与  $\alpha_2$  的对应坐标成比例.

几何意义:  $\alpha_1$  与  $\alpha_2$  (及原点) 共线.

(3) 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性相关, **当且仅当** 其中有一个向量可由其余两个向量线性表出.

几何意义:  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  (及原点) 共面.

## § 4.3 线性相关与线性无关

例4.3.1 判断下列向量组是线性相关还是线性无关：

$$(1) \alpha_1 = (1, 2, 4)^T, \alpha_2 = (2, 1, 3)^T, \alpha_3 = (4, -1, 2)^T;$$

$$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + x_3 \alpha_3 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

判断齐次线性方程组是否有非零解？

只有零解。

## § 4.3 线性相关与线性无关

例4.3.1 判断下列向量组是线性相关还是线性无关：

$$(2) \beta_1 = (1, -1, 0)^T, \beta_2 = (2, 0, 1)^T, \\ \beta_3 = (-1, 2, 0)^T; \beta_4 = (0, 2, -1)^T.$$

$$x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + x_3\beta_3 + x_4\beta_4 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

判断齐次线性方程组是否有非零解？  
有. 但不必求出具体的解！





## § 4.3 线性相关与线性无关

例4.3.2 设向量组 $\alpha, \beta, \gamma$ 是线性无关的.

证明: 向量组 $\alpha+\beta, \beta+\gamma, \gamma+\alpha$ 线性无关.

## § 4.3 线性相关与线性无关

例4.3.3 证明:  $n$ 维向量组

$$\varepsilon_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \varepsilon_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \cdots, \quad \varepsilon_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

线性无关, 并且  $\mathbf{R}^n$  中任意向量可由此向量组线性表出.



## § 4.3 线性相关与线性无关



### 二、性质

**定理(单调性)** 若向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  线性相关, 则  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_{m+r}$  也线性相关. 若向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_{m+r}$  线性无关, 则  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  也线性无关.

**定理4.3.1** 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m (m \geq 2)$  线性相关的充分必要条件是: 此向量组中至少有一个向量可由其余向量线性表出.



## § 4.3 线性相关与线性无关

定义4.3.2 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是两组向量. 如果每个 $\beta_i (1 \leq i \leq s)$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出, 则称向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出.

如果向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出, 同时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 也可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表出, 则称此两个向量组等价.



设向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$  可由向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  线性表出, 则

令  $C=[c_{ij}]_{m \times s}$ , 则可用矩阵形式地记为

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)C. \quad (4.3.4)$$

若向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$  与  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  等价, 则

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)C,$$

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)D.$$



## § 4.3 线性相关与线性无关

**定理** (1) 向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$  可由向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  **线性表出** 的充分必要条件是:

$$\text{Span}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) \subseteq \text{Span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m).$$

(2) 两个向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$  与  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$

**等价** 的充分必要条件是:

$$\text{Span}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = \text{Span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m).$$



## § 4.3 线性相关与线性无关

定理4.3.2 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表出. 若 $m > s$ , 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关.

**等价命题:** 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表出. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 则 $m \leq s$ .

**推论4.3.1** 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 等价, 且它们均线性无关, 则 $m = s$ .

推论4.3.2 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in \mathbf{R}^n$ . 若 $m > n$ , 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 必然线性相关.



# 回顾

例4.3.1 判断下列向量组是线性相关还是线性无关：

$$(2) \beta_1 = (1, -1, 0)^T, \beta_2 = (2, 0, 1)^T, \\ \beta_3 = (-1, 2, 0)^T; \beta_4 = (0, 2, -1)^T.$$

$$x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + x_3\beta_3 + x_4\beta_4 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

判断齐次线性方程组是否有非零解？有。

## § 4.3 线性相关与线性无关

例4.3.4 证明：线性无关的向量组

$$\varepsilon_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \varepsilon_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \varepsilon_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

任意添加  $k$  个分量得到的向量组

$$\gamma_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_k \end{bmatrix}, \quad \gamma_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_k \end{bmatrix}, \quad \gamma_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_k \end{bmatrix}$$

也线性无关.

## § 4.3 线性相关与线性无关

定理4.3.3 一组线性无关的 $n$ 维向量添加  
 $k$ 个同序号分量得到的 $n+k$ 维向量组仍然线性  
无关.

例4.3.5 判断向量组

$$\alpha_1 = (1, 2, 1, 4, 1, 1)^T,$$

$$\alpha_2 = (0, -2, 1, 0, 1, 1)^T,$$

$$\alpha_3 = (0, -3, 0, 2, 1, 0)^T$$

是否线性无关.

## § 4.3 线性相关与线性无关

课堂练习 P93-94: 4, 10, 12

作 业 P94: 6, 8, 11

# 回顾

## 第四章 向量与线性方程组

1. 线性相关
2. 线性无关
3. 向量组的线性表出
4. 向量组等价
5. 性质



# 回顾

## 线性表出

线性方程组有解的  
新充要条件



## 第四章 向量与线性方程组

令其增广矩阵的列向量为  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta$ , 则线性方程组(4.2.1)可改写成如下的向量形式:

$$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \cdots + x_n \alpha_n = \beta.$$

**定理** 线性方程组(4.2.1)有解的充分必要条件是: 常数项向量 $\beta$ 可由系数矩阵的列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出.

# 回顾

## 线性相关 (线性无关)

齐次线性方程组有非零解(只有零解)的  
新充要条件



例 齐次线性方程组的向量形式: 设齐次线性方程组为

令其系数矩阵的列向量为  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ , 则上述齐次线性方程组可改写成如下的向量形式:

$$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \cdots + x_n \alpha_n = \mathbf{0}.$$

**定理** 齐次线性方程组有非零解(只有零解)的充分必要条件是: 系数矩阵的列向量组  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  线性相关(线性无关).

## § 4.4 向量空间的 基和维数



## § 4.4 向量空间的基和维数

定义4.4.1 若向量空间 $V$ 中有一组向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 满足:

(1)  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关;

(2)  $V$ 中任一向量可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出,

则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 $V$ 的一个基(亦称基底).

注 上面条件(2)等价于:

$$V = \text{Span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$$

## § 4.4 向量空间的基和维数

例4.3.3中的向量组

$$\varepsilon_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \varepsilon_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \cdots, \quad \varepsilon_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

是向量空间 $\mathbf{R}^n$ 的一个基.

思路 需要证明两件事情:

- (1) 该向量组线性无关;
- (2)  $\mathbf{R}^n$ 中任一向量可由该向量组线性表出.

## § 4.4 向量空间的基和维数

### 例4.4.1 证明向量组

$$\beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}, \beta_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}, \dots, \beta_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

也是向量空间 $\mathbf{R}^n$ 的一个基.

思路 需要证明两件事情:

- (1) 该向量组线性无关;
- (2)  $\mathbf{R}^n$ 中任一向量可由该向量组线性表出.

## § 4.4 向量空间的基和维数

例 设向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  线性无关, 则  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  是生成子空间  $\text{Span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$  的一个基.

思路 需要证明两件事情:

(1) 该向量组线性无关;

(2)  $\text{Span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$  中任一向量可由该向量组线性表出.

**思考:** 考察  $\mathbf{R}^3$  中的  $xoy$  平面, 或  $\mathbf{R}^3$  中过原点的平面, 分别找出它们的一个基?

## § 4.4 向量空间的基和维数

**注** 关于基的问题:

- (1) 是否一定有基?
- (2) 有多少个基?
- (3) 不同基之间的共性或联系?



## § 4.4 向量空间的基和维数

定理4.4.1 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 均是向量空间 $V$ 的基, 则 $s=t$ .

定义4.4.2 设向量空间 $V$ 有基, 则基所含向量的个数称为向量空间 $V$ 的**维数**. 若 $V=\{O\}$ , 规定:  
 $V$ 的**维数**为0.

$\mathbf{R}^n$ 的维数是 $n$ .

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 则生成子空间 $\text{Span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 的维数是 $m$ .

**思考:**  $\mathbf{R}^3$ 中的 $xoy$ 平面, 或 $\mathbf{R}^3$ 中过原点的平面, 它们的维数是多少?

## § 4.4 向量空间的基和维数

作 业 P94: 13, 14

思考题 P94-95: 15, 17

## § 4.5 极大无关组与 向量组的秩

## § 4.5 极大无关组与向量组的秩

定义4.5.1 称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的**部分向量组**  $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$  ( $1 \leq i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_r \leq m$ ) 为**极大线性无关组**(简称**极大无关组**), 如果

(1)  $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$  线性无关;

(2) 每个 $\alpha_j$  ( $1 \leq j \leq m$ ) 均可由 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$  线性表出.

**注** (i) **极大性**: 上面条件(2)等价于: 对每个 $\alpha_j$  ( $1 \leq j \leq m$ ),  $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}, \alpha_j$  **必线性相关**.

(ii) 上面条件(2)等价于: 向量组与它的极大无关组**等价**, 从而

$$\text{Span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = \text{Span}(\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}).$$

## § 4.5 极大无关组与向量组的秩

**注** 关于极大无关组的问题:

- (1) 是否一定有极大无关组?
- (2) 有多少个极大无关组?
- (3) 不同极大无关组之间的共性或联系?



## § 4.5 极大无关组与向量组的秩

定理4.5.1 向量组的任意两个极大无关组所含向量的个数相等.

定义4.5.2 向量组的极大无关组所含向量的个数称为该**向量组的秩**.

**注** 向量组的秩**体现**向量组线性无关的**程度**.  
当向量组的秩**小于**向量组所含的向量个数时, 向量组**线性相关**; 当向量组的秩**等于**向量组所含的向量个数时, 向量组**线性无关**.

## § 4.5 极大无关组与向量组的秩

定理4.5.2 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的极大无关组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 必定是生成子空间

$$\text{Span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$$

的一个基. 从而向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的秩等于生成子空间 $\text{Span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 的维数.

定理4.5.3 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表出, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的秩不大于向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的秩.

推论 两个等价的向量组有相同的秩.

(见P95习题19)

## § 4.5 极大无关组与向量组的秩

课堂练习

P95: 18

作 业

P95: 19, 21

思 考 题

P95: 20

# 回顾



向量空间的基

向量空间的维数

向量组的极大无关组

向量组的秩

定理4.5.2 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  的极大无关组  $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$  必定是生成子空间

$\text{Span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$

的一个基. 从而向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  的秩等于生成子空间  $\text{Span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$  的维数.



## § 4.6 矩阵的秩

- 一、矩阵的行秩与列秩
- 二、矩阵的秩
- 三、计算



## § 4.6 矩阵的秩



### 一、矩阵的行秩与列秩

给定一个矩阵  $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ .

$A$  的行向量

$$\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}), \quad i = 1, 2, \dots, m,$$

构成的向量组称为  $A$  的**行向量组** ( $m$  个  $n$  维向量):

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in \mathbf{R}^n.$$

$A$  的列向量

$$\beta_j = (a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj})^T, \quad j = 1, 2, \dots, n,$$

构成的向量组称为  $A$  的**列向量组** ( $n$  个  $m$  维向量):

$$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \in \mathbf{R}^m.$$



## § 4.6 矩阵的秩

定义4.6.1 矩阵 $A$ 的行向量组的秩称为矩阵 $A$ 的**行秩**, 而其列向量组的秩称为矩阵 $A$ 的**列秩**.

定理4.6.1 初等变换不会改变矩阵的行秩与列秩.

定理4.6.2 矩阵的行秩与列秩相等.

## § 4.6 矩阵的秩

定义4.6.1 矩阵 $A$ 的行向量组的秩称为矩阵 $A$ 的**行秩**, 而其列向量组的秩称为矩阵 $A$ 的**列秩**.

定理4.6.1 初等变换不会改变矩阵的行秩与列秩.

定理4.6.2 矩阵的行秩与列秩相等.

证明思路 任意矩阵可经过初等变换变为:

$$\begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix}_{m \times n}.$$

此矩阵的行秩与列秩都等于 $r$ . 利用定理4.6.1, 原矩阵的行秩与列秩也分别等于 $r$ , 从而它们相等.

## § 4.6 矩阵的秩

$$\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & 0 & \cdots & \cdots & 0 & \cdots & c_{1n} \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & \cdots & 0 & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & c_{rn} \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

**注** 矩阵 $A$ 的行秩和列秩均等于由 $A$ 化简成的  
阶梯型矩阵和最简型矩阵中**非零行的个数**.



## § 4.6 矩阵的秩

### 二、矩阵的秩

定义 矩阵 $A$ 的行秩和列秩统称为矩阵的**秩**, 记为 $r(A)$ .

**注** 矩阵 $A$ 的秩等于由 $A$ 化简成的阶梯型矩阵和最简型矩阵中**非零行的个数**.

定理4.6.1' 初等变换不改变矩阵的秩.

推论4.6.1  $n$ 阶方阵 $A$ 可逆的充要条件是:

$$r(A)=n. \quad (\text{称为**满秩**})$$

证明思路 由定理2.4.1的3)可知:  $A$ 行等价于单位矩阵 $I$  (最简型), 从而  $r(A)=n$ .

推论4.6.1'  $n$ 阶方阵 $A$ 的行列式  $\det(A) \neq 0$  的充要条件是:  $r(A) = n$  (**满秩**).



## § 4.6 矩阵的秩

定义 取矩阵 $A$ 的 $k$ 个不同行与 $k$ 个不同列交叉位置上的 $k^2$ 个元素,按照它们在 $A$ 中的相对位置关系构成一个 $k$ 阶行列式,称为 $A$ 的一个 $k$ 阶子式.

定理4.6.3 矩阵 $A$ 的秩等于 $r$ 的充要条件是:  
存在 $A$ 的一个 $r$ 阶子式不等于0,且 $A$ 的任意 $r+1$ 阶子式(若存在)都等于0.

推论4.6.1'  $n$ 阶方阵 $A$ 的行列式 $\det(A) \neq 0$ 的充要条件是:

$$r(A) = n. \quad (\text{满秩})$$

## § 4.6 矩阵的秩

### 三、计算

#### 1. 求矩阵的秩

用初等行变换把 $A$ 化为阶梯型矩阵, 则阶梯型矩阵中非零行的个数就是矩阵 $A$ 的秩 $r(A)$ .

#### 2. 求向量组的秩

给定一个向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ . 以它们作为列向量构成的矩阵记为 $A$ , 则矩阵 $A$ 的秩 $r(A)$ 等于向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的秩.

用初等行变换把 $A$ 化为阶梯型矩阵, 则阶梯型矩阵中非零行的个数就是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的秩.

## § 4.6 矩阵的秩

### 3. 求向量组的极大无关组及其线性表出

给定一个向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ . 以它们作为列向量构成的矩阵记为  $A$ . 用初等行变换把  $A$  化为最简型矩阵  $B$ . 设  $B$  的所有首元素所在列的列向量为  $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_r}$ , 则  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  必然是向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  的一个极大无关组.

如果  $B$  的其它列向量  $\beta_j$  满足

$$\beta_j = k_1 \beta_{j_1} + k_2 \beta_{j_2} + \dots + k_r \beta_{j_r},$$

则

$$\alpha_j = k_1 \alpha_{j_1} + k_2 \alpha_{j_2} + \dots + k_r \alpha_{j_r}.$$

## § 4.6 矩阵的秩

$$\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & 0 & \cdots & \cdots & 0 & \cdots & c_{1n} \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & \cdots & 0 & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & c_{rn} \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$



## § 4.6 矩阵的秩

### 例4.6.1 求向量组

$$\alpha_1 = (0, 2, 6, 0, -8)^T, \quad \alpha_2 = (1, -3, 2, 0, 4)^T,$$

$$\alpha_3 = (-1, 2, -5, 0, 0)^T, \quad \alpha_4 = (3, -8, 5, -2, 11)^T$$

的秩和一个极大无关组, 并将其余的向量(如果有)  
用此极大无关组线性表出.

**注** 上述求向量组秩的方法也可用来判断向量组线性相关或线性无关.



## § 4.6 矩阵的秩

例4.6.2 设  $A=[a_{ij}]_{m \times n}$ ,  $B=[b_{jk}]_{n \times s}$ . 证明:  
$$r(AB) \leq \min(r(A), r(B)).$$

例 设  $A=[a_{ij}]_{m \times n}$ ,  $B=[b_{ij}]_{m \times n}$ . 证明:  
$$r(A+B) \leq r(A) + r(B).$$

例 设  $A=[a_{ij}]_{m \times n}$ . 证明:  $r(A^T) = r(A)$ .

## § 4.6 矩阵的秩

课堂练习

P95: 22(2), 23(1)

作 业

P95: 22(1), 23(2)

思 考 题

P95: 24

# 回顾

矩阵的秩

行秩、列秩

矩阵秩的新认识

子式

矩阵可逆的**新**充要条件

初等变换不改变矩阵的秩

## § 4.7 线性方程组 解的结构

- 一、矩阵秩的应用：  
判定线性方程组解的状况
- 二、齐次线性方程组  
解的结构
- 三、非齐次线性方程组  
解的结构

## § 4.7 线性方程组解的结构

**约定:**

从现在开始, 线性方程组的解, 均用**列向量**的形式表示, 称为线性方程组的**解向量**.

第一章

第二章及现在

$$x_1 = a_1$$

$$x_2 = a_2$$

$$\vdots$$

$$x_n = a_n$$

$$X = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$$

$$AX = \beta$$



## § 4.7 线性方程组解的结构

一、矩阵秩的应用: 判定方程组解的状况

给定一个齐次线性方程组

$$AX=O, \quad (4.7.1)$$

其中  $A=[a_{ij}]_{m \times n}$ ,  $X=(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ ,  $O=(0, 0, \dots, 0)^T$ .

定理4.7.1 齐次线性方程组(4.7.1) **只有零解**  
(惟一解)的充要条件是:  $r(A)=n$ .

齐次线性方程组(4.7.1) **有非零解**(有无穷多解)的充要条件是:  $r(A)<n$ .

## § 1.3 线性方程组解的初步讨论

$$\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & c_{1,j_1} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & c_{1n} \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & c_{2,j_2} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & c_{r,j_r} & \cdots & c_{rn} \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

- (1) 总是有解(零解);
- (2) 当 $r=n$ 时, 只有零解(有惟一解);
- (3) 当 $r<n$ 时, 有非零解(有无穷多解).

## § 4.7 线性方程组解的结构

给定一个非齐次线性方程组

$$AX=\beta, \quad (4.7.5)$$

其中

$$A=[a_{ij}]_{m \times n}, X=(x_1, x_2, \dots, x_n)^T, \beta=(b_1, b_2, \dots, b_m)^T \neq \mathbf{0}.$$

定理4.7.5 设非齐次线性方程组(4.7.5)的系数矩阵的秩为 $r$ , 增广矩阵的秩为 $r'$ ,

- (1) 若 $r \neq r'$ , 则(4.7.5)无解, 此时 $r'=r+1$ ;
- (2) 若 $r=r'=n$ , 则(4.7.5)有唯一解;
- (3) 若 $r=r'<n$ , 则(4.7.5)有无穷多解.

**注** 线性方程组(4.7.5)有解的充要条件是:

$$r=r'.$$

## § 1.3 线性方程组解的初步讨论

使用初等行变换可化为阶梯型矩阵:

$$\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & c_{1,j_1} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & c_{1n} & d_1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & c_{2,j_2} & \cdots & \cdots & \cdots & c_{2n} & d_2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & c_{r,j_r} & \cdots & c_{rn} & d_r \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & d_{r+1} \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}, (1.3.2)$$

其中,  $c_{1,j_1}, \cdots, c_{r,j_r}$  分别是它们所在行的首元素.



## § 4.7 线性方程组解的结构



### 二、齐次线性方程组解的结构

#### 1. 齐次线性方程组解集的整体结构--向量空间 给定一个齐次线性方程组

$$AX=O, \quad (4.7.1)$$

其中  $A=[a_{ij}]_{m \times n}$ ,  $X=(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ ,  $O=(0, 0, \dots, 0)^T$ .

定理4.7.2 若  $\xi_1, \xi_2$  是齐次线性方程组(4.7.1)的解向量,  $k$  是任意常数, 则  $\xi_1 + \xi_2, k\xi_1$  均为齐次线性方程组(4.7.1)的解向量.

定理4.7.2' 齐次线性方程组(4.7.1)的所有解向量构成的集合是  $\mathbf{R}^n$  的一个子空间(当然它也是一个向量空间), 称为齐次线性方程组(4.7.1)的解空间.



## § 4.7 线性方程组解的结构



### 2. 齐次线性方程组解集的内部结构--基础解系

定义4.7.1 设 $r(A) < n$ , 且 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_l$ 是齐次线性方程组(4.7.1)的一组解向量. 称 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_l$ 为齐次线性方程组(4.7.1)的一个基础解系, 如果

- (1)  $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_l$ 线性无关;
- (2) 齐次线性方程组(4.7.1)的任意解向量都可由 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_l$ 线性表出.

**注** 基础解系是解空间的一个基.

解空间的维数是 $l$ .

## § 4.7 线性方程组解的结构



定理4.7.3 若 $r=r(A)<n$ , 则齐次线性方程组(4.7.1)的基础解系含有 $n-r$ 个解向量.

**注** 解空间的维数是 $n-r$ .



## § 1.3 线性方程组解的初步讨论

使用初等行变换可化为阶梯型矩阵:

$$\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & c_{1,j_1} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & c_{1n} \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & c_{2,j_2} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & c_{r,j_r} & \cdots & c_{rn} \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

其中,  $c_{1,j_1}, \cdots, c_{r,j_r}$  分别是它们所在行的首元素.

## § 1.3 线性方程组解的初步讨论

$$\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & 0 & \cdots & \cdots & 0 & \cdots & c_{1n} \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & \cdots & 0 & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & c_{rn} \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_{j_1} + \cdots & + c_{1n} x_n = 0, \\ x_{j_2} + \cdots & + c_{2n} x_n = 0, \\ \cdots & \\ x_{j_r} + \cdots + c_{rn} x_n = 0. \end{cases}$$

## § 1.3 线性方程组解的初步讨论

$$\left\{ \begin{array}{l} x_{j_1} + \cdots + c_{1n} x_n = 0, \\ \quad x_{j_2} + \cdots + c_{2n} x_n = 0, \\ \quad \quad \quad \cdots \\ \quad \quad \quad x_{j_r} + \cdots + c_{rn} x_n = 0. \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_{j_1} = -\cdots, \\ \quad x_{j_2} = -\cdots, \\ \quad \quad \quad \cdots \\ \quad \quad \quad x_{j_r} = -\cdots. \end{array} \right.$$

变元  $x_{j_1}, \cdots, x_{j_r}$  为**首项变元**, 而其余的变元为**自由变元**.



## § 4.7 线性方程组解的结构

定义4.7.2 若 $r=r(A)<n$ , 而 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是齐次线性方程组(4.7.1)的一个基础解系, 则称向量

$$k_1\xi_1+k_2\xi_2+\dots+k_{n-r}\xi_{n-r}$$

为齐次线性方程组(4.7.1)的**通解**, 其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 为任意数.

## § 4.7 线性方程组解的结构

### 例4.7.1 求齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0, \\ -2x_1 + 4x_2 - 4x_3 + x_4 = 0, \\ -5x_1 + 10x_2 - 17x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

的一个基础解系, 并写出其通解.

## § 4.7 线性方程组解的结构



### 三、非齐次线性方程组解的结构

给定一个非齐次线性方程组

$$AX=\beta, \quad (4.7.5)$$

其中

$$A=[a_{ij}]_{m \times n}, X=(x_1, x_2, \dots, x_n)^T, \beta=(b_1, b_2, \dots, b_m)^T \neq \mathbf{0}.$$

定义4.7.3 称齐次线性方程组

$$AX=\mathbf{0} \quad (4.7.6)$$

为非齐次线性方程组(4.7.5)的**导出方程组**.

**注** (1) (4.7.5)的任意两个解向量之差是(4.7.6)的解向量;

(2) (4.7.5)的解向量与(4.7.6)的解向量之和是(4.7.5)的解向量.



## § 4.7 线性方程组解的结构

定理4.7.4 设非齐次线性方程组(4.7.5)有解, 且 $r=r(A)<n$ ,  $\eta_0$ 为其一个解向量(称为**特解**), 而 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是其**导出方程组**的一个基础解系, 则非齐次线性方程组(4.7.5)的全部解(也称**通解**)为:

$$X = \eta_0 + k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r}, \quad (4.7.7)$$

其中,  $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 为任意数.

证明思路 (1) 证明(4.7.7)是非齐次线性方程组(4.7.5)的解向量;

(2) 非齐次线性方程组(4.7.5)的任一解向量都可表示成(4.7.7)的形式.



## § 4.7 线性方程组解的结构

### 求非齐次线性方程组通解的步骤

- (1) 用初等行变换将增广矩阵化为阶梯型矩阵，然后判断解的状况；
- (2) 若有无穷多解，则再用初等行变换将阶梯型矩阵进一步地化为最简型矩阵；
- (3) 求出原方程组的一个特解；
- (4) 求出导出方程组的一个基础解系；
- (5) 写出原方程组的通解。



## § 4.7 线性方程组解的结构

例4.7.2 求下述非齐次线性方程组的通解:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = -1, \\ -2x_1 + 4x_2 - 4x_3 + x_4 = 3, \\ -5x_1 + 10x_2 - 17x_3 - x_4 = 4. \end{cases}$$

## § 4.7 线性方程组解的结构

课堂练习 P95: 25(1), 26(1)

作业 P95-96: 25(2), 26(2), 27

思考题 P95: 24

# 回顾

给定一个齐次线性方程组

$$AX=O, \quad (4.7.1)$$

其中  $A=[a_{ij}]_{m \times n}$ ,  $X=(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ ,  $O=(0, 0, \dots, 0)^T$ .

定理4.7.1 齐次线性方程组(4.7.1) **只有零解**  
(惟一解)的充要条件是:  $r(A)=n$ .

齐次线性方程组(4.7.1) **有非零解**(有无穷多解)的充要条件是:  $r(A)<n$ .

# 回顾



给定一个非齐次线性方程组

$$AX=\beta, \quad (4.7.5)$$

其中


$$A=[a_{ij}]_{m \times n}, X=(x_1, x_2, \dots, x_n)^T, \beta=(b_1, b_2, \dots, b_m)^T \neq \mathbf{0}.$$

定理4.7.5 设非齐次线性方程组(4.7.5)的系数矩阵的秩为 $r$ , 增广矩阵的秩为 $r'$ ,

- (1) 若 $r \neq r'$ , 则(4.7.5)无解, 此时 $r'=r+1$ ;
- (2) 若 $r=r'=n$ , 则(4.7.5)有唯一解;
- (3) 若 $r=r'<n$ , 则(4.7.5)有无穷多解.

**注** 线性方程组(4.7.5)有解的充要条件是:

$$r=r'.$$



# 回顾



齐次线性方程组解集的整体结构--向量空间

给定一个齐次线性方程组

$$AX=O, \quad (4.7.1)$$

其中  $A=[a_{ij}]_{m \times n}$ ,  $X=(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ ,  $O=(0, 0, \dots, 0)^T$ .

**定理4.7.2'** 齐次线性方程组(4.7.1)的所有解向量构成的集合是  $\mathbf{R}^n$  的一个子空间(当然它也是一个向量空间), 称为齐次线性方程组(4.7.1)的解空间.

解空间的维数是  $n-r(A)$ .





# 回顾

齐次线性方程组解集的**内部结构**--基础解系

定义4.7.1 设 $r(A) < n$ , 且 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_l$ 是齐次线性方程组(4.7.1)的一组**解向量**. 称 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_l$ 为齐次线性方程组(4.7.1)的一个**基础解系**, 如果

(1)  $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_l$ 线性无关;

(2) 齐次线性方程组(4.7.1)的任意解向量都可由 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_l$ 线性表出.

定义4.7.2 若 $r=r(A) < n$ , 而 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是齐次线性方程组(4.7.1)的一个基础解系, 则称向量

$$k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r}$$

为齐次线性方程组(4.7.1)的**通解**, 其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 为任意数.

# 回顾



给定一个非齐次线性方程组

$$AX=\beta, \quad (4.7.5)$$

其中

$$A=[a_{ij}]_{m \times n}, X=(x_1, x_2, \dots, x_n)^T, \beta=(b_1, b_2, \dots, b_m)^T \neq O.$$

定义4.7.3 称齐次线性方程组

$$AX=O \quad (4.7.6)$$

为非齐次线性方程组(4.7.5)的**导出方程组**.

定理4.7.4 设非齐次线性方程组(4.7.5)有解,且  $r=r(A)<n$ ,  $\eta_0$ 为其一个解向量(称为**特解**),而  $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是其**导出方程组**的一个基础解系,则非齐次线性方程组(4.7.5)的**通解**为:

$$X=\eta_0+k_1\xi_1+k_2\xi_2+\dots+k_{n-r}\xi_{n-r}, \quad (4.7.7)$$

其中,  $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 为任意数.

