

2020 年执业药师考试中药综合模拟卷

一、单选题

1. 现阶段中药药学服务模式的

- A. 以药品为中心
- B. 以保障药品供应为中心
- C. 以老百姓为中心
- D. 以病人为中心
- E. 以合理用药为中心

答案：D

2. 活血化瘀药，如桃核承气汤，服药方法

- A. 空腹服
- B. 饭前服
- C. 饭后服
- D. 清晨服
- E. 午后到夜晚服

答案：A

3. 正气未虚的急症者治疗方法

- A. 分服
- B. 顿服
- C. 频服
- D. 连服
- E. 发作时服

答案：B

4. 某女，39 岁。长期精神抑郁，情绪不宁，胸部满闷，胁肋胀痛，痛无定处，胸闷暖气，喜太息，不思饮食，中医辨证为

- A. 肝气郁结
- B. 痰气郁结
- C. 心神失养
- D. 心脾两虚
- E. 气瘀血阻

答案：A

5. 某女，50 岁，出现脏腑组织器官功能减退，出现血虚现象。该病证属于

- A. 推动作用失常
- B. 温煦作用失常
- C. 防御作用失常
- D. 固摄作用失常
- E. 气化作用失常

答案：A

6. 某男，70 岁。临床表现可见汗出不止，汗热而黏，手足温和，喘咳烦躁，皮肤皱褶，目眶深陷。其病机属于

- A. 真实假虚
- B. 真虚假实
- C. 阳盛格阴
- D. 亡阴
- E. 亡阳

答案：D

7. 肝气郁结和男子的排精和女子的月经有关，体现了

- A. 肝主疏泄
- B. 肝主藏血，精血同源
- C. 肾藏精
- D. 肾主生殖
- E. 脾主统血

答案：A

8. 某女，49 岁。食纳减少，食后作胀，腹中冷痛，得温则舒，口泛清水，四肢不温。中医辨证是为

- A. 脾肾阳虚
- B. 脾阳虚
- C. 肝肾阳虚
- D. 心肾阳虚
- E. 肝脾气虚

答案：B

9. 诊断乙型肝炎的直接证据是

- A. 抗-HBS
- B. HBcAg
- C. HBV-DNA
- D. HBsAg
- E. 抗-HBs

答案：C

10. 某男，28 岁。突然发热，高热不退，甚或寒战，周身酸痛，无汗，口干，咽喉疼痛，流行性发作，舌红，苔黄，脉浮数。中医治则是

- A. 益气解表，宣肺化痰
- B. 清热解毒，凉血泻火
- C. 辛温解表，宣肺散寒
- D. 辛凉解表，宣肺清热
- E. 清热宣肺

答案：B

11. 某男，68 岁。咳嗽频剧，气粗，咳痰不爽，痰粘稠或稠黄，喉燥咽痛，口渴，恶风身热，中医辨证是

- A. 风寒犯肺
- B. 风热犯肺
- C. 燥邪伤肺
- D. 痰湿壅肺
- E. 痰热郁肺

答案：B

12. 某男，26 岁，咳逆，喘息气粗，胸满，目胀睛突，痰黄，黏稠难咳，烦躁，口渴欲饮，尿赤，大便干。舌边尖红，苔黄或黄腻，脉数或滑数，中医诊断为肺胀，所选用的中成药是

- A. 苏子降气丸
- B. 理气定喘丸
- C. 清肺消炎丸
- D. 平喘固本汤
- E. 百令胶囊

答案：C

13. 某男，68 岁，胸痛彻背，感寒痛甚，胸闷气短，心悸，形寒肢冷，面白。舌苔白，脉沉紧，中医辨证为胸痹，证属

- A. 气虚血瘀
- B. 气滞血瘀
- C. 痰浊痹阻
- D. 寒凝心脉
- E. 气阴两虚

答案：D

14. 某女，26 岁，常心悸不安，胸闷气短，动则尤甚，面色苍白，形寒肢冷，舌淡苔白。脉虚弱或沉细无力，中医用药选择为

- A. 芪苈强心胶囊
- B. 人参归脾丸
- C. 天王补心丹
- D. 血府逐瘀口服液
- E. 参松养心胶囊

答案：A

15. 某女，50 岁，小便频数，饮一溲一，手足心热，咽干舌燥，面容憔悴，耳轮干枯，腰膝酸软，畏寒肢冷。舌淡苔白乏津，脉沉细无力，中医诊断为消渴症，中医辨证为

- A. 肾阴亏虚
- B. 阴阳两虚
- C. 阴虚燥热
- D. 脾胃气虚
- E. 气阴两虚

答案：B

16. 某女，小便点滴而下，尿如细线，阻塞不通，烦躁口苦。舌质紫暗或有瘀点，苔黄腻，脉涩。中医辨证用药为

- A. 八正散
- B. 清淋颗粒
- C. 癃闭舒
- D. 济生肾气丸
- E. 金匱肾气丸

答案：C

17. 某男，37 岁，遍体浮肿，胸闷，烦热，口渴多饮水，小便黄，舌红，苔黄腻，脉沉数，中医辨证为

- A. 风水相搏
- B. 水湿浸渍
- C. 脾阳虚衰
- D. 湿热壅盛
- E. 脾阳虚衰

答案：D

18. 某女，39 岁，腰痛如刺，痛有定处，痛处拒按，日轻夜重，轻者俯仰不便，重则不能转侧。舌质暗紫，或有瘀斑，脉涩，中医辨证用药为

- A. 左归丸
- B. 身痛逐瘀汤
- C. 四妙丸
- D. 甘姜苓术
- E. 三妙丸

答案：B

19. 某女，55岁，腹部积块质软不坚，固定不移，胀痛不适。舌苔薄，脉弦，中医辨证为

- A. 肝气郁结
- B. 气滞血阻
- C. 瘀血内结
- D. 正虚邪结
- E. 肝肾阴虚

答案：B

20. 某男，21岁，皮肤瘙痒，反复发作，迁延日久，午后或夜晚加剧，伴心烦易怒，口干，手足心热，舌红少津，脉沉，中医辨证用药为

- A. 当归饮子
- B. 防风通圣散
- C. 皮肤病血毒丸
- D. 桂枝汤
- E. 消风散

答案：A

21. 某男，患痔疮，肛内肿物脱出，甚或嵌顿，肛管紧缩，坠胀疼痛，甚则肛缘有血栓。水肿，触痛明显，舌质暗红，苔白或黄，脉弦涩，中医辨证用药为

- A. 止痛如神汤
- B. 凉血地黄汤
- C. 槐角丸
- D. 脏连丸
- E. 补中益气汤

答案：A

22. 瘀血引起的崩漏，治疗宜选用的治法是

- A. 塞因塞用
- B. 通因通用
- C. 补气摄血
- D. 清热凉血
- E. 热者寒之

答案：B

23. 某女，38岁，经行量少，经色暗淡，伴面容憔悴，头晕耳鸣，腰膝酸软，小腹凉，夜尿多，舌淡暗，苔薄白，脉沉细，中医辨证为

- A. 肾虚
- B. 气血亏虚
- C. 痰湿
- D. 血瘀
- E. 肝肾亏虚

答案：A

24. 某小儿6岁，不思进食，食少饮多，皮肤失润，大便偏干，小便短黄，烦躁少寐，手足心热，舌红少津，脉细数，中医辨证用药为

- A. 养胃增液汤
- B. 保和丸
- C. 小儿消食片
- D. 小儿化食丹
- E. 四磨汤口服药物

答案：A

25. 某小儿7岁不思饮食，食不知味，面色萎黄，神倦多汗，大便偏稀夹有不消化食物，面色少华，形体偏瘦，肢倦乏力。苔薄白，脉缓无力，中医辨证用药为

- A. 不换金正气散
- B. 异功散
- C. 健脾消食口服液
- D. 养胃增液汤
- E. 儿宝颗粒

答案：B

26. 蒙医认为的饮食禁忌是

- A. 用药期间禁忌猪肉
- B. 用药期间慎用山羊肉
- C. 乳类反水果
- D. 鱼肉反乳类
- E. 蜂蜜不可和等量植物油同用

答案：A

27. 具有清瘟泻热、宽胸益肺，祛风通痹的藏药是

- A. 三十五味沉香丸
- B. 二十九味能消散
- C. 十一味金色丸
- D. 十味黑冰片丸
- E. 八味沉香散

答案：A

28. 属于配伍禁忌，斗谱排列时不能装于一斗及上下斗的饮片是

- A. 芦根与茅根
- B. 茵陈与金钱草
- C. 千年健和五加皮
- D. 灯心草与通草
- E. 玄明粉和京三棱

答案：E

29. 中成药有很多剂型，不同剂型采用的贮藏养护方法各不相同。一般而言，应置遮光容器中密闭保存，置于阴凉、干燥处。除另有规定外，应避光、密封储存的剂型是

- A. 软膏剂
- B. 酒剂
- C. 颗粒剂
- D. 胶剂
- E. 胶囊剂

答案：A

30. 某男，32岁。因慢性咽炎来医院就诊，医师辨证为气阴两虚，开具的处方为：金银花、桔梗、黄芪、西洋参、鱼腥草、蛤粉。煎煮时需要另煎0.5小时的饮片是

- A. 鱼腥草
- B. 西洋参
- C. 蛤粉。
- D. 金银花
- E. 黄芪

答案：B

31. 毒性中药药性峻烈，治疗剂量与中毒剂量相近，使用不当会致人中毒甚则死亡，因此掌握毒性中药饮

片的正确用法尤为重要。下列毒性中药不可内服

- A. 雪上一枝蒿
- B. 闹羊花
- C. 轻粉
- D. 红娘虫
- E. 生甘遂

答案：A

32. 处方中马蹄决明表明中药的

- A. 炮制品
- B. 修治
- C. 产地
- D. 品质
- E. 形状

答案：D

33. 中药材天花粉引起变异现象常见为

- A. 虫蛀
- B. 霉变
- C. 变色
- D. 气味散失
- E. 泛油

答案：C

34. 含朱砂较多的中成药，如磁朱丸、更衣丸、安宫牛黄丸等不宜长期与含较多还原性溴离子或碘离子服用的中成药是

- A. 柏子养心丸
- B. 内消瘰疬丸
- C. 天王补心丸
- D. 牛黄清心丸
- E. 牛黄醒消丸

答案：B

35. 含有砷、汞等矿物类成分的中成药，长期服用可造成血尿、蛋白尿等肾功能损害，肾功能不全患者应慎用。含有砷类分的中成药是

- A. 六神丸
- B. 天王补心丹
- C. 朱砂安神丸
- D. 七厘散
- E. 大活络丸

答案：A

36. 以下药物对肾功能有影响的含有生物碱的是

- A. 川楝子
- B. 苍耳子
- C. 益母草
- D. 五倍子
- E. 寻骨风

答案：C

37. 中成药麻仁丸不宜和红霉素同用，主要是影响了

- A. 吸收
- B. 分布

- C. 代谢
 - D. 排泄.
 - E. 剂量
- 答案: A

38. 中药复方青黛丸不良反应有腹泻. 腹痛. 肝炎. 肝功能异常. 头晕。执业药师在进行复方青黛丸用药指导时, 用药建议错误的是

- A. 用药期间注意监测肝生化指标
- B. 若出现肝脏生化指标异常. 便血及腹泻等, 应立即停药, 及时就医
- C. 孕妇及本品过敏者慎用。
- D. 肝脏生化指标异常禁用
- E. 消化性溃疡. 白细胞低者禁用

答案: C

39. 个人发现药品引起的新的或严重的不良反应, 可直接向报告给

- A. 所在省、自治区、直辖市药品不良反应监测中心或（食品）药品监督管理局
- B. 本地三甲医院
- C. 本地卫检委
- D. 本地药检所
- E. 国家药品不良反应监测中心

答案: A

40. 服用小金丸、西黄丸引起的皮肤红肿、瘙痒等过敏反应, 停药后即可逐渐消失属于

- A. 副作用
- B. 毒性作用
- C. 变态反应
- D. 后遗作用
- E. 特异质反应

答案: D

二、B 型题

- A. 肝主疏泄失常
- B. 心主血脉失常
- C. 脾主运化失常
- D. 肾主藏精失常
- E. 肺司呼吸失常

41. 某女, 35 岁, 月经异常, 生殖能力低下, 基于五脏的生理功能分析, 其病变属于

答案: D

42. 某男, 50 岁, 咳嗽, 咽痒, 痰稀薄色白。常伴有头痛, 鼻塞, 眼痒, 喷嚏, 恶寒无汗。基于五脏的生理功能分析, 其病变属于

答案: E

- A. 气血两虚
- B. 气虚血瘀
- C. 气不摄血
- D. 气随血脱
- E. 气滞血瘀

43. 某女, 37 岁, 症见胸胁胀痛, 性情急躁, 舌紫暗, 月经期间出现痛经。中医辨证是

答案: E

44. 某女, 48 岁。面色苍白, 崩漏, 气短, 倦怠乏力, 脉软弱细微、舌淡。中医辨证是

答案：C

45. 某女，51 岁。大出血，兼见面色白，四肢厥冷，大汗淋漓，脉微细，中医辨证是

答案：D

A. 结脉

B. 细脉

C. 弱脉

D. 代脉

E. 促脉

46. 脉来缓弱而有规则间歇，间歇时间较长，此脉象是

答案：D

47. 脉来急数而有不规则的间歇，此脉象是

答案：E

48. 脉来缓慢而有不规则间歇，此脉象是

答案：A

A. 白苔

B. 黑苔

C. 紫苔

D. 灰苔

E. 黄苔

49. 热邪熏灼导致，主热证，则为

答案：E

50. 可见于里热证也可见于寒湿证，则为

答案：D

A. 阴盛格阳

B. 阳盛格阴

C. 阳偏衰

D. 亡阴

E. 阴盛

51. 某男，50 岁，四肢厥冷，脉象沉伏心胸烦热，腹部扪之灼热，身大寒。分析该病机是

答案：B

52. 某男，27 岁。畏寒喜暖，形寒肢冷，面色白，踧卧神疲，小便清长，下利清谷，水肿，脉微细。分析该病机是

答案：C

A. 气阴两虚

B. 痰热扰心

C. 肝火扰心

D. 心肾不交

E. 心胆气虚

53. 某男，46 岁，多梦，甚则彻夜不眠，急躁易怒，伴头晕头胀，目赤耳鸣，口干而苦，不思饮食，便秘溲赤，舌红苔黄，脉弦而数，中医辨证是

答案：C

54. 某男，32 岁。心烦不寐，入睡困难，心悸多梦，伴头晕耳鸣，腰膝酸软，潮热盗汗，五心烦热，咽干少津，男子遗精，女子月经不调，舌红少苔，脉细数中医辨证是

答案：D

55. 某男，29 岁。虚烦不眠，触事易惊，胆怯心悸，气短自汗，倦怠乏力，舌淡，脉弦细，中医辨证是
答案：E

- A. 左归丸
- B. 归脾汤
- C. 天麻钩藤饮
- D. 松龄血脉康
- E. 半夏白术天麻汤

56. 某男，55 岁。眩晕头重昏蒙，胸闷恶心，食少多寐，苔白腻，脉濡滑。宜选用的方剂是
答案：E

57. 某男，43 岁。眩晕日久不愈，精神萎靡，两目干涩，视力减退，腰膝酸软，或五心烦热。舌红苔少，脉弦细数，宜选用的方剂是
答案：A

58. 某女，35 岁，眩晕，动则加剧，劳累即发，神疲乏力食少，心悸少寐，面唇甲淡白，舌淡苔薄白，脉细弱，宜选用的方剂是
答案：B

- A. 补中益气汤
- B. 清骨散
- C. 丹栀逍遥散
- D. 左归丸
- E. 右归丸

59. 某男，55 岁，发热，热势或低或高，常在劳累后发作或加剧，倦怠乏力，气短懒言，自汗，易于感冒，食少便溏。舌质淡，苔薄白，脉细弱。宜选用的方剂是
答案：A

60. 某男，50 岁。午后潮热，不欲近衣，手足心热，烦躁，少寐多梦，盗汗，口干咽燥。舌质红，或有裂纹，苔少甚至无苔，脉细数。宜选用的方剂是
答案：B

61. 某女，53 岁。热势常随情绪波动而起伏，精神抑郁，胁肋胀满，烦躁易怒，口干而苦，纳食减少。舌红，苔黄，脉弦数，宜选用的方剂是
答案：C

- A. 举元煎
- B. 宫血宁胶囊
- C. 宫血停颗粒
- D. 坤宁口服液
- E. 宫宁颗粒

62. 某女，42 岁，经行量多，色淡红，质清稀；神疲肢倦，气短懒言，小腹空坠，面色苍白。舌淡，苔薄，脉细弱，选用的方剂是
答案：A

63. 某女，35 岁。经行量多，经色鲜红或深红，质稠黏；伴心烦口渴，身热面赤，大便干结，小便黄赤，或有灼热感。舌红绛，苔黄，脉滑数宜选用的中成药是
答案：B

- A. 酒当归
- B. 当归炭

C. 炒当归

D. 炙当归

E. 当归

64. 四物汤，调配时当归应给付的是

答案：A

65. 共人散剂，调配时当归应给付的是

答案：B

A. 姜半夏

B. 法半夏

C. 清半夏

D. 生半夏

E. 竹茹半夏

66. 某女，75岁，痰热互结之结胸证。胸脘痞闷，按之则痛，或心胸闷痛，或咳痰黄稠，舌红苔黄腻，脉滑数，给予小陷胸汤，执业药师建议可使用的半夏为

答案：A

67. 某女，65岁。脾虚气滞，消化不良，嗳气食少，脘腹胀满，大便溏泄，给予香砂六君丸。为增强疗效，执业药师建议可使用的半夏是

答案：A

68. 某男，25岁。恶寒发热，头身疼痛，无汗，喘咳，痰涎清稀而量多，胸痞，或干呕，或痰饮喘咳，不得平卧，或身体疼重，头面四肢浮肿，舌苔白滑，脉，给予小青龙汤。为执业药师建议可使用的半夏是

答案：B

A. 生蒺藜、炒蒺藜

B. 刺蒺藜、沙苑子

C. 白蒺藜、黑蒺藜

D. 沙苑子、熟蒺藜

E. 潼蒺藜果、白蒺藜藤

69. 处方中的并开药“二蒺藜”，执业药师在调配时应付

答案：B

70. 处方中的并开药“潼白蒺藜”，执业药师在词配时应付

答案：B

A. 包煎

B. 对服

C. 先煎

D. 后下

E. 冲服或后下
某男，55岁。近日风湿发作，兼咳嗽，医师开具的处方为：附子. 徐长卿. 防风. 枇杷叶. 沉香. 降香，执业药师对患者进行煎药. 服用方法的指导。

71. 附子应采用的方法是

答案：C

72. 降香应采用的方法是

答案：D

73. 沉香应采用的方法是

答案：D

- A. 罂粟壳
- B. 桂枝
- C. 草乌
- D. 生藤黄
- E. 重楼

74. 根据 2015 年版《中国药典》，有大毒的中药是

答案：C

75 与群药一起调配。不能单独发药的中药是

答案：A

76. 根据 2015 年版《中国药典》，有小毒的中药是

答案：E

- A. 牡丹皮
- B. 吴茱萸
- C. 绿豆
- D. 泽泻
- E. 当归

77. 按照对抗贮存法，50 度的白酒密封保存的中药是

答案：E

78. 按照对抗贮存法，宜与冰硼砂同贮的中药是

答案：C

- A. 人参再造丸
- B. 硫磺软膏
- C. 复方黄连素软膏
- D. 正红花油

E. 枣仁安神胶囊
妊娠期妇女使用中成药时要慎重选择，以免损伤胎儿及母体

79. 根据 2015 年版《中国药典》，孕妇应慎用的中成药是

答案：E

80. 根据 2015 年版《中国药典》，孕妇应禁用的中成药是

答案：A

- A. 川贝止咳糖浆
- B. 羚羊感冒片
- C. 六味地黄丸
- D. 人参归脾丸
- E. 大补阴丸
老年人用药需辨证选药，合理使用

81. 肾阴虚宜选用

答案：C

82. 阴虚的慢性支气管炎

答案：E

83. 心脾两虚者宜用

答案：D

- A. 2—5° C
- B. 10—25° C
- C. 避光并不超过 20° C

D. 2—10° C

E. 10—30° C根据 2015 年版《中国药典》“凡例”[贮藏]项下对药品贮藏与保管基本要求的规定。

84. 凉暗处是指

答案: C

85. 常温是指

答案: E

A. 半夏泻心汤

B. 芍药甘草汤

C. 逍遥散

D. 茵陈蒿汤

E. 黄连

86. 中西药联用时, 可与抗生素类联用, 增强抗菌作用的是

答案: E

87. 中西药联用时, 可灰黄霉素联用, 促进吸收, 加强抗菌作用是

答案: D

A. 肾功能不全, 粒细胞减少, 精子数量减少

B. 上消化道出血. 血尿. 皮肤瘀斑, 过敏反应

C. 肝肾功能异常. 粒细胞. 白细胞和血小板减少. 精子数量减少

D. 胰腺炎. 低钾血症. 低氯血症. 低钠血症

E. 心慌、气短、胸闷、颜面潮红, 过敏性休克, 呼吸困难

88. 服用雷公藤制剂发生严重不良反应时可见

答案: A

89. 使用感冒通发生严重不良反应时可见

答案: B

90. 使用参麦注射液发生严重不良反应时可见

答案: E

三、综合题

某女, 63 岁。胁肋隐痛, 悠悠不休, 遇劳加重, 口干咽燥, 心中烦热, 头晕目眩。舌红少苔, 脉细弦而数

91. [单选]四诊合参, 中医辨证是

A. 肝郁气滞

B. 肝胆湿热

C. 瘀血阻络

D. 肝络失养

E. 阳虚寒凝

答案: D

92. [单选]宜采用的治法是

A. 祛瘀通络

B. 疏肝理气

C. 清热利湿

D. 养阴柔肝

E. 温散寒湿

答案: D

93. [单选]宜选用的方剂是

A. 一贯煎

- B. 柴胡疏肝散
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 血府逐瘀汤
- E. 理中丸

答案：A

某女，76岁，因冠心病至村卫生所就诊，查血压130/80mmHg，给予香丹注射液20ml加入5%葡萄糖注射液250ml静脉滴注。约滴注30ml时，患者出现皮肤瘙痒、面色苍白、出冷汗、胸闷、气促。查血压60/40mmHg，呼吸60次/分，肌肉注射氯苯那敏10mg、地塞米松10mg。20分钟后，血压回升，症状好转

94. [单选] 该患者出现的不良反应和香丹注射液之间的因果关系应评价为

- A. 很可能
- B. 可能
- C. 可能无关
- D. 肯定
- E. 无法评价

答案：D

95. [单选] 香丹注射液常见的不良反应不包括

- A. 过敏性休克
- B. 过敏样反应
- C. 喉头水肿
- D. 肾功能伤害
- E. 胃肠道反应

答案：D

某女，25岁。乳房肿块月经前加重，经后缓解，并伴腰膝酸软，神疲倦怠，月经失调，舌质淡，苔白，脉沉细

96. [单选] 四诊合参，本病例的中医辨证是

- A. 气滞血瘀
- B. 阳虚内寒
- C. 肝郁痰凝
- D. 冲任失调
- E. 寒凝气滞

答案：D

97. [单选] 治疗宜选用的中药方剂是

- A. 二仙汤合四物汤
- B. 逍遥蒺藜散
- C. 枇杷清肺饮
- D. 茵陈蒿汤
- E. 凉血地黄汤

答案：A

某男，48岁，咽喉红肿疼痛，吞咽困难，咽喉如梗，咽部红肿明显，高热，口干喜饮，头痛较剧，尿黄便秘，舌红苔黄，脉数有力。血象检查白细胞为 $21 \times 10^9/L$ 。

98. [单选] 白细胞是多见于重度感染，严重组织损伤等。常见参考值应为

- A. $(4-10) \times 10^9/L$ 。
- B. $(3-8) \times 10^9/L$
- C. $(40-100) \times 10^9/L$
- D. $(20-40) \times 10^9/L$

E. $(6-9) \times 10^9/L$

答案: A

99. [单选]医师给予适合的中药方剂是

- A. 疏风清热汤
- B. 复方鱼腥草片
- C. 金嗓开音丸
- D. 清咽利膈汤
- E. 养阴清肺汤

答案: D

100. [单选]该患者采用的治法为

- A. 疏风清热、消肿利咽
- B. 泄热解毒、利咽消肿
- C. 滋阴降火、清肺咽喉
- D. 疏散风热、清热解毒
- E. 利咽消肿, 滋阴清热

答案: B

某男, 57 岁。夜寐盗汗, 五心烦热, 午后潮热, 两颧色红, 口渴, 舌红少苔, 脉细数

101. [单选]中医辨证是

- A. 肺卫不固
- B. 心血不足
- C. 气血亏虚
- D. 阴虚火旺
- E. 邪热郁蒸

答案: D

102. [单选]宜采用的治法是

- A. 益气固表
- B. 补养心血
- C. 滋阴降火
- D. 清肝泄热
- E. 化湿和营

答案: C

103. [单选]宜选用的方剂是

- A. 归脾汤加减
- B. 当归六黄汤加减
- C. 异功散加减
- D. 龙胆泻肝汤加减
- E. 玉屏风散加减

答案: B

104. [单选]宜选用的中成药是

- A. 复芪止汗颗粒
- B. 健脾生血颗粒
- B. 六味地黄丸
- D. 龙胆泻肝丸
- E. 心脑舒口服液

答案: E

某女, 36 岁。胆怯易惊, 惊悸不宁, 烦躁不安, 失眠多梦, 眩晕耳鸣, 口苦呕恶, 胸肋胀闷, 舌红苔黄腻,

脉弦数，具饮片处方如下：大黄、荷叶、芒硝、枳实、厚朴、龙胆草

105. [单选] 该患者服用 7 剂后，出现肾水肿等，引起不良反应的中药是

- A. 大黄
- B. 芒硝
- C. 龙胆草
- D. 厚朴
- E. 荷叶

答案：A

106. [单选] 该中药中引起肝损伤的主要化学物质属于

- A. 蒽醌类
- B. 木质素类
- C. 环烯醚萜类
- D. 盐类（硫酸钠）
- E. 生物碱类

答案：A

某男，45 岁。夜晚发热，口燥咽干，但不多饮，肢体固定痛处，面色萎黄，舌质青紫，脉弦

107. [单选] 中医辨证是

- A. 气虚发热
- B. 阴虚发热
- C. 气郁发热
- D. 血瘀发热
- E. 心肾不交

答案：D

108. [单选] 宜采用的治法是

- A. 交通心肾
- B. 活血化瘀
- C. 疏肝理气，解郁泻热
- D. 滋阴清热
- E. 益气健脾，甘温除热

答案：B

109. [单选] 宜选用的方剂是

- A. 补中益气丸加减
- B. 清骨散
- C. 丹栀逍遥散
- D. 血府逐瘀汤
- E. 玉屏风散

答案：D

110. [单选] 宜选用的中成药是

- A. 补中益气丸
- B. 知柏地黄丸
- C. 丹栀逍遥散
- D. 血府逐瘀口服液
- E. 越鞠丸

答案：D

四、多选题

111. 马来酸氯苯那敏引起嗜睡和疲劳乏力，含马来酸氯苯那敏成分的中成药有

- A. 感特灵胶囊
- B. 金羚感冒片
- C. 维 C 银翘片
- D. 复方感冒灵片
- E. 治感佳片

答案：ABCDE

112. 不合理用药的后果有

- A. 浪费一啣资源
- B. 引发药源性疾病
- C. 延误疾病治疗
- D. 引发药物不良反应
- E. 造成医疗纠纷

答案：ABCDE

113. 治未病的主要原则

- A. 未病先防，扶助正气，提高抗病能力
- B. 未病先防，消灭病邪，防止邪气侵害
- C. 既病防变，早期诊治
- D. 既病防变，控制疾病传变
- E. 愈后康复，调整阴阳平衡，避免复发诱因

答案：ABCDE

114. 某女，38 岁。症见发热恶寒，恶寒，身重疼痛，神疲倦怠，舌质淡，苔薄黄，可选用的中成药有

- A. 暑湿感冒颗粒
- B. 暑症片
- C. 藿香正气水
- D. 清暑解毒颗粒
- E. 九味羌活丸

答案：ABC

115. 下列属于消法的是

- A. 食积内停的治疗方法
- B. 脘腹癥结的治疗方法
- C. 便秘的治疗方法
- D. 瘰癧的治疗方法
- E. 五心烦热的治疗方法

答案：ABD

116. 中药饮片斗谱的编排是否科学、合理，直接影响配方效率和质量，处方中常以药对出现可放于同一斗中的饮片有

- A. 麦冬、北沙参
- B. 桃仁、红花
- C. 杜仲、续断
- D. 杏仁、桃仁
- E. 牛黄、麝香

答案：ABC

117. 某男，35 岁。尿频，尿急，尿痛等尿路刺激症，舌红，苔黄，脉滑数。医师给予八正汤，效果显著。该方剂体现的治法有

- A. 塞因塞用

- B. 热因热用
- C. 实则泻之
- D. 通因通用
- E. 热者寒之

答案：CE

118. 护士咨询主要有

- A. 药品的保管
- B. 药品价格
- C. 药品的剂量
- D. 输液药物的稳定性和配伍的理化变化
- E. 药物配伍禁忌

答案：ACDE

119. 某女，38 岁。月经周期延后，经量少，色淡红，质清稀，头晕眼花，心悸少寐，皮肤不润，面色苍白，苔薄白，脉细弱，宜选用的中成药是

- A. 固阴煎
- B. 复方益母草膏
- C. 人参归脾丸
- D. 四物益母丸
- E. 丹栀逍遥丸

答案：BD

120. 对肝、肾均有损害的药物有

- A. 蜈蚣
- B. 斑蝥
- C. 雄黄
- D. 朱砂
- E. 红粉

答案：ABCDE