



华南理工大学

South China University of Technology

工科数学分析

刘青青

§3.6 Taylor 公式

- ▶ Taylor 公式的建立
- ▶ 几个初等函数的 Maclaurin 公式
- ▶ 近似计算与误差估计
- ▶ 其它应用





Taylor 公式的建立

回顾函数的微分与线性估计

- ▶ 若函数 $f(x)$ 在 x_0 可导, 则当 $|x - x_0|$ 很小时, 有

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$



Taylor 公式的建立

回顾函数的微分与线性估计

- ▶ 若函数 $f(x)$ 在 x_0 可导, 则当 $|x - x_0|$ 很小时, 有

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

- ▶ 这一线性估计的误差

$$\sigma_1(x) = f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)$$

是比 $x - x_0$, ($x \rightarrow x_0$) 更高阶的无穷小.



Taylor 公式的建立

回顾函数的微分与线性估计

- ▶ 若函数 $f(x)$ 在 x_0 可导, 则当 $|x - x_0|$ 很小时, 有

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

- ▶ 这一线性估计的误差

$$\sigma_1(x) = f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)$$

是比 $x - x_0$, ($x \rightarrow x_0$) 更高阶的无穷小.

- ▶ 上述估计较为粗略, 精度不高.



Taylor 公式的建立

回顾函数的微分与线性估计

- ▶ 若函数 $f(x)$ 在 x_0 可导, 则当 $|x - x_0|$ 很小时, 有

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

- ▶ 这一线性估计的误差

$$\sigma_1(x) = f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)$$

是比 $x - x_0$, ($x \rightarrow x_0$) 更高阶的无穷小.

- ▶ 上述估计较为粗略, 精度不高.
- ▶ **问题:** 能否给出 $f(x)$ 的更精确的估计?



Taylor 公式的建立

问题: 考虑用二次多项式近似 $f(x)$, 并且误差是比 $(x - x_0)^2$ 更高阶的无穷小?



$$f(x) = A + B(x - x_0) + C(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2), \quad x \rightarrow x_0.$$



Taylor 公式的建立

问题: 考虑用二次多项式近似 $f(x)$, 并且误差是比 $(x - x_0)^2$ 更高阶的无穷小?



$$f(x) = A + B(x - x_0) + C(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2), \quad x \rightarrow x_0.$$



$$A = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$



$$B = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0).$$



$$C = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{(x - x_0)^2} = \frac{1}{2}f''(x_0).$$



Taylor 公式的建立

现在我们证明了有惟一的一个二次多项式 $T_2(f, x_0; x)$:

$$T_2(f, x_0; x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2.$$

满足要求, 那么 $f(x) - T_2(f, x_0; x)$ 是否是比 $(x - x_0)^2$ 更高阶的无穷小?

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_2(x - x_0)}{(x - x_0)^2} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) - \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2}{(x - x_0)^2}$$

Type $\left(\frac{0}{0}\right)$ L'Hospital Rule

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0) - f''(x_0)(x - x_0)}{2(x - x_0)}$$

$$= 0.$$



Taylor 公式的建立

- ▶ $T_2(f, x_0; x_0) = f(x_0)$: 近似二次多项式与 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 重合
- ▶ $T'_2(f, x_0; x_0) = f'(x_0)$: 近似二次多项式与 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 具有相同的切线
- ▶ $T''_2(f, x_0; x_0) = f''(x_0)$: 近似二次多项式与 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 凹凸性 (弯曲程度) 相同



Taylor 公式的建立

结论:

$f(x)$ 在 x_0 的邻域内有连续的导数, 并且 $f''(x_0)$ 存在, 则

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2),$$

即

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2,$$

$$R_2(x-x_0) = f(x) - [f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x-x_0)^2] = o((x-x_0)^2).$$



Taylor 公式

► Taylor 多项式

设函数 $f(x)$ 在 x_0 点有直到 n 阶的导数. 多项式

$$T_n(f, x_0; x) := \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

称为函数 $f(x)$ 在 x_0 点的 n 阶 Taylor 多项式.

$$R_n(x - x_0) := f(x) - T_n(f, x_0; x)$$

称为 n 阶余项.



Taylor 公式的惟一性

Taylor 公式的惟一性

设 $f(x)$ 足够好 (函数 $f(x)$ 在 x_0 附近有 $n-1$ 阶导数且 $f^{(n)}(x_0)$ 存在), 若有 n 次逼近多项式

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \cdots + a_n(x - x_0)^n$$

使得

$$f(x) = P_n(x) + o((x - x_0)^n)$$

则

$$a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \cdots, n.$$

即

$$P_n(x) = T_n(f, x_0; x)$$



定理证明

► 对多项式 $P_{n-1}(x)$ 求 k 阶导数.

►

$$\begin{aligned} P_{n-1}^{(k)}(x) = & k!a_k + (k+1)k \cdots 2a_{k+1}(x-x_0) \\ & + \cdots + (n-1) \cdots (n-k)(x-x_0)^{n-1-k} \end{aligned}$$



定理证明

- ▶ 对多项式次数 n 进行归纳.
- ▶ 已验证定理对 $n = 0, 1, 2$ 成立.
- ▶ 若 $\sigma_n(x) = f(x) - P_n(x) = o((x - x_0)^n), x \rightarrow x_0$, 则

$$\sigma_{n-1}(x) = f(x) - P_{n-1}(x) = o((x - x_0)^{n-1}), x \rightarrow x_0.$$

由归纳假设,

$$a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}, k = 0, 1, 2, \dots, n - 1.$$

而且

$$P_{n-1}^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0)$$



定理证明

► 对于 a_n , 由 $\sigma_n(x) = f(x) - P_n(x) = o((x - x_0)^n), x \rightarrow x_0$, 有

$$0 = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - P_n(x)}{(x - x_0)^n} = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x) - P_{n-1}(x)}{(x - x_0)^n} - a_n \right).$$

因此,

$$\begin{aligned} a_n &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - P_{n-1}(x)}{(x - x_0)^n} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - (n-1)!a_{n-1}}{n!(x - x_0)}, \quad (n-1 \text{ 次 L'Hôpital 法则}) \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{n!(x - x_0)}, \\ &= \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}. \quad (f^{(n)}(x_0) \text{ 的定义}) \end{aligned}$$



Taylor 多项式的特征

函数 $f(x)$ 在 x_0 点的 n 阶 Taylor 多项式

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$


$$= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n.$$

与 $f(x)$ 在 x_0 点处有相等的函数值和直到 n 阶的导数.

$$T_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0), \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$



Taylor 公式：几何意义





带 Peano 余项的 Taylor 公式

带 Peano 余项的 Taylor 公式

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某个领域内有直到 $(n-1)$ 阶的连续导数且 $f^{(n)}(x_0)$ 存在, 则 $f(x)$ 关于点 x_0 处 n 阶 Taylor 多项式的余项 $R_n(x-x_0)$ 是比 $(x-x_0)^n$, $x \rightarrow x_0$ 更高阶的无穷小.

$$R_n(x-x_0) = o((x-x_0)^n),$$

即

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + o((x-x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0.$$



带 Lagrange 余项的 Taylor 公式

带 Lagrange 余项的 Taylor 公式

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某个领域内有直到 $n+1$ 阶的连续导数
则 $f(x)$ 关于点 x_0 处 n 阶 Taylor 多项式的余项 $R_n(x-x_0)$ 满足;
存在 ξ 在 x_0 和 x 之间使得

$$R_n(x-x_0) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}.$$

即,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}.$$



带 Lagrange 余项的 Taylor 公式

注:

- ▶ 带 Lagrange 余项的 0 阶 Taylor 公式就是 Lagrange 中值定理:
存在某个 ξ 在 x_0 和 x 之间, 使得

$$f(x) = f(x_0) + f'(\xi)(x - x_0).$$



带 Lagrange 余项的 Taylor 公式

注:

- ▶ 带 Lagrange 余项的 0 阶 Taylor 公式就是 Lagrange 中值定理:
存在某个 ξ 在 x_0 和 x 之间, 使得

$$f(x) = f(x_0) + f'(\xi)(x - x_0).$$

- ▶ Peano 余项是对余项的定性描述:
余项是比 $(x - x_0)^n$ 更高阶的无穷小.



带 Lagrange 余项的 Taylor 公式

注:

- ▶ 带 Lagrange 余项的 0 阶 Taylor 公式就是 Lagrange 中值定理:
存在某个 ξ 在 x_0 和 x 之间, 使得

$$f(x) = f(x_0) + f'(\xi)(x - x_0).$$

- ▶ Peano 余项是对余项的定性描述:
余项是比 $(x - x_0)^n$ 更高阶的无穷小.
- ▶ Lagrange 余项是对余项的定量描述.

例

求函数 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2x + 4$ 在 $x_0 = -1$ 处的一阶和三阶 Taylor 公式及相应的 Lagrange 余项.



Maclaurin 公式

函数在点 $x_0 = 0$ 处的 Taylor 公式称为 Maclaurin 公式.

► 带 Peano 余项的 Maclaurin 公式:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n), \quad x \rightarrow 0.$$



Maclaurin 公式

函数在点 $x_0 = 0$ 处的 Taylor 公式称为 Maclaurin 公式.

► 带 Peano 余项的 Maclaurin 公式:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n), \quad x \rightarrow 0.$$

► 带 Lagrange 余项的 Maclaurin 公式:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!} x^{n+1},$$

其中 $0 < \theta < 1$.



常用 Maclaurin 公式

带 Lagrange 余项的 Maclaurin 公式:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!} x^{n+1},$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{m-1} \frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!} + \frac{\sin(\theta x + (2m+1)\frac{\pi}{2})}{(2m+1)!} x^{2m+1},$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m)!} + \frac{\cos(\theta x + (m+1)\pi)}{(2m+2)!} x^{2m+2},$$



常用 Maclaurin 公式

带 Lagrange 余项的 Maclaurin 公式:

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \frac{(-1)^n}{(n+1)(1+\theta x)^{n+1}} x^{n+1},$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \binom{\alpha}{2} x^2 + \cdots + \binom{\alpha}{n} \frac{x^n}{n!} + \binom{\alpha}{n+1} (1+\theta x)^{\alpha-n-1} x^{n+1},$$

$$\text{其中 } \binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!},$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \frac{1}{(1-\theta x)^{n+2}} x^{n+1}.$$



Taylor 公式

例

写出 $f(x) = \frac{\sin x}{1-x^2}$ 的带有 Peano 余项的三阶 Maclaurin 公式, 并求 $f'''(0)$ 的值.

注:

- ▶ 若对简单函数的 Maclaurin 公式进行加减乘除和变量替换可将 $f(x)$ 写为

$$f(x) = P_n(x) + o(x^n), \quad x \rightarrow 0,$$

其中 $P_n(x)$ 是 x 的 n 次多项式, 则 $P_n(x)$ 必为 $f(x)$ 的 n 次 Maclaurin 多项式. 这是 Taylor 多项式的唯一性保证的.

- ▶ 由 Taylor 多项式的唯一性, 从 Taylor 多项式的系数中可读出 $f^{(k)}(x_0)$.



Taylor 公式

例

把 $f(x) = \ln(1 + \sin^2 x)$ 在 $x = 0$ 点展开到 x^4 .

例

求下列函数的带有 Peano 余项的三阶 Maclaurin 公式:

$$(1) f(x) = e^{\sin x}, \quad (2) g(x) = \sin(e^x).$$

注:

间接展开法的核心是把函数写成多项式加高阶无穷小, 无法得到高阶无穷小时需直接展开法 (直接计算高阶导数) 写 Taylor 公式.



例

求 $f(x) = \arctan x$ 的带 Peano 余项的 n 阶 Maclaurin 公式.

注：求函数在某个点处的高阶导数时, 应注意技巧.

例 (习题 3.6 (A)-5)

求函数 $f(x) = xe^x$ 的带有 Lagrange 余项的 n 阶 Maclaurin 公式.

注:

带 Peano 余项的 Taylor 公式可以通过间接展开法求出,
但 Lagrange 余项一般不能通过间接展开法得到, 需直接求高阶
导数.



利用 Taylor 公式求极限

回顾有理函数的极限计算

例

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^3 + 4x^5 + 2x^8}{3x^3 + x^4 + 3x^{20}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 + 4x^2 + 2x^5}{3 + x + 3x^{17}} = \frac{2}{3}.$$

观后感:

- ▶ 当 $x \rightarrow 0$ 时, 有理函数的极限仅依赖于其分子和分母的最低次项.
- ▶ 对于多项式, 可以用高阶无穷小来表示更高次项:

$$2x^3 + 4x^5 + 2x^8 = 2x^3 + o(x^3),$$

$$3x^3 + x^4 + 3x^{20} = 3x^3 + o(x^3).$$



利用 Taylor 公式求极限

核心事实

当 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x) = ax^m + o(x^m)$, $g(x) = bx^n + o(x^n)$, $a, b \neq 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^m + o(x^m)}{bx^n + o(x^n)} = \begin{cases} \frac{a}{b}, & \text{if } m = n, \\ 0, & \text{if } m > n, \\ \infty, & \text{if } m < n. \end{cases}$$

注:

计算分式的极限的核心是:

将分子和分母分别写成一个单项式和比它更高阶的无穷小之和.

Taylor 多项式中最低次项(第一个非零的项)就是我们需要的单项.



利用 Taylor 公式求极限

例

► 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{\sin^3 x}.$$



利用 Taylor 公式求极限

例

► 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{\sin^3 x}.$$

► 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^6 x}{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}} + \frac{x^4}{12}}.$$



利用 Taylor 公式求极限

例

► 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \alpha x)^\beta - (1 + \beta x)^\alpha}{x^2}.$$



利用 Taylor 公式求极限

例

► 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \alpha x)^\beta - (1 + \beta x)^\alpha}{x^2}.$$

► 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[3]{x^3 + 3x} - \sqrt{x^2 - 2x} \right).$$

► 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right).$$



利用 Taylor 公式求极限

例 (自己做)

计算下列极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sin^3 2x},$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{x^2}{2}} - \sqrt{1-x^2}}{\ln(1+x^4)},$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x \ln(1+x) - x}{x^2}.$$



Taylor 公式的应用

例

设 $f(x)$ 在 (a, b) 内二阶可导, 且 $f''(x) < 0$.

证明: $\forall x_1, x_2 \in (a, b)$, 有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$



Taylor 公式的应用

例

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续且在 (a, b) 内二阶可导.

若 $f(a)$ 和 $f(b)$ 都不是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最小值.

证明: 存在 $\xi_1, \xi_2 \in (a, b)$, $\xi_1 \neq \xi_2$, 使得

$$f''(\xi_1) > 0 \text{ 且 } f''(\xi_2) > 0.$$



Taylor 公式的应用

例

设函数 $f(x)$ 满足:

- ▶ 在 $[0, 1]$ 连续且在 $(0, 1)$ 内二阶可导;
- ▶ $f(0) = f(1) = 0$;
- ▶ 在 $[0, 1]$ 上的最小值为 -1 .

证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) \geq 8$.



Taylor 公式的应用

例

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续且在 (a, b) 二阶可导.
若 $f'_+(a) = f'_-(b) = 0$, 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$|f''(\xi)| \geq 4 \cdot \frac{|f(b) - f(a)|}{(b - a)^2}.$$



函数值估计

- ▶ 若函数 $f(x)$ 在 x_0 附近有直到 $n+1$ 阶导数.

当 $|x - x_0|$ 很小时, $f(x)$ 可近似为

$$f(x) \approx T_n(f, x_0; x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$



函数值估计

- ▶ 若函数 $f(x)$ 在 x_0 附近有直到 $n+1$ 阶导数.

当 $|x - x_0|$ 很小时, $f(x)$ 可近似为

$$f(x) \approx T_n(f, x_0; x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

- ▶ 这一近似的绝对误差为

$$|R_n(x)| = |f(x) - T_n(f, x_0; x)|.$$



函数值估计

- ▶ 若函数 $f(x)$ 在 x_0 附近有直到 $n+1$ 阶导数.

当 $|x - x_0|$ 很小时, $f(x)$ 可近似为

$$f(x) \approx T_n(f, x_0; x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

- ▶ 这一近似的绝对误差为

$$|R_n(x)| = |f(x) - T_n(f, x_0; x)|.$$

- ▶ 误差 $|R_n(x)|$ 是比 $(x - x_0)^n, x \rightarrow x_0$ 高阶的无穷小.



误差估计

- ▶ 误差可由 Lagrange 余项给出

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1},$$

其中 ξ 是 x_0 与 x 之间的某个数.



误差估计

- ▶ 误差可由 Lagrange 余项给出

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1},$$

其中 ξ 是 x_0 与 x 之间的某个数.

- ▶ 若 $f^{(n+1)}(x)$ 在包含 x, x_0 的某个区间上有界, $|f^{(n+1)}(x)| \leq M$.
则有绝对误差限

$$|R_n(x)| = \frac{|f^{(n+1)}(\xi)|}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1} \leq \frac{M}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1}.$$



误差估计

- ▶ 误差可由 Lagrange 余项给出

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1},$$

其中 ξ 是 x_0 与 x 之间的某个数.

- ▶ 若 $f^{(n+1)}(x)$ 在包含 x, x_0 的某个区间上有界, $|f^{(n+1)}(x)| \leq M$.
则有绝对误差限

$$|R_n(x)| = \frac{|f^{(n+1)}(\xi)|}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1} \leq \frac{M}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1}.$$

- ▶ 若进一步 $x, x_0 \in (a, b)$,

$$|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} (b - a)^{n+1}.$$



误差估计

例

- ▶ 用 e^x 在 0 点处的 4 阶 Taylor 多项式计算常数 e 的近似值并估计误差. (已知 n 和 x , 计算近似值并估计误差.)



误差估计

例

- ▶ 用 e^x 在 0 点处的 4 阶 Taylor 多项式计算常数 e 的近似值并估计误差. (已知 n 和 x , 计算近似值并估计误差.)
- ▶ 计算 $\ln 1.1$ 的近似值, 要求误差不超过 10^{-4} . (已知 x 和误差, 求 n 及近似值.)



误差估计

例

- ▶ 用 e^x 在 0 点处的 4 阶 Taylor 多项式计算常数 e 的近似值并估计误差. (已知 n 和 x , 计算近似值并估计误差.)
- ▶ 计算 $\ln 1.1$ 的近似值, 要求误差不超过 10^{-4} . (已知 x 和误差, 求 n 及近似值.)

- ▶ 现利用公式

$$\sin x \approx x - \frac{x^3}{3!}$$

计算 $\sin x$ 的近似值, 要求误差不超过 0.001,
 x 的取值应限制在什么范围?

(已知 n 和误差, 求 x 的范围.)



华南理工大学
South China University of Technology

作业:

► 习题 3.6 (A)

2. (3)

4.

6. (3) (6)

习题 3.6 (B)

1.

3. (2)

4.

