



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 42070—2022

## 仔猪泄泻中兽医辨证论治

Treatment of piglets diarrhea based on syndrome differentiation in traditional  
Chinese veterinary medicine



2022-10-12 发布

2023-05-01 实施

国家市场监督管理总局 发布  
国家标准化管理委员会

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国农业农村部提出。

本文件由全国动物卫生标准化技术委员会(SAC/TC 181)归口。

本文件起草单位：东北农业大学。

本文件主要起草人：葛铭、刘智慧、李艳华、张瑞莉、于莉莉、王海彬。



# 仔猪泄泻中兽医辨证论治

## 1 范围

本文件描述了仔猪泄泻中兽医辨证论治。  
本文件适用于仔猪泄泻中兽医诊断和治疗。

## 2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

## 3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

## 4 总则

由于外感寒湿或内伤阴冷引起的仔猪泄泻多为仔猪寒湿泄泻证；由于湿热内侵所致，或由于细菌、病毒和球虫感染引起的仔猪泄泻多为仔猪湿热泄泻证；由于更换饲料或乘饥饲喂过量引起的仔猪泄泻多为仔猪伤食泄泻证；由于长期饮喂失调，脾胃失养引起的仔猪泄泻多为仔猪脾虚泄泻证；由于肾阳虚衰，运化失常引起的仔猪泄泻多为仔猪肾虚泄泻证。

## 5 中兽医辨证论治

### 5.1 仔猪寒湿泄泻证

#### 5.1.1 病因

多发于寒冷季节，或猪舍阴冷潮湿、天气骤变，多由外感寒湿或内伤阴冷而来。外感寒湿，侵袭肠胃，致肠胃升降失司，清浊不分，水谷并走大肠，故泄泻清稀如水；或内伤阴冷，直中胃肠，致使脾阳不振，运化无力，寒湿下注大肠而致泄泻；湿浊阻滞，肠胃气机受阻；湿浊中阻，故脘闷食少，苔白腻。

#### 5.1.2 主证

精神倦怠，夹背，弓腰，背毛粗乱，头低耳耷，喜欢扎堆或四肢压在腹下趴卧。耳寒发白，耳脉失散，鼻冷，鼻尖、山根发白，鼻孔有黏液流出，眼神呆滞，眼睑肿胀，苍白，眼圈暗青，苔白或白腻，口津滑利，间有寒颤。泄泻清稀，甚至如水样，或有未消化的饲料残渣，多呈淡土黄色，偏白，泻物气味淡，遇冷泻甚，遇暖则轻。

#### 5.1.3 治法

温中散寒，利水止泻。



#### 5.1.4 方例

见附录 A 中的 A.1。

#### 5.1.5 针治

白针时,六脉为主穴,后海、后三里为配穴。火针时,六脉、后海为主穴,百会、后三里为配穴。电针时,六脉或百会为主穴,后三里、后海为配穴。仔猪的主要穴位见附录 B。

### 5.2 仔猪湿热泄泻证

#### 5.2.1 病因

多由湿热内侵所致,一般常见于烈日暑夏,湿热主令,或猪舍高温伴湿热环境,湿热伤及肠胃,脏腑壅极,胃肠气血阻滞,致传化失常,发生泄泻。湿热下注于肠,故泻下急迫,粪色黄褐而臭;湿热互结,故泻下不爽;湿热下注,膀胱气化不利,故小便短赤;烦热口渴,苔黄腻等均为湿热内盛之象;湿热及外感虫邪也可引起湿热血痢和虫积。或由寒邪入里化热所致,加之饲养密度过大,猪舍透光透气差,粪水排除不及时,湿热积蓄、心烦气闷,槽内食物过剩或饮污浊之水,使湿热郁结胃肠,导致脾胃升降失调,传导失职,清浊不分造成泄泻。

#### 5.2.2 主证

精神沉郁,背毛粗乱。耳耷,耳尖发红,耳热如灼,鼻盘干燥,鼻尖、山根发干,鼻尖黄中带红,眼发红,眼睑肿胀,色微红,口色赤红或红绛,苔黄腻或灰黑,口津黏稠或少津。小便短赤,肛门阴户发红,呼吸增数,心跳快速,食欲废绝,排粪濒数,暴注下迫或里急后重,肛门红肿,泻粪黄褐而臭,如浆或稀粥状,黏膜暴脱,有时轻微腹痛,蜷腰卧地,泻粪稀薄,腥臭黏腻,有的泻下脓血,污秽不洁或红相白间,肠音亢进,失治则易脱水而致命。

#### 5.2.3 治法

清热化湿,行气和血。



#### 5.2.4 方例

见 A.2。根据发病情况,可同时配合西药进行治疗。

#### 5.2.5 针治

白针时,六脉为主穴,后三里、后海为配穴。血针时,带脉为主穴,蹄头、尾尖为配穴。仔猪的主要穴位见附录 B。

### 5.3 仔猪伤食泄泻证

#### 5.3.1 病因

多由更换饲料或乘饥饲喂过量,致宿食停滞,脾胃受损,运化失常,水反为湿,谷反为滞,水谷合污下注,遂成泄泻。

#### 5.3.2 主证

体色淡白,食欲废绝,肚腹胀满,隐隐作痛。耳热如灼,口色红,鼻盘干燥,眼发红,苔厚腻。粪稀黏稠,粪中夹有未消化的食物,气味酸臭或恶臭,暖气吐酸,屁粪同泄,常伴呕吐,泄吐之后痛减。

### 5.3.3 治法

消积导滞,调和脾胃。

### 5.3.4 方例

见 A.3。

### 5.3.5 针治

白针时,脾俞为主穴,后海、后三里、关元俞为配穴。仔猪的主要穴位见附录 B。

## 5.4 仔猪脾虚泄泻证

### 5.4.1 病因

多由长期饮喂失调,或饲料质劣,脾胃失养而致虚弱。脾虚则不运,胃虚则不化,脾胃虚弱,升降失司,清浊不分,故大便时溏时泻;脾阳不振,胃气虚弱,纳运无权则饮食减少,食后脘腹胀闷不舒,稍进油腻之物则大便次数增多。

### 5.4.2 主证

体瘦毛焦,四肢无力。鼻寒耳冷,呼吸之气偏冷,鼻盘、山根淡白,鼻孔有黏液流出,耳脉失散,发白,耳根淡白发蔫,或耷耳,眼无神昏暗,眼睑肿胀。舌淡苔白,口润津稠,舌质软绵,苔白或腻。病初食欲减少,饮水增多,腹内肠鸣,大便时溏时泻,粪中带水,粪渣粗大,或完谷不化,稍进油腻之物则大便次数增多,食欲大减,甚者停食,排粪次多量少,泻物稀薄,如粥似糊,略混黏膜,稍有腥臭,渣水调匀,黏腻不分,粘在肛周污秽,尿短质浓,腹部虚胀,触胃虚软,痕陷难复,胃音低沉,波幅短缩,抑或无音,肠音衰弱,后期水湿下注,四肢浮肿。

### 5.4.3 治法

补脾益气,利水止泻。

### 5.4.4 方例

见 A.4。

### 5.4.5 针治

白针为主,配合电针和火针。白针、电针、火针时,脾俞为主穴,后三里、后海、关元俞为配穴。仔猪的主要穴位见附录 B。

## 5.5 仔猪肾虚泄泻证

### 5.5.1 病因

脾的运化全靠肾阳的蒸运,肾阳虚衰,命门之火不能温煦脾土,运化失常,黎明之前,阳气未复而阴气极盛,故脐腹作痛,肠鸣泄泻,泻后腑气通利,故泻后即安。

### 5.5.2 主证

精神沉郁,头低耳耷,鼻寒耳冷。耳根、耳后根及下唇苍白,或青白,耳根肿胀,耳脉失散,鼻孔有黏液流出,鼻尖、山根青白,眼无神昏暗,眼圈发暗,口色如绵,舌淡苔白。毛焦耷吊,腰膝无力,卧多立

少,四肢厥逆,久泻不愈,夜间泻重,黎明之前,脐腹作痛,肠鸣即泻,泻后稍安,腰膝酸软,日久腹下或四肢浮肿,严重时肛门失禁,粪水外溢,腹下或后肢浮肿。

### 5.5.3 治法

温肾健脾,涩肠止泻。

### 5.5.4 方例

见 A.5。

### 5.5.5 针治

火针为主,配合白针、电针或艾灸。火针、白针、电针、艾灸时,肾俞为主穴,后海、后三里、百会、脾俞为配穴。仔猪的主要穴位见附录 B。



## 附录 A

(资料性)

## 仔猪泄泻的方例

## A.1 仔猪寒湿泄泻证方例

五苓散(猪苓 6 g、茯苓 6 g、泽泻 9 g、白术 6 g、桂枝 5 g,共为末,或水煎)加减。寒重,加干姜、茴香;水泻重,加诃子、乌梅、天仙子。或选用藿香正气散(藿香 9 g、紫苏 3 g、白芷 3 g、大腹皮 3 g、茯苓 3 g、白术 6 g、半夏曲 6 g、厚朴 6 g、桔梗 6 g、炙甘草 8 g,共为末,或水煎)。1 kg 饲料中加中药方剂 3 g~5 g,或水煎服,1 g 中药方剂煎成 1 mL,按仔猪每 10 kg 体重灌服 1 mL~1.5 mL,连用 5 d~7 d。

## A.2 仔猪湿热泄泻证方例

白头翁散(白头翁 12 g、黄柏 6 g、黄连 9 g、秦皮 12 g,共为末,或水煎)加减。热毒甚者,加马齿苋、银花、连翘;腹痛明显者,加白芍、甘草;口渴贪饮者,加葛根、麦门冬、玄参、沙参;里急后重剧烈者,加枳壳、槟榔。或选用复方郁金诃子散(郁金 12 g、诃子 12 g、黄芩 12 g、大黄 12 g、黄连 12 g、黄柏 9 g、栀子 12 g、白芍 12 g,共为末,或水煎)。或选用葛根芩连汤(葛根 30 g、黄芩 20 g、黄连 5 g、炙甘草 5 g,共为末,或水煎)。湿热血痢和虫积可选用复方青蒿常山散(青蒿 10 g、常山 10 g、苦参 10 g、黄柏 8 g、白头翁 8 g、柴胡 6 g、黄芪 6 g,共为末,或水煎)。1 kg 饲料中加中药方剂 3 g~5 g,或水煎服,1 g 中药方剂煎成 1 mL,按仔猪每 10 kg 体重灌服 1 mL~1.5 mL,连用 5 d~7 d。

## A.3 仔猪伤食泄泻证方例

焦三仙(焦神曲 6 g、焦麦芽 6 g、焦山楂 6 g,共为末,或水煎),或选用保和散(山楂 6 g、六曲 6 g、半夏 3 g、茯苓 3 g、陈皮 3 g、连翘 3 g、莱菔子 3 g,共为末,或水煎)加减。食滞重者,加大黄、枳实、槟榔;水泻甚者,加猪苓、木通、泽泻;热盛者,加黄芩、黄连。或选用木香导滞散(木香 4 g、槟榔 4 g、枳实 9 g、大黄 12 g、六曲 9 g、茯苓 6 g、黄芩 4 g、黄连 3 g、白术 4 g、泽泻 3 g,共为末,或水煎)。1 kg 饲料中加中药方剂 3 g~5 g,或水煎服,1 g 中药方剂煎成 1 mL,按仔猪每 10 kg 体重灌服 1 mL~1.5 mL,连用 5 d~7 d。一时轻症也可不治,绝食或减食一二日即可。

## A.4 仔猪脾虚泄泻证方例

四君子汤(党参 6 g、炒白术 6 g、茯苓 6 g、炙甘草 3 g,共为末,或水煎),若泄泻重,加诃子、肉豆蔻。或选用参苓白术散(党参 9 g、白术 9 g、茯苓 9 g、炙甘草 9 g、山药 9 g、扁豆 12 g、莲子肉 6 g、桔梗 6 g、薏苡仁 6 g、砂仁 6 g,共为末,或水煎)。久泻气陷可选用补中益气汤(炙黄芪 9 g、党参 6 g、白术 6 g、当归 6 g、陈皮 6 g、炙甘草 5 g、升麻 3 g、柴胡 3 g,共为末,或水煎)加减。1 kg 饲料中加中药方剂 3 g~5 g,或水煎服,1 g 中药方剂煎成 1 mL,按仔猪每 10 kg 体重灌服 1 mL~1.5 mL,连用 7 d。

## A.5 仔猪肾虚泄泻证方例

巴戟散(巴戟天 9 g、肉苁蓉 9 g、补骨脂 9 g、胡芦巴 9 g、小茴香 6 g、肉豆蔻 6 g、陈皮 6 g、青皮


6 g、肉桂 4 g、木通 4 g、川楝子 4 g、槟榔 3 g,共为末,或水煎)去槟榔,加茯苓、猪苓等。或选用四神散(炒补骨脂 12 g、煨肉豆蔻 6 g、五味子 6 g、吴茱萸 3 g,共为末,或水煎),另用生姜 12 g、大枣 12 g 合四君子汤(党参 6 g、炒白术 6 g、茯苓 6 g、炙甘草 3 g,共为末,或水煎)加減。1 kg 饲料中加中药方剂 3 g~5 g,或水煎服,1 g 中药方剂煎成 1 mL,按仔猪每 10 kg 体重灌服 1 mL~1.5 mL,连用 7 d。





附 录 B  
(资料性)  
仔猪的主要穴位

仔猪的主要穴位见图 B.1。



标引序号说明：

- 1 —— 六脉；
- 2 —— 百会；
- 3 —— 肾俞；
- 4 —— 后海；
- 5 —— 尾尖；
- 6 —— 后三里；
- 7 —— 蹄头；
- 8 —— 关元俞；
- 9 —— 脾俞；
- 10 —— 带脉。

图 B.1 仔猪的主要穴位