



北京航空航天大学  
BEIHANG UNIVERSITY

# 矩阵理论

---

王磊

自动化科学与电气工程学院

# 第四章 矩阵分析

---

- 向量范数
  - 矩阵范数
  - 相容范数
  - 矩阵扰动分析
  - 特征值估计
- 矩阵级数
  - 矩阵函数
  - 函数矩阵
  - 应用：主元分析法



# 第四章 矩阵分析

---

## 矩阵扰动分析（自学）

## 第四章 矩阵分析——矩阵扰动分析

---

**例4.4.1** 考察线性方程组  $Ax = b$ , 其中  $x = [x_1, x_2]^T$ ,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0.99 \\ 0.99 & 0.98 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$



## 第四章 矩阵分析——矩阵扰动分析

**例4.4.1** 考察线性方程组  $Ax = b$ , 其中  $x = [x_1, x_2]^T$ ,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0.99 \\ 0.99 & 0.98 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

通过计算得, 该方程的精确解为

$$x_1 = 100, \quad x_2 = -100$$



## 第四章 矩阵分析——矩阵扰动分析

**例4.4.1** 考察线性方程组  $Ax = b$ , 其中  $x = [x_1, x_2]^T$ ,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0.99 \\ 0.99 & 0.98 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

通过计算得, 该方程的精确解为

$$x_1 = 100, \quad x_2 = -100$$

若系数矩阵  $A$  有一扰动  $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0.01 \end{bmatrix}$ , 并且右端  $b$  也有

一扰动  $\begin{bmatrix} 0 \\ 0.001 \end{bmatrix}$ , 则扰动后的线性方程组为

## 第四章 矩阵分析——矩阵扰动分析

---

$$\begin{bmatrix} 1 & 0.99 \\ 0.99 & 0.99 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1.001 \end{bmatrix}$$

通过计算得, 该方程组的精确解为  $x_1 = -\frac{1}{10}$ ,  $x_2 = \frac{10}{9}$ .

对比两组解向量知, 系数矩阵和右端项的微小扰动会引起解的强烈变化. 同时, 注意例4.4.1本身并没有截断误差和舍入误差, 因此原始数据的扰动对问题解的影响程度取决于问题本身的固有性质.

## 第四章 矩阵分析——矩阵扰动分析

---

**定义4.4.1（病态问题）** 病态问题是指输出结果相对于输入非常敏感的问题, 输入数据中哪怕是极少（或者极微妙）的扰动也会导致输出的较大改变. 相反的, 对于输入不敏感的问题, 我们称为良态问题.

矩阵扰动分析就是研究矩阵元素的变化对矩阵问题解的影响, 它对矩阵理论和矩阵计算都具有重要意义. 这里仅简要介绍矩阵 $A$ 的逆矩阵、以 $A$ 为系数矩阵的线性方程组的扰动分析.



## 第四章 矩阵分析——矩阵扰动分析

为讨论方便, 假定 $\|\cdot\|$ 为 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 上满足 $\|I\| = 1$ 的相容矩阵范数. 我们需要解决:

- (1) 什么条件下 $A + E$ 非奇异?
- (2) 当 $A + E$ 非奇异时,  $(A + E)^{-1}$ 与 $A^{-1}$ 的近似程度.

**定理4.4.1** 设 $A$ 和 $E \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ,  $B = A + E$ . 若 $A$ 与 $B$ 均非奇异, 则

$$\frac{\|B^{-1} - A^{-1}\|}{\|A^{-1}\|} \leq \|A\| \|B^{-1}\| \frac{\|E\|}{\|A\|}$$

## 第四章 矩阵分析——矩阵扰动分析

**定理4.4.2** 设  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$  是非奇异矩阵,  $E \in \mathbb{C}^{n \times n}$ , 且满足条件  $\|A^{-1}E\| < 1$ , 则  $A + E$  非奇异, 并且有

$$\|(A + E)^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}E\|}$$
$$\frac{\|(A + E)^{-1} - A^{-1}\|}{\|A^{-1}\|} \leq \frac{\|A^{-1}E\|}{1 - \|A^{-1}E\|}$$



## 第四章 矩阵分析——矩阵扰动分析

**推论4.4.1** 设  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$  是非奇异矩阵,  $E \in \mathbb{C}^{n \times n}$  满足条件  $\|A^{-1}E\| < 1$ , 则  $A + E$  非奇异, 并且有

$$\frac{\|(A + E)^{-1} - A^{-1}\|}{\|A^{-1}\|} \leq \frac{\kappa(A) \frac{\|E\|}{\|A\|}}{1 - \kappa(A) \frac{\|E\|}{\|A\|}}$$

其中,  $\kappa(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$ .

推论表明,  $\kappa(A)$  反映了  $A^{-1}$  对于  $A$  的扰动的敏感性  $\kappa(A)$  愈大,  $(A + E)^{-1}$  与  $A^{-1}$  的相对误差就愈大.

## 第四章 矩阵分析——矩阵扰动分析

**定义4.4.1（条件数）** 设 $n$ 阶矩阵 $A$ 非奇异, 称 $\kappa(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$  为 $A$ 关于求逆的条件数, 也称为求解线性方程组 $Ax = b$ 的条件数.

**注1:** 条件数就是用来衡量输出相对于输入敏感度的指标. 良态问题和病态问题就是靠这个指标进行区分的: 如果 $\kappa(A)$ 很大, 则矩阵 $A$ 关于求逆是病态的.

## 第四章 矩阵分析——矩阵扰动分析

---

现考查线性方程组

$$Ax = b$$

如果系数矩阵 $A$ 和右端项 $b$ 分别有扰动项 $E$ 和 $\delta b$ , 则扰动后方程组为

$$(A + E)(x + \delta x) = b + \delta b$$

且有如下定理:

**定理4.4.3** 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是非奇异矩阵,  $b$ 和 $\delta b \in \mathbb{C}^n$ ,  $x$ 是原线性方程组的解. 如果 $E \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 满足条件  $\|A^{-1}E\| < 1$ , 则上述扰动后方程组有唯一解 $x + \delta x$ ,

## 第四章 矩阵分析——矩阵扰动分析

且有

$$\frac{\|\delta \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \frac{\kappa(A)}{1 - \kappa(A) \frac{\|E\|}{\|A\|}} \left( \frac{\|E\|}{\|A\|} + \frac{\|\delta \mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|} \right)$$

该式表明,  $\kappa(A)$ 反映了 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解 $\mathbf{x}$ 的相对误差对于 $A$ 和 $\mathbf{b}$ 的相对误差的依赖程度. 在求矩阵的逆或求解线性方程组时, 可以通过变换降低矩阵的条件数, 即所谓的预处理或预条件.

## 第四章 矩阵分析——矩阵扰动分析

### 例4.4.2 考查线性方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & 10^5 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10^5 \\ 2 \end{bmatrix}$$

的求解问题.

**注2:** 条件数 $\kappa(A)$ 大的两个常见原因: 矩阵的列之间的相关性过大 (此时矩阵为奇异或接近奇异的, 见例4.4.1) 和矩阵的特征值差异大 (见例4.4.2) .

# 第四章 矩阵分析

---

## 特 征 值 估 计





## 第四章 矩阵分析——特征值估计

**定义4.5.1 (谱和谱半径)** 给定复方阵  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ , 记  $S_p(A) = \{\lambda | \lambda \text{ 是 } A \text{ 的特征值}\}$ , 则称  $S_p(A)$  是矩阵  $A$  的**谱**, 称  $A$  的特征值模的最大值为  $A$  的**谱半径**, 记为  $\rho(A)$ .

**例4.5.1** 求  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2i \end{bmatrix}$  的谱半径  $\rho(A)$ .

**思考:** 矩阵的谱半径可定义矩阵范数吗?

## 第四章 矩阵分析——特征值估计

---

**例4.5.2** 求  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$  的谱半径  $\rho(A)$ ,  $\|A\|_1$ ,  $\|A\|_\infty$ ,  $\|A\|_2$  和  $\|A\|_F$ .



## 第四章 矩阵分析——特征值估计

---

**定理4.5.1** 复方阵的谱半径不大于它的任一矩阵范数.

**定理4.5.2** 设  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ , 任取正常数  $\epsilon$ , 则必存在某个矩阵范数  $\|\cdot\|$  使得  $\|A\| \leq \rho(A) + \epsilon$ .

## 第四章 矩阵分析——特征值估计

**定理4.5.1** 复方阵的谱半径不大于它的任一矩阵范数.

**定理4.5.2** 设  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ , 任取正常数  $\epsilon$ , 则必存在某个矩阵范数  $\|\cdot\|$  使得  $\|A\| \leq \rho(A) + \epsilon$ .

**注1:** 定理4.5.2中构造的矩阵范数与给定的矩阵  $A$  有关. 因此, 当用矩阵  $A$  构造的矩阵范数来计算矩阵  $B$  ( $B \neq A$ ) 矩阵范数时, 不等式  $\|B\| \leq \rho(B) + \epsilon$  不一定成立.

## 第四章 矩阵分析——特征值估计

**定义4.5.2（盖尔圆盘）** 设  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ , 令

$$\delta_i = \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|, i = 1, \dots, n$$

并定义  $G_i = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - a_{ii}| \leq \delta_i\}$ ,  $i = 1, \dots, n$

即  $G_i$  是复平面上以  $a_{ii}$  为圆心,  $\delta_i$  为半径的闭圆盘, 称之为矩阵  $A$  的一个**盖尔圆盘**.


## 第四章 矩阵分析——特征值估计

---

**例4.5.3** 计算矩阵  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0.02 & 0.11 \\ 0.01 & i & 0.14 \\ 0.02 & 0.01 & 0.5 \end{bmatrix}$  的盖尔圆盘.

## 第四章 矩阵分析——特征值估计

**例4.5.3** 计算矩阵  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0.02 & 0.11 \\ 0.01 & i & 0.14 \\ 0.02 & 0.01 & 0.5 \end{bmatrix}$  的盖尔圆盘.



## 第四章 矩阵分析——特征值估计

---

**定理4.5.3（盖尔圆盘定理）** 设  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$  的  $n$  个盖尔圆盘  $G_1, \dots, G_n$ , 则矩阵  $A$  的任一特征值  $\lambda \in \bigcup_{i=1}^n G_i$ .






## 第四章 矩阵分析——特征值估计

---

**例4.5.4** 试估计矩阵  $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & 2i & 0 \\ 0 & -i & 10 & i \\ -2 & 0 & 0 & 6i \end{bmatrix}$  的特  
征值分布.

## 第四章 矩阵分析——特征值估计

**例4.5.4** 试估计矩阵  $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & 2i & 0 \\ 0 & -i & 10 & i \\ -2 & 0 & 0 & 6i \end{bmatrix}$  的特  
征值分布.



## 第四章 矩阵分析——特征值估计

$A^T$  的4个盖尔圆为:


$$G'_1: |z - 2| \leq 3;$$

$$G'_2: |z - 3| \leq 2;$$

$$G'_3: |z - 10| \leq 4;$$

$$G'_4: |z - 6i| \leq 1.$$

$A$  的4个特征值都在  $\bigcup_{i=1}^4 G'_i$  中.



## 第四章 矩阵分析——特征值估计

---

**注2:** 设 $A^T$ 的盖尔圆为 $G'_1, \dots, G'_n$ , 则 $G_i$ 与 $G'_i$ 有相同的圆心. 因此, 矩阵 $A$ 的特征值必须满足

$$\lambda \in \left( \bigcup_{i=1}^n G_i \right) \cap \left( \bigcup_{i=1}^n G'_i \right)$$



## 第四章 矩阵分析——特征值估计

---

思考： $n$ 阶复方阵 $A$ 的 $n$ 个特征值是否恰好落入它的 $n$ 个盖尔圆内？

## 第四章 矩阵分析——特征值估计

---

思考： $n$ 阶复方阵 $A$ 的 $n$ 个特征值是否恰好落入它的 $n$ 个盖尔圆内？

**例4.5.5** 考查矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & -0.4 \\ 0.9 & 1 \end{bmatrix}$ , 其盖尔圆为

$$G_1: |z| \leq 0.4, \quad G_2: |z - 1| \leq 0.9$$




## 第四章 矩阵分析——特征值估计

**例4.5.5** 考查矩阵  $A = \begin{bmatrix} 0 & -0.4 \\ 0.9 & 1 \end{bmatrix}$ , 其盖尔圆为  
 $G_1: |z| \leq 0.4, \quad G_2: |z - 1| \leq 0.9$

经解析计算矩阵  $A$  的特征值为  $\lambda_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{0.44i}}{2}$ .

所以, 并非每个盖尔圆内都恰好有一个特征值.



## 第四章 矩阵分析——特征值估计

---

**定理4.5.4（盖尔圆盘定理续）** 设  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$  的  $n$  个盖尔圆盘为  $G_1, \dots, G_n$ , 若其中的  $k$  个盖尔圆盘的并集形成一个连通的区域, 且该区域与其余  $n - k$  个圆盘都不相交, 则此连通域内恰有  $k$  个特征值. 特别地, 孤立盖尔圆内有且仅有一个特征值.





## 第四章 矩阵分析——特征值估计

---

**推论4.5.1** 设矩阵  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$  的  $n$  个盖尔圆盘为  $G_1, \dots, G_n$ , 若原点  $0 \notin \bigcup_{i=1}^n G_i$ , 则矩阵  $A$  为非奇异矩阵.



## 第四章 矩阵分析——特征值估计

**推论4.5.2** 设矩阵  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$  是对角占优矩阵, 对即  $i = 1, \dots, n$ , 有

$$|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|, \quad (\text{列对角占优})$$

$$\text{或 } |a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ji}|, \quad (\text{行对角占优})$$

则矩阵  $A$  非奇异.

## 第四章 矩阵分析——特征值估计

---

**推论4.5.3** 若复方阵 $A$ 有 $k$ 个孤立的盖尔圆, 则它至少有 $k$ 个互异的特征值. 特别地, 若矩阵 $A$ 的所有盖尔圆两两互不相交, 则 $A$ 是单纯矩阵.

**推论4.5.4** 若实方阵 $A$ 有 $k$ 个孤立的盖尔圆, 则它至少有 $k$ 个互异的实特征值. 特别地, 若矩阵 $A$ 的所有盖尔圆两两互不相交, 则它有至少 $n$ 个互异的是特征值.

## 第四章 矩阵分析——特征值估计

**例4.5.6** 证明 $n$ 阶矩阵 $A$ 是单纯矩阵, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 2 & \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{n} & 4 & \frac{1}{n} & \cdots & \frac{1}{n} \\ & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \cdots & 2n \end{bmatrix}$$



## 第四章 矩阵分析——特征值估计

---


**例4.5.7** 证明矩阵 $A$ 至少有两个特征值, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 9 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 8 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## 第四章 矩阵分析——特征值估计

**例4.5.7** 证明矩阵 $A$ 至少有两个特征值, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 9 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 8 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



## 第四章 矩阵分析——特征值估计

**注3:** 在使用盖尔圆估计矩阵 $A$ 的特征值时, 我们总希望获得更多的孤立圆, 这时可采取如下方法:

取合适的非零实数 $d_1, \dots, d_n$ , 并令

$$D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$$

则

$$B = DAD^{-1} = (a_{ij} \frac{d_i}{d_j})_{n \times n}$$

显然, 矩阵 $A$ 与 $B$ 相似, 它们具有相同的特征值.

## 第四章 矩阵分析——特征值估计

---

### 注3（续）：

通常 $d_i$ 的选取办法为：

- （1）若取 $d_i < 1$ , 其余元素为1, 则第 $i$ 个盖尔圆 $G_i$ 会缩小, 其余所有盖尔圆会放大;
- （2）若取 $d_i > 1$ , 其余元素为1, 则第 $i$ 个盖尔圆 $G_i$ 会放大, 其余所有盖尔圆会缩小;





## 第四章 矩阵分析——特征值估计


---

**例4.5.8** 估计复方阵  $A = \begin{bmatrix} 9 & 1 & 1 \\ 1 & i & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$  的特征值分布范围.

## 第四章 矩阵分析——特征值估计

**例4.5.8** 估计复方阵  $A = \begin{bmatrix} 9 & 1 & 1 \\ 1 & i & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$  的特征值分布范围.


$$D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



## 第四章 矩阵分析——特征值估计

**例4.5.8** 估计复方阵  $A = \begin{bmatrix} 9 & 1 & 1 \\ 1 & i & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$  的特征值分布范围.

$$D = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



## 第四章 矩阵分析——特征值估计

---

**例4.5.9** 利用盖尔圆定理考察矩阵  $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$  的特征值分布.



## 第四章 矩阵分析——特征值估计

---

**例4.5.9** 利用盖尔圆定理考察矩阵  $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$  的特征值分布.

$$\text{取 } D = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则 } B = \begin{bmatrix} 0 & -k \\ 1/k & 0 \end{bmatrix}$$



# 第四章 矩阵分析

---

## 矩 阵 级 数

## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

**定义4.6.1（向量序列按范数收敛）** 设 $(V, \|\cdot\|_\alpha)$ 是 $n$ 维赋范线性空间,  $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_k, \dots$ 是 $V$ 中一个向量序列, 记为 $\{\mathbf{x}_k\}$ . 若存在 $V$ 的向量 $\mathbf{x}$ 满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}\|_\alpha = 0$$

则称向量序列 $\{\mathbf{x}_k\}$ 按范数 $\|\cdot\|_\alpha$ 收敛于 $\mathbf{x}$ , 记作

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}_k = \mathbf{x} \text{ 或 } \mathbf{x}_k \xrightarrow{\alpha} \mathbf{x}$$

不收敛的向量称为是发散的.

## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

---

**例4.6.1** 设 $V = \mathbb{R}$ ,  $\|\cdot\|_\alpha$ 取为绝对值, 则定义4.6.1中敛散性与高等数学中的相关概念一致.



## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

---

**例4.6.1** 设 $V = \mathbb{R}$ ,  $\|\cdot\|_\alpha$ 取为绝对值, 则定义4.6.1中敛散性与高等数学中的相关概念一致.

**定理4.6.1** 设 $(V, \|\cdot\|)$ 是 $n$ 维赋范线性空间,  $\{x_k\}$ 是 $V$ 的一个向量序列. 若序列 $\{x_k\}$ 按某种范数收敛于 $x$ , 则序列 $\{x_k\}$ 按任意范数收敛于 $x$ , 即有限维空间中按范数收敛是等价的.

## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

**定义4.6.2（向量序列按坐标收敛）** 设 $(V, \|\cdot\|_\alpha)$ 是 $n$ 维赋范线性空间,  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$ 是 $V$ 中一组基,  $\{x_k\}$ 是 $V$ 中一个向量序列, 并记向量序列 $\{x_k\}$ 中的任一向量 $x_k$ 在 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$ 下坐标为

$$\xi_k = [\xi_1^{(k)}, \dots, \xi_n^{(k)}]^T \in F^n$$

若存在 $V$ 的向量 $x$ 满足  $\lim_{k \rightarrow \infty} \xi_i^{(k)} = \xi_i, i = 1, \dots, n$

则称**向量序列 $\{x_k\}$ 按坐标收敛于向量 $x$** , 其中 $\xi$ 是向量 $x$ 在基 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$ 下坐标.

## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

---

**定理4.6.2** 设 $(V, \|\cdot\|)$ 是 $n$ 维赋范线性空间,  $\{x_k\}$ 是 $V$ 的一个向量序列且 $x \in V$ . 向量序列 $\{x_k\}$ 按范数收敛于向量 $x$ 当且仅当它按坐标收敛于 $x$ .



## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

**定义4.6.3（矩阵序列按坐标收敛）** 设矩阵序列 $\{A_k\}$ , 其中矩阵 $A_k = (a_{ij}^{(k)}) \in \mathbb{C}^{m \times n}$ ,  $k = 1, 2, \dots$ , 如果当  $k \rightarrow \infty$  时, 矩阵 $A_k$ 的每一个元素 $a_{ij}^{(k)}$ 都有极限 $a_{ij}^{(0)}$ , 即  $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(0)}$ ,  $1 \leq i \leq m$ ,  $1 \leq j \leq n$  则称**矩阵序列按元素收敛或按坐标收敛**（或简称为**矩阵序列 $\{A_k\}$ 收敛**）,  $A_0 = (a_{ij}^{(0)})$ 称为**序列的极限**, 记为  $\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = A_0$ .



## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

---

**例4.6.2** 设  $A_k = \begin{bmatrix} \frac{2k^2+k+1}{k^2} & \frac{\sin k}{k} \\ e^{-k} \sin k & (1 + \frac{1}{2k})^k \end{bmatrix}$ , 求极限

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_k.$$

## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

**命题4.6.1** 设矩阵序列 $\{A_k\}$ 和 $\{B_k\}$ 分别收敛于矩阵 $A$ 和 $B$ , 则对任意 $c_1, c_2 \in \mathbb{C}$ , 有

$$(1) \lim_{k \rightarrow \infty} (c_1 A_k + c_2 B_k) = c_1 A + c_2 B, \text{ 其中 } A_k, B_k \in \mathbb{C}^{m \times n};$$

$$(2) \lim_{k \rightarrow \infty} (A_k B_k) = AB, \text{ 其中 } A_k \in \mathbb{C}^{m \times n}, B_k \in \mathbb{C}^{n \times p};$$

$$(3) \text{ 若 } A_k \text{ 和 } A \text{ 为可逆矩阵, 则 } \lim_{k \rightarrow \infty} A_k^{-1} = A^{-1}.$$

## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

---

**推论4.6.1** 设 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{C}^{m \times n}$ 上任一矩阵范数,  $\mathbb{C}^{m \times n}$ 中矩阵序列 $\{A_k\}$ 收敛于矩阵 $A_0$ 的充分必要条件是

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|A_k - A_0\| = 0.$$



## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

---

**推论4.6.2** 复方阵 $A$ 的某一范数满足 $\|A\| < 1$ , 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = 0.$$

思考: 若 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = 0$ , 则 $\|A\| < 1$ 成立吗?





## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

**推论4.6.2** 复方阵 $A$ 的某一范数满足 $\|A\| < 1$ , 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = 0.$$

思考: 若 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = 0$ , 则 $\|A\| < 1$ 成立吗?

$$A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0 \\ 1 & 0.1 \end{bmatrix} \Rightarrow A^k = \begin{bmatrix} 0.1^k & 0 \\ k0.1^{k-1} & 0.1^k \end{bmatrix}$$



## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

---

**定理4.6.3** 设  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ,  $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = 0$  的充分必要条件是  $\rho(A) < 1$ .



## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

**定理4.6.3** 设  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ,  $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = 0$  的充分必要条件是  $\rho(A) < 1$ .

$$J_i^k = \begin{bmatrix} \lambda_i^k & C_k^1 \lambda_i^{k-1} & C_k^2 \lambda_i^{k-2} & \cdots & C_k^{n_i-1} \lambda_i^{k-n_i+1} \\ & \lambda_i^k & C_k^1 \lambda_i^{k-1} & \cdots & C_k^{n_i-2} \lambda_i^{k-n_i+2} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & \lambda_i^k & C_k^1 \lambda_i^{k-1} \\ & & & & \lambda_i^k \end{bmatrix}$$



## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

---

**例4.6.3** 设  $A = \begin{bmatrix} c & 2c \\ 3c & 4c \end{bmatrix}$ , 其中  $c$  为实数. 求  $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = 0$  的充分必要条件.



## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

---

**推论4.6.3** 若复方阵 $A$ 的某一矩阵范数满足 $\|A\| < 1$ , 则矩阵序列 $\{A_k\}$ 收敛于零矩阵.



## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

**定义4.6.4（矩阵级数）** 设矩阵序列 $\{A_k \in \mathbb{C}^{m \times n}\}$ , 称 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$  为**矩阵级数**. 令 $S_N = \sum_{k=1}^N A_k$ , 称 $S_N$ 为**矩阵级数的部分和**. 若矩阵序列 $\{S_N\}$ 收敛且有极限 $S$ , 即 $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = S$ , 则称矩阵级数 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ **收敛且有和 $S$** . 不收敛的矩阵级数称为**发散级数**.



## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

---

**例4.6.4** 设  $A_k = \begin{bmatrix} \frac{1}{k(k+1)} & 0 \\ 0 & \frac{2k}{3^k} \end{bmatrix}$ ,  $k = 1, 2, \dots$ , 求级数  $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ .

## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

**例4.6.4** 设  $A_k = \begin{bmatrix} \frac{1}{k(k+1)} & 0 \\ 0 & \frac{2k}{3^k} \end{bmatrix}$ ,  $k = 1, 2, \dots$ , 求级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} A_k.$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = 1$$

当  $|x| < 1$  时,

$$1 + x + x^2 + \dots + x^k + \dots = \frac{1}{1-x}$$

$$1 + 2x + 3x^2 + \dots + kx^{k-1} + \dots = \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$x + 2x^2 + 3x^3 + \dots + kx^k + \dots = \frac{x}{(1-x)^2}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k}{3^k} = 2 \sum_{k=1}^{\infty} k \left(\frac{1}{3}\right)^k = \frac{3}{2}$$



## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

**命题4.6.2** 设  $A_k \in \mathbb{C}^{m \times n}$ , 则以下命题成立:

(1)  $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$  收敛  $\Leftrightarrow mn$  个数值级数  $\sum_{k=1}^{\infty} a_{ij}^{(k)}$  收敛;

(2)  $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$  发散  $\Leftrightarrow mn$  个数值级数  $\sum_{k=1}^{\infty} a_{ij}^{(k)}$  中至少有一个发散;

(3)  $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$  收敛  $\Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} A_k = 0$ .



## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

---

**定义4.6.5（矩阵级数绝对收敛）** 设  $A_k \in \mathbb{C}^{m \times n}$ , 若矩阵级数  $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$  所对应的  $mn$  个数值级数  $\sum_{k=1}^{\infty} a_{ij}^{(k)}$ ,  $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$  均绝对收敛, 则称  $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$  **绝对收敛**.



## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

**命题4.6.3** 设 $A_k \in \mathbb{C}^{m \times n}$ , 则以下命题成立:

- (1) 若 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 绝对收敛, 则 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 收敛. 但 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 收敛并不蕴含 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 绝对收敛;
- (2) 若 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 绝对收敛于 $S$ , 对 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 任意重组重排得矩阵级数 $\sum_{k=1}^{\infty} B_k$ , 则 $\sum_{k=1}^{\infty} B_k$ 绝对收敛于 $S$ ;
- (3) 对任意常矩阵 $P \in \mathbb{C}^{p \times m}$ 和 $Q \in \mathbb{C}^{n \times q}$ , 若矩阵级数 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$  (绝对) 收敛, 则矩阵级数 $\sum_{k=1}^{\infty} P A_k Q$  (绝对) 收敛. 反之则不然.

## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

---

**例4.6.5** 考查矩阵级数  $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$  的敛散性, 其中

$$A_k = \begin{bmatrix} (-1)^{k+1} \frac{1}{k} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

---

**定理4.6.4** 设  $A_k = (a_{ij}^{(k)}) \in \mathbb{C}^{m \times n}$ , 矩阵级数  $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$  绝对收敛当且仅当对任意矩阵范数, 数值级数  $\sum_{k=1}^{\infty} \|A_k\|$  收敛.



## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

**例4.6.6** 考查矩阵级数  $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$  的敛散性, 其中

$$A_k = \begin{bmatrix} \frac{1}{3^k} & 0 \\ 0 & \frac{1}{k(k+1)} \end{bmatrix}$$



## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

---

**定义4.6.6（矩阵幂级数）** 设  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ , 定义矩阵级数  $\sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$ , 其中  $A^0 = I$ , 则称该级数为**矩阵幂级数**.

## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

**引理4.6.1** 设  $z \in \mathbb{C}$ , 若幂级数  $\sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m$  在  $z = z_0$  点收敛, 则对满足不等式  $|z| < |z_0|$  的幂级数都绝对收敛. 反之, 若幂级数  $\sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m$  在  $z = z_0$  点发散, 则对于  $|z| > |z_0|$  的幂级数都发散.

若存在非负实数或无穷大数  $R$  满足  $|z| < r$  时, 幂级数  $\sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m$  收敛; 而  $|z| > r$  时, 幂级数  $\sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m$  都发散, 则称  $r$  为**收敛半径**.





## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

**定理4.6.5 (Abel型定理)** 设复变量幂级数  $\sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m$  的收敛半径为  $r$ , 矩阵  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$  的谱半径为  $\rho(A)$ , 则

- (1) 当  $\rho(A) < r$ ,  $\sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$  绝对收敛;
- (2) 当  $\rho(A) > r$ ,  $\sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$  发散.



## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

**定理4.6.5 (Abel型定理)** 设复变量幂级数  $\sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m$  的收敛半径为  $r$ , 矩阵  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$  的谱半径为  $\rho(A)$ , 则

- (1) 当  $\rho(A) < r$ ,  $\sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$  绝对收敛;
- (2) 当  $\rho(A) > r$ ,  $\sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$  发散.

**注1:** 当  $\rho(A) = r$  时, 矩阵幂级数  $\sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$  的敛散性无法由Abel型定理判断, 只能根据矩阵级数的定义进行判断.

## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

---

**例4.6.7** 设  $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ , 判断  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} A^k$  的敛散性.



## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

---

**推论4.6.4** 若幂级数 $\sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m$ 在整个复平面上都收敛, 则对任意复方阵 $A$ , 有幂级数 $\sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$ 收敛.



## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

---

**例4.6.8** 已知 $e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} z^k$  对任意复数 $z$ 都收敛,  
则对任意复方阵 $A$ , 矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} A^k$ 收敛.



## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

---

**推论4.6.5 (Neumann级数)** 矩阵幂级数  $\sum_{m=0}^{\infty} A^m$  收敛当且仅当  $\rho(A) < 1$ , 此时

$$\sum_{m=0}^{\infty} A^m = (I - A)^{-1}.$$



## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

---

**例4.6.9** 判断幂级数  $\sum_{m=1}^{\infty} A^m$  的敛散性, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.5 & 0.2 \\ 0.1 & 0.5 & 0.3 \\ 0.1 & 0.4 & 0.2 \end{bmatrix}$$



## 第四章 矩阵分析——矩阵级数

**注3:** 可逆矩阵  $(I - A)^{-1}$  与矩阵  $A$  的乘积可交换,

$$(I - A)^{-1}A = A(I - A)^{-1}$$

这是基于幂级数的定义推导的. 实际上, 所有可展开成幂级数的矩阵都具有这一性质.

例如, 当  $|z| < 1$  时, 有  $\sum_{k=0}^{\infty} kz^k = \frac{z}{(1-z)^2}$ . 相应的, 令  $\rho(A) < 1$ , 则有矩阵幂级数

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{\infty} kA^k &= A(I - A)^{-2} = (I - A)^{-2}A \\ &= (I - A)^{-1}A(I - A)^{-1}\end{aligned}$$