

Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана



Факультет: Информатика и системы управления

Кафедра: Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

Дисциплина: Функциональное и логическое программирование

Лабораторная работа №2

Выполнили: Никичкин А. С., Фокеев А. И.
Группа: ИУ7–61

Москва, 2015 г.

1 Для указанных выражений составить диаграмму вычисления

Задание 1.1 ($equal\ 3\ (abs\ -3)$)

$\longrightarrow (equal\ 3\ (abs\ -3))$:

- $3 \rightarrow 3$;

$\longrightarrow (abs\ -3)$:

- $-3 \rightarrow -3$;

\implies применение abs к -3 ;

\implies результат: 3.

\implies применение $equal$ к 3, 3;

\implies результат: T.

Задание 1.2 ($equal\ (+\ 1\ 2)\ 3$)

$\longrightarrow (equal\ (+\ 1\ 2)\ 3)$:

$\longrightarrow (+\ 1\ 2)$:

- $1 \rightarrow 1$;

- $2 \rightarrow 2$;

\implies применение «+» к 1, 2;

\implies результат: 3;

- $3 \rightarrow 3$;

\implies применение $equal$ к 3, 3;

\implies результат: T.

Задание 1.3 ($equal\ (*\ 4\ 7)\ 21$)

$\longrightarrow (equal\ (*\ 4\ 7)\ 21)$:

$\longrightarrow (*\ 4\ 7)$:

- $4 \rightarrow 4$;

- $7 \rightarrow 7$;

\implies применение «*» к 4, 7;

\implies результат: 28.

- $21 \rightarrow 21$;

\implies применение $equal$ к 28, 21;

\implies результат: NIL.

Задание 1.4 $(equal (* 2 3) (+ 7 2))$

$\longrightarrow (equal (* 2 3) (+ 7 2))$:

$\longrightarrow (* 2 3)$:

• $2 \rightarrow 2$;

• $3 \rightarrow 3$;

\implies применение «*» к 2, 3;

\implies результат: 6.

$\longrightarrow (+ 7 2)$:

• $7 \rightarrow 7$;

• $2 \rightarrow 2$;

\implies применение «+» к 7, 2;

\implies результат: 9.

\implies применение *equal* к 6, 9;

\implies результат: NIL.

Задание 1.5 $(equal (- 7 3) (* 3 2))$

1. $(- 7 3)$:

(a) $7 \rightarrow 7$;

(b) $3 \rightarrow 3$;

(c) применение «-» к 7, 3;

(d) результат: 4;

2. $(* 3 2)$:

(a) $3 \rightarrow 3$;

(b) $2 \rightarrow 2$;

(c) применение «*» к 3, 2;

(d) результат: 2;

3. применение *equal* к 4, 6;

4. результат: NIL.

Задание 1.6 $(equal (abs (- 2 4)) 3)$

1. $(abs (- 2 4))$:

(a) $(- 2 4)$:

i. $2 \rightarrow 2$;

ii. $4 \rightarrow 4$;

iii. применение «-» к 2, 4;

iv. результат: -2;

- (b) применение *abs* к -2 ;
 - (c) результат: 2;
2. $3 \rightarrow 3$;
 3. применение *equal* к 2, 3;
 4. результат: NIL.

2 Написать функцию и составить для неё диаграмму вычисления

Задание 2.1 Функция вычисляет гипотенузу прямоугольного треугольника по заданным катетам.

```

1 (defun sqr (arg)
2   (* arg arg))
3
4 (defun hypotenuse-rect-triangle (leg1 leg2)
5   (sqrt
6     (+
7       (sqr leg1)
8       (sqr leg2))))

```

$$\left(\text{sqrt} \left(+ \left(* \text{arg1} \text{arg1} \right) \left(* \text{arg2} \text{arg2} \right) \right) \right)$$

1. $(+ (* \text{arg1} \text{arg1}) (* \text{arg2} \text{arg2}))$:
 - (a) $(* \text{arg1} \text{arg1})$:
 - i. $\text{arg1} \rightarrow \text{arg1}$;
 - ii. $\text{arg1} \rightarrow \text{arg1}$;
 - iii. применение «*» к $\text{arg1}, \text{arg1}$;
 - iv. результат: $(\text{arg1})^2$.
 - (b) $(* \text{arg2} \text{arg2})$:
 - i. $\text{arg2} \rightarrow \text{arg2}$;
 - ii. $\text{arg2} \rightarrow \text{arg2}$;
 - iii. применение «*» к $\text{arg2}, \text{arg2}$;
 - iv. результат: $(\text{arg2})^2$.
 - (c) применение «+» к $(\text{arg1})^2, (\text{arg2})^2$;
 - (d) результат: $(\text{arg1})^2 + (\text{arg2})^2$.
2. применение *sqrt* к $(\text{arg1})^2 + (\text{arg2})^2$;
3. результат: $\sqrt{(\text{arg1})^2 + (\text{arg2})^2}$.

Задание 2.2 Функция вычисляет объём прямоугольного параллелепипеда по 3-м его сторонам.

```
1 (defun volume-rect-parallepiped (arg1 arg2 arg3)
2   (* arg1 arg2 arg3))
```

→ (*volume-rect-parallepiped* *q w e*);

- $q \rightarrow q$;
- $w \rightarrow w$;
- $e \rightarrow e$;

⇒ применение *volume-rect-parallepiped* к *q, w, e*:

- $arg1 \rightarrow q$;
- $arg2 \rightarrow w$;
- $arg3 \rightarrow e$;

→ (** arg1 arg2 arg3*):

- $arg1 \rightarrow q$;
- $arg2 \rightarrow w$;
- $arg3 \rightarrow e$;

⇒ применение «*» к *arg1, arg2, arg3*;

⇒ результат: $q \cdot w \cdot e$.

⇒ результат: $q \cdot w \cdot e$.

Задание 2.3 Функция по заданной гипотенузе и катету, вычисляет другой катет прямоугольного треугольника.

```
1 (defun sqr (arg)
2   (* arg arg))
3
4 (defun problem-2-3 (leg hypotenuse)
5   (sqrt
6     (-
7       (sqr hypotenuse)
8       (sqr leg))))
```

- $q \rightarrow q$;
- $w \rightarrow w$;

→ (*problem-2-3* *q w*):

- $leg \rightarrow q$;
- $hypotenuse \rightarrow w$;

→ (*sqrt* (*-* (** hypotenuse hypotenuse*) (** leg leg*)))):

→ (*-* (** hypotenuse hypotenuse*) (** leg leg*)))):

$\rightarrow (* \textit{hypotenuse hypotenuse})$:
 • $\textit{hypotenuse} \rightarrow \textit{hypotenuse}$;
 • $\textit{hypotenuse} \rightarrow \textit{hypotenuse}$;
 \Rightarrow применение «*» к $\textit{hypotenuse}, \textit{hypotenuse}$;
 \Rightarrow результат: $(\textit{hypotenuse})^2$.
 $\rightarrow (* \textit{leg leg})$:
 • $\textit{leg} \rightarrow \textit{leg}$;
 • $\textit{leg} \rightarrow \textit{leg}$;
 \Rightarrow применение «*» к $\textit{leg}, \textit{leg}$;
 \Rightarrow результат: $(\textit{leg})^2$.
 \Rightarrow применение «-» к $(\textit{hypotenuse})^2, (\textit{leg})^2$;
 \Rightarrow результат: $(\textit{hypotenuse})^2 - (\textit{leg})^2$.
 \Rightarrow применение \textit{sqrt} к $(\textit{hypotenuse})^2 - (\textit{leg})^2$;
 \Rightarrow результат: $\sqrt{(\textit{hypotenuse})^2 - (\textit{leg})^2}$.
 \Rightarrow применение $\textit{problem-2-3}$ к q, w ;
 \Rightarrow результат: $\sqrt{q^2 - w^2}$.

3 Вычислить результаты выражений

Задание 3.1

```
(list 'a 'b c) => Unbound variable C
```

Задание 3.2

```
(cons 'a (b c)) => Unbound variable C
```

Задание 3.3

```
(cons 'a '(b c)) => (A B C)
```

Задание 3.4

```
(caddr '(1 2 3 4 5)) => 3
```

Задание 3.5

```
(cons 'a 'b 'c) => Too many arguments
```

Задание 3.6

```
(list 'a (b c)) => Unbound variable C
```

Задание 3.7

```
(list a '(b c)) => Unbound variable A
```

Задание 3.8

```
(list (+ 1 (length '(1 2 3)))) => (4)
```

Задание 3.9

```
(cons 3 (list 5 6)) => (3 5 6)
```

Задание 3.10

```
(list 3 'from 9 'gives (- 9 3)) => (3 FROM 9 GIVES 6)
```

Задание 3.11

```
(+ (length '(1 foo 2 too)) (car '(21 22 23))) => 25
```

Задание 3.12

```
(cdr '(cons is short for ans)) => (IS SHORT FOR ANS)
```

Задание 3.13

```
(car (list one two)) => Unbound variable ONE
```

Задание 3.14

```
(cons 3 '(list 5 6)) => (3 LIST 5 6)
```

Задание 3.15

```
(car (list 'one 'tow)) => ONE
```

Задание 3.16

```
(list 'cons t NIL) => (CONST T NIL)
```

Задание 3.17

```
(eval (eval (list 'cons t NIL))) => Undefined function T
```

Задание 3.18

```
(apply #'cons '(t NIL)) => (T)
```

Задание 3.19

```
(list 'eval NIL) => (EVAL NIL)
```

Задание 3.20

```
(eval (list 'cons t nil)) => (T)
```

Задание 3.21

```
(eval NIL) => NIL
```

Задание 3.22

```
(eval (list 'eval NIL)) => NIL
```

4 Написать функцию

Задание 4.1 Функция от двух списков-аргументов, которая возвращает Т, если первый аргумент имеет большую длину.

```
1 (defun longer-then (arg1 arg2)
2   (>
3     (length arg1)
4     (length arg2)))
```

Задание 4.2 Функция переводит температуру из системы Фаренгейта в температуру по Цельсию.

```
1 (defun f-to-c (temp)
2   (*
3     (/ 5 9)
4     (- temp 32.0)))
```

5 Исследование функции

Имеется следующая функция

```
1 (defun mystery (x)
2   (list
3     (second x)
4     (first x)))
```

Необходимо вычислить результаты выражений.

Задание 5.1

```
(mystery '(one two)) => (TWO ONE)
```

Задание 5.2

```
(mystery 'free) => value FREE is not LIST
```


Задание 5.3

`(mystery (last 'one 'two)) => no list for LAST`

Задание 5.4

`(mystery 'one 'two) => too many arguments`