

Московский государственный технический университет  
имени Н. Э. Баумана



Факультет: Информатика и системы управления

Кафедра: Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

Дисциплина: Функциональное и логическое программирование

## Лабораторная работа №2

Выполнили: Никичкин А. С., Фокеев А. И.  
Группа: ИУ7–61

Москва, 2015 г.

# 1 Для указанных выражений составить диаграмму вычисления

**Задание 1.1** ( $equal\ 3\ (abs\ -3)$ )

1.  $3 \rightarrow 3$ ;
2.  $(abs\ -3)$ :
  - (a)  $-3 \rightarrow -3$ ;
  - (b) применение  $abs$  к  $-3$ ;
  - (c) результат: 3;
3. применение  $equal$  к 3, 3
4. результат: Т.

**Задание 1.2** ( $equal\ (+\ 1\ 2)\ 3$ )

1.  $(+\ 1\ 2)$ :
  - (a)  $1 \rightarrow 1$ ;
  - (b)  $2 \rightarrow 2$ ;
  - (c) применение «+» к 1, 2;
  - (d) результат: 3;
2.  $3 \rightarrow 3$ ;
3. применение  $equal$  к 3, 3;
4. результат: Т.

**Задание 1.3** ( $equal\ (*\ 4\ 7)\ 21$ )

1.  $(*\ 4\ 7)$ :
  - (a)  $4 \rightarrow 4$ ;
  - (b)  $7 \rightarrow 7$ ;
  - (c) применение «\*» к 4, 7;
  - (d) результат: 28;
2.  $21 \rightarrow 21$ ;
3. применение  $equal$  к 28, 21;
4. результат: NIL.

**Задание 1.4**  $(equal (* 2 3) (+ 7 2))$

1.  $(* 2 3)$ :
  - (a)  $2 \rightarrow 2$ ;
  - (b)  $3 \rightarrow 3$ ;
  - (c) применение «\*» к 2, 3;
  - (d) результат: 6;
2.  $(+ 7 2)$ :
  - (a)  $7 \rightarrow 7$ ;
  - (b)  $2 \rightarrow 2$ ;
  - (c) применение «+» к 7, 2;
  - (d) результат: 9;
3. применение *equal* к 6, 9;
4. результат: NIL.

**Задание 1.5**  $(equal (- 7 3) (* 3 2))$

1.  $(- 7 3)$ :
  - (a)  $7 \rightarrow 7$ ;
  - (b)  $3 \rightarrow 3$ ;
  - (c) применение «-» к 7, 3;
  - (d) результат: 4;
2.  $(* 3 2)$ :
  - (a)  $3 \rightarrow 3$ ;
  - (b)  $2 \rightarrow 2$ ;
  - (c) применение «\*» к 3, 2;
  - (d) результат: 2;
3. применение *equal* к 4, 6;
4. результат: NIL.

**Задание 1.6**  $(equal (abs (- 2 4)) 3)$

1.  $(abs (- 2 4))$ :
  - (a)  $(- 2 4)$ :
    - i.  $2 \rightarrow 2$ ;
    - ii.  $4 \rightarrow 4$ ;
    - iii. применение «-» к 2, 4;
    - iv. результат: -2;

- (b) применение *abs* к  $-2$ ;
  - (c) результат: 2;
2.  $3 \rightarrow 3$ ;
  3. применение *equal* к 2, 3;
  4. результат: NIL.

## 2 Написать функцию и составить для неё диаграмму вычисления

**Задание 2.1** Функция вычисляет гипотенузу прямоугольного треугольника по заданным катетам.

```

1 (defun sqr (arg)
2   (* arg arg))
3
4 (defun hypotenuse-rect-triangle (leg1 leg2)
5   (sqrt
6     (+
7       (sqr leg1)
8       (sqr leg2))))

```

$$\left( \text{sqrt} \left( + \left( * \text{arg1} \text{arg1} \right) \left( * \text{arg2} \text{arg2} \right) \right) \right)$$

1.  $(+ (* \text{arg1} \text{arg1}) (* \text{arg2} \text{arg2}))$ :
  - (a)  $(* \text{arg1} \text{arg1})$ :
    - i.  $\text{arg1} \rightarrow \text{arg1}$ ;
    - ii.  $\text{arg1} \rightarrow \text{arg1}$ ;
    - iii. применение «\*» к  $\text{arg1}, \text{arg1}$ ;
    - iv. результат:  $(\text{arg1})^2$ .
  - (b)  $(* \text{arg2} \text{arg2})$ :
    - i.  $\text{arg2} \rightarrow \text{arg2}$ ;
    - ii.  $\text{arg2} \rightarrow \text{arg2}$ ;
    - iii. применение «\*» к  $\text{arg2}, \text{arg2}$ ;
    - iv. результат:  $(\text{arg2})^2$ .
  - (c) применение «+» к  $(\text{arg1})^2, (\text{arg2})^2$ ;
  - (d) результат:  $(\text{arg1})^2 + (\text{arg2})^2$ .
2. применение *sqrt* к  $(\text{arg1})^2 + (\text{arg2})^2$ ;
3. результат:  $\sqrt{(\text{arg1})^2 + (\text{arg2})^2}$ .

**Задание 2.2** Функция вычисляет объём прямоугольного параллелепипеда по 3-м его сторонам.

```
1 (defun volume-rect-parallepiped (arg1 arg2 arg3)
2   (* arg1 arg2 arg3))
```

→ (*volume-rect-parallepiped* *q w e*);

- $q \rightarrow q$ ;
- $w \rightarrow w$ ;
- $e \rightarrow e$ ;

⇒ применение *volume-rect-parallepiped* к *q, w, e*:

- $arg1 \rightarrow q$ ;
- $arg2 \rightarrow w$ ;
- $arg3 \rightarrow e$ ;

→ (*\* arg1 arg2 arg3*):

- $arg1 \rightarrow q$ ;
- $arg2 \rightarrow w$ ;
- $arg3 \rightarrow e$ ;

⇒ применение «\*» к *arg1, arg2, arg3*;

⇒ результат:  $q \cdot w \cdot e$ .

⇒ результат:  $q \cdot w \cdot e$ .

**Задание 2.3** Функция по заданной гипотенузе и катету, вычисляет другой катет прямоугольного треугольника.

```
1 (defun sqr (arg)
2   (* arg arg))
3
4 (defun problem-2-3 (leg hypotenuse)
5   (sqrt
6     (-
7       (sqr hypotenuse)
8       (sqr leg))))
```

- $q \rightarrow q$ ;
- $w \rightarrow w$ ;

→ (*problem-2-3* *q w*):

- $leg \rightarrow q$ ;
- $hypotenuse \rightarrow w$ ;

→ (*sqrt* (*-* (*\* hypotenuse hypotenuse*) (*\* leg leg*)))):

→ (*-* (*\* hypotenuse hypotenuse*) (*\* leg leg*)))):

$\rightarrow (* \textit{hypotenuse hypotenuse})$ :  
 •  $\textit{hypotenuse} \rightarrow \textit{hypotenuse}$ ;  
 •  $\textit{hypotenuse} \rightarrow \textit{hypotenuse}$ ;  
 $\Rightarrow$  применение «\*» к  $\textit{hypotenuse}, \textit{hypotenuse}$ ;  
 $\Rightarrow$  результат:  $(\textit{hypotenuse})^2$ .  
 $\rightarrow (* \textit{leg leg})$ :  
 •  $\textit{leg} \rightarrow \textit{leg}$ ;  
 •  $\textit{leg} \rightarrow \textit{leg}$ ;  
 $\Rightarrow$  применение «\*» к  $\textit{leg}, \textit{leg}$ ;  
 $\Rightarrow$  результат:  $(\textit{leg})^2$ .  
 $\Rightarrow$  применение «-» к  $(\textit{hypotenuse})^2, (\textit{leg})^2$ ;  
 $\Rightarrow$  результат:  $(\textit{hypotenuse})^2 - (\textit{leg})^2$ .  
 $\Rightarrow$  применение  $\textit{sqrt}$  к  $(\textit{hypotenuse})^2 - (\textit{leg})^2$ ;  
 $\Rightarrow$  результат:  $\sqrt{(\textit{hypotenuse})^2 - (\textit{leg})^2}$ .  
 $\Rightarrow$  применение  $\textit{problem-2-3}$  к  $q, w$ ;  
 $\Rightarrow$  результат:  $\sqrt{q^2 - w^2}$ .

### 3 Вычислить результаты выражений

#### Задание 3.1

```
(list 'a 'b c) => Unbound variable C
```

#### Задание 3.2

```
(cons 'a (b c)) => Unbound variable C
```

#### Задание 3.3

```
(cons 'a '(b c)) => (A B C)
```

#### Задание 3.4

```
(caddr '(1 2 3 4 5)) => 3
```

#### Задание 3.5

```
(cons 'a 'b 'c) => Too many arguments
```

#### Задание 3.6

```
(list 'a (b c)) => Unbound variable C
```

#### Задание 3.7

```
(list a '(b c)) => Unbound variable A
```

### Задание 3.8

```
(list (+ 1 (length '(1 2 3)))) => (4)
```

### Задание 3.9

```
(cons 3 (list 5 6)) => (3 5 6)
```

### Задание 3.10

```
(list 3 'from 9 'gives (- 9 3)) => (3 FROM 9 GIVES 6)
```

### Задание 3.11

```
(+ (length '(1 foo 2 too)) (car '(21 22 23))) => 25
```

### Задание 3.12

```
(cdr '(cons is short for ans)) => (IS SHORT FOR ANS)
```

### Задание 3.13

```
(car (list one two)) => Unbound variable ONE
```

### Задание 3.14

```
(cons 3 '(list 5 6)) => (3 LIST 5 6)
```

### Задание 3.15

```
(car (list 'one 'tow)) => ONE
```

### Задание 3.16

```
(list 'cons t NIL) => (CONST T NIL)
```

### Задание 3.17

```
(eval (eval (list 'cons t NIL))) => Undefined function T
```

### Задание 3.18

```
(apply #'cons '(t NIL)) => (T)
```

### Задание 3.19

```
(list 'eval NIL) => (EVAL NIL)
```

### Задание 3.20

```
(eval (list 'cons t nil)) => (T)
```

### Задание 3.21

```
(eval NIL) => NIL
```

### Задание 3.22

```
(eval (list 'eval NIL)) => NIL
```

## 4 Написать функцию

**Задание 4.1** Функция от двух списков-аргументов, которая возвращает T, если первый аргумент имеет большую длину.

```
1 (defun longer-then (arg1 arg2)
2   (>
3     (length arg1)
4     (length arg2)))
```

**Задание 4.2** Функция переводит температуру из системы Фаренгейта в температуру по Цельсию.

```
1 (defun f-to-c (temp)
2   (*
3     (/ 5 9)
4     (- temp 32.0)))
```

## 5 Исследование функции

Имеется следующая функция

```
1 (defun mystery (x)
2   (list
3     (second x)
4     (first x)))
```

Необходимо вычислить результаты выражений.

### Задание 5.1

```
(mystery '(one two)) => (TWO ONE)
```

### Задание 5.2

```
(mystery 'free) => value FREE is not LIST
```



### Задание 5.3

`(mystery (last 'one 'two)) => no list for LAST`

### Задание 5.4

`(mystery 'one 'two) => too many arguments`