

Lineer olmayan Denklemlerin Sayısal
Çözümü

Teğetler
YÖNTEMİ

Teğetler Yöntemi

$$f(x) = 0 \quad (1)$$

lineer olmayan denklemini ele alalım. (1) denkleminin $x = \alpha$ çözümü $x = \alpha \in [a, b]$ olsun. Yani,

$$f(a)f(b) < 0 \quad (2)$$

koşulu sağlanır. Bellidir ki (1) denklemini her zaman

$$x = \varphi(x) \quad (3)$$

şeklinde yazabiliriz.

(1) denkleminin her iki tarafını $-\psi(x)$ fonksiyonu ile çarpalım ve elde edilen eşitliğin her iki tarafına x ekliyelim. O halde

$$x = x - \psi(x)f(x) \quad (4)$$

(4) denkleminin çözümü de

$$x = \alpha$$

olacaktır.

Şimdi ise, $x = x - \psi(x)f(x)$ ifadesinde $\psi(x)$ fonksiyonu yerine

$$\psi(x) = \frac{1}{f'(x)} \quad (5)$$

yazalım. Bu durumda

$$\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} \quad (6)$$

elde ederiz.

Bellidir ki

$$\varphi'(x) = 1 - \frac{[f'(x)]^2 - f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}$$

$$\varphi'(x) = 1 - \frac{[f'(x)]^2 - f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}$$

ifadesinde x yerine α çözümünü yazalım. O halde, α denklemin çözümü olduğundan $f(\alpha) = 0$ olacaktır.

$$\begin{aligned}\Rightarrow \varphi'(\alpha) &= 1 - \frac{[f'(\alpha)]^2 - f(\alpha)f''(\alpha)}{[f'(\alpha)]^2} = 1 - \frac{[f'(\alpha)]^2}{[f'(\alpha)]^2} \\ &= 1 - 1 = 0 < 1\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \varphi'(\alpha) < 1$$

elde edilir. $|\varphi'(x)|$ çözümün civarında 1'den küçük olduğundan

$$x_{n+1} = \varphi(x_n) \quad (7)$$

yaklaşımları ile belirlenen $\{x_n\}$ dizisi (1) denkleminin α çözümüne yaklaşıyor.

(6), (7) ve (4) ifadelerini göz önüne alırsak, yaklaşımların ifadesini

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (8)$$

şeklinde yazabiliriz. (8) ifadesini aşağıdaki şekilde yazalım:

$$x_{n+1} - x_n = -\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Buradan

$$-f(x_n) = f'(x_n)(x_{n+1} - x_n) \quad (9)$$

yazabiliriz.

Bellidir ki, $(x_0, f(x_0))$ noktasından geçen ve eğimi $f'(x_0)$ olan doğrunun denklemi

$$f(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

şeklindedir.

Benzer şekilde llidir ki, $(x_n, f(x_n))$ noktasından geçen ve eğimi $f'(x_n)$ olan doğrunun denklemini

$$f(x) - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n)$$

şeklinde yazabiliriz.

$$f(x) - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n)$$

ifadesinde $x = x_{n+1}$ yazalım:

$$f(x_{n+1}) - f(x_n) = f'(x_n)(x_{n+1} - x_n) \quad (10)$$

olacaktır.

$$-f(x_n) = f'(x_n)(x_{n+1} - x_n) \quad (9)$$

ve (10) ifadelerini karşılaştırırsak, $f(x_{n+1}) = 0$ olduğunu görebiliriz. Yani, x_{n+1} noktası, $f(x)$ fonksiyonunun grafiğinin x - eksenini ile kesişme noktasıdır.

Yani, x_{n+1} noktasının geometrik olarak " **$f(x)$ fonksiyonunun grafiğine $(x_n, f(x_n))$ noktasında çizilen teğetin x - eksenini ile kesişme noktasıdır**" olduğu söylene bilir.

x_0 noktası (başlangıç yaklaşımı), $f(x_0)f''(x_0) > 0$ koşulunu sağlayan herhangi bir noktadır. İşlemler

$$|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$$

olduğunda durdurulur.

(8) ifadesine, (1) lineer olmayan denkleminin çözümünün yaklaşık bulunması için **Teğetler Yöntemi** denir.

Uygulamalarda eğer

$$f(a) \times f''(a) > 0 \Rightarrow x_0 = a$$


$$f(b) \times f''(b) > 0 \Rightarrow x_0 = b$$

Olarak ele alınır.

Teğetler yönteminin geometrik yorumunu aşağıdaki şekilde verebiliriz:

TEĞETLER

a)




$$\begin{aligned} f(a) &> 0 \\ f(b) &< 0 \\ f'(x) &< 0 \\ f''(x) &< 0 \end{aligned}$$

$$f(b) \times f''(b) > 0 \Rightarrow x_0 = b$$

TEĞETLER

b)


$$\begin{aligned}f(a) &< 0 \\f(b) &> 0 \\f'(x) &> 0 \\f''(x) &> 0\end{aligned}$$



TEĞETLER


c)

$$\begin{aligned}f(a) &> 0 \\f(b) &< 0 \\f'(x) &< 0 \\f''(x) &> 0\end{aligned}$$



$$f(a) \times f''(a) > 0 \Rightarrow x_0 = a$$

UYARI: $f(x)$ fonksiyonunun birinci ve ikinci türevlerinin işaret deęiřtirmedięi varsayılmaktadır.



ÖRNEK: $x - \cos x = 0$ denkleminin çözümünü teğetler yöntemi yardımı ile $\varepsilon = 10^{-3}$ kesinliği ile bulunuz.

$$x = \cos x$$

denklemin çözümünün $[0, \pi/2]$ aralığında olduğunu grafik yardımı ile belirleyebiliriz.

Gerçekten $f(x) = x - \cos x$ fonksiyonu için

$$f(0) = 0 - \cos 0 = -1 < 0$$

$$f(1) = 1 - \cos 1 = 0.4397 > 0$$

$$f(0)f(1) < 0 \text{ elde edilir.}$$

Yani denkleminin $[0, 1]$ aralığında çözümü vardır.

$$f(x) = x - \cos x$$

$$f'(x) = 1 + \sin x$$

$$f''(x) = \cos x$$

$$f(0) = 0 - \cos 0 = -1$$

$$f''(0) = \cos 1 = 1 > 0$$

$$f(1) = 1 - \cos 1 = 0.4597 > 0$$

$$f''(1) = \cos 1 = 0.5403 > 0$$

$$f''(x) > 0 \quad (\text{iç bükü})$$

$$f(1)f''(1) > 0 \quad \text{olduğundan} \quad \Rightarrow \quad x_0 = 1$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$f(x) = x - \cos x$$

$$f'(x) = 1 + \sin x$$

$$f''(x) = \cos x$$

$$x_0 = 1$$

$$\Rightarrow f(1) = 1 - \cos 1 = 0.4597, \quad f'(1) = 1 + \sin 1 = 1.8415$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 1 - \frac{f(1)}{f'(1)} = 1 - \frac{0.4597}{1.8415} = 0.7504$$

$$|x_1 - x_0| > \varepsilon$$

$$x_1 = 0.7504$$

$$\Rightarrow f(x_1) = f(0.7504) = 0.7504 - \cos 0.7504 = 0.0190, \quad f'(0.7504) = 1 + \sin 0.7504 = 1.6819$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 0.7504 - \frac{f(0.7504)}{f'(0.7504)} = 0.7504 - \frac{0.0190}{1.6818} = 0.7391$$

$$|x_2 - x_1| > \varepsilon$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$x_2 = 0.7391$$

$$\Rightarrow f(x_2) = f(0.7391) = 0.7391 - \cos 0.7391 = 0.000025, \quad f'(x_2) = f'(0.7391) = 1 + \sin 0.7391 = 1.6736$$

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = 0.7391 - \frac{f(0.7391)}{f'(0.7391)} = 0.7391 - \frac{0.000025}{1.6736} = 0.7391$$

$$|x_3 - x_2| < \varepsilon$$

$$\alpha \approx x_3 = 0.7391$$