

Задачи по элементарной теории вероятностей и математической статистике

Составитель: Борис Демешев,
boris.demeshev@gmail.com

20 декабря 2012 г.

Содержание

0.1	Обращение к читателю	2
0.2	Цель	2
0.3	Об ответах и упрощениях	3
1	Простые эксперименты	3
1.1	Дискретные простые эксперименты	3
1.1.1	Немного оптимизации	5
1.2	Непрерывные простые эксперименты	6
1.3	Смешанные простые эксперименты, или содержание эксперимента неясно	7
2	Сложные эксперименты	7
2.1	«Продвинутая» комбинаторика	7
2.2	Геометрическое распределение (и близкие по духу)	9
2.3	Из n предметов выбирается k	11
2.4	Биномиальное распределение (до дисперсии)	12
2.5	Деревья и прочее без условных вероятностей	14
3	Условные вероятности и ожидания. Дополнительная информация	18
3.1	Условная вероятность	18
3.2	Условное среднее	21
4	Var, σ, conditional Var, conditional σ	26
4.1	Дискретный случай	26
4.2	Непрерывный случай	27
4.3	? Способ расчёта ожидания и дисперсии через условную	27
5	Связь между случайными величинами, Cov, Corr	27
5.1	Дискретный случай	27
5.2	Непрерывный случай (Cov, Corr)	28
5.3	Общие свойства Cov и Var	28
5.4	Преобразование случайных величин (преобразования)	28
5.5	Прочее про несколько случайных величин	29
6	Приёмы решения	29
6.1	Разложение в сумму	29
6.2	Первый шаг	32
6.3	Аллюзии на принцип Белмана	34
6.4	o -малое	35
6.5	Вероятностный метод	35
6.6	Склеивание отрезка	35
6.7	Мартингальный метод	35

7 Неравенства, связанные с ожиданием	35
7.1 Чебышёв/Марков/Кантелли/Чернов	35
7.2 Йенсен	36
7.3 Коши—Шварц	36
8 Сходимости	36
9 Компьютерные (use R or Python!)	36
9.1 Нахождение сложных сумм/поиск оптимальных стратегий	36
9.2 Проведение симуляций	37
9.3 Statistics	37
10 Пуассоновский поток и экспоненциальное распределение	37
10.1 Пуассоновский поток	37
10.2 Пуассоновское приближение	38
11 Нормальное распределение и ЦПТ	38
11.1 Одномерное нормальное распределение	38
11.2 ЦПТ	39
11.3 Многомерное нормальное распределение	39
11.4 Распределения связанные с нормальным	39
12 Случайное блуждание	40
12.1 Дискретное случайное блуждание	40
12.2 Принцип отражения	40
12.3 Броуновское движение	40
13 Выборочные характеристики, общая интуиция	40
14 Метод максимального правдоподобия, метод моментов	41
15 Байесовский подход	42
16 Тестирование гипотез — общие свойства	42
17 Гипотезы о среднем и сравнении среднего при большом n	43
18 Решения	48
18.0.1 Немного оптимизации	49

Предисловие

0.1 Обращение к читателю

Задачник находится в стадии разработки. Смелее спрашивайте и высказывайте своё мнение Борису Демешеву, boris.demeshev@gmail.com

Предлагайте свои задачи!

0.2 Цель

Есть много сборников задач. Зачем этот:

- Открытость и доступность. <http://demeshev.wordpress.com/materials/>
- Красивые задачи.
- Задачи под курс НИУ ВШЭ.

Всё то, что можно рассказать без теории меры.

0.3 Об ответах и упрощениях

Большинство ответов имеет совсем простой вид в духе $\frac{a}{a+b}$, и их, очевидно, нельзя упростить. Некоторые ответы простым образом выражаются через биномиальные коэффициенты. Не упрощаются, но встречаются в ответах: $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$, $\sum_{i=1}^n i^k$. Ответы в виде громоздких сумм биномиальных коэффициентов не используются, если это не оговорено в условии. Используется сумма геометрической прогрессии, разложение в ряд Тейлора для e^x .

1 Простые эксперименты

1.1 Дискретные простые эксперименты

Задача 1.1.

Подбрасываются два кубика. Какова вероятность выпадения хотя бы одной шестёрки? Какова вероятность того, что шестёрка не выпадет ни разу?

Задача 1.2.

$\Omega = \{a, b, c\}$, $\mathbb{P}(\{a, b\}) = 0,8$, $\mathbb{P}(\{b, c\}) = 0,7$. Найдите $\mathbb{P}(\{a\})$, $\mathbb{P}(\{b\})$, $\mathbb{P}(\{c\})$.

Задача 1.3.

A и B несовместны, $\mathbb{P}(A) = 0,3$, $\mathbb{P}(B) = 0,4$. Найдите $\mathbb{P}(A^c \cap B^c)$.

Задача 1.4.

$\mathbb{P}(A) = 0,3$, $\mathbb{P}(B) = 0,8$. В каких пределах может лежать $\mathbb{P}(A \cap B)$?

Задача 1.5.

Кубик подбрасывается два раза. Какова вероятность того, что результат второго броска будет строго больше, чем результат первого? Какова вероятность того, что в сумме будет 6? Что в сумме будет 9? Что максимум равен 5? Что минимум равен 3? Что разница будет равна 1 или 0?

Задача 1.6.

На подносе лежит 20 шоколадных конфет, одинаковых с виду. В четырёх из них есть орех внутри. Маша съела 5 конфет. Какова вероятность того, что в наугад выбранной оставшейся конфете будет орех?

Задача 1.7.

Пусть X принимает два значения, причём $\mathbb{P}(\{X = 1\}) = p$ и $\mathbb{P}(\{X = 0\}) = 1 - p$. Найдите $\mathbb{E}(X)$.

Задача 1.8.

Пусть существует всего два момента времени, $t = 0$ и $t = 1$. Стоимости облигаций и акций в момент времени t обозначим соответственно B_t (bond) и S_t (share). Известно, что $B_0 = 1$, $B_1 = 1,1$, $S_0 = 5$,

$$S_1 = \begin{cases} 10, & p_{\text{high}} = 0,7; \\ 2, & p_{\text{low}} = 0,3. \end{cases}$$

Индивид может покупать акции и облигации по указанным ценам без ограничений. Например, можно купить минус одну акцию: это означает, что в момент времени $t = 0$ индивид получает 5 рублей, а в момент $t = 1$ в зависимости от состояния природы должен заплатить 10 рублей или 2 рубля.

1. Чему равна безрисковая процентная ставка за период?
2. Найдите дисконтированные математические ожидания будущих цен акций и облигаций. Совпадают ли они с ценами нулевого периода?
3. Найдите такие вероятности q_{high} и q_{low} , чтобы дисконтированное математическое ожидание будущих цен совпало с ценами нулевого периода.
4. Индивиду предлагают купить некий актив, который приносит 8 рублей в состоянии мира ω_{high} и 11 рублей в состоянии мира ω_{low} . Посчитайте ожидание стоимости этого актива с помощью вероятностей p и с помощью вероятностей q . Придумайте такую комбинацию акций и облигаций, которая в будущем приносит 8 и 11 рублей соответственно, и найдите её стоимость.

Задача 1.9.

Игральный кубик подбрасывается два раза. Пусть X_1 и X_2 — результаты подбрасывания. Найдите вероятности $\mathbb{P}(\min\{X_1, X_2\} = 4)$ и $\mathbb{P}(\min\{X_1, X_2\} = 2)$.

Задача 1.10.

На десяти карточках написаны числа от 1 до 9. Число 8 фигурирует два раза, остальные числа — по одному разу. Карточки извлекают в случайном порядке. Какова вероятность того, что девятка появится позже обеих восьмёрок?

Задача 1.11.

17 заключённых, 5 камер. Заключённых распределяют по камерам по очереди, равновероятно в каждую. Какова вероятность, что Петя и Вася сидят в одной камере?

Задача 1.12.

Кость подбрасывается два раза. Пусть X и Y — результаты подбрасываний. Найдите $\mathbb{E}(|X - Y|)$.

Задача 1.13.

We throw 3 dices one by one. What is the probability that we obtain 3 points in strictly increasing order?

Задача 1.14.

Из 10 цифр (от 0 до 9) выбираются 3 наугад (возможны повторения). Обозначим числа (в порядке появления): X_1, X_2, X_3 . Какова вероятность того, что $X_1 > X_2 > X_3$?

Задача 1.15.

Кубик подбрасывается 3 раза. Какова вероятность того, что сумма первых двух подбрасываний будет больше третьего?

Задача 1.16.

«Масть» при игре в бридж

Часто приходится слышать, что некто при игре в бридж получил на руки 13 пик. Какова вероятность (при условии, что карты хорошо перетасованы) получить 13 карт одной масти?

Замечание. Каждый из четырёх игроков в бридж получает 13 карт из колоды в 52 карты.

Источник: Mosteller.

Задача 1.17.

На карточках написаны числа от 1 до 100. В левую руку Маша берёт одну карточку, в правую — k карточек. Какова вероятность того, что число на карточке в левой руке окажется больше числа на любой карточке из правой руки?

Задача 1.18.

Спящая красавица

Спящая красавица согласилась принять участие в научном эксперименте. В воскресенье её специально уколют веретеном. Как только она заснёт, будет подброшена правильная монетка. Если монетка выпадет орлом, то спящую красавицу разбудят в понедельник и спросят о том, как выпала монетка. Если монетка выпадет решкой, то спящую царевну разбудят в понедельник, спросят о монетке, снова уколют веретеном, разбудят во вторник и снова спросят о монетке. Укол веретена вызывает легкую амнезию, и красавица не сможет определить, просыпается ли она в первый раз или во второй. Красавица только что проснулась.

1. Какова вероятность того, что сегодня понедельник?
2. Как следует отвечать красавице, если за каждый верный ответ ей дарят молодильное яблоко?
3. Как следует отвечать красавице, если за неверный ответ её тут же превращают в тыкву?

Замечание. Осторожно! Некорректные вопросы!

Задача 1.19.

Пусть события A_0, A_1 и A_2 несовместны и вместе покрывают всё Ω . Обозначим $p_0 = \mathbb{P}(A_1 \cup A_2)$, $p_1 = \mathbb{P}(A_0 \cup A_2)$, $p_2 = \mathbb{P}(A_0 \cup A_1)$. Перечислите все условия, которым удовлетворяют p_0, p_1, p_2 .

Задача 1.20.

Найдите вероятность того, что произойдёт ровно одно событие из A и B , если $\mathbb{P}(A) = 0,3$, $\mathbb{P}(B) = 0,2$, $\mathbb{P}(A \cap B) = 0,1$.

Задача 1.21.

Вася наугад выбирает два разных натуральных числа от 1 до 4.

1. Какова вероятность того, что будет выбрано число 3?
2. Какова вероятность того, что сумма выбранных чисел будет чётная?
3. Каково математическое ожидание суммы выбранных чисел?

Задача 1.22.

Известно, что когда соревнуются А и Б, то А побеждает с вероятностью x (Б, соответственно, с вероятностью $(1 - x)$). Когда соревнуются А и В, то А побеждает с вероятностью y (В, соответственно, с вероятностью $(1 - y)$).

1. Придумайте модель, которая бы позволяла узнать вероятность победы Б над В.
2. Покажите, что можно придумать другую модель и получить другую вероятность.

Задача 1.23.

В клубе 25 человек.

1. Сколькими способами можно выбрать комитет из четырёх человек?
2. Сколькими способами можно выбрать руководство, состоящее из директора, зама и кассира?

Задача 1.24.

Сколькими способами можно расставить 5 человек в очередь?

Задача 1.25.

Сколькими способами можно покрасить 12 комнат, если требуется 4 покрасить жёлтым цветом, 5 — голубым и 3 — зелёным?

Задача 1.26.

Шесть студентов (три юноши и три девушки), стоят в очереди за пирожками в случайном порядке. Какова вероятность того, что юноши и девушки чередуются?

Задача 1.27.

Где-то в начале 17 века Галилея попросили объяснить следующее: количество троек натуральных чисел, дающих в сумме 9, такое же, как количество троек, дающих в сумме 10; но при трёхкратном подбрасывании кубика 9 в сумме выпадает реже, чем 10. Дайте корректное объяснение.

Задача 1.28.

В классе 30 человек, и все разного роста. Учитель физкультуры хочет отобрать и поставить в порядке возрастания роста 5 человек. Сколькими способами это можно сделать?

Задача 1.29.

Случайная величина X равновероятно принимает одно из пяти значений: 1, 2, 3, 8 и 9.

1. Найдите математическое ожидание и медиану X
2. Найдите значение u при котором функция $f(u) = \mathbb{E}(|X - u|)$ достигает минимума
3. Найдите значение u при котором функция $g(u) = \mathbb{E}((X - u)^2)$ достигает минимума
4. Сделайте выводы

Задача 1.30.

Контрольную писали 32 человека, каждый из четырех вариант писали 8 человек. Какова вероятность того, что Вася и Петя писали один и тот же вариант?

Задача 1.31.

На окружности наугад выбираются точки A, B, C, D, E и F . Какова вероятность того, что треугольники ABC и DEF не пересекаются?

1.1.1 Немного оптимизации

Задача 1.32.

Kelly criterion

У Васи имеется стартовый капитал в 100 рублей. Вася может сделать любую ставку в рамках своего капитала. Вероятность выигрыша 0.7. В случае выигрыша Вася получает свою ставку обратно в удвоенном размере, в случае проигрыша - теряет ставку.

1. Какую часть капитала нужно поставить чтобы максимизировать ожидаемый выигрыш?
2. Какую часть капитала нужно поставить, чтобы максимизировать ожидаемый логарифм своего итогового капитала?
3. Решите задачу при произвольной вероятности выигрыша p

Задача 1.33.

В забеге участвуют две лошади, Метель и Пурга. Вася верит, что Метель побеждает с вероятностью $1/2$. Петя верит, что Пурга побеждает с вероятностью $1/3$. Каждый из них согласен участвовать в споре,

если получает положительную ожидаемую прибыль. Как можно без риска получить деньги, поспорив с Васей и Петей?

Задача 1.34.

At a horse race, a horse named «Winner» has 25% chance to win and is posted at 4 to 1 odds. (For every dollar gambler bets, he receives \$5 if horse wins and nothing if it loses). If gambler has square root utility function:

What fraction of his money should he bet on «Winner»?

1.2 Непрерывные простые эксперименты

Задача 1.35.

Поезда метро идут регулярно с интервалом 3 минуты. Пассажир приходит на платформу в случайный момент времени. Пусть X — время ожидания поезда в минутах.

Найдите $\mathbb{P}(X < 1)$, $\mathbb{E}(X)$.

Задача 1.36.

Светофор 40 секунд горит зелёным светом, 3 секунды — жёлтым, 30 секунд — красным, затем цикл повторяется. Петя подъезжает к светофору. На жёлтый свет Петя предпочитает остановиться.

1. Какова вероятность, что Петя сможет проехать сразу?
2. Какова средняя задержка Пети на светофоре?
3. Вася, стоящий рядом со светофором, смотрит на него в течение 3 секунд. Какова вероятность того, что он увидит смену цвета?

Задача 1.37.

Случайные величины X , Y , и Z независимы и равномерны на $[0; 1]$. Какова вероятность того, что $X + Y > Z$?

Задача 1.38.

At a bus stop you can take bus #1 and bus #2. Bus #1 passes 10 minutes after bus #2 has passed whereas bus #2 passes 20 mins after bus #1 has passed. What is the average waiting time to get on a bus at that bus stop?

Источник: Wilmott forum, [catid=26&threadid=55617](#).

Задача 1.39.

На множестве $A := \{x \geq 0, 0 \leq y \leq e^{-x}\}$ случайно (равномерно) выбирается точка. Пусть X — абсцисса этой точки. Найдите следующие вероятности: $\mathbb{P}(X > 1)$, $\mathbb{P}(X \in (1; 5))$, $\mathbb{P}(X \in [1; 5])$.

Задача 1.40.

На плоскости нарисован треугольник с вершинами $(0, 0)$, $(2, 0)$ и $(1, 1)$. Случайным образом, равномерно, выбирается точка внутри этого треугольника. Случайная величина X — абсцисса полученной точки. Найдите

1. $\mathbb{P}(X > 1)$, $\mathbb{P}(X < 0.5)$, $\mathbb{P}(X = 0.2)$
2. $\mathbb{E}(X)$

Тут спросить про минимизацию $f(u) = \mathbb{E}(|X - u|)$?

Задача 1.41.

Предположим, что завтрашний курс тугриков к луйдорам — случайная величина X , равномерная на отрезке $[0; 1]$. Финансовый аналитик Вовочка строит прогноз a . За неправильный прогноз Вовочка заплатит штраф. Какой прогноз следует сделать Вовочке чтобы минимизировать ожидаемое значение штрафа, если

1. штраф считается по формуле $|X - a|$
2. штраф считается по формуле $0.75(X - a)$ при $X > a$ и $0.25(a - X)$ при $X < a$

Задача 1.42.

На бумаге проведена прямая. На бумагу бросают иголку. Какова вероятность, что острый угол между прямой и иглой будет меньше 10 градусов?

Задача 1.43.

Вася бежит по кругу длиной 400 метров. В случайный момент времени он останавливается. Какова вероятность того, что он будет ближе, чем в 50 м от точки старта? Дальше, чем в 100 м?

Задача 1.44.

На отрезке $[0;1]$ (равномерно и независимо друг от друга) выбираются две точки.

1. Какова вероятность того, что расстояние между ними не более 0,25?
2. Какова вероятность, что из трех частей, на которые они разбили отрезок, можно сложить треугольник?

Задача 1.45.

Внутри квадрата выбирается точка наугад. Какова вероятность того, что она будет ближе к центру, чем к любой из вершин?

1.3 Смешанные простые эксперименты, или содержание эксперимента неясно

Задача 1.46.

Как связаны между собой $\mathbb{P}(A)$ и $\mathbb{E}(\mathbf{1}_{\{A\}})$?

2 Сложные эксперименты

2.1 «Продвинутая» комбинаторика

Задача 2.1.

Jenny and Alex flip n fair coins each.

1. What is the probability that they get the same number of tails?
2. Пусть $a_n = \sqrt{n} \cdot p_n$, где p_n — найденная вероятность. Найдите $\lim a_n$.

Задача 2.2.

2 couples and a single person are to be randomly placed in 5 seats in a row. What is the probability that no person that belongs to one of the couples sits next to his/her pair?

Задача 2.3.

Встретились 6 друзей. Каждый дарит подарок одному из других 5 человек. Какова вероятность того, что найдется хотя бы одна пара человек, которая вручит подарки друг другу?

Задача 2.4.

Хулиган и случайная система

На плоскости нарисовано n прямых. Среди них нет параллельных, и никакие три не пересекаются в одной точке. Хулиган берёт первую прямую. Эта прямая делит плоскость на две полуплоскости. Хулиган случайным образом закрашивает одну из этих двух полуплоскостей. Затем хулиган поступает аналогично с каждой прямой. Какова вероятность того, что на плоскости останется хотя бы один незакрашенный кусочек?

Источник: Алексей Суздальцев.

Задача 2.5.

На столе есть следующие предметы:

- 4 отличающихся друг от друга чашки;
- 4 одинаковых гранёных стакана;
- 10 одинаковых кусков сахара;
- 7 соломинок разных цветов.

Сколькими способами можно разложить:

1. Сахар по чашкам;
2. Сахар по стаканам;
3. Соломинки по чашкам;
4. Соломинки по стаканам?

Как изменятся ответы, если требуется, чтобы пустых ёмкостей не оставалось?

Задача 2.6.

Сколькими способами можно разложить k кусков сахара по n различающимся чашкам?

Подсказка: ответ — всего лишь биномиальный коэффициент.

Задача 2.7.

Генуэзская лотерея (задача Леонарда Эйлера)

Из 90 чисел выбираются 5 наугад. Назовем серией последовательность из нескольких чисел, идущих подряд. Например, если выпали числа 23, 24, 77, 78 и 79 (неважно в каком порядке), то есть две серии (23-24, 77-78-79). Определите вероятность того, что будет ровно k серий.

Замечание. Сама лотерея возникла в 17 веке.

Задача 2.8.

Судьба Дон-Жуана (см. тж. с. 29)

У Васи n знакомых девушек (их всех зовут по-разному). Он пишет им n писем, но по рассеянности раскладывает их в конверты наугад. Случайная величина X обозначает количество девушек, получивших письма, написанные лично для них.

1. Какова вероятность того, что Маша получит письмо, адресованное ей?
2. Какова вероятность того, что Маша и Лена получают письма, адресованные им?
3. Какова вероятность того, что хотя бы одна девушка получит письмо, адресованное именно ей? Каков предел этой вероятности при $n \rightarrow +\infty$?
4. Какова вероятность того, что произойдет ровно k совпадений?

Задача 2.9.

Покер

Выбирается 5 карт из колоды (52 карты без джокеров, достоинством от 2 до туза, всего 13 достоинств).

Рассчитайте вероятности комбинаций:

1. Pair (пара) — две карты одного достоинства;
2. Two pairs (две пары) — две карты одного достоинства и две другого;
3. Three of Kind (тройка) — три карты одного достоинства (две другие — разного достоинства);
4. Straight (стрит) — пять последовательных карт, не обязательно одной масти;
5. Flush (масть) — все карты одной масти;
6. Full House (фул-хаус) — три карты одного достоинства и две другого;
7. Four of Kind (каре) — четыре карты одного достоинства;
8. Straight Flush (стрит-флэш) — пять последовательных карт одной масти;
9. Royal Flush (роял-флэш) — старшие пять последовательных карт одной масти?

Примечание: более слабая комбинация не содержит в себе более сильной.

Задача 2.10.

«Вилкодыр»

Есть n дырочек, расположенных в линию, на расстоянии в 1 см друг от друга. У каждой вилки два штырька на расстоянии в 1 см.

1. Сколькими способами можно воткнуть k одинаковых вилок?
2. Как изменится ответ, если дырочки расположены по окружности?

Задача 2.11.

В ряду n лампочек. Из них надо зажечь 8, причём так, чтобы было три серии (по 2, 3 и 3 горящих лампочки). Сколькими способами это можно сделать?

Задача 2.12.

Вася играет в преферанс. Он взял прикуп, снёс две карты и выбрал козыря. У Васи на руках четыре козыря. Какова вероятность, что оставшиеся четыре козыря разделились как 4:0, 3:1, 2:2?

Замечание. Для тех, кто не знает, как играть в преферанс: 32 карты, из которых 8 — будущие козыри, раздаются по 10 между 3 игроками, ещё две кладутся в прикуп.

Задача 2.13.

Перетасована колода в 52 карты.

1. Какова вероятность того, что какие-нибудь туз и король будут лежать рядом?
2. Какова вероятность того, что какой-нибудь туз будет лежать за каким-нибудь королем?

Задача 2.14.

Чему равна сумма $C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 - \dots$?

Её применение к matching problem.

Задача 2.15.

В линию выложено n предметов друг за другом. Сколькими способами можно выбрать k предметов из линии так, чтобы не были выбраны соседние предметы?

Задача 2.16.

Given eight distinguishable rings, let n be the number of possible five-ring arrangements on the four fingers (not the thumb) of one hand. The order of rings on each finger is significant, but it is not required that each finger have a ring. Find the leftmost three nonzero digits of n .

Источник: AIME 2000, 5.

Задача 2.17.

5 numbers are randomly picked from 90. In your bet cards, you get to choose 5 numbers. How many cards have you got to fill in, to guarantee that at least one of them has 4 right numbers?

Источник: Wilmott forum.

Задача 2.18.

В контрольной 20 вопросов. Все ответы разные. Вася успел переписать у друга все верные ответы, но не знает, в каком порядке они идут. Отлично ставят ответившим верно на не менее чем 15 вопросов. Какова вероятность того, что Вася получит отлично?

Задача 2.19.

There are k books of mine among n books. We put them in a shelf randomly. Which is the possibility that there are p books of my who are placed continuously? (At least? Exactly?)

Источник: AoPS, f=498&t=192257.

Задача 2.20.

На каждой карточке вы можете отметить любые 5 чисел из 100. Сколько карточек нужно купить, чтобы гарантированно угадать 3 числа из выпадающих в лотереи 7 чисел?

Замечание. Могут быть громоздкие вычисления.

Задача 2.21.

Сколькими способами можно поставить в очередь a мужчин и b женщин так, чтобы нигде двое мужчин не стояли рядом?

Задача 2.22.

Известно, что функция $f(n, k)$ удовлетворяет условиям:

- $f(n, k) = f(n - 1, k) + f(n, k - 1)$;
- $f(n, 0) = f(n, n) = 1$.

Что это за функция такая?

Задача 2.23.

Усталые влюблённые

В вагоне метро на длинную скамейку в n мест садятся случайным образом $k > \frac{n}{2}$ пассажиров. Какова вероятность того, что после этого на скамейку сможет сесть влюблённая пара (влюблённым обязательно надо сидеть рядом)?

Источник: Алексей Суздальцев.

Задача 2.24.

В классе 28 человек, среди них 18 девочек. Класс построили в 4 ряда по 7 человек. Какова вероятность того, что рядом с Вовочкой будет стоять хотя бы одна девочка?

Замечание. Для Вовочки любая девушка — рядом :).

2.2 Геометрическое распределение (и близкие по духу)

Задача 2.25.

Равной силы команды играют до трёх побед. Какова вероятность того, что будет ровно 3 партии? Ровно 4? Ровно 5?

Задача 2.26.

Вася стреляет по мишени бесконечное количество раз. Он попадает по мишени с очень маленькой вероятностью. Какова вероятность того, что до первого попадания по мишени Васе потребуется больше времени, чем в среднем уходит на одно попадание?

Задача 2.27.

Геометрическое распределение Кубик подбрасывают до первого выпадения шестерки. Случайная величина N — число подбрасываний.

- Найдите $\mathbb{P}(N = 6)$, $\mathbb{P}(N = k)$, $\mathbb{P}(N > 10)$ и $\mathbb{P}(N > 30 \mid N > 20)$, $\mathbb{E}(N)$.
- Найдите $\mathbb{E}\left(\frac{1}{N}\right)$.

Задача 2.28.

С чего всё начиналось...

Париж, Людовик XIV, 1654 год, высшее общество говорит о рождении новой науки — теории вероятностей. Ах, кавалер де Мере, «*fort honnête homme sans être mathématicien*»... («благородный человек, хотя и не математик»). Старая задача, неправильные решения которой предлагались тысячелетиями (например, одно из неправильных решений предлагал изобретатель двойной записи, кумир бухгалтеров, Лука Пачоли), наконец решена правильно! Два игрока играют в честную игру до шести побед. Игрок, первым выигравший шесть партий (не обязательно подряд), получает 800 рублей. К текущему моменту первый игрок выиграл 5 партий, а второй — 3 партии. Они вынуждены прервать игру в данной ситуации. Как им поделить приз по справедливости?

Задача 2.29.

Von Neumann. Что делать, если монетка неправильная?

Имеется «несправедливая» монетка, выпадающая гербом с некоторой вероятностью. Под раундом будем подразумевать двукратное подбрасывание монеты. Проводим первый раунд. Если результат раунда — ГР (сначала герб, затем решка), то считаем, что выиграл первый игрок. Если результат раунда — РГ, то считаем, что выиграл второй игрок. Если результат раунда — ГГ или РР, то проводим ещё один раунд. И так далее, пока либо не определится победитель, либо количество раундов не достигнет числа n .

1. Найдите вероятности «ничьей», выигрыша первого игрока, выигрыша второго игрока в зависимости от n . Найдите пределы этих вероятностей при $n \rightarrow +\infty$.
2. Как с помощью неправильной монетки симитировать правильную?

Задача 2.30.

Monty Hell problem (не путать с Monty Hall)

Сказка. Ежедневно Кощей Бессмертный получает пенсию в размере 10 золотых монет. Затрат у Кощея нет никаких. Поэтому с начала пенсионного возраста он аккуратно нумерует каждую полученную монету и кладет её в сундук. Ночью Мышка-норушка крадёт одну золотую монету из сундука.

1. Какова вероятность того, что i -я монета когда-либо исчезнет из Сундука?
2. Какова вероятность того, что хотя бы одна монета пролежит в сундуке бесконечно долго?
3. Дни сокращаются в продолжительности (каждый последующий — в два раза короче, чем предыдущий). Сколько монет будет в сундуке в конце времени?

Подсказка. $(1 - x) \leq e^{-x}$.

Замечание. А где надсказка?

Задача 2.31.

Случайным образом выбирается натуральное число X . Вероятность выбора числа n такова: $\mathbb{P}(X = n) = 2^{-n}$.

1. Какова вероятность того, что будет выбрано чётное число? Нечётное число? Число, большее пяти? Число от 3 до 11?
2. Пусть независимо друг от друга выбираются s чисел. Пусть K_c — количество невыбранных чисел на отрезке от одного до наибольшего выбранного числа. Найдите $\mathbb{P}(K_c = k)$.

Источник: АММ Е3061, Т. Ferguson and С. Melolidakis.

Задача 2.32.

Величины X_1, X_2, \dots независимы и одинаково распределены с некоторой функцией плотности f . Величина X_i — это количество осадков в i -ый год. Пусть Y — номер года, когда впервые будет превышено количество осадков, выпавших в первом году. Найдите закон распределения Y и $\mathbb{E}(Y)$

Задача 2.33.

Преподаватель по теории вероятностей пообещал своим студентам, что включит задачу на геометрическое распределение в экзамен с вероятностью $1/3$. Чтобы исполнить своё обещание он подбросил одну

монетку два раза и посчитал количество орлов. Оказалось, что орлов было ровно два. На основании этого количества он принял решение. Какое решение он принял и почему? Идея: Николай Арефьев

Задача 2.34.

Вася прыгает в длину несколько раз подряд. Результаты васиных прыжков — независимые одинаково распределенные непрерывные случайные величины. Прыгнув в первый раз он записывает результат. И прыгает до тех пор, пока не перепрыгнет свой первый результат. Величина X — сколько прыжков Васе потребуется сделать дополнительно, чтобы перепрыгнуть первый результат. Найдите $\mathbb{P}(X = k)$ и $\mathbb{E}(X)$.

2.3 Из n предметов выбирается k

Задача 2.35.

Из 50 деталей 4 бракованные. Выбирается наугад 10 деталей на проверку. Какова вероятность не заметить брак?

Задача 2.36.

Есть 4 карты одного достоинства. Наугад выбираются две. Какова вероятность того, что они будут разного цвета?

Задача 2.37.

Какова вероятность полностью угадать комбинацию в лотерее 5 из 36?

Задача 2.38.

В мешке 50 орехов, из них 5 пустые. Вы выбираете наугад 10 орехов. Какова вероятность того, что ровно один из них будет пустой?

Задача 2.39.

Из коробки с 4 синими и 5 зелёными шарами достают 3 шара. Пусть B и G — количество извлечённых синих и зелёных шаров. Найдите $\mathbb{E}(B)$, $\mathbb{E}(G)$, $\mathbb{E}(B \cdot G)$, $\mathbb{E}(B - G)$.

Задача 2.40.

На факультете n студентов. Из них наугад выбирают a человек. Через год b_- студентов покидают факультет, b_+ студентов приходят на факультет. Из них снова наугад выбирают a . Какова вероятность того, что хотя бы одного выберут два раза?

Задача 2.41.

(см. тж. с. 29)

A wooden cube that measures 3 cm along each edge is painted red. The painted cube is then cut into 27 pieces of 1-cm cubes.

1. If I choose one of the small cubes at random and toss it in the air, what is the probability that it will land red-painted side up?
2. If I put all the small cubes in a bag and randomly draw out 3, what is the probability that at least 3 faces on the cubes I choose are painted red?
3. If I put the small cubes in a bag and randomly draw out 3, what is the probability that exactly 3 of the faces are painted red?
4. Invent a new question!

Источник: <http://letsplaymath.wordpress.com/2007/07/25/puzzle-random-blocks/>

Задача 2.42.

Контрольную пишут 40 человек. Половина пишет первый вариант, половина — второй. Время написания работы каждым студентом — независимые непрерывные случайные величины. Какова вероятность того, что в тот момент, когда будет сдана последняя работа первого варианта, останется ещё 5 человек, пишущих второй вариант?

Задача 2.43.

В бридж играют четыре игрока: Юг, Восток, Север, Запад. Перемешанная колода в 52 карты раздаётся игрокам по очереди по одной карте. Юг и Север получили 11 пик. Какова вероятность того, что две оставшиеся пики оказались у одного игрока? Разделились между остальными игроками? Каковы вероятности различных раскладов пик между остальными игроками, если Юг и Север получили 8 пик?

Задача 2.44.

Корректоры очепятток

Вася замечает опечатку с вероятностью 0,7; Петя независимо от Васи замечает опечатку с вероятностью 0,8. В книге содержится 100 опечаток. Какова вероятность того, что Вася заметит 30 опечаток, Петя — 50, причём 14 опечаток будут замечены обоими корректорами?

2.4 Биномиальное распределение (до дисперсии)

Задача 2.45.

Монетка подбрасывается 5 раз. Какова вероятность того, что будет выпадет ровно один орёл? Ровно два? Ни одного?

Задача 2.46.

Какова вероятность при шести подбрасываниях кубика получить ровно две шестёрки?

Задача 2.47.

Какова вероятность того, что у десяти человек не будет ни одного совпадения дней рождений? Каков минимальный размер компании, чтобы вероятность одинакового дня рождения была больше половины?

Задача 2.48.

Маша подбрасывает монетку три раза, а Саша — два раза. Какова вероятность того, что у Маши герб выпадет больше раз, чем у Саши?

Задача 2.49.

Сколько детей должно быть в семье, чтобы вероятность того, что имеется по крайней мере один ребенок каждого пола, была больше 0,95?

Задача 2.50.

Осторожный фальшивомонетчик

Дворцовый чеканщик кладёт в каждый ящик вместимостью в сто монет одну фальшивую. Король подозревает чеканщика и подвергает проверке монеты, взятые наудачу по одной в каждом из 100 ящиков.

1. Какова вероятность того, что чеканщик не будет разоблачён?
2. Каков ответ в предыдущей задаче, если 100 заменить на n ?

Источник: Mosteller.

Задача 2.51.

Стратегия удвоения

В казино имеется рулетка, которая с вероятностью 0,5 выпадает или на чёрное, или на красное. Игрок, поставивший сумму n и угадавший цвет, получает обратно сумму $2n$. Вася решил играть по следующей схеме. Сначала он ставит доллар. Если он выигрывает, то покидает казино, если проигрывает, то удваивает ставку и ставит два доллара. Если выигрывает, то покидает казино, если проигрывает, то снова удваивает ставку и ставит четыре доллара и т. д., пока не выиграет в первый раз или впервые не хватит денег на новую удвоенную ставку. У Васи имеется 1 050 долларов.

1. Какова вероятность того, что Вася покинет казино после выигрыша?
2. Каков ожидаемый выигрыш Васи?

Замечание. В реальности вероятность меньше 0,5, т. к. на рулетке есть 0 и (иногда) 00. Их наличие, естественно, уменьшает и вероятность, и ожидаемый выигрыш.

Задача 2.52.

When the n 's dice are thrown at the one time, find the probability such that the sum of the cast is $n + 3$?

Задача 2.53.

Пусть X_1, X_2, \dots, X_n — НОРСВ, такие, что $X_i = \begin{cases} 1, & p; \\ 0, & (1 - p). \end{cases}$ Пусть k — такая константа, что $2k \geq n$.

Найдите вероятность того, что самая длинная серия из единиц имеет длину k . Что делать при $2k < n$?

Задача 2.54.

Suppose you are given a random number generator, which draws samples from an uniform distribution between 0 and 1. The question is: how many samples you have to draw, so that you are 95% sure that at least 1 sample lies between 0.70 and 0.72?

Задача 2.55.

Биномиальное распределение

Кубик подбрасывают 5 раз. Пусть N — количество выпадений шестёрки. Найдите $\mathbb{P}(N = 3)$, $\mathbb{P}(N = k)$ и $\mathbb{P}(N > 4 \mid N > 3)$, $\mathbb{E}(N)$.

Задача 2.56.

Максимальная вероятность для биномиального распределения

Пусть X распределена биномиально. Общее число экспериментов равно n , вероятность успеха в отдельном испытании равна p .

1. Найдите $\frac{\mathbb{P}(X=k)}{\mathbb{P}(X=k-1)}$.
2. При каких k дробь $\frac{\mathbb{P}(X=k)}{\mathbb{P}(X=k-1)}$ будет не меньше 1?
3. Каким должно быть k , чтобы $\mathbb{P}(X = k)$ была максимальной?

Задача 2.57.

Известно, что предварительно зарезервированный билет на автобус дальнего следования выкупается с вероятностью 0,9. В обычном автобусе 18 мест, в микроавтобусе 9 мест. Компания «Микро», перевозящая людей в микроавтобусах, допускает резервирование 10 билетов на один микроавтобус. Компания «Макро», перевозящая людей в обычных автобусах допускает резервирование 20 мест на один автобус. У какой компании больше вероятность оказаться в ситуации нехватки мест?

Задача 2.58.

The psychologist Tversky and his colleagues say that about four out of five people will answer (a) to the following question:

A certain town is served by two hospitals. In the larger hospital about 45 babies are born each day, and in the smaller hospital 15 babies are born each day. Although the overall proportion of boys is about 50 percent, the actual proportion at either hospital may be more or less than 50 percent on any day. At the end of a year, which hospital will have the greater number of days on which more than 60 percent of the babies born were boys?

- (a) the large hospital (b) the small hospital (c) neither (about the same)

Дайте верный ответ и попытайтесь объяснить, почему большинство людей ошибается при ответе на этот вопрос.

Задача 2.59.

В забеге участвуют 12 лошадей. Каждый из 10 зрителей пытается составить свой прогноз для трёх призовых мест. Какова вероятность того, что хотя бы один из них окажется прав?

Задача 2.60.

Есть N монеток. Каждая из них может быть фальшивой с вероятностью p . Известно, сколько весят настоящие. Известно, что фальшивые весят меньше, чем настоящие. Каждая фальшивая может иметь своё отклонение от правильного веса. Задача — определить, является ли фальшивой каждая монета. Предлагается следующий способ:

Разбить монеты на группы по n монет в каждой группе. Взвесить каждую группу. Если вес группы совпадает с эталонным, то вся группа признается настоящей. Если вес группы меньше эталонного, то каждая монета из группы взвешивается отдельно.

Предположим, что N делится на n . Пусть X — требуемое число взвешиваний.

1. Найдите $\mathbb{E}(X)$;
2. При каком условии на p и n предложенный способ более эффективен чем взвешивание каждой монеты?
3. Исследуйте поведение функции $\frac{\mathbb{E}(X)}{N}$ от n (есть ли минимум, максимум и т. д.).

Задача 2.61.

Задача Банаха (Banach's matchbox problem)

У Маши есть две коробки, в каждой из которых осталось по n конфет. Когда Маша хочет конфету, она выбирает наугад одну из коробок и берёт конфету оттуда. Рано или поздно Маша впервые откроет пустую коробку. В этот момент другая коробка содержит некоторое количество конфет. Обозначим за u_r вероятность того, что в другой коробке ровно r конфет.

1. Найдите u_r .

2. Найдите вероятности v_r того, что в тот момент, когда из одной коробки возьмут последнюю конфету (она только станет пустой!), в другой будет находиться ровно r конфет.
3. Найдите вероятность того, что коробка, которая была опустошена раньше, не будет первой коробкой, открытой пустой.

Задача 2.62.

В уездном городе N два родильных дома, в одном ежедневно рождается 50 человек, в другом — 100 человек. В каком роддоме чаще рождается одинаковое количество мальчиков и девочек?

Задача 2.63.

Let you choose an infinite sequence of integers between 1 and 10, what is the possibility that your sequence doesn't have any "1"?

Задача 2.64.

There are three coins in a box. These coins when flipped, will come up heads with respective probabilities 0.3, 0.5, 0.7. A coin is randomly selected (meaning uniform distribution!) from among these three and then flipped 10 times. Let N be the number of heads obtained on the first ten flips.

1. Найдите $\mathbb{P}(N = 0)$.
2. If you win \$1 each time a head appears and you lose \$1 each time a tail appears, is this a fair game? Explain.

Задача 2.65.

Как почувствовать разницу в 0,01[?]? Пусть вероятность того, что Маша находится целый день в хорошем настроении, равна 0,99, а вероятность того, что Саша находится в хорошем настроении, равна 0,9999. Какова вероятность того, что Маша будет целый год непрерывно в хорошем настроении? Саша?

Задача 2.66.

Петя подбрасывает 10 монеток. Если из этих 10 подбрасываний будет как минимум 8 одинаковых, то мы назовём это чудом. Какова вероятность чуда? Какова вероятность хотя бы одного чуда, если, кроме Пети, ещё 9 человек подбрасывает по 10 монеток?

Задача 2.67.

Вероятность того, что прошлогодний грецкий орех будет червивым, равна 0,25. Сколько минимум нужно взять грецких орехов, чтобы среди них был хотя бы один нормальный с вероятностью 99,9%?

Задача 2.68.

Биномиальные числа Фибоначчи

Пусть $\{F_k\}$ — последовательность Фибоначчи, а X — число выпавших орлов при n подбрасываниях правильной монетки. Вычислить $\mathbb{E}(F_{1+X})$.

Источник: Алексей Суздальцев.

Задача 2.69.

Семеро друзей выбирают, пойти им в кино на фильм ужасов или на комедию. Каждый из них предпочтёт комедию независимо от других с вероятностью 0,6. Есть два способа голосования, А и Б. Способ А — все голосуют одновременно, выбирается альтернатива, набравшая больше голосов. Способ Б — голосование в два тура. Первый тур: трое самых старших друзей голосуют между собой и большинством решают, за что они втроём будут голосовать единогласно во втором туре: за комедию или за ужасы. Второй тур: голосуют все семеро, но трое старших голосуют так, как согласованно договорились на первом туре. При каком способе голосования выше шансы пойти на комедию?

Задача 2.70.

Маша и Саша учатся в одном классе. Маша и Саша учатся по одним и тем же n учебникам. В один день Маша и Саша независимо друг от друга приносят случайное подмножество своих учебников в школу.

1. Какова вероятность того, что у Маши не будет ни одного учебника, которого бы не было у Саши?
2. Какова вероятность того, что вместе у Саши и Маши будут все n учебников хотя бы в одном экземпляре?

2.5 Деревья и прочее без условных вероятностей

Задача 2.71.

Подбрасывается кубик, а затем монетка подбрасывается столько раз, сколько очков на выпавшей грани. Какова вероятность того, что орёл выпадет ровно 4 раза?

Задача 2.72.

Рыцари-близнецы

Король Артур проводит рыцарский турнир, в котором, так же как и в теннисе, порядок состязания определяется жребием. Среди восьми рыцарей, одинаково искусных в ратном деле, два близнеца.

1. Какова вероятность того, что они встретятся в поединке?
2. Каков ответ в случае 2^n рыцарей?

Источник: Mosteller.

Задача 2.73.

Вася посещает 60 % лекций по теории вероятностей, Петя — 70 %. Они из разных групп и посещают лекции независимо друг от друга. Какова вероятность, что на следующую лекцию придут оба? Хотя бы один из них?

Задача 2.74.

Выйдет ли второй в финал?

В теннисном турнире участвуют 8 игроков. Есть три тура (четвертьфинал — полуфинал — финал). Противники в первом туре определяются случайным образом. Предположим, что лучший игрок всегда побеждает второго по мастерству, а тот, в свою очередь побеждает всех остальных. Проигрывающий в финале занимает второе место. Какова вероятность того, что это место займет второй по мастерству игрок?

Источник: обработка Mosteller.

Задача 2.75.

The Wimbledon Men's Singles Tournament has 128 players. The first round pairings are completely random, subject to the constraint that none of the top 32 players can be paired against each other. Two competitors, Olivier Rochus, and his brother Christophe are competing, and neither are in the elite group of 32 players. What is the probability that these brothers play in the first round (as actually occurred)?

Задача 2.76.

Первый автобус отходит от остановки в 5:00. Далее интервалы между автобусами равновероятно составляют 10 или 15 минут, независимо от прошлых интервалов. Вася приходит на остановку в 5:42.

1. Какова ожидаемая длина интервала, в который он попадает?
2. Какова ожидаемая длина следующего интервала?
3. Пусть $t \rightarrow \infty$ (???)

Задача 2.77.

There are two ants on opposite corners of a cube. On each move, they can travel along an edge to an adjacent vertex. What is the probability that they both return to their starting point after 4 moves?

Задача 2.78.

Легкомысленный член жюри

В жюри из трёх человек два члена независимо друг от друга принимают правильное решение с вероятностью p , а третий для вынесения решения бросает монету (окончательное решение выносится большинством голосов). Жюри из одного человека выносит справедливое решение с вероятностью p . Какое из этих жюри выносит справедливое решение с большей вероятностью?

Источник: Mosteller.

Задача 2.79.

Simpson's paradox

Тренер хочет отправить на соревнование самого сильного из своих спортсменов. Самым сильным игроком тренер считает того, у кого больше всех шансов получить первое место, если бы соревнование проводилось среди своих. У тренера два спортсмена: А, постоянно набирающий 3 штрафных очка при выполнении упражнения, и Б, набирающий 1 штрафное очко с вероятностью 0,54 и 5 штрафных очков с вероятностью 0,46.

1. Кого отправит тренер на соревнования?
2. Кого отправит тренер на соревнования, если, помимо А и Б, у него тренируется спортсмен В, набирающий 2 штрафных очка с вероятностью 0,56, 4 штрафных очка с вероятностью 0,22 и 6 штрафных очков с вероятностью 0,22.

3. Мораль?

Задача 2.80.

В турнире участвуют 8 человек, разных по силе. Более сильный побеждает более слабого. Проигравший выбывает, победитель выходит в следующий тур. Какова вероятность того, что i -й по силе игрок дойдет до финала?

Задача 2.81.

A bag contains a total of N balls either blue or red. If 5 balls are chosen from the bag the probability all of them being blue is 0.5. What are the values of N for which this is possible?

Задача 2.82.

Each of two boxes contains both black and white marbles, and the total number of marbles in the two boxes is 25. One marble is taken out of each box randomly. The probability that both marbles are black is $\frac{27}{50}$. What is the probability that both marbles are white?

Задача 2.83.

Маша с подружкой гуляют в поле. Подружка предлагает погадать на суженого. Она зажимает в руке шесть травинок так, чтобы концы травинок торчали сверху и снизу. Маша сначала связывает эти травинки попарно между собой сверху, а затем и снизу (получается три завязывания сверху и три завязывания снизу). Если при этом все шесть травинок окажутся связанными в одно кольцо, то это означает, что Маша в текущем году выйдет замуж. Какие шансы у Маши?

Замечание. Будем считать, что завязывание травинок в «трилистник», «восьмерку» и прочие нетривиальные узлы также означает замужество.

Источник: Баврин, Фрибус, «Старинные задачи».

Задача 2.84.

Две урны содержат одно и то же количество шаров, несколько чёрных и несколько белых каждая. Из них извлекаются n ($n > 3$) шаров с возвращением. Найти число n и содержимое обеих урн, если вероятность того, что все белые шары извлечены из первой урны, равна вероятности того, что из второй извлечены либо все белые, либо все чёрные шары.

Источник: Mosteller.

Задача 2.85.

Кость подбрасывается 3 раза. Размер ставки — 1 рубль. Если шестёрка не выпадает ни разу, то ставка проиграна, если шестёрка выпадает хотя бы один раз, то ставка возвращается, плюс выплачивается выигрыш по 1 рублю за каждую шестёрку. Найдите стоимость этой лотереи.

Задача 2.86.

Parrondo's game

Назовем «рублёвой игрой с вероятностью p » игру, в которой игрок выигрывает 1 рубль с вероятностью p и проигрывает один рубль с вероятностью $(1 - p)$. Игра A — это рублёвая игра с вероятностью 0,45. Игра B состоит в следующем: если сумма в твоём кошельке делится на три, то ты играешь в рублёвую игру с вероятностью 0,05; если же сумма в твоём кошельке не делится на три, то ты играешь в рублёвую игру с вероятностью 0,7. Что будет происходить с ожидаемым благосостоянием игрока, если он

1. Будет постоянно играть в игру A ?
2. Будет постоянно играть в игру B ?
3. Будет постоянно играть A или B с вероятностью по 0,5?
4. Придумайте «лохотрон» для интеллектуалов.

Задача 2.87.

Parrondo's game — альтернатива

A much simpler example is dealing cards from a well-shuffled deck. Suppose I get \$14 if two cards in a row match in rank (two 2's or two Kings for examples), and pay \$1 if they don't. The chance of two cards in a row matching is $\frac{1}{17}$, so I pay \$16 for each \$14 I win.

Now I play the same game, alternating the deal between two decks. Now the chance of two successive cards matching is $\frac{1}{13}$, so I pay \$12 for every \$14 I win.

Each game individually loses money, but alternate them and you win money. Eureka! We're all rich.

Источник: Wilmott forum.

Задача 2.88.

Триэль

Три гусара — A , B и C — стреляются за прекрасную даму. Стреляют они по очереди (A , B , C , A , B , C , ...), каждый стреляет в противника по своему выбору. A попадает с вероятностью 0,1, B — 0,5, C — 0,9. Триэль продолжается до тех пор, пока в живых не останется только один. Предположим, что стрелять в воздух нельзя.

1. Какой должна быть стратегия A ?
2. У кого какие шансы на победу?

Задача 2.89.

Триэль-2

Три гусара — A , B и C — стреляются за прекрасную даму. Стреляют они одновременно, каждый стреляет в противника по своему выбору. A попадает с вероятностью 0,1, B — 0,5, C — 0,9. Триэль продолжается до тех пор, пока в живых не останется только один или никого.

1. Какой должна быть стратегия A ?
2. У кого какие шансы на прекрасную даму?

Задача 2.90.

У диплоидных организмов наследственные характеристики определяются парой генов. Вспомним знакомые нам с 9-го класса горошины чешского монаха Менделя. Ген, определяющий форму горошины, имеет две аллели: « A » (гладкая) и « a » (морщинистая). « A » доминирует над « a ». В популяции бесконечное количество организмов. Родители каждого потомка определяются случайным образом. Одна аллель потомка выбирается наугад из аллелей матери, другая — из аллелей отца. Начальное распределение генотипов имеет вид: « AA » — 30 %, « Aa » — 60 %, « aa » — 10 %.

1. Каким будет распределение генотипов в n -м поколении?
2. Заметив закономерность, сформулируйте и докажите теорему Харди—Вайнберга для произвольного начального распределения генотипов.

Задача 2.91.

У диплоидных организмов наследственные характеристики определяются парой генов. Некий ген, сцепленный с полом, имеет две аллели: « A » и « a », т. е. девочка может иметь один из трёх генотипов (« AA », « Aa », « aa »), а мальчик — только два (« A » и « a »; хромосома, определяющая мужской пол, короче и не содержит нужного участка). От мамы ребёнок наследует одну из двух аллелей (равновероятно), а от отца либо наследует (тогда получается девочка), либо нет (тогда получается мальчик). « A » доминирует над « a ». В популяции бесконечное количество организмов. Родители каждого потомка определяются случайным образом.

1. Верно ли, что численность генотипов стабилизируется со временем?
2. Известно, что дальтонизм является признаком, сцепленным с полом. Догадавшись, является ли он рецессивным или доминантным, определите, среди кого (мужчин или женщин) дальтоников больше.

/проверить биологию/

Задача 2.92.

В коробке находится четыре внешне одинаковые лампочки. Две лампочки исправны, две — нет. Лампочки извлекают из коробки по одной до тех пор, пока не будут извлечены обе исправные.

1. Какова вероятность того, что опыт закончится извлечением трёх лампочек?
2. Каково ожидаемое количество извлеченных лампочек?

Задача 2.93.

Спелестолог и батарейки

У спелестолога в каменоломнях сели батарейки в налобном фонаре, и он оказался в абсолютной темноте. В рюкзаке у него 8 батареек: 5 новых и 3 старых. Для работы фонаря требуется две новые батарейки. Спелестолог вытаскивает из рюкзака две батарейки наугад и вставляет их в фонарь. Если фонарь не начинает работать, то спелестолог откладывает эти две батарейки и пробует следующие и т. д.

1. Сколько попыток в среднем потребуется?
2. Какая попытка вероятнее всего будет первой удачной?
3. Творческая часть. Поиграйтесь с задачей. Случайна ли прогрессия в ответе? Сравните с вариантом «6 новых + 4 старых» и т. д.

Задача 2.94.

Два ферзя (чёрный и белый) ставятся наугад на шахматную доску.

1. Какова вероятность того, что они будут «бить» друг друга?
2. К чему стремится эта вероятность для шахматной доски со стороной, стремящейся к бесконечности?

Задача 2.95.

На день рождения к Васе пришли две Маши, два Саши, Петя и Коля. Все вместе с Васей сели за круглый стол. Какова вероятность, что Вася окажется между двумя тёзками?

Задача 2.96.

Равновероятно независимо друг от друга выбираются три числа от 1 до 20. Какова вероятность того, что третье попадет между двух первых?

Задача 2.97.

Five distinct numbers are randomly distributed to players numbered 1 through 5. Whenever two players compare their numbers, the one with the higher one is declared the winner. Initially, players 1 and 2 compare their numbers; the winner then compares with player 3. Let X denote the number of times player 1 is a winner. Find the distribution of X .

Задача 2.98.

Подбрасывается правильный кубик. Узнав результат, игрок выбирает, подкидывать ли кубик второй раз. Игрок получает сумму денег, равную количеству очков при последнем подбрасывании.

1. Каков ожидаемый выигрыш игрока при оптимальной стратегии?
2. Каков ожидаемый выигрыш игрока, если максимальное количество подбрасываний равно трём?

Задача 2.99.

На столе стоят 42 коробки, они занумерованы от 0 до 41. В каждой коробке 41 шар, в коробке с номером i лежат i белых шаров, а остальные чёрные. Мы наугад выбираем коробку, а затем из неё достаём три шара. Какова вероятность того, что они будут одного цвета?

Источник: <http://math.stackexchange.com/questions/70760/>

3 Условные вероятности и ожидания. Дополнительная информация

3.1 Условная вероятность

Задача 3.1.

A bag contains a counter, known to be either white or black. A white counter is put in, the bag is shaken, and a counter is drawn out, which proves to be white. What is now the chance of drawing a white counter?

Задача 3.2.

You have a hat in which there are three pancakes: one is golden on both sides, one is brown on both sides, and one is golden on one side and brown on the other. You withdraw one pancake, look at one side, and see that it is brown. What is the probability that the other side is brown?

Задача 3.3.

The inhabitants of an island tell truth one third of the time. They lie with the probability of $\frac{2}{3}$. On an occasion, after one of them made a statement, another fellow stepped forward and declared the statement true. What is the probability that it was indeed true?

Задача 3.4.

На кубиках написаны числа от 1 до 100. Кубики свалены в кучу. Вася выбирает наугад из кучи по очереди три кубика.

1. Какова вероятность, что полученные три числа будут идти в возрастающем порядке?
2. Какова вероятность, что полученные три числа будут идти в возрастающем порядке, если известно, что первое меньше последнего?

Задача 3.5.

(дописать)

Наследование группы крови контролируется аутосомным геном. Три его аллеля обозначаются буквами А, В и 0. Аллели А и В доминантны в одинаковой степени, а аллель 0 рецессивен по отношению к ним обоим. Поэтому существует четыре группы крови. Им соответствуют следующие генотипы:

- Первая (I) — 00;

- Вторая (II) — AA, A0;
- Третья (III) — BB, B0;
- Четвёртая (IV) — AB.

Наследование резус-фактора кодируется тремя парами генов и происходит независимо от наследования группы крови. Наиболее значимый ген имеет два аллеля, аллель D доминантный, аллель d рецессивный. Таким образом, получаем следующие генотипы:

- Резус-положительный — DD, Dd;
- Резус-отрицательный — dd.

Если у беременной женщины резус-отрицательная кровь, а у плода резус-положительная, то есть риск возникновения гемолитической болезни (у матери образуются антитела к резус фактору, безвредные для неё, но вызывающие разрушение эритроцитов плода).

Перед нами два семейства: Монтекки и Капулетти.

...

Задача 3.6.

Пусть X_i — НОРСВ, такие, что $\mathbb{P}(X_i = X_j) = 0$. Обозначим за E_k событие, состоящее в том, что X_k оказалась «рекордом», т. е. больше, чем все предыдущие X_i ($i < k$). Для определённости будем считать, что $E_1 = \Omega$.

1. Найдите $\mathbb{P}(E_k)$.
2. Верно ли, что E_k независимы?
3. Какова вероятность того, что второй рекорд будет зафиксирован в n -й момент времени?
4. Сколько в среднем времени пройдёт до второго рекорда?

Источник: Williams, 4.3.

Задача 3.7.

Известно, что $\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A | B^c)$. Верно ли, что A и B независимы?

Задача 3.8.

Randomized response technique

В анкету для чиновников включён скользкий вопрос: «Берёте ли Вы взятки?». Чтобы стимулировать чиновников отвечать правдиво, используется следующий прием. Перед ответом на вопрос чиновник втайне от анкетирующего подкидывает специальную монетку, на гранях которой написано «правда», «ложь». Если монетка выпадает «правдой», то предлагается отвечать на вопрос правдиво, если монетка выпадает на «ложь», то предлагается солгать. Таким образом, ответ «да» не обязательно означает, что чиновник берёт взятки.

Допустим, что треть чиновников берёт взятки, а монетка неправильная и выпадает «правдой» с вероятностью 0,2.

1. Какова вероятность того, что чиновник ответит «да»?
2. Какова вероятность того, что чиновник берёт взятки, если он ответил «да»? Если ответил «нет»?

Вставить построение несмещённой оценки?

Задача 3.9.

Пусть события A и B независимы и $\mathbb{P}(B) > 0$. Чему равна $\mathbb{P}(A | B)$?

Задача 3.10.

Из колоды в 52 карты извлекается одна карта наугад. Верно ли, что события «извлечён туз» и «извлечена пика» являются независимыми?

Задача 3.11.

Из колоды в 52 карты извлекаются по очереди две карты наугад. Верно ли, что события «первая карта — туз» и «вторая карта — туз» являются независимыми?

Задача 3.12.

Известно, что $\mathbb{P}(A) = 0,3$, $\mathbb{P}(B) = 0,4$, $\mathbb{P}(C) = 0,5$. События A и B несовместны, события A и C независимы и $\mathbb{P}(B | C) = 0,1$. Найдите $\mathbb{P}(A \cup B \cup C)$.

Задача 3.13.

Имеется три монетки. Две «правильных» и одна — с орлами по обеим сторонам. Петя выбирает одну монетку наугад и подкидывает её два раза. Оба раза выпадает орёл. Какова вероятность того, что монетка «неправильная»?

Задача 3.14.

Самолёт упал либо в горах, либо на равнине. Вероятность того, что самолёт упал в горах, равна 0,75. Для поиска пропавшего самолёта выделено 10 вертолётов. Каждый вертолёт можно использовать только в одном месте. Как распределить имеющиеся вертолёты, если вероятность обнаружения пропавшего самолёта отдельно взятым вертолётom равна: 0,95? 0,6 (пасмурно)? 0,1 (туман)?

Источник: Айвазян, экзамен РЭШ.

Задача 3.15.

Предположим, что социологическим опросам доверяют 70 % жителей. Те, кто доверяет опросам, всегда отвечают искренне; те, кто не доверяет, отвечают наугад, равновероятно выбирая «да» или «нет». Социолог Петя в анкету очередного опроса включил вопрос: «Доверяете ли Вы социологическим опросам?»

1. Какова вероятность, что случайно выбранный респондент ответит «Да»?
2. Какова вероятность того, что он действительно доверяет, если известно, что он ответил «Да»?

Задача 3.16.

Два охотника выстрелили в одну утку. Первый попадает с вероятностью 0,4, второй — с вероятностью 0,6. В утку попала ровно одна пуля. Какова вероятность того, что утка была убита первым охотником?

Задача 3.17.

С вероятностью 0,3 Вася оставил конспект в одной из 10 посещённых им сегодня аудиторий. Вася осмотрел 7 из 10 аудиторий и конспекта в них не нашёл.

1. Какова вероятность того, что конспект будет найден в следующей осматриваемой им аудитории?
2. Какова (условная) вероятность того, что конспект оставлен где-то в другом месте?

Задача 3.18.

Вася гоняет на мотоцикле по единичной окружности с центром в начале координат. В случайный момент времени он останавливается. Пусть случайные величины X и Y — это Васины абсцисса и ордината в момент остановки. Найдите $\mathbb{P}(X > \frac{1}{2})$, $\mathbb{P}(X > \frac{1}{2} \mid Y < \frac{1}{2})$. Являются ли события $A = \{X > \frac{1}{2}\}$ и $B = \{Y < \frac{1}{2}\}$ независимыми?

Подсказка. $\cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$, длина окружности $l = 2\pi r$.

Задача 3.19.

Пусть $\mathbb{P}(A) = 1/4$, $\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{1}{2}$ и $\mathbb{P}(B \mid A) = \frac{1}{3}$. Найдите $\mathbb{P}(A \cap B)$, $\mathbb{P}(B)$ и $\mathbb{P}(A \cup B)$.

Задача 3.20.

Примерно¹ 4 % коров заражены «коровьим бешенством». Имеется тест, позволяющий с определённой степенью достоверности установить, заражено ли мясо прионом или нет. С вероятностью 0,9 заражённое мясо будет признано заражённым. «Чистое» мясо будет признано заражённым с вероятностью 0,1. Судя по тесту, эта партия мяса заражена. Какова вероятность того, что она действительно заражена?

Задача 3.21.

Роме Протасевичу, искавшему со мной у Мутновского вулкана в тумане серую палатку...

Есть две тёмные комнаты, A и B . В одной из них сидит чёрная кошка. Первоначально предполагается, что вероятность нахождения кошки в комнате A равна α . Вероятность найти чёрную кошку в темной комнате (если она там есть) с одной попытки равна p . Допустим, что вы сделали a неудачных попыток поиска кошки в комнате A и b неудачных попыток в комнате B .

1. Чему равна условная вероятность нахождения кошки в комнате A ?
2. При каком условии на $(a - b)$ эта вероятность будет больше 0,5?

Задача 3.22.

Кубик подбрасывается два раза. Найдите вероятность получить сумму, равную 8, если на первом кубике выпало 3.

Задача 3.23.

¹Цифры условные. Celui qui ne mange pas de bifsteak au cause de la vache folle — il est fou! Jolivaldt.

В коробке 10 пронумерованных монеток, i -я монетка выпадает орлом с вероятностью $\frac{i}{10}$. Из коробки была вытащена одна монетка наугад. Она выпала орлом. Какова вероятность того, что это была пятая монетка?

Задача 3.24.

Вы играете две партии в шахматы против незнакомца. Равновероятно незнакомец может оказаться новичком, любителем или профессионалом. Вероятности вашего выигрыша в отдельной партии, соответственно, будут равны 0,9; 0,5; 0,3.

1. Какова вероятность выиграть первую партию?
2. Какова вероятность выиграть вторую партию, если вы выиграли первую?

Задача 3.25.

В каких из перечисленных случаев вероятность наличия флэша (см. **карточные комбинации** на стр. 8) больше, чем при полном отсутствии информации:

1. Первая карта из имеющихся — это туз;
2. Первая карта из имеющихся — это туз бубей;
3. На руках имеется хотя бы один туз;
4. На руках имеется туз бубей.

Задача 3.26.

A man has 3 equally favorite seats to fish at. The probability with which the man can succeed at catching at each seat is 0.6, 0.7, 0.8 respectively. It is known that the man dropped the hint at one seat three times and just caught one fish. Find the probability that the fish was caught at the first seat.

Задача 3.27.

Есть 101 мешок конфет. В каждом мешке 100 шоколадных конфет, неотличимых с виду. В i -ом мешке $i - 1$ конфета с орехом, остальные без ореха.

Мы выбираем мешок наугад и съедаем из него две конфеты.

1. Какова вероятность, что первая будет с орехом?
2. Какова вероятность, что вторая с орехом, если первая с орехом?

Задача 3.28.

В классе было 2 мальчика и сколько-то девочек. Заходит еще кто-то. Ребята решили, что народу стало слишком много, выбрали одного человека жеребьевкой и выгнали. Какова вероятность того, что вошел мальчик, если выгнали мальчика?

Задача 3.29.

Вася подкидывает монетку четыре раза. Если монетка выпадает орлом, то он кладет в мешок черный шар, если решкой — белый. Петя не знает, как выпадала монетка, и достает два шара из мешка наугад. Первый шар черного цвета. Какова вероятность того, что второй будет белым?

Задача 3.30.

Внутри квадрата с вершинами $(0; 0)$, $(0; 1)$, $(1; 0)$ и $(1; 1)$ равновероятно выбирается одна точка. Пусть X и Y — абсцисса и ордината этой точки. Найдите $\mathbb{P}(X < 0,75)$, $P(X \leq a)$ для произвольного a , $\mathbb{P}(X > 0,5 | X + Y > 0,5)$, $\mathbb{P}(X + Y > 0,5 | X > 0,5)$, $\mathbb{P}(X \cdot Y > 1/3 | X + Y < 2/3)$, $\mathbb{P}(X > 0,3 | Y < 0,7)$

3.2 Условное среднее

Задача 3.31.

Две шкатулки

Васе предлагают две шкатулки и обещают, что в одной из них денег в два раз больше, чем в другой. Вася открывает наугад одну из них — в ней a рублей. Вася может взять либо деньги, либо оставшуюся шкатулку.

1. Правильно ли Вася считает, что ожидаемое количество денег в неоткрытой шкатулке равно $\frac{1}{2}(\frac{1}{2}a) + \frac{1}{2}(2a) = 1\frac{1}{4}a$ и что поэтому нужно изменить свой выбор?
2. Пусть известно, что в пару шкатулок кладут 3^k и 3^{k+1} рублей с вероятностью $p_k = (\frac{1}{2})^k$. Стоит ли Васе изменить свой выбор после того, как он открыл первую шкатулку? Почему?

Задача 3.32.

В кабинет бюрократа скопилась очередь ещё до его открытия. Пусть время обслуживания страждущих — независимые экспоненциальные случайные величины. Посетитель, пришедший через t минут

после открытия, узнал, что первый посетитель уже ушёл, а второй ещё сидит в кабинете. Найдите ожидаемое время обслуживания первого посетителя, $E(X_1 \mid X_1 \leq t < X_1 + X_2)$.

Задача 3.33.

Пете и Васе предложили одну и ту же задачу. Они могут правильно решить её с вероятностями 0,7 и 0,8 соответственно. К задаче предлагается 5 ответов на выбор, поэтому будем считать, что выбор каждого из пяти ответов равновероятен, если задача решена неправильно.

1. Какова вероятность несовпадения ответов Пети и Васи?
2. Какова вероятность того, что Петя ошибся, если ответы совпали?
3. Каково ожидаемое количество правильных решений, если ответы совпали?

Задача 3.34.

Автобусы ходят регулярно с интервалом в 10 минут. Вася приходит на остановку в случайный момент времени и ждёт автобуса не больше a минут. Величина a — константа из интервала $(0; 10)$. Если автобус приходит меньше чем за a минут, то Вася уезжает на нём. Если автобуса нет в течение a минут, то Вася заходит в ближайшую кафешку перекусить и через случайное время возвращается на остановку. На второй раз он ждёт до прихода автобуса.

1. Какое время Вася в среднем проводит в ожидании автобуса?
2. Постройте график получившейся функции от a .

Задача 3.35.

Игрок получает 13 карт из колоды в 52 карты.

1. Какова вероятность того, что у него как минимум два туза, если известно, что у него есть хотя бы один туз?
2. Какова вероятность того, что у него как минимум два туза, если известно, что у него есть туз пик?
3. Объясните, почему эти две вероятности отличаются.

Задача 3.36.

В уездном городе N проживают 10^7 человек. Каждый из них может обладать редким даром ясновидения с вероятностью $p = 10^{-7}$ независимо от других.

1. Каково ожидаемое количество ясновидящих?
2. Известно, что Петя — ясновидящий. Какова вероятность найти ещё одного ясновидящего в городе N ?

Задача 3.37.

Цвет глаз кодируется несколькими генами. В целом более темный цвет доминирует более светлый. Ген карих глаз доминирует ген синих. Т.е. у носителя пары bb глаза синие, а у носителя пар BB и Bb — карие. У диплоидных организмов (а мы такие :) одна аллель наследуется от папы, а одна — от мамы. В семье у кареглазых родителей два сына — кареглазый и синеглазый. Кареглазый женился на синеглазой девушке. Какова вероятность рождения у них синеглазого ребенка?

Задача 3.38.

У тети Маши — двое детей, один старше другого. Предположим, что вероятности рождения мальчика и девочки равны и не зависят от дня недели, а пол первого и второго ребенка независимы.

1. Известно, что хотя бы один ребенок — мальчик. Какова вероятность того, что другой ребенок — девочка?
2. Тетя Маша наугад выбирает одного своего ребенка и посылает к тете Оле, вернуть учебник по теории вероятностей. Это оказывается мальчик. Какова вероятность того, что другой ребенок — девочка?
3. Известно, что старший ребенок — мальчик. Какова вероятность того, что другой ребенок — девочка?
4. На вопрос: «А правда ли тетя Маша, что у вас есть сын, родившийся в пятницу?». Она ответила: «Да». Какова вероятность того, что другой ребенок — девочка?

Задача 3.39.

В урне 5 белых и 11 черных шаров. Два шара извлекаются по очереди. Какова вероятность того, что второй шар будет черным? Какова вероятность того, что первый шар — белый, если известно, что второй шар — черный?

Задача 3.40.

Monty-hall

Вы играете в «Поле Чудес» и Вам предлагают «3 шкатулки». Назовем их a , b и c . В одной из трех шкатулок лежит 1000 рублей. (Введем соответственно события A , B и C , где A означает «деньги лежат в шкатулке a »). Вы выбираете наугад одну из трех шкатулок.

Ведущий, который знает, где лежат деньги, убирает одну пустую шкатулку, не выбранную Вами (среди двух не выбранных Вами обязательно есть пустая, если таковых две, то ведущий убирает любую наугад). Допустим, Вы выбрали шкатулку b , а ведущий после этого убрал шкатулку c .

Найдите условную вероятность того, что приз лежит в выбранной Вами шкатулке. Имеет ли Вам смысл изменить Ваш выбор?

Альтернативный вариант условия-1

После того, как Вы выбрали шкатулку, ведущий открывает наугад одну из пустых шкатулок (при этом он может открыть Вашу и разочаровать Вас). Допустим, Вы выбрали шкатулку b , а ведущий после этого открыл шкатулку c . Найдите условную вероятность того, что приз лежит в выбранной Вами шкатулке. Имеет ли Вам смысл изменить Ваш выбор?

Альтернативный вариант условия-2

После того, как Вы выбрали шкатулку, ведущий открывает наугад одну из оставшихся шкатулок (при этом он может оказаться открытой шкатулка с деньгами). Допустим, Вы выбрали шкатулку b , а ведущий после этого открыл шкатулку c и она оказалась пустой. Найдите условную вероятность того, что приз лежит в выбранной Вами шкатулке. Имеет ли Вам смысл изменить Ваш выбор?

Задача 3.41.

multi-stage monty hall

Suppose there are four doors, one of which is a winner. The host says: «You point to one of the doors, and then I will open one of the other non-winners. Then you decide whether to stick with your original pick or switch to one of the remaining doors. Then I will open another (other than the current pick) non-winner. You will then make your final decision by sticking with the door picked on the previous decision or by switching to the only other remaining door» Optimal strategy?

source: cut-the-knot – Bhaskara Rao

Задача 3.42.

В школе три девятых класса, «А», «Б» и «В», одинаковые по численности. В «А» классе 30% обожают учителя географии, в «Б» классе — 40% и в «В» классе — 70%. Девятиклассник Петя обожает учителя географии. Какова вероятность того, что он из «Б» класса?

Задача 3.43.

В урне 7 красных, 5 желтых и 11 белых шаров. Два шара выбирают наугад. Какова вероятность, что это красный и белый, если известно, что они разного цвета.

Задача 3.44.

Саша едет на день рождения к Маше и ищет её дом. Её дом находится южнее по улице. Одна треть встречных прохожих — местные. Местные всегда лгут, неместные говорят правду с вероятностью $\frac{3}{4}$. Изначально Саша оценивает вероятность того, что дом находится южнее, как a . Саша спросил первого встречного прохожего и получил ответ «севернее». Как Саша изменит свою субъективную вероятность?

Задача 3.45.

Самолет упал в горах, в степи или в море. Вероятности, соответственно, равны 0,5, 0,3 и 0,2. Если он упал в горах, то при поиске его найдут с вероятностью 0,7. В степи — 0,8, на море — 0,2. Самолет искали в горах, в степи и не нашли. Какова вероятность того, что он упал в море?

Задача 3.46.

Русская рулетка.

Давайте сыграем в русскую рулетку... Вы привязаны к стулу и не можете встать. Вот пистолет. Вот его барабан — в нем шесть гнезд для патронов, и они все пусты. Смотрите: у меня два патрона. Вы обратили внимание, что я их вставил в соседние гнезда барабана? Теперь я ставлю барабан на место и вращаю его. Я подношу пистолет к вашему виску и нажимаю на спусковой крючок. Щелк! Вы еще

живы. Вам повезло! Сейчас я собираюсь еще раз нажать на крючок. Что вы предпочитаете: чтобы я снова провернул барабан или чтобы просто нажал на спусковой крючок?

<http://forum.eldaniz.ru/index.php?topic=293.60>

Задача 3.47.

Четыре свидетеля, A , B , C и D , говорят правду независимо друг от друга с вероятностью $\frac{1}{3}$. A утверждает, что B отрицает, что C заявил, что D солгал. Какова условная вероятность того, что D сказал правду?

Задача 3.48.

Подробности о пожаре (Ах, а правда ли, что тетя Соня забыла выключить утюг?) передаются по цепочке из четырех человек (A - B - C - D), каждый из которых говорит следующему имеющуюся у него информацию с вероятностью p , а с вероятностью $1 - p$ говорит совершенно противоположное. D говорит, что тетя Соня утюг выключила.

Как зависит от p условная вероятность того, что тетя Соня действительно выключила утюг?

Задача 3.49.

Есть четыре населенных пункта A , B , C и D . Прямая дорога между любыми двумя существует с вероятностью p .

1. Какова вероятность того, что можно добраться из A в D ?
2. Какова вероятность того, что можно добраться из A в D , если между B и C нет прямой дороги?

Задача 3.50.

В урне лежат 5 пронумерованных от одного до пяти шаров. По очереди вытаскиваются два шара. Какова вероятность того, что разница в номерах будет больше двух? Какова вероятность того, что первым был вытащен шар с номером 2, если разница в номерах была больше двух?

Задача 3.51.

A regular n -polygon has vertices numbered $0, 1, 2, \dots, n - 1$ in clockwise. Let the vertex 0 be a starting point. When you roll a dice, you will move the coin clockwise by the number on the dice. Denote the number of the arriving vertex by X . Again roll a dice, you will move from the vertex X to the vertex Y .

1. Are X and Y independent?
2. Find the value of n such that X and Y are independent

Source: Kyoto University entrance exam/Science, Problem 6, 1st Round, 1990

Задача 3.52.

Будем говорить, что событие A благоприятствует событию B , если $\mathbb{P}(B | A) > \mathbb{P}(B)$.

Известно, что A благоприятствует B , B благоприятствует C .

Верно ли, что A благоприятствует C ?

Задача 3.53.

Два неравенства

1. Известно, что $\mathbb{P}(A | B) > \mathbb{P}(A)$. Верно ли, что $\mathbb{P}(B | A) > \mathbb{P}(B)$?
2. Известно, что $\mathbb{P}(A | B) > \mathbb{P}(B)$. Верно ли, что $\mathbb{P}(B | A) > \mathbb{P}(A)$?

Задача 3.54.

На Древе познания Добра и Зла растет 6 плодов познания Добра и 5 плодов познания Зла. Адам и Ева съели по 2 плода. Какова вероятность того, что Ева познала Зло, если Адам познал Добро?

Задача 3.55.

A sniper has 0.8 chance to hit the target if he hit his last shot and 0.7 chance to hit the target if he missed his last shot. It is known he missed on the 1st shot and hit on the 3rd shot.

What is the probability he hit the second shot?

Задача 3.56.

Снайпер попадает в «яблочко» с вероятностью 0.8, если в предыдущий раз он попал в «яблочко»; и с вероятностью 0.7, если в предыдущий раз он не попал в «яблочко» или если это был первый выстрел. Снайпер стрелял по мишени 3 раза.

1. Какова вероятность попадания в «яблочко» при втором выстреле?
2. Какова вероятность попадания в «яблочко» при втором выстреле, если при первом снайпер попал, а при третьем — промазал?

Задача 3.57.

Есть две неправильные монетки. Первая выпадает орлом с вероятностью 0.1, вторая выпадает орлом с вероятностью 0.9. Из этих двух монеток равновероятно выбирают одну и подбрасывают ее 2 раза.

1. Верно ли, что результат первого и второго подбрасывания независимы?
2. Известно, что выбрали первую монетку. Верно ли, что результат первого и второго подбрасывания независимы?

Задача 3.58.

Вы равновероятно могли получить письмо из Москвы или из Игарки. Все буквы в названии города в обратном адресе кроме одной нечитаемы из-за загрязнения на конверте. Единственная различимая буква — это буква «а». Какова условная вероятность того, что письмо пришло из Москвы?

Задача 3.59.

Вася кидает дротик в мишень три раза. Его броски независимы друг от друга. Известно, что во второй раз он попал дальше от центра, чем в первый раз. Какова условная вероятность того, что в третий раз он попадет ближе к центру, чем в первый раз?

Задача 3.60.

В одном мешке лежат только спелые яблоки, в другом — одинаковое количество спелых и зеленых. Вы случайным образом вытаскиваете яблоко из мешка, оно — спелое, вы кладете его обратно. Какова вероятность, что следующее яблоко из того же мешка будет зеленым?

Какова вероятность, что следующее яблоко из того же мешка будет зеленым, если было n попыток достать яблоко, и каждый раз вытаскивалось и клалось обратно спелое яблоко?

Задача 3.61.

Three dice are rolled. If no two show the same face, what is the probability that one is an “ace” (one spot showing.)?

Задача 3.62.

Given that a throw with ten dice produced at least one ace, what is the probability of two or more aces?

Задача 3.63.

Определение. События A_1 и A_2 называются *условно независимыми* относительно события B , если $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \mid B) = \mathbb{P}(A_1 \mid B) \cdot \mathbb{P}(A_2 \mid B)$.

1. Приведите пример таких A_1 , A_2 и B , что A_1 и A_2 , независимы, но не являются условно независимыми относительно B .
2. Приведите пример таких A_1 , A_2 и B , что A_1 и A_2 , зависимы, но являются условно независимыми относительно B .

Задача 3.64.

В урне 99 белых и один черный шар. Один шар извлекается из урны наугад. Петя сказал, что шар — белый. Вася сказал, что шар — белый. Какова вероятность того, что шар действительно белый, если Петя говорит правду с вероятностью 0.8, а Вася — с вероятностью 0.9, независимо от Пети?

Задача 3.65.

У нас ходят два автобуса — 10-ый и 20-ый. Десятый приходит через десять минут после 20-го; 20-ый — через 20 минут после десятого. Я прихожу на остановку в случайный момент времени.

1. Сколько мне в среднем ждать автобуса?
2. Сколько мне еще в среднем ждать автобуса, если я уже прождал t минут?

Задача 3.66.

Suppose ten balls are inserted into a bag based on the tosses of an unbiased coin using the following rules: insert white ball when the coin turns up heads and insert black ball when the coin turns up tails.

Suppose someone who knows how the balls were selected but not what their colors are selects ten balls from the bag one at a time at random, returning each ball and mixing the balls thoroughly before making another selection. If all ten examined balls turn out to be white, what is the probability to the nearest percent that all ten balls in the bag are white?

Задача 3.67.

Неподписанную работу мог написать один из трех человек: Аня — отличница, Петечка и Вовочка — двоешники. Аня всегда отвечает на вопросы теста правильно, Петечка и Вовочка — наугад. Тест — данетка.

1. Какова вероятность того, что на 4-ый вопрос теста будет дан верный ответ?
2. Какова вероятность того, что на 4-ый вопросы теста будет дан верный ответ, если на первые три вопроса даны верные ответы?

source: used at NYC interview (wilmott, bt)

Задача 3.68.

Нестандартный кубик

Нестандартный кубик изготавливают следующим образом: на каждой грани равновероятно независимо от других граней пишут одно из чисел от одного до шести. Т.е. на кубике могут оказаться даже только шестерки. Затем этот кубик подбрасывается два раза.

1. Верно ли, что результаты подбрасываний независимы?
2. Какова вероятность того, что в первый раз выпадет шесть?
3. Какова вероятность того, что во второй раз выпадет шесть, если в первый раз выпало шесть?
4. Какова вероятность того, что шесть выпадет два раза подряд?
5. Чему равна корреляция результатов подбрасываний?
6. Чему равно ожидаемое количество шестерок на кубике, если из n подбрасываний оказалось k шестерок?

4 Var, σ , conditional Var, conditional σ

4.1 Дискретный случай

Задача 4.1.

Кубик подбрасывают до тех пор, пока накопленная сумма очков на гранях не превысит 2. Пусть X — число подбрасываний кубика. Найдите $\mathbb{E}(X)$, $\text{Var}(X)$, $\text{Var}(36X - 5)$, $\mathbb{E}(36X - 17)$.

Задача 4.2.

Из 5-ти деталей 3 бракованных. Сколько потребуется в среднем попыток, прежде чем обнаружится первая дефектная деталь? Какова дисперсия числа попыток?

Задача 4.3.

Бросают два правильных игральных кубика. Пусть X — наименьшая из выпавших граней, а Y — наибольшая.

1. Рассчитайте $\mathbb{P}(X = 3 \cap Y = 5)$;
2. Найдите $\mathbb{E}(X)$, $\text{Var}(X)$, $\mathbb{E}(3X - 2Y)$.

Источник: Cut the knot.

Задача 4.4.

Из колоды в 52 карты извлекаются две. Пусть X — количество тузов. Найдите закон распределения X , $\mathbb{E}(X)$, $\text{Var}(X)$.

Задача 4.5.

Иська пригласил трёх друзей навестить его. Каждый из них появится независимо от другого с вероятностью 0,9, 0,7 и 0,5 соответственно. Пусть N — количество пришедших гостей.

1. Рассчитайте вероятности $\mathbb{P}(N = 0)$, $\mathbb{P}(N = 1)$, $\mathbb{P}(N = 2)$ и $\mathbb{P}(N = 3)$;
2. Найдите $\mathbb{E}(N)$ и $\text{Var}(N)$.

Задача 4.6.

В коробке лежат три монеты: их достоинство — 1, 5 и 10 копеек соответственно. Они извлекаются в случайном порядке. Пусть X_1 , X_2 и X_3 — достоинства монет в порядке их появления из коробки.

1. Верно ли, что X_1 и X_3 одинаково распределены?
2. Верно ли, что X_1 и X_3 независимы?
3. Найдите $\mathbb{E}(X_2)$
4. Найдите дисперсию $\bar{X}_2 = \frac{X_1 + X_2}{2}$.

Задача 4.7.

Easy

Пусть X — сумма очков, выпавших в результате двукратного подбрасывания кубика. Найдите $\mathbb{E}(X)$, $\text{Var}(X)$.

Задача 4.8.

Охотник, имеющий 4 патрона, стреляет по дичи до первого попадания или до израсходования всех патронов. Вероятность попадания при первом выстреле равна 0,6, а при каждом последующем уменьшается на 0,1. Найдите

1. Закон распределения числа патронов, израсходованных охотником;
2. Математическое ожидание и дисперсию этой случайной величины.

Задача 4.9.

У Васи есть две неправильные монетки, выпадающие орлом с вероятностями p_1 и p_2 .

1. Вася n раз наугад берет одну из монеток и подбрасывает ее. Найдите матожидание и дисперсию числа выпавших орлов.
2. Вася наугад берет одну из монеток и подбрасывает ее n раз. Найдите матожидание и дисперсию числа выпавших орлов.
3. Сравните матожидания и дисперсии, полученные выше. Поясните результат интуитивно.

Источник: Алексей Суздальцев

4.2 Непрерывный случай

Задача 4.10.

A large quantity of pebbles lies scattered uniformly over a circular field; compare the labour of collecting them on by one

1. At the center O of the field;
2. At a point A on the circumference.

Источник: Grimmett, экзамен 1858 года в St John's College, Кембридж.

4.3 ? Способ расчёта ожидания и дисперсии через условную

Задача 4.11.

Число x выбирается равномерно на отрезке $[0; 1]$. Затем случайно выбираются числа из отрезка $[0; 1]$ до тех пор, пока не появится число больше x .

1. Сколько в среднем потребуется попыток?
2. Сколько в среднем потребуется попыток, если x выбирается равномерно на отрезке $[0; r]$, $r < 1$?
3. Сколько в среднем потребуется попыток, x не выбирается равномерно, а имеет функцию плотности $p(t) = 2(1 - t)$ для $t \in [0; 1]$?

Задача 4.12.

Петя сообщает Васе значение величины $X \sim U[0; 1]$. Вася изготавливает неправильную монетку, которая выпадает «орлом» с вероятностью X и подкидывает ее 20 раз.

1. Какова вероятность, что выпадет ровно 5 орлов?
2. Каково среднее количество выпавших орлов? Дисперсия?

5 Связь между случайными величинами, Cov, Corr

5.1 Дискретный случай

Задача 5.1.

У Васи есть n монеток, каждая из которых выпадает орлом с вероятностью p . В первом раунде Вася подкидывает все монетки, во втором раунде Вася подкидывает только те монетки, которые выпали орлом в первом раунде. Пусть R_i — количество монеток, подкидывавшихся и выпавших орлом во i -м раунде.

1. Каков закон распределения величины R_2 ?
2. Найдите $\text{Cov}(R_1, R_2)$.

3. Как ведет себя корреляция при $p \rightarrow 0$ и $p \rightarrow 1$? Почему?

Задача 5.2.

«Корреляция — это мера линейной связи»

Найдите все случайные величины X такие, что $\text{corr}(X, X^2) = 1$.

Источник: Алексей Суздальцев

5.2 Непрерывный случай (Cov, Corr)

Задача 5.3.

Пусть X равномерно на $[0; 1]$. Если известно, что $X = x$, то случайная величина Y равномерна на $[x; x + 1]$. Найдите $P(X + Y < 1)$ и $f_{X|Y}(x|y)$. Как распределено $Y - X$?

5.3 Общие свойства Cov и Var

Задача 5.4.

Верно ли, что X и Y независимы, если известно, что

1. Величина X и любая функция $g(Y)$ некоррелированы?
2. Любая функция $f(X)$ и любая функция $g(Y)$ некоррелированы?

5.4 Преобразование случайных величин (преобразования)

Задача 5.5.

На отрезке равномерно и независимо выбираются две точки. Верно ли, что длины получающихся трёх отрезков распределены одинаково?

Задача 5.6.

Птички на проводе-1

На провод, отрезок $[0; 1]$, равномерно и независимо друг от друга садятся n птичек. Пусть Y_1, \dots, Y_{n+1} — расстояния от левого столба до первой птички, от первой птички от второй и т. д.

1. Найдите функцию плотности Y_1 ;
2. Верно ли, что все Y_i одинаково распределены?
3. Верно ли, что все Y_i независимы?
4. Найдите $\text{Cov}(Y_i, Y_j)$ (вроде бы ковариации равны?);
5. Как распределена величина $n \cdot Y_1$ при больших n ? Почему?

Задача 5.7.

Птички на проводе-2

На провод, отрезок $[0; 1]$, равномерно и независимо друг от друга садятся n птичек. Мы берем ведро жёлтой краски и для каждой птички красим участок провода от неё до ближайшей к ней соседки.

Какая часть провода будет окрашена при больших n ?

Источник: Marcin Kuczma.

Задача 5.8.

Длительность разговора клиента в минутах X — экспоненциальная случайная величина со средним две минуты. Стоимость разговора, Y , составляет 5 рублей за весь разговор, если разговор короче двух минут, и 2,5 рубля за минуту, если разговор длиннее двух минут. Неполные минуты оплачиваются пропорционально, например, за 3,5 минуты нужно заплатить $2,5 \cdot 3,5$ рублей. Найдите $\mathbb{E}(Y)$, $\text{Var}(Y)$, постройте функцию распределения Y .

Задача 5.9.

Вася пришёл на остановку. Ему нужен 42-й или 21-й автобус. Время до прихода 42-го равномерно на отрезке $[0; 10]$ минут, время до прихода 21-го равномерно на отрезке $[0; 20]$ минут. Время прихода 42-го и время прихода 21-го — независимые величины. Обозначим за Y время, которое Вася проведёт в ожидании на остановке. Найдите функцию плотности Y , $\mathbb{E}(Y)$, $\text{Var}(Y)$.

5.5 Прочее про несколько случайных величин

Задача 5.10.

Парадокс голосования

Пусть X, Y, Z — дискретные случайные величины, их значения попарно различны с вероятностью 1. Докажите, что $\min \{\mathbb{P}(X > Y), \mathbb{P}(Y > Z), \mathbb{P}(Z > X)\} \leq \frac{2}{3}$. Приведите пример, при котором эта граница точно достигается.

6 Приёмы решения

6.1 Разложение в сумму

Задача 6.1.

Судьба Дон-Жуана-2 (см. тж. с. 8)

У Васи n знакомых девушек, их всех зовут по-разному. Он пишет им n писем, но по рассеянности раскладывает их в конверты наугад. Случайная величина X обозначает количество девушек, получивших письма, написанные лично для них. Найдите $\mathbb{E}(X)$, $\text{Var}(X)$.

Задача 6.2.

(см. тж. с. 11)

A wooden cube that measures 3 cm along each edge is painted red. The painted cube is then cut into 27 pieces of 1-cm cubes. If I tossed all the small cubes in the air, so that they landed randomly on the table, how many cubes should I expect to land with a painted face up?

Задача 6.3.

Вокруг новогодней ёлки танцуют хороводом 27 детей. Мы считаем, что ребенок высокий, если он выше обоих своих соседей. Сколько высоких детей в среднем танцует вокруг елки? Вероятность совпадения роста будем считать равной нулю.

Задача 6.4.

Маша собирает свою дамскую сумочку. Есть n различных предметов, которые она туда может положить. Каждый предмет она кладёт независимо от других с вероятностью p .

1. Пусть X — количество положенных предметов. Найдите $\mathbb{E}(X)$ и $\text{Var}(X)$.
2. При каком p вероятность положить в сумку любой заданный набор вещей не будет зависеть от конкретного набора?

Задача 6.5.

Игральный кубик подбрасывается 100 раз. Найдите ожидаемую сумму очков, дисперсию суммы, стандартное отклонение суммы.

Задача 6.6.

Гипергеометрическое распределение

В задачнике N задач. Из них a — Вася умеет решать, а остальные не умеет. На экзамене предлагается равновероятно выбираемые n задач. Величина X — число решенных Васей задач на экзамене.

Найдите $\mathbb{E}(X)$ и $\text{Var}(X)$

Задача 6.7.

Кубик подбрасывается n раз. Величина X_1 — число выпадений 1, а X_6 — число выпадений 6. Найдите $\text{Cov}(X_1, X_6)$

Подсказка: $\text{Cov}(X_1, X_1 + \dots + X_6)$ вам в помощь...

Задача 6.8.

По 10 коробкам наугад раскладывают 7 карандашей. Каково среднее количество пустых коробок?

Задача 6.9.

[Mosteller] Среднее число совпадений

Из хорошо перетасованной колоды на стол последовательно выкладываются карты лицевой стороной вверх, после чего Аналогичным образом выкладывается вторая колода, так что каждая карта первой колоды лежит под картой из второй колоды. Каково среднее число совпадений нижней и верхней карт?

Задача 6.10.

Grimmett, 3.3.3.

В группе 20 человек. Каждый из них подбрасывает по кубику. Найдите ожидаемый выигрыш и дисперсию выигрыша группы, если:

1. за каждую пару игроков, выкинувших одинаковое количество очков, группа получает один тугрик
2. за каждую пару игроков, выкинувших одинаковое количество очков, группа получает эту сумму в тугриках

Задача 6.11.

Coupon's collector problem

Внутри упаковки шоколадки «Веселые животные» находится наклейка с изображением одного из 30 животных. Предположим, что все наклейки равновероятны. Большой приз получит каждый, кто соберет наклейки всех животных. Какое количество шоколадок в среднем нужно купить, чтобы выиграть большой приз?

Задача 6.12.

[Mosteller]

В n урн случайным образом бросают один за одним k шаров. Найдите математическое ожидание числа пустых урн.

Задача 6.13.

У Маши 30 разных пар туфель. И она говорит, что мало! Пес Шарик утащил 17 туфель без разбору на левые и правые. Сколько полных пар в среднем осталось у Маши? Сколько полных пар в среднем досталось Шарику?

Задача 6.14.

Из колоды в 52 карты извлекается 5 карт. Сколько в среднем извлекается мастей? Достоинств? Тузов?

Задача 6.15.

На карточках написаны числа от 1 до n . В игре участвуют n человек. В первом туре каждый получает случайным образом по одной карточке. Во втором туре карточки выдаются заново. Призы раздаются по следующему принципу: Человек не получает приз, только если найдется кто-то другой, кто получил большие числа в каждом туре. Каково среднее количество человек, получивших приз? Взято с www.zaba.ru, какая-то олимпиада.

Задача 6.16.

А.А. Мамонтов сидит в 424 аудитории. Эконометрику собираются сдавать несколько человек. На поиски пустых аудиторий послано 3 студента-разведчика. На втором этаже 9 учебных аудиторий, 5 из них заняты. Каждый из 3 студентов-разведчиков независимо друг от друга заглядывает в 3 аудитории. Если студент обнаруживает пустую аудиторию, то он сообщает ее номер А.А. Мамонтову. Каково среднее количество обнаруженных пустых аудиторий?

Задача 6.17.

Вася пишет друг за другом наугад 100 букв из латинского алфавита.

1. Каково ожидаемое количество букв, встречающихся в написанном «слове» ровно один раз?
2. Как изменилась бы искомая величина, $a_{k,n}$, если бы в алфавите было k букв, а Вася писал бы «слово» из n букв?
3. Найдите $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{k,n}$, $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{k,n}$

Задача 6.18.

За круглым столом сидят в случайном порядке n супружеских пар, всего — $2n$ человек. Величина X — число пар, где супруги оказались напротив друг друга.

Найдите $\mathbb{E}(X)$ и $\text{Var}(X)$

Задача 6.19.

Suppose there were m married couples, but that d of these $2m$ people have died. Regard the d deaths as striking the $2m$ people at random. Let X be the number of surviving couples. Find: $\mathbb{E}(X)$ and $\text{Var}(X)$

Задача 6.20.

Над озером взлетело 20 уток. Каждый из 10 охотников стреляет в утку по своему выбору.

1. Каково ожидаемое количество убитых уток, если охотники стреляют без промаха?

2. Как изменится ответ, если вероятность попадания равна 0,7?
3. Каким будет ожидаемое количество охотников, попавших в цель?

Задача 6.21.

В каждой из двух урн находится по 50 белых и 50 черных шаров. Вася одновременно вытаскивает по шару из каждой урны и выбрасывает их. Величина X — количество раз, когда из обеих урн были одновременно вытащены белые шары.

Найдите $\mathbb{E}(X)$, $\text{Var}(X)$

Задача 6.22.

На карточках написаны числа от 1 до n . Вася достает их одну за другой наугад. Если номер карточки является соседним с номером предыдущей карточки, то Вася получает 1 рубль. Величина X — Васин выигрыш.

Найдите $\mathbb{E}(X)$, $\text{Var}(X)$

Задача 6.23.

Вася называет наугад 50 чисел от 1 до 100, допускаются повторения, а Петя называет наугад 50 чисел от 1 до 100 без повторов.

Величины X и Y это суммы этих чисел.

1. Сравните $\mathbb{E}(X)$ и $\mathbb{E}(Y)$
2. Сравните $\text{Var}(X)$ и $\text{Var}(Y)$

Задача 6.24.

Кубик подбрасывается до тех пор, пока каждая грань не выпадет по разу. Найдите математическое ожидание и дисперсию числа подбрасываний.

Задача 6.25.

Правильная монетка подбрасывается n раз. Серия — это последовательность подбрасываний из одинаковых результатов. К примеру, в последовательности ОООРРО три серии.

1. Каково ожидаемое количество серий?
2. Дисперсия числа серий?
3. А если монетка неправильная и выпадает гербом с вероятностью p ?

Задача 6.26.

В здании 10 этажей, на каждом этаже 30 окон. Вечером в каждом окне независимо от других свет включается с вероятностью p .

1. Чему равно ожидаемое количество «ноликов» на фасаде здания?
2. Чему равно ожидаемое количество «крестиков» на фасаде здания?
3. При каких p эти количества максимальны? Минимальны?

Примечание: два разных нолика могут иметь общие точки

Вставить рисунок нолика и рисунок крестика, пример подсчета

Задача 6.27.

Если смотреть на корпус Ж здания Вышки с Дурасовского переулка, то видно 40 окон. (??? Видно 7 этажей, первый не видно, и 8 окон на каждом этаже, уточнить по месту). Допустим, что каждое из них освещено вечером независимо от других с вероятностью одна вторая. Назовем «уголком» комбинацию из 4-х окон, расположенных квадратом, в которой освещено ровно три окна (не важно, какие). Величина X — число «уголков», возможно пересекающихся, на всем корпусе Ж.

Найдите $\mathbb{E}(X)$ и $\text{Var}(X)$

Примечание - для наглядности:

X	X
	X

,

X	
X	X

,

	X
X	X

,

X	X
X	

- это «уголки».

X	X	X
	X	
X	X	

- в этой конфигурации три «уголка»;

X		X
	X	
X		X

- а здесь - ни одного «уголка».

Задача 6.28.

В урне n шаров пронумерованных $1, 2, \dots, n$. Наугад вытаскивают k . Найдите ожидание и дисперсию суммы номеров.

Задача 6.29.

У Пети стопка из n номеров газеты «Вышка» лежащих в случайном порядке. Петя сортирует газеты следующим образом. Он последовательно просматривает стопку сверху вниз. Если просматриваемый выпуск более свежий, чем лежащий сверху стопки, то Петя перекладывает более свежий выпуск наверх стопки и начинает просматривать стопку заново.

Сколько «переносов» более свежих номеров наверх в среднем будет сделано до того момента, когда наверху окажется первый выпуск газеты?

<http://www.artofproblemsolving.com/Forum/viewtopic.php?t=124903>

6.2 Первый шаг

Какой-то баг с Ильёй Муромцем!

Задача 6.30.

Илье Муромцу предстоит дорога к камню. И от камня начинаются ещё три дороги. Каждая из тех дорог снова оканчивается камнем. И от каждого камня начинаются ещё три дороги. И каждые те три дороги оканчиваются камнем. . . И так далее до бесконечности. На каждой дороге можно встретить живущего на ней трёхголового Змея Горыныча с вероятностью (хм, вы не поверите!) одна третья. Какова вероятность того, что Илья Муромец пройдет свой бесконечный жизненный путь, так ни разу и не встретив Змея Горыныча?

Задача 6.31.

У Пети — монетка, выпадающая орлом с вероятностью $p \in (0; 1)$. У Васи — с вероятностью $q \in (0; 1)$. Они одновременно подбрасывают свои монетки до тех пор, пока у них не окажется набранным одинаковое количество орлов. В частности, они останавливаются после первого подбрасывания, если оно дало одинаковые результаты. Сколько в среднем раз им придётся подбросить монетку?

Задача 6.32.

Сколько в среднем нужно взять из колоды в 52 карты, чтобы насобирать подряд 5 карт одной масти?

Подсказка. Ответ имеет вид произведения дробей очень простого вида.

Задача 6.33.

Вася прыгает на один метр вперёд с вероятностью p и на два метра вперёд с вероятностью $1 - p$. Как только он пересечёт дистанцию в 100 метров, он останавливается. Получается, что он может остановиться на отметке либо в 100 метров, либо в 101 метр. Какова вероятность того, что он остановится ровно на отметке в 100 метров?

Задача 6.34.

Испытания по схеме Бернулли проводятся до первого успеха, вероятность успеха в отдельном испытании равна p

- а) Чему равно ожидаемое количество испытаний?
- б) Чему равно ожидаемое количество неудач?
- в) Чему равна дисперсия количества неудач?

Задача 6.35.

Отрицательное биномиальное

Испытания по схеме Бернулли проводятся до r -го успеха, вероятность успеха в отдельном испытании равна p

- а) Чему равно ожидаемое количество неудач?
- б) Чему равна дисперсия количества неудач?

Задача 6.36.

Саша и Маша по очереди подбрасывают кубик. Посуду будет мыть тот, кто первым выбросит шестерку. Маша бросает первой. Какова вероятность того, что Маша будет мыть посуду?

Задача 6.37.

Саша и Маша решили, что будут рожать нового ребенка, до тех пор, пока в их семье не будут дети обоих полов. Каково ожидаемое количество детей?

Задача 6.38.

Четыре человека играют в игру «белая ворона платит». Они одновременно подкидывают монетки. Если три монетки выпали одной стороной, а одна - по-другому, то «белая ворона» оплачивает всей четверке ужин в ресторане. Если «белая ворона» не определилась, то монетки подбрасывают снова. Сколько в среднем нужно подбрасывания для определения «белой вороны»?

Задача 6.39.

Саша и Маша каждую неделю ходят в кино. Саша доволен фильмом с вероятностью $1/4$, Маша - с вероятностью $1/3$.

- Сколько недель в среднем пройдет до тех пор, пока кто-то не будет доволен?
- Какова вероятность того, что первым будет доволен Саша?
- Сколько недель в среднем пройдет до тех пор, пока каждый не будет доволен хотя бы одним просмотренным фильмом?

Задача 6.40.

По ответу студента на вопрос преподаватель может сделать один из трех выводов: ставить зачет, ставить незачет, задать еще один вопрос. Допустим, что знания студента и характер преподавателя таковы, что при ответе на отдельный вопрос зачет получается с вероятностью $p_1 = 3/8$, незачет - с вероятностью $p_2 = 1/8$. Преподаватель задает вопросы до тех пор, пока не определится оценка.

- Сколько вопросов в среднем будет задано?
- Какова вероятность получения зачета?

Задача 6.41.

Вы играете в следующую игру. Кубик подкидывается неограниченное число раз. Если на кубике выпадает 1, 2 или 3, то соответствующее количество монет добавляется на кон. Если выпадает 4 или 5, то игра оканчивается и Вы получаете сумму, лежащую на кону. Если выпадает 6, то игра оканчивается, а Вы не получаете ничего.

- Чему равен ожидаемый выигрыш в эту игру?
- Изменим условие: если выпадает 5, то набранная сумма сгорает, а игра начинается заново. Чему будет равен ожидаемый выигрыш?

Задача 6.42.

Вася подкидывает кубик. Если выпадает единица, или Вася говорит «стоп», то игра оканчивается, если нет, то начинается заново. Васин выигрыш - последнее выпавшее число. Как выглядит оптимальная стратегия? Как выглядит оптимальная стратегия, если за каждое подбрасывание Вася платит 35 копеек? [?]

Задача 6.43.

Саша и Маша подкидывают монетку бесконечное количество раз. Если сначала появится РОРО, то выигрывает Саша, если сначала появится ОРОО, то - Маша.

- У кого какие шансы выиграть?
- Сколько в среднем времени ждать до появления РОРО? До ОРОО?
- Сколько в среднем времени ждать до определения победителя?

Задача 6.44.

Есть три комнаты. В первой из них лежит сыр. Если мышка попадает в первую комнату, то она находит сыр через одну минуту. Если мышка попадает во вторую комнату, то она ищет сыр две минуты и покидает комнату. Если мышка попадает в третью комнату, то она ищет сыр три минуты и покидает комнату. Покинув комнату, мышка выходит в коридор и выбирает новую комнату наугад (т.е. может зайти в одну и ту же). Сейчас мышка в коридоре. Сколько времени ей в среднем потребуется, чтобы найти сыр?

Задача 6.45.

Иська и Еська по очереди подбрасывают два кубика. Иська бросает первым. Иська выигрывает, если при своем броске получит 6 очков в сумме на двух кубиках. Еська выигрывает, если при своем броске получит 7 очков в сумме на двух кубиков. Кубики подбрасываются до тех пор, пока не определится победитель.

- Верно ли, что события $A = \{\text{на двух кубиках в сумме выпало больше 5 очков}\}$ и $B = \{\text{на одном из кубиков выпала 1}\}$ являются независимыми?
- Какова вероятность того, что Еська выиграет?

Задача 6.46.

Players A and B play a (fair) dice game. «A» deposits one coin and they take turns rolling a single dice, «B» rolling first.

If «B» rolls an even number, he collects a coin from the pot. If he rolls an odd number, he put a coin (coins with same values always). If «A» (plays and) rolls an even number, he collects a coin but if he rolls an odd number, he does NOT add a coin. The game continues until the pot is exhausted.

Question: what is the probability that «A» wins this game (that is, exhaust the pot) ?

t=138358

Задача 6.47.

Вам предложена следующая игра. Изначально на кону 0 рублей. Раз за разом подбрасывается правильная монетка. Если она выпадает орлом, то казино добавляет на кон 100 рублей. Если монетка выпадает решкой, то все деньги, лежащие на кону, казино забирает себе, а Вы получаете красную карточку. Игра прекращается либо когда Вы получаете третью красную карточку, либо в любой момент времени до этого по Вашему выбору. Если Вы решили остановить игру до получения трех красных карточек, то Ваш выигрыш равен сумме на кону. При получении третьей красной карточки игра заканчивается и Вы не получаете ничего.

1. Как выглядит оптимальная стратегия в этой игре?

2. Чему при этом будет равен средний выигрыш?

Задача 6.48.

Китайский ресторан

Каждый момент времени в китайский ресторан приходит новый посетитель. Если сейчас в ресторане сидит n человек, а за конкретным столиком сидит b человек, то вероятность того, что новый посетитель присоединится к этому столику равна $\frac{b}{n+\theta}$. С вероятностью $\frac{\theta}{n+\theta}$ посетитель сядет за отдельный столик.

Каково ожидаемое число занятых столиков к моменту времени n ?

Задача 6.49.

Вася бьет мячом по воротам 100 раз. В первый раз вероятность попасть равна $\frac{1}{2}$, в каждый последующий раз вероятность попасть увеличивается - Вася становится метче; при этом разные удары независимы. Какова вероятность того, что Вася попадет в ворота четное число раз?

Задача 6.50.

Вася нажимает на пульте телевизора кнопку «On-Off» 100 раз подряд. Пульт старый, поэтому в первый раз кнопка срабатывает с вероятностью $\frac{1}{2}$, затем вероятность срабатывания падает. Какова вероятность того, что после всех нажатий телевизор будет включен, если сейчас он выключен?

Задача 6.51.

Вы в тире, и у Вас 100 патронов. С вероятностью 0.01 Вы попадаете в глаз Усамы Бен Ладена, за что получаете 20 дополнительных патронов, с вероятностью 0.05 Вы попадаете в нос Усамы Бен Ладена, за что получаете 5 дополнительных патронов. Вы стреляете до тех пор, пока патроны не кончатся. Сколько в среднем Вы сделаете выстрелов?

www.wilmott.com-forum-brainteasers

Задача 6.52.

В вершинах треугольника три ежика. С вероятностью p каждый ежик независимо от других двигается по часовой стрелке, с вероятностью $(1 - p)$ он двигается против часовой стрелки. Сколько в среднем пройдет времени прежде, чем они встретятся в одной вершине?

При каком p ожидаемое время встречи минимально?

6.3 Аллюзии на принцип Белмана

Задача 6.53.

Начинающая певица дает концерты каждый день. Каждый ее концерт приносит продюсеру 0.75 тысяч евро. После каждого концерта певица может впасть в депрессию с вероятностью 0.5. Самостоятельно выйти из депрессии певица не может. В депрессии она не в состоянии проводить концерты. Помочь ей могут только цветы от продюсера. Если подарить цветы на сумму $0 \leq x \leq 1$ тысяч евро, то она выйдет из депрессии с вероятностью \sqrt{x} . Дисконт фактор равен 0.8.

Какова оптимальная стратегия продюсера?

Задача 6.54.

Будучи незамужней Маша испытывает отрицательную полезность —с каждый день. Каждый день она знакомится с новым ухажером и может тут же выскочить за него замуж. Каждый ухажер характеризуется параметром X , полезностью, которую Маша получит в день свадьбы с ним. Вы о чем подумали? Величина X распределено равномерно на $[0; 1]$. Ежедневная полезность Маши от замужнего состояния после дня свадьбы равна 0. Дисконт фактор (с которым дисконтируется Машина полезность) равен δ .

1. Как выглядит оптимальная стратегия Маши, если она выбирает мужа на всю жизнь?
2. Как выглядит оптимальная стратегия Маши, если она легко может развестись?

6.4 α -малое

Задача 6.55.

Случайные величины X_1, \dots, X_n одинаково распределены с функцией плотности $p(t)$ и независимы. Найдите функцию плотности третьего по величине $X_{(3)}$.

6.5 Вероятностный метод

Задача 6.56.

На потоке 200 студентов. На контрольной было 6 задач. Известно, что каждую задачу решило не менее 120 человек. Всегда ли преподаватель может выбрать двух студентов из потока так, что эти двое могут решить всю контрольную совместными усилиями?

6.6 Склеивание отрезка

Задача 6.57.

Машина может сломаться равновероятно в любой точке на дороге от города А до города Б. Когда машина сломается мы будем толкать ее до ближайшего сервиса. Где должны быть расположены три автосервиса чтобы минимизировать ожидаемую продолжительность толкания? А если автосервисов будет n ?

Задача 6.58.

Рулет

Длинный рулет разрезан на n частей. Каждый из k гостей по очереди забирает себе один кусочек, выбираемый случайным образом. В результате остается $n - k$ кусочков рулета. Оставшиеся кусочки рулета лежат «сериями», разделенными «дырками» от забранных кусочков. Каково ожидаемое число «серий» оставшихся кусочков? К чему стремится эта величина при $n \rightarrow \infty$?

Автор: Алексей Суздальцев

Задача 6.59.

Петя ищет 6 нужных ему книг в стопке из 30 книг. Книги внешне не отличимы. Сколько книг в среднем ему придется пересмотреть? Просмотренные книги Петя в общую кучу не возвращает.

6.7 Мартингальный метод

Справедливую игру стратегией не испортишь!

Задача 6.60.

У Васи 100 рублей, у Пети — 150. Они играют в орлянку правильной монеткой до тех пор, пока все деньги не перейдут к одному игроку. Какова вероятность, что победит Вася?

7 Неравенства, связанные с ожиданием

7.1 Чебышёв/Марков/Кантелли/Чернов

Задача 7.1.

У последовательности неотрицательных случайных величин X_1, X_2, \dots дисперсия постоянна, а математическое ожидание стремится к бесконечности, $\lim \mathbb{E}(X) = +\infty$. Найдите $\lim \mathbb{P}(X_n > a)$.

7.2 Йенсен

Задача 7.2.

Вася забрасывает удочку 100 раз. Вероятность поймать рыбку при одном забрасывании равна p . Петя забрасывает удочку случайное количество раз, N , под настроение. Известно, что $\mathbb{E}(N) = 100$. У кого шансы поймать хотя бы одну рыбку выше?

Задача 7.3.

Тысяча зайцев требует спасения. Дед Мазай выбирает между двумя стратегиями:

А. Перевозить зайцев равными партиями по 10 за заход.

В. Перевозить зайцев случайными партиями от 1 до 19 зайцев за заход.

В каком случае ожидаемое количество заходов будет меньшим?

Задача 7.4.

При каких условиях $\mathbb{E}\left(\frac{1}{X}\right) = \frac{1}{\mathbb{E}(X)}$?

7.3 Коши—Шварц

8 Сходимости

Задача 8.1.

Определите, к какому распределению сходятся указанные последовательности

1. $X_n \sim N\left(\frac{n-1}{n+1}, 9\right)$

2. $X_n \sim N\left(7, \frac{5+n}{n^2}\right)$

3. $X_n \sim t_n$

4. $X_n \sim \frac{Y_n}{n}$, где $Y_n \sim \chi_n^2$

5. $X_n \sim \frac{Y_n}{n+5}$, где $Y_n \sim \chi_n^2$

6. $X_n \sim \frac{Y_n - n}{\sqrt{n}}$, где $Y_n \sim \chi_n^2$

7. $X_n \sim 2011Y_n$, где $F_{2011,n}$

9 Компьютерные (use R or Python!)

9.1 Нахождение сложных сумм/поиск оптимальных стратегий

Задача 9.1.

Перед нами 10 коробок. Изначально в 1-й коробке 1 шар, во 2-й — 2 шара и т. д. Мы равновероятно выбираем одну из коробок, вытаскиваем из неё шар и кладем его равновероятно в одну из девяти оставшихся коробок. Мы повторяем это перекладывание до тех пор, пока одна из коробок не станет пустой. Пусть N — число перекладываний. С помощью компьютера оцените $\mathbb{E}(N)$, $\text{Var}(N)$.

Задача 9.2.

В классе учатся n человек. Нас интересует вероятность того, что хотя бы у двух из них дни рождения будут в соседние дни. (31 декабря и 1 января будем считать соседними). При каком n эта вероятность впервые достигнет 0,5?

Задача 9.3.

В классе 30 человек. Какова вероятность того, что есть три человека, у которых совпадают дни рождения? Найдите ответ с помощью симуляций и с помощью пуассоновского приближения. При каком количестве человек эта вероятность впервые превысит 50 %?

Задача 9.4.

Сколько нужно людей, чтобы вероятность того, что в каждый день года у кого-то день рождения, впервые превысила 50 %?

Задача 9.5.

Сколько в среднем нужно взять из колоды в 52 карты, чтобы собирать подряд 5 карт одной масти? Не обязательно одной масти?

Задача 9.6.

Маленький мальчик торгует на улице еженедельной газетой. Покупает он ее по 15 рублей, а продает по 30 рублей. Количество потенциальных покупателей — случайная величина с распределением Пуассона и средним значением равным 50. Нераспроданные газеты ничего не стоят. Пусть n — количество газет, максимизирующее ожидаемую прибыль мальчика.

1. Чему примерно должно быть равно значение функции распределения в точке n ?
2. С помощью компьютера найдите n и ожидаемую прибыль.

Задача 9.7.

Подбрасывается правильная монетка. В любой момент вы можете сказать «Хватит». Ваш выигрыш равен доле орлов на момент остановки. С помощью компьютера определите, чему равен ожидаемый выигрыш при использовании оптимальной стратегии? При решении на компьютере можно считать, что число подбрасываний ограничено скажем 500.

Задача 9.8.

У Васи есть 100 рублей. Вася открывает карты из колоды одну за одной в случайном порядке. В колоде 26 красных и 26 чёрных карт. Перед открытием каждой карты Вася может поставить на цвет любую целую сумму рублей в пределах своего капитала. Если он угадал цвет, то его ставка возвращается удвоенной, если нет, то он теряет ставку. Задача Васи — максимизировать ожидаемый финальный выигрыш. С помощью компьютера определите, как выглядит оптимальная стратегия и какую сумму он в среднем выигрывает?

9.2 Проведение симуляций

9.3 Statistics

Задача 9.9.

Петя подбрасывал две монетки неправильные монетки. Результаты подбрасывания:

Число подбрасываний первой. Число подбрасываний второй. Общее число орлов.

... ..

Оцените с помощью компьютера вероятности выпадения орлом для каждой монетки. Постройте доверительные интервалы. (Красивого решения в явном виде нет).

Можно использовать нормальное приближение

Задача 9.10.

Голосовать можно за трёх кандидатов: А, Б и В. Из 100 опрошенных 20 хотят голосовать за А, 40 — за Б, остальные — за В. В осях p_A , p_B постройте 90-процентную доверительную двумерную область.

10 Пуассоновский поток и экспоненциальное распределение

10.1 Пуассоновский поток

Задача 10.1.

Предположим, что кузнечики на большой поляне распределены по пуассоновскому закону с $\lambda = 3$ на квадратный метр. Какой следует взять сторону квадрата, чтобы вероятность найти в нем хотя бы одного кузнечика была равна 0,8?

Задача 10.2.

Саша красит стены в своей комнате, а Алёша — в своей. У каждой комнаты четыре стены. Предположим, что время покраски одной стены и для Саши, и для Алёши — экспоненциальная случайная величина с параметром λ . Какова вероятность того, что Саша успеет покрасить 3 стены раньше, чем Алёша — две?

Задача 10.3.

Машины подъезжают к светофору пуассоновским потоком с интенсивностью λ . Для простоты будем считать, что первая машина подъезжает в $t = 0$. Светофор горит зелёным только в целые моменты времени, и этого достаточно чтобы пропустить одну машину, т. е. светофор горит красным при $t \in (0; 1)$, $t \in (1; 2)$, $t \in (2; 3)$ и т. д. Какой будет средняя длина очереди через продолжительное время? Чему будет равна вероятность, что очередь пуста?

Задача 10.4.

В офисе два телефона: зелёный и красный. Входящие звонки на красный — Пуассоновский поток событий с интенсивностью $\lambda_1 = 4$ звонка в час, входящие на зелёный — с интенсивностью $\lambda_2 = 5$ звонков в час. Секретарша Василиса Премудрая одна в офисе. Время разговора — случайная величина, имеющая экспоненциальное распределение со средним временем 5 минут. Если Василиса занята разговором, то на второй телефон она не отвечает. Сколько звонков в час в среднем пропустит Василиса, потому что будет занята разговором по другому телефону? Являются ли пропущенные звонки Пуассоновским потоком?

Задача 10.5.

В офисе два телефона: зелёный и красный. Входящие звонки на красный — Пуассоновский поток событий с интенсивностью $\lambda_1 = 4$ звонка в час, входящие на зелёный — с интенсивностью $\lambda_2 = 5$ звонков в час. Секретарша Василиса Премудрая одна в офисе. Перед началом рабочего дня она подбрасывает монетку и отключает один из телефонов: зелёный — если выпала решка, красный — если выпал орёл. Обозначим за Y время от начала дня до первого звонка. Найдите функцию плотности Y .

Задача 10.6.

Случайная величина X имеет экспоненциальное распределение с параметром λ . Найдите медиану X .

10.2 Пуассоновское приближение

Задача 10.7.

Используя пуассоновское предупреждение найдите вероятности

1. В гирлянде 25 лампочек. Вероятность брака для отдельной лампочки равна 0,01. Какова вероятность того, что гирлянда полностью исправна?
2. По некоему предмету незачет получило всего 2% студентов. Какова вероятность того, что в группе из 50 студентов будет ровно 1 человек с незачетом?
3. Вася испек 40 булочек. В каждую из них он кладет изюминку с $p = 0,02$. Какова вероятность того, что всего окажется 3 булочки с изюмом?

Задача 10.8.

Вася каждый день подбрасывает монетку 10 раз. Монетка с вероятностью 0,005 встает на ребро. Используя пуассоновскую аппроксимацию, оцените вероятность того, что за 100 дней монетка встанет на ребро ровно 3 раза.

Задача 10.9.

Страховая компания «Ой» заключает договор страхования от «невыезда» (не выдачи визы) с туристами, покупающими туры в Европу. Из предыдущей практики известно, что в среднем отказывают в визе одному из 130 человек. Найдите вероятность того, что из 200 застраховавшихся в «Ой» туристов, четверым потребуется страховое возмещение.

Задача 10.10.

Вася, владелец крупного Интернет-портала, вывесил на главной странице рекламный баннер. Ежедневно его страницу посещают 1000 человек. Вероятность того, что посетитель портала кликнет по баннеру равна 0,003. С помощью пуассоновского приближения оцените вероятность того, что за один день не будет ни одного клика по баннеру.

11 Нормальное распределение и ЦПТ

11.1 Одномерное нормальное распределение

Задача 11.1.

Где находятся точки перегиба функции плотности для нормального распределения?

Задача 11.2.

Пусть $X \sim \mathcal{N}(\mu; \sigma^2)$ и $t > \mu$. В какой точке функция $\mathbb{P}(X \in [t; t + dt])$ убывает быстрее всего?

Задача 11.3.

Имеются две акции с доходностями X и Y на один вложенный рубль. Доходности некоррелированы, $\mathbb{E}(X) = 0,09$, $\mathbb{E}(Y) = 0,04$, $\sigma_X = 0,5$, $\sigma_Y = 0,1$. У инвестора есть 1 рубль. Он покупает на $a \in (0; 1)$

рубля первых акций и на $(1 - a)$ вторых акций. Обозначим за $\mu(a)$ и $\sigma(a)$ ожидаемую доходность и стандартное отклонение доходности полученного портфеля.

1. Постройте множество возможных $\mu(a)$ и $\sigma(a)$
2. Найдите наименее рискованный портфель. Чему равна его ожидаемая доходность?

Задача 11.4.

Имеются две акции с доходностями X и Y на один вложенный рубль. Доходности некоррелированы, $E(X) = 0,09$, $E(Y) = 0,04$, $\sigma_X = 0,5$, $\sigma_Y = 0,1$. У инвестора есть 1 рубль. Инвестор подкидывает неправильную монетку, выпадающую орлом с вероятностью p . Если монетка выпадает орлом, он покупает первые акции, если решкой, то вторые. Обозначим за $\mu(p)$ и $\sigma(p)$ ожидаемую доходность и стандартное отклонение доходности полученной стратегии.

1. Постройте множество возможных $\mu(p)$ и $\sigma(p)$.
2. Найдите функцию плотности доходности полученной стратегии.

Задача 11.5.

Известна функция плотности случайной величины, $p_X(t) = c \cdot \exp(-8t^2 + 5t)$. Найдите $E(X)$, σ_X .

11.2 ЦПТ

Задача 11.6.

Вася играет в компьютерную игру — «стрелялку-бродилку». По сюжету ему нужно убить 60 монстров. На один выстрел уходит ровно 1 минута. Вероятность убить монстра с одного выстрела равна 0,25. Количество выстрелов не ограничено.

1. Сколько времени в среднем Вася тратит на одного монстра?
2. Найдите дисперсию этого времени.
3. Какова вероятность того, что Вася закончит игру меньше, чем за 3 часа?

11.3 Многомерное нормальное распределение

Задача 11.7.

Ермолай Лопахин решил приступить к вырубке вишневого сада. Однако выяснилось, что растут в нём не только вишни, но и яблони. Причём, по словам Любови Андреевны Раневской, среднее количество деревьев (а они периодически погибают от холода или жары, либо из семян вырастают новые) в саду распределено в соответствии с нормальным законом (X — число яблонь, Y — число вишен) со следующими параметрами:

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim \mathcal{N} \left(\begin{pmatrix} 25 \\ 125 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 10 \end{pmatrix} \right) \quad (1)$$

Найдите вероятность того, что Ермолаю Лопахину придется вырубить более 150 деревьев. Каково ожидаемое число подлежащих вырубке вишен, если известно, что предприимчивый и последовательный Лопахин, не затронув ни одного вишнёвого дерева, начал очистку сада с яблонь и все 35 яблонь уже вырубил?

Автор: Кирилл Фурманов, Ира ...

Задача 11.8.

В самолете пассажирам предлагают на выбор «мясо» или «курицу». В самолет 250 мест. Каждый пассажир с вероятностью 0.6 выбирает курицу, и с вероятностью 0.4 - мясо. Сколько порций курицы и мяса нужно взять, чтобы с вероятностью 99% каждый пассажир получил предпочитаемое блюдо, а стоимость «мяса» и «курицы» для компании одинаковая?

Как изменится ответ, если компания берет на борт одинаковое количество «мяса» и «курицы»?

11.4 Распределения связанные с нормальным

Задача 11.9.

Сравните $E(F_{k,n})$ и $Var(t_n)$.

Задача 11.10.

Пусть $X \sim t_n$. Как распределена величина $Y = X^2$?

Задача 11.11.

На плоскости выбирается точка со случайными координатами. Абсцисса и ордината независимы и распределены $N(0; 1)$. Какова вероятность того, что расстояние от точки до начала координат будет больше 2,45?

12 Случайное блуждание

12.1 Дискретное случайное блуждание

Задача 12.1.

Какова вероятность того, что трёхмерное случайное блуждание бесконечное количество раз пересечёт вертикальную ось?

Задача 12.2.

Пусть X_n — симметричное случайное блуждание. Сколько времени в среднем придётся ждать, пока остаток от деления X_n на 183 окажется равным 39?

12.2 Принцип отражения

Задача 12.3.

Выборы

После выборов, в которых участвуют два кандидата, А и В, за них поступило a и b ($a > b$) бюллетеней соответственно, скажем, 3 и 2. Если подсчёт голосов производится последовательным извлечением бюллетеней из урны, то какова вероятность того, что хотя бы один раз число вынутых бюллетеней, поданных за А и В, было одинаково? Какова вероятность того, что А всё время лидировал?

Источник: Mosteller.

Задача 12.4.

Ничьи при бросании монеты

Игроки А и В в орлянку играют n раз. После первого бросания каковы шансы на то, что в течение всей игры их выигрыши не совпадут?

Источник: Mosteller.

Задача 12.5.

Доходность акции следует симметричному дискретному случайному блужданию. Какова вероятность того, что в момент времени $2k + 1$ доходность будет выше, чем когда-либо в прошлом?

Источник: Алексей Суздальцев

12.3 Броуновское движение

13 Выборочные характеристики, общая интуиция

Задача 13.1.

Имеется пять чисел: x , 4, 5, 7, 9. При каком значении x медиана будет равна среднему?

Задача 13.2.

Измерен рост 100 человек. Средний рост оказался равным 160 см. Медиана оказалась равной 155 см. Машин рост в 163 см был ошибочно внесен как 173 см. Как изменятся медиана и среднее после исправления ошибки?

Задача 13.3.

Возможно ли, что риск катастрофы в расчете на 1 час пути больше для самолета, чем для автомобиля, а в расчете на 1 километр пути — наоборот?

Задача 13.4.

Деканат утверждает, что если студента N перевести из группы А в группу В, то средний рейтинг каждой группы возрастет. Возможно ли это?

Задача 13.5.

Есть три группы по 10 человек, две группы по 20 человек и одна группа по 40 человек. У каждой из групп свой преподаватель.

1. Каков средний размер группы, для которой читает лекции наугад выбранный профессор?
2. Каков средний размер группы, в которой учится наугад выбранный студент?
3. Творческий вопрос. Мы ловим студентов наугад и спрашиваем каждого размер группы, в которой он учится. Можно ли как-то восстановить средний размер группы с точки зрения преподавателя?

Задача 13.6.

Приведите примеры, когда $Med(X + Y) = Med(X) + Med(Y)$ и $Med(X + Y) \neq Med(X) + Med(Y)$.
 Med - медиана

Задача 13.7.

Пусть X и Y — две независимые случайные величины. Верно ли, что $Med(X+Y) = Med(X)+Med(Y)$, где Med - это медиана.

14 Метод максимального правдоподобия, метод моментов

Задача 14.1.

Падал первый снег и 30 школьников ловили снежинки. В среднем каждый поймал 3,3 снежинки. Количества снежинок пойманные каждым — независимые Пуассоновские случайные величины с общим параметром λ .

1. Оцените λ используя метод максимального правдоподобия
2. Оцените дисперсию полученной оценки
3. На уровне значимости 5% проверьте гипотезу о том, что $\lambda = 3$ используя тест множителей Лагранжа
4. ... используя тест отношения правдоподобия
5. ... используя тест Вальда
6. Постройте 95% доверительный интервал Вальда для λ

Задача 14.2.

В коробке 10 внешне не отличимых шоколадных конфет. Внутри k штук из них есть орех. Мы выбирали конфеты наугад по одной и ели. Первый орех оказался в третьей по счету конфете.

Оцените неизвестный параметр k методом моментов, методом максимального правдоподобия.

Задача 14.3.

Интервал времени в минутах между спам-письмами по электронной почте — случайная величина с функцией плотности

$$p(t) = \begin{cases} a^2 \cdot t \cdot \exp(-at), & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}, \quad (2)$$

где a — неизвестный параметр. По выборке из 20 наблюдений известно, что $\sum_{i=1}^n X_i = 625$, $\sum_{i=1}^n \ln(X_i) = 25$.

1. Оцените a методом моментов
2. Оцените a методом максимального правдоподобия
3. Постройте 95% доверительный интервал для a с помощью максимального правдоподобия

Задача 14.4.

В банке 10 независимых клиентских «окошек». В момент открытия в банк вошло 10 человек. Каждый клиент встал к отдельному окошку. Других клиентов банке в этот день не было. Предположим, что время обслуживания одного клиента распределено экспоненциально с параметром λ . Оцените параметр λ и оцените дисперсию оценки методом максимального правдоподобия в каждой из ситуаций

1. Менеджер записал время обслуживания клиента в каждом окошке. Окошко №1 обслужило своего клиента за 10 минут, окошко №2 обслужило своего клиента за 20 минут; оставшуюся часть записей менеджер благополучно затерял.
2. Менеджер наблюдал за окошками в течение получаса и записывал время обслуживания клиента. Окошко №1 обслужило своего клиента за 10 минут, окошко №2 обслужило своего клиента за 20 минут; остальные окошки еще обслуживали своих первых клиентов в тот момент, когда менеджер удалился.

3. Менеджер наблюдал за окошками в течение получаса. За эти полчаса два окошка успели обслужить своих клиентов. Остальные окошки еще обслуживали своих первых клиентов в тот момент, когда менеджер ушел.
4. Менеджер наблюдал за окошками и решил записать время обслуживания первых двух клиентов. Через 10 минут от начала работы был обслужен первый клиент в одном из окошек, через 20 минут от начала работы был обслужен второй клиент. Сразу после того, как был обслужен второй клиент менеджер прекратил наблюдение.
5. Одновременно с открытием банка началась деловая встреча директора банка с инспектором по охране труда. Время проведения таких встреч — случайная величина, имеющая экспоненциальное распределение со средним временем 30 минут. За время проведения встречи было обслужено два клиента.
6. Одновременно с открытием банка началась деловая встреча директора банка с инспектором по охране труда. Время проведения таких встреч — случайная величина, имеющая экспоненциальное распределение со средним временем 30 минут. За время проведения встречи было обслужено два клиента, один за 10 минут, второй — за 20 минут.
7. Изменим условие: в банке 11 окошек, при открытии банка вошло 11 клиентов. Других клиентов в этот день не было. Клиент попавший в окошко №11 смотрел за остальными. Раньше клиента из окошка №11 освободилось двое клиентов: за 10 минут и за 20 минут.

Задача 14.5.

Предположим, что доход жителей страны распределен экспоненциально. Имеется выборка из 1000 наблюдений по жителям столицы. Если возможно, постройте 90% доверительный интервал для λ в следующих случаях

1. Столицу можно считать случайной выборкой из жителей страны
2. В столице селятся только люди с доходом больше 100 тыс. рублей.
3. В столице селятся только люди с доходом больше m тыс. рублей, где m — неизвестная константа. При этом постройте также и 90% доверительный интервал для m
4. В столице живут 10% самых богатых жителей страны
5. В столице живут $p\%$ самых богатых жителей страны, где p — неизвестная константа. Постройте также 90% доверительный интервал для p

Задача 14.6.

Случайные величины X_1, X_2, \dots, X_n независимы и нормальны $N(\mu, \sigma^2)$ с неизвестным математическим ожиданием и дисперсией. При помощи теста множителей Лагранжа, отношения правдоподобия и теста Вальда проверьте гипотезы

1. $H_0: \mu = 0$
2. $H_0: \sigma^2 = 1$
3. $H_0: \begin{cases} \mu = 0 \\ \sigma^2 = 1 \end{cases}$

15 Байесовский подход

Задача 15.1.

В коробке 10 внешне не отличимых шоколадных конфет. Внутри k штук из них есть орех. Мы выбирали конфеты наугад по одной и ели. Первый орех оказался в третьей по счету конфете.

Постройте байесовскую оценку неизвестного k , если изначально мы верили, что k равновероятно принимает значения от 0 до 10.

16 Тестирование гипотез — общие свойства

Задача 16.1.

Вовочка тестирует гипотезу H_0 против гипотезы H_a . Предположим, что H_0 на самом деле верна. По своей сути p -value является случайной величиной. Какое распределение оно имеет?

Задача 16.2.

Гражданин Фёдор решает проверить, не жульничает ли напёрсточник Афанасий, для чего предлагает Афанасию сыграть 5 партий в напёрстки. Фёдор решает, что в каждой партии будет выбирать один из трёх напёрстков наугад, не смотря на движения рук ведущего. Основная гипотеза: Афанасий честен, и вероятность правильно угадать напёрсток, под которым спрятан шарик, равна $1/3$. Альтернативная гипотеза: Афанасий каким-то образом жульничает (например, незаметно прячет шарик), так что вероятность угадать нужный напёрсток меньше, чем $1/3$. Статистический критерий: основная гипотеза отвергается, если Фёдор ни разу не угадает, где шарик.

1. Найдите уровень значимости критерия.
2. Найдите мощность критерия в том случае, когда Афанасий жульничает, так что вероятность угадать нужный напёрсток равна $1/5$.

Задача 16.3.

Имеется две конкурирующие гипотезы:

H_0 : Величина X распределена равномерно на отрезке $[0; 100]$

H_a : Величина X распределена равномерно на отрезке $[50; 150]$

Исследователь выбрал такой критерий:

Если $X < c$, то использовать H_0 , иначе использовать H_a .

1. Что такое «ошибка первого рода», «ошибка второго рода», «мощность теста»?
2. Постройте графики зависимостей ошибок первого и второго рода от c .

Задача 16.4.

Известно, что $X_i \text{ iid } N(\mu; 900)$. Исследователь проверяет гипотезу $H_0: \mu = 10$ против $H_A: \mu = 30$ по выборке из 20 наблюдений. Критерий выглядит следующим образом: если $\bar{X} > c$, то выбрать H_A , иначе выбрать H_0 .

1. Рассчитайте вероятности ошибок первого и второго рода, мощность критерия для $c = 25$.
2. Что произойдет с указанными вероятностями при росте количества наблюдений ($c \in (10; 30)$)?
3. Каким должно быть c , чтобы вероятность ошибки второго рода равнялась 0,15?
4. Как зависят от c вероятности ошибок первого и второго рода ($c \in (10; 30)$)?

Задача 16.5.

Дама утверждает, что обладает особыми способностями и безошибочно отличает «бонакву» без газа от «святого источника» без газа. H_0 : дама не обладает особыми способностями, H_a : дама обладает особыми способностями. При даме в 3 стаканчика из 8-ми налили «бонакву», а в 5 оставшихся — «святой источник». При отгадывании стаканчики предлагаются даме в неизвестном ей порядке. Критерий: принимается основная гипотеза, если дама ошиблась хотя бы один раз и альтернативная иначе.

1. Рассчитайте вероятности ошибок первого и второго рода, мощность критерия.
2. Сколько из 8 стаканчиков надо наполнить «бонаквой» и сколько «святым источником», чтобы вероятность ошибки первого рода была минимальной?

Коммент: некоторые студенты утверждают, что отличить «святой источник» от «бонаквы» — элементарно, а вот отличить «бонакву» от «акваминерале» — трудно.

Задача 16.6.

Аня и Таня любят мыть посуду. Аня разбивает тарелку, которую моет, с вероятностью p_a , Таня — с вероятностью p_t . Они хотят проверить гипотезу $H_0: p_a = p_t$ против альтернативной $H_a: p_a > p_t$. Способ проверки следующий. Они по очереди будут мыть по одной тарелки, до тех пор пока не разобьются две тарелки. Если обе эти тарелки будут разбиты Аней, то H_0 будет отвергнута в пользу H_a . Определите вероятность ошибки первого рода как функцию от p_a , если:

1. Первой моет тарелку Аня
2. Первой моет тарелку Таня

17 Гипотезы о среднем и сравнении среднего при большом n

Задача 17.1.

Предположим, что исходные наблюдения X_i нормальны $N(\mu, \sigma^2)$ и независимы. Константы μ и σ неизвестны. Вовочка строит доверительный интервал для μ по первой половине доступных наблюдений. Петя — по всем наблюдениям. Может ли получиться у Вовочки интервал меньшей ширины, чем у Пети?

Задача 17.2.

Вася и Петя выясняют, кто лучше умеет знакомиться с девушками. Вася попытался познакомиться с 100 девушек, из них 54 девушки дали ему номер своего телефона. Петя попытался познакомиться с 900 девушек, из них 495 дали ему номер своего телефона.

Вася и Петя изучили курс матстата и начали спорить. Петя утверждает, что ему в среднем чаще девушки дают свой номер телефона и аргументирует это так: давай проверим гипотезу, что в среднем ровно половина девушек даёт номер своего телефона, против альтернативной гипотезы, что больше половины. По твоим данным эта гипотеза не отвергается, а по моим — отвергается.

Вася утверждает, что он лучше убеждает девушек. Аргументирует это так: давай проверим гипотезу, что в среднем 60% девушек даёт номер своего телефона, против альтернативной гипотезы, что меньше 60%. По твоим данным эта гипотеза отвергается, а по моим — не отвергается.

Кто из них прав? Идея: Кирилл Фурманов

Задача 17.3.

Расчёт вероятностей с неизвестным параметром

1. Величина X — равномерна на $[\mu - 1; \mu + 1]$, причем μ — неизвестна. Найдите $E(X)$. С какой вероятностью случайный интервал $[X - 0.5; X + 0.5]$ покрывает неизвестное μ ?
2. Пусть X_1, X_2 — нормальны $N(\mu, 1)$, причем μ — неизвестна. Найдите $E(X_1)$, $E(\bar{X})$. С какой вероятностью случайный интервал $[X_1 - 0.5; X + 0.5]$ покрывает неизвестное μ ? А интервал $[\bar{X} - 0.5; \bar{X} + 0.5]$? Почему вторая вероятность не равна первой?

Задача 17.4.

До проведения рекламной компании в среднем 7 из 10 посетителей художественного магазина-салона делали покупки. После рекламной компании из 200 посетителей покупки сделали 163. Можно ли считать, что рекламная компания имела эффект на 5%-ом уровне значимости?

Задача 17.5.

Дневные расходы электроэнергии на предприятии составляли 1400 кВт со стандартным отклонением 50 кВт. За 50 дней прошедших после ремонта и наладки оборудования средние расходы за день составили 1340 кВт. Можно ли считать, что ремонт способствовал экономии электроэнергии на 10% уровне значимости?

Задача 17.6.

Монету подбросили 1000 раз, при этом 519 раз она выпала на орла. Проверьте гипотезу о том, что монета «правильная» на уровне значимости 5%.

Задача 17.7.

Вася отвечает на 100 тестовых вопросов. В каждом вопросе один правильный вариант ответа из пяти возможных. На 5%-ом уровне значимости проверьте гипотезу о том, что Вася ставит ответы наугад, если он ответил правильно на 26 вопросов из теста.

Задача 17.8.

Некоторых студентов спросили, на какую оценку они рассчитывают по теории вероятностей, 30 человек надеются на 4 балла, 20 человек — на 6 баллов, 30 человек — на 8 баллов, 10 человек — на 10 баллов. Проверьте гипотезу о том, что медиана равна 7 баллам на уровне значимости 10%.

Задача 17.9.

Кубик подбросили 160 раз, из них 29 он выпал на шестерку. Проверьте гипотезу о том, что вероятность выпадения шестерки правильная на уровне значимости 10%.

Задача 17.10.

Двести домохозяйки попробовали новый «Вовсе не обычный порошок», 110 из них получили более удачный результат, чем раньше. На уровне значимости 5% проверьте гипотезу о том, что «Вовсе не обычный порошок» по эффективности не отличается от старого средства (против альтернативной гипотезы о большей эффективности).

Задача 17.11.

Величины x_1, x_2, \dots, x_n независимы и распределены $N(10, 16)$. Вася знает дисперсию, но не знает среднего. Поэтому он строит 60% доверительный интервал для истинного среднего значения. У него получаются две границы — левая и правая.

Какова вероятность того, что:

1. левая меньше 9?
2. левая и правая лежат по разные стороны от 9?

Можно включить чтение неизвестной дисперсии?

3. левая и правая лежат по разные стороны от настоящего среднего?

Задача 17.12.

По предварительному опросу 10000 человек на выборах в Думу 462 человека будут голосовать за партию «Обычная партия». На уровне значимости 0,05 проверьте гипотезу о том, что «Обычная партия» преодолет 5% барьер.

Задача 17.13.

Вася и Петя метают дротики по мишени. Каждый из них сделал по 100 попыток. Вася оказался метче Пети в 59 попытках. На уровне значимости 5% проверьте гипотезу о том, что меткость Васи и Пети одинаковая, против альтернативной гипотезы о том, что Вася метче Пети.

Задача 17.14.

По 820 посетителям супермаркета средние расходы на одного человека составили 340 рублей. Из достоверных источников известно, что дисперсия равна 90000 руб. Постройте 95% доверительные интервалы для средних расходов одного посетителя, двусторонний и два односторонних.

Задача 17.15.

В прошлом году средняя длина ушей зайцев в темно-синем лесу была 20 см, $\sigma = 4$. В этом году у случайно попавшихся 15 зайцев средняя длина оказалась 24 см. Предполагая нормальность распределения, проверьте гипотезу о том, что средняя длина ушей не изменилась против альтернативной гипотезы о росте длины.

Задача 17.16.

Стандартное отклонение количества иголок у ежа равно 130. По выборке из 12 ежей было получено среднее количество иголок 5120. Допустим, что количество иголок на одном еже можно считать нормально распределенным.

1. Постройте 90%-ый доверительный интервал для среднего количества иголок.
2. На 5%-ом уровне значимости проверьте гипотезу о том, что среднее количество иголок равно 5000.

Задача 17.17.

Средний бал по диплому студента — нормальная случайная величина, $N(\mu; 0.04)$. Средний бал, рассчитанный по выборке из 25 абитуриентов этого года, составил 4.30. По данной выборке был построен доверительный интервал для μ : (4.2424; 4.3576). Какой уровень доверия соответствует этому интервалу?

Задача 17.18.

Вася очень любит играть в преферанс. Предположим, что Васин выигрыш распределен нормально. За последние 5 партий средний выигрыш составил 1560 рублей, при оценке стандартного отклонения равной 670 рублям. Постройте 90%-ый доверительный интервал для математического ожидания Васиного выигрыша.

Задача 17.19.

In 1882 Michelson performed experiments to measure the speed of light. 23 trials gave an average of 299756.2 km/sec with a standard deviation of 107.12. Find a 95% confidence interval for the speed of light. The correct answer is 299710.5 so there must have been some bias in his experiments.

Задача 17.20.

An English biologist named Weldon was interested in the 'pip effect' in dice — the idea that the spots, or 'pips', which on some dice are produced by cutting small holes in the surface, make the sides with more spots lighter and more likely to turn up. Weldon threw 12 dice 26306 times for a total of 315672 throws and observed that a 5 or 6 came up on 106602 throws. Find a 95% confidence interval for the true probability of getting 5 or 6 on a dice.

Задача 17.21.

On 384 out of 600 randomly selected farms, the operator was also the owner. Find a 95% confidence interval for the true proportion of owner operated farms.

Задача 17.22.

During a two week period, 10 weekdays, a parking garage collected an average of \$126 with a standard deviation of \$15. Find a 95% confidence interval for the mean revenue.

Problems are borrowed from www.math.cornell.edu/~durrett/ep4a/ep4a.html

Задача 17.23.

In their last 100 chess games played against each other, Bill has won 46 and Monica has won 54. Using this information and a 95% confidence level, what is the probability that Bill will win a «best of seven» series with Monica? The first one to win 4 games is the winner and no more games are played.

Hints: First determine a 95% confidence interval for the probability that Bill will win a game. Then, using the two extremes of this interval, determine the probability that Bill will win the series. This is a binomial experiment. Bill could win the series in 4 games, 5 games, 6 games, or 7 games. Calculate the probability of each and add them up. Do this for each of the two interval extremes.

Source: (?):

<http://www.artofproblemsolving.com/Forum/viewtopic.php?highlight=probability+game&t=87203>

Задача 17.24.

Имеются две монетки. Одна правильная, другая — выпадает орлом с вероятностью $0 < q < 0.5$, значение q известно. Монетки неотличимы по внешним признакам. Одну из них, неизвестно какую, подкинули n раз и сообщили Вам, сколько раз выпал орел.

1. Опишите процедуру тестирования гипотезы H_0 : «подбрасывалась правильная монетка» против H_a : «подбрасывалась неправильная монетка».
2. Каким должно быть n чтобы вероятность ошибок первого и второго рода не превышала 10 процентов, если $q = 0.4$
3. Ответьте на предыдущий вопрос при произвольном q

Задача 17.25.

Школьник Вася аккуратно замерял время, которое ему требовалось, чтобы добраться от школы до дома. По результатам 90 наблюдений, среднее выборочное оказалось равным 14 мин, а несмещенная оценка дисперсии — 5 мин².

1. Постройте 90% доверительный интервал для среднего времени на дорогу
2. На уровне значимости 10% проверьте гипотезу о том, что среднее время равно 14,5 мин, против альтернативной гипотезы о меньшем времени. Найдите точное P -значение.

Задача 17.26.

На днях Левада-Центр опубликовал итоги опроса, согласно которым 2/3 россиян поддерживают Путина и 2/5 россиян доверяют опросам Левада-Центра. Доверяющие опросам всегда отвечают искренне, а недоверяющие могли соврать в ответе на любой вопрос или оба. Исходя из этих данных, оцените реальную поддержку Путина россиянами. Постройте 95% доверительный интервал (для поддерживающих Путина и для верящих в опрос), если было опрошено 1000 человек.

source: лента ru-math

Задача 17.27.

При подбрасывании кубика грани выпали 234, 229, 240, 219, 236 и 231 раз соответственно. Проверьте гипотезу о том, что кубик «правильный».

Задача 17.28.

Проверьте независимость дохода и пола по таблице:

	< 500	500 — 1000	> 1000
М	112	266	34
Ж	140	152	11

Задача 17.29.

Вася Сидоров утверждает, что ходит в кино в два раза чаще, чем в спортзал, а в спортзал в два раза чаще, чем в театр. За последние полгода он 10 раз был в театре, 17 раз - в спортзале и 39 раз - в кино. Правдоподобно ли Васино утверждение?

Задача 17.30.

Проверьте независимость пола респондента и предпочитаемого им сока:

	Апельсиновый	Томатный	Вишневый
М	69	40	23
Ж	74	62	34

Задача 17.31.

У 200 человек записали цвет глаз и волос. На уровне значимости 10% проверьте гипотезу о независимости этих признаков.

Цвет глаз/волос	Светлые	Темные	Итого
Зеленые	49	25	74
Другие	30	96	126
Итого	79	121	200

Задача 17.32.

Идея задачи на хи-квадрат.

Если предложить голосовать за 3 альтернативы...

Если предложить голосовать за 4 альтернативы...

Выполняется ли предпосылка независимости от посторонних альтернатив?

Задача 17.33.

Когда Пирсон придумал хи-квадрат тест на независимость признаков (около 1900 г.), он не был уверен в правильном количестве степеней свободы. Он разошелся во мнениях с Фишером. Фишер считал, что для таблицы сопряженности размера два на два хи-квадрат статистика будет иметь три степени свободы, а Пирсон - что одну. Чтобы выяснить истину, Фишер взял большое количество таблиц два на два с заведомо независимыми признаками и посчитал среднее значение хи-квадрат статистики. Чему оно оказалось равно? Почему этот эксперимент помог выяснить истину?

Задача 17.34.

Из 10 опрошенных студентов часть предпочитала готовиться по синему учебнику, а часть - по зеленому. В таблице представлены их итоговые баллы.

Синий	76	45	57	65		
Зеленый	49	59	66	81	38	88

а) С помощью теста Манна-Уитни (Mann-Whitney) проверьте гипотезу о том, что выбор учебника не меняет закона распределения оценки.

Разрешается использование нормальной аппроксимации

б) Возможно ли в этой задаче использовать (Wilcoxon Signed Rank Test)?

Задача 17.35.

Имеются результаты экзамена в двух группах. Группа 1: 45, 67, 87, 71, 34, 12, 54, 57; группа 2: 46, 66, 81, 72, 11, 47, 55, 51, 9, 99. С помощью теста Манна-Уитни на уровне значимости 5% проверьте гипотезу о том, что результаты двух групп не отличаются.

Задача 17.36.

Имеются результаты нескольких студентов до и после апелляции (в скобках указан результат до апелляции): 48(47), 54(52), 67(60), 56(60), 55(58), 55(60), 90(70), 71(81), 72(87), 69(60). Предполагая, что изменение оценки на апелляции симметрично распределено, на уровне значимости 5% проверьте гипотезу о том, что апелляция в среднем не сказывается на результатах.

Задача 17.37.

Имеются наблюдения за говорливостью 30 попугаев (слов/день): 34, 56, 32, 45, 34, 45, 67, 1, 34, 12, 123, ... , 37 (всего 13 наблюдений меньше 40). Проверить гипотезу о том, что медиана равна 40 (слов/день).

Задача 17.38.

Вашему вниманию представлены результаты прыжков в длину Васи Сидорова на двух соревнованиях. На первых среди болельщиц присутствовала Аня Иванова (его первая любовь): 1,83; 1,64; 2,27; 1,78; 1,89; 2,33; 1,61; 2,31. На вторых Аня среди болельщиц не присутствовала: 1,26; 1,41; 2,05; 1,07; 1,59; 1,96; 1,29; 1,52; 1,18; 1,47. С помощью теста (Mann-Whitney) проверьте гипотезу о том, что присутствие Ани Ивановой положительно влияет на результаты Васи Сидорова. Уровень значимости $\alpha = 0.05$.

Задача 17.39.

Некоторые результаты 2-х контрольных по теории вероятностей выглядят следующим образом (указан результат за вторую контрольную и в скобках результат за первую): 43(55), 113(108), 97(53), 68(42), 94(67), 90.5(97), 35(91), 126(127), 102(78), 89(83). Можно ли считать (при $\alpha = 0.05$), что вторую контрольную написали лучше? Предположим, что разница в баллах распределена симметрично.

Задача 17.40.

Садовник осматривал по очереди розовые кусты вдоль ограды. Всего вдоль ограды растет 30 розовых кустов. Из них оказалось 20 здоровых и 10 больных.

Вот заметки садовника: + + + ⊖ + + ⊖ ⊖ ⊖ + + + + ⊖ ⊖ + + ⊖ + + + + + ⊖ ⊖ ⊖ + + + +

(+ - здоровый куст, \ominus - больной куст)

а) С помощью теста серий проверьте гипотезу о независимости испытаний

б) Какой естественный смысл имеет эта гипотеза?

Подсказка: можно использовать нормальное распределение

18 Решения

— Профессор, я решал эту задачу 3 часа, а ответ не совпадает. Где я сделал ошибку?

— Предположив, что ответы к задачку верные.

По мотивам AoPS, f=265&t=275053.

1.1. $\mathbb{P}(N \geq 1) = 1 - \frac{5}{6}^2$; $\mathbb{P}(N = 0) = \frac{5}{6}^2$.

1.2. $\mathbb{P}(\{b\}) = 0,2$, $\mathbb{P}(\{a\}) = 0,6$, $\mathbb{P}(\{c\}) = 0,5$.

1.3. $\mathbb{P}(A^c \cap B^c) = 1 - 0,3 - 0,4$.

1.4. $\mathbb{P}(A \cap B) \in [0,1; 0,3]$.

1.5. $\mathbb{P}(\{N_2 > N_1\}) = \frac{15}{36}$;

$\mathbb{P}(\{N_1 + N_2 = 6\}) = \frac{5}{36}$;

$\mathbb{P}(\{N_1 + N_2 = 9\}) = \frac{4}{36}$;

$\mathbb{P}(\{\max\{N_1, N_2\} = 5\}) = \frac{9}{36}$;

$\mathbb{P}(\{\min\{N_1, N_2\} = 3\}) = \frac{7}{36}$;

$\mathbb{P}(\{|N_1 - N_2| \leq 1\}) = \frac{16}{36}$.

1.6. $\frac{4}{20}$.

1.7. $\mathbb{E}(X) = p$.

1.8.

1.9.

1.10. Устно: $\frac{1}{3}$.

1.11. 0,2.

1.12.

1.13. $\frac{C_6^3}{6^3}$.

1.14. $\frac{C_{10}^3}{10^3}$, т. к. каждый способ выбрать три разных числа соответствует благоприятной комбинации.

1.15.

1.16.

1.17. $\frac{1}{k+1}$, т. к. одна из $k + 1$ карточек должна быть наибольшей.

1.18. «Сегодня понедельник» — это **не** событие. Вероятность не определена. Это функция от времени.

Вероятность того, что монетка выпала орлом, равна 0,5. Поэтому ей всё равно, как отвечать, если наказанием является превращение в тыкву, и нужно отвечать: «Решка!» — если наградой является молодильное яблоко. Предполагается, что красавица максимизирует ожидаемое количество молодильных яблок.

1.19.

1.20.

1.21. $\mathbb{P}(\{3\}) = \frac{1}{2}$, $\mathbb{P}(\{\Sigma \text{ чёт.}\}) = \frac{1}{3}$, $\mathbb{E}(\Sigma) = 5$.

1.22. Если предположить, что у каждого игрока есть своя сила (константа), а вероятности победить в схватке для двух игроков относятся так же, как их силы, то $x = \frac{a}{a+b}$, $y = \frac{a}{a+c}$. Легко находим, что $\frac{b}{b+c} = \frac{y-xy}{x+y-2xy}$.

1.23. Комитет можно выбрать C_{25}^4 способами, руководство — $C_{25}^3 3!$.

1.24. $5!$.

1.25. $C_{12}^4 C_8^5$.

1.26. $2 \cdot \frac{3!3!}{6!}$.

1.27.

1.28. C_{30}^5 . Расположить по росту можно только в одном порядке.

1.29. $\min f(u) = \text{med}(X)$, $\min g(u) = \mathbb{E}(X)$

1.30. Семь человек пишут тот же вариант, что Вася, 24 человека — другой. Значит вероятность

равна $7/31$.

1.31. Точки ABC должны идти подряд. Есть 6 способов выбрать три точки подряд и C_6^3 выбрать три точки без ограничений. Итого, $\frac{6}{C_6^3} = 0.3$

18.0.1 Немного оптимизации

1.32.

1.33. да, два линейных уравнения

1.34.

1.35. $\frac{1}{3}$, 1, 5.

1.36.

1.37.

1.38. $\frac{25}{3}$.

1.39. $\int_1^\infty e^{-x} dx$; $\mathbb{P}(X \in (1; 5)) = \mathbb{P}(X \in [1; 5]) = \int_1^5 e^{-x} dx$.

1.40. $\mathbb{E}(X) = 1$

Тут спросить про минимизацию $f(u) = \mathbb{E}(|X - u|)$?

1.41. Квантили распределения

1.42.

1.43.

1.44. б) $1/4$

1.45.

1.46. Равны.

2.1. $C_{2n}^n / 2^{2n}$. Из $2n$ подбрасываний выберем n . Выбранные в зоне Жеппу соответствуют невыбранным в зоне Алекс. б) Через формулу Стирлинга: $\frac{1}{\sqrt{\pi}}$.

2.2.

2.3.

2.4. $\frac{n^2+n+2}{2^{n+1}}$ В оригинале у Алексея: Пусть A — матрица $n \times 2$, \vec{x} и \vec{b} — векторы подходящих размерностей. Известно, что как в матрице A , так и в расширенной матрице $(A \quad \vec{b})$ все миноры максимального порядка ненулевые. Вася берёт систему $Ax = b$ и в каждой строке независимо от других ставит вместо знака равенства равновероятно знак «больше» или знак «меньше». Какова вероятность того, что полученная система неравенств имеет решение?

Решение: остаться может либо один кусочек, либо ни одного. Всего есть 2^n способов выбирать полуплоскости. Некоторые из этих способов приводят к тому, что закрашена вся плоскость. Кусочков всего $\frac{n^2+n+2}{2}$. Каждый кусочек однозначно определяет способ выбора полуплоскостей.

2.5.

2.6. C_{k+n-1}^{n-1} .

2.7.

2.8. $1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \dots; \frac{1}{e}$.

2.9.

2.10. Представим себе мифический объект «вилкодыр». Он может превращаться либо в вилку, либо в дырку. Вилкодыров у нас $n - k$. Из них нужно выбрать k вилок. Ответ: C_{n-k}^k для линейного и $C_{n-k}^k \frac{n}{n-k}$ для кругового расположения дырочек.

2.11. $3 \cdot C_{n+1-d}^k$, где k — число серий, d — суммарная длина серий. Домножение на 3 взялось из трёх вариантов (2-3-3, 3-2-3, 3-3-2). Мифический объект — серия из горящих лампочек плюс негорящая справа.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15. C_{n-k+1}^k .

Решение 1. Отдельно рассмотрим два случая: самый правый предмет выбран и самый правый предмет не выбран. В каждом случае склеиваем предмет и примыкающий к нему справа предмет «разделитель».

Решение 2. Удалим $k - 1$ предмет из линии. Из оставшихся предметов выберем k . Вернём удалённые как «разделители».

2.16. Всего расположений $\binom{8}{5} \binom{8}{3} 5! = 376\,320$, и три левые цифры — это $\boxed{376}$.

2.17. The answer to the original problem (43,948,843 bet cards) was quoted already several times assuming that positioning of right numbers is irrelevant:

- there is exactly one bet card choice with 5 right numbers and
- there are $5 \times (90 - 5) = 425$ bet card choices with exactly 4 right numbers.

Since the total number of different bet card choices is $\binom{90}{5}$, we have to fill out $\binom{90}{5} - 425 - 1 + 1 = 43,948,843$ bet cards to have at least 4 right numbers with probability 1.

2.18. $p = \frac{1}{20!} \cdot (C_{20}^0 + C_{20}^1 \cdot 0 + C_{20}^2 + C_{20}^3 \cdot 2 + C_{20}^4 \cdot (C_4^2 + 3) + C_{20}^5 \cdot (2C_5^2 + 4))$.

2.19. Ugly sum?

2.20.

2.21.

2.22. C_{n+m}^n

2.23. Любую рассадку пассажиров можно представить в виде последовательности из нулей и единиц длины n , в которой единиц ровно k . Всего таких последовательностей C_n^k . Найдем количество последовательностей, не удовлетворяющих условию, то есть не содержащих сдвоенных нулей (назовем такие последовательности *плохими*).

Припишем к каждой плохой последовательности фиктивную единицу справа. Тогда в новой последовательности после любого нуля стоит единица, а значит, вся последовательность состоит из паттернов «1» и «01». Паттернов «01» ровно $n - k$, (столько же, сколько и нулей), всего же паттернов столько же, сколько и единиц, то есть $k + 1$. Таким образом, мы имеем $k + 1$ позиций, из которых надо выбрать $n - k$, куда встанет паттерн «01». Способов сделать это всего C_{k+1}^{n-k} , что и равно числу плохих последовательностей.

Значит, искомая вероятность равна $1 - \frac{C_{k+1}^{n-k}}{C_n^k}$.

2.24.

2.25. $\mathbb{P}(N = 3) = 2\frac{1}{2}^3$; $\mathbb{P}(N = 4) = 2C_3^1\frac{1}{2}^4$; $\mathbb{P}(N = 5) = 2C_4^2\frac{1}{2}^5$.

2.26. Пусть p — вероятность. Тогда $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}$. Нас интересует $\mathbb{P}\left(X > \frac{1}{p}\right) = \left(1 - \frac{1}{p}\right)^{\frac{1}{p}} \approx \frac{1}{e}$.

2.27.

2.28. 700 : 100.

2.29.

2.30. Вероятность, что i -я монета когда-либо исчезнет, равна 1, а того, что пролежит бесконечно долго, — 0.

2.31. $P(K_c = k) = 2^{-(k+1)}$ вне зависимости от c . Для начала обнулим значение K_c и возьмём в руку c монеток. Подкинем монетки. Если все выпали орлом, мы прибавляем единичку к K_c . Если все выпали решкой, то мы объявляем значение K_c . Если часть выпала орлом, часть решкой, то выкинем те, что выпали решкой, и снова перейдем к подкидыванию монеток. В результате имеем: рост K_c на единицу или глобальная остановка процесса происходит равновероятно. Значит, K_c распределено геометрически.

2.32. Найдем $\mathbb{P}(Y > k)$. Это вероятность того, что в первые k лет не будет достигнут уровень первого года. Значит это вероятность того, что первый год дал наибольшее количество осадков за первые k лет. В силу симметрии $\mathbb{P}(Y > k) = 1/k$. Отсюда $\mathbb{P}(Y = k) = \mathbb{P}(Y > k - 1) - \mathbb{P}(Y > k) = 1/k(k - 1)$ и $\mathbb{E}(Y) = +\infty$

2.33. Подбрасывая монетки детерминированное количество раз нельзя получить вероятность $1/3$, значит преподаватель заранее не знал, сколько раз он будет подбрасывать монетку. Простое правило принятия решения может иметь примерно такой вид: если выпало А, то давать задачу, если выпало Б, то не давать задачу, если не выпало ни А, ни Б, то повторить эксперимент. Орлов может быть либо два, либо один, либо 0. На два орла преподаватель повторять эксперимент не стал. Разумно предположить, что он использовал простую стратегию. Значит два орла означают «включать», один

орел — «не включать», ноль орлов — подбрасывать монетку еще два раза. Идея: Николай Арефьев

2.34. $\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{k(k+1)}$, т.к. последний прыжок должен быть самым длинным из $k + 1$ прыжка, а первый — самым длинным из k оставшихся. $\mathbb{E}(X) = \infty$.

2.35. $\frac{C_{46}^{10}}{C_{50}^{10}}$.

2.36. $\frac{1}{3}$.

2.37. $\frac{1}{C_{36}^5}$.

2.38. $\frac{C_{45}^9 C_{50}^1}{C_{50}^{10}}$.

2.39. $\mathbb{E}(B) = 3 \cdot \frac{4}{9} = \frac{4}{3}$; $\mathbb{E}(G) = 3 - \mathbb{E}(B) = \frac{8}{3}$; $\mathbb{E}(B - G) = -\frac{4}{3}$; $\mathbb{E}(B \cdot G) = 2 \cdot \frac{5}{6}$.

2.40.

2.41. Вероятность выпадения красной стороны сверху равна $\frac{1}{3}$.

2.42. $\frac{C_{20}^1 C_{20}^5}{C_{40}^6} \frac{1}{6}$ (вероятность заданной шестёрки финалистов помножить на вероятность выбора одного человека из шести).

2.43.

2.44. $\frac{100!}{14!16!36!34!} 0,7^{30} 0,3^{70} 0,8^{50} 0,2^{50}$.

2.45. $\mathbb{P}(N = 1) = C_5^1 \left(\frac{1}{2}\right)^5$; $\mathbb{P}(N = 2) = C_5^2 \left(\frac{1}{2}\right)^5$; $\mathbb{P}(N = 0) = C_5^0 \left(\frac{1}{2}\right)^5$.

2.46. $\mathbb{P}(N = 2) = C_6^2 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^4$.

2.47. $\frac{365 \cdot 364 \cdot 363 \cdot \dots \cdot 356}{365^n}$; минимальная компания состоит из 23 человек.

2.48. $\mathbb{P} = \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{8}\right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{8} + 3\frac{1}{8}\right) + \frac{1}{4} \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$.

2.49. $\left(\frac{1}{2}\right)^{(n-1)} \leq 0,15$.

2.50. $0,99^n$.

2.51. $1 - \frac{1}{1024}$; 0.

2.52.

2.53.

2.54.

2.55.

2.56.

2.57.

2.58. В маленьком роддоме «мальчиковых» дней больше. В силу закона больших чисел, чем больше число наблюдений, тем сильнее выборочная доля мальчиков должна быть похожа на вероятность рождения мальчика.

2.59. $1 - \left(\frac{1319}{1320}\right)^{10} \approx 0,008$.

2.60.

2.61. Пункт 1. Последняя попытка взять конфету — из пустой коробки. Назовём эту коробку А. Из предыдущих $n + (n - r)$ конфет n приходятся на коробку А. Вероятности равны $\frac{1}{2}$. Получаем:

$$u_r = \frac{C_{2n-r}^n}{2^{n+(n-r)}}$$

2.62. В маленьком.

2.63. 0.

2.64.

2.65. 0,025 5 и 0,964 2.

2.66. $\frac{7}{64}$; около $\frac{2}{3}$.

2.67. 5.

2.68. $\frac{F_{2n+1}}{2^n}$. У чисел Фибоначчи есть свойство: $F_n = F_{n-1} + F_{n-2} = L(1 + L)F_n = \dots = L^k(1 + l)^k F_n = (1 + L)^k F_{n-k}$.

2.69.

2.70. Можно считать, что каждый учебник Саша и Маша берут с вероятностью 0,5. Ответ в обоих пунктах: $0,75^n$.

2.71. $\mathbb{P} = \frac{1}{6} \left(\left(\frac{1}{2}\right)^4 + C_5^4 \left(\frac{1}{2}\right)^5 + C_6^4 \left(\frac{1}{2}\right)^6 \right)$.

2.72. $\mathbb{P}_1 = \frac{1}{7} + \frac{1}{14} + \frac{1}{28}$; $\mathbb{P}_2 = \frac{1}{2^n - 1} \cdot 2 \cdot (1 - 0,5^n)$.

Источник: Mosteller.

2.73. $\mathbb{P}(N = 2) = 0,7 \cdot 0,6 = 0,42$. $\mathbb{P}(N \geq 1) = 1 - (1 - 0,7) \cdot (1 - 0,6) = 0,88$.

2.74. $\mathbb{P} = \frac{4}{7}$.

2.75.

2.76. Ожидаемая длина следующего интервала — 12,5 минут.

2.77. $(\frac{7}{27})^2$.

2.78. $p - \frac{p^2}{2} < p$, т. е. жюри из одного человека лучше.

2.79. Спортсмена Б, если нет спортсмена В; спортсмена А, если есть спортсмен В. Мораль — зависимость от третьей альтернативы.

2.80.

2.81.

2.82.

2.83. $\frac{8}{15}$.

2.84.

2.85. $\mathbb{E}(X) = 3 \cdot \frac{1}{6} + 1 + (-2) \cdot (\frac{5}{6})^3$

2.86. При игре только в А — убывать; только в В убывать; в вероятностную комбинацию — возрастать.

2.87.

2.88.

2.89.

2.90.

2.91.

2.92.

2.93.

N	1	2	3	4
\mathbb{P}	$\frac{5}{14}$	$\frac{4}{14}$	$\frac{3}{14}$	$\frac{2}{14}$

Решение для $6 = 4 + 2$: $\mathbb{P}(N = 1) = \frac{C_4^2}{C_6^2} = \frac{6}{15}$; $\mathbb{P}(N = 3) = \frac{4 \cdot 2}{C_6^2} \frac{3 \cdot 1}{C_5^2} = \frac{4}{15}$; $\mathbb{P}(N = 2) = \frac{5}{15}$; $\mathbb{E}(N) = \frac{28}{15}$.

2.94. Вероятность того, что ферзи будут угрожать друг другу, равна $\frac{14}{63} + \frac{1}{64} \frac{1}{63} 4(7 \cdot 7 + 5 \cdot 9 + 3 \cdot 11 + 1 \cdot 13)$.

Шахматная доска делится на четыре квадратных зоны с одинаковым числом клеток, покрываемых ферзём. Если длина стороны будет стремиться в бесконечность, то эта вероятность будет стремиться к 0, так как она равна отношению длин нескольких линий ко всей площади.

2.95. Слева должен сесть тот, у кого есть тёзка. $p_1 = \frac{4}{6}$. Справа должен сесть его парный. $p_2 = \frac{1}{5}$, итого $p = p_1 \cdot p_2 = \frac{2}{15}$.

2.96. $\frac{57}{200} = 0,285$.

2.97.

2.98. $\frac{1}{2} \cdot 5 + \frac{1}{2} \frac{7}{2} = 4,25$.

2.99. Можно представить себе другое условие: в коробке 42 занумерованных шара, мы выбираем один наугад. Красим шары с меньшим номером в белый, остальные — в чёрный. Затем берём три шара. Это равносильно тому, что мы возьмём 4 шара с номерами 1, 2, 3, 4 и выберем из них разделитель цветов случайно. Значит, вероятность равна $\frac{1}{2}$.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4. $\frac{1}{6}, \frac{1}{3}$.

3.5.

3.6. Какая-то из первых k величин будет наибольшей. В силу i.i.d. получаем, что $\mathbb{P}(E_k) = \frac{1}{k}$. E_k независимы: например, если известно, что 10-е наблюдение было рекордом, это ничего не говорит о рекордах в первых 9-ти наблюдениях. Вероятность второго рекорда в n -й момент равна $\frac{1}{n(n-1)}$, а в среднем времени до второго рекорда пройдёт ∞ .

3.7. Да.

3.8.

3.9. $\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A)$.

3.10. Да.

3.11. Нет.

3.12.

3.13.

Источник: Айвазян, экзамен РЭШ.

3.14.

3.15.

3.16. $p = \frac{0,4 \cdot 0,4}{0,4 \cdot 0,4 + 0,6 \cdot 0,6} = \frac{4}{13}$.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

3.22. $\frac{1}{6}$.

3.23. $\frac{1}{11}$.

3.24. $p_a = \frac{1}{3}(0,9 + 0,5 + 0,3) = \frac{17}{30}$, $p_b = \frac{1}{3}(0,9^2 + 0,5^2 + 0,3^2)/p_a = \frac{115}{170}$.

3.25. Unverified, but no calculation:

An arbitrary hand can have two aces but a flush hand can't. The average number of aces that appear in flush hands is the same as the average number of aces in arbitrary hands, but the aces are spread out more evenly for the flush hands, so set (3) contains a higher fraction of flushes.

Aces of spades, on the other hand, are spread out the same way over possible hands as they are over flush hands, since there is only one of them in the deck. Whether or not a hand is flush is based solely on a comparison between different cards in the hand, so looking at just one card is necessarily uninformative. So the other sets contain the same fraction of flushes as the set of all possible hands.

3.26. $\approx 0,503$.

3.27. а) $1/2$ б) $2/3$ (есть ли красивое решение? можно пробиться через сумму квадратов)

3.28. $3/5$ при любом количестве девочек

3.29.

3.30.

3.31. Вася считает неправильно: условное распределение суммы можно определить, только зная безусловное.

Концепция условного ожидания неприменима? Вставить это в иллюстрацию условного ожидания? При заданном безусловном распределении Васе следует сменить свой выбор вне зависимости от того, что он увидел в первой шкатулке. Вторая открытая лучше первой открытой. Это возможно из-за того, что безусловная ожидаемая сумма равна бесконечности для обеих шкатулок.

3.32. $\frac{t}{2}$.

3.33.

3.34. $f(a) = 5 + \frac{a(10-a)}{20}$.

3.35.

3.36. 1, почти 1.

3.37.

3.38. $2/3$, $1/2$, $1/2$, $14/27$

3.39.

3.40. solution 1:

Задача эквивалентна следующей: игрок выбирает шкатулку. Затем (она не открывается) игрок выбирает оставить ее или взять обе другие. Очевидно, во втором случае шансы в два раза выше.

Solution 2:

Игрок не получает информации — вероятность не меняется. Лучше сменить выбор.

3.41. stick-switch

3.42.

3.43.

3.44.

3.45.

3.46.

3.47.

3.48.

3.49.

3.50.

3.51.

3.52. не обязательно

3.53. а) да; б) нет

3.54.

3.55. $8/11$

3.56. а) $p = 0.7 \cdot 0.8 + 0.3 \cdot 0.7 = 0.77$

б) $p = \frac{0.7 \cdot 0.8 \cdot 0.2}{0.7 \cdot 0.8 \cdot 0.2 + 0.7 \cdot 0.2 \cdot 0.3} = \frac{8}{11}$

3.57. нет, да

3.58. Из названия города случайным образом оставляем одну букву.

$p = \frac{0.5 \frac{1}{6}}{0.5 \frac{1}{6} + 0.5 \frac{2}{6}} = 1/3$

3.59. $\frac{1}{3}$

3.60. $\frac{1}{2+2^n}$

3.61.

3.62.

3.63.

3.64.

3.65. а) $\frac{253}{254}$

3.66. about 7%

3.67. а) $2/3$ б) 0.9

3.68. а) нет, т.к. если выпало шесть, то это увеличивает ожидаемое количество шестерок на кубике

б) $1/6$ (можно считать, что кубик сначала подбросили, а потом подписали стороны)

в) $11/36$

г) $11/216$

4.1.

X	1	2	3
\mathbb{P}	$\frac{24}{36}$	$\frac{11}{36}$	$\frac{1}{36}$

$\mathbb{E}(X) = \frac{49}{36}$, $\mathbb{E}(36X - 17) = 32$. $\text{Var}(X) = \frac{371}{1296}$, $\text{Var}(36X - 5) = 371$.

4.2.

X	1	2	3
\mathbb{P}	$\frac{12}{20}$	$\frac{6}{20}$	$\frac{2}{20}$

$\mathbb{E}(X) = \frac{3}{2}$, $\text{Var}(X) = \frac{9}{20}$.

4.3.

4.4.

4.5. $\mathbb{P}(N = 0) = 0,1 \cdot 0,3 \cdot 0,5$; $\mathbb{P}(N = 3) = 0,9 \cdot 0,7 \cdot 0,5$; $\mathbb{P}(N = 1) = 0,9 \cdot 0,3 \cdot 0,5 + 0,1 \cdot 0,7 \cdot 0,5 + 0,1 \cdot 0,3 \cdot 0,5$.

$\mathbb{E}(N) = 0,9 + 0,7 + 0,5$; $\text{Var}(N) = 0,9 \cdot 0,1 + 0,7 \cdot 0,3 + 0,5 \cdot 0,5$.

4.6.

4.7.

4.8.

x_i	1	2	3	4
$p_i = \mathbb{P}(X = x_i)$	0,6	$(1 - 0,6) \cdot 0,5 = 0,2$	$(1 - 0,6) \cdot (1 - 0,5) \cdot 0,4 = 0,08$	$1 - p_1 - p_2 - p_3 = 0,12$

$\mathbb{E}(X) = 1,7$, $\text{Var}(X) \approx 1,08$.

4.9. В первом случае мы имеем просто «составную» монетку. Матожидание и дисперсия равны $n \frac{p_1 + p_2}{2}$ и $n \frac{p_1 + p_2}{2} (1 - \frac{p_1 + p_2}{2})$ соответственно.

Во втором случае все немного сложнее. Матожидание будет тем же, а дисперсия будет равна

$\frac{n(p_1(1-p_1)+p_2(1-p_2))}{2} + \frac{n^2(p_1-p_2)^2}{4}$, что, как нетрудно проверить, всегда не меньше дисперсии в первом случае (равенство достигается, естественно, только при $p_1 = p_2$).

Во втором эксперименте по сравнению с первым больше вероятности «крайних» значений числа выпавших орлов, но меньше вероятности «срединных» значений. Это и является интуитивным обоснованием того, что матожидания в двух случаях одинаковые, а дисперсия во втором случае больше.

4.10.

4.11.

4.12.

5.1. Закон распределения по сути эксперимента: $\text{Bin}(n; p^2)$; $\text{Corr}(R_1, R_2) = \sqrt{\frac{p}{1+p}}$. При $p \rightarrow 0$ корреляция равна 0; при $p \rightarrow 1$ составляет 0,5. Почему — чез = чёрт его знает.

5.2. Случайные величины, принимающие два значения $x_1 < x_2$, такие, что $|x_1| < |x_2|$.

5.3. $P(X + Y < 1) = 1/4$, $f_{X|Y}(x|y) = 1/f(y)$ при $y \in [x; x+1]$, $x \in [0; 1]$. Равномерно.

5.4. В первом случае — нет, например, $X \sim \mathcal{N}(0; 1)$ и $Y = X^2$. Во втором — да: возьмём индикаторы и получим стандартное определение независимости

5.5. Да. Возьмём окружность. Наугад отметим три точки. Одну будем трактовать как разрезающую окружность на отрезок. Две других — как разрезающие отрезок на три части.

5.6. Пусть X_i — координата i -ой птички. $\mathbb{P}(Y_1 \leq t) = 1 - \mathbb{P}(\min\{X_i\} > t) = 1 - (1 - t)^n$. Далее, $\lim \mathbb{P}(nY_1 \leq t) = \lim 1 - (1 - \frac{t}{n})^n = 1 - e^{-t}$. Распределение экспоненциальное с параметром $\lambda = 1$.

5.7. Пусть n велико, тогда Y_i можно считать независимыми и nY_i — экспоненциально распределёнными. Не красятся только «большие» интервалы, т.е. интервалы, чья длина больше, чем каждого из двух соседних интервалов. «Больших» интервалов примерно треть. Находим $\mathbb{E}(B) = \mathbb{E}(\max\{Y_1, Y_2, Y_3\})$. $\delta = 1 - \mathbb{E}(B)^{\frac{n}{3}} = \frac{7}{18}$.

Источник: Marcin Kuczma.

5.8.

5.9.

5.10.

6.1. $\mathbb{E}(X) = 1$, $\text{Var}(X) = 1$.

6.2. 9.

6.3. Для трёх детей вероятность того, что тот, что посередине — самый высокий, равна $\frac{1}{3}$, значит математическое ожидание равно $\frac{27}{3} = 9$.

6.4. Биномиальное распределение, $\mathbb{E}(X) = np$, $\text{Var}(X) = np(1-p)$. При $p = 0,5$ все подмножества будут равновероятны.

6.5.

6.6. $X = X_1 + \dots + X_n$, $\mathbb{E}(X) = n \frac{a}{N}$

$$\text{Var}(X_i) = \frac{a(N-a)}{N^2}$$

$$\text{Cov}(X_i, X_1 + \dots + X_N) = 0$$

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = -\frac{\text{Var}(X_i)}{N-1}$$

$$\text{Var}(X) = n \text{Var}(X_i) \frac{N-n}{N-1}$$

6.7. $\text{Cov}(X_1, X_1 + \dots + X_6) = 0$, т.к. $X_1 + \dots + X_6 = \text{const}$ $\text{Corr}(X_1, X_6) = -\frac{1}{5}$

6.8. $10 \cdot (1 - \frac{9}{10}^7)$

6.9. 1

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14. Масть: $4 \cdot (1 - \frac{C_{39}^5}{C_{52}^5})$

Достоинство: $13 \cdot (1 - \frac{C_{48}^5}{C_{52}^5})$

Туз: $4 \cdot \frac{5}{52}$

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23. $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y)$, $\text{Var}(X) > \text{Var}(Y)$

6.24.

6.25.

6.26.

6.27.

6.28.

6.29. Solution 1:

$$p_2 = \frac{1}{2}$$

С вероятностью $\frac{n-1}{n}$ сверху стопки лежит номер, меньший n , в этом случае можно считать, что n -ый номер вообще отсутствует в стопке.

С вероятностью $\frac{1}{n}$ сверху стопки лежит n -ый номер, тогда обязательно происходит одно переключивание, после которого мысленно выкинув n -ый номер можно считать, что имеется случайно упорядоченная стопка из $(n-1)$ выпуска.

$$p_n = \frac{n-1}{n}p_{n-1} + \frac{1}{n}(p_{n-1} + 1)$$

$$\text{Итого: } p_n = \sum_{i=2}^n \frac{1}{i} \approx n \ln(n)$$

Solution 2:

Пусть q_i - вероятность того, что число i «уберут» с верха стопки.

$$q_1 = 0$$

Вероятность того, что число i «уберут» с верха стопки равна вероятности того, что среди чисел $1, 2, \dots, i$ число i будет первым, т.е. $\frac{1}{i}$.

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(X_2) + \dots + \mathbb{E}(X_n) = \sum_{i=2}^n \frac{1}{i} \approx n \ln(n)$$

Какой-то баг с Ильёй Муромцем!

6.30. $p = \frac{2}{3}(1 - (1-p)^3)$, нам подходит решение $p = \frac{3-\sqrt{3}}{2}$.

6.31.

6.32. Если у нас $m = 13$ достоинств и $n = 4$ масти, то ответ имеет вид: $mn \prod_{i=1}^n \frac{in}{in+1} \approx 45,3$.

6.33. Обозначим за P_n вероятность остановиться ровно на n метрах. Мы ищем P_{100} .

Решение 1. По методу первого шага: $P_n = pP_{n-1} + (1-p)P_{n-2}$.

Решение 2. Попасть ровно в n можно двумя способами: перелетев $n-1$ или попав в $n-1$ и сделав шаг в один метр. Значит $P_n = (1 - P_{n-1}) + pP_{n-1}$.

Решение 3. Обозначим Васину координату в момент времени t как X_t . Можно найти a так, чтобы процесс $Y_t = a^{X_t}$ был мартингалом. Момент остановки $T = \min\{t \mid X_t \geq n\}$. Мартингал $Y_{t \wedge T}$ ограничен, теорема Дуба применима. $\mathbb{E}(Y_T) = \mathbb{E}(Y_0) = 1$. Получаем уравнение $P_n a^n + (1 - P_n) a^{n+1} = 1$.

6.34. $\frac{1}{p}, \frac{q}{p}$

в) $E(X^2) = p \cdot 1 + q \cdot E((X+1)^2)$, $\text{Var}(X) = \frac{q}{p^2}$

6.35. (устно, при сделанной предыдущей задаче) $\frac{rq}{p}$, $\text{Var}(X) = \frac{rq}{p^2}$

6.36.

6.37.

6.38.

6.39.

6.40.

6.41. а) $V(x) = \frac{1}{6}(V(x+1) + V(x+2) + V(x+3) + 2x + 0)$

Ищем линейную $V(x)$, получаем $V(x) = \frac{2}{3}x + \frac{4}{3}$

$$6) V(x) = \frac{1}{6}(V(x+1) + V(x+2) + V(x+3) + x + V(0) + 0)$$

6.42.

6.43.

$$6.44. m = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}(2+m) + \frac{1}{3}(3+m), m = 6$$

6.45.

6.46.

6.47.

6.48.

$$6.49. \frac{1}{2}$$

$$6.50. \frac{1}{2}$$

6.51. Во первых, заметим, что ожидаемое количество выстрелов, если у Вас осталось n патронов имеет вид $E_n = k \cdot n$.

Во-вторых, получим уравнение на E_n :

$E_n = 1 + E_{n-1} + kE(X)$, где $E(X)$ - ожидаемый выигрыш патронов от одного выстрела.

Находим k : $k = \frac{1}{1-E(X)}$

Ответ задачи: $\frac{100}{1-0.45}$

Solution2: Интуитивно: $100 + 100 \cdot 20 \cdot 0.01 + 100 \cdot (20 \cdot)^2 + \dots$

6.52. У системы 4 состояния (1-1-1, 1-2-0, 2-1-0, 3-0-0).

Пишем три уравнения на ожидаемые времена.

Решая находим $E(T) = \frac{3}{p(1-p)}$

Минимум при $p = 0.5$

Ответ слишком красивый... красивое решение????

6.53. Рассмотрим совершенно конкурентный невольничий рынок начинающих певиц. Певицы в хорошем настроении продаются по V_1 , в депрессии - по V_2 .

$$V_1 = 0.75 + \delta(0.5V_1 + 0.5V_2)$$

$$V_2 = \max_x -x + \delta(\sqrt{x}V_1 + (1 - \sqrt{x})V_2)$$

6.54.

6.55. $\mathbb{P}(X_{(3)} \in [x; x+dx]) = C_n^2 C_{n-2}^1 ((F(x) + o(x))^{n-3} (1 - F(x) + o(x))^2 ((f(x) + o(x))dx$. Значит, искомая функция плотности равна $f_{X_{(3)}}(t) = f(t)F(t)^{n-3}(1 - F(t))^2$.

6.56. Выберем двух студентов из потока наугад. Вероятность того, что ни один из них не решил задачу № 1, не превосходит $\left(\frac{80}{200}\right)^2 = 0,16$. Вероятность того, что ни один из них не решил задачу № 2, не превосходит 0,16 (по тем же причинам), и это справедливо для каждой из шести задач. Вероятность того, что хотя бы одну задачу они на пару не решили, не превосходит суммы этих вероятностей, т.е. $0,16 \cdot 6 = 0,96$. Значит, вероятность выбора пары студентов, которые совместными усилиями могут решить экзамен, не менее 0,04. Значит, хотя бы одна такая пара существует.

6.57. Проверить. Разбиваем отрезок на n частей, ставим автосервис в центр каждой части <http://math.stackexchange.com/questions/37254/>

6.58. Решение 1:

Величина X — число «серий», $X = X_1 + \dots + X_n$, где X_i - индикатор, показывающий, начинается ли новая серия с i -го кусочка.

$$\text{Ответ: } \frac{n-k}{n} + (n-1)\frac{k}{n}\frac{n-k}{n-1} = (k+1)\frac{n-k}{n}$$

Решение 2:

Закольцуем рулет, добавив в него еще один кусочек, для хозяина дома — для Алексея Суздальцева. Получаем $(k+1)$ потенциальную серию. Вероятность того, что некая серия не пуста, равна $\frac{n-k}{n}$. Итого, $(k+1)\frac{n-k}{n}$

6.59. Можно считать, что Петя берет книги подряд из хорошо перетасованной стопки. Соответственно он берет 6 книг и 6 интервалов (книги до 1-ой нужной, книги от 1-ой нужной до 2-ой нужной, и т.д.). Если считать, что средняя длина всех интервалов одинаковая, то получается такой ответ: $6 + 6 \cdot \frac{24}{7}$.

Доказательство того, что средняя длина всех интервалов одинаковая:

Расположим 30 книг по кругу. Среди этих 30 книг отметим случайным образом 7 книг и случайным образом занумеруем их от 1 до 7. Эти 7 книг разбивают круг из книг на 7 частей. В силу симметрии средняя длина каждой части одинакова и равна $\frac{24}{7}$. Будем трактовать книгу номер 1 как разбивающую круг на стопку. А книги 2-7, как нужные Пети.

Справедливую игру стратегией не испортишь!

6.60. Пусть X_n - благосостояние Васи после n -го хода, тогда $\mathbb{E}(X_n) = 100$. $\mathbb{E}(X_{final}) = 250p + 0(1-p)$.

7.1. $\mathbb{P}(X_n \leq q) = \mathbb{P}(X_n - \mathbb{E}(X_n) \leq a - \mathbb{E}(X_n))$. При больших n величина $a - \mathbb{E}(X_n)$ отрицательна, поэтому $\mathbb{P}(X_n - \mathbb{E}(X_n) \leq a - \mathbb{E}(X_n)) \leq \mathbb{P}(|X_n - \mathbb{E}(X_n)| \geq |a - \mathbb{E}(X_n)|) \leq c/(a - \mathbb{E}(X_n))^2$.

7.2. У Васи

7.3.

7.4. Только если X с вероятностью 1 константа.

8.1.

9.1. $\mathbb{E}(N) \approx 12,15$.

9.2. $\mathbb{P}_{16} = 0,482\,390\,182$, $\mathbb{P}_{17} = 0,525\,836\,596$.

9.3. Симуляции $p = 0,028\,5$, Пуассон: $p = 0,03$.

9.4. $\mathbb{P}(T \leq k) = n^{-k} n! \left\{ \begin{matrix} k \\ n \end{matrix} \right\}$ (число Стирлинга второго рода); 2287.

9.5. Если у нас $m = 13$ достоинств и $n = 4$ масти, то ответ имеет вид: $mn \prod_{i=1}^n \frac{in}{in+1} \approx 45,3; \approx 28,0$.

9.6. $n = 50$, 665.51

```
# -*- coding: utf-8 -*-
from __future__ import division
from numpy import arange
import scipy.stats as stats

# this function calculates expected number of sold newspapers
def e_sold_newspapers(n,lam=50):
    x=arange(n)
    probs=stats.poisson.pmf(x,lam)
    e_sold_newspapers=sum(x*probs)+(1-stats.poisson.cdf(n-1,lam))*n
    return e_sold_newspapers

# this function calculates expected profit
def profit(n,lam=50):
    return 30*e_sold_newspapers(n,lam)-15*n

print profit(50)
```

9.7. Около 0.7925

9.8. Ожидаемая сумма в конце игры - 808 рублей

9.9.

9.10.

10.1.

10.2. Каждая следующая стена равновероятно покрашена Сашей и Алёшей. Значит, нам нужны $\mathbb{P}(SSS) + \mathbb{P}(SSAS) + \mathbb{P}(SASS) + \mathbb{P}(ASSS) = \frac{5}{16}$. По другому: для простоты положим $\lambda = 1$. Пусть T — время, когда Саша закончит 3 стены. Функция плотности гамма-распределения (сумма трёх экспоненциальных) $f(t) = 0,5t^2 e^{-t}$. Нам нужна вероятность того, что к тому времени Алёша успеет меньше двух стен: $\int_0^\infty \mathbb{P}(N_t < 2 \mid T = t) dt = \dots = \frac{5}{16}$.

10.3. Производящая функция удовлетворяет соотношению:

$$g(t) = \exp(\lambda(t-1)) \frac{g(t) + tg(0) - g(0)}{t}$$

$$g(t) = g(0) \frac{(t-1) \exp(\lambda(t-1))}{t - \exp(\lambda(t-1))}$$

Из условия $g(1) \rightarrow 1$ находим $g(0) = 1 - \lambda$ и, помучившись, $\mathbb{E}(X_\infty) = g'(1) = \frac{\lambda(2-\lambda)}{2 \cdot (1-\lambda)}$.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

11.1. $\mu \pm \sigma$.

11.2. $\mu + \sigma$.

11.3.

11.4.

11.5. выделяем полный квадрат, $\mathbb{E}(X) = \frac{5}{16}$, $\sigma_X = \frac{1}{4}$

11.6.

11.7.

11.8. $K = 170$, $M = 120$ (симметричный интервал) или $K = M = 168$ (площадь с одного края можно принять за 0)

Вариант: театр, два входа, два гардероба а) только пары, б) по одному

11.9. $\mathbb{E}(F_{k,n}) = \text{Var}(t_n)$

11.10. $F_{1,n}$

11.11. Квадрат расстояния имеет χ_2^2 распределение

12.1. 1. Про вертикальные шаги можно забыть, а вероятность бесконечное количество раз посетить 0 для двумерного случайного блуждания равна 1.

12.2. 39^2 .

12.3.

12.4.

12.5. $\frac{C_{2k}^k}{2^{2k+1}}$. Совсем простого решения не знаю, хотя ответ простой.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6. два независимых симметричных распределения; практически любая сумма несимметричных распределений, например, два независимых с $p(x) = 2 - 2x$ на $[0; 1]$.

13.7. нет

14.1. Логарифмическая функция правдоподобия

$$l(\lambda) = -n\lambda + \sum x_i \ln \lambda - \sum \ln(x_i!) \quad (3)$$

Первая производная:

$$l'(\lambda) = -n + \frac{\sum x_i}{\lambda} \quad (4)$$

Оценка метода максимального правдоподобия имеет вид $\hat{\lambda} = \bar{X}_n$ Ожидаемая информация Фишера $I(\lambda) = n/\lambda$, наблюдаемая информация Фишера $I(\hat{\lambda}) = n/\hat{\lambda}$. Тест Вальда $W = (\hat{\lambda} - 3)^2 \cdot I(\hat{\lambda})$

Тест множителей Лагранжа $LM = l'(3) \cdot I^{-1}(3)$

Тест отношения правдоподобия $LR = 2(l(\hat{\lambda}) - l(3))$

14.2.

14.3.

$$E(\bar{X}) = E(X_i) = \int_0^\infty a^2 \cdot t^2 \exp(-at) dt \quad (5)$$

Для удобства заметим, что

$$\int_0^\infty t^n \exp(-at) dt = 0 + \int_0^\infty t^{n-1} \frac{n}{a} \exp(-at) dt \quad (6)$$

Получаем мат. ожидание:

$$\begin{aligned} E(\bar{X}) &= \int_0^\infty a^2 \cdot t \frac{2}{a} \cdot \exp(-at) dt = \\ &= \int_0^\infty 2a \cdot t \cdot \exp(-at) dt = \int_0^\infty 2a \cdot \frac{1}{a} \exp(-at) dt = \\ &= \int_0^\infty 2 \cdot \exp(-at) dt = \frac{2}{a} \quad (7) \end{aligned}$$

Метод моментов

$$\bar{X} = \frac{2}{\hat{a}_{MM}} \quad (8)$$

Получаем \hat{a}_{MM} :

$$\hat{a}_{MM} = \frac{2}{\bar{X}} = \frac{40}{625} = \frac{8}{125} = 0.064 \quad (9)$$

Метод максимального правдоподобия

$$l = \sum_{i=1}^n \ln(p(x_i)) = \sum_{i=1}^n (2 \ln(a) + \ln(x_i) - ax_i) = 2n \ln(a) + \sum \ln(x_i) - a \sum x_i \quad (10)$$

$$l'(a) = \frac{2n}{a} - \sum x_i \quad (11)$$

Получаем \hat{a}_{ML} :

$$\hat{a}_{ML} = \frac{2n}{\sum X_i} = \frac{2}{\bar{X}} = \hat{a}_{MM} \quad (12)$$

Наблюдаемая информация Фишера

$$J_n(\hat{a}) = -l''(\hat{a}) = \frac{2n}{\hat{a}^2} = 2n \cdot \left(\frac{\sum X_i}{2n} \right)^2 = \frac{(\sum X_i)^2}{2n} = \frac{625^2}{40} \quad (13)$$

Доверительный интервал

$$\hat{a} \pm 1.96 \cdot J_n^{-1/2} = 0.064 \pm 0.0198 = [0.0442; 0.0838] \quad (14)$$

14.4.

14.5.

14.6.

15.1.

16.1. Равномерное на $[0; 1]$

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6. Если начинает Аня, то $\frac{1-p}{(2-p)^2}$; Если начинает Таня, то $\frac{(1-p)^2}{(2-p)^2}$. Источник: Кирилл Фурманов

17.1. Да. Например, если первая половина наблюдений попала рядом с μ , а вторая — далеко. Ну не повезло Пете.

17.2. Оба они делают одну ошибку: если H_0 не отвергается, это не значит, что она — верна. Корректнее

было бы провести тест на сравнение средних. Идея: Кирилл Фурманов

17.3. b) У \bar{X} меньше дисперсия, поэтому она в среднем ближе к μ , чем X_1 .

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

17.12.

17.13.

17.14.

17.15.

17.16.

17.17.

17.18.

17.19.

17.20.

17.21.

17.22.

17.23.

17.24.

17.25. a) [13.61; 14.39]

b) Отвергается ($Z_{observed} = -2.12$, $Z_{critical} = -1.28$)

c) $P_{value} = 0.017$

17.26.

17.27.

17.28.

17.29.

17.30.

17.31.

17.32.

17.33. Среднее значение хи-квадрат случайной величины равно числу степеней свободы. Единице. Historical Note (as told by Chris Olsen): The Chi-square statistic was invented by Karl Pearson about 1900. Pearson knew what the Chi-square distribution looks like, but he was unsure about the degrees of freedom.

About 15 years later, Fisher got involved. He and Pearson were unable to agree on the degrees of freedom for the two-by-two table, and they could not settle the issue mathematically. Pearson believed there was 1 degree of freedom and Fisher 3 degrees of freedom.

They had no nice way to do simulations, which would be the modern approach, so Fisher looked at lots of data in two-by-two tables where the variables were thought to be independent. For each table he calculated the Chi-square statistic. Recall that the expected value for the Chi-square statistic is the degrees of freedom. After collecting many Chi-square values, Fisher averaged all the values and got a result he described as «embarrassingly close to 1»

This confirmed that there is one degree of freedom for a two-by-two table. Some years later this result was proved mathematically.

17.34.

17.35.

17.36.

17.37.

17.38.

17.39.

17.40.

Мож
вклю
чить
неиз-
вестн
дисп
сию?