

Diagonalització d'Endomorfismes

Grau en Enginyeria Telemàtica

Juan Gabriel Gomila

Grau en Enginyeria Telemàtica

Universitat de les Illes Balears

`juangabriel.gomila@uib.es`

7 de diciembre de 2016

Índex

- 1 Introducció
- 2 Diagonalització
- 3 Vectors i Valors propis d'una Matriu
 - Definicions
 - Càlcul de vectors i valors propis
 - Subespai propi associat a un valor propi
 - Propietats dels valors i vectors propis
- 4 Matrius diagonalitzables
- 5 Definició
 - Càlcul de la matriu diagonal
- 6 Diagonalització ortogonal

1 Introducció

2 Diagonalització

3 Vectors i Valors propis d'una Matriu

- Definicions
- Càlcul de vectors i valors propis
- Subespai propi associat a un valor propi

- Propietats dels valors i vectors propis

4 Matrius diagonalitzables

5 Definició

- Càlcul de la matriu diagonal

6 Diagonalització ortogonal

Introducció

Abans d'entrar matemàticament en el tema de diagonalització de matrius quadrades, exposarem alguna de les aplicacions que té l'ús de les matrius diagonals.

Recordem que una matriu diagonal és una matriu quadrada que té zeros en tots els elements fora de la seva diagonal principal.

Introducció

La factorització d'una matriu donada A en funció d'una altra matriu diagonal D permet resoldre problemes d'anàlisi i estudi dels sistemes elèctrics, vibracions, economia, etc... que solen venir modelitzats per equacions diferencials i en derivades parcials. En aquesta factorització hi juguen un paper molt important uns escalars anomenats **valors propis** i un tipus especials de vectors anomenats **vectors propis**

Introducció

Un tipus d'aplicació de la diagonalització de matrius es troba en l'anàlisi de la solució d'un sistema dinàmic al llarg del temps.

Un sistema es caracteritza per l'estat d'un conjunt de n variables que el determinen. Aquest conjunt es pot expressar com un vector de \mathbb{R}^n les components del qual expressen els valors d'aquestes variables

$$(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Si l'estat evoluciona al llarg del temps modificant el seu valor a cada període (cada hora, dia, mes,...) es molt comú que la relació entre els estats del sistema es presenti de forma recursiva:

Introducció

- $X_{p+1} = A \cdot X_p$, on A és una matriu quadrada d'ordre n
- X_p representa l'estat del sistema en el període p
- X_{p+1} representa l'estat del sistema en el període següent $p + 1$

Llavors, basta conèixer l'estat del sistema en el període inicial X_0 (estat inicial del sistema) per poder calcular l'estat del sistema en qualsevol període.

Introducció

En efecte, si coneixem l'estat inicial X_0 , podem coneixer

$$X_1 = A \cdot X_0$$

$$X_2 = A \cdot X_1 = A \cdot (A \cdot X_0) = A^2 \cdot X_0$$

...

$$X_m = A^m \cdot X_0$$

Per tant, per coneixer l'estat del sistema en el període m és necessari el càlcul de la matriu A^m . Aquest càlcul, ja imaginareu que és bastant complicat i és difícil no equivocar-se... En canvi, se simplifica bastant en el cas de que A sigui diagonalitzable (com recordareu del Tema 1 de Matrius).

1 Introducció

2 Diagonalització

3 Vectors i Valors propis d'una Matriu

- Definicions
- Càlcul de vectors i valors propis
- Subespai propi associat a un valor propi

- Propietats dels valors i vectors propis

4 Matrius diagonalitzables

5 Definició

- Càlcul de la matriu diagonal

6 Diagonalització ortogonal


Matrius semblants

Matrius Semblants

Dues matrius A i A' són **semblants** si existeix una matriu P quadrada invertible (amb $|P| \neq 0$) tal que $A' = P^{-1} \cdot A \cdot P$

Matrius semblants

Pensem que totes les matrius semblants constitueixen les diverses representacions analítiques d'un mateix endomorfisme f d'un espai vectorial E de dimensió n en diferents bases de E .



Matrius semblants

Això planteja el problema de cerca la base de E en la qual f es presenti de la forma més senzilla possible. Degut a les característiques tan bones que presenten les matrius diagonals, s'intenta trobar una base de E en la qual f estigui representada per una matriu diagonal, és a dir, donada una matriu A en una base qualssevol, volem cercar una matriu diagonal semblant a ella. Aquest procés rebrà el nom de **diagonalitzar la matriu o l'endomorfisme**.

Matrius diagonalitzables

Matriu Diagonalitzable

Una matriu A és diagonalitzable si és semblant a una matriu diagonal D , és a dir, si existeix una matriu P regular tal que $D = P^{-1} \cdot A \cdot P$.

Això no és possible sempre. Haurem de veure en quines condicions existeix una matriu així i respecte de quina base representarà l'endomorfisme.

- 1 Introducció
- 2 Diagonalització
- 3 Vectors i Valors propis d'una Matriu
 - Definicions
 - Càlcul de vectors i valors propis
 - Subespai propi associat a un valor propi

- Propietats dels valors i vectors propis

- 4 Matrius diagonalitzables
- 5 Definició
 - Càlcul de la matriu diagonal
- 6 Diagonalització ortogonal

- 1 Introducció
- 2 Diagonalització
- 3 Vectors i Valors propis d'una Matriu

- Definicions
- Càlcul de vectors i valors propis
- Subespai propi associat a un valor propi

- Propietats dels valors i vectors propis

- 4 Matrius diagonalitzables
- 5 Definició
 - Càlcul de la matriu diagonal
- 6 Diagonalització ortogonal

Matrius diagonalitzables

La teoria que veurem a continuació, està pensada per aconseguir arribar a diagonalitzar una matriu, però no hem d'olvidar que aquesta matriu, realment representa un cert endomorfisme en una certa base.

Vectors Propis

Vector Propi (o autovector)

Donada una matriu quadrada $A \in M_{n \times n}$ de tamany n els vectors columna del qual pertanyen a un espai vectorial E de dimensió n , un element $\vec{x} \in E$ és un **vector propi** de A si

- 1 $\vec{x} \neq \vec{0}$ no és el vector nul
- 2 Existeix un escalar $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que verifica $A \cdot \vec{x} = \lambda \vec{x}$

Geomètricament, un vector propi \vec{x} és aquell que té la mateixa direcció que el vector $A \cdot \vec{x}$ transformat per la matriu A .

Vectors Propis

Exercici 1

Demostrar que $\vec{x} = (2, -1)$ és un vector propi de la matriu

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Resulta que \vec{x} serà un vector propi de la matriu si es compleix que $B \cdot \vec{x} = \lambda \vec{x}$ per algun escalar λ .

$$\begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$$

i com que el vector $(4, -2)$ resulta ser $2(2, -1)$, és a dir $B \cdot \vec{x} = 2\vec{x}$, aleshores \vec{x} és un vector propi de B .

Valor Propis

Valor Propi (o autovalor)

L'escalar λ de la definició anterior s'anomena valor propi associat al vector propi \vec{x} . El conjunt de tots els vectors que satisfan la relació $A \cdot \vec{x} = \lambda \vec{x}$ reben el nom de conjunt de vectors propis associats al valor propi λ .

- 1 Introducció
- 2 Diagonalització
- 3 Vectors i Valors propis d'una Matriu
 - Definicions
 - Càlcul de vectors i valors propis
 - Subespai propi associat a un valor propi

- Propietats dels valors i vectors propis
- 4 Matrius diagonalitzables
 - 5 Definició
 - Càlcul de la matriu diagonal
 - 6 Diagonalització ortogonal

Càlcul de valors i vectors propis

Partim de l'equació matricial anterior

$$A \cdot \vec{x} = \lambda \vec{x}$$

que també es pot expressar com

$$A \cdot \vec{x} - \lambda \vec{x} = \vec{0}$$

o bé

$$(A - \lambda I) \cdot \vec{x} = \vec{0}$$

Aquesta equació representa un sistema **homogeni** de n equacions i n incògnites, amb matriu de coeficients $A - \lambda I$

Càlcul de valors i vectors propis

Si aquest sistema d'equacions és de Cramer (n equacions, n incògnites, de rang n amb $|A - \lambda I| \neq 0$) serà compatible i determinat, i la seva única solució serà la solució trivial $\vec{x} = \vec{0}$. Si en canvi, si el sistema ha de tenir solucions diferents de la solució trivial, aleshores el determinant de $A - \lambda I$ haurà de ser zero:

$$|A - \lambda I| = 0$$

Es a dir, existiran vector propis de la matriu, únicament en el cas en que $|A - \lambda I| = 0$.

Càlcul de valors i vectors propis

Exercici 2

Té vectors propis la matriu A ?

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 6 \\ 2 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 8 \end{pmatrix}$$

Càlcul de valors i vectors propis

Construïm la matriu $A - \lambda I$

$$\begin{pmatrix} 4 - \lambda & -1 & 6 \\ 2 & 1 - \lambda & 6 \\ 2 & -1 & 8 - \lambda \end{pmatrix}$$

En calculam el determinant

$$|A - \lambda I| = (9 - \lambda)(2 - \lambda)^2$$

Per tant el determinant és nul pels valors de $\lambda \in \{2, 9\}$. Aquests seran els dos valors propis de la matriu.

- Els vectors \vec{x} que verifiquin $(A - 2I) \cdot \vec{x} = \vec{0}$ seran els vectors propis associats al valor propi $\lambda_1 = 2$.
- Els vectors \vec{x} que verifiquin $(A - 9I) \cdot \vec{x} = \vec{0}$ seran els vectors propis associats al valor propi $\lambda_2 = 9$.

Càlcul de valors i vectors propis

En l'exercici que acabam de fer, hem vist que el resultat de desenvolupar el determinant $|A - \lambda I|$ és un polinomi en la variable λ .

Polinomi característic d'una matriu A

El **polinomi característic** d'una matriu A és el polinomi de grau n que surt en calcular el determinant $|A - \lambda I|$.

Equació característica d'una matriu A

L'equació característica d'una matriu A és la que s'obté en igualar el seu polinomi característic a zero: $|A - \lambda I| = 0$.

Les n solucions d'aquesta equació són els valors propis de la matriu.

Càlcul de valors i vectors propis

Com que l'equació característica és de grau n , té exactament n solucions, no necessàriament diferents entre elles. Per tant, es convenient acompanyar cada arrel del polinomi del nombre de vegades que aquesta es repeteix.

Multiplicitat algebraica d'un valor propi

Donat un valor propi λ_i d'una matriu característica $A - \lambda I$, s'anomena **multiplicitat algebraica** de λ_i al nombre de vegades que apareix com a solució de l'equació característica.

En l'exercici anterior, el polinomi caracteristic era $(9 - \lambda)(2 - \lambda)^2$, per tant

- El valor propi $\lambda_1 = 2$ té multiplicitat algebraica 2
- El valor propi $\lambda_2 = 9$ té multiplicitat algebraica 1

Càlcul de valors i vectors propis

Exercici 3

Calculau els autovalors de la matriu

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Càlcul de valors i vectors propis

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 1 & 0 \\ 1 & -1 - \lambda & -1 \\ 0 & 2 & 1 - \lambda \end{pmatrix}$$

- El polinomi característic és $\lambda^2(1 - \lambda)$.
- L'equació característica és $\lambda^2(1 - \lambda) = 0$.
- Els valors propis són $\lambda_1 = 0$ amb multiplicitat algebraica 2, i $\lambda_2 = 1$ amb multiplicitat algebraica 1.

Càlcul de valors i vectors propis

Una vegada hem calculat tots els valors propis ens tocarà calcular el conjunt de vectors propis associats a cada valor propi. Per fer-ho resoldrem per a cada valor propi λ_i el sistema homogeni següent:

$$(A - \lambda_i I) \cdot \vec{x} = \vec{0}$$

Càlcul de valors i vectors propis

Exercici 4

Calculau els vectors propis de la matriu

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & -8 & -2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Càlcul de valors i vectors propis

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 2 - \lambda & -2 & 1 \\ 2 & -8 - \lambda & -2 \\ 1 & 2 & 2 - \lambda \end{pmatrix}$$

Els valors propis són $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = -7$ amb multiplicitat algebraica 1 els tres.

- Els vectors propis \vec{x} associats al valor propi $\lambda_1 = 0$ són els que compleixin $(A - 0I) \cdot \vec{x} = \vec{0}$.
- Els vectors propis \vec{x} associats al valor propi $\lambda_2 = 3$ són els que compleixin $(A - 3I) \cdot \vec{x} = \vec{0}$.
- Els vectors propis \vec{x} associats al valor propi $\lambda_3 = -7$ són els que compleixin $(A + 7I) \cdot \vec{x} = \vec{0}$.

Càlcul de valors i vectors propis

Per $\lambda_1 = 0$:

$$(A - 0I) \cdot \vec{x} = \vec{0}$$

té per solució la família de vectors

$$(-z, -z/2, z)$$

Càlcul de valors i vectors propis

Per $\lambda_2 = 3$:

$$(A - 2I) \cdot \vec{x} = \vec{0}$$

té per solució la família de vectors

$$(z, 0, z)$$

Càlcul de valors i vectors propis

Per $\lambda_3 = -7$:

$$(A + 7I) \cdot \vec{x} = \vec{0}$$

té per solució la família de vectors

$$(-z, -4z, z)$$

- 1 Introducció
- 2 Diagonalització
- 3 Vectors i Valors propis d'una Matriu
 - Definicions
 - Càlcul de vectors i valors propis
 - Subespai propi associat a un valor propi

- Propietats dels valors i vectors propis
- 4 Matrius diagonalitzables
 - 5 Definició
 - Càlcul de la matriu diagonal
 - 6 Diagonalització ortogonal

Subespai propi associat a un valor propi

Se pot demostrar que

- Si \vec{x}, \vec{x}' són dos vectors propis qualssevol de la matriu A associats al mateix valor propi λ , aleshores la seva suma $\vec{x} + \vec{x}'$ també és un vector propi de A associat al mateix valor propi λ .
- Si \vec{x} és un vector propi de la matriu A associat al valor propi λ , també ho és qualssevol altre vector de la forma $\mu\vec{x}$ on μ és un escalar no nul.

Subespai propi associat a un valor propi

Tenint en compte el teorema de caracterització de subespais (la suma de dos vectors del subconjunt pertany al subconjunt, i el producte d'un escalar per un vector del subconjunt és del subconjunt):

Subespai propi associat a un valor propi

El conjunt dels vectors propis associats al mateix valor propi λ juntament amb el vector $\vec{0}$, constitueixen un subespai vectorial de E anomenat **subespai propi associat al valor propi λ** .

Multiplicitat geomètrica d'un valor propi

La multiplicitat geomètrica d'un valor propi λ_i és la dimensió del seu subespai propi associat.

Subespai propi associat a un valor propi

Exercici 5

Donada la matriu

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

trobau els autovalors, i els subespais propis associats a cadascun d'ells.

Subespai propi associat a un valor propi

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 4 - \lambda & 1 & 1 \\ 1 & 4 - \lambda & 1 \\ 1 & 1 & 4 - \lambda \end{pmatrix}$$

El polinomi característic és $|A - \lambda I| = (3 - \lambda)^2(6 - \lambda)$, que té l'autovalor $\lambda_1 = 3$ amb multiplicitat algebraica 2, i l'autovalor $\lambda_2 = 6$ amb multiplicitat algebraica 1.

Subespai propi associat a un valor propi

Els vectors propis \vec{x} associats al valor propi $\lambda_1 = 3$ són els que compleixen $(A - 3I)\vec{x} = \vec{0}$

$$A - 3I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Aleshores, $(A - 3I)\vec{x} = \vec{0}$ ens dona la mateixa equació tres vegades, un SCI amb dos graus de llibertat:

$$x + y + z = 0 \Rightarrow x = -y - z$$

El subespai propi associat a $\lambda_1 = 3$ serà:

$$H_1 = \langle (x, y, z) \rangle = \langle (-y - z, y, z) \rangle = \langle (-1, 1, 0), (-1, 0, 1) \rangle$$

Com que són dos vectors no proporcionals, són LI i per tant són una base de H_1 , d'on $\dim H_1 = 2$

Subespai propi associat a un valor propi

Els vectors propis \vec{x} associats al valor propi $\lambda_1 = 6$ són els que compleixen $(A - 6I)\vec{x} = \vec{0}$

$$A - 6I = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Aleshores, $(A - 6I)\vec{x} = \vec{0}$ ens dona dues equacions diferents, un SCI amb un grau de llibertat::

$$x = y = z$$

El subespai propi associat a $\lambda_2 = 6$ serà:

$$H_2 = \langle (x, y, z) \rangle = \langle (x, x, x) \rangle = \langle (1, 1, 1) \rangle$$

Com que només tenim un vector no nul, és LI i per tant és una base de H_2 , d'on $\dim H_2 = 1$

- 1 Introducció
- 2 Diagonalització
- 3 Vectors i Valors propis d'una Matriu
 - Definicions
 - Càlcul de vectors i valors propis
 - Subespai propi associat a un valor propi

- Propietats dels valors i vectors propis

- 4 Matrius diagonalitzables
- 5 Definició
 - Càlcul de la matriu diagonal
- 6 Diagonalització ortogonal

Propietats dels valors i vectors propis

Propietats

- La suma dels n valors propis d'una matriu és igual a la seva traça.
- Els valors propis d'una matriu i de la seva transposada coincideixen.
- El producte dels n valors propis d'una matriu és igual al seu determinant.

Propietats dels valors i vectors propis

Propietats

- Dues matrius semblants tenen la mateixa equació característica, i per tant els mateixos valors propis amb el mateix grau de multiplicitat.
- Una matriu triangular té com a valors propis els elements de la diagonal principal.
- A valors propis diferents, els hi correspon vectors propis linealment independents.
- Un mateix vector propi no pot estar associat a dos valors propis diferents.

Propietats dels valors i vectors propis

Teorema

La dimensió del subespai propi H_i associat al valor propi λ_i és major o igual que 1 i menor o igual que l'ordre de multiplicitat (o multiplicitat algebraica), n_i del valor propi

$$1 \leq \dim(H_i) \leq n_i$$

Corol·lari

Si la multiplicitat algebraica del valor propi és 1 ($n_i = 1$), la dimensió del corresponent subespai propi (multiplicitat geomètrica) serà també 1

$$1 \leq \dim(H_i) \leq n_i = 1 \Rightarrow \dim(H_i) = 1$$

Propietats dels valors i vectors propis

Teorema

Donats $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$, valors propis diferents de la matriu $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ i $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_r$ els vectors propis associats a ells, llavors $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_r$ son linalment independents.

Teorema

Si la matriu $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ formada per vectors d'un espai vectorial E té n valors propis, també tindrà n vectors propis que seran linealment independents: $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n$.

A més, com que n vectors LI d'un espai de dimensió finita n són base, $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n$ seran una base de E .

- 1 Introducció
- 2 Diagonalització
- 3 Vectors i Valors propis d'una Matriu
 - Definicions
 - Càlcul de vectors i valors propis
 - Subespai propi associat a un valor propi

- Propietats dels valors i vectors propis

- 4 **Matrius diagonalitzables**
- 5 Definició
 - Càlcul de la matriu diagonal
- 6 Diagonalització ortogonal

- 1 Introducció
- 2 Diagonalització
- 3 Vectors i Valors propis d'una Matriu
 - Definicions
 - Càlcul de vectors i valors propis
 - Subespai propi associat a un valor propi

- Propietats dels valors i vectors propis

- 4 Matrius diagonalitzables
- 5 **Definició**
 - Càlcul de la matriu diagonal
- 6 Diagonalització ortogonal

Matrius diagonalitzables

Recordem que hem començat el tema dient que una matriu A és diagonalitzable si existeix una matriu D diagonal semblant a ella. A i D són semblants si es pot establir una igualtat entre elles $D = Q^{-1} \cdot A \cdot Q$, on Q es una matriu regular.

Teorema

Una matriu $A \in M_{n \times n}$ és diagonalitzable si i només si té n vectors propis linealment independents.

Equivalentment, la condició necessària i suficient perquè una matriu sigui diagonalitzable és que existeixi una base de l'espai vectorial formada per vectors propis de la matriu donada.

Matrius diagonalitzables

Corol·lari

Si la matriu A té n valors propis diferents. hi haurà n vectors propis LI, i com a conseqüència A serà diagonalitzable.

Exercici 6

Estudiar els valors propis de la matriu B

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

És B diagonalitzable?

Matrius diagonalitzables

$$B - \lambda I = \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 0 & 2 \\ 0 & -1 - \lambda & 0 \\ 2 & 0 & -1 - \lambda \end{pmatrix}$$

El polinomi característic és

$$-(1 + \lambda)(\lambda - 3)(\lambda + 2)$$

Per tant els valors propis són $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = -2$. Com que esteim en un espai vectorial de dimensió 3 i hi ha 3 valors propis reals i diferents, la matriu és diagonalitzable.

Matrius diagonalitzables

Arribats a aquest punt, esteim en condicions d'enunciar el teorema que ens permet saber qué ha de passar perquè una matriu sigui diagonalitzable:

Teorema

La condició necessària i suficient perquè una matriu A sigui diagonalitzable és que per cada valor propi λ_i el seu ordre de multiplicitat n_i coincideixi amb la seva multiplicitat geomètrica $\dim(H_i)$

$$\dim(H_i) = n_i \quad \forall \lambda_i$$

Matrius diagonalitzables

D'aquesta manera, si la matriu té r valors propis diferents $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ unint bases de tots els subespais propis H_1, H_2, \dots, H_n obtindrem una base de E

$$\{B_{H_1} \cup B_{H_2} \cup \dots \cup B_{H_r}\} = B_E$$

Matrius diagonalitzables

En resum, A és diagonalitzable si tots els valors propis pertanyen als nombres reals i

- Son tots ells diferents, o bé
- Són múltiples i les multiplicitats algebraiques i geomètriques són iguals.

A més, la matriu D té com elements de la diagonal principal els valors propis de la matriu A i compleix la igualtat

$$D = (VP)^{-1} \cdot A \cdot (VP)$$

on la matriu VP és la matriu que té per columnes els n vectors propis LI de la matriu A .

- 1 Introducció
- 2 Diagonalització
- 3 Vectors i Valors propis d'una Matriu
 - Definicions
 - Càlcul de vectors i valors propis
 - Subespai propi associat a un valor propi

- Propietats dels valors i vectors propis

- 4 Matrius diagonalitzables
- 5 **Definició**
 - Càlcul de la matriu diagonal
- 6 Diagonalització ortogonal

Càlcul de la matriu diagonal

Procediment per diagonalitzar una matriu A

- 1 Trobar el polinomi característic
- 2 Obtenir les arrels de l'equació característica, és a dir els valors propis λ_i i els seus ordres de multiplicitat n_i .
- 3 Resoldre per cada λ_i el sistema $(A - \lambda_i I)\vec{x} = \vec{0}$ per trobar els vectors propis i els subespais propis.
- 4 Si $n_i = \dim(H_i)$ per cada valor propi λ_i , aleshores la matriu és diagonalitzable.
- 5 La matriu D té com elements de la diagonal principal els valors propis de la matriu A i $D = (VP)^{-1} \cdot A \cdot (VP)$ on la matriu VP és la matriu que té per columnes els n vectors propis LI de la matriu A col·locats seguint el mateix ordre que els valors propis en la matriu D .

Càlcul de la matriu diagonal

Exercici 7

Diagonalitzar la matriu

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Càlcul de la matriu diagonal

D'un exemple anterior, sabem que els valors propis són $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = -2$ i els subespais propis

$$H_1 = \langle (0, 1, 0) \rangle, H_2 = \langle (2, 0, 1) \rangle, H_3 = \langle (1, 0, -2) \rangle$$

Per tant

$$D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, VP = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Exercici 8

Calculau $(VP)^{-1}$ i demostra que $D = (VP)^{-1} \cdot A \cdot (VP)$

Càlcul de la matriu diagonal

La solució és

$$VP^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 0 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

i si es fa el producte $(VP)^{-1} \cdot A \cdot (VP)$ es comprova fàcilment que la solució és D .

Càlcul de la matriu diagonal

Exercici 9

Diagonalitzar la matriu

$$C = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Càlcul de la matriu diagonal

El polinomi característic és

$$(2 - \lambda)(\lambda - 2)(\lambda + 4)$$

i per tant els valors propis són $\lambda_1 = -4$ amb multiplicitat $n_1 = 1$ i $\lambda_2 = 2$ amb $n_2 = 2$. Els espais propis són

$$H_1 = \langle (1, -1, 0) \rangle, H_2 = \langle (1, 1, 0), (0, 0, 1) \rangle$$

Per tant, $\dim(H_i) = n_i$ per tots dos i

$$D = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, VP = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Exercici 10

Calculau $(VP)^{-1}$ i demostraueu que $D = (VP)^{-1} \cdot A \cdot (VP)$

Càlcul de la matriu diagonal

La solució és

$$VP^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

i si es fa el producte $(VP)^{-1} \cdot A \cdot (VP)$ es comprova fàcilment que la solució és D .

Càlcul de la matriu diagonal

Exercici 11

Diagonalitzar la matriu

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 2 & 6 & 0 \\ 2 & 2 & 8 \end{pmatrix}$$

Càlcul de la matriu diagonal

El polinomi característic és

$$(8 - \lambda)(6 - \lambda)^2$$

i per tant els valors propis són $\lambda_1 = 6$ amb multiplicitat $n_1 = 2$ i $\lambda_2 = 8$ amb $n_2 = 1$.

Si ho calculam, el subespai propi H_1 ve generat pel vector $(0, -1, 1)$ i per tant

$$1 = \dim(H_1) < 2 = n_1$$

Per tant, els valors són diferents i concloem que la matriu A no és diagonalitzable.

- 1 Introducció
- 2 Diagonalització
- 3 Vectors i Valors propis d'una Matriu
 - Definicions
 - Càlcul de vectors i valors propis
 - Subespai propi associat a un valor propi

- Propietats dels valors i vectors propis

- 4 Matrius diagonalitzables
- 5 Definició
 - Càlcul de la matriu diagonal
- 6 Diagonalització ortogonal

Diagonalització ortogonal

Les matrius reals simètriques són sempre diagonalitzables és a dir, tenen una base de vectors propis. I no només això, si no que sempre tenen una base de vectors propis ortonormals (és a dir, els seus vectors són ortogonals dos a dos i unitaris).

Diagonalització ortogonal

Matriu ortogonal

Una matriu quadrada Q es diu **ortogonal** si es compleix que la seva inversa i la seva transposta són iguals

$$Q^t = Q^{-1}$$

Diagonalització ortogonal

Matriu ortogonalment diagonalitzable

Es diu que una matriu quadrada A és **ortogonalment diagonalitzable** si existeix una base de vectors propis ortonormals. Això és equivalent a dir que existeix una matriu Q ortogonal tal que

$$Q^t \cdot A \cdot Q$$

és una matriu diagonal formada pels valors propis de A

Diagonalització ortogonal

Teorema

Si A és una matriu quadrada real simètrica de tamany n , aleshores es verifica

- 1 Tots els valors propis de la matriu són reals.
- 2 Els vectors propis associats a valors propis diferents són ortogonals
- 3 Té n vectors propis, és a dir diagonalitza.
- 4 Té n vectors propis ortonormals, és a dir, és ortogonalment diagonalitzable.

Diagonalització ortogonal

Exercici 12

Diagonalitzar ortogonalment la matriu

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Diagonalització ortogonal

En un exercici precedent, hem vist que els valors propis d'aquesta matriu eren $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = -2$ i que els subespais propis venien generats per

$$B_{H_1} = \{\vec{u}_1\} = \{(0, 1, 0)\}$$

$$B_{H_2} = \{\vec{u}_2\} = \{(2, 0, 1)\}$$

$$B_{H_3} = \{\vec{u}_3\} = \{(1, 0, -2)\}$$

Unint les tres bases tenim una base de l'espai vectorial total

$$B = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$$

Diagonalització ortogonal

Si feim els productes escalars pertinents, resulta que

$$\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = (0, 1, 0) \cdot (2, 0, 1) = 0$$

$$\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_3 = (0, 1, 0) \cdot (1, 0, -2) = 0$$

$$\vec{u}_2 \cdot \vec{u}_3 = (2, 0, 1) \cdot (1, 0, -2) = 0$$

B és una base ortogonal. Perque sigui ortogonalment diagonalitzable, només ens cal que siguin unitaris.

$$\|\vec{u}_1\| = 1, \|\vec{u}_2\| = \sqrt{5}, \|\vec{u}_3\| = \sqrt{5}$$

Diagonalització ortogonal

Per tant, una base ortonormal és

$$B = \left\{ (0, 1, 0), \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, 0, \frac{1}{\sqrt{5}} \right), \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, 0, \frac{-2}{\sqrt{5}} \right) \right\}$$

Per tant, la matriu ortogonal de vectors propis és

$$(VP)_{ort} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{-2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

Diagonalització ortogonal

Finalment, podem comprovar que $(VP)_{ort}^t \cdot B \cdot (VP)_{ort} = D$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{-2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{-2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} =$$
$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Diagonalització ortogonal

Exercici 13

Diagonalitzar ortogonalment la matriu

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Diagonalització ortogonal

En un exercici precedent, hem vist que els valors propis d'aquesta matriu eren $\lambda_1 = 3$ amb multiplicitat algebraica $n_1 = 2$, $\lambda_2 = 6$ amb $n_2 = 1$

$$B_{H_1} = \{(-1, 1, 0), (-1, 0, 1)\}$$

$$B_{H_2} = \{(1, 1, 1)\}$$

Unint les dues bases tenim una base de l'espai vectorial total

$$B = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\} = \{(-1, 1, 0), (-1, 0, 1), (1, 1, 1)\}$$

Diagonalització ortogonal

Si feim els productes escalars pertinents, resulta que

$$\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = (-1, 1, 0) \cdot (-1, 0, 1) = 1 \neq 0$$

$$\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_3 = (-1, 1, 0) \cdot (1, 1, 1) = 0$$

$$\vec{u}_2 \cdot \vec{u}_3 = (-1, 0, 1) \cdot (1, 1, 1) = 0$$

B NO és una base ortogonal. Haurem de començar per ortogonalitzar-la amb el teorema de Gram-Smidt.

Diagonalització ortogonal

$$\vec{c}_1 = \vec{u}_1 = (-1, 1, 0)$$

$$\vec{c}_2 = \vec{u}_2 - \frac{\vec{c}_1 \cdot \vec{u}_2}{\vec{c}_1 \cdot \vec{c}_1} \vec{c}_1 =$$

$$= (-1, 0, 1) - \frac{(-1, 1, 0) \cdot (-1, 0, 1)}{(-1, 1, 0) \cdot (-1, 1, 0)} (-1, 1, 0) = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right)$$

Com que \vec{u}_3 ja era ortogonal a \vec{u}_1 i \vec{u}_2 , per construcció també ho és ja a \vec{c}_1, \vec{c}_2 .

$$B_{ort} = \left\{ (-1, 1, 0), \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1 \right), (1, 1, 1) \right\}$$

Diagonalització ortogonal

ulam la norma de cadascun dels vectors i els dividim per aquest valor per obtenir vectors unitaris

$$B_{ort-uni} = \left\{ \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), \left(\frac{-1}{\sqrt{6}}, \frac{-1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}} \right), \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \right\}$$

La matriu ortonormal de vectors propis és doncs:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

Finalment, recordau que podeu provar que $(VP)_{ort}^t \cdot A \cdot (VP)_{ort}$ per veure que no us heu equivocat.