

APUNTS DE L'ASSIGNATURA: MATEMÀTIQUES I. ÀLGEBRA LINEAL

Margalida Mas i Joan Torrens

Capítol 5

Diagonalització d'endomorfismes

En aquest apartat considerarem un \mathbb{K} -espai vectorial E de dimensió n ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o \mathbb{C}) i $f \in \text{End}(E)$ (és a dir $f : E \rightarrow E$ lineal).

Hem vist anteriorment que tota $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ defineix un endomorfisme

$$\begin{aligned} f : \mathbb{K}^n &\rightarrow \mathbb{K}^n \\ X &\mapsto AX \end{aligned}$$

la matriu associada del qual respecte de la base canònica és A . Per tant, tot el que segueix referit a un endomorfisme $f \in \text{End}(E)$, serà vàlid per a una matriu $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Definició 1. *Segui $f \in \text{End}(E)$, direm que $\lambda \in \mathbb{K}$ és un valor propi de f si existeix algún $x \in E$, $x \neq 0$ tal que $f(x) = \lambda x$. En aquest cas direm que x és un vector propi associat al valor propi λ .*

Si consideram l'endomorfisme identitat

$$\begin{aligned} I : E &\rightarrow E, \\ x &\mapsto x \end{aligned}$$

tenim que tot $x \in E$ amb $x \neq 0$ és un vector propi de I de valor propi associat 1. Per altra banda, notem que escriure $f(x) = \lambda x$ és el mateix que escriure $f(x) = \lambda I(x)$ o també $(f - \lambda I)(x) = 0$. Així,

$$\lambda \in \mathbb{K} \text{ és valor propi de } f \iff \text{Ker}(f - \lambda I) \neq \{0\}$$

i $x \in E$ amb $x \neq 0$ és un vector propi associat a λ si i només si $x \in \text{Ker}(f - \lambda I)$.

Al subespai vectorial $\text{Ker}(f - \lambda I)$ l'anomenam subespai propi associat al valor propi λ i el denotam per $E(\lambda)$.

Proposició 2. *(Càlcul dels valors propis)*

Donat $\lambda \in \mathbb{K}$, es verifica

$$\lambda \in \mathbb{K} \text{ és valor propi de } f \iff \det(f - \lambda I) = 0.$$

Demostració: L'aplicació $f - \lambda I : E \rightarrow E$ és lineal i pel Teorema del rang tenim

$$\dim E = \dim \text{Ker}(f - \lambda I) + \text{rang}(A - \lambda I_n)$$

on A és la matriu associada a f respecte d'una base fixada. Llavors tenim la següent cadena d'equivalències:

$$\begin{aligned} \lambda \in \mathbb{K} \text{ és valor propi de } f &\iff \text{Ker}(f - \lambda I) \neq \{0\} \iff \\ \iff \dim \text{Ker}(f - \lambda I) > 0 &\iff \text{rang}(A - \lambda I_n) < n \iff \det(f - \lambda I) = 0. \end{aligned}$$

□

Així, calcular els vectors propis associats a un valor propi $\lambda \in \mathbb{K}$, és trobar el subespai $E(\lambda) = \text{Ker}(f - \lambda I)$, que és el mateix que resoldre el sistema homogeni $(f - \lambda I)(x) = 0$ o equivalentment $(A - \lambda I_n)X = 0$.

Exemple 3. Donat $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definit per

$$f(x, y, z) = (-4x + 8y - 12z, 6x - 6y + 12z, 6x - 8y + 14z),$$

volem calcular els valors propis de f i els vectors propis associats.

Calculam primer els valors propis fent $\det(f - \lambda I) = |A - \lambda I_3| = 0$ on

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 8 & -12 \\ 6 & -6 & 12 \\ 6 & -8 & 14 \end{pmatrix}$$

és la matriu associada a f respecte de la base canònica. Tenim

$$|A - \lambda I_3| = \begin{vmatrix} -4 - \lambda & 8 & -12 \\ 6 & -6 - \lambda & 12 \\ 6 & -8 & 14 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

Si calculam aquest determinant obtenim $-(2 - \lambda)^2 \lambda = 0$ amb dues úniques solucions $\lambda_1 = 2$ i $\lambda_2 = 0$.

Per tant, els dos únics valors propis de f són $\lambda_1 = 2$ i $\lambda_2 = 0$.

Calculem ara els vectors propis associats a cada un d'aquests valors propis. Per calcular $E(\lambda_1) = E(2)$ hem de resoldre el sistema $(A - 2I_3)X = 0$ o equivalentment

$$\begin{cases} -6x + 8y - 12z = 0 \\ 6x - 8y + 12z = 0 \\ 6x - 8y + 12z = 0 \end{cases}$$

Aquest sistema és compatible indeterminat amb solucions:

$$-6x + 8y - 12z = 0 \implies x = \frac{4}{3}y - 2z$$

i per tant, si feim $y = 1, z = 0$ i $y = 0, z = 1$, obtenim que $E(2) = \langle (4, 3, 0), (-2, 0, 1) \rangle$.

Calculem ara $E(\lambda_2) = E(0)$. Hem de resoldre el sistema

$$\begin{cases} -4x + 8y - 12z = 0 \\ 6x - 6y + 12z = 0 \\ 6x - 8y + 14z = 0 \end{cases}$$

Si aplicam el mètode de Gauss podem reduir la matriu com segueix

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -4 & 8 & -12 & 0 \\ 6 & -6 & 12 & 0 \\ 6 & -8 & 14 & 0 \end{array} \right) \sim \dots \quad (\text{Gauss}) \quad \dots \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

d'on el sistema és compatible indeterminat amb solucions

$$\begin{cases} x - 2y = -3z \\ y = z \end{cases}$$

i, si feim $z = 1$ obtenim que $E(0) = \langle (-1, 1, 1) \rangle$.

Definició 4. (Polinomi característic)

Donada $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ es defineix polinomi característic de la matriu A el polinomi

$$p_A(x) = |A - xI_n|.$$

Si $f \in \text{End}(V)$ i A és la matriu associada a f respecte d'una base qualsevol, es defineix el polinomi característic de f com el polinomi $p_f(x) = p_A(x)$.

Notem que si $x = 0$, $p_A(0) = |A|$.

Teorema 5. (Teorema de Cayley-Hamilton)

Tota matriu $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ verifica l'equació característica $p_A(x) = 0$, és a dir, $p_A(A) = 0$.

Aquest resultat ens permet expressar la inversa d'una matriu A mitjançant una expressió polinòmica amb A .

Exemple 6. Donada la matriu

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & a \end{pmatrix}, \quad a \in \mathbb{R}$$

volem calcular el seu polinomi característic.

$$p_A(x) = |A - xI_n| = \begin{vmatrix} -x & 0 & 1 \\ 1 & -x & -1 \\ -1 & 1 & a-x \end{vmatrix} = -x^3 + ax^2 - 2x + 1$$

Aleshores, segons el Teorema de Cayley-Hamilton, tenim que

$$p_A(A) = -A^3 + aA^2 - 2A + I = 0.$$

Per una altra banda, com que $|A| = p_A(0) = 1 \neq 0$, la matriu A és invertible i, si aïllem I de l'equació anterior, obtenim $I = A^3 - aA^2 + 2A$. Si ara multiplicam per A^{-1} ambdós membres de la igualtat tenim l'expressió de A^{-1}

$$A^{-1} = (A^3 - aA^2 + 2A)A^{-1} = A^2 - aA + 2I.$$

Definició 7. Direm que un endomorfisme $f \in \text{End}(E)$ és diagonalitzable si existeix una base de E formada per vectors propis de f . Diagonalitzar f és trobar una tal base. En tal cas, si $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ és una base de vectors propis associats als valors propis $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ (no necessàriament diferents), la matriu associada a f respecte d'aquesta base és la matriu diagonal

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

ja que $f(v_i) = \lambda_i v_i$, per a tot $i = 1, 2, \dots, n$.

Notem que si A és la matriu de f respecte d'una altra base $\{e_1, \dots, e_n\}$, podem escriure

$$D = P^{-1}AP$$

on P és la matriu del canvi de base de $\{e_i\}$ a $\{v_i\}$.

Aquest fet ens resultarà molt útil per calcular potències successives de'una matriu A , ja que de la igualtat anterior tenim que $A = PDP^{-1}$ i aleshores

$$A^2 = (PDP^{-1})(PDP^{-1}) = PD^2P^{-1}$$

i successivament

$$A^k = A^{k-1}A = (PD^{k-1}P^{-1})(PDP^{-1}) = PD^kP^{-1}.$$

Anem a veure sota quines condicions un endomorfisme f (una matriu) és diagonalitzable.

Proposició 8. Siguin $f \in \text{End}(f)$ i e_1, e_2, \dots, e_r vectors propis de f amb valors propis associats $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ respectivament. Aleshores, si $\lambda_i \neq \lambda_j$ per a tot $i \neq j$, els vectors e_1, e_2, \dots, e_r són L.I.

Demostració: La farem per inducció sobre r .

Si $r = 1$, e_1 és un vector propi, d'on $e_1 \neq 0$ i per tant és L.I.

Suposem provat que e_1, \dots, e_{r-1} són L.I.. Provem-ho per a r . Considerem una combinació lineal

$$\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_{r-1} e_{r-1} + \alpha_r e_r = 0 \quad (5.1)$$

Si aplicam f a (5.1) tenim

$$f(\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_{r-1} e_{r-1} + \alpha_r e_r) = f(0) = 0$$

o equivalentment

$$\alpha_1 \lambda_1 e_1 + \dots + \alpha_{r-1} \lambda_{r-1} e_{r-1} + \alpha_r \lambda_r e_r = 0. \quad (5.2)$$

Si multiplicam ara (5.1) per λ_r obtenim

$$\alpha_1 \lambda_r e_1 + \dots + \alpha_{r-1} \lambda_r e_{r-1} + \alpha_r \lambda_r e_r = 0. \quad (5.3)$$

Si restam (5.2)-(5.3) obtenim

$$\alpha_1 (\lambda_1 - \lambda_r) e_1 + \dots + \alpha_{r-1} (\lambda_{r-1} - \lambda_r) e_{r-1} = 0$$

i com que, per hipòtesi, e_1, \dots, e_{r-1} són L.I. tenim que

$$\begin{aligned} \alpha_1 (\lambda_1 - \lambda_r) &= 0 \\ &\vdots \\ \alpha_{r-1} (\lambda_{r-1} - \lambda_r) &= 0. \end{aligned}$$

Com que $\lambda_i \neq \lambda_j$ per a tot $i \neq j$, obtenim que $\alpha_1 = \dots = \alpha_{r-1} = 0$. Finalment, si substituïm aquests valors a (5.1) ens queda $\alpha_r e_r = 0$ d'on $\alpha_r = 0$ perquè $e_r \neq 0$. La qual cosa prova que e_1, \dots, e_r són L.I. \square

Corol·lari 9. *El nombre de valors propis diferents d'un endomorfisme f és com a màxim n . Si hi ha exactament n valors propis diferents, aleshores f és diagonalitzable.*

Teorema 10. *(Teorema de diagonalització)*

Sigui $f \in \text{End}(E)$ ($A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$), aleshores f (A) és diagonalitzable si i només si el seu polinomi característic $p_f(x)$ ($p_A(x)$) descompon totalment en factors lineals i la multiplicitat de cada un dels seus zeros coincideix amb la dimensió del subespai propi associat corresponent. Dit d'una altra manera, el polinomi característic ha de ser de la forma

$$p_f(x) = (x - \lambda_1)^{n_1} (x - \lambda_2)^{n_2} \dots (x - \lambda_r)^{n_r} \quad (5.4)$$

amb $n_1 + n_2 + \dots + n_r = n$ i, per a cada $i = 1, \dots, r$, ha de ser $n_i = \dim E(\lambda_i)$.

Observació 11. *i) Notem que, pel Teorema del rang, tenim de forma equivalent que $f(A)$ és diagonalitzable si i només si $p_f(x)$ és de la forma (5.4) i per a tot $i = 1, \dots, r$, se satisfà $\text{rang}(A - \lambda_i I_n) = n - n_i$.*

ii) Per una altra part, quan un endomorfisme f de E és diagonalitzable, amb valors propis $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ i subespais propis $E(\lambda_1), \dots, E(\lambda_r)$, llavors es veu fàcilment que E admet la descomposició

$$E = E(\lambda_1) \oplus E(\lambda_2) \oplus \dots \oplus E(\lambda_r).$$

Exemple 12. *Estudiarem la diagonalització de la matriu*

$$A = \begin{pmatrix} a+2 & 1 & 1 \\ 1 & a+2 & 1 \\ 1 & 1 & a+2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$$

segons els valors de $a \in \mathbb{R}$.

Hem de resoldre $|A - \lambda I| = 0$.

$$\begin{aligned} |A - \lambda I| &= \begin{vmatrix} a+2-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & a+2-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & a+2-\lambda \end{vmatrix} = \\ & \begin{vmatrix} a+2-\lambda+2 & 1 & 1 \\ a+2-\lambda+2 & a+2-\lambda & 1 \\ a+2-\lambda+2 & 1 & a+2-\lambda \end{vmatrix} = (a+4-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a+2-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & a+2-\lambda \end{vmatrix} = \\ & (a+4-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a+1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & a+1-\lambda \end{vmatrix} = (a+4-\lambda)(a+1-\lambda)^2 = 0 \end{aligned}$$

Otenim $\lambda_1 = a+4$ de multiplicitat 1 i $\lambda_2 = a+1$ de multiplicitat 2 i aleshores

$$A \text{ serà diagonalitzable} \iff \text{rang}(A - \lambda_1 I) = 2 \text{ i } \text{rang}(A - \lambda_2 I) = 1$$

Si aplicam el mètode de Gauss per calcular el rang d'aquestes matrius tenim que

$$\begin{aligned} A - \lambda_1 I &= \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \\ & \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 3 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

d'on $\text{rang}(A - \lambda_1 I) = 2$. Si feim el mateix amb la matriu

$$A - \lambda_2 I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

obtenim que $\text{rang}(A - \lambda_2 I) = 1$ per a tot $a \in \mathbb{R}$.

Per tant A és diagonalitzable per a qualsevol valor de $a \in \mathbb{R}$.

Observació 13. Notem que la matriu anterior és simètrica ($A = A^t$). Si una matriu és simètrica és diagonalitzable.