

1.10. Seja  $X_1, X_2, \dots, X_n$  uma amostra aleatória da distribuição da variável aleatória  $X$

$$f(x|\theta) = e^{-(x-\theta)} I_A(x), \quad A = (\theta, \infty), \theta > 0.$$

- i. Especifique o espaço paramétrico e o suporte associado à distribuição de  $X$ .
- ii. Verifique se

$$\hat{\theta}_1 = \bar{X} \quad \text{e} \quad \hat{\theta}_2 = Y_1 = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

são estimadores não viciados para  $\theta$ .

**Solução:** Vamos calcular a esperança de  $X$ .

$$E(X) = \int_{\theta}^{\infty} x e^{-(x-\theta)} dx$$

Fazendo a mudança de variável

$$y = x - \theta \quad \text{temos} \quad dy = dx \quad \text{e} \quad x = y + \theta.$$

$$E(X) = \int_0^{\infty} (y + \theta) e^{-y} dy = \theta \int_0^{\infty} y e^{-y} dy + \int_0^{\infty} e^{-y} dy$$

$$E(X) = \theta \Gamma(2) + \Gamma(1) = \theta 1! + 0! = \theta + 1.$$

Por outro lado temos:

$$E(X^2) = \int_{\theta}^{\infty} x^2 e^{-(x-\theta)} dx$$

Fazendo a mesma mudança de variável temos:

$$E(X^2) = \int_0^{\infty} (y + \theta)^2 e^{-y} dy = \int_0^{\infty} y^2 e^{-y} dy + 2\theta \int_0^{\infty} y e^{-y} dy + \theta^2 \int_0^{\infty} e^{-y} dy$$

$$E(X^2) = \Gamma(3) + 2\theta \Gamma(2) + \theta^2 \Gamma(1) = 2! + 2\theta 1! + \theta^2 0!.$$

$$E(X^2) = 2 + 2\theta + \theta^2 = 1 + 1 + 2\theta + \theta^2 = 1 + (\theta + 1)^2.$$

A variância de  $X$  é dada por:

$$\sigma^2 = V(X) = E(X^2) - E^2(X) = 1 + (\theta + 1)^2 - (\theta + 1)^2 = 1.$$

Vamos responder ao item i:

O espaço paramétrico é dado por:

$$\Theta = (0, \infty).$$

O suporte é dado por:

$$A = (\theta, \infty).$$

O suporte depende do parâmetro  $\theta$ .

Vamos responder ao item **ii**:

Sabemos que

$$E(\bar{X}) = \mu = \theta + 1 \neq \theta,$$

que é um estimador viciado de  $\theta$ . Percebamos que

$T = \bar{X} - 1$  é um estimador não viciado para  $\theta$ .

Vamos achar a f.d.p. de  $Y_1 = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ .

A acumulada de  $Y_1$  é dada por:

$$G_{Y_1}(y) = P(Y_1 \leq y) = 1 - P(Y_1 > y)$$

$$G_{Y_1}(y) = 1 - P(\min(X_1, X_2, \dots, X_n) > y)$$

$$G_{Y_1}(y) = 1 - P(X_1 > y, X_2 > y, \dots, X_n > y)$$

Como as variáveis são independentes temos:

$$G_{Y_1}(y) = 1 - P(X_1 > y)P(X_2 > y) \dots P(X_n > y)$$

Como são identicamente distribuídas temos:

$$G_{Y_1}(y) = 1 - [P(X > y)]^n = 1 - S(y)^n = 1 - [1 - F(y)]^n$$

A f.d.p. de  $Y_1 = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$  é dada por:

$$g_{Y_1}(y) = n [1 - F(y)]^{n-1} f(y).$$

Note que:

Para  $y > \theta$  temos:

$$P(X > y) = \int_y^\infty e^{-(x-\theta)} dx = e^{-(y-\theta)}.$$

Assim

$$g_{Y_1}(y) = n [e^{-(y-\theta)}]^{n-1} e^{-(y-\theta)}.$$

$$g_{Y_1}(y) = n e^{-n(y-\theta)} I_A(y).$$

A esperança de  $Y_1$  é dada por:

$$E(Y_1) = \int_\theta^\infty n y e^{-n(y-\theta)} dy$$

$$E(Y_1) = \int_{\theta}^{\infty} y e^{-n(y-\theta)} n dy$$

Fazendo a mudança de variável

$$u = n(y - \theta) \quad \text{temos} \quad du = n dy \quad e \quad y = \frac{u}{n} + \theta.$$

$$E(Y_1) = \int_0^{\infty} \left(\frac{u}{n} + \theta\right) e^{-u} du = \frac{1}{n} \int_0^{\infty} u e^{-u} du + \theta \int_0^{\infty} e^{-u} du$$

$$E(Y_1) = \frac{1}{n} \Gamma(2) + \theta \Gamma(1) = \theta + \frac{1}{n} \neq \theta.$$

$Y_1$  é um estimador viciado de  $\theta$ .

Assim

$$T_2 = Y_1 - \frac{1}{n}$$

é um estimador não viciado de  $\theta$ .

Vamos responder ao item **iii**:

Sabemos que

$$Var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{1}{n}.$$

O viés de  $\hat{\theta}_1 = \bar{X}$  é dado por:

$$B(\bar{X}) = E(\bar{X}) - \theta = \theta + 1 - \theta = 1.$$

O eqm de  $\bar{X}$  é:

$$EQM(\bar{X}) = Var(\bar{X}) + B^2(\bar{X}) = \frac{1}{n} + 1.$$

Vamos calcular  $E(Y_1^2)$ .

$$E(Y_1^2) = \int_{\theta}^{\infty} n y^2 e^{-n(y-\theta)} dy$$

$$E(Y_1^2) = \int_{\theta}^{\infty} y^2 e^{-n(y-\theta)} n dy$$

Fazendo a mudança de variável

$$u = n(y - \theta) \quad \text{temos} \quad du = n dy \quad e \quad y = \frac{u}{n} + \theta.$$

$$E(Y_1^2) = \int_0^{\infty} \left(\frac{u}{n} + \theta\right)^2 e^{-u} du = \frac{1}{n^2} \int_0^{\infty} u^2 e^{-u} du + \theta \frac{2}{n} \int_0^{\infty} u e^{-u} du + \theta^2 \int_0^{\infty} e^{-u} du$$

$$E(Y_1^2) = \frac{1}{n^2} \Gamma(3) + \frac{2\theta}{n} \Gamma(2) + \theta^2 \Gamma(1) = \frac{2}{n^2} + \frac{2\theta}{n} + \theta^2.$$

A variância de  $Y_1$  é dada por:

$$Var(Y_1) = \frac{2}{n^2} + \frac{2\theta}{n} + \theta^2 - \left(\theta + \frac{1}{n}\right)^2 = \frac{1}{n^2}$$

O viés de  $Y_1$  é dado por:

$$B(Y_1) = E(Y_1) - \theta = \theta + \frac{1}{n} - \theta = \frac{1}{n}.$$

O erro quadrático médio de  $Y_1$  é dado por:

$$EQMY_1 = \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^2} = \frac{2}{n^2}.$$

Vamos estudar

$$EQM(\bar{X}) - EQMY_1 = \frac{1}{n} + 1 - \frac{2}{n^2} = \frac{n^2 + n - 2}{n^2}$$

$$EQM(\bar{X}) - EQMY_1 = \frac{(n-1)(n+2)}{n^2}.$$

Note que para  $n = 1$

$$EQM(\bar{X}) = EQMY_1.$$

Note que para  $n \geq 2$

$$EQM(\bar{X}) > EQMY_1,$$

pois o numerador é positivo.

$Y_1$  é melhor estimador seguindo o critério seguido.