

# Appunti

Andreas Araya Osorio

3 June 2021

## 1 Funzioni

### 1.1 Introduzione

#### Definizione 1:

*Una funzione  $f$  è una relazione tra gli elementi di due insiemi  $A$  e  $B$  che ad ogni elemento di  $A$  associa **uno ed un solo** elemento di  $B$ .*

Una funzione è definita assegnando:

- un insieme  $A$  detto DOMINIO
- un insieme  $B$  detto CODOMINIO
- una relazione  $f : A \rightarrow B$  che associa ogni elemento di  $A$  uno ed un solo elemento di  $B$

### 1.2 Tipi di funzioni

Una funzione  $f(x)$  può essere di 3 tipi:

1. **suriettiva**
2. **iniettiva**
3. **biiettiva** se è sia **iniettiva** e **suriettiva**

#### Definizione 2:

*Una funzione si dice **iniettiva** quando ad elementi **distinti** del DOMINIO corrispondono elementi **distinti** del CODOMINIO*

$$f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2 \quad (1)$$




Figure 1: grafico iniettiva

**Definizione 3:**

Una funzione si dice **suriettiva** quando **ogni** elemento del codominio è immagine di **almeno** un elemento del dominio.

$$b \in B \rightarrow \exists a \in A : f(a) = b \quad (2)$$




Figure 2: graifco suriettiva

ESERCIZIO 1.

Dimostra di che tipo è questa funzione:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = x^2 \quad (3)$$

DIMOSTRAZIONE 1.

Non può essere iniettiva perchè per ogni numero reale positivo ne esiste uno uguale negativo, il cui quadrato sarà il **medesimo**.

$$se \quad x_1 = -x_2 \quad \Rightarrow \quad f(x_1) = f(x_2) \quad (4)$$

si può provare inoltre che non è una funzione suriettiva in quanto **nessun** numero negativo fa parte del codominio ed esso è formato da  $\mathbb{R}$  dunque

$$-4 \neq f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (5)$$

ESERCIZIO 2.

Dimostra di che tipo è questa funzione:

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad f(x) = x^2 \quad (6)$$

DIMOSTRAZIONE 2.

se cambiamo il dominio e il codominio nell'insieme dei numeri naturali e consideriamo la stessa legge possiamo dedurre che:

$$\forall n, m : n \neq m \Rightarrow n^2 \neq m^2 \quad (7)$$

Per **qualsiasi** coppia di numeri naturali diversi fra loro non è possibile pensare che il loro quadrato sia uguale, per tanto la funzione è iniettiva.

Inoltre **qualsiasi** numero dispari non avrà una propria immagine, in quanto l'insieme racchiude **solo** numeri interi positivi. Ovvero:

$$\exists \frac{x}{2} \in \mathbb{N} : \{y = x + 1\} \Rightarrow y \neq n^2 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (8)$$

### 1.3 Funzioni invertibili

**Definizione 4:**

Una funzione  $f : A \rightarrow B$  si dice invertibile se esiste una funzione  $g : B \rightarrow A$  chiamata funzione inversa tale che:

- $\forall a \in A, \quad g(f(a)) = a$
- $\forall b \in B, \quad f(g(b)) = b$

Essa si può considerare invertibile se è **biiettiva**.

ESERCIZIO 3.

Dimostra se la funzione  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = 2x + 1$  è inversibile.

DIMOSTRAZIONE 3.

Ponendo l'equazione  $y = 2x + 1$  deduciamo che

$$f^{(-1)}(x) = \frac{x - 1}{2} \quad (9)$$

quindi:

$$f^{(-1)}(f(x)) = f^{(-1)}(2x + 1) = \frac{(2x + 1) - 1}{2} = x; \quad (10)$$

e allo stesso tempo

$$f(f^{(-1)}(y)) = f\left(\frac{y - 1}{2}\right) + 1 = y \quad (11)$$

## 1.4 Piano Cartesiano

Fissando un'origine e un'unità di misura ad **ogni** punto di una retta orientata corrisponde uno ed un solo numero reale. Si stabilisce così una **corrispondenza biunivoca** tra i punti della retta orientata e i numeri reali.

Data la funzione

$$f : A \rightarrow B \quad A, B \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2 \quad (12)$$



Figure 3: la retta orientata

### Definizione 5:

Definiamo una **coppia** di rette orientate disposte **perpendicolarmente** fra loro **assi coordinati**.

- La retta da destra verso sinistra viene chiamata **asse delle ascisse**
- la retta dal basso verso l'alto viene chiamata **asse delle ordinate**

Il punto del piano in cui si incontrano viene chiamato **origine degli assi** e viene indicato con  $O$

Un qualsiasi punto del piano  $P$  viene identificato con una ascissa  $x_p$  ed una ordinata  $y_p$ , quindi  $P(x_p, y_p)$ .

Il piano viene diviso in IV quadranti numerati in senso antiorario.




Figure 4: il piano cartesiano

## 1.5 Grafici di funzioni

Ora possiamo rappresentare graficamente coppie ordinate di numeri reali sul piano, quindi possiamo rappresentare il **grafico** di una funzione

$$f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow B \subseteq \mathbb{R} \quad (13)$$

e tutte le coppie  $(x, f(x))$  tali che  $x \in A$ :

$$G(f) = \{(x, f(x))\} : x \in A \quad (14)$$




Figure 5: il grafico di una funzione crescente

## 1.6 Funzioni Pari e Dispari

**Definizione 6:**

Una funzione  $f : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$  si dice **pari** se  $f(x) = f(-x)$




Figure 6: Una funzione pari

Si deduce quindi che il grafico di una funzione così definita è simmetrico rispetto all'**asse delle ordinate**

**Definizione 7:**

Una funzione  $f : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$  si dice **dispari** se  $f(-x) = -f(x)$   
 Si deduce quindi che il grafico di una funzione così definita viene **specchiata** in due quadranti uno **opposto** all'altro




Figure 7: Una funzione dispari

## 1.7 Funzioni crescenti e decrescenti

**Definizione 8:**

Una funzione  $f : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$  si dice **crescente** se

$$f(x_2) \geq f(x_1) \quad \forall x_2 > x_1 \in [a, b] \quad (15)$$

Si dice **strettamente crescente** se

$$f(x_2) \geq f(x_1) \quad \forall x_2 > x_1 \in [a, b] \quad (16)$$




Figure 8: il grafico di una funzione crescente

**Definizione 9:**

Una funzione  $f : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$  si dice **decreciente** se

$$f(x_2) \leq f(x_1) \quad \forall x_2 > x_1 \in [a, b] \quad (17)$$

Si dice **strettamente decrescente** se

$$f(x_2) < f(x_1) \quad \forall x_2 > x_1 \in [a, b] \quad (18)$$




Figure 9: il grafico di una funzione decrescente

## 1.8 Funzioni inverse

Se i punti di una funzione  $f : A \rightarrow B$   $A, B \subseteq \mathbb{R}$  si ottengono dalle coppie  $(a, b) \in A \times B$

### Definizione 10:

*Il grafico di una funzione inversa si ottiene invertendo le coordinate dei punti del grafico. Ovvero i punti del grafico della **funzione inversa** si ottengono dalle coppie  $(b, a) \in B \times A$  // Per via grafica esso può essere ottenuto **riflettendo** il grafico rispetto alla **bisettrice del primo e terzo quadrante***




Figure 10: Il grafico di una funzione inversa

## 1.9 Modellizzazione matematica

### Definizione 11:

*Per **modellizzazione matematica** si intende un porcesso che ha per scopo quello di **interpretare** fenomeni legati al mondo reale partendo da dati sperimentali e **traducendoli** in **problemi matematici***

Per passare da un fenomeno reale alla sua descrizione mediante modello matematico è necessario un processo di **astrazione** e **traduzione** del fenomeno in termini matematici e rigorosi.

Quando si vuole modellizzare un certo fenomeno, si vuole capire **come** le variabili coinvolte siano in relazione tra loro, ovvero stabilire delle **leggi matematiche** che descrivono queste relazioni.

La procedura di modellizzazione è:

1. si identifica l'incognita del problema
2. si analizza il fenomeno fisico e si raccolgono informazioni
3. si individuano le relazioni tra le informazioni raccolte, che poi vengono tradotte in equazioni



4. si risolvono le equazioni ottenute e se ne verifica la validità del modello

In un modello matematico che coinvolge due grandezze  $x$  ed  $y$  ci interessa capire come la **variabile dipendente** ( $y$ ) varia al variare di quella **indipendente**

ESEMPIO 1.

Supponiamo di aver formulato la legge  $y = f(x)$

Se il modello è giusto potremmo ricavare il valore di  $y$  a partire da qualsiasi valore di  $x$  senza effettuare ulteriori esperimenti e misurazioni.

Rappresentandolo graficamente:




Figure 11: Il grafico dell'andamento dei bitcoin

Questo è il grafico di  $y = f(x)$  dove  $y$ ="valore del bitcoin in dollari" e  $x$ ="tempo".

## 1.10 Proporzioni

**Definizione 12:**

Due grandezze  $A$  e  $B$  si dicono **direttamente proporzionali** se esiste un numero  $c$  detto **costante di proporzionalità** tale che:

$$A = cB \quad (19)$$

Questo significa che le due grandezze sono legate da una certa legge, per la quale quando una raddoppia, triplica, dimezza, di conseguenza la seconda raddoppia, triplica, dimezza etc.

ESEMPIO 2.

$A$  = "quantità di chilometri che l'auto può percorrere"

$B$  = "litri di carburante nel serbatoio"

**Definizione 13:**

Due grandezze  $A$  e  $B$  si dicono **inversamente proporzionali** se esiste un numero  $c$  detto **costante di proporzionalità** tale che:

$$AB = c \quad (20)$$

Questo significa che le due grandezze sono tali che all'aumentare di una, l'altra diminuisce proporzionalmente.

ESEMPIO 3.

$A$  = "numero di partecipanti all'acquisto di un immobile"

$B$  = "quota per partecipante"

$c$  = costo dell'immobile

## 2 Combinatoria e probabilità

### 2.1 Introduzione

**Definizione 14:**

L'**analisi combinatoria** è la branca della matematica applicata per risolvere problemi nel quale è necessario saper "contare" efficacemente esiti e probabilità di determinate situazioni.

Essa è infatti la disciplina che ci permette di **contare senza contare**

### 2.2 Combinatoria

**Definizione 15** (Principio di moltiplicazione):

Un insieme  $X$  soddisfa le ipotesi del principio di moltiplicazione se:

- è possibile ottenere ciascuno dei suoi elementi come risultato di una procedura composta da  $n$  fasi successive.
- se ad una fase intermedia si sono ottenuti due esiti distinti allora la procedura conduce ad elementi distinti di  $X$

Nella prima fase avremo  $m_1$  possibili esiti nella seconda fase avremo  $m_2$  esiti sino alla  $n$ -esima fase avremo  $m_n$  esiti

$$|X| = m_1 \times m_2 \times \dots \times m_k \quad (21)$$

ESERCIZIO 4.

Calcoliamo il numero di coppie ordinate  $(a, b)$  contenenti un numero primo ed uno non primo compresi tra 1 ed 8

DIMOSTRAZIONE 4.

I numeri primi tra 1 e 8 sono  $\{2, 3, 5, 7\}$  mentre i numeri non primi tra 1 e 8 sono  $\{1, 4, 6, 8\}$

I. Scegliamo un qualsiasi elemento di  $I_8$ : abbiamo 8 possibilità.

II. Se il primo elemento era primo il secondo non lo sarà, e viceversa se il numero non era primo. In ogni caso avremo 4 distinte possibilità

Il numero di coppie è:  $8 \times 4 = 32$

ESERCIZIO 5.

Consideriamo un'estrazione in successione di 3 numeri della tombola **tenendo conto dell'ordine**. Quanti sono i possibili esiti?

DIMOSTRAZIONE 5.

I numeri della tombola sono 90. Gli scenari possibili sono 2:

Nel primo caso **senza rimpiazzo** se ogni numero può essere scelto una volta sola, mentre sarà **con rimpiazzo** se un numero può essere scelto più di una volta.

Nel primo caso  $(a_1, a_2, a_3) : \rightarrow (a_1 \neq a_2 \neq a_3) :$

I FASE:  $a_1 = 90$

II FASE:  $a_2 = 90 - 1 = 89$

III FASE:  $a_3 = 90 - 2 = 88$

Quindi il numero di possibili esiti è:

$$90 \times 89 \times 88 = 704880 \quad (22)$$

Nel secondo caso  $(a_1, a_2, a_3) : \rightarrow (a_1 = a_2 = a_3) :$

I FASE:  $a_1 = 90$

II FASE:  $a_2 = 90$

III FASE:  $a_3 = 90$

Quindi il numero di possibili esiti è:

$$90 \times 90 \times 90 = 90^3 = 729000 \quad (23)$$

**Definizione 16:**

Definiamo una regola general per  $k$ -sequenze di  $I_n$ . Siano  $k, n \in \mathbb{N}$  definiamo  $k$ -sequenza di  $I_n$  una  $k$ -upla **ordinata**  $(a_1, \dots, a_k)$  di elementi **non necessariamente distinti** di  $I_n$ . Ovvero:

$$(a_1, \dots, a_k) \in \underbrace{I_n \times \dots \times I_n}_{k \text{ volte}} \quad (24)$$

Nella definizione di sequenze l'ordine degli elementi della  $k$ -upla è importante: le 3-sequenze  $(2, 1, 3)$  e  $(3, 1, 2)$  sono diverse anche se composte dagli stessi numeri. Vengono comunemente dette **disposizioni** di  $n$  oggetti a  $k$  a  $k$

ESEMPIO 4.

Sia  $I_4 = \{1, 2, 3, 4\}$ . Allora

$$(1, 2, 3, 3, 4), \quad (1, 1, 1, 1, 1), \quad (2, 2, 1, 3, 4) \quad (25)$$

sono 5-sequenze di  $I_4$ . Invece

$$(1, 2, 3), \quad (1, 1, 1), \quad (2, 3, 4) \quad (26)$$

sono 3-sequenze di  $I_4$

**2.3 Fattoriale**

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \quad (27)$$

$$n! = \begin{cases} n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1 & \text{se } n \geq 1 \\ 1 & \text{se } n = 0 \end{cases} \quad (28)$$

**Definizione 17:**

Il **fattoriale** di un numero equivale al prodotto di quel numero per tutti i numeri che lo precedono. I valori dei fattoriale crescono esponenzialmente

$$0! = 1 \quad 5! = 120 \quad 6! = 720 \quad 7! = 5040 \quad 10! = 3628800 \quad (29)$$

ciao nana