

# Appunti

Andreas Araya Osorio

3 June 2021

## Contents

# 1 Insiemi

## 1.1 Introduzione

### Definizione 1:

*Un insieme è una "collezione" di oggetti.*

Sia  $A$  un INSIEME, la scrittura  $x \in A$  significa che  $x$  appartiene ad  $A$ .

Analogamente, scrivendo  $x \notin A$  si intende che  $x$  non appartiene ad  $A$ .

Gli insiemi **finiti** si possono denotare all'interno di parentesi graffe " $\{, \}$ "

Un qualsiasi insieme può definirsi mediante una **proprietà astratta**

ESEMPIO 1.

$$A = \{ x \in \mathbb{N} \mid x \text{ pari} \} \quad (1)$$

Questo insieme raccoglie **tutti i numeri naturali pari** e si può meglio riscrivere così:

$$A = \{ x \in \mathbb{N} \mid \exists y \in \mathbb{N} : x = 2y \} \quad (2)$$

## 1.2 Insiemi ed operazioni

Sia  $X$  un insieme e siano  $A, B \subseteq X$

- **UNIONE**  $A \cup B$ , L'unione di  $A$  e  $B$  come l'insieme

$$A \cup B = \{ x \in X : x \in A \text{ o } x \in B \} \quad (3)$$

- **INTERSEZIONE**  $A \cap B$ , L'intersezione di  $A$  e  $B$  come l'insieme

$$A \cap B = \{ x \in X : x \in A \text{ e } x \in B \} \quad (4)$$

- **DIFFERENZA**  $A \setminus B$ , che equivale a

$$A \setminus B = \{ x \in X : x \in A \text{ e } x \notin B \} \quad (5)$$

- **COMPLEMENTARE** L'insieme complementare di  $A$  in  $X$  è:

$$A^C = X \setminus A = \{ x \in X : x \notin A \} \quad (6)$$

ESEMPIO 2.

Il complementare dell'unione è l'intersezione dei complementari, mentre il complementare dell'intersezione è l'unione dei complementari.

- $X \setminus (A \cup B) = (X \setminus A) \cap (X \setminus B)$
- $X \setminus (A \cap B) = (X \setminus A) \cup (X \setminus B)$

DIMOSTRAZIONE 1.

Si dice relazione da  $A$  a  $B$  ogni sottoinsieme  $R$  di  $A \times B$ . Se  $(a, b) \in R$ ,  $a$  è in relazione  $R$  con  $b$ , si scrive  $aRb$ .

$$R = \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : \exists p \in \mathbb{N} \mid a = p \cdot b\} \quad (7)$$

### 1.3 Relazioni d'ordine

Sia  $A \neq \emptyset$  un insieme non vuoto e sia  $R \subseteq A \times A$  una relazione di  $A$  con  $A$ .  $R$  è:

1. riflessiva se  $xRx \quad \forall x \in A$ ,
2. simmetrica se  $xRy \rightarrow yRx$ ,
3. transitiva se  $xRy \wedge yRz \rightarrow xRz$ ,
4. antisimmetrica se  $xRy \wedge yRz \rightarrow x = y$ .

Una **relazione d'equivalenza** è tale se è RIFLESSIVA, SIMMETRICA E TRANSITIVA.

**Definizione 2:**

Una relazione d'ordine su un insieme  $X \neq \emptyset$  è detta di ordine totale se  $\forall x, y \in X$  si ha  $x \leq y \vee y \leq x$ . Se su  $X$  c'è una relazione d'ordine totale,  $X$  è totalmente ordinato.

**Definizione 3:**

Sia  $(X, \leq)$ , insieme non vuoto e ordinato e sia  $A \subseteq X$ ,  $A \neq \emptyset$

- $x \in X$  è un **maggiorante** di  $A$  se  $a \leq x \quad \forall a \in A$
- $y \in X$  è un **minorante** di  $A$  se  $y \leq a \quad \forall a \in A$
- $A$  ha **massimo** se  $\exists \lambda \in A \mid a \leq \lambda \quad \forall a \in A \implies \lambda = \max A$
- $A$  ha **minimo** se  $\exists \mu \in A \mid \mu \leq a \quad \forall a \in A \implies \mu = \min A$

**Definizione 4:**

Siano  $(X, \leq)$  un insieme ordinato e  $A \subseteq X$ ,  $A \neq \emptyset$ .  $A$  ha estremo superiore se l'insieme dei maggioranti di  $A$  è non vuoto e ha minimo.  $\sup A$  è il più piccolo dei maggioranti. Analogamente l'estremo inferiore è presente se l'insieme dei minoranti di  $A$  è non vuoto ed esso ne è il più piccolo:  $\inf A$ .

**Definizione 5:****Proprietà di sup e inf:**

Siano  $(X, \leq)$  un insieme ordinato e  $A \subseteq X, A \neq \emptyset$ .

**SUP** Si ha che  $\lambda = \sup A$  se e solo se

1.  $a \leq \lambda \quad \forall a \in A$ ;
2.  $\lambda_1 \in X, a \leq \lambda_1 \quad \forall a \in A \implies \lambda \leq \lambda_1$

**INF** Si ha che  $\mu = \inf A$  se e solo se

1.  $\mu \leq a \quad \forall a \in A$ ;
2.  $\mu_1 \in X, \mu_1 \leq a \quad \forall a \in A \implies \mu_1 \leq \mu$

**Definizione 6:**

Siano  $(X, \leq)$  un insieme ordinato e  $A \subseteq X, A \neq \emptyset$ , allora:

1. se  $A$  ha massimo, allora si ha  $\max A = \sup A$
2. se  $A$  ha minimo, allora si ha  $\min A = \inf A$

**1.4 Numeri reali**

Un **gruppo commutativo** e' un insieme  $X$  dotato di un'operazione binaria  $*$  :  $X \times X \rightarrow X$  tale che:

1. PROPRIETÀ ASSOCIATIVA:  $(x \star y) \star z = x \star (y \star z) \quad \forall x, y, z \in X$
2. ELEMENTO NEUTRO:  $\exists e \in X \rightarrow e \star x = x \star e = e$
3. INVERSO:  $\forall x \in X \quad \exists y \in X \rightarrow x \star y = y \star x = e$
4. PROPRIETÀ COMMUTATIVA;  $\forall x, y \in X \rightarrow x \star y = y \star x$

Se le prime 3 proprietà sono valide allora  $X$  e' un *gruppo*. Se e' valida solo la prima allora si chiama *semigrupp*

**Definizione 7 (Campo dei numeri reali  $\mathbb{R}$ ):**

I 6 assiomi di completezza:

- $A_1) (\mathbb{R}, +) \rightarrow$  gruppo commutativo, neutro = 0
- $A_2) (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot) \rightarrow$  gruppo commutativo, neutro = 1
- $A_3) x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z \quad \forall x, y, z \in \mathbb{R},$  proprietà distributiva

- $A_4) (\mathbb{R}, \leq) \rightarrow \text{totalmente ordinato}$
- $A_5) (\leq) \rightarrow \text{compatibile con } + \wedge \cdot$
- $A_6) (\mathbb{R}, \leq) \rightarrow \text{completo}$

Le proprietà  $A_1, \dots, A_3 \implies (\mathbb{R}, +, \cdot) \rightarrow \text{campo}$

Le proprietà  $A_1, \dots, A_6 \implies (\mathbb{R}, +, \cdot, \leq) \rightarrow \text{campo **ordinato e completo**}.$

**Definizione 8** (Sottoinsiemi induttivi):

Un sottoinsieme  $I \subseteq \mathbb{R}$  si dice **induttivo** se:

1.  $1 \in I$
2.  $x \in I \Rightarrow x + 1 \in I$

$\mathcal{F}$  indica la famiglia degli insiemi induttivi di  $\mathbb{R}$ :

$$\mathbb{N} \stackrel{\text{def.}}{=} \{x \in \mathbb{R} : x \in I \forall I \in \mathcal{F}\} \quad (8)$$

$\mathbb{N}$  è per definizione l'intersezione di tutti gli insiemi induttivi

$$\mathbb{N} = \bigcap_{I \in \mathcal{F}} I \quad (9)$$

DIMOSTRAZIONE 2 (Il principio di induzione).

Se  $M \subseteq \mathbb{N}$  è induttivo  $\iff M = \mathbb{N}$

Dato che  $M$  è induttivo  $\mathbb{N} \subseteq M \iff \mathbb{N} = M$

Questo ragionamento introduce il *principio di induzione*.

**Definizione 9** (Il minimo di  $\mathbb{N}$ ):

$$1 \leq n \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (10)$$

Il  $\min \mathbb{N} = 1$

**Definizione 10** ( $\mathbb{Z}$  l'anello dei numeri interi):

$$\mathbb{Z} \stackrel{\text{def.}}{=} \mathbb{N} \cup \{0\} \cup \{-n : n \in \mathbb{N}\} \quad (11)$$

$\mathbb{Z}$  è chiuso per somma e moltiplicazione

$$n, m \in \mathbb{Z} \Rightarrow n + m, n \cdot m \in \mathbb{Z} \quad (12)$$

Se  $A \subseteq \mathbb{Z}$ ,  $A \neq \emptyset$

- se  $A$  è superiormente limitato, ammette massimo  $\exists \max A$

- se  $A$  è inferiormente limitato ammette minimo  $\exists \min A$

**Definizione 11** ( $\mathbb{Q}$  l'anello dei numeri razionali):

$$\mathbb{Q} \stackrel{\text{def.}}{=} \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \right\} \quad (13)$$

$\mathbb{Q}$  è chiuso per somma e moltiplicazione

$$x, y \in \mathbb{Q} \Rightarrow x + y, x \cdot y \in \mathbb{Q} \quad (14)$$

$\mathbb{Q}$  è un campo totalmente ordinato ossia sono validi gli assiomi  $A_1, \dots, A_5$  escluso l'  $A_6$

## 1.5 Radice n-esima

Sia  $n \in \mathbb{N}$  e sia  $x \in \mathbb{R}, x \geq 0$ .

$y \in \mathbb{R}$  è la radice n-esima di  $x$  se  $y \geq 0, y^n = x$

$$y \stackrel{\text{def.}}{=} x^{\frac{1}{n}}, \sqrt[n]{x} \quad (15)$$

**Definizione 12:**

*Proprietà della radice n-esima: per ogni  $x, y \in \mathbb{R}, x, y \geq 0$ :*

$$P_1 \quad x^n \leq y^n \iff x \leq y$$

$$P_2 \quad x^n = y^n \iff x = y$$

$$P_3 \quad x^n < y \iff \exists \epsilon \in \mathbb{R}, \epsilon > 0, : (x + \epsilon)^n < y$$

$$P_4 \quad x^n > y \iff \exists \epsilon \in \mathbb{R}, \epsilon > 0, : (x - \epsilon)^n > y$$

## 1.6 Funzioni esponenziali in $\mathbb{Q}$

**Definizione 13:**

Sia  $a > 0, \forall x \in \mathbb{Q}$ :

$$a^x := \sqrt[q]{a^p} \Rightarrow x = \frac{p}{q}, \quad p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \quad (16)$$

$$\text{Se } x = \frac{p}{q} = \frac{m}{n} \implies np = mq$$

$$1. \quad a^{x+y} = a^x a^y \quad \forall x, y \in \mathbb{Q}$$

$$2. \quad a^x > 0 \quad \forall x \in \mathbb{Q}$$

$$3. (a^x)^y = a^{xy} \quad \forall x, y \in \mathbb{Q}$$

se  $a > 1$

$$x < y \implies a^x < a^y \quad \forall x, y \in \mathbb{Q}$$

se  $a < 1$

$$x < y \implies a^y < a^x \quad \forall x, y \in \mathbb{Q}$$

In parole povere se la **base è minore di 1**, con un esponente maggiore (y) avremo un numero inferiore rispetto a quello di un esponente minore (x), viceversa quando avremo la **base maggiore di 1**, con esponente maggiore avremo un numero maggiore rispetto ad uno con base minore.

## 2 Successioni

### 2.1 Successioni in $\mathbb{R}$

Sia  $X \neq \emptyset$ , una qualsiasi funzione  $f : \mathbb{N} \rightarrow X$  si dice: **successione in  $X$** .

In notazione si indica  $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  o  $f_1, f_2, \dots, f_n$

$f_n$  si chiama termine n-esimo.

$k_1, k_2, \dots, k_n$  è una successione di numeri naturali:

$$k_1 < k_2 < \dots < k_n < k_{n+1} < \dots \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (17)$$

La successione  $\{f_{k_n}\}$  è una *sottosuccessione* di  $\{f_n\}$ .

Il limite di una successione  $\{a_n\} = l$ . Vale a dire che  $l \in \mathbb{R}$  è un numero vicino ai termini della successione. Esso è più precisamente un **numero reale** tale che *comunque si scelga* un intervallo di numeri intorno ad  $a$ .

$$\begin{array}{c} \Downarrow \\ \underbrace{(a - \epsilon, a + \epsilon)}_{\text{un intervallo attorno a } l}, \epsilon > 0 \mid \exists \underbrace{\bar{n}}_{\text{un indice } n \text{ t.c.}} \quad n > \bar{n}. \end{array} \quad (18)$$

$a_n$  si trova in questo *intorno*

**Definizione 14** (Successione):

Una successione è una legge che ad ogni numero **naturale**  $n$  fa corrispondere **uno ed uno solo** numero reale  $a_n$ .

$$\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} = a_1, a_2, a_3, \dots, a_n \quad (19)$$

Una successione è una funzione che collega degli indici  $n$  a dei numeri reali  $a \in \mathbb{R}$

**Definizione 15:**

Se  $a_n$  tende a  $l \in \mathbb{R}$  per  $n \rightarrow \infty$ , si dice che

$$\begin{aligned}
 & \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \\
 & \Downarrow \\
 & \forall \epsilon > 0, \exists \bar{n} : (n > \bar{n} \Rightarrow |a_n - l| < \epsilon) \\
 & \Downarrow \\
 & |a_n - l| < \epsilon
 \end{aligned} \tag{20}$$

$\{a_n\}$  converge ad  $l$  ed esso è il **limite** di tale **tale successione**

ESEMPIO 3.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \tag{21}$$

Ovvero

$$\forall \epsilon > 0 \exists \bar{n} : \forall n \in \mathbb{N} \left( n > \bar{n} \Rightarrow \left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \epsilon \right) \tag{22}$$

DIMOSTRAZIONE 3 (Il limite se esiste è unico).

$$\lim_{x \rightarrow \infty} a_n = l \quad \wedge \quad \lim_{x \rightarrow \infty} a_n = m \quad \Longleftrightarrow \quad l = m \tag{23}$$

ESEMPIO 4.

Poniamo per assurdo che  $l \neq m$  Fissiamo  $\epsilon > 0$

$$\underbrace{|a_n - l| < \frac{\epsilon}{2}}_{n > \bar{n}_1} \quad \& \quad \underbrace{|a_n - m| < \frac{\epsilon}{2}}_{n > \bar{n}_2} \tag{24}$$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{n > \max\{\bar{n}_1, \bar{n}_2\}}$$

$\Downarrow$

Ricordiamo che  $|a_n - m| = |m - a_n|$

$$|\cancel{a_n} - l - \cancel{a_n} + m| |a_n - l| + |m - a_n| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \tag{25}$$

$\Downarrow$

$$|m - l| < \epsilon \quad \Longrightarrow \quad |m - l| = 0 \tag{26}$$



Ma questo è assurdo perchè:  $\epsilon > 0, \forall \epsilon \in \mathbb{R}$

$$m = l \quad (27)$$

**Definizione 16:**

Se  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$  converge ad  $l \in \mathbb{R}$  **ogni** sua sottosuccessione  $\{a_{k_n}\}_{n \in \mathbb{N}}$  converge ad  $l$

DIMOSTRAZIONE 4 (Limiti).

Se  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  converge  $l \in \mathbb{R} \implies \{a_{k_n}\}_{k_n \in \mathbb{N}}$  converge  $l \in \mathbb{R}$

$\Downarrow$

Si ha che:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \bar{n} \in \mathbb{N} : n > \bar{n} \implies |a_n - l| < \epsilon \quad (28)$$

$$\forall \epsilon > 0 \exists \bar{n} \in \mathbb{N} : n > \bar{n} \implies |a_{k_n} - l| < \epsilon \quad (29)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{k_n} = l \quad (30)$$

ESEMPIO 5.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0 \quad \& \quad k = 2, \lim_{k_n \rightarrow +\infty} \frac{1}{k_n} = 0 \quad (31)$$

ESERCIZIO 1.

DIMOSTRAZIONE 5.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n + b_n) = l + m \quad (32)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l \quad \& \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = m \quad (33)$$

$\Downarrow$

$$|a_n - l| < \frac{\epsilon}{2} \quad \text{se} \quad n > \bar{n}_1 \quad (34)$$

$$|b_n - m| < \frac{\epsilon}{2} \quad \text{se} \quad n > \bar{n}_2 \quad (35)$$

$$n > \max\{\overline{n_1}, \overline{n_2}\}$$

$$|a_n + b_n - l - m| \leq |a_n - l| + |b_n - m| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \quad (36)$$

$\Downarrow$

$$\forall \epsilon > 0, \exists \overline{n} \equiv \max\{\overline{n_1}, \overline{n_2}\} : n > \overline{n} \Rightarrow \underbrace{|(a_n + b_n) - (l + m)|}_0 < \epsilon \quad (37)$$

$$(a_n + b_n) - (l + m) = 0 \quad (38)$$

$$a_n + b_n = l + m \quad (39)$$

DIMOSTRAZIONE 6 (Permanenza del segno).

$$\forall \epsilon > 0, \exists \overline{n} \in \mathbb{N} : n > \overline{n} \Rightarrow \underbrace{|a_n - l|}_{l - \epsilon < a_n < l + \epsilon} < \epsilon \quad (40)$$

$$\epsilon = |l|$$

Da questo otteniamo che

$$\underbrace{l - |l|}_0 < a_n < \underbrace{l + |l|}_{2l} \quad (41)$$

In conclusione avremo che:

se  $l > 0 \Rightarrow a_n > 0$

se  $l < 0 \Rightarrow a_n < 0$

**Definizione 17** (Teorema dei 2 carabinieri):

Se  $\underbrace{\{a_n\}, \{b_n\}}_{\text{convergono a } l}, \{c_n\}$

$$\text{è ovvio che: } a_n \leq c_n \leq b_n \implies c_n \text{ converge a } l \quad (42)$$

DIMOSTRAZIONE 7.

$$\forall \epsilon > 0, \exists \overline{n_1}, \overline{n_2} \in \mathbb{N} : \quad (43)$$

$\Downarrow$

$$l - \epsilon < a_n < l + \epsilon \quad \& \quad l - \epsilon < b_n < l + \epsilon \quad (44)$$

se  $n > \max\{\bar{n}_1, \bar{n}_2\}$

$\Downarrow$

$$l - \epsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < l + \epsilon \quad \forall n > \bar{n} \quad (45)$$

$$\underbrace{l - \epsilon < c_n < l + \epsilon}_{|c_n - l| < \epsilon} \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = l \quad (46)$$

**Definizione 18:**

Sia una successione  $\{a_n\}_n \subseteq \mathbb{R}$  è detta:

- *superiormente limitata*, se  $\exists M \in \mathbb{R} : a_n \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$
- *inferiormente limitata*, se  $\exists M \in \mathbb{R} : a_n \geq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$
- *limitata*, se  $\exists M \in \mathbb{R} : |a_n| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$

**Definizione 19** (Ogni successione convergente è limitata):

Sia  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ ,  $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l$

Allora (con  $\epsilon = 1$ )

$$\exists \bar{n} : \forall n \in \mathbb{N} (n > \bar{n} \implies |a_n - l| < 1) \quad (47)$$

Segue quindi che  $|a_n| \leq |a_n - l| + |l| < 1 + |l|, \quad n > \bar{n}$

$$|a_n| \leq 1 + |l| \quad (48)$$

**Definizione 20** (Retta reale ampliata):

$$\bar{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\} \quad (49)$$

**Definizione 21:**

Sia  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$$

$\Downarrow$

$$\forall k \in \mathbb{R} \exists \bar{n} \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N} (n > \bar{n} \implies a_n > k) \quad (50)$$

La scrittura è analoga per  $-\infty$  invertendo il segno: ( $a_n < k$ )

Potremo dire che  $a_n$  diverge positivamente o negativamente

## 2.2 Forme indeterminate

Se  $\{a_n\}, \{b_n\} \subseteq \mathbb{R}$  e  $\{a_n\} \rightarrow +\infty, \{b_n\} \rightarrow -\infty$  allora:

$$a_n + b_n \rightarrow +\infty - \infty = ? \quad (51)$$

$+\infty$  e  $-\infty$  non sono veri e propri numeri, piuttosto sono dei **simboli**, quindi il risultato sarà detto: FORMA INDETERMINATA  $+\infty - \infty$

Altri tipi di forme indeterminate sono:

$$\frac{\infty}{\infty}, \frac{0}{0}, 0 \cdot \infty, 1^\infty, 0^0, \infty^0 \quad (52)$$

## 2.3 Teoremi generali di esistenza

Una successione  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$  è detta monotona crescente se

$$a_n \leq a_{n+1}, \forall n \in \mathbb{N} \quad (53)$$

Si dice invece monotona decrescente se

$$a_n \geq a_{n+1}, \forall n \in \mathbb{N} \quad (54)$$

Sono rispettivamente **strettamente** monotone crescenti o decrescenti se le disuguaglianze sono **strette** ( $<, >$ )

Le scritture  $a_n \nearrow$  e  $a_n \searrow$  indicano monotonia crescente e decrescente

**Definizione 22** (Successioni costanti):

Se  $a_n = a \forall n \in \mathbb{N}$ , con  $a$  numero reale fissato si dice che

$$\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} = l, l \in \mathbb{R} \quad \{a_n\} \nearrow \searrow = \text{costante} \quad (55)$$

**Definizione 23:**

Ogni successione monotona ammette limite:

Se  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ :

$$1. a_n \nearrow \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} a_n$$

$$2. a_n \searrow \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} a_n$$

DIMOSTRAZIONE 8.

Se  $\{a_n\}$  è superiormente limitata per l'assioma di completezza:

$$\exists \sup_{n \in \mathbb{N}} a_n = \lambda \quad (56)$$

Per la proprietà del sup si ha che  $a_n \leq \lambda, \forall n \in \mathbb{N}$  dunque:

$$a_n < \lambda + \epsilon \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall \epsilon > 0 \quad (57)$$

$$\forall \epsilon > 0, \exists \bar{n} \in \mathbb{N} : \lambda < a_{\bar{n}} + \epsilon \quad (58)$$

La definizione di limite è:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lambda \quad (59)$$

ESERCIZIO 2 (Il numero di nepero  $e$ ).

$$e \equiv \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad (60)$$

Si nota che  $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  e  $b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$  sono successioni **convergenti** che hanno lo stesso limite  $e$ , inoltre sono **strettamente monotone**

$$a_n < a_{n+1} \quad \text{e} \quad b_n > b_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (61)$$

Inoltre

$$a_n < b_n \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (62)$$

allora:

$$a_n < a_p < b_p < b_m \quad \forall n, m, p; p = \max\{n, m\} \quad (63)$$

Entrambe le successioni convergono:  $a_n$  è monotona crescente e superiormente limitata e  $b_n$  è monotona decrescente e inferiormente limitata.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b_n}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1 \quad (64)$$

Questo implica che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = e \quad (65)$$

DIMOSTRAZIONE 9.

$$b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \quad \& \quad b_{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{(n+1)+1} \quad (66)$$

$$\begin{aligned}
\frac{b_n}{b_{n+1}} > 1 &\implies \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{(n+1)+1}} > 1 \quad \forall n \in \mathbb{N} \\
&= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \left(\frac{n+1}{n}\right) > 1 \\
&= \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+2} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^2 = \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^n \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^2 > 1 \\
&= \left(\frac{(n+1)(n+2)}{n(n+1)}\right)^n \cdot \left(\frac{n+2}{n}\right) \cdot \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^2 > 1 \\
&= \left(\frac{n+2}{n}\right)^n \cdot \left(\frac{n+2}{n}\right) \cdot \left(\frac{n+2}{n+1}\right) > 1 \\
&= \underbrace{\left(\frac{n+2}{n}\right)^{n+1}}_{>1} > \underbrace{\left(\frac{n+2}{n+1}\right)}_{<1}
\end{aligned} \tag{67}$$

**Definizione 24** (Bolzano - Weierstrass):

*Ogni successione reale limitata ammette una sottosuccessione convergente.*

DIMOSTRAZIONE 10.

Per ogni  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$  esiste  $M > 0 : |a_n| \leq M, \forall n \in \mathbb{N} \exists k_n \nearrow : a_{k_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l \in \mathbb{R}$

$$-M \leq a_n \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N} \tag{68}$$

$$\alpha_n = \sup a_k : k \geq n, n \in \mathbb{N} \implies -M \leq \alpha_n \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N} \tag{69}$$

Quindi dalla definizione ne segue che:

$$\begin{aligned}
\alpha_{n+1} &\leq \alpha_n \quad \forall n \in \mathbb{N} \implies \alpha_n \searrow \\
&\Downarrow
\end{aligned} \tag{70}$$

$$\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n \equiv l \implies l \equiv \inf_{n \in \mathbb{N}} \alpha_n \tag{71}$$

$$\begin{aligned}
&\forall \epsilon > 0, \forall p \in \mathbb{N} \exists n \geq p : l - \epsilon \leq a_n \\
&\alpha_p \searrow \implies l \leq \alpha_p \implies l - \epsilon < \alpha_p \quad \forall \epsilon > 0 \quad \forall p
\end{aligned} \tag{72}$$

Dato che  $\alpha_p = \sup\{a_n : n \geq p\}$ , deve esistere  $n \geq p : a_n > l - \epsilon$

Sia  $k_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  definita per ricorrenza:

$$\begin{cases} k_1 = \min\{k \in \mathbb{N} : l - 1 < a_k\} \\ k_{n+1} = \min\{k \in \mathbb{N} : k > k_n \wedge l - \frac{1}{n+1} < a_k\} \end{cases} \quad (73)$$

$\Downarrow$

$$k_{n+1} > k_n, \forall n \quad \wedge \quad l - \frac{1}{n} < a_{k_n} \quad \forall n \quad (74)$$

Questo implica che  $\{a_{k_n}\}_{n \in \mathbb{N}}$  verifica le disuguaglianze

$$l - \frac{1}{n} < a_{k_n} \leq \alpha_{k_n} \implies \alpha_{k_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l \implies a_{k_n} \rightarrow l \quad (75)$$

**Definizione 25** (Successioni di Cauchy):

Una successione  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$  si chiama *successione di Cauchy* se:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \bar{n} \in \mathbb{N} : \forall n, m \in \mathbb{N} (n, m > \bar{n} \Rightarrow |a_n - a_m| < \epsilon) \quad (76)$$

Una successione si dice di *Cauchy* se i suoi termini sono "arbitrariamente" vicini tra loro.

**Definizione 26** (Ogni successione convergente è di Cauchy):

$$\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}, a_n \rightarrow l \in \mathbb{R} = \text{di Cauchy} \quad (77)$$

DIMOSTRAZIONE 11.

Se  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l \in \mathbb{R}$  implica che:

$$\forall \epsilon, \epsilon > 0 \exists \bar{n} \forall n \left( n > \bar{n} \Rightarrow |a_n - l| < \frac{\epsilon}{2} \right) \quad (78)$$

La scrittura  $\exists \bar{n}$  significa che esiste un indice dopo il quale ogni indice successivo sarà maggiore di quello.

Di conseguenza:

$$|a_n - a_m| = |(a_n - l) + (l - a_m)| \leq |a_n - l| + |a_m - l| \leq 2 \cdot \frac{\epsilon}{2} \quad n, m > \bar{n} \quad (79)$$

$\{a_n\}$  è di Cauchy

$$\{a_n\} \text{ di Cauchy} \Rightarrow \{a_n\} \nearrow \iff \{a_n\} \nearrow \Rightarrow \{a_n\} \text{ di Cauchy} \quad (80)$$

## 2.4 Rappresentazione decimale di numeri reali

Se  $x \in \mathbb{R}$  è:

$$[x] = \text{parte intera} = \max\{p \in \mathbb{Z} : p < x\} \quad (81)$$

$\Downarrow$

$$[x] \leq x < [x] + 1 \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (82)$$

$\Downarrow$

$$x_n = \frac{[b^n x]}{b^n} \quad (83)$$

Le seguenti affermazioni sono vere:

1.  $\{x_n\} \nearrow$
2.  $x_n \leq x < x_n + \frac{1}{b^n} \quad \forall n \in \mathbb{N}$
3.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$
4.  $\exists \alpha_0 \in \mathbb{Z}, \exists \{\alpha_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{Z}$

**Definizione 27** (Decimali):

*I numeri decimali sono i numeri razionali:*

$$\frac{m}{10^n} \quad (m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}) \quad (84)$$

*Ogni numero decimale si può scrivere come*

$$x = \alpha_0 + \frac{\alpha_1}{10} + \frac{\alpha_2}{10^2} + \cdots + \frac{\alpha_n}{10^n} \quad (85)$$

con  $\alpha_0 \in \mathbb{Z}, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}$

**Definizione 28** (Decimali propri):

*Sia  $x \in \mathbb{R}$ ,  $x = \alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n, \dots$ . La rappresentazione decimale di  $x$  si dice **propria** se:*

$$\nexists p \in \mathbb{N} : \alpha_n = 9 \quad \forall n \geq p \quad (86)$$

Ogni numero reale ammette un'**unica** rappresentazione decimale propria.  
Se  $x \in \mathbb{R} \Rightarrow x = \alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n, \dots$  è la rappresentazione decimale propria di  $x$  **se e solo se**

$$\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n \leq x < \alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n + \frac{1}{10^n} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (87)$$



## 2.5 Cardinalità di insiemi

Due insiemi  $A, B \neq \emptyset$  si dicono **equipotenti** se

$$\exists f : A \xrightarrow[1-1]{su} B \implies A \cong B \quad (88)$$

Vale a dire che esiste una **funzione biunivoca** fra i due insiemi ed essi hanno stessa **cardinalità**

$$card(A) = card(B) \quad (89)$$

$\Downarrow$

$$I_n = \{k \in \mathbb{N} : 1 \leq k \leq n\}, \quad card(A) \cong card(I_n) \implies card(A) = n \quad (90)$$

$A$  è un insieme finito. Un insieme è infinito se non è finito.

- $A$  è finito  $B \subseteq A, B \neq \emptyset \implies B$  è finito
- $A$  è finito e  $B$  è sottoinsieme proprio di  $A \implies A \cong B$
- $A$  è finito, allora il numero dei suoi elementi è unico
- $B$  è infinito e  $B \subseteq A \implies A$  è infinito

Altre proposizioni che ne conseguono sono:

- $A \neq \emptyset \implies A \cong A$
- $A \cong B \iff B \cong A$
- $A \cong B, B \cong C \implies A \cong C$

L'equipotenza è una relazione di **equivalenza**

**Definizione 29** ( $\mathbb{N}$  è infinito):

*Dimostriamo che  $\mathbb{N}$  è equivalente ad un suo sottoinsieme proprio:*

$$P = \{n \in \mathbb{N} := 2m, n \in \mathbb{N}\}, \quad f : P \rightarrow \mathbb{N}, f(n) = \frac{n}{2} \quad (91)$$

$f$  è biunivoca quindi  $P \subset \mathbb{N} \implies P \cong \mathbb{N}$

**Definizione 30** ( $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$  sono infiniti):

*Tutti questi insiemi contengono  $\mathbb{N}$*

**Definizione 31** (Insiemi numerabili):

Un insieme si dice **numerabile** se è **equipotente** ad  $\mathbb{N}$

Un insieme  $A$  è numerabile se si possono *elencare i suoi elementi*:  
ovvero se esiste una successione biiettiva  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  che ha come immagine  $A$ ,  
il nome di tale successione è **numerazione**

**Definizione 32:**

Sia  $A$  un insieme numerabile se  $M \subseteq A$ ,  $M$  è infinito  
 $\implies M \cong \mathbb{N}$

Ogni sottoinsieme infinito di un insieme numerabile è **numerabile**.  
**Ogni** sottoinsieme di  $\mathbb{N}$  è un insieme **infinito o numerabile**.

**Definizione 33** (Assioma della scelta):

Sia  $\mathcal{B}$  una famiglia  $\neq \emptyset$  di insiemi. Sia  $A$  un insieme t.c.

$$B \subseteq A \quad \forall B \in \mathcal{B} \quad (92)$$

$$\Downarrow$$

$$\exists \varphi : \mathcal{B} \rightarrow A : \varphi(B) \in B \quad \forall B \in \mathcal{B} \Rightarrow \mathbf{AC} \quad (93)$$

Ovvero in parole: data una **famiglia** di insiemi  $\mathcal{B}$  non vuoti, esiste una  
funzione che ad ogni insieme della famiglia fa corrispondere un suo elemento.

L'assioma assicura che, quando viene data una collezione di insiemi non  
vuoti si può sempre costruire un nuovo insieme "scegliendo" un **singolo  
elemento** da ciascuno di quelli di partenza.

**Definizione 34:**

Dati due insiemi  $A, B$ :

$$\text{card}(A) \leq \text{card}(B) \quad (94)$$

Se esiste  $B_0 \subseteq B$ , t.c.  $\text{card}(A) = \text{card}(B_0)$ . Se  $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$  e  
 $\text{card}(A) \neq \text{card}(B) \implies \text{card}(A) < \text{card}(B)$

Un insieme si dice finito **se e solo se**:  $\text{card}(A) < \text{card}(\mathbb{N})$

**Definizione 35** (Numeri algebrici):

Un numero reale si dice **algebrico** se risolve un'equazione

$$p(x) = 0, \quad p \in \mathbb{Z} \quad (95)$$

con  $p$  un polinomio con coefficienti in  $\mathbb{Z}$ .

I numeri reali **non** algebrici si dicono **trascendenti**

DIMOSTRAZIONE 12.

I numeri algebrici sono i razionali , infatti essi sono:

$$x = \frac{m}{n} \implies nx - m = 0 \quad (96)$$

$$p(x) = 3x^7 - 5x^2 + 3 \rightarrow h = 7 + 3 + |-5| + 2 + 3 = 20 \quad (97)$$

**Definizione 36** (Gerarchia di infiniti):

*Esiste una gerarchia di **infiniti**, ovvero "certi infiniti valgono di più di altri infiniti"*

$$\mathcal{N}_0 = \text{card}(\mathbb{N}), \mathcal{N}_1 = \text{card}(\mathbb{R}) \implies \mathcal{N}_0 < \mathcal{N}_1 \quad (98)$$

## 2.6 O grande, o piccolo, $\sim$ equivalente

**Definizione 37** (o piccolo):

*Siano  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}, \{b_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$  due successioni reali, si dice che  $a_n$  è un "o piccolo" di  $b_n$  per  $n \rightarrow +\infty$*

$$a_n = o(b_n) \ (n \rightarrow +\infty) \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0 \quad (99)$$

**Definizione 38** (O grande):

*Siano  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}, \{b_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$  due successioni reali, si dice che  $a_n$  è un "O grande" di  $b_n$  per  $n \rightarrow +\infty$*

$$a_n = O(b_n) \ (n \rightarrow +\infty) \iff \exists \bar{n} \in \mathbb{N}, \exists M \in \mathbb{R} : \left( \left| \frac{a_n}{b_n} \right| \leq M \ \forall n > \bar{n} \right) \quad (100)$$

*Occorre notare che se esiste il limite di  $\frac{a_n}{b_n}$*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = l \in \mathbb{R} \quad (101)$$

*Si può sempre scrivere  $a_n = O(b_n)$*

**Definizione 39** ( $\sim$  equivalente):

*Siano  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}, \{b_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$  due successioni reali, si dice che  $a_n$  è un "equivalente" di  $b_n$  per  $n \rightarrow +\infty$*

$$a_n \sim b_n \ (n \rightarrow +\infty) \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1 \quad (102)$$

*Questo vale a dire che le due successioni hanno lo stesso limite.*

Consideriamo anche che, se due successioni sono equivalenti  $a_n \sim b_n$  implica che :

$$a_n \sim b_n \implies a_n = O(b_n) \iff b_n = O(a_n) \quad (103)$$

### 3 Topologia della retta euclidea

#### 3.1 Intervalli

Siano  $a, b \in \mathbb{R}$ , si pone per definizione

$$\begin{aligned} \text{aperto } ]a, b[ &= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\} \\ \text{semiaperto } [a, b[ &= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\} \\ \text{semiaperto } ]a, b] &= \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\} \\ \text{chiuso } [a, b] &= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\} \end{aligned} \quad (104)$$

Se uno degli estremi è  $\pm\infty$ , ( $a = -\infty, b = +\infty$ )

$$\begin{aligned} ]a, +\infty[ &= \{x \in \mathbb{R} : x > a\} \\ ]-\infty, a[ &= \{x \in \mathbb{R} : x < a\} \\ [a, +\infty[ &= \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\} \\ ]-\infty, a] &= \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\} \end{aligned} \quad (105)$$

**Definizione 40:**

Se  $x_0 \in \mathbb{R}, \rho > 0$ , si pone

$$B(x_0, \rho) = ]x_0 - \rho, x_0 + \rho[ \quad (106)$$

si chiama intorno aperto di  $x_0$  di raggio  $\rho \in \mathbb{R}_+$ .

La famiglia degli intorni aperti di  $x_0$  si denota come

$$\mathcal{U}_{x_0} = \{ ]x_0 - \rho, x_0 + \rho[ : \rho > 0 \} \quad (107)$$

#### 3.2 Punti di accumulazione, isolati e aderenti

**Definizione 41** (Punti di accumulazione):

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{R}$ , si dice che  $x_0$  è un **punto di accumulazione** di  $A$  se per ogni  $W$  (intorno)  $\in \mathcal{U}_{x_0}$  (famiglia degli intorni):

$$A \setminus \{x_0\} \cap W \neq \emptyset \quad (108)$$

$\Downarrow$

$$(A \setminus \{x_0\}) \cap ]x_0 - \rho, x_0 + \rho[ \neq \emptyset \quad \forall \rho > 0 \quad (109)$$

In parole, se prendiamo l'insieme  $A$  e ad esso sottriamo un qualsiasi punto  $x_0$  e ad esso intersechiamo l'intervallo formato di raggio rho " $\rho$ " e con centro  $x_0$ . Questo insieme è un punto di accumulazione se quanto citato prima **non** è un insieme vuoto, ovvero in esso troviamo almeno **un elemento**.

L'insieme dei punti di accumulazione si chiama **derivato** di  $A = D(A)$ .

Per definizione poniamo  $D(\emptyset) = \emptyset$

**Definizione 42** (Punto isolato):

Se  $x \in A$  e  $x \notin D(A)$  si dice che  $x$  è un **punto isolato**

DIMOSTRAZIONE 13.

Se  $A \subset \mathbb{R}$  è un insieme finito, questo implica che  $D(A) = \emptyset$ .

1. Se  $A = \emptyset \implies D(\emptyset) = \emptyset$
2. Se  $A = \{x_1, x_2, \dots, x_p\}$  Nessuno  $z \in \mathbb{R}$  è punto di accumulazione per  $A$ :

$$z \notin D(A), \quad \forall z \in \mathbb{R} \quad (110)$$

- Supponiamo che  $z$  non sia in  $\mathbb{R}$ :  
 $z \in \mathbb{R} \setminus A \rightarrow z \neq x_j, \quad \forall j = 1, \dots, p$

$$\rho = \{|z - x_j| : j = 1, \dots, p\} \quad (111)$$

$$|z - x_j| = 0 \iff z = x_j \text{ ma } z \text{ è escluso dall'insieme } A$$

$$(A \setminus \{z\}) \cap ]z - \rho, z + \rho[ = \emptyset \quad (112)$$

- Supponiamo invece che  $z$  sia in  $A$ :  
 $z \in A \rightarrow z = x_1$

$$\rho = \{|x_1 - x_j| : j = 2, \dots, p\} \quad (113)$$

$\rho > 0$  dato che i punti di  $x_j \in A$  sono diversi tra loro.

Se ne deduce quindi che l'intorno aperto  $B(x_1, \rho)$  di centro  $x_1$  di raggio  $\rho$  esclude qualsiasi altro punto di  $A$

$$(A \setminus \{x_1\}) \cap ]x_1 - \rho, x_1 + \rho[ = \emptyset \quad (114)$$

ESEMPIO 6 ( $A \subseteq \mathbb{R}$  e  $D(A) \neq \emptyset \implies A$  è **infinito**).

Ovvero, se  $A$  è un insieme contenuto nell'insieme dei numeri reali e l'insieme dei suoi punti di accumulazione **non** è vuoto allora  $A$  è infinito.

Ciò non è vero in quanto questa proposizione è solamente una **condizione necessaria** ma **non sufficiente**.

$\mathbb{N}$  è infinito ma  $D(\mathbb{N}) = \emptyset$

**Definizione 43:**

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $x_0 \in \mathbb{R}$ , allora:

$$x_0 \in D(A) \iff \exists \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A \setminus \{x_0\} : x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x_0 \quad (115)$$

## 4 Funzioni

### 4.1 Introduzione

**Definizione 44:**

Una funzione  $f$  è una relazione tra gli elementi di due insiemi  $A$  e  $B$  che ad ogni elemento di  $A$  associa **uno ed un solo** elemento di  $B$ .

Una funzione è definita assegnando:

- un insieme  $A$  detto DOMINIO
- un insieme  $B$  detto CODOMINIO
- una relazione  $f : A \rightarrow B$  che associa ogni elemento di  $A$  uno ed un solo elemento di  $B$

### 4.2 Tipi di funzioni

Una funzione  $f(x)$  può essere di 3 tipi:

1. **suriettiva**
2. **iniettiva**
3. **biiettiva** se è sia **iniettiva** e **suriettiva**

**Definizione 45:**

Una funzione si dice **iniettiva** quando ad elementi **distinti** del DOMINIO corrispondono elementi **distinti** del CODOMINIO

$$f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2 \quad (116)$$




Figure 1: grafico iniettiva

**Definizione 46:**

Una funzione si dice **suriettiva** quando **ogni** elemento del codominio è immagine di **almeno** un elemento del dominio.

$$b \in B \rightarrow \exists a \in A : f(a) = b \quad (117)$$




Figure 2: graifco suriettiva

ESERCIZIO 3.

Dimostra di che tipo è questa funzione:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = x^2 \quad (118)$$

DIMOSTRAZIONE 14.

Non può essere iniettiva perchè per ogni numero reale positivo ne esiste uno uguale negativo, il cui quadrato sarà il **medesimo**.

$$se \quad x_1 = -x_2 \quad \Rightarrow \quad f(x_1) = f(x_2) \quad (119)$$

si può provare inoltre che non è una funzione suriettva in quanto **nessun**

numero negativo fa parte del codominio ed esso è formato da  $\mathbb{R}$  dunque

$$-4 \neq f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (120)$$

ESERCIZIO 4.

Dimostra di che tipo è questa funzione:

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad f(x) = x^2 \quad (121)$$

DIMOSTRAZIONE 15.

se cambiamo il dominio e il codominio nell'insieme dei numeri naturali e consideriamo la stessa legge possiamo dedurre che:

$$\forall n, m : n \neq m \Rightarrow n^2 \neq m^2 \quad (122)$$

Per **qualsiasi** coppia di numeri naturali diversi fra loro non è possibile pensare che il loro quadrato sia uguale, per tanto la funzione è iniettiva. Inoltre **qualsiasi** numero dispari non avrà una propria immagine, in quanto l'insieme racchiude **solo** numeri interi positivi. Ovvero:

$$\exists \frac{x}{2} \in \mathbb{N} : \{y = x + 1\} \Rightarrow y \neq n^2 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (123)$$

### 4.3 Funzioni invertibili

**Definizione 47:**

Una funzione  $f : A \rightarrow B$  si dice invertibile se esiste una funzione  $g : B \rightarrow A$  chiamata funzione inversa tale che:

- $\forall a \in A, \quad g(f(a)) = a$
- $\forall b \in B, \quad f(g(b)) = b$

Essa si può considerare invertibile se è **biiettiva**.

ESERCIZIO 5.

Dimostra se la funzione  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = 2x + 1$  è inversibile.

DIMOSTRAZIONE 16.

Ponendo l'equazione  $y = 2x + 1$  deduciamo che

$$f^{(-1)}(x) = \frac{x - 1}{2} \quad (124)$$



quindi:

$$f^{(-1)}(f(x)) = f^{(-1)}(2x + 1) = \frac{(2x + 1) - 1}{2} = x; \quad (125)$$

e allo stesso tempo

$$f(f^{(-1)}(y)) = f\left(\frac{y - 1}{2}\right) + 1 = y \quad (126)$$

## 4.4 Piano Cartesiano

Fissando un'origine e un'unità di misura ad **ogni** punto di una retta orientata corrisponde uno ed un solo numero reale. Si stabilisce così una **corrispondenza biunivoca** tra i punti della retta orientata e i numeri reali.

Data la funzione

$$f : A \rightarrow B \quad A, B \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2 \quad (127)$$



Figure 3: la retta orientata

### Definizione 48:

Definiamo una **coppia** di rette orientate disposte **perpendicolarmente** fra loro **assi coordinati**.

- La retta da destra verso sinistra viene chiamata **asse delle ascisse**
- la retta dal basso verso l'alto viene chiamata **asse delle ordinate**

Il punto del piano in cui si incontrano viene chiamato **origine degli assi** e viene indicato con  $O$

Un qualsiasi punto del piano  $P$  viene identificato con una ascissa  $x_p$  ed una ordinata  $y_p$ , quindi  $P(x_p, y_p)$ .

Il piano viene diviso in IV quadranti numerati in senso antiorario.




Figure 4: il piano cartesiano

## 4.5 Grafici di funzioni

Ora possiamo rappresentare graficamente coppie ordinate di numeri reali sul piano, quindi possiamo rappresentare il **grafico** di una funzione

$$f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow B \subseteq \mathbb{R} \quad (128)$$

e tutte le coppie  $(x, f(x))$  tali che  $x \in A$ :

$$G(f) = \{(x, f(x))\} : x \in A \quad (129)$$




Figure 5: il grafico di una funzione crescente

## 4.6 Funzioni Pari e Dispari

**Definizione 49:**

Una funzione  $f : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$  si dice **pari** se  $f(x) = f(-x)$




Figure 6: Una funzione pari

*Si deduce quindi che il grafico di una funzione così definita è simmetrico rispetto all'asse **delle ordinate***

**Definizione 50:**

*Una funzione  $f : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$  si dice **dispari** se  $f(-x) = -f(x)$   
 Si deduce quindi che il grafico di una funzione così definita viene **specchiata** in due quadranti uno **opposto** all'altro*




Figure 7: Una funzione dispari

## 4.7 Funzioni crescenti e decrescenti

**Definizione 51:**

*Una funzione  $f : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$  si dice **crescente** se*

$$f(x_2) \geq f(x_1) \quad \forall x_2 > x_1 \in [a, b] \quad (130)$$

*Si dice **strettamente crescente** se*

$$f(x_2) \geq f(x_1) \quad \forall x_2 > x_1 \in [a, b] \quad (131)$$




Figure 8: il grafico di una funzione crescente

**Definizione 52:**

Una funzione  $f : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$  si dice **decrecente** se

$$f(x_2) \leq f(x_1) \quad \forall x_2 > x_1 \in [a, b] \quad (132)$$

Si dice **strettamente decrecente** se

$$f(x_2) < f(x_1) \quad \forall x_2 > x_1 \in [a, b] \quad (133)$$




Figure 9: il grafico di una funzione decrecente

## 4.8 Funzioni inverse

Se i punti di una funzione  $f : A \rightarrow B$   $A, B \subseteq \mathbb{R}$  si ottengono dalle coppie  $(a, b) \in A \times B$

### Definizione 53:

*Il grafico di una funzione inversa si ottiene invertendo le coordinate dei punti del grafico. Ovvero i punti del grafico della **funzione inversa** si ottengono dalle coppie  $(b, a) \in B \times A$  // Per via grafica esso può essere ottenuto **riflettendo** il grafico rispetto alla **bisettrice del primo e terzo quadrante***




Figure 10: Il grafico di una funzione inversa

## 4.9 Modellizzazione matematica

### Definizione 54:

*Per **modellizzazione matematica** si intende un porcesso che ha per scopo quello di **interpretare** fenomeni legati al mondo reale partendo da dati sperimentali e **traducendoli** in **problemi matematici***

Per passare da un fenomeno reale alla sua descrizione mediante modello matematico è necessario un processo di **astrazione** e **traduzione** del fenomeno in termini matematici e rigorosi.

Quando si vuole modellizzare un certo fenomeno, si vuole capire **come** le variabili coinvolte siano in relazione tra loro, ovvero stabilire delle **leggi matematiche** che descrivono queste relazioni.

La procedura di modellizzazione è:

1. si identifica l'incognita del problema
2. si analizza il fenomeno fisico e si raccolgono informazioni
3. si individuano le relazioni tra le informazioni raccolte, che poi vengono tradotte in equazioni

4. si risolvono le equazioni ottenute e se ne verifica la validità del modello

In un modello matematico che coinvolge due grandezze  $x$  ed  $y$  ci interessa capire come la **variabile dipendente** ( $y$ ) varia al variare di quella **indipendente**

ESEMPIO 7.

Supponiamo di aver formulato la legge  $y = f(x)$

Se il modello è giusto potremmo ricavare il valore di  $y$  a partire da qualsiasi valore di  $x$  senza effettuare ulteriori esperimenti e misurazioni.

Rappresentandolo graficamente:




Figure 11: Il grafico dell'andamento dei bitcoin

Questo è il grafico di  $y = f(x)$  dove  $y$ ="valore del bitcoin in dollari" e  $x$ ="tempo".

## 4.10 Proporzioni

**Definizione 55:**

Due grandezze  $A$  e  $B$  si dicono **direttamente proporzionali** se esiste un numero  $c$  detto **costante di proporzionalità** tale che:

$$A = cB \quad (134)$$

Questo significa che le due grandezze sono legate da una certa legge, per la quale quando una raddoppia, triplica, dimezza, di conseguenza la seconda raddoppia, triplica, dimezza etc.

ESEMPIO 8.

$A$  = "quantità di chilometri che l'auto può percorrere"

$B$  = "litri di carburante nel serbatoio"

**Definizione 56:**

Due grandezze  $A$  e  $B$  si dicono **inversamente proporzionali** se esiste un numero  $c$  detto **costante di proporzionalità** tale che:

$$AB = c \quad (135)$$

Questo significa che le due grandezze sono tali che all'aumentare di una, l'altra diminuisce proporzionalmente.

ESEMPIO 9.

$A$  = "numero di partecipanti all'acquisto di un immobile"

$B$  = "quota per partecipante"

$c$  = costo dell'immobile

## 5 Combinatoria e probabilità

### 5.1 Introduzione

**Definizione 57:**

L'**analisi combinatoria** è la branca della matematica applicata per risolvere problemi nel quale è necessario saper "contare" efficacemente esiti e probabilità di determinate situazioni.

Essa è infatti la disciplina che ci permette di **contare senza contare**

### 5.2 Combinatoria

**Definizione 58** (Principio di moltiplicazione):

Un insieme  $X$  soddisfa le ipotesi del principio di moltiplicazione se:

- è possibile ottenere ciascuno dei suoi elementi come risultato di una procedura composta da  $n$  fasi successive.
- se ad una fase intermedia si sono ottenuti due esiti distinti allora la procedura conduce ad elementi distinti di  $X$

Nella prima fase avremo  $m_1$  possibili esiti nella seconda fase avremo  $m_2$  esiti sino alla  $n$ -esima fase avremo  $m_n$  esiti

$$|X| = m_1 \times m_2 \times \dots \times m_k \quad (136)$$

ESERCIZIO 6.

Calcoliamo il numero di coppie ordinate  $(a, b)$  contenenti un numero primo ed uno non primo compresi tra 1 ed 8

DIMOSTRAZIONE 17.

I numeri primi tra 1 e 8 sono  $\{2, 3, 5, 7\}$  mentre i numeri non primi tra 1 e 8 sono  $\{1, 4, 6, 8\}$

I. Scegliamo un qualsiasi elemento di  $I_8$ : abbiamo 8 possibilità.

II. Se il primo elemento era primo il secondo non lo sarà, e viceversa se il numero non era primo. In ogni caso avremo 4 distinte possibilità

Il numero di coppie è:  $8 \times 4 = 32$

ESERCIZIO 7.

Consideriamo un'estrazione in successione di 3 numeri della tombola **tenendo conto dell'ordine**. Quanti sono i possibili esiti?

DIMOSTRAZIONE 18.

I numeri della tombola sono 90. Gli scenari possibili sono 2:

Nel primo caso **senza rimpiazzo** se ogni numero può essere scelto una volta sola, mentre sarà **con rimpiazzo** se un numero può essere scelto più di una volta.

Nel primo caso  $(a_1, a_2, a_3) : \rightarrow (a_1 \neq a_2 \neq a_3) :$

I FASE:  $a_1 = 90$

II FASE:  $a_2 = 90 - 1 = 89$

III FASE:  $a_3 = 90 - 2 = 88$

Quindi il numero di possibili esiti è:

$$90 \times 89 \times 88 = 704880 \quad (137)$$

Nel secondo caso  $(a_1, a_2, a_3) : \rightarrow (a_1 = a_2 = a_3) :$

I FASE:  $a_1 = 90$

II FASE:  $a_2 = 90$

III FASE:  $a_3 = 90$

Quindi il numero di possibili esiti è:

$$90 \times 90 \times 90 = 90^3 = 729000 \quad (138)$$



**Definizione 59:**

Definiamo una regola general per  $k$ -sequenze di  $I_n$ . Siano  $k, n \in \mathbb{N}$  definiamo  $k$ -sequenza di  $I_n$  una  $k$ -upla **ordinata**  $(a_1, \dots, a_k)$  di elementi **non necessariamente distinti** di  $I_n$ . Ovvero:

$$(a_1, \dots, a_k) \in \underbrace{I_n \times \dots \times I_n}_{k \text{ volte}} \quad (139)$$

Nella definizione di sequenze l'ordine degli elementi della  $k$ -upla è importante: le 3-sequenze  $(2, 1, 3)$  e  $(3, 1, 2)$  sono diverse anche se composte dagli stessi numeri. Vengono comunemente dette **disposizioni** di  $n$  oggetti a  $k$  a  $k$

ESEMPIO 10.

Sia  $I_4 = \{1, 2, 3, 4\}$ . Allora

$$(1, 2, 3, 3, 4), \quad (1, 1, 1, 1, 1), \quad (2, 2, 1, 3, 4) \quad (140)$$

sono 5-sequenze di  $I_4$ . Invece

$$(1, 2, 3), \quad (1, 1, 1), \quad (2, 3, 4) \quad (141)$$

sono 3-sequenze di  $I_4$

**5.3 Fattoriale**

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \quad (142)$$

$$n! = \begin{cases} n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1 & \text{se } n \geq 1 \\ 1 & \text{se } n = 0 \end{cases} \quad (143)$$

**Definizione 60:**

Il **fattoriale** di un numero equivale al prodotto di quel numero per tutti i numeri che lo precedono. I valori dei fattoriale crescono esponenzialmente

$$0! = 1 \quad 5! = 120 \quad 6! = 720 \quad 7! = 5040 \quad 10! = 3628800 \quad (144)$$

**5.4 Numero di Insiemi****Definizione 61:**

Il **numero di sottoinsiemi** di  $k$  elementi di  $I_n$  si distinguono esclusivamente dagli elementi di cui fanno parte: **l'ordine non conta**.

Spesso un sottoinsieme di  $k$  elementi di un insieme di  $n$  elementi viene chiamato **combinazione** (semplice, senza ripetizioni) di  $n$  elementi a  $k$  a  $k$

**Definizione 62:**

Siano  $k, n \in \mathbb{N}$  il **binomiale** di  $n$  su  $k$  è:

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} = \begin{cases} \frac{n!}{k!(n-k)!}, & \text{se } k \leq n, \\ 0, & \text{se } k > n. \end{cases} \quad (145)$$

Il numero di sottoinsiemi di  $k$  elementi di  $I_n$  è

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\}. \quad (146)$$

ESEMPIO 11.

Calcola i sottoinsiemi con 3 elementi di  $I_6$

DIMOSTRAZIONE 19.

La soluzione è data da una semplice applicazione della formula prima vista:

$$\left\{ \begin{matrix} 6 \\ 3 \end{matrix} \right\} = \frac{6!}{3!3!} = 20 \quad (147)$$

ESEMPIO 12.

Calcola il numero di partite giocate nella fase a gironi dei Mondiali di calcio. Ci sono 32 squadre divise in 8 gironi da 4 squadre ed in ogni girone una squadra deve giocare contro le altre una volta sola.

DIMOSTRAZIONE 20.

Il numero di partite totale è 8 volte le partite giocate in un singolo girone. L'insieme delle 4 squadre in un girone possiamo identificarlo con  $I_4$ , e una partita tra 2 squadre con un sottoinsieme di 2 elementi di  $I_4$ . Il numero di partite giocate in un girone è **il numero di sottoinsiemi** di 2 elementi di  $I_4$  ovvero:

$$\left\{ \begin{matrix} 4 \\ 2 \end{matrix} \right\} = \frac{4!}{2!(4-2)!} = \frac{4 \times 3 \times 2 \times 1}{2 \times 2} = \frac{24}{4} = 6 \quad (148)$$

Infine il risultato equivale a:  $6 \times 8 = 48$