

Simulazione Esame 22/12/2021

Cavalli Riccardo

January 13, 2022

Esercizio 1

Mostrare se i sequenti elencati sotto sono tautologie, opinioni o paradossi in logica classica con uguaglianza motivando la risposta: nel caso di sequente proposizionale non valido si indichi la riga della tabella di verità in cui il sequente è falso e nel caso di sequente predicativo non valido si mostri un contromodello (nel caso di non validità si assegna il doppio dei punti indicati).

A (3 punti): $B \vdash \neg(B \& \neg B) \& \neg B$

$$\frac{\frac{\frac{\neg \neg ax_{sx1}}{B, B, \neg B \vdash} \& -S}{B, B \& \neg B \vdash} \neg -D}{B \vdash \neg(B \& \neg B)} \neg -D \quad \frac{B, B \vdash}{B \vdash \neg B} \neg -D}{B \vdash \neg(B \& \neg B) \& \neg B} \& -D$$

La foglia $B, B \vdash$ diventa falsa per $B = 1$ e quindi anche il sequente radice è falso in tal riga.

Provo a negare il sequente radice: $\vdash \neg(B \rightarrow \neg(B \& \neg B) \& \neg B)$

$$\frac{\frac{\vdash B \quad \neg(B \& \neg B) \& \neg B \vdash}{B \rightarrow \neg(B \& \neg B) \& \neg B \vdash} \rightarrow -S}{\vdash \neg(B \rightarrow \neg(B \& \neg B) \& \neg B)} \neg -D$$

La foglia $\vdash B$ è falsa per $B = 0$ e quindi anche il sequente radice è falso in tal riga.

Essendo questo la negazione del sequente di partenza, allora il sequente originale è vero su tal riga.

Il sequente di partenza è quindi un'opinione.

B (6 punti): $\neg \forall x \forall y y=x, a = b \vdash \forall x \exists y \neg x = y$

$$\frac{\frac{\frac{ax - id}{w = x, a = b, w = z \vdash w = z} = -S}{a = b, w = z, w = x \vdash x = z} \neg -D}{a = b, w = z \vdash \neg w = x, x = z} \exists -D_v}{a = b, w = z \vdash \exists y \neg w = y, x = z} \neg -D}{a = b \vdash \neg w = z, \exists y \neg w = y, x = z} \exists -D}{a = b \vdash \exists y \neg w = y, x = z} sc_{dx}{a = b \vdash x = z, \exists y \neg w = y} \forall -D (x \notin VL){a = b \vdash \forall y y = z, \exists y \neg w = y} \forall -D (z \notin VL){a = b \vdash \forall x \forall y y = x, \exists y \neg w = y} \neg -S}{a = b, \neg \forall x \forall y y = x \vdash \exists y \neg w = y} sc_{sx}{\neg \forall x \forall y y = x, a = b \vdash \exists y \neg w = y} \forall -D (w \notin VL)$$

Il sequente radice è derivabile, quindi è una tautologia.

C (5 punti): $\exists z A(z), \neg \forall x A(x) \vdash \neg \forall y \neg A(y)$

$$\begin{array}{c}
\frac{\neg \neg ax_{sx1}}{A(w), \neg A(w) \vdash} \quad \frac{A(w), \neg A(w) \vdash}{A(w), \forall y \neg A(y) \vdash} \quad \frac{A(w), \forall y \neg A(y) \vdash}{\forall y \neg A(y), A(w) \vdash} \quad \frac{\forall y \neg A(y), A(w) \vdash}{\forall y \neg A(y), \exists z A(z) \vdash} \quad \frac{\forall y \neg A(y), \exists z A(z) \vdash}{\exists z A(z), \forall y \neg A(y) \vdash} \quad \frac{\exists z A(z), \forall y \neg A(y) \vdash}{\exists z A(z), \neg \forall x A(x), \forall y \neg A(y) \vdash} \quad \frac{\exists z A(z), \neg \forall x A(x), \forall y \neg A(y) \vdash}{\exists z A(z), \neg \forall x A(x) \vdash \neg \forall y \neg A(y)} \\
\vdash -S_v \quad sc_{sx} \quad \exists -S \text{ (w} \notin \text{VL)} \quad sc_{sx} \quad in_{sx} \quad \neg -D
\end{array}$$

Il sequente radice è derivabile, quindi è una tautologia.

Esercizio 2

Formalizzare le seguenti asserzioni e stabilire se i sequenti ottenuti sono tautologie, opinioni o paradossi nella logica classica con uguaglianza motivando la risposta: nel caso di sequente predicativo non valido si mostri un contromodello (nel caso di non validità si assegna il doppio dei punti indicati)

A (6 punti): $\forall x(\neg C(x) \rightarrow \neg T(x)), \forall x(\neg T(x) \rightarrow C(x)) \vdash \forall x C(x)$

$$\begin{array}{c}
\frac{\neg \neg ax_{dx2}}{\vdash \neg C(w), \neg T(w), C(w)} \quad \frac{ax - id}{\neg T(w) \vdash \neg T(w), C(w)} \quad \frac{\vdash \neg C(w), \neg T(w), C(w) \quad \neg T(w) \vdash \neg T(w), C(w)}{\neg C(w) \rightarrow \neg T(w) \vdash \neg T(w), C(w)} \rightarrow -S \\
\frac{\neg C(w) \rightarrow \neg T(w) \vdash \neg T(w), C(w)}{\forall x(\neg C(x) \rightarrow \neg T(x)) \vdash \neg T(w), C(w)} \quad \frac{ax - id}{\forall x(\neg C(x) \rightarrow \neg T(x)), C(w) \vdash C(w)} \quad \frac{\forall x(\neg C(x) \rightarrow \neg T(x)) \vdash \neg T(w), C(w) \quad \forall x(\neg C(x) \rightarrow \neg T(x)), C(w) \vdash C(w)}{\forall x(\neg C(x) \rightarrow \neg T(x)), \neg T(w) \rightarrow C(w) \vdash C(w)} \rightarrow -S \\
\frac{\forall x(\neg C(x) \rightarrow \neg T(x)), \neg T(w) \rightarrow C(w) \vdash C(w)}{\forall x(\neg C(x) \rightarrow \neg T(x)), \forall x(\neg T(x) \rightarrow C(x)) \vdash C(w)} \quad \frac{\forall x(\neg C(x) \rightarrow \neg T(x)), \forall x(\neg T(x) \rightarrow C(x)) \vdash C(w)}{\forall x(\neg C(x) \rightarrow \neg T(x)), \forall x(\neg T(x) \rightarrow C(x)) \vdash \forall x C(x)} \quad \forall -S_v \quad \forall -D \text{ (w} \notin \text{VL)}
\end{array}$$

Il sequente radice è derivabile, quindi è una tautologia.

B (6 punti): $\neg \exists x C(x) \vdash \exists x(\neg C(x) \ \& \ \neg T(x))$

$$\begin{array}{c}
\frac{\neg \neg ax_{dx2}}{\vdash \neg C(x), \exists x(\neg C(x) \ \& \ \neg T(x)), C(x), \exists x C(x)} \quad \frac{T(x) \vdash \exists x(\neg C(x) \ \& \ \neg T(x)), C(x), \exists x C(x)}{\vdash \neg T(x), \exists x(\neg C(x) \ \& \ \neg T(x)), C(x), \exists x C(x)} \quad \frac{\vdash \neg C(x), \exists x(\neg C(x) \ \& \ \neg T(x)), C(x), \exists x C(x) \quad \vdash \neg T(x), \exists x(\neg C(x) \ \& \ \neg T(x)), C(x), \exists x C(x)}{\vdash \neg C(x) \ \& \ \neg T(x), \exists x(\neg C(x) \ \& \ \neg T(x)), C(x), \exists x C(x)} \neg -D \quad \& -D \\
\frac{\vdash \neg C(x) \ \& \ \neg T(x), \exists x(\neg C(x) \ \& \ \neg T(x)), C(x), \exists x C(x)}{\vdash \exists x(\neg C(x) \ \& \ \neg T(x)), C(x), \exists x C(x)} \exists -D \\
\frac{\vdash \exists x(\neg C(x) \ \& \ \neg T(x)), C(x), \exists x C(x)}{\vdash C(x), \exists x C(x), \exists x(\neg C(x) \ \& \ \neg T(x))} sc_{dx} \\
\frac{\vdash C(x), \exists x C(x), \exists x(\neg C(x) \ \& \ \neg T(x))}{\vdash \exists x C(x), \exists x(\neg C(x) \ \& \ \neg T(x))} \exists -D \\
\frac{\vdash \exists x C(x), \exists x(\neg C(x) \ \& \ \neg T(x))}{\neg \exists x C(x) \vdash \exists x(\neg C(x) \ \& \ \neg T(x))} \neg -S
\end{array}$$

La foglia che non si riesce a derivare

$T(x) \vdash \exists x(\neg C(x) \ \& \ \neg T(x)), C(x), \exists x C(x)$

suggerisce il seguente contromodello

$D_{contra} = \{ \text{Minni} \}$

$T(x)^{D_{contra}}(\text{Minni}) = 1$

$C(x)^{D_{contra}}(\text{Minni}) = 0$

Il sequente radice non vale in tal modello perchè

$(\exists x C(x))^{D_{contra}} = 0$ perchè ci sono solo falsari in dominio dato che c'è solo Minni

$$(\neg \exists x C(x))^{D_{contra}} = \neg(\exists x C(x))^{D_{contra}} = \neg 0 = 1$$

$$(\exists x(\neg C(x) \& \neg T(x)))^{D_{contra}} = 0 \text{ perchè } (\neg C(x) \& \neg T(x))^{D_{contra}} = 0 \text{ avendo } C(x)^{D_{contra}}(\text{Minni}) = 0 \text{ e } T(x)^{D_{contra}}(\text{Minni}) = 1$$

$$\text{Quindi } (\neg \exists x C(x) \vdash \exists x(\neg C(x) \& \neg T(x)))^{D_{contra}} = (\neg \exists x C(x))^{D_{contra}} \vdash (\exists x(\neg C(x) \& \neg T(x)))^{D_{contra}} = 1 \vdash 0 = 0$$

Provo a negare il seguente radice: $\vdash \neg(\neg \exists x C(x) \rightarrow \exists x(\neg C(x) \& \neg T(x)))$

$$\frac{\frac{\frac{C(w) \vdash}{\exists x C(x) \vdash} \exists -S \ (w \notin VL)}{\vdash \neg \exists x C(x)} \neg -D \quad \frac{\exists x(\neg C(x) \& \neg T(x)) \vdash}{\neg \exists x C(x) \rightarrow \exists x(\neg C(x) \& \neg T(x)) \vdash} \rightarrow -S}{\vdash \neg(\neg \exists x C(x) \rightarrow \exists x(\neg C(x) \& \neg T(x)))} \neg -D$$

La foglia che non si riesce a derivare

$$C(w) \vdash$$

suggerisce il seguente contromodello

$$D_{contra} = \{ \text{Minni} \}$$

$$C(w)^{D_{contra}}(\text{Minni}) = 1$$

$$T(w)^{D_{contra}}(\text{Minni}) = \text{a piacere}$$

Il seguente radice non vale in tal modello perchè

$$(\exists x C(x))^{D_{contra}} = 1 \text{ perchè } C(w)^{D_{contra}}(\text{Minni}) = 1 \text{ (c'è un testimone)}$$

$$(\neg \exists x C(x))^{D_{contra}} = \neg(\exists x C(x))^{D_{contra}} = \neg 1 = 0$$

$$\text{Quindi } \neg((\neg \exists x C(x) \rightarrow \exists x(\neg C(x) \& \neg T(x)))^{D_{contra}}) = \neg((\neg \exists x C(x))^{D_{contra}} \rightarrow (\exists x(\neg C(x) \& \neg T(x)))^{D_{contra}}) = \neg(0 \rightarrow ?) = \neg 1 = 0$$

Questo contromodello è un modello del seguente di partenza essendo l'ultimo sequente analizzato la negazione di quello di partenza.

$$\text{Infatti il sequente di partenza } (\neg \exists x C(x) \vdash \exists x(\neg C(x) \& \neg T(x)))^{D_{contra}} = 0 \rightarrow ? = 1.$$

Quindi il sequente di partenza è un'opinione avendo un modello e un contromodello.

C (12 punti): $\forall x \exists y ((M(y,x) \ \& \ \forall y1 \ \forall y2 (M(y1,x) \ \& \ M(y2,x) \rightarrow y1 = y2)) \ \& \ \neg x = y) \vdash \neg e = r \rightarrow \neg M(e,l) \vee (\neg M(r,l) \ \& \ \neg M(l,l))$

Per il ramo sx della & da destra.

Vai sotto

↑

Per il ramo dx della & da destra.

Vai sotto

↑

$$\begin{array}{c}
 \frac{M(w,l), \forall y1 \forall y2 (M(y1,l) \ \& \ M(y2,l) \rightarrow y1 = y2) \vdash \neg M(r,l) \ \& \ \neg M(l,l), l = w, e = r, \neg M(e,l)}{M(w,l), \forall y1 \forall y2 (M(y1,l) \ \& \ M(y2,l) \rightarrow y1 = y2) \vdash l = w, e = r, \neg M(e,l), \neg M(r,l) \ \& \ \neg M(l,l)} \& -D \\
 \frac{M(w,l), \forall y1 \forall y2 (M(y1,l) \ \& \ M(y2,l) \rightarrow y1 = y2) \vdash l = w, e = r, \neg M(e,l), \neg M(r,l) \ \& \ \neg M(l,l)}{M(w,l) \ \& \ \forall y1 \forall y2 (M(y1,l) \ \& \ M(y2,l) \rightarrow y1 = y2) \vdash l = w, e = r, \neg M(e,l), \neg M(r,l) \ \& \ \neg M(l,l)} \& -S \\
 \frac{M(w,l) \ \& \ \forall y1 \forall y2 (M(y1,l) \ \& \ M(y2,l) \rightarrow y1 = y2), \neg l = w \vdash e = r, \neg M(e,l), \neg M(r,l) \ \& \ \neg M(l,l)}{M(w,l) \ \& \ \forall y1 \forall y2 (M(y1,l) \ \& \ M(y2,l) \rightarrow y1 = y2), \neg l = w \vdash e = r, \neg M(e,l), \neg M(r,l) \ \& \ \neg M(l,l)} \neg -S \\
 \frac{(M(w,l) \ \& \ \forall y1 \forall y2 (M(y1,l) \ \& \ M(y2,l) \rightarrow y1 = y2)) \ \& \ \neg l = w \vdash e = r, \neg M(e,l), \neg M(r,l) \ \& \ \neg M(l,l)}{\exists y ((M(y,l) \ \& \ \forall y1 \forall y2 (M(y1,l) \ \& \ M(y2,l) \rightarrow y1 = y2)) \ \& \ \neg l = y) \vdash e = r, \neg M(e,l), \neg M(r,l) \ \& \ \neg M(l,l)} \& -S \\
 \frac{\exists y ((M(y,l) \ \& \ \forall y1 \forall y2 (M(y1,l) \ \& \ M(y2,l) \rightarrow y1 = y2)) \ \& \ \neg l = y) \vdash e = r, \neg M(e,l), \neg M(r,l) \ \& \ \neg M(l,l)}{\forall x \exists y ((M(y,x) \ \& \ \forall y1 \forall y2 (M(y1,x) \ \& \ M(y2,x) \rightarrow y1 = y2)) \ \& \ \neg x = y) \vdash e = r, \neg M(e,l), \neg M(r,l) \ \& \ \neg M(l,l)} \exists -S \ (w \notin VL) \\
 \frac{\forall x \exists y ((M(y,x) \ \& \ \forall y1 \forall y2 (M(y1,x) \ \& \ M(y2,x) \rightarrow y1 = y2)) \ \& \ \neg x = y) \vdash e = r, \neg M(e,l), \neg M(r,l) \ \& \ \neg M(l,l)}{\forall x \exists y ((M(y,x) \ \& \ \forall y1 \forall y2 (M(y1,x) \ \& \ M(y2,x) \rightarrow y1 = y2)) \ \& \ \neg x = y), \neg e = r \vdash \neg M(e,l), \neg M(r,l) \ \& \ \neg M(l,l)} \forall -S_v \\
 \frac{\forall x \exists y ((M(y,x) \ \& \ \forall y1 \forall y2 (M(y1,x) \ \& \ M(y2,x) \rightarrow y1 = y2)) \ \& \ \neg x = y), \neg e = r \vdash \neg M(e,l), \neg M(r,l) \ \& \ \neg M(l,l)}{\forall x \exists y ((M(y,x) \ \& \ \forall y1 \forall y2 (M(y1,x) \ \& \ M(y2,x) \rightarrow y1 = y2)) \ \& \ \neg x = y), \neg e = r \vdash \neg M(e,l) \vee (\neg M(r,l) \ \& \ \neg M(l,l))} \vee -D \\
 \frac{\forall x \exists y ((M(y,x) \ \& \ \forall y1 \forall y2 (M(y1,x) \ \& \ M(y2,x) \rightarrow y1 = y2)) \ \& \ \neg x = y) \vdash \neg e = r \rightarrow \neg M(e,l) \vee (\neg M(r,l) \ \& \ \neg M(l,l))}{\forall x \exists y ((M(y,x) \ \& \ \forall y1 \forall y2 (M(y1,x) \ \& \ M(y2,x) \rightarrow y1 = y2)) \ \& \ \neg x = y) \vdash \neg e = r \rightarrow \neg M(e,l) \vee (\neg M(r,l) \ \& \ \neg M(l,l))} \rightarrow -D
 \end{array}$$

Sviluppo del ramo sinistro della & -D

Per il ramo sx dell'implicazione.

Vai sotto

↑

$ax - id$

$$\begin{array}{c}
 \frac{M(w,l), e = r \vdash \neg M(r,l), l = w, e = r, \neg M(e,l)}{M(w,l), M(e,l) \ \& \ M(r,l) \rightarrow e = r \vdash \neg M(r,l), l = w, e = r, \neg M(e,l)} \rightarrow -S \\
 \frac{M(w,l), M(e,l) \ \& \ M(r,l) \rightarrow e = r \vdash \neg M(r,l), l = w, e = r, \neg M(e,l)}{M(w,l), \forall y2 (M(e,l) \ \& \ M(y2,l) \rightarrow e = y2) \vdash \neg M(r,l), l = w, e = r, \neg M(e,l)} \forall -S_v \\
 \frac{M(w,l), \forall y2 (M(e,l) \ \& \ M(y2,l) \rightarrow e = y2) \vdash \neg M(r,l), l = w, e = r, \neg M(e,l)}{M(w,l), \forall y1 \forall y2 (M(y1,l) \ \& \ M(y2,l) \rightarrow y1 = y2) \vdash \neg M(r,l), l = w, e = r, \neg M(e,l)} \forall -S_v
 \end{array}$$

Sviluppo del ramo sinistro della \rightarrow -S

$\neg -ax_{dx1}$

$\neg -ax_{dx1}$

$$\frac{M(w,l) \vdash M(e,l), \neg M(r,l), l = w, e = r, \neg M(e,l) \quad M(w,l) \vdash M(r,l), \neg M(r,l), l = w, e = r, \neg M(e,l)}{M(w,l) \vdash M(e,l) \ \& \ M(r,l), \neg M(r,l), l = w, e = r, \neg M(e,l)} \& -D$$

Completato lo sviluppo del ramo sinistro della & -D

Sviluppo del ramo destro della & -D

Per il ramo sx dell'implicazione.

Vai sotto

↑

$ax - id$

$$\begin{array}{c}
 \frac{M(w,l), l = w \vdash \neg M(l,l), l = w, e = r, \neg M(e,l)}{M(w,l), M(l,l) \ \& \ M(w,l) \rightarrow l = w \vdash \neg M(l,l), l = w, e = r, \neg M(e,l)} \rightarrow -S \\
 \frac{M(w,l), M(l,l) \ \& \ M(w,l) \rightarrow l = w \vdash \neg M(l,l), l = w, e = r, \neg M(e,l)}{M(w,l), \forall y2 (M(l,l) \ \& \ M(y2,l) \rightarrow l = y2) \vdash \neg M(l,l), l = w, e = r, \neg M(e,l)} \forall -S_v \\
 \frac{M(w,l), \forall y2 (M(l,l) \ \& \ M(y2,l) \rightarrow l = y2) \vdash \neg M(l,l), l = w, e = r, \neg M(e,l)}{M(w,l), \forall y1 \forall y2 (M(y1,l) \ \& \ M(y2,l) \rightarrow y1 = y2) \vdash \neg M(l,l), l = w, e = r, \neg M(e,l)} \forall -S_v
 \end{array}$$

Sviluppo del ramo sinistro della \rightarrow -S

$\neg -ax_{dx1}$

$ax - id$

$$\frac{M(w,l) \vdash M(l,l), \neg M(l,l), l = w, e = r, \neg M(e,l) \quad M(w,l) \vdash M(w,l), \neg M(l,l), l = w, e = r, \neg M(e,l)}{M(w,l) \vdash M(l,l) \ \& \ M(w,l), \neg M(l,l), l = w, e = r, \neg M(e,l)} \& -D$$

Completato lo sviluppo del ramo destro della & -D

Il sequente radice è derivabile, quindi è una tautologia.

D (12 punti): $\vdash \neg \exists x(\forall y ((A(y,y) \rightarrow \neg A(x,y)) \& (\neg A(x,y) \rightarrow A(y,y))) \& \neg A(x,x))$

$\neg -ax_{dx2}$	$ax - id$
$A(w, w) \rightarrow \neg A(w, w) \vdash \neg A(w, w), A(w, w)$	$A(w, w) \rightarrow \neg A(w, w), A(w, w) \vdash A(w, w)$
$\frac{A(w, w) \rightarrow \neg A(w, w), \neg A(w, w) \rightarrow A(w, w) \vdash A(w, w)}{\rightarrow -S}$	
$\frac{(A(w, w) \rightarrow \neg A(w, w)) \& (\neg A(w, w) \rightarrow A(w, w)) \vdash A(w, w)}{\& -S}$	
$\frac{\forall y((A(y, y) \rightarrow \neg A(w, y)) \& (\neg A(w, y) \rightarrow A(y, y))) \vdash A(w, w)}{\forall -S_v}$	
$\frac{\forall y((A(y, y) \rightarrow \neg A(w, y)) \& (\neg A(w, y) \rightarrow A(y, y))), \neg A(w, w) \vdash}{\neg -S}$	
$\frac{\forall y((A(y, y) \rightarrow \neg A(w, y)) \& (\neg A(w, y) \rightarrow A(y, y))) \& \neg A(w, w) \vdash}{\& -S}$	
$\frac{\exists x(\forall y((A(y, y) \rightarrow \neg A(x, y)) \& (\neg A(x, y) \rightarrow A(y, y))) \& \neg A(x, x)) \vdash}{\exists -S (w \notin VL)}$	
$\vdash \neg \exists x(\forall y((A(y, y) \rightarrow \neg A(x, y)) \& (\neg A(x, y) \rightarrow A(y, y))) \& \neg A(x, x))$	
$\neg -D$	

Il seguente radice è derivabile, quindi è una tautologia.

Esercizio 3 (31 punti)

AX.1: $D(e) \rightarrow \neg D(a)$

AX.2: $D(e) \vee D(p) \rightarrow D(a)$

AX.3: $\neg D(a) \rightarrow \neg D(p) \& D(g)$

AX.4: $D(g) \rightarrow \forall x (D(x) \vee \neg D(x))$

AX.5: $D(a) \rightarrow D(e) \vee D(p)$

AX.6: $\neg D(p) \rightarrow \neg D(g)$

A Alice danza: $D(a)$

$ax - id$	$\neg -ax_{sx1}$
$\frac{\neg D(p), D(g) \vdash \neg D(p), D(e), D(p), D(a)}{\vdash AX.6}$	$\frac{\neg D(p), D(g), \neg D(g) \vdash D(e), D(p), D(a)}{\rightarrow -S}$
$\frac{\neg D(p), D(g), \neg D(p) \rightarrow \neg D(g) \vdash D(e), D(p), D(a)}{comp}$	
$\neg -ax_{dx2}$	$\neg D(p), D(g) \vdash D(e), D(p), D(a)$
$\frac{\neg D(p) \& D(g) \vdash D(e), D(p), D(a)}{\& -S}$	
$\vdash AX.3$	$\neg D(a) \rightarrow \neg D(p) \& D(g) \vdash D(e), D(p), D(a)$
$\frac{\neg D(a) \rightarrow \neg D(p) \& D(g) \vdash D(e), D(p), D(a)}{\rightarrow -S}$	
$\frac{\vdash D(e), D(p), D(a)}{comp}$	
$\frac{\vdash D(e) \vee D(p), D(a)}{\vee -D}$	
$\vdash AX.2$	$\frac{D(e) \vee D(p) \rightarrow D(a) \vdash D(a)}{D(a) \vdash D(a)}$
$\frac{D(a) \vdash D(a)}{\rightarrow -S}$	
$comp$	

E Eleonora non danza: $\neg D(e)$

$\neg -ax_{dx1}$	$\neg -ax_{sx1}$
$D(a) \vdash D(e), \neg D(e)$	$D(a), \neg D(a) \vdash \neg D(e)$
$\vdash AX.1$	$\frac{D(a), D(e) \rightarrow \neg D(a) \vdash \neg D(e)}{\rightarrow -S}$
$\frac{D(a) \vdash \neg D(e)}{comp}$	
$\vdash T.1$	$\frac{D(a) \vdash \neg D(e)}{comp}$
$\vdash \neg D(e)$	

P Il primo ballerino danza: $D(p)$

$\neg -ax_{sx2}$	$ax - id$
$ax - id$	$\frac{D(a), \neg D(e), D(e) \vdash D(p)}{D(a), \neg D(e), D(p) \vdash D(p)}$
$\frac{D(a), \neg D(e), D(e) \vee D(p) \vdash D(p)}{\vee -S}$	
$\vdash AX.5$	$\frac{D(a), \neg D(e), D(a) \rightarrow D(e) \vee D(p) \vdash D(p)}{\rightarrow -S}$
$\vdash T.2$	$\frac{D(a), \neg D(e) \vdash D(p)}{comp}$
$\vdash T.1$	$\frac{D(a) \vdash D(p)}{comp}$
$\vdash D(p)$	
$comp$	

G Se Gertrude danza anche Alice Danza: $D(g) \rightarrow D(a)$

$$\frac{\frac{ax - id}{\frac{\vdash T.1 \quad D(g), D(a) \vdash D(a)}{D(g) \vdash D(a)} \text{ comp}}{\vdash D(g) \rightarrow D(a)} \rightarrow -D$$

Q Qualcuno danza ma non tutti: $\exists x D(x) \ \& \ \exists x \neg D(x)$

$$\frac{\vdash T.1 \quad \frac{\frac{ax - id \quad \frac{D(a), \neg D(e) \vdash D(a)}{D(a), \neg D(e) \vdash \exists x D(x)} \exists -D_v \quad \frac{ax - id \quad \frac{D(a), \neg D(e) \vdash \neg D(e)}{D(a), \neg D(e) \vdash \exists x \neg D(x)} \exists -\neg D_v}{D(a), \neg D(e) \vdash \exists x D(x) \ \& \ \exists x \neg D(x)} \& -D}{D(a) \vdash \exists x D(x) \ \& \ \exists x \neg D(x)} \text{ comp}}{\vdash \exists x D(x) \ \& \ \exists x \neg D(x)} \text{ comp}$$

Esercizio 4 (60 punti)

AX.1: $\forall x \forall y \forall z (C(x,y) \ \& \ C(y,z) \rightarrow \neg C(x,z))$

AX.2: $\neg \exists x C(p,x)$

AX.3: $\forall x \forall y (C(x,y) \rightarrow C(y,x))$

AX.4: $C(v,m) \ \& \ \forall x (C(v,x) \rightarrow x=m)$

AX.5: $\neg(\exists x \neg C(l,x))$

P Piero non chiama Luca: $\neg C(p,l)$

$$\frac{\vdash AX.2 \quad \frac{\frac{\neg -ax_{dx1} \quad \frac{\vdash C(p,l), \neg C(p,l)}{\vdash \exists x C(p,x), \neg C(p,l)} \exists -D_v}{\neg \exists x C(p,x) \vdash \neg C(p,l)} \neg -S}{\vdash \neg C(p,l)} \text{ comp}$$

L Luca chiama Piero: $C(l,p)$

$$\frac{\vdash AX.5 \quad \frac{\frac{\neg -ax_{dx2} \quad \frac{\vdash \neg C(l,p), C(l,p)}{\vdash \exists x \neg C(l,x), C(l,p)} \exists -D_v}{\neg \exists x \neg C(l,x) \vdash C(l,p)} \neg -S}{\vdash C(l,p)} \text{ comp}$$

Dopo aver mostrato una derivazione nella teoria in T_{ch} delle affermazioni precedenti noto una contraddizione tra i primi due teoremi e l'assioma 3.

Provo quindi a derivare il falso.

F Derivazione del falso

$$\begin{array}{c}
\frac{ax - id \quad \neg \neg ax_{sx2}}{\frac{\neg C(p, l), C(l, p) \vdash C(l, p), \perp \quad \neg C(p, l), C(l, p), C(p, l) \vdash \perp}{\neg C(p, l), C(l, p), C(l, p) \rightarrow C(p, l) \vdash \perp} \rightarrow -S \\
\frac{\neg C(p, l), C(l, p), C(l, p) \rightarrow C(p, l) \vdash \perp}{\neg C(p, l), C(l, p), \forall y(C(l, y) \rightarrow C(y, l)) \vdash \perp} \forall -S_v \\
\frac{\neg C(p, l), C(l, p), \forall y(C(l, y) \rightarrow C(y, l)) \vdash \perp}{\neg C(p, l), C(l, p), \forall x \forall y(C(x, y) \rightarrow C(y, x)) \vdash \perp} \forall -S_v \\
\frac{\vdash AX.3 \quad \neg C(p, l), C(l, p), \forall x \forall y(C(x, y) \rightarrow C(y, x)) \vdash \perp}{\neg C(p, l), C(l, p) \vdash \perp} comp \\
\frac{\vdash T.2 \quad \neg C(p, l), C(l, p) \vdash \perp}{\neg C(p, l) \vdash \perp} comp \\
\frac{\vdash T.1 \quad \neg C(p, l) \vdash \perp}{\vdash \perp} comp
\end{array}$$

M Mila chiama Veronica: $C(m, v)$

Per derivare l'affermazione utilizzo come assioma il falso, che ho derivato utilizzando i primi due teoremi e l'assioma 3

$$\frac{\vdash \perp \quad \perp \vdash C(m, v) \quad ax - id}{\vdash C(m, v)} comp$$

N Nessuno chiama se stesso: $\neg \exists x C(x, x)$

Per derivare l'affermazione utilizzo come assioma il falso, che ho derivato utilizzando i primi due teoremi e l'assioma 3

$$\frac{\vdash \perp \quad \perp \vdash \neg \exists x C(x, x) \quad ax - id}{\vdash \neg \exists x C(x, x)} comp$$

M Mila è diversa da Veronica: $\neg m = v$

Per derivare l'affermazione utilizzo come assioma il falso, che ho derivato utilizzando i primi due teoremi e l'assioma 3

$$\frac{\vdash \perp \quad \perp \vdash \neg m = v \quad ax - id}{\vdash \neg m = v} comp$$

Esercizio 5

Ipotesi: D'inverno non tutti non vanno a sciare: $I \rightarrow \exists x S(x)$

A Se è inverno qualcuno va a sciare e qualcuno non ci va: $I \rightarrow \exists x S(x) \ \& \ \exists x \neg S(x)$

$$\begin{array}{c}
 \frac{ax-id \quad \frac{I, S(w) \vdash S(w)}{I, S(w) \vdash \exists x S(x)} \exists -D_v \quad \frac{I, S(w), S(w) \vdash \exists x \neg S(x)}{I, S(w) \vdash \neg S(w), \exists x \neg S(x)} \neg -D}{\frac{I \vdash I, \exists x S(x) \quad \frac{I, S(w) \vdash \exists x S(x)}{I, \exists x S(x) \vdash \exists x S(x)} \exists -S \ (w \notin VL)}{I, I \rightarrow \exists x S(x) \vdash \exists x S(x)} \rightarrow -S \quad \frac{ax-id \quad \frac{I, S(w) \vdash \neg S(w), \exists x \neg S(x)}{I, S(w) \vdash \exists x \neg S(x)} \exists -D}{\frac{I \vdash I, \exists x \neg S(x) \quad \frac{I, S(w) \vdash \exists x \neg S(x)}{I, \exists x S(x) \vdash \exists x \neg S(x)} \exists -S \ (w \notin VL)}{I, I \rightarrow \exists x S(x) \vdash \exists x \neg S(x)} \rightarrow -S \\
 \hline
 \frac{I, I \rightarrow \exists x S(x) \vdash \exists x S(x) \ \& \ \exists x \neg S(x)}{I \rightarrow \exists x S(x), I \vdash \exists x S(x) \ \& \ \exists x \neg S(x)} \& -D \\
 \hline
 \frac{I \rightarrow \exists x S(x), I \vdash \exists x S(x) \ \& \ \exists x \neg S(x)}{I \rightarrow \exists x S(x) \vdash I \rightarrow \exists x S(x) \ \& \ \exists x \neg S(x)} sc_{sx} \\
 \hline
 \frac{\vdash Ip \quad I \rightarrow \exists x S(x) \vdash I \rightarrow \exists x S(x) \ \& \ \exists x \neg S(x)}{\vdash I \rightarrow \exists x S(x) \ \& \ \exists x \neg S(x)} \rightarrow -D \\
 \hline
 \vdash I \rightarrow \exists x S(x) \ \& \ \exists x \neg S(x) \quad comp
 \end{array}$$

Contromodello di Ipotesi \vdash Aff. A

La foglia che non si riesce a derivare

$I, S(w), S(w) \vdash \exists x \neg S(x)$

suggerisce il seguente contromodello

$D_{contra} = \{ \text{Minni} \}$

$I^{D_{contra}} = 1$

$S(w)^{D_{contra}}(\text{Minni}) = 1$

In questo modello

$(\neg S(w))^{D_{contra}}(\text{Minni}) = 0$

$(\exists x \neg S(x))^{D_{contra}} = 0$ perchè ci sono solo falsari nel dominio dato che c'è solo Minni

$(\exists x S(x))^{D_{contra}} = 1$ perchè $S(w)^{D_{contra}}(\text{Minni}) = 1$ (c'è un testimone)

Ipotesi $I^{D_{contra}}: I^{D_{contra}} \rightarrow (\exists x S(x))^{D_{contra}}$ equivale a $1 \rightarrow 1$ equivale a 1

Aff. A $I^{D_{contra}}: I^{D_{contra}} \rightarrow (\exists x S(x) \ \& \ \exists x \neg S(x))^{D_{contra}}: I^{D_{contra}} \rightarrow (\exists x S(x))^{D_{contra}} \ \& \ (\exists x \neg S(x))^{D_{contra}}$

equivale a $1 \rightarrow 1 \ \& \ 0$ equivale a $1 \rightarrow 0$ equivale a 0

Quindi, (Ipotesi \vdash Aff. A) $I^{D_{contra}}$ equivale a $1 \vdash 0$ equivale a 0

Ho trovato un contromodello, quindi l'affermazione A non è deducibile dall'ipotesi.

B Se è inverno qualcuno va a sciare oppure qualcuno non ci va: $I \rightarrow \exists x S(x) \vee \exists x \neg S(x)$

$$\begin{array}{c}
 \frac{ax-id \quad \frac{I, S(w) \vdash S(w), \exists x \neg S(x)}{I, S(w) \vdash \exists x S(x), \exists x \neg S(x)} \exists -D_v}{\frac{ax-id \quad \frac{I, S(w) \vdash \exists x S(x), \exists x \neg S(x)}{I, \exists x S(x) \vdash \exists x S(x), \exists x \neg S(x)} \exists -S \ (w \notin VL)}{I, I \rightarrow \exists x S(x) \vdash \exists x S(x), \exists x \neg S(x)} \rightarrow -S \\
 \hline
 \frac{I \rightarrow \exists x S(x), I \vdash \exists x S(x), \exists x \neg S(x)}{I \rightarrow \exists x S(x), I \vdash \exists x S(x) \vee \exists x \neg S(x)} sc_{sx} \\
 \hline
 \frac{I \rightarrow \exists x S(x), I \vdash \exists x S(x) \vee \exists x \neg S(x)}{I \rightarrow \exists x S(x) \vdash I \rightarrow \exists x S(x) \vee \exists x \neg S(x)} \vee -D \\
 \hline
 \frac{\vdash Ip \quad I \rightarrow \exists x S(x) \vdash I \rightarrow \exists x S(x) \vee \exists x \neg S(x)}{\vdash I \rightarrow \exists x S(x) \vee \exists x \neg S(x)} \rightarrow -D \\
 \hline
 \vdash I \rightarrow \exists x S(x) \vee \exists x \neg S(x) \quad comp
 \end{array}$$

L'affermazione B è deducibile dall'ipotesi.

C Se tutti vanno a sciare non è inverno: $\forall x S(x) \rightarrow \neg I$

$$\begin{array}{c}
 \frac{S(w), \forall x S(x), S(w) \vdash \neg I}{S(w), \forall x S(x) \vdash \neg I} \forall -S \\
 \frac{\neg -ax_{dx1} \quad \frac{S(w), \forall x S(x) \vdash \neg I}{\forall x S(x), S(w) \vdash \neg I} sc_{sx}}{\forall x S(x) \vdash I, \neg I} \exists -S \text{ (w } \notin \text{ VL)} \\
 \frac{\forall x S(x) \vdash I, \neg I}{\forall x S(x), I \rightarrow \exists x S(x) \vdash \neg I} \rightarrow -S \\
 \frac{\forall x S(x), I \rightarrow \exists x S(x) \vdash \neg I}{I \rightarrow \exists x S(x), \forall x S(x) \vdash \neg I} sc_{sx} \\
 \frac{\vdash Ip \quad I \rightarrow \exists x S(x), \forall x S(x) \vdash \neg I}{I \rightarrow \exists x S(x) \vdash \forall x S(x) \rightarrow \neg I} \rightarrow -D \\
 \frac{I \rightarrow \exists x S(x) \vdash \forall x S(x) \rightarrow \neg I}{\vdash \forall x S(x) \rightarrow \neg I} comp
 \end{array}$$

Contromodello di Ipotesi \vdash Aff. C

La foglia che non si riesce a derivare

$S(w), \forall x S(x), S(w) \vdash \neg I$

suggerisce il seguente contromodello

$D_{contra} = \{ \text{Minni} \}$

$I^{D_{contra}} = 1$

$S(w)^{D_{contra}}(\text{Minni}) = 1$

In questo modello

$(\forall x S(x))^{D_{contra}} = 1$ perchè sono tutti testimoni dato che nel dominio c'è solo Minni

$(\exists x S(x))^{D_{contra}} = 1$ perchè $S(w)^{D_{contra}}(\text{Minni}) = 1$ (c'è un testimone)

$(\neg I)^{D_{contra}} = 0$

Ipotesi $I^{D_{contra}}: I^{D_{contra}} \rightarrow (\exists x S(x))^{D_{contra}}$ equivale a $1 \rightarrow 1$ equivale a 1

Aff. C $I^{D_{contra}}: (\forall x S(x))^{D_{contra}} \rightarrow (\neg I)^{D_{contra}}$ equivale a $1 \rightarrow 0$ equivale a 0

(Ipotesi \vdash Aff. C) $I^{D_{contra}}$ equivale a $1 \vdash 0$ equivale a 0

Ho trovato un contromodello, quindi l'affermazione C non è deducibile dall'ipotesi.

Esercizio 6 (15 punti)

Stabilire se la seguente regola è sicura rispetto alla semantica classica (nel caso di regola non sicura si analizzi entrambe le inverse)

A

$$\frac{F \vdash \neg C \ \& \ M \qquad C \vdash \neg M}{\neg \neg M \vee F \vdash \neg C} 1$$

Ipotesi

Sia r una riga fissata sulla tabella di verità

- 1) $F \rightarrow \neg C \ \& \ M = 1$, riscritta come $\neg F \vee (\neg C \ \& \ M) = 1$
- 2) $C \rightarrow \neg M = 1$, riscritta come $\neg C \vee \neg M = 1$
- 3) $\neg \neg M \vee F = 1$, riscritta come $M \vee F = 1$

Tesi $\neg C = 1$

Dimostrazione

Considero l'ipotesi 1.

Perchè $\neg F \vee (\neg C \ \& \ M)$ sia uguale a 1 ho due casi possibili:

Caso 1

$\neg F = 1$ e quindi $F = 0$

Ipotesi 1) Dato che $\neg F = 1$ ottengo $1 \vee (\neg C \ \& \ M) = 1$ ok

Ipotesi 3) Dato che $F = 0$ ottengo $M \vee 0$, quindi $M = 1$ in modo che $1 \vee 0 = 1$ ok

Ipotesi 2) Dato che $M = 1$ e $\neg M = 0$ ottengo $\neg C \vee 0$, quindi $\neg C = 1$ in modo che $1 \vee 0 = 1$ ok

Tesi verificata per il caso 1 dato che $\neg C = 1$.

Caso 2

$\neg C \ \& \ M = 1$ e quindi $\neg C = 1$ e $M = 1$

Ipotesi 1) Dato che $\neg C = 1$ e $M = 1$ ottengo $\neg F \vee 1 = 1$ ok

Ipotesi 2) Dato che $\neg C = 1$, $M = 1$ e $\neg M = 0$ ottengo $1 \vee 0 = 1$ ok

Ipotesi 3) Dato che $M = 1$ ottengo $1 \vee F = 1$ ok

Tesi verificata per il caso 2 dato che $\neg C = 1$.

Quindi la regola è valida.

Controllo la sicurezza della regola.

Prima regola inversa:

$$\frac{\neg \neg M \vee F \vdash \neg C}{F \vdash \neg C \ \& \ M} inv_1$$

Ipotesi

Sia r una riga fissata sulla tabella di verità

- 1) $\neg \neg M \vee F \rightarrow \neg C = 1$, riscritta come $\neg(M \vee F) \vee \neg C = 1$
- 2) $F = 1$

Tesi $\neg C \ \& \ M = 0$

Dimostrazione

Dall'ipotesi 2) so che $F = 1$, quindi l'ipotesi 1) diventa $\neg(M \vee 1) \vee \neg C = 1$

Qualsiasi sia il valore di M ottengo $\neg 1 \vee \neg C = 1$, che equivale a $0 \vee \neg C = 1$

Da ciò ricavo che $\neg C = 1$, così anche l'ipotesi 1) è ok

Essendo M un valore qualsiasi, decido di prendere $M = 0$

In questo modo la tesi $\neg C \ \& \ M = 0$ diventa $1 \ \& \ 0 = 0$

La tesi quindi è verificata, perciò la regola non è valida.

Seconda regola inversa:

$$\frac{\neg\neg M \vee F \vdash \neg C}{C \vdash \neg M} \text{ inv}_2$$

Ipotesi

Sia r una riga fissata sulla tabella di verità

1) $\neg\neg M \vee F \rightarrow \neg C = 1$, riscritta come $\neg(M \vee F) \vee \neg C = 1$

2) $C = 1$

Tesi $\neg M = 1$

Dimostrazione

Dall'ipotesi 2) so che $C = 1$, quindi l'ipotesi 1) diventa $\neg(M \vee F) \vee \neg 1 = 1$

Ottengo quindi $\neg(M \vee F) \vee 0 = 1$

Da ciò ricavo che $M = 0$ e $F = 0$, così ho $\neg(0 \vee 0) \vee 0$, che equivale a $\neg 0 \vee 0$

Ottengo $1 \vee 0 = 1$, quindi anche l'ipotesi 1) è ok

Avendo $M = 0$, la tesi $\neg M = 1$ diventa $\neg 0 = 1$

La tesi quindi è verificata, perciò la regola è valida.

Concludiamo che la regola di partenza 1 è valida ma non sicura dato che una sua regola inversa non è valida.

Esercizio 7 (32 punti)

In un gioco due amiche fanno un'affermazione, che è vera o falsa.
Un'affermazione è mancante e l'altra è riportata sotto:

AX.1: Morgana: almeno una di noi afferma il vero: $M \leftrightarrow M \vee C$ riscritta come $(M \rightarrow M \vee C) \& (M \vee C \rightarrow M)$

Si può dedurre, anche se non si conosce l'affermazione di Celeste, quante affermazioni sono vere?

Possibili soluzioni:

- a) No, ma se Celeste dice il vero anche Morgana dice il vero.
- a') No, ma se Morgana dice il vero anche Celeste dice il vero.
- b) Sì, sono vere tutte e due le affermazioni.
- c) Sì, è vera solo l'affermazione di Morgana.
- d) Sì, è vera solo l'affermazione di Celeste.
- e) Nessuna affermazione è vera.

Provo a verificare se entrambe dicono il vero.

$$\frac{(M \rightarrow M \vee C) \& (M \vee C \rightarrow M) \vdash M \quad (M \rightarrow M \vee C) \& (M \vee C \rightarrow M) \vdash C}{(M \rightarrow M \vee C) \& (M \vee C \rightarrow M) \vdash M \& C} \& -D$$

$$\frac{\frac{\frac{\frac{\vdash M, M \vee C, M}{M \rightarrow M \vee C \vdash M \vee C, M} \quad \frac{M \vee C \vdash M \vee C, M}{M \rightarrow M \vee C, M \vdash M} \rightarrow -S \quad \frac{ax - id}{M \rightarrow M \vee C, M \vdash M} \rightarrow -S}{M \rightarrow M \vee C, M \vee C \rightarrow M \vdash M} \rightarrow -S}{(M \rightarrow M \vee C) \& (M \vee C \rightarrow M) \vdash M} \& -S$$

Non è vero che M afferma il vero perchè il sequente radice è falso per $M = 0$ e $C = 0$.

Già da questo posso escludere l'opzione b) secondo cui tutte e due le affermazioni sono vere.

Controllo ora se C afferma il vero.

$$\frac{\frac{\frac{\frac{\vdash M, M \vee C, C}{M \rightarrow M \vee C \vdash M \vee C, C} \quad \frac{M \vee C \vdash M \vee C, C}{M \rightarrow M \vee C, C \vdash C} \rightarrow -S \quad \frac{ax - id}{M \rightarrow M \vee C, C \vdash C} \rightarrow -S}{M \rightarrow M \vee C, M \vee C \rightarrow M \vdash C} \rightarrow -S}{(M \rightarrow M \vee C) \& (M \vee C \rightarrow M) \vdash C} \& -S$$

Non è vero che C afferma il vero perchè il sequente radice è falso per $M = 0$ e $C = 0$.

Posso escludere ora l'opzione c) secondo cui è vera solo l'affermazione di Morgana.

Posso escludere l'opzione d) secondo cui è vera solo l'affermazione di Celeste.

Posso verificare adesso l'opzione e), dato che dalle affermazioni precedenti ho notato la possibilità che entrambe dicano il falso.

$$\frac{(M \rightarrow M \vee C) \& (M \vee C \rightarrow M) \vdash \neg M \quad (M \rightarrow M \vee C) \& (M \vee C \rightarrow M) \vdash \neg C}{(M \rightarrow M \vee C) \& (M \vee C \rightarrow M) \vdash \neg M \& \neg C} \& -D$$

$$\frac{\frac{\neg \neg ax_{dx1} \quad \frac{M \rightarrow M \vee C \vdash M, C, \neg M}{M \rightarrow M \vee C \vdash M \vee C, \neg M} \vee -D \quad \frac{\frac{ax-id \quad M \vdash M, \neg M}{M, M \rightarrow M \vee C, M \vdash \neg M} \neg -D \quad \frac{M, M \vee C, M \vdash \neg M}{M, M \vee C \vdash \neg M} \rightarrow -S}{\frac{M, M \rightarrow M \vee C \vdash \neg M}{M \rightarrow M \vee C, M \vdash \neg M} \rightarrow -S \quad \frac{M \rightarrow M \vee C, M \vee C \rightarrow M \vdash \neg M}{(M \rightarrow M \vee C) \& (M \vee C \rightarrow M) \vdash \neg M} \& -S} sc_{sx}$$

Non è vero che M afferma il falso perchè il sequente radice è falso per $M = 1$ e $C = 1$.

Già da questo posso escludere l'opzione e) secondo cui tutte e due dicono il falso.

Quindi non posso capire quante affermazioni sono vere.

Rimangono le opzioni a) e a').

Controllo l'opzione a).

$$\frac{\frac{ax-id \quad \frac{C, M \rightarrow M \vee C \vdash M, C, M}{C, M \rightarrow M \vee C \vdash M \vee C, M} \vee -D \quad \frac{ax-id \quad C, M \rightarrow M \vee C, M \vdash M}{C, M \rightarrow M \vee C, M \vdash M} \rightarrow -S}{\frac{C, M \rightarrow M \vee C, M \vee C \rightarrow M \vdash M}{C, (M \rightarrow M \vee C) \& (M \vee C \rightarrow M) \vdash M} \& -S} \rightarrow -S$$

$$\frac{(M \rightarrow M \vee C) \& (M \vee C \rightarrow M), C \vdash M}{(M \rightarrow M \vee C) \& (M \vee C \rightarrow M) \vdash C \rightarrow M} sc_{sx} \rightarrow -D$$

Il sequente è derivabile, quindi l'opzione a),

secondo cui se Celeste dice il vero anche Morgana dice il vero, è corretta.