

Μοριοδότηση 2021

Ενδεικτικές απαντήσεις και από γραπτά μαθητών

Θέμα A

A1 - γ

A2 - δ


A3 - γ

A4 - β

A5: $\Sigma - \Lambda - \Sigma - \Sigma - \Lambda$

Θέμα B

B1(ii) – 2 – 6



$\alpha)$ τρόπος

σκάλα ισορροπία $\sum \vec{\tau}_T = \vec{0}$

$$\vec{\tau}_W + \vec{\tau}_F = \vec{0} \Rightarrow W \cdot \frac{l}{2} \cdot \sigma v \nu \varphi = F \cdot l \cdot \eta \mu \varphi$$

$$\vec{\tau}_W + \vec{\tau}_F = \vec{0} \Rightarrow W_y \cdot \frac{l}{2} = F_y \cdot l \Rightarrow W \cdot \sigma v \nu \varphi \cdot \frac{l}{2} = F \cdot \eta \mu \varphi \cdot l$$


σκάλα ισορροπία $\sum \vec{F}_x = \vec{0} \Rightarrow F = T_s$

σκάλα ισορροπία $\sum \vec{F}_y = \vec{0} \Rightarrow W = N$

$$N \cdot \frac{l}{2} \cdot \sigma v \nu \varphi = T_s \cdot l \cdot \eta \mu \varphi \Rightarrow T_s = \frac{N}{2 \cdot \varepsilon \varphi \varphi}$$

στατική τριβή $0 \leq T_s \leq \mu \cdot N$

$$T_s \leq \mu \cdot N \Rightarrow \frac{1}{2 \varepsilon \varphi \varphi} \leq \mu \Rightarrow \varepsilon \varphi \varphi \geq \frac{1}{2 \mu}$$



$\beta) \underline{\tau \rho \delta \pi o \varsigma}$

σκάλα ισορροπία $\sum \vec{\tau}_A = \vec{0}$

$$\vec{\tau}_W + \vec{\tau}_N + \vec{\tau}_{T_s} = \vec{0} \Rightarrow W \cdot \frac{l}{2} \cdot \sigma v \nu \varphi + T_s \cdot l \cdot \eta \mu \varphi = N \cdot l \cdot \sigma v \nu \varphi$$

$$\vec{\tau}_W + \vec{\tau}_N + \vec{\tau}_{T_s} = \vec{0} \Rightarrow W_y \cdot \frac{l}{2} + T_{s_y} \cdot l = N_y \cdot l$$

$$\text{σκάλα ισορροπία } \Sigma \vec{F}_y = \vec{0} \Rightarrow W = N$$


$$W \cdot \frac{l}{2} \cdot \sigma v \nu \varphi + T_s \cdot l \cdot \eta \mu \varphi = W \cdot l \cdot \sigma v \nu \varphi \Rightarrow T_s = \frac{W}{2 \cdot \varepsilon \varphi \varphi}$$

$$\text{στατική τριβή } 0 \leq T_s \leq \mu \cdot N$$

$$T_s \leq \mu \cdot N \Rightarrow \frac{1}{2 \cdot \varepsilon \varphi \varphi} \leq \mu \Rightarrow \varepsilon \varphi \varphi \geq \frac{1}{2\mu}$$

άρα σωστό το *ii*

B2 - (i) - 2 - 6



Bernoulli ($0 \rightarrow 2$)


$$P_{\alpha\tau\mu} + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_0^2 + \rho \cdot g \cdot H = P_{\alpha\tau\mu} + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_2^2 + 0$$

Bernoulli ($1 \rightarrow 2$)

$$P_1 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_1^2 = P_{\alpha\tau\mu} + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_2^2$$

Εξίσωση συνέχειας ($1 \rightarrow 2$)

$$\Pi_1 = \Pi_2 \Rightarrow A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2 \Rightarrow v_1 = \frac{v_2}{2}$$



$\alpha)$ τρόπος

έμβολο ισορροπία $\sum \vec{F} = \vec{0}$

$$F_E = F_{\alpha\mu} + W \Rightarrow \frac{F_E}{A} = \frac{F_{\alpha\mu}}{A} + \frac{W}{A} \Rightarrow P_E = P_{\alpha\mu} + \frac{W}{A}$$

Θεμελιώδης νόμος της υδροστατικής $P_1 = P_E + \rho \cdot g \cdot \frac{H}{4}$

$\beta)$ τρόπος

Θεμελιώδης νόμος της υδροστατικής $P_1 = P_{\alpha\mu} + \frac{w}{A} + \rho \cdot g \cdot \frac{H}{4}$

μετά τις πράξεις

$$W = \frac{\rho \cdot g \cdot H \cdot A}{2}$$



άρα σωστό το i

B3 - (iii) - 2 - 7

ΠΡΙΝ



META



$\alpha) \underline{\tau\rho\delta\pi\circ\varsigma}$

Ελαστική κρούση

$$\sum \vec{F}_x^{\varepsilon\xi} = \vec{0} \Rightarrow A. \Delta. O. (x)$$

$$\vec{p}_{\pi\rho\nu} = \vec{p}_{\mu\varepsilon\tau\dot{\alpha}} \Rightarrow m_1 \cdot v_1 = m_2 \cdot v_2 \cdot \sigma \nu \nu \varphi$$

$$\sum \vec{F}_y^{\varepsilon\xi} = \vec{0} \Rightarrow A. \Delta. O. (y)$$

$$\vec{p}_{\pi\rho\nu} = \vec{p}_{\mu\varepsilon\tau\dot{\alpha}} \Rightarrow 0 = m_1 \cdot v'_1 - m_2 \cdot v'_2 \cdot \eta \mu \varphi$$

$$v'_1 = \frac{v_1}{\sqrt{3}}$$

$\beta) \underline{\tau\rho\delta\pi\circ\varsigma}$

Ελαστική κρούση

$$\eta \mu \varphi = \frac{p'_1}{p'_2} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{p'_1}{p'_2} \Rightarrow p'_2 = 2 \cdot p'_1$$


$$p'^2_2 = p'^2_1 + p^2_1 \Rightarrow 4 \cdot p'^2_1 = p'^2_1 + p^2_1$$

$$p'_1 = \frac{p_1}{\sqrt{3}} \Rightarrow v'_1 = \frac{v_1}{\sqrt{3}}$$


$$\gamma) \underline{\tau\rho\delta\pi\sigma}$$

Ελαστική κρούση


$$\varepsilon\varphi\varphi = \frac{p'_1}{p_1} \Rightarrow v'_1 = \frac{v_1}{\sqrt{3}}$$



ΠΡΙΝ



ΜΕΤΑ



Πλαστική κρούση

$$\sum \vec{F}_{\epsilon\xi} = \vec{0} \Rightarrow A. \Delta. O.$$

$$\vec{p}_{\pi\rho\nu} = \vec{p}_{\mu\varepsilon\tau\dot{\alpha}} \Rightarrow m_1 \cdot v'_1 = (m_1 + m_2) \cdot V_k$$

$$\frac{K_{\sigma\nu\sigma}}{K_1} = \frac{\frac{1}{2}(m_1 + m_3) \cdot V_k^2}{\frac{1}{2}m_1 \cdot v_1^2}$$


και μετά τις πράξεις

$$\frac{K_{\sigma\nu\sigma}}{K_1} = \frac{1}{6}$$

άρα σωστό το *iii*

Θέμα Γ

Π1(6)



α) Τρόπος

$$\bar{P} = I_{\varepsilon\nu}^2 \cdot R_1 \Rightarrow I_{\varepsilon\nu} = \sqrt{\frac{\bar{P}}{R_1}} \Rightarrow I_{\varepsilon\nu} = \sqrt{2}A$$

$$V_{\varepsilon\nu} = I_{\varepsilon\nu} \cdot R_1 \Rightarrow V_{\varepsilon\nu} = 6\sqrt{2} Volt$$

$$V_{\varepsilon\nu} = \frac{V}{\sqrt{2}} \Rightarrow V = V_{\varepsilon\nu}\sqrt{2} \Rightarrow V = 12 \text{ Volt}$$


$\beta) \underline{\tau\rho\delta\pi o\varsigma}$

$$\bar{P} = \frac{V_{\varepsilon\nu}^2}{R_1} \Rightarrow V_{\varepsilon\nu} = \sqrt{\bar{P} \cdot R_1} \Rightarrow V_{\varepsilon\nu} = 6\sqrt{2} \text{ Volt}$$

$$V_{\varepsilon\nu} = \frac{V}{\sqrt{2}} \Rightarrow V = V_{\varepsilon\nu}\sqrt{2} \Rightarrow V = 12 \text{ Volt}$$

$$I_{\varepsilon\nu} = \frac{V_{\varepsilon\nu}}{R_1} \Rightarrow I_{\varepsilon\nu} = \sqrt{2} A$$

Γ2-(6)



$$\omega' = 2\omega \Rightarrow \omega' = 100\pi \frac{r}{s}$$

$$V = N\omega BA \Rightarrow V' = N\omega' BA \Rightarrow V' = 2 \cdot V$$

$$v = V' \cdot \eta\mu(\omega't) \Rightarrow v = 24 \cdot \eta\mu(100\pi \cdot t) \quad S.I.$$


$$I' = \frac{V'}{R_1} \Rightarrow I' = 4A$$

$$i = I' \cdot \eta\mu(\omega't) \Rightarrow i = 4\eta\mu(100\pi t) \quad S.I.$$

$$P_1 = i^2 \cdot R_1 \Rightarrow P_1 = 96\eta\mu^2(100\pi t)^2 \quad S.I.$$

$$t = 5 \cdot 10^{-3} s \Rightarrow P_1 = 96Watt$$

Γ3-(6)



$$t = 0 \quad \dot{\omega}\varsigma \quad t = 2s$$

$$\text{ράβδος ΚΛ } \sum \vec{F} = m \cdot \alpha \Rightarrow \alpha = \frac{F}{m} \Rightarrow \alpha = 1 \frac{m}{s^2}$$

Ομαλά επιπταχυνόμενη κίνηση

$$v_o = \alpha \cdot t \Rightarrow v_o = 2 \frac{m}{s}$$

t=2s

$$E_{\epsilon\pi} = \left| -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \right| = \left| -\frac{B \cdot \Delta S}{\Delta t} \right| = B \cdot v_o \cdot l$$

$$v_o = \sigma\tau\alpha\theta. \Rightarrow \alpha = 0 \Rightarrow \sum F = 0$$


$$F = F_L \quad F_L = B \cdot I_{\epsilon\pi} \cdot l \quad I_{\epsilon\pi} = \frac{E_{\epsilon\pi}}{R_{o\lambda}}$$

$$\frac{1}{R_\pi} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \Rightarrow R_\pi = 2\Omega$$

$$R_{o\lambda} = R_\pi + R_{KA} \Rightarrow R_{o\lambda} = 4\Omega$$

και μετά τις πράξεις $B = 1T$

Γ4-(7)



$\alpha) \underline{\tau\rho\delta\pi\circ\varsigma}$

$$E_{\varepsilon\pi} = B \cdot v_o \cdot l \Rightarrow E_{\varepsilon\pi} = 2V$$

$$E_{\varepsilon\pi} = I_{\varepsilon\pi} \cdot R_{o\lambda} \Rightarrow E_{\varepsilon\pi} = 2V$$

$$V_{KA} = I_{\varepsilon\pi} \cdot R_\pi \Rightarrow V_{KA} = 1V$$

$$V_{KA} = E_{\varepsilon\pi} - I_{\varepsilon\pi} \cdot R_{KA} \Rightarrow V_{KA} = 1V$$

$$I_2 = \frac{V_{KA}}{R_2} \Rightarrow I_2 = \frac{1}{3}A$$

$$Q_2 = I_2^2 \cdot R_2 \cdot \Delta t \Rightarrow Q_2 = 1J$$

$\beta) \underline{\tau\rho\delta\pi\circ\varsigma}$

Θ.Μ.Κ.Ε ($t_1 = 2s \rightarrow t_2 = 5s$)

$$\Delta K = \Sigma W \Rightarrow K_{\tau\varepsilon\lambda} - K_{\alpha\rho\chi} = W_F + W_{F_L}$$

$$\Delta x = v_o \cdot \Delta t \Rightarrow \Delta x = 6m$$

$$0 = F \cdot \Delta x + W_{F_L} \Rightarrow W_{F_L} = -3Joule$$

$$Q_{o\lambda} = |W_{F_L}| \Rightarrow Q_{o\lambda} = 3Joule$$

$$Q_{o\lambda} = Q_1 + Q_2 + Q_{KA}$$

$$Q = I^2 \cdot R \cdot \Delta t \Rightarrow Q = \frac{V^2}{R} \cdot \Delta t$$

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{R_2}{R_1} \Rightarrow \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{1}{2}$$

$$Q_{KA} = I_{\varepsilon\pi}^2 \cdot R_{KA} \cdot \Delta t \quad Q_{1,2} = I_{\varepsilon\pi}^2 \cdot R_\pi \cdot \Delta t$$

$$\frac{Q_{KA}}{Q_{1,2}} = \frac{R_{KA}}{R_\pi} \Rightarrow \frac{Q_{KA}}{Q_{1,2}} = 1$$

και μετά τις πράξεις $Q_2 = 1Joule$

$$t_o = 0 \rightarrow t_1 = 2s$$

$$\Delta x_1 = \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t_1^2 \Rightarrow \Delta x_1 = 2m$$

$$t_1 = 2s \rightarrow t_2 = 5s$$


$$\Delta x_2 = v_o \cdot \Delta t \Rightarrow \Delta x_2 = 6m$$

$$W_F = F \cdot (\Delta x_1 + \Delta x_2) \Rightarrow W_F = 4Joule$$


$$\Pi(\%) = \frac{Q_2}{W_F} \cdot 100\% \Rightarrow \Pi(\%) = 25\%$$

Θέμα Δ


Δ1-(7)



$$m_1 : \text{ισορροπία} \quad \Sigma \vec{F} = \vec{0} \Rightarrow m_1 \cdot g = T_1'$$



$$m_2 : \text{ισορροπία} \quad \Sigma \vec{F}_x = \vec{0} \Rightarrow m_2 \cdot g \cdot \eta \mu \varphi = T_2'$$



τροχαλία Τ: ισορροπία $\sum \vec{\tau}_{(o)} = \vec{0}$

$$\vec{\tau}_{T_1} + \vec{\tau}_{T_2} = \vec{0} \Rightarrow T_1 \cdot r_1 = T_2 \cdot r_2 \Rightarrow T_1 = \frac{T_2}{2}$$

τροχαλία Τ: ισορροπία $\sum \vec{F}_x = \vec{0}$

$$F_{ox} = T_{2x} \Rightarrow F_{ox} = T_2 \cdot \sigma v v \varphi$$


τροχαλία Τ: ισορροπία $\sum \vec{F}_y = \vec{0}$

$$F_{oy} = T_1 + M \cdot g + T_2 \cdot \eta \mu \varphi$$

και μετά τις πράξεις $F_{ox} = 24N$ και $F_{oy} = 48N$

$$F_o = \sqrt{F_{ox}^2 + F_{oy}^2} \Rightarrow F_o = 24\sqrt{5}N$$

Δ2-(5)



$\Sigma_2 : A. \Delta. M. E. (I \rightarrow II)$

$$E_{Mhx}^{(I)} = E_{Mhx}^{(II)} \Rightarrow K^{(I)} + U^{(I)} = K^{(II)} + U^{(II)}$$

$$m_2 \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m_2 \cdot v_2^2 \Rightarrow v_2 = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} \Rightarrow v_2 = 6 \frac{m}{s}$$

$\Sigma_2 : (\Gamma \rightarrow \Delta) \quad E.O.K. \Delta x = v_2 \cdot \Delta t$

$$\Delta t = \frac{l}{v_2} \Rightarrow \Delta t = 0.314s$$

$\Sigma_3 : (A. \Theta. \rightarrow \Theta. I.)$

$$\Delta t = \frac{T}{4} \Rightarrow T = 0.4\pi$$

$\alpha) \underline{\tau \rho \circ \pi o \varsigma}$

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{m_3}{k}} \Rightarrow k = 125 \frac{N}{m}$$

$\beta) \underline{\tau \rho \circ \pi o \varsigma}$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow \omega = 5 \frac{r}{s}$$


$$k = m_3 \cdot \omega^2 \Rightarrow k = 125 \frac{N}{m}$$

Δ3-(5)


$$\Theta \cdot I. \equiv \Theta \cdot \Phi \cdot M. \Rightarrow v_3 = v_{max} = A \cdot \omega \Rightarrow v_3 = 1 \frac{m}{s}$$

Κεντρική ελαστική κρούση, ίσες μάζες ανταλλαγή ταχυτήτων

ΠΡΙΝ



ΜΕΤΑ



$$v'_3 = v_2 \Rightarrow v_3 = 6 \frac{m}{s} \quad (\delta\varepsilon\xi\iota\dot{\alpha})$$

$$v'_3 = A' \cdot \omega \Rightarrow A' = 1.2m$$

$$\left. \begin{array}{l} t_o = 0 \\ x = 0 \\ v'_3 < 0 \end{array} \right\} x = A \cdot \eta\mu(\omega t + \varphi_o)$$

$$0 = \eta\mu\varphi_o \Rightarrow \eta\mu\varphi_o = \eta\mu 0$$

$$\varphi_o = 2 \cdot k \cdot \pi + 0 \Rightarrow \varphi_o = 0 \text{ rad} \quad \text{απορριπτεται} \quad v'_3 < 0$$


$$x = 1.2 \cdot \eta\mu(5t + \pi) \quad S.I.$$

Δ4-(6)

$$t_2 : \quad K = 8 \cdot U \quad E_{\tau\alpha\lambda} = K + U \quad U = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$$

Από Α.Δ.Ε.Τ. μετά τις πράξεις έχουμε: $x = \pm 0.4m$

$$x_Z = -0.4m$$



$$\Sigma \vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = -D \cdot \vec{x}$$

$$\frac{\Delta p}{\Delta t} = +50 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$t_2 : K = 8 \cdot U \quad E_{\tau\alpha\lambda} = K + U \quad K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

Από Α.Δ.Ε.Τ. μετά τις πράξεις έχουμε: $v = \sqrt{32} \frac{m}{s}$

$$|\frac{\Delta K}{\Delta t}| = |\frac{\Delta W}{\Delta t}| = |\Sigma F \cdot v \cdot \sigma v \nu \varphi|$$

$$\text{και μετά τις πράξεις } \frac{\Delta K}{\Delta t} = 200\sqrt{2} \frac{\text{Joule}}{\text{s}}$$

Δ5-(3)

Κεντρική ελαστική κρούση, ίσες μάζες ανταλλαγή ταχυτήτων

$$v'_2 = v_3 \Rightarrow v'_2 = 1 \frac{m}{s}$$

Θ.Ι. ≡ Θ.Φ.Μ. άρα για πρώτη φορά μετά την κρούση το Σ_3 διέρχεται από την Θ.Φ.Μ. σε χρόνο:

$$\Delta t' = \frac{T}{2} \Rightarrow \Delta t' = 0.2\pi s$$

$$\Sigma_2 : E.O.K. \quad x = v'_2 \cdot \Delta t' \Rightarrow x = 0.628m$$

Μπορείτε να εκτυπώσετε τις λύσεις σε μορφή pdf από [εδώ](#) και τα θέματα από [εδώ](#)

[← Previous](#) [Archive](#) [Next →](#)

ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING MATHEMATICS

Τροχαλία και ακίνητο σώμα

ένας μήνας πριν

Φυσική Γ' Λυκείου

Ευθύγραμμη ομαλά ...

3 μήνες πριν

Φυσική Α' Λυκείου

Διαγώνισμα στο στερεό

2 μήνες πριν

Φυσική Γ' Λυκείου

Προσ

3 μέρες

με την

0 Σχόλια

Science Technology Engineering Mathematics

 Πολιτική Απορρήτου

 Panagiotis Petridis

 Προτείνετε

 Tweet

 Κοινοποίηση

Ταξινόμηση με βάση τα καλύτερα



Ξεκινήστε την συζήτηση...

Γράψτε το πρώτο σχόλιο.

 Συνδρομή

 Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σας

Published

21 June 2021

Category

Άσκηση

Tags

Βαθμολογικό 17

© 2021 Panagiotis Petridis with help from [Jekyll Bootstrap](#) and [The Hooligan Theme](#)