



# 厦门大学微积分 (III-2) 课程期末试卷

经管类试卷: (A 卷)

考试日期: 2018. 6. 20

1、(5 分) 计算曲线积分  $I = \int_L (x^2 + y^2) ds$ , 其中  $L$  是圆心在  $(1, 0)$ 、半径为 1 的上半圆周。

得分	
评阅人	

解: 由于上半圆周的参数方程为

$$x = (1 + \cos t), y = \sin t \quad (0 \leq t \leq \pi)$$

所以

$$\begin{aligned} I &= \int_0^\pi [(1 + \cos t)^2 + \sin^2 t] \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} dt \\ &= 2 \int_0^\pi (1 + \cos t) dt = 2[t + \sin t]_0^\pi = 2\pi \end{aligned}$$

2、(10 分) 设曲线积分  $\int_L xy^2 dx + y\varphi(x) dy$  与路径无关, 其中  $\varphi$  具有连续的导数, 且  $\varphi(0) = 0$ , 计算  $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\varphi(x) dy$ 。

得分	
评阅人	

解: 由  $P(x, y) = xy^2, Q(x, y) = y\varphi(x)$ , 得

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(xy^2) = 2xy, \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}[y\varphi(x)] = y\varphi'(x)$$

因积分与路径无关, 有  $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ , 故  $y\varphi'(x) = 2xy$ , 从而

$$\varphi(x) = x^2 + C$$

由  $\varphi(0) = 0$ , 得  $C = 0$ , 即  $\varphi(x) = x^2$ 。所以

$$\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\varphi(x) dy = \int_0^1 0 dx + \int_0^1 y dy = \frac{1}{2}$$

3、(10 分) 计算  $I = \oint_L \frac{xdy-ydx}{4x^2+y^2}$ , 其中  $L$  是以点  $(1, 0)$  为中心,  $R$  为半径的圆周 ( $R \neq 1$ ), 方向取逆时针方向。

得分	
评阅人	

解: 记  $L$  围成的闭区域为  $D$ , 当  $R < 1, (0,0) \notin D$  时, 有

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{x}{4x^2+y^2} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{-y}{4x^2+y^2} \right) = \frac{\partial P}{\partial y}$$

根据格林公式,  $I = \oint_L \frac{xdy-ydx}{4x^2+y^2} = \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = 0$

当  $R > 1, (0,0) \in D$  时, 作一位于  $D$  内的椭圆  $l: 4x^2 + y^2 = r^2$ , 方向取逆时针方向。

记由  $l$  和  $L$  所围成的区域为  $D_1$ , 则由格林公式得

$$\oint_L \frac{xdy-ydx}{4x^2+y^2} - \oint_l \frac{xdy-ydx}{4x^2+y^2} = \iint_{D_1} \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = 0$$

所以利用  $l$  的参数式方程  $x = \frac{r}{2} \cos t, y = r \sin t$  ( $0 \leq t \leq 2\pi$ ), 得

$$\oint_L \frac{xdy-ydx}{4x^2+y^2} = \oint_l \frac{xdy-ydx}{4x^2+y^2} = \int_0^{2\pi} \frac{\frac{r^2}{2} \cos^2 t + \frac{r^2}{2} \sin^2 t}{r^2} dt = \pi$$

4. 判断下列级数是绝对收敛、条件收敛还是发散。(每小题 5 分, 共 20 分)

得分	
评阅人	

(1)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 2^n}{(n+1)!}$

解: 根据比值审敛法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2 2^{n+1}}{(n+2)!} \cdot \frac{(n+1)!}{n^2 2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n+2} \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^2 = 0$$

该级数绝对收敛。

(2)  $\sum_{n=1}^{\infty} (-2)^n \sin \frac{\pi}{3^n}$

解: 因为  $\sin \frac{\pi}{3^n} \sim \frac{\pi}{3^n}$ , 所以  $|(-2)^n \sin \frac{\pi}{3^n}| \sim \left(\frac{2}{3}\right)^n \pi$

且级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$  收敛, 知原级数绝对收敛。

$$(3) \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1}$$

解:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^n n}{n+1} \right| = 1 \neq 0$

所以原级数发散。

$$(4) \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n}$$

解: 绝对级数  $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{\ln n}{n} > \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n}$ , 易知绝对级数发散

令  $f(x) = \frac{\ln x}{x}$  ( $x > 3$ ), 则

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} < 0 \quad (x > 3)$$

即  $x > 3$  时,  $\{\frac{\ln n}{n}\}$  是递减数列, 又利用洛必达法则, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

故由莱布尼茨定理知该级数条件收敛。

5、(10 分) 求  $\frac{\pi}{4} - 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 4^n}{2n+1} x^{2n+1}$  的收敛域及和函数, 并计算  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$  的和。

解: 因为幂级数只有奇数阶次幂, 所以利用比值审敛法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(-1)^n 4^n}{2n+1} x^{2n+1}}{\frac{(-1)^{n-1} 4^{n-1} x^{2n-1}}{2n-1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2n-1}{2n+1} 4x^2 \right| = 4x^2 < 1$$

所以收敛半径  $R = \frac{1}{2}$ 。当  $x = \frac{1}{2}$  时,  $2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 4^n}{2n+1} x^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 4^n}{2n+1} x^{2n} =$

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ , 交错级数满足莱布尼茨定理的条件, 收敛; 当  $x = -\frac{1}{2}$  时,

$2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 4^n}{2n+1} x^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 4^n}{2n+1} x^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n+1}$ , 同理收敛。综上, 收敛

域  $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 。

$$s(x) = \frac{\pi}{4} - 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 4^n}{2n+1} x^{2n+1}$$

$$s'(x) = -2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 4^n x^{2n} = \frac{-2}{1+4x^2} \quad (|x| < \frac{1}{2})$$

又  $s(0) = \frac{\pi}{4}$ , 由积分公式

$$s(x) = s(0) + \int_0^x s'(x) dx = \frac{\pi}{4} - \tan^{-1} 2x \quad (|x| < \frac{1}{2})$$

因为  $s(x)$  在  $|x| = \frac{1}{2}$  点处连续, 所以  $s(x) = \frac{\pi}{4} - \tan^{-1} 2x \quad (|x| \leq \frac{1}{2})$ 。

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4} - s\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{4} - \left(\frac{\pi}{4} - \tan^{-1} 1\right) = \frac{\pi}{4}$$

6、(10 分) 设  $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x^2)}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ , (1) 将  $f(x)$  展成  $x$  的幂级数, 给出收敛域;

(2) 求  $f^{(45)}(0)$ 。

解: (1)

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \quad (-1 < x \leq 1)$$

$$\ln(1+x^2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^{2n} \quad (-1 \leq x \leq 1)$$

当  $-1 \leq x \leq 1$  且  $x \neq 0$  时,  $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^{2n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{2n+1}$ , 易知  $f(x)$  在 0 点处连续, 所以收敛域  $[-1, 1]$ 。

(2) 由  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(0) x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{2n+1} \quad (-1 \leq x \leq 1)$ ,

$$f^{(45)}(0) = 45! \frac{(-1)^{22}}{22+1} = \frac{45!}{23}$$

7、(10 分) 求方程  $y^{(4)} + y'' = x - 5$  的通解。

解: 对应齐次方程的特征方程为

$$\lambda^4 + \lambda^2 = 0$$

解得  $\lambda = 0, 0, \pm i$ , 于是对应齐次方程的通解为  $Y = (C_1 + C_2 x) + C_3 \cos x + C_4 \sin x$ 。

设所给方程的特解为  $y^* = x^2(ax + b)$ , 代入方程有

$$6ax + 2b = x - 5$$

得分	
评阅人	

比较系数，得 $a = \frac{1}{6}$ ,  $b = -\frac{5}{2}$ ，于是 $y^* = \frac{1}{6}x^3 - \frac{5}{2}x^2$ 。从而得到所给方程的通解

$$y(x) = (C_1 + C_2x) + C_3 \cos x + C_4 \sin x + \frac{1}{6}x^3 - \frac{5}{2}x^2$$

其中 $C_1, C_2, C_3, C_4$ 为任意常数。

8、(10 分) 已知二阶常系数非齐次线性方程的三个特解分别为 $y_1 = \cos 2x - \frac{1}{4}x \cos 2x$ ,  $y_2 = \sin 2x - \frac{1}{4}x \cos 2x$ ,  $y_3 = -\frac{1}{4}x \cos 2x$ ，求该微分方程并给出通解。

解：根据二阶常系数非齐次线性方程解的结构，可以推出

$-\frac{1}{4}x \cos 2x$ 是方程的一个特解。 $\cos 2x, \sin 2x$ 是对应齐次方

程的两个特解，即对应齐次方程的通解为 $C_1 \cos 2x +$

$C_2 \sin 2x$ 。特征方程 $r^2 + pr + q = 0$ 有一对共轭复根 $\pm 2i$ 。

$$r^2 + pr + q = (r - 2i)(r + 2i) = r^2 + 4 = 0$$

对应齐次方程为 $y'' + 4y = 0$ 。设非齐次方程为 $y'' + 4y = f(x)$ ，将 $-\frac{1}{4}x \cos 2x$ 代

入非齐次方程求得 $f(x) = \sin 2x$ 。所以该微分方程为

$$y'' + 4y = \sin 2x$$

通解为

$$y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x - \frac{1}{4}x \cos 2x$$

9、(10 分) 设曲线 L 上位于第一象限内任意一点 M 处的切线总于 y 轴相交，交点为 A，已知 $|\overline{MA}| = |\overline{OA}|$ ，且曲线 L 过点 $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$ ，求曲线 L 的方程。

解：易知点 M 处的切线方程为

$$Y - y = y'(X - x)$$

点 A 坐标为 $(0, y - xy')$ 。由 $|\overline{MA}| = \sqrt{x^2 + (xy')^2}$ ,  $|\overline{OA}| = |y - xy'|$ 可得

得分	
评阅人	

得分	
评阅人	

$$x^2 + (xy')^2 = y^2 - 2xyy' + (xy')^2$$

化简得

$$y' = \frac{1}{2} \left( \frac{y}{x} - \frac{x}{y} \right)$$

该方程是齐次方程，令  $u = \frac{y}{x}$ ，代入方程并分离变量得到

$$\frac{2uu'}{u^2 + 1} = -\frac{1}{x}$$

两端分别积分并化简可得通解  $u^2 = \frac{C}{x} - 1$  ( $C \neq 0$ )，其中  $C$  为任意常数。将  $u = \frac{y}{x}$  代入通解并令通解过  $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$  点，解出  $C = 3$ ，所以曲线  $L$  的方程为

$$y^2 = 3x - x^2$$

10、(5 分)求方程 $y_{x+1} + 2y_x = 2x - 1 + e^x$ 的通解。

解：

对应齐次方程的通解为

$$y = C(-2)^x$$

设 $y_1^*(x) = a_0x + a_1, y_2^* = Ae^x$ ，于是 $y^*(x) = a_0x + a_1 + Ae^x$ 代入方程有

$$3a_0x + a_0 + 3a_1 + (Ae + 2A)e^x = 2x - 1 + e^x$$

比较系数，得 $a_0 = \frac{2}{3}, a_1 = -\frac{5}{9}, A = \frac{1}{e+2}$ ，从而有

$$y^*(x) = \frac{2}{3}x - \frac{5}{9} + \frac{1}{e+2}e^x$$

所给方程的通解为

$$y(x) = C(-2)^x + \frac{2}{3}x - \frac{5}{9} + \frac{1}{e+2}e^x$$

其中 C 为任意常数。

得分	
评阅人	