

Homework 11

抹茶奶绿

May 12, 2025



Exercise 1.

从一批产品随机地取 100 个样品进行检测, 发现 40 个不合格, 求这批产品合格率 p 的 95% 置信区间估计.

Solution.

记样本合格率 $\hat{p} = 0.60$, 正态近似

$$\hat{p} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$$

由

$$P(|\hat{p} - p| \leq z_{0.975} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}) \approx 0.95$$

可得

$$n(\hat{p} - p)^2 \leq z^2 p(1-p) \implies (n + z^2)p^2 - (2n\hat{p} + z^2)p + n\hat{p}^2 \leq 0$$

于是

$$p = \frac{2n\hat{p} + z^2 \pm z\sqrt{z^2 + 4n\hat{p}(1-\hat{p})}}{2(n + z^2)}$$

代入 $n = 100$, $\hat{p} = 0.60$, $z^2 = 1.96^2 \approx 3.8416$

$$p_L \approx \frac{123.8416 - 1.96\sqrt{99.8416}}{207.6832} \approx 0.502 \quad p_U \approx \frac{123.8416 + 1.96\sqrt{99.8416}}{207.6832} \approx 0.690$$

因此在近似下, 95% 置信区间约为 (0.502, 0.690).

Exercise 2.

设随机样本 X_1, \dots, X_n 来自概率密度

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

其中未知参数 $\theta > 0$, $\hat{\theta}$ 为 θ 的极大似然估计量.

(1) 当 $n = 4$ 时, 一组样本观测值为 $X = (1/2, 1/3, 1/5, 1/5)$, 利用 Fisher 信息量和该组观测值给出 $\hat{\theta}$ 的标准误差估计.

(2) 基于 (1) 的估计给出满足 95% 要求的 θ 的置信区间.

Solution.

(1) 似然函数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^4 \theta x_i^{\theta-1} = \theta^4 \left(\prod_{i=1}^4 x_i \right)^{\theta-1}$$

对数似然

$$\ell(\theta) = 4 \ln \theta + (\theta - 1) \sum_{i=1}^4 \ln x_i \implies \hat{\theta} = -\frac{4}{\sum_{i=1}^4 \ln x_i}$$

计算 $\sum \ln x_i = \ln \frac{1}{2} + \ln \frac{1}{3} + 2 \ln \frac{1}{5} = -\ln 2 - \ln 3 - 2 \ln 5 \approx -4.6052$, 故

$$\hat{\theta} \approx \frac{4}{4.6052} \approx 0.8685$$

Fisher 信息量

$$I(\theta) = -E\left[\frac{\partial^2 \ell}{\partial \theta^2}\right] = \frac{4}{\theta^2}$$

因此

$$\text{se}(\hat{\theta}) \approx \frac{1}{\sqrt{I(\hat{\theta})}} = \frac{\hat{\theta}}{\sqrt{4}} = \frac{0.8685}{2} = 0.4343$$

(2) 近似 $\hat{\theta} \sim N(\theta, \text{se}^2(\hat{\theta}))$, 取 $z_{0.975} = 1.96$, 则

$$\hat{\theta} \pm z_{0.975} \text{se}(\hat{\theta}) = 0.8685 \pm 1.96 \times 0.4343 = 0.8685 \pm 0.8504$$

故 95% 置信区间约为

$$(0.8685 - 0.8504, 0.8685 + 0.8504) \approx (0.0181, 1.7189)$$

$n = 4$ 太小导致误差较大 (?)

Exercise 3.

假设总体服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 参数 μ 已知, σ^2 未知, X_1, \dots, X_n 为其随机样本, 常数 $0 < \alpha < 1$.

- (1) 求 σ 的极大似然估计 $\hat{\sigma}$.
- (2) 利用 Fisher 信息量给出 $\hat{\sigma}$ 的标准误差估计.
- (3) 利用 $\hat{\sigma}$ 给出 $\log \sigma$ 的 $1 - \alpha$ 置信区间估计.

Solution.

(1) 总体密度

$$f(x; \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$$

对数似然函数

$$\ell(\sigma) = \sum_{i=1}^n \left[-\ln \sigma - \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2} \right] = -n \ln \sigma - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

求导

$$\frac{\partial \ell}{\partial \sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \stackrel{!}{=} 0 \implies \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2, \quad \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}$$

(2) Fisher 信息量

$$I(\sigma) = -E\left[\frac{\partial^2 \ell}{\partial \sigma^2}\right] = -E\left[\frac{n}{\sigma^2} - \frac{3}{\sigma^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2\right] = -\left(\frac{n}{\sigma^2} - \frac{3n\sigma^2}{\sigma^4}\right) = \frac{2n}{\sigma^2}$$

因此

$$\text{se}(\hat{\sigma}) \approx \frac{1}{\sqrt{I(\hat{\sigma})}} = \frac{1}{\sqrt{2n/\hat{\sigma}^{-1}}} = \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{2n}}$$

(3) 我们关心 $\tau = \log \sigma$. 由 Delta 方法

$$\text{Var}(\log \hat{\sigma}) \approx \left(\frac{d}{d\sigma} \log \sigma\right)^2 \text{Var}(\hat{\sigma}) = \frac{1}{\hat{\sigma}^2} \left(\frac{\hat{\sigma}^2}{2n}\right) = \frac{1}{2n}$$

于是近似 $\log \hat{\sigma} \sim N(\log \sigma, 1/(2n))$. 取 $z_{1-\alpha/2}$ 为标准正态上 $1 - \alpha/2$ 分位点, 可得

$$\left[\log \hat{\sigma} - \frac{z_{1-\alpha/2}}{\sqrt{2n}}, \log \hat{\sigma} + \frac{z_{1-\alpha/2}}{\sqrt{2n}} \right]$$

Exercise 4.

为提高某化学生产过程的得率，原催化剂 20 次试验的得率均值为 91.73，样本方差为 3.89；新催化剂 30 次试验的得率均值为 93.75，样本方差为 4.02. 假设两总体正态且独立，不假设方差相等，求两总体均值差的 95% 置信区间.

Solution.

构造标准正态变量

$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

用样本方差替代总体方差后，置信区间变为

$$\mu_1 - \mu_2 \in (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm z_{1-\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

那么置信区间为

$$(-3.1434, -0.8966)$$

Exercise 5.

李雷和韩梅梅开始约会，韩梅梅迟到时间 $X \sim U[0, \theta]$ ，先验 $\theta \sim U[0, 1]$ （小时）. 若观测到 $X = x$ ，求更新后的 θ 的后验分布.

Solution.

观测模型为

$$f(x | \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

先验为

$$\pi(\theta) = \begin{cases} 1, & 0 < \theta < 1, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

后验密度（未标准化）

$$f(\theta | x) \propto \frac{1}{\theta} \cdot \mathbf{1}_{x < \theta < 1}$$

归一化常数

$$C = \int_x^1 \frac{1}{\theta} d\theta = -\ln x$$

因此

$$f(\theta | x) = \begin{cases} -\frac{1}{\theta \cdot \ln x}, & x < \theta < 1, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

Exercise 6.

计算硬币正面朝上概率 θ 的后验众数估计（MAP）. 并给出 $n = 20, x = 13$ 时的具体值，讨论其与 MLE 的关系.

Solution.

先验密度 $f(\theta) \propto \theta^{\alpha-1}(1-\theta)^{\beta-1}$, 似然 $\theta^x(1-\theta)^{n-x}$. 后验 $\text{Beta}(\alpha+x, \beta+n-x)$. 于是

$$\hat{\theta}_{\text{MAP}} = \frac{\alpha+x-1}{\alpha+\beta+n-2}$$

若采用非信息先验 $\alpha = \beta = 1$, 则 $\hat{\theta}_{\text{MAP}} = \frac{x}{n} = \hat{\theta}_{\text{MLE}}$. 当 $n = 20, x = 13$, $\text{MAP} = 13/20 = 0.65$.

Exercise 7.

假设总体 $X_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, 先验 $\mu \sim N(\mu_0, \sigma_0^2)$.

(1) 求 μ 的 MAP 估计; (2) 求 μ 的后验均值估计.

Solution.

似然函数

$$L(\mu) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$$

先验分布

$$\pi(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_0^2}} \exp\left\{-\frac{(\mu - \mu_0)^2}{2\sigma_0^2}\right\}$$

由共轭性, 后验分布仍为正态分布

$$\mu | \mathbf{X} \sim N(\mu_n, \sigma_n^2)$$

其中

$$\mu_n = \frac{n\sigma_0^2\bar{X} + \sigma^2\mu_0}{n\sigma_0^2 + \sigma^2}, \quad \sigma_n^2 = \frac{\sigma^2\sigma_0^2}{n\sigma_0^2 + \sigma^2}$$

(1) **MAP 估计**: 即后验分布的众数, 由于后验是正态分布, 其众数就是均值, 因此

$$\hat{\mu}_{\text{MAP}} = \mu_n = \frac{n\sigma_0^2\bar{X} + \sigma^2\mu_0}{n\sigma_0^2 + \sigma^2}$$

(2) 后验均值估计: 正态分布的期望就是其均值, 因此:

$$\hat{\mu}_{\text{Bayes}} = E[\mu | \mathbf{X}] = \mu_n = \frac{n\sigma_0^2\bar{X} + \sigma^2\mu_0}{n\sigma_0^2 + \sigma^2}$$

Exercise 8.

设随机变量 X 的分布列 $P(X = k|\theta) = \theta(1-\theta)^k$, $k = 0, 1, 2, \dots$, 先验 $\theta \sim U(0, 1)$. 三次独立观测得 $x_1 = 2, x_2 = 3, x_3 = 5$.

(1) 求 θ 的后验密度; (2) 求后验均值估计.

Solution.

三次观测值的联合似然函数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^3 \theta(1-\theta)^{x_i} = \theta^3(1-\theta)^{\sum x_i} = \theta^3(1-\theta)^{10}$$

先验为 $\pi(\theta) = 1$ 在 $(0, 1)$ 上均匀, 故后验密度

$$f(\theta | x) \propto \theta^3(1-\theta)^{10}$$

归一化

$$f(\theta | x) = \frac{\theta^3(1-\theta)^{10}}{\text{Beta}(4, 11)}$$

Beta(α, β) 分布的均值为 $\frac{\alpha}{\alpha + \beta}$, 代入后验参数

$$\mathbb{E}[\theta | x_1, x_2, x_3] = \frac{4}{15}$$

Exercise 9.

(Bayes 区间估计) 总体 $X_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, $0 < \alpha < 1$.

- (1) 先验 $\mu \sim N(\mu_0, \sigma_0^2)$, 求使后验包含概率 $1 - \alpha$ 且长度最短的区间;
- (2) 当 $\sigma_0^2 \rightarrow \infty$ 时, 估计 (1) 中区间的极限情况, 并比较其与经典置信区间, 并直观解释;
- (3) 若先验 $f(\mu) \propto 1$, 分别给出 μ 的后验分布, MAP 区间和等尾可信区间, 并与经典方法比较.

Solution.

- (1) 似然函数 $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$; 先验 $\mu \sim N(\mu_0, \sigma_0^2)$

由共轭性, 后验分布仍为正态

$$\mu | \mathbf{X} \sim N(\mu_n, \sigma_n^2)$$

其中

$$\mu_n = \frac{n\sigma_0^2\bar{X} + \sigma^2\mu_0}{n\sigma_0^2 + \sigma^2}, \quad \sigma_n^2 = \frac{\sigma^2\sigma_0^2}{n\sigma_0^2 + \sigma^2}$$

因为后验为正态分布, 长度最短的 $1 - \alpha$ 区间即为对称区间

$$[\mu_n - z_{1-\alpha/2} \cdot \sigma_n, \mu_n + z_{1-\alpha/2} \cdot \sigma_n]$$

- (2) 当 $\sigma_0^2 \rightarrow \infty$, $\mu_n \rightarrow \bar{X}$, $\sigma_n^2 \rightarrow \frac{\sigma^2}{n}$, 所以后验分布变为

$$\mu | \mathbf{X} \sim N\left(\bar{X}, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

于是 (1) 中区间退化为:

$$\left[\bar{X} - z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

这恰好是经典的 $1 - \alpha$ 置信区间.

先验变得非常“平”, 它对后验几乎没有影响.

- (3) 若先验 $f(\mu) \propto 1$, 这相当于 $\sigma_0^2 \rightarrow \infty$, 即一个无信息先验, 等价于第 (2) 问的极限情形. 因此此时后验分布为:

$$\mu | \mathbf{X} \sim N\left(\bar{X}, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

MAP 与等尾可信区间均为经典区间

$$\left[\bar{X} - z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

Exercise 10.

(计算机实验续) 利用作业 10-11 的结果给出 $\theta = e^\mu$ 的 95% 置信区间估计, 并讨论其他构造置信区间的方法.

Solution.

代码如下:

```

1 from random import normalvariate as norm, choice
2 from math import exp, sqrt, log
3
4 def data_set(n: int):
5     data = []
6     observation = []
7     for i in range(0, n):
8         data += [norm(5, 1)]
9     for i in range(0, n):
10        observation += [choice(data)]
11    return exp(sum(observation) / n)
12
13 theta = []
14 for i in range(0, 1000):
15     theta += [data_set(100)]
16 mean = sum(theta)/1000
17 alpha = exp(1/200)
18 print("1:", [mean/(alpha+1.96*sqrt(alpha*(alpha-1)/1000)), mean/(alpha-1.96*sqrt(alpha*(alpha-1)/1000))])
19 x = sum([log(data_set(100)) for i in range(0, 1000)]) / 1000
20 print("2:", [exp(x - 1.96 * (10**(-2.5))), exp(x + 1.96 * (10**(-2.5)))])

```

输出结果:

1 : [148.80640899688925, 150.11485329551672]

2 : [147.25682892324858, 149.09360441846417]

若先得到:

$$\mu \in \left[\bar{X} - z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

对两端取指数变换即可得到 θ 的置信区间:

$$\theta \in \left[e^{\bar{X} - z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}}, e^{\bar{X} + z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right]$$