枯草之间的空隙

每日一课 · 5张范例 · 每张九项深入解读

读这份点评的方法

先看照片五秒，说出第一视觉落点和整体感受，再读文字。每张依次分为三页：明暗与清晰；快门、构图、色彩与光线；机位、主题与自己的练习。阅读不等于接受唯一答案，试着用图中证据支持或修正自己的判断。

哪些是事实，哪些是解释

曝光参数来自sources.json保存的Commons原图元数据；颜色、边缘与亮暗是现有图像上的观察；光向、焦点与氛围解释在证据不足时标明可能性。Z30设置均为教学建议，不能冒充作者使用过的参数。没有EXIF的拍法会写（推测）。

先借鉴原则，再考虑复制外观

手机、小型相机和不同画幅镜头不能直接照抄焦距或光圈。套头不够近、没有同样树种或没有相同场所时，可以换对象、距离与取景范围。每张最后都有可完成的对照练习和成片检查。

本题五张的阅读顺序

01｜林地上的茎彼此分开
02｜石缝从草根里露出来
03｜灰天空被芒线切开
04｜白芒之间还留着缝
05｜颖壳之间的窄缝

今天这一课有好几个题材

导读把今天的题材连成一件事。这一份点评只负责其中一个。每张范例末尾有一个当天能用套头完成的练习。时间紧就每个题材交一张，不要把一个题材里的五张都仿一遍。

01｜林地上的茎彼此分开

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



01.jpg · Krzysztof Ziarnek, Kenraiz · CC BY-SA 4.0

1．明暗与曝光

几丛细茎立在林地上，茎是浅褐，地面是深一块浅一块的落叶，后面的树干较暗，树叶仍绿。视线从中间最高的一丛开始，再看见茎与茎之间的地面。最暗的是树干，不是空隙本身。来源为尼康Z 6_2，50mm，f/5.6，1/200秒，ISO 400，35mm等效50mm，时间2024-09-03 10:41。没有软件字段。亮部没有大片死白，落叶的深浅还在。

2．对焦与景深

中部的茎和近处的落叶比较清楚，背景的树稍软，但仍能认出是树干。f/5.6和50mm没有把林地化成一块颜色。对焦点没有标明。全画幅50mm的视角，Z30大约用35mm才能接近，景深不会相同。这张要的是茎之间的地面还能被指出来，所以复拍用f/8，让空隙不要先于茎消失。若只有一根清楚，空隙就没法比较。

01｜林地上的茎彼此分开

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

记录快门1/200秒。细茎没有明显拖影，1/200秒在50mm上对静止的草够用，风来就偏慢。九月上旬的上午，和茎已经变干、树上还有绿叶相符。来源说明写的是波兰巴比戈什奇附近的拂子茅。1/200秒不能证明林间完全无风。慢门改变不了落叶从茎之间露出来这件事，只会让细茎变双。

4．构图与内容

主体是空隙，不是某一根最亮的茎。中间的丛较密，右侧还有更小的一丛，两丛之间和每一丛内部都能看见落叶。茎大多竖直，所以这张不改去练倒伏，只看空。若凑近到茎贴满画面，地面就没了；若退到只剩树林，茎会细得不可读。昨天的落叶课看叶子的疏密，今天这些落叶只是空隙里的底，不要把题目交还给叶子。

5．色彩

浅褐的茎、褐绿的落叶和背景的绿。绿会把季节说成还没到冬天，这是诚实的，但组织画面的是茎和地面的交替。把颜色想成明暗，细茎仍比许多落叶亮，空隙仍是一块块地面。若把落叶调成和茎一样的金，空隙会被填上。颜色的任务只是帮我们确认：露出来的是地面，不是另一丛草。

6．光线与光影

茎有亮边，地面上有斑驳的明暗，光穿过树，方向不能从一张图定死（推测为林间的散射加局部的直射）。上午10:41和这种亮度相符。影子如果刚好落在空隙里，会把地面变暗，空隙还在，但更难认。复拍时先看地面是否还能被指出来；若树影把所有空隙吞掉，就横移一步，让至少一块地面落在可见的光里。

01｜林地上的茎彼此分开

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

机位大约站立或略低，能看见茎的高度，也能看见脚下的落叶。50mm没有贴到草里，所以空隙是一片林地里的间隔，不是一根茎的特写。Z30用16-50mm约35mm。再低，近处的落叶会变大，可能挡住茎根；再高，会更像平面，茎的间隔变短。先让两丛和它们之间的地面同时在。

8．主题、情绪与氛围

可以读成“草已经枯了，林地却还从缝里露出来”。空不是缺失，而是茎还没有连成墙。绿叶让它不至于沉，细茎让它轻。地点来自说明。另一读法只看疏：能看见底的地方就是空隙。不要把落叶铺满的部分又读成昨天的叶堆，除非它盖住了茎与茎的间隔。感受要能指出一块看得见地面的缝。

9．学习与模仿

学“拍枯草时留下能看见底的缝”。林缘、树下或墙根的枯草都可以。Z30用16-50mm约35mm，A档f/8，对焦在中部的茎上，快门不低于1/250秒，风大用1/500秒，不要照抄1/200秒；ISO自动。只改变距离：走近到茎贴满一张，退后到能看见地面一张。交第二张。自检：能否指出两块空隙，以及空隙里是落叶、土还是别的。若说不出底是什么，就还没有拍到空。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：NIKON Z 6_2；实焦距mm：50；光圈f/：5.6；曝光秒：0.005；ISO：400

作者：Krzysztof Ziarnek, Kenraiz ｜ 授权：CC BY-SA 4.0

Commons文件页：File:Calamagrostis arundinacea kz17.jpg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。

02｜石缝从草根里露出来

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



02.jpg · Z3lvs · CC0

1．明暗与曝光

一丛干草从石坡上长出来，中心很密、呈浅金，下部和四周的石头更暗，有一块清楚的影子。视线先被这一丛抓住，然后才看见根部露出的石块。影子在丛的一侧，不把石头全部盖住。来源是iPhone 13 Pro，实焦距5.7mm，f/1.5，1/6993秒，ISO 50，35mm等效26mm，时间2022-04-29 12:38。没有软件字段。高光在茎上，还没有连成死白。

2．对焦与景深

草丛和近处的石头大多清楚，远处的坡稍软。手机小传感器上的f/1.5仍然可以前后都比较清楚，不能理解成Z30开到f/1.8就会得到同样的景深，也不会得到同样的虚化。对焦点没有记录。这张的空隙在下部，所以清晰必须包括草根和石头，不能只让穗尖清楚。复拍用f/8。

02｜石缝从草根里露出来

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

记录快门约1/6993秒，这是手机可以写出的很短时间，不能当成Z30要去追的目标。茎没有拖影。四月底的中午，地点是死亡谷但丁景以北的山脊，来源说明写的是干草丛。沙漠里四月也可以是枯的，不要因为不是十一月就改口说它还绿。极快的快门只说明这一张冻住了，不说明空隙会因此变大。

4．构图与内容

主体是丛和它让出来的石头。中心密，几乎没有空；空出现在下部和外围，石块从茎之间露出来。这和上一张林地的空不同：那里空在丛与丛之间，这里空在一丛的根上。若取景只留中心的金，石头会消失，题目就丢了。上方还有别的枯丛和岩石，它们说明这不是孤立的一棵，但今天仍看这一丛怎样把底露出来。

5．色彩

金草、红褐的土和灰石。金的面积集中，第一眼像在看一束干花。把颜色放下，中心仍密，四周仍有石头的形状和影子。石头的灰是空隙的证据，不是杂物。若把地面调暗到和影子连成一片，根部的缝会被吞掉。颜色的用处是把草和石分开，然后就该把视线交回那些缝。

6．光线与光影

影子硬，落在丛的一侧，正午的时间字段和这种短而清楚的影子相符，光来自上方略偏一侧（推测）。硬光让石头的边和草的边都更可读，也让空不被一片柔和的灰盖住。不能从影子精确画出太阳的角度。手机成片可能还有机内处理，不把对比度写成某个后期数值。阴天时，缝还在，但要靠石头和茎的固有深浅。

02｜石缝从草根里露出来

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

机位略高于丛，能看见它的顶，也能看见四周的石头，所以根部的空隙进得了画面。等效26mm很广，Z30用16-50mm约16–18mm接近这个范围。广角会把近处的石头放大，若靠得太近，丛会变形，空隙的比例也会变。先后退到整丛和一圈石头都在。再俯一点，顶面会更清楚，侧面的茎会变短。

8．主题、情绪与氛围

可以读成“干枯的一丛并没有把地面盖完，石头还在根上”。硬影子让它干脆，密集的中心让它有重量。安静来自没有人。地点和“干草”来自说明，四月的日期阻止我们把它编成冬天。另一读法只看密和空的位置：密在中心，空在外围。不要把沙漠说成荒凉的结论，画面提供的是石头和草的关系。

9．学习与模仿

学“看一丛枯草的根，找露出来的底”。墙根、石缝、花坛边的枯草都可以，不必去沙漠。Z30用16-50mm约18mm，A档f/8，对焦在草和石头相交的地方，快门不低于1/500秒，不要追1/6993秒，也不要开大光圈模仿f/1.5；ISO自动。只改变俯仰：平视一张，略俯视把根部露出来一张。交第二张。自检：能否指出空在中心还是在外围。若只剩满丛的金，就把石头留在画面里。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：iPhone 13 Pro；实焦距mm：5.7；光圈f/：1.5；曝光秒：0.000143；ISO：50

作者：Z3lvs ｜ 授权：CC0

Commons文件页：File:Dry grass tufts on a rocky slope, ridge north of Dante's View, Death Valley National Park.jpg

许可证：http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。

03｜灰天空被芒线切开

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



03.jpg · Björn S... · CC BY-SA 2.0

1．明暗与曝光

细长的芒在灰天上弯成深色的线，天空占了大部分，下方有更黑的树影。芒不是纯黑，还能看见毛边。视线沿最长的那根弧走，然后发现线与线之间的天。来源为佳能EOS 600D，60mm，f/8，1/800秒，ISO 100，时间2016-06-11 14:30。没有35mm等效字段，也没有软件字段。天空亮而不刺，暗部没有完全糊死。

2．对焦与景深

几根主要的芒还能分开，毛边可见，背景的树是软的暗块。f/8和60mm没有把所有芒都化成雾。对焦点没有标明。600D是APS-C，60mm的视角接近Z30的60mm，只是倍率约1.6而不是1.5，不能说完全相同。这张的空隙是天空的形状，所以细线必须清楚；若只对到后面的树，线会糊，空也会糊。复拍对在最近的一根芒上。

03｜灰天空被芒线切开

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

记录快门1/800秒。线没有明显拖影，1/800秒把细芒按住了。时间是六月中旬的下午，不是深冬。来源说明写的是欧洲羽茅。羽茅的芒在这个季节就是细而浅的，不要因为它不是十一月就认为空隙的练法不成立。更快的快门不会让天空的孔变大。风来时，这种细线比粗茎更容易糊，Z30仍应保持1/800秒或更快。

4．构图与内容

主体是芒与芒之间的天空。线是弯的，所以空不是整齐的格子，而是几块不规则的灰。下方的暗树把一些空堵住了，上部的空更大。这和林地那张不同：底换成了天空。若线条密到没有孔，就回到第一题的节奏；若只剩天空，线又没了。学习时先圈出三块还能看见天的孔，再谈线好不好看。

5．色彩

几乎没有色相，灰和深灰。低饱和在这里是结构的朋友，因为没有金黄来抢空隙。不能据此说作者做了黑白处理，来源没有写。若现场的天是蓝的，蓝也只是底，不是题目。把这张和前面的金色草放在一起看，会发现空是否成立，不取决于枯黄够不够响。颜色退场之后，孔还在。

6．光线与光影

芒暗、天亮，接近剪影，但毛边还在，所以不是完全没有层次。光在芒的背后（推测），天空充当大的光源。没有地面投影可以确定太阳的位置。六月下午的记录和灰天可以同时成立，不能推出阴天的厚度。模仿时不必追日落，均匀的灰天反而让孔更好认。若背景里有明亮的楼，孔会被切断，换一个只剩天的方向。

03｜灰天空被芒线切开

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

明显是对着天空，机位在芒的下方或平齐，所以线像画在天上。60mm只取了几根，而不是整丛。Z30用50-250mm约60–80mm。再广，会把太多地面和杂枝收进来，孔会变碎；再长，可能只剩一根弧，空就只剩这一根旁边的天，样本太少。横移半步，交叉点和孔的形状会变，这比变焦更值得拍第二张。

8．主题、情绪与氛围

可以读成“细芒把一块灰天切成可以指认的孔”。弯线有轻盈的感觉，暗树又把下部压住，所以不是一片空白的轻。六月的日期让它不能被说成冬日的哀愁。另一读法只看负形：空的形状比线的名字重要。不要把羽茅的学名变成情绪。感受要能描出一块最大的天空孔，以及它被哪两根线围住。

9．学习与模仿

学“让枯草或细芒之间露出天空，并能指出孔的形状”。任何细茎都可以，站在安全的地方仰拍，注意脚下。Z30用50-250mm约70mm，A档f/8，对焦在最近的细茎上，快门不低于1/800秒，ISO自动。只横移半步，焦距和曝光不动，拍两张。交孔更大、线仍分开的一张。自检：能否说出三块空分别被哪些线围住。若只剩黑线堆，就把最挤的交叉移出画面。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：Canon EOS 600D；实焦距mm：60；光圈f/：8；曝光秒：0.00125；ISO：100

作者：Björn S... ｜ 授权：CC BY-SA 2.0

Commons文件页：File:Stipa pennata (27858193581).jpg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。

04｜白芒之间还留着缝

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



04.jpg · Björn S... · CC BY-SA 2.0

1．明暗与曝光

许多白而毛的芒叠在一起，茎是深褐，背景是一块柔和的绿。白芒很亮，但还能看见毛，不是一片死白。视线会先被最亮的芒带走，然后才发现它们并没有完全封死，缝里还有深一点的茎和一点背景。来源同样是佳能EOS 600D，60mm，f/8，1/100秒，ISO 125，时间2016-06-11 14:31，比上一张晚大约二十秒。没有软件字段。

2．对焦与景深

中部的茎和部分芒较清楚，前后有的芒变软。f/8并没有让所有毛都同样锐，距离的前后已经够把层次分开。对焦点没有标明。软掉的芒会把缝填上，所以复拍时要放大看：缝的两边是否还是两条线。Z30用f/8，对在缝的边缘，而不是对在最亮的一团毛上。若整张都软，空隙会变成雾。

04｜白芒之间还留着缝

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

记录快门1/100秒，比上一张的1/800秒慢很多，ISO只从100提到125。白芒没有明显的单向拖影，说明这一刻风不大，或者晃动小于能看见的程度。1/100秒在60mm上不是安全值，不能照抄。六月的同一分钟，植物仍是欧洲羽茅。慢八倍不会让缝变更清楚，只会让毛更容易糊成没有缝的白。

4．构图与内容

主体是还留着的缝。上一张的空是大块的天，这一张的空是芒与芒之间的窄缝，有的被另一根芒挡住，有的还通。深色的茎是缝的边。若取景只留最密的白，缝会消失，题目就变成质感；质感不是今天的题。学习时先找一条还能看穿的缝，再决定白芒要留多少。不要为了干净把所有交叉都裁掉，交叉正说明缝会不会被堵住。

5．色彩

白、深褐和背景的绿。白最响，所以它比上一张更危险：质感会冒充主体。把白色想成一组浅的线，缝就是线没有盖住的地方。绿背景很小，只在缝的尽头出现，它帮助确认缝是通的。若把绿色去掉，缝还在，只是底变成灰。不要为了“更白”而提高曝光，直到毛的边缘连在一起。

6．光线与光影

白芒发亮，茎较暗，光来自侧方或前方（推测），把毛和茎分开。没有长影子。和上一张的剪影不同，这一张靠的是亮芒自己的间隔，不是暗线对亮天。两张相隔二十秒，光不可能完全换一种天气，差别主要来自机位和取景：一张对着天，一张对着草的亮面。复拍时可以连着拍这两种空，但要知道它们不是同一种底。

04｜白芒之间还留着缝

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

机位靠近芒，镜头几乎平视这一小束，所以毛占满画面，背景只在缝里露出。60mm加上靠近，相当于把间隔放大。Z30的50-250mm约60mm，再靠近到最近对焦距离。套头若不能更近，就接受更大的一束，只要缝还在，不要换新镜头。仰一点会把天请回来，变成上一张；平视则把空留在芒自己的中间。

8．主题、情绪与氛围

可以读成“看起来满的地方，仍要去找还没封死的缝”。白芒有轻和软的感觉，深茎把缝的边固定住。六月的记录让它不能被写成冬雪。另一读法是和上一张对照：空可以大到是一块天，也可以小到是两根芒之间的一条。不要因为毛茸茸就停止寻找缝。感受要能指出一条还通着的缝，以及它被什么挡住。

9．学习与模仿

学“在看起来已经很密的枯草里，仍指出一条缝”。狗尾草、芒草、芦花都可以。Z30用50-250mm约60–100mm，靠近，A档f/8，对焦在缝的边上，快门不低于1/500秒，不要用1/100秒；ISO自动。只改变密度：第一张找最密的一束，第二张略移，让一条缝通到背景。交第二张。自检：缝的尽头能不能看见别的颜色或亮度。若白成一片，就还没有空。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：Canon EOS 600D；实焦距mm：60；光圈f/：8；曝光秒：0.01；ISO：125

作者：Björn S... | 授权：CC BY-SA 2.0

Commons文件页：File:Stipa pennata (27900981516).jpg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。

05｜颖壳之间的窄缝

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



05.jpg · Matt Lavin · CC BY-SA 2.0

1．明暗与曝光

几片干而薄的颖壳竖在画面里，颜色是浅木色，中间有一粒更深、带毛的部分，右侧是一块空的灰。壳的边缘亮，重叠的地方暗。视线从深色的那一粒开始，再看见壳与壳之间的缝。来源为奥林巴斯TG-6，实焦距5.4mm，f/3.2，1/125秒，ISO 200，35mm等效30mm，时间2021-09-20 12:54。软件字段是Version 1.0，像相机版本，不据此编造后期。

2．对焦与景深

中间的壳和那粒深色比较清楚，前后有的壳变软，灰背景完全没有纹理。小传感器上的f/3.2仍可能有足够的景深，近摄时前后差会被放大，所以软不全是大光圈的标志。对焦点没有记录。这张的缝很窄，必须清楚到能指出两条边。Z30套头做不到同样的放大率时，不要假装能拍成同样的特写，退一点，让几枚壳和它们的缝同时可读即可。

05｜颖壳之间的窄缝

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

记录快门1/125秒。壳没有明显拖影。1/125秒对静止的干穗够用，手若抖，窄缝会先糊掉。九月下旬的中午和这种亮度相符。来源说明写穗状或收缩的圆锥花序上还留着少量小花，颖壳大约3到4厘米，芒可以超过10厘米；说明里的拼写错误不必跟着写。这张裁在局部，长芒大多不在画面里，不要根据说明去想象画面外的长度。

4．构图与内容

主体是壳与壳之间的窄缝，以及右侧那块更大的空。缝是竖直的间隔，空是壳没有延伸到的灰。这是今天最小的一档空隙：不再是林地或天空，而是一穗内部。若把右侧的灰裁掉，只剩壳的质感；若把壳拍散到看不出间隔，窄缝又没了。来源说这是豪猪草，种名可以帮助检索，但不能代替我们指出缝在哪里。

5．色彩

浅木色、深褐和中性灰，饱和度低。低饱和让缝靠明暗而不是靠颜色被看见。深色的一粒是变化，它防止所有壳看起来一样，但不是空隙本身。若把它调得更红，视线会停在那一粒上，缝会退到第二眼。和前面的白芒相比，这里几乎没有“好看的白”，所以更适合检查：没有吸引人的颜色时，还看不看得出空。

6．光线与光影

壳的边缘有细的亮线，重叠处较暗，光来自侧方（推测），把薄壳的层次显出来。灰背景没有影子可测。中午的时间字段不能单独证明是顶光，因为我们看见的是侧边的亮线。这种光对窄缝有帮助：边亮，缝才不会和壳粘成一片。若正面平光，壳会变成没有间隔的一块浅色，那时要换角度，而不是只加锐化。

05｜颖壳之间的窄缝

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

机位非常近，镜头对着穗的侧面，所以壳被放大成画面的主要形状。5.4mm是卡片机的短焦距，近摄才得到这样的大小，不能把5.4mm理解成广角风景。Z30用16-50mm的50mm，靠近到最近对焦距离；若缝还太小，就拍一小段穗，让三枚以上的壳和它们的间隔入画。不要为了同等放大去买微距镜头。侧一点，缝会比正对着壳面更清楚。

8．主题、情绪与氛围

可以读成“空隙可以小到一穗的内部，仍然要能被指出来”。干燥的薄壳有脆的感觉，灰背景让它安静。九月的记录和残留的小花说明它已过盛花，这是说明里的话，画面能支持的是壳已经干、颜色浅。另一读法只看间隔的宽窄：中间窄，右侧宽。不要把豪猪草的名字写成危险或可爱。感受要能指出最窄的那一条缝。

9．学习与模仿

学“在一穗枯草的内部找出壳与壳的缝”。任何已经干了的穗都可以，摘下来之前先在植株上拍，不要为了画面折断它。Z30用16-50mm约50mm，尽量靠近，A档f/8，对焦在缝的边上，快门不低于1/250秒，不要用1/125秒；ISO自动。只改变角度：正对壳面一张，侧过三十度再一张。交缝更清楚的侧面。自检：能否指出最窄的缝和右侧更大的空。若只看见一片浅色，就还停在质感上。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：TG-6；实焦距mm：5.4；光圈f/：3.2；曝光秒：0.008；ISO：200

作者：Matt Lavin｜授权：CC BY-SA 2.0

Commons文件页：File:Stipa spartea - porcupine grass - 51497550232.jpg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。