倒伏枯草指出的方向

每日一课 · 5张范例 · 每张九项深入解读

读这份点评的方法

先看照片五秒，说出第一视觉落点和整体感受，再读文字。每张依次分为三页：明暗与清晰；快门、构图、色彩与光线；机位、主题与自己的练习。阅读不等于接受唯一答案，试着用图中证据支持或修正自己的判断。

哪些是事实，哪些是解释

曝光参数来自sources.json保存的Commons原图元数据；颜色、边缘与亮暗是现有图像上的观察；光向、焦点与氛围解释在证据不足时标明可能性。Z30设置均为教学建议，不能冒充作者使用过的参数。没有EXIF的拍法会写（推测）。

先借鉴原则，再考虑复制外观

手机、小型相机和不同画幅镜头不能直接照抄焦距或光圈。套头不够近、没有同样树种或没有相同场所时，可以换对象、距离与取景范围。每张最后都有可完成的对照练习和成片检查。

本题五张的阅读顺序

01｜穗尖朝向同一侧
02｜草叶倒向水沟
03｜近处的茎斜下去
04｜后层倒了，前层还立着
05｜倒了，却不朝一边

今天这一课有好几个题材

导读把今天的题材连成一件事。这一份点评只负责其中一个。每张范例末尾有一个当天能用套头完成的练习。时间紧就每个题材交一张，不要把一个题材里的五张都仿一遍。

01｜穗尖朝向同一侧

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



01.jpg · Sharon Mollerus · CC BY 2.0

1．明暗与曝光

许多褐色的穗排在浅蓝天空前，穗比天更暗，边缘却被光勾亮。视线顺着穗尖走，它们大体朝向画面右侧。没有地面，也没有很黑的大块。天空的白云只是底，不指出另一个方向。来源为佳能EOS Digital Rebel XT，195mm，f/10，1/250秒，ISO 100，时间2007-08-25 18:07。没有35mm等效字段。软件是Lightroom 5.7，文件经过该软件写出，具体调整无法还原。

2．对焦与景深

多数穗的颗粒还能分开，天空是平的，近处和远处的穗没有变成两摊糊。主体和背景靠形状与亮度，不靠一片虚化。Rebel XT是APS-C，195mm已经较长，f/10让前后的穗不至于只剩一根清楚。对焦点没有标明。Z30也是DX，但倍率约1.5而不是1.6，195mm的视角接近，却不能说完全相同。复拍时放大看穗尖是否还指得准。

01｜穗尖朝向同一侧

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

记录快门1/250秒。穗没有明显拖影，说明这一刻的方向是可信的；若有重影，朝向就会变成两套。1/250秒在195mm上偏紧，风再大应更快。时间字段是八月下旬的18:07，不是冬天。穗已经变褐并弯向一侧，枯的是这部分茎穗的样子，季节仍是夏末。文件名写着in the wind，静帧不能测量风速。

4．构图与内容

主体是共同的方向：茎从下方进入，穗尖指向画面右侧，倾斜的角度大体相近。天空是空的底，让方向不被地面的纹理干扰。也有少数穗更平或更垂，它们是变奏，不取消多数穗的那一侧。若把相机转正，让穗看起来竖直，方向就被藏起来了。学习时先不要转相机去“摆正”它们。

5．色彩

褐穗和蓝天，颜色简单。蓝天帮助把穗分开，褐是茎穗自己的颜色。第一眼会说“金黄的草”，可是决定这张的是穗尖的指向，不是色相。把画面想成灰度，斜线还在。八月的日期提醒我们：变褐不一定要等到立冬。若继续增加蓝色的饱和度，方向不会更清楚。

6．光线与光影

穗的上缘较亮、下缘较暗，光来自上方或侧上方（推测），把每一穗的厚度显出来，也让它们从天上分开。没有地面影子，不能画出太阳的方位。18:07在八月仍可以是白天，和蓝天相符，不把钟点单独读成日落。侧光是这张能读方向的帮助；逆光剪影也能练方向，但会损失穗上的颗粒。

01｜穗尖朝向同一侧

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

机位大约在穗的高度，镜头略微向上，所以只剩天空。195mm把一小束草拉近，环境全部让出。Z30的50-250mm约180–200mm可以试接近的范围。若退不到、或草不够近，用250mm仍能拍“同一侧”，不必换更长的镜头。穗尖被切掉一点没关系，共同的那一侧还在就行。站低会把地面带进来，方向还在，但题目会变杂。先让共同的指向占满画面。

8．主题、情绪与氛围

可以读成“这些穗同意朝向一边”。这种一致让画面有动势，即使快门已经把运动按住。动势来自形状，不来自拖影。文件名提到风，画面能支持的只是共同的弯曲。另一读法是纯粹的斜线重复。不要因为八月就改口说它们还绿，颜色已经是褐的。感受要能用手指比出那一侧。

9．学习与模仿

学“找到朝向同一侧的穗或茎，不要把它们转正”。路边的枯草、芦苇都可以。Z30用50-250mm约200mm，A档f/8，对焦在中部的穗上，快门不低于1/500秒，不要照抄1/250秒；ISO自动。只改变相机的角度：第一张让穗在画面里保持斜，第二张把相机转得看起来竖直。交第一张。自检：别人能否按你的句子指出穗尖的那一侧。若两张看起来都像竖直的墙，说明相机被转正了，穗尖共同的那一侧还没拍到。不要交转正的那张。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：Canon EOS DIGITAL REBEL XT；实焦距mm：195；光圈f/：10；曝光秒：0.004；ISO：100

作者：Sharon Mollerus ｜ 授权：CC BY 2.0


Commons文件页：File:Reeds in the Wind (2126858432).jpg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by/2.0

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。

02｜草叶倒向水沟

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



02.jpg · Krzysztof Ziarnek, Kenraiz · CC BY-SA 4.0

1．明暗与曝光

两条草岸夹着一条浅绿色的沟，草叶有的还绿、有的已经金褐，沟面更亮、更平。视线沿沟向远处走，也被两侧倒向沟心的叶子拉住。沟比岸亮，所以方向有一条浅的轴。来源是尼康Z 6_2，ISO 640，35mm等效105mm，时间2025-11-09 15:08。实焦距、光圈和快门没有记录，不补。和上一题那丛金秆几乎是同一分钟，机位和题目都不同。

2．对焦与景深

近处的叶和沟边比较清楚，远处变软，沟的走向仍然可读。这不是只虚化成一条色带。对焦点没有标明。全画幅上等效105mm可以让远处柔和；Z30要得到相近的取景，焦距大约70–90mm，景深不会自动一样。复拍用f/8，让沟的两边和近处的叶尖都能指认。若只有中心清楚，方向会只剩一段。

02｜草叶倒向水沟

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

快门没有记录。叶尖没有明显重影，只能说明这一张看起来是静止的，不能推出某一档速度（推测快门当时够用）。十一月上旬的下午，和叶已经半金相符。来源说明写的是施维诺乌伊希切、沿着沟的紫莫利草。慢门不会让叶子更朝向沟。风若把叶尖吹糊，方向就不可信，Z30应先提高到至少1/500秒。

4．构图与内容

方向是沟，也是叶子的倾斜：两侧的叶都倒向中间的水面，像给沟加了两条斜边。这不是所有叶子朝向画面的同一侧，而是朝向同一条线。近处叶子大，远处收拢，纵深帮助这条方向走远。若裁掉沟，只剩纹理；若只拍水面，草的倒向又没了。两边都要留。昨天的沟拦住落叶，今天的沟指出草的倾斜。

5．色彩

绿、金和浅灰绿的水面混在一起。绿说明没有完全枯，金说明已经在枯。颜色会先喊“秋天的水边”，可是把颜色想成灰度，斜叶和亮沟还在。水面的浅色是方向的底，不是要调掉的灰。若把所有叶子调成同一种金，沟的边会被涂平。先问：去掉颜色，还能不能指出叶子倒向哪里。

6．光线与光影

叶面的明暗比较缓，没有整齐的长影子，光像白天的散射（推测）。15:08的时间字段和这种亮度不冲突，但不能指定天气。沟面更亮，主要是因为它平、反射天光，不能直接说成“沟被单独提亮”。硬侧光会给每片叶子一条影子，方向会更硬，也会更乱。这一张先靠叶子自己的倾斜。

02｜草叶倒向水沟

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

机位较高，向下看着沟，所以能同时看见两侧的倒向。若贴着地面，会只看见一岸。等效105mm把沟的一段拉近，而不是拍整条河。Z30用50-250mm约80mm，或16-50mm的50mm再靠近一点。站的位置比焦距更决定两侧是否对称。横移到一岸，另一岸会变小，方向还在，但“夹着”的关系会弱。

8．主题、情绪与氛围

可以读成“草还没有完全枯，已经把方向交给了沟”。半绿半金让它处在半途，沟让倾斜有了归处。安静来自没有人和没有拖影。来源写了地点和“沿着沟”，和画面相符。另一读法只看两条斜边夹一条亮线。不要把倒向解释成被修剪，画面里没有工具，也不要把浅绿色水面说成污染，证据不够。

9．学习与模仿

学“找一条沟、坡边或路沿，看草是不是倒向它”。浅沟即可，不要踩进去。Z30用16-50mm约35–50mm，A档f/8，对焦在近处倒向沟的叶上，快门不低于1/500秒，ISO自动。没有快门记录，不要编一个数字。只改变站位：沟的正上方一张，挪到一岸再一张。交两侧都能看见的。自检：能否指出叶子倒向哪一条线。若只剩金色纹理，就把沟留在画面里。半绿的叶子不用等它全枯。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：NIKON Z 6_2；ISO：640

作者：Krzysztof Ziarnek, Kenraiz ｜ 授权：CC BY-SA 4.0

Commons文件页：File:Molinia caerulea kz11.jpg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。

03｜近处的茎斜下去

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



03.jpg · Dietmar Rabich · CC BY-SA 4.0

1．明暗与曝光

近处的枯草是亮的黄褐，向画面右下方斜，中景有一小片水面，左下是一块深绿的灌木，远处的坡更红、更密，天空是均匀的灰白。视线从斜着的近景开始，再走到水面。灰天没有云隙来抢这些斜线。来源为佳能EOS 5D Mark IV，50mm，f/8，1/50秒，ISO 250，时间2021-10-06 16:12。软件是Lightroom Classic 11.0，文件经过它写出。

2．对焦与景深

近处的茎、灌木和中景的水面都能辨认，远处的树稍软，但形状还在。f/8和50mm在全画幅上、对一片沼地，可以让大部分地面清楚。对焦点没有标明。这张不靠虚化分离主体，分离靠的是近处更大的斜茎。Z30用f/8时景深通常更长，不必为了模仿虚化去开大光圈。复拍要放大看近处茎是否还是一条线。

03｜近处的茎斜下去

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

记录快门1/50秒。这个速度偏慢，近处的茎却没有明显的单向拖影，只能说明这一刻风不大，或者晃动没有留下可见的重影。它不是值得照抄的安全值。十月上旬的16:12和灰白天光相符。来源说明写的是比利时瓦姆附近的高沼地。1/50秒若遇到风，斜线会糊成一团，方向就没了。Z30应提高到至少1/250秒。

4．构图与内容

方向主要在近处：茎从画面中下部斜向右下方，可以被一根手指比出来。远处的草更密，也更接近直立，所以不能说整片沼地都倒伏。水面和灌木是停顿，它们不指出同一方向。若只裁近处的斜茎，会失去“只有近处明显斜”这个差别；若取景高到全是远坡，斜线又会变小。近处要留够。

5．色彩

黄褐、红褐、深绿和灰天。近处的黄最亮，所以容易把整张读成“金黄的荒野”。把颜色放下，近处仍是斜线，远处仍是更密的纹理，灌木仍是一块深的形状。红褐是远处草和枯枝的颜色，不是另一条方向。若把灌木调得更饱和，视线会被它拖走。方向仍以近处的茎为准。

6．光线与光影

天空平，草上没有硬边的长影子，光是阴天的散射（推测）。灰白的天和16:12的记录一致，不能再指定太阳的位置。近处更亮，有一部分是因为它靠近、茎更分开，不全是曝光。阴天并不妨碍读方向，因为方向来自茎的倾斜，不来自影子。若改成硬光，影子会添第二条线，要单独观察，不要和茎的倾斜混成一件事。

03｜近处的茎斜下去

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

机位站在沼地边，镜头略微向下，近处的草被放大，所以斜线比远处清楚。50mm在全画幅上的视角，接近Z30的35mm。站得更高，近处的斜会变弱；再低，会只剩草、失去水面这个停顿。先用16-50mm约35mm把近处斜茎和中景水面一起留下。横移会改变灌木是否挡在斜茎前面。

8．主题、情绪与氛围

可以读成“一大片枯草里，方向先在脚下出现”。远处仍站着，近处已经斜下去，所以倒伏不是均匀地铺满。安静来自无人、无风的痕迹和灰天。地点来自说明，情绪不是说明里的词。另一读法只看近处的斜线和远处的密。不要把水面写成危险，也不要把灌木写成唯一的生命，画面只是让几种形状同时在。

9．学习与模仿

学“在一片枯草里，只把已经斜下去的那一部分拍清楚”。荒地、河滩、公园边缘都可以，站在硬地上。Z30用16-50mm约35mm，A档f/8，对焦在近处的斜茎上，快门不低于1/250秒，不要用1/50秒；ISO自动。只改变取景：第一张包含远处更直立的草，第二张只留近处的斜茎。交第一张，用来说明方向不是到处一样。自检：能否指出哪一段斜、哪一段还立着。灌木可以留在边上，不要让它挡住那一段斜茎。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：Canon EOS 5D Mark IV；实焦距mm：50；光圈f/：8；曝光秒：0.02；ISO：250

作者：Dietmar Rabich ｜ 授权：CC BY-SA 4.0

Commons文件页：File:Weismes (B), Brackvenn -- 2021 -- 6575.jpg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。

04｜后层倒了，前层还立着

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



04.jpg · Krzysztof Ziarnek, Kenraiz · CC BY-SA 4.0

1．明暗与曝光

前景几根茎较直，带一点红，后面一大片草倒向画面左侧，颜色更浅、更密。没有天空。视线会先被直立的茎挡住，再发现后层的方向。后层更浅，不是因为它更重要，而是茎更细、更密。来源为奥林巴斯TG-4，实焦距5.5mm，f/3.2，1/250秒，ISO 100，35mm等效30mm，时间2016-08-30 20:28。软件是GIMP 2.8.16，文件经过它处理，改了哪些数值无法还原。

2．对焦与景深

前景的茎比较清楚，后层的倒伏变成较软的纹理，但倾斜的方向还能看见。小传感器上的f/3.2不容易得到很浅的景深，后层变软有距离的原因，也可能有处理的影响，不能断言是大光圈虚化。对焦点没有记录。复拍时让前景的直和后层的斜都还能指认，用f/8比模仿f/3.2更合适。

04｜后层倒了，前层还立着

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

记录快门1/250秒。前景没有重影。时间字段是八月底的20:28，画面仍是白天的亮度，所以不把时钟单独当成夜景，时区或相机时间都未核实。来源说明写的是纽约植物园里的小须芒草。它是栽种的，不是野地里被一场风暴压倒的记录。1/250秒不能证明后层的倾斜来自风。

4．构图与内容

这张的内容就是两层不一样：前景还立着，后层倒向左侧。方向在后层，对照在前层。若把前景裁掉，就只剩一片倾斜的纹理，失去“还没倒的”那一根参照；若只拍前景，倒向又没了。茎的红和后层的浅只是帮助分层。不要谎称所有茎都朝左。学习时先找到一层立、一层倒的地方。

5．色彩

红、绿和浅褐混在一起，八月的记录也说明它还没有完全枯。颜色容易把前景的红茎当成主体。把颜色想成灰度，后层仍是同一方向的斜线，前景仍是较直的深线。红有用，它把前景从后层里分出来，但不是题目。若把后层调得更黄，方向不会更清楚，分层却可能被抹平。

6．光线与光影

茎上的明暗比较柔，没有整齐的投影可以代替倾斜本身，光更像开阔的白天（推测）。20:28和这种亮度如果冲突，以画面为准，不编一段黄昏。后层更浅，主要是因为茎更细、更密、更远，不能直接说成“后层被照得更亮”。方向来自茎的倒向，不来自影子。这是它和靠影子指出方向的画面不同的地方。

04｜后层倒了，前层还立着

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

机位靠近草丛，略微向下或平视，所以前景被放大，后层堆在上面。等效30mm，Z30用16-50mm约18–24mm可以接近。再靠近，前景会挡住后层；退远，两层会变平，对照变弱。先让一层直茎压在倒伏的前面。横移会改变后层的斜线是否被前景切断，那是这张最值得试的一步。

8．主题、情绪与氛围

可以读成“同一片草，有的还站着，有的已经倒向一侧”。这种差别比一整片都倒更有内容，因为它提供了比较。植物园的身份来自说明，不自动使画面变成标本。另一读法只看前直后斜。不要把倒伏写成伤害，来源没有写原因。感受要能指着后层说出“向左”，并指着前景说出“还直”。

9．学习与模仿

学“在同一张里留下还立着的茎和已经倒向一侧的茎”。花园或路边的观赏草就可以，不必等荒野。Z30用16-50mm约24mm，A档f/8，对焦在前景直立的茎上，快门不低于1/320秒，ISO自动。只横移半步：第一张让直立的茎挡住一部分倒伏，第二张让倒伏单独占满。交第一张。自检：能否一句话里同时说出直和倒。若两层变成同一种斜，就还没有拍到对照。不要把后层的浅色写成“更亮的光”，先说出它倒向哪一侧。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：TG-4；实焦距mm：5.5；光圈f/：3.2；曝光秒：0.004；ISO：100

作者：Krzysztof Ziarnek, Kenraiz ｜ 授权：CC BY-SA 4.0

Commons文件页：File:Schizachyrium scoparium kz2.jpg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。

05｜倒了，却不朝一边

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



05.jpg · Johann Jaritz · CC BY-SA 3.0 at

1．明暗与曝光

许多芦穗已经弯下来，有的朝左，有的朝右，茎和叶是深金褐，后面是发白的天空和一排裸树。穗的亮边很明显，视线会被最近的弯穗带走，却走不出同一个方向。树是一条暗边，不替穗选择朝向。来源为尼康D7000，70mm，f/8，1/320秒，ISO 400，35mm等效105mm，时间2013-12-21 13:58。软件字段是QuickTime 7.6.6，只说明文件带有这个记录，不编造一段视频。

2．对焦与景深

前排的穗和弯曲的茎还能分开，后面的树是剪影般的一层，细节少。f/8和70mm让芦苇这一层比较清楚。对焦点没有标明。D7000与Z30同为DX，70mm可以直接在50-250mm上找到接近的视角，等效105mm不是镜头环上的数字。复拍时要能看清相邻两穗各自弯向哪边。若糊成一团，就无法判断方向是否统一。

05｜倒了，却不朝一边

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

记录快门1/320秒。穗没有明显拖影，所以弯是茎自己的形状，不是运动拉出来的。和前一题的芦苇同一天下午，相隔大约十八分钟，地点仍是珀尔查赫，这一张在汉斯·普鲁沙路。十二月的白天和亮背景相符。1/320秒在70mm上比195mm那张宽裕，风大时仍应再加快。慢门不能把不同的朝向收成一个方向。

4．构图与内容

主体是“倒了，但没有共同方向”。有的穗垂向左，有的扬向右，也有较直的茎。裸树在后面提供一条暗的边，它们不是今天的题目，不要把画面读成上一周的裸树课。若为了凑题，硬说所有穗都朝向湖面，证据不够，就不要写。取景把许多穗同时留下，正是为了让不统一可以被看出来。

5．色彩

金褐、浅灰和树的深灰。金褐的面积大，第一眼仍会喊颜色。把颜色换成明暗，穗的弯折还在，而且弯折彼此矛盾。这就是它被放在这一题最后的原因：倒伏不等于已经指出方向。树的深色只是背景的重量。若把最亮的一穗裁成特写，不统一会消失，题目也会变成单根的姿态。

6．光线与光影

穗的边缘发亮，背后的树较暗，光在草的这一侧，背景处于阴影或逆光里（推测）。这样的光把穗的轮廓显出来，方便我们比较朝向，但光本身没有把它们收成同一个方向。13:58的白天记录和亮天相符。不能因为树是暗的，就说这是日落之后。方向的混乱是形状的事实，不是曝光失误。

05｜倒了，却不朝一边

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

机位在芦苇边，镜头平视，穗的高度和人的视线接近，所以弯曲被看得很具体。70mm去掉了太宽的环境，树只剩一条。Z30用50-250mm约70–90mm。再广，会把路和天空的比例加大，穗的互相矛盾会变小；再长，可能只剩两三穗，样本不够，就判断不了是否统一。先保证画面里有多种朝向。

8．主题、情绪与氛围

可以读成“冬天的芦苇已经弯了，却还没有达成一个方向”。这并不失败。失败只发生在我们为了题目编出一个方向的时候。裸树和灰天让它冷，亮穗又让它不沉。地点和日期来自说明。另一读法是：这是上一张“一根根站着”的对照，同一类植物，隔了一小段时间，结构已经不同。不要把不同朝向写成混乱的情绪本身。

9．学习与模仿

学“如果指不出共同方向，就老实说没有”。水边或墙边的枯草都可以。Z30用50-250mm约80mm，A档f/8，对焦在最近的弯穗上，快门不低于1/400秒，ISO自动。只改变取景：第一张包含几种朝向，第二张只留朝向最接近的两三穗。交第一张，并在句子里写“没有共同方向”。自检：你的句子是否比画面更整齐。若更整齐，就是把方向说满了。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：NIKON D7000；实焦距mm：70；光圈f/：8；曝光秒：0.003125；ISO：400

作者：Johann Jaritz ｜ 授权：CC BY-SA 3.0 at

Commons文件页：File:Poertschach Hans-Pruscha-Weg Phragmites australis 21122013 333.jpg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/at/deed.en

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。