枯草丛的竖线节奏

每日一课 · 5张范例 · 每张九项深入解读

读这份点评的方法

先看照片五秒，说出第一视觉落点和整体感受，再读文字。每张依次分为三页：明暗与清晰；快门、构图、色彩与光线；机位、主题与自己的练习。阅读不等于接受唯一答案，试着用图中证据支持或修正自己的判断。

哪些是事实，哪些是解释

曝光参数来自sources.json保存的Commons原图元数据；颜色、边缘与亮暗是现有图像上的观察；光向、焦点与氛围解释在证据不足时标明可能性。Z30设置均为教学建议，不能冒充作者使用过的参数。没有EXIF的拍法会写（推测）。

先借鉴原则，再考虑复制外观

手机、小型相机和不同画幅镜头不能直接照抄焦距或光圈。套头不够近、没有同样树种或没有相同场所时，可以换对象、距离与取景范围。每张最后都有可完成的对照练习和成片检查。

本题五张的阅读顺序

01｜暗底上重复的穗
02｜一丛金秆立在中间
03｜整面坡都是竖的
04｜路边一丛向外张开
05｜芦穗一根根站着

今天这一课有好几个题材

导读把今天的题材连成一件事。这一份点评只负责其中一个。每张范例末尾有一个当天能用套头完成的练习。时间紧就每个题材交一张，不要把一个题材里的五张都仿一遍。

01｜暗底上重复的穗

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



01.jpg · MaedaAkihiko · CC BY-SA 4.0

1．明暗与曝光

上半部几乎是黑的，几丛芒穗被光照成浅金，细茎是亮的竖线，底部叶子是橙褐。视线先停在最亮的穗上，再沿茎向下。亮的是穗和叶缘，暗的是背景，并不是整张都压成低调。来源记录1/500秒、f/3.8、ISO 125，机型松下DC-FZ1000M2，实焦距约34.4mm，35mm等效94mm。软件是Photoshop Express，文件经过该应用写出，还改了什么无法还原。黑底不能证明现场没有别的景物。

2．对焦与景深

近处穗的小珠和几根茎还能分开，背景完全没有细节。分离主要靠明暗，不只靠虚化。一英寸传感器上的f/3.8，景深不能换成Z30的同一光圈。对焦点没有标出。复拍时应放大看穗的边缘是否粘成一团，不要只看缩略图里的金色。若只有最近一根清楚、后面的茎融化，重复的节奏就读不出来。

01｜暗底上重复的穗

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

记录快门1/500秒，时间字段2022-01-03 08:28。穗没有明显拖影，1/500秒按住了这一刻，但不能证明全程无风。一月上旬的日期和枯萎的穗相一致，早晨的钟点不能单独推出太阳的高度。来源说明写的是冬季枯萎的芒草穗，英文俗名写成了pampas grass ears，植物名仍是Miscanthus sinensis。慢门不会让竖线本身变多。

4．构图与内容

主体不是某一根茎，而是几丛穗在暗底上的重复。茎大多向上，穗头有的弯、有的扬，所以节奏是“竖线加上顶端的变化”，不是尺子画出来的平行线。底部的叶子斜着交叉，给竖线一个结束的地方。若裁掉所有茎、只留穗，就变成一堆光点；若只留一根，重复就没了。学习时先保证至少三根茎同时入画。

5．色彩

金、橙褐和近黑就够了。金色很响，容易被读成“冬日暖光”，可是把颜色想成明暗，竖线还在，穗仍然是线上的亮块。底部叶子偏橙，和穗的浅金不是同一种亮度，它帮助把叶和穗分开。继续增加饱和度，节奏不会更清楚。遮住颜色之后若还指不出重复的茎，这张就没有被读完。

6．光线与光影

穗的边缘发亮、背景全黑，光在主体的侧后方（推测），接近轮廓光，但没有影子落在地面上，不能指定太阳的方位。叶子的明暗差比穗更大，说明叶子还受着比较直接的光。不能因为背景黑就说是夜景，时间字段是早晨。现场若只有阴天，Z30很难得到同样的黑底，那时改靠茎和天空的亮度差，不要靠后期把背景涂黑。

01｜暗底上重复的穗

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

机位大约在穗的高度或略低，镜头对着草丛，天空或暗背景占了上半。等效94mm把环境裁掉了，所以节奏很单纯。Z30的50-250mm大约60–80mm可以得到接近的范围，16-50mm的50mm会稍宽。先退后，让几丛穗和底部叶子同时留下，再决定要不要再长一点。贴得太近，会只剩一片光。

8．主题、情绪与氛围

可以读成“叶子退场以后，草用穗和茎接着把竖线立起来”。亮穗显得轻，黑底显得静，两种感觉同时在。安静来自没有人和没有拖影，不来自某个固定的冬季象征。我们不能据此猜测作者当天的心情。另一读法只看重复：亮块沿竖线排开。两种读法都要回到能指认的茎，不能另编一段风的故事。

9．学习与模仿

学“用暗或简单的背景，让重复的竖茎被读出来”。小区里的芒草、芦苇或枯草丛都可以，不必是同一种。Z30用50-250mm约70mm，A档f/8，对焦在中部的茎上。快门不低于1/500秒，不要照抄f/3.8；ISO自动。只改变背景：第一张背后是树或楼，第二张蹲低或侧过，让茎背后变成天空或暗处。交第二张。自检：能否指出三根分开的茎。若只剩一团金，就把茎请回来。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：DC-FZ1000M2；实焦距mm：34.43；光圈f/：3.8；曝光秒：0.002；ISO：125

作者：MaedaAkihiko ｜ 授权：CC BY-SA 4.0

Commons文件页：File:Miscanthus-sinensis winter.jpg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。

02｜一丛金秆立在中间

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



02.jpg · Krzysztof Ziarnek, Kenraiz · CC BY-SA 4.0

1．明暗与曝光

中间一丛秆是浅金，底部还有绿叶和几片落叶，后面的林子是暖褐和发白的树干，都比较柔。视线从金秆开始，再落到秆脚。没有大块死白，秆上还能看见一条条细茎。来源是尼康Z 6_2，ISO 640，35mm等效105mm，时间2025-11-09 15:09。实焦距、光圈和快门都没有记录，不补数字。软件字段也空着，不能说它经过或没经过后期。

2．对焦与景深

中部的秆比较清楚，背景的树和远处的草明显变软。这支持“一丛作为主体”，清晰的范围大约盖住这一丛的中段。对焦点没有标明。全画幅上等效105mm、靠近拍摄时，背景容易软；Z30画幅更小，同样取景不会自动得到同样的虚化。复拍用f/8，让这一丛的茎能数，背景可以软，但不要软到分不清是林子。

02｜一丛金秆立在中间

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

快门没有记录。画面里的秆没有明显拖影，只能说明这一张看起来是静止的，不能推出作者用了某一档速度（推测当时快门足以按住无风或微风）。日期是十一月上旬的下午，和秆已经变金、林子还留着褐色相符。来源说明写的是波兰施维诺乌伊希切的紫莫利草。慢门改变不了“一丛立在中间”这件事。风来时Z30应先保证茎不重影。

4．构图与内容

主体是这一丛，而不是整片林地。秆从底部散开、向上收束，多数接近竖直，左右还有更低的草托着它。落叶只是地面上的小点，不要把它读成昨天的落叶课。若取景宽到只剩树林，这一丛的节奏会消失；若裁到只剩几根秆，丛的形状又没了。先让整丛入画，再看茎是不是还分得开。

5．色彩

金秆、绿叶、褐叶和灰白树干在一起。金的面积集中，所以第一眼像在看秋色。把颜色想成灰度，中间仍是一束较亮的竖线，背景是一块更平的灰褐。绿色不是要消除的杂色，它说明这丛还没有完全枯透，底部仍有活的叶子。今天不把“金”当成结论。若把背景调成同一种黄，竖线的边界会被涂掉。

6．光线与光影

秆的左右明暗差不大，没有又长又硬的影子，光比较柔（推测为白天的散射或树荫里的开阔光）。15:09的时间字段和柔和的亮度不冲突，但不能指定云的厚度。背景发白，有一部分是虚化，不全是光照。现场如果变成硬侧光，每根秆会多出一条窄影子，节奏会更硬；那是额外的结构，要另外观察。

02｜一丛金秆立在中间

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

机位大约在丛的中部高度，镜头平视这一丛，所以能看见秆从脚到顶，而不是只看见穗的平面。等效105mm把旁边的环境让出去了。Z30用50-250mm约70–90mm尝试接近的范围，站定之后先包含整丛。再低一些，底部的叶子会变大，竖线的上半可能被裁掉。高度比继续变焦更影响这张的样子。

8．主题、情绪与氛围

一种有依据的读法是“一丛草先于整片林子站出来”。金秆显得集中，背景显得让开，季节停在秆已枯、林还未完全光秃的时候。安静来自没有人和茎没有拖影。它也可以只被看成一次对竖线重复的观察。两种读法都要回到中间这束秆，不能把落叶编成打扫或不打扫，画面里没有工具。

9．学习与模仿

学“让一丛站着的枯草占住中间，茎还数得清”。公园里任何一丛枯草都可以，不必是紫莫利草。Z30用50-250mm约80mm，A档f/8，对焦在丛的中部，快门不低于1/320秒，ISO自动。没有快门记录，不要猜一个数字去照抄。只改变取景宽度：第一张只留这一丛，第二张退半步，让左右的低草也进入。交茎更分开的一张。自检：能否不看颜色就指出这是一丛，而不是一片。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：NIKON Z 6_2；ISO：640

作者：Krzysztof Ziarnek, Kenraiz ｜ 授权：CC BY-SA 4.0

Commons文件页：File:Molinia caerulea kz12.jpg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。

03｜整面坡都是竖的

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



03.jpg · Krzysztof Ziarnek, Kenraiz · CC BY-SA 4.0

1．明暗与曝光

整面坡是浅褐和黄绿，坡顶的树更暗，天空很淡。近处的穗稍亮，草叶在缝里偏绿。没有一块特别黑的前景，视线沿着坡向上走，也被近处较大的穗拖住。坡上的深浅是一层层草，不是一条人工的边。来源为奥林巴斯TG-4，实焦距4.5mm，f/2.8，1/400秒，ISO 100，35mm等效25mm，时间2020-09-19 17:15。软件是Windows照片编辑器，文件经过它写出，曲线无法还原。

2．对焦与景深

近处的穗和草叶还能分开，坡上的草逐渐变小，但没有变成一片无法阅读的色块。小传感器上的f/2.8仍然可以前后都比较清楚，不能理解成Z30也应该开到f/2.8。对焦点没有记录。这张要的是整面坡的重复还在，所以复拍用f/8，让近处和中段的穗都能指认。若只有脚下清楚，坡就断了。

03｜整面坡都是竖的

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

记录快门1/400秒。穗没有拖影，说明这一刻它们是静止的，或晃动没有留下痕迹。九月下旬的17:15仍是白天，和明亮的坡相符，不把钟点读成傍晚的故事。来源说明写的是波兰西北部雷加河谷、被毁的山毛榉林附近的拂子茅。画面里是草坡和坡顶的树，林相是否“被毁”不能从这一张看出来，所以不把毁林写成可见事实。

4．构图与内容

主体是重复本身：许多穗从近到远铺在坡上，茎大多向上，只有轻微的倾斜。方向先让给竖线的节奏，强烈的倒向留到下一题。树在坡顶形成一条边，告诉竖线在哪里结束。若取景低到只剩脚下几穗，坡的重复就没了；若高到只剩天，草又没了。近处留够大的穗，远处留够小的点。

5．色彩

褐穗、绿叶和淡蓝天同时在。绿没有消失，所以它还不是深冬的一片枯。颜色帮助把穗和叶分开，但组织画面的是穗的重复。把饱和度再抬高，坡不会更有节奏，只会更像颜色样本。试着只用明暗看：近处的穗仍比叶亮，远处的穗仍比天暗。能这样看，竖线就还在。

6．光线与光影

天空平，穗上没有很长的投影，光比较散（推测）。17:15若在当地仍有太阳，画面也没有给出明确的光向。坡的明暗主要来自草本身的深浅和远近，不是一条影子切开画面。硬光会让每根穗多一条影子，节奏会从“茎”变成“茎加影子”。今天这一张先练没有影子时，竖线是否还读得懂。

03｜整面坡都是竖的

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

机位较低，镜头望向坡上，近大远小把重复送向坡顶。等效25mm很广，Z30用16-50mm约16–18mm可以接近这个范围。广角会把脚下放大，所以要留神最近的穗会不会占掉一半。站高一点，坡会变平，重复会更像纹理；保持低一些，竖线才有前后。先决定高度，再微调左右，让坡顶的树始终只做结束的边。

8．主题、情绪与氛围

可以读成“一整面坡用同一种竖线说话”。它不靠一丛英雄式的主体，而靠数量。安静来自没有人和没有运动痕迹，天空又让它并不沉。另一读法只是植物记录：来源已经给出种名。两种都成立，只要不把坡顶的树说成毁林的证据。感受要能指回那些重复的穗。

9．学习与模仿

学“让同一种竖线从近处排到远处”。河堤、荒地或公园的草坡都可以。Z30用16-50mm约18mm，A档f/8，对焦在中段的穗上，快门不低于1/400秒，ISO自动。不要为了模仿小传感器的f/2.8而开大光圈。只改变高度：站立一张，膝盖高度一张。交重复更清楚的。自检：能否指出近处三穗和远处仍是同样的穗。若只剩一片褐色，就还没有拍到节奏。树可以留在坡顶，不要让它变成主体。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：TG-4；实焦距mm：4.5；光圈f/：2.8；曝光秒：0.0025；ISO：100

作者：Krzysztof Ziarnek, Kenraiz ｜ 授权：CC BY-SA 4.0

Commons文件页：File:Calamagrostis epigejos kz05.jpg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。

04｜路边一丛向外张开

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



04.jpg · BeckyLaboy · CC BY 4.0

1．明暗与曝光

一丛枯草占住中下部，穗是浅褐和白，茎有暗红，后面的马路较暗，黄线和白线是亮的细条。地面是深色的土和碎屑。视线先被这一丛抓住，路是后来才看见的。土比路暗，把丛的下缘托住。来源为佳能PowerShot SX60 HS，实焦距约5.5mm，f/4，1/640秒，ISO 100，时间2021-09-11 11:20。没有35mm等效字段，不补。也没有软件字段。

2．对焦与景深

丛的中部、穗的绒毛和地面的土粒大多能辨认，马路稍软，但仍能看见标线。这不是用极浅景深把草挖出来。小传感器上的f/4很容易前后都清楚，不能换成Z30的f/4配方。对焦点没有记录。复拍时用f/8，让丛的轮廓和地面的边都可读。若马路完全融化，环境还在，但标线就不再是可用的横线参照。

04｜路边一丛向外张开

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

记录快门1/640秒。穗没有重影，1/640秒对静止的草足够，也不能证明无风。九月中旬的中午前后，和小丛已经吐出浅色穗、茎还带红相符。来源说明写的是新泽西派恩比奇的小须芒草。它种在路边，不是荒野里的一片。更快的快门不会改变它向外张开的形状。

4．构图与内容

主体是这一丛的张开：中间的茎较直，外圈的茎弯下来，像从土里放射出来。节奏仍是重复的茎，只是不全垂直。马路的横线在背后，提醒我们这是路边，而不是让路成为主体。右侧还有一根不相干的绿茎，它打破了全是枯草的印象，不必修掉，但不要让它变成新的中心。若裁掉地面，丛就悬空了。

5．色彩

浅褐、暗红、灰马路和一点绿同时在。浅色穗最跳，所以第一眼容易只说“毛茸茸”。把颜色放下，仍能看见茎从中心向外、再弯下。红茎帮助把相邻的茎分开，这是颜色有用的地方，不是题目本身。若以最白的穗为中心重新构图，张开的整体会碎掉。先看整丛的轮廓。

6．光线与光影

丛的下部和土面有较清楚的暗，上部的穗较亮，光来自上方或前上方（推测），能把绒毛和土分开。没有一条很长的影子横过马路，所以不把这张读成低角度的侧光。上午的时间字段和这样的亮度相符，精确的太阳高度不能从一张图测定。阴天时，靠茎和土的明度差也能拍，不必等硬影子。

04｜路边一丛向外张开

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

机位大约与丛同高或略高，能看见它怎样从土里张开，也能看见背后的路。5.5mm是卡片机的短焦距，取景却把一丛装得比较满，说明人离得不远。Z30用16-50mm约24–35mm，先后退到整丛和一点地面都在，再靠近。站得太高，会变成俯视的圆斑，竖线的张开会变平。路的横线可以留一条，不要让它占到上半。

8．主题、情绪与氛围

可以读成“一丛草在路边自己形成一个节奏，不必占据整片地”。马路让它日常，浅色穗让它轻。这些都来自可见的丛、土和路，不是作者的日记。另一读法只看放射状的茎。不要因为旁边是路，就把它写成被忽视或被保护，画面没有提供这样的情节。右侧的绿茎只是打断，不是故事。

9．学习与模仿

学“拍一丛向外张开的枯草，让中间的直和外围的弯同时在”。路边绿化带、花坛边都可以，不要踩进土。Z30用16-50mm约28mm，A档f/8，对焦在丛的中部，快门不低于1/500秒，ISO自动。只改变高度：与穗平齐一张，再高到能看见丛的顶面一张。交平齐的那张。自检：能否指出哪些茎还直、哪些已经弯下。若只剩路和标线，就把草丛请回画面中央。绿茎可以留着，只要它不盖住丛的中心。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：Canon PowerShot SX60 HS；实焦距mm：5.525；光圈f/：4；曝光秒：0.0015625；ISO：100

作者：BeckyLaboy｜授权：CC BY 4.0

Commons文件页：File:Little Blue Stem Schizachyrium scoparium Pine Beach NJ 210911 BLaboy.jpg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。

05｜芦穗一根根站着

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



05.jpg · Johann Jaritz · CC BY-SA 3.0 at

1．明暗与曝光

许多芦穗立在画面中上部，茎和叶是深褐，后面是一块平的蓝灰，像水和远岸。穗比茎亮，有的几乎发白。视线沿一根根竖茎上下走，也会被横过来的叶子打断。蓝灰是一整块，没有云的纹理来抢茎。来源为尼康D7000，95mm，f/11，1/320秒，ISO 400，35mm等效142mm，时间2013-12-21 14:16。软件字段是Ver.1.02，更像相机版本而不是后期软件，不据此编造调色。

2．对焦与景深

前排的穗和茎大多能分开，后面的蓝灰没有细节，但那本来就是一块平的背景。f/11和95mm让一层芦苇比较清楚，不是只虚化出一根标本。对焦点没有标明。D7000和Z30都是DX，实焦距可以对照，等效142mm不要直接当成镜头环上的数字。复拍时放大看相邻的穗是否粘在一起。

05｜芦穗一根根站着

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

记录快门1/320秒。多数穗没有拖影，1/320秒在95mm上刚刚够用或略紧，风再大就会不够。十二月下旬的14:16是白天，和明亮的背景相符。来源说明写的是奥地利珀尔查赫半岛步道旁的芦苇。同一天稍后还有一张穗的朝向更乱，那一张放在下一题。这一张先看它们还站着。

4．构图与内容

主体是竖线的重复：茎从下方向上，穗停在不同的高度，所以节奏有高有低，不是一道整齐的墙。有几根茎和叶子斜着穿过，它们是变奏，不是这张的主方向。若所有穗都被裁成同样高，重复会变呆；若斜茎占了一半，就会滑到“倒伏”那一题。学习时先数竖直的茎，再决定斜的要留多少。

5．色彩

褐、浅金和蓝灰。蓝灰的面积稳定，把穗托出来，本身不是主体。穗的亮和茎的暗已经能分开结构，颜色只是加上季节的感觉。十二月的记录和枯色相符，但不能因为褐就说它比九月的草“更悲伤”。遮住蓝灰只看茎，竖线还在；如果只记得“湖边的金色芦苇”，这张就停在颜色上。

6．光线与光影

穗的一侧较亮，茎的另一侧较暗，光来自侧前方或侧方（推测），能把一根根茎从背景里分出来。背景没有云的细节，不能测量太阳高度。f/11、1/320秒、ISO 400和白天的亮度相符，不能据此说作者故意欠曝。硬一点的侧光对这种重复有帮助；若光线太平，就靠穗和背景的明度差，而不是指望同样的亮边。

05｜芦穗一根根站着

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

机位大约在芦苇中部，镜头平视或略微向上，所以天空或水面成为上半的底，茎像一排竖线插进去。95mm在DX上的视角，Z30用50-250mm约90–110mm可以接近。再广，会把岸和对面都收进来，竖线的密度会下降。横移会改变哪几根斜茎穿过画面，这比原地变焦更值得试。先数清竖直的茎，再决定斜茎留几根。

8．主题、情绪与氛围

可以读成“冷天的芦苇仍用竖线占着水边”。亮穗让它不沉，密茎让它有重量。安静来自没有人和没有明显的晃动。地点来自文件说明，情绪不是说明里写好的。另一读法只看高低不同的穗怎样避免节奏变呆。不要把斜过的叶子理解成衰败的证据，它只是方向上的变奏。

9．学习与模仿

学“拍一排还站着的枯茎，让高低有一点变化”。水边的芦苇、公园的芒草墙都可以，站在路边，不要走入水。Z30用50-250mm约100mm，A档f/8，对焦在中部的穗上，快门不低于1/400秒，风大再加快，不要照抄1/320秒；ISO自动。只横移一步：第一张让一根斜茎穿过，第二张避开它。交竖直重复更清楚的一张。自检：能否指出三根分开的竖茎，以及最高和最矮的穗。横过来的叶子留一两根就够，多了会把竖线切断。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：NIKON D7000；实焦距mm：95；光圈f/：11；曝光秒：0.003125；ISO：400

作者：Johann Jaritz ｜ 授权：CC BY-SA 3.0 at

Commons文件页：File:Poertschach Halbinselpromenade Phragmites australis 21122013 745.jpg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/at/deed.en

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。