霜叶的边缘与质感

第45周 · 5张范例 · 每张九项深入解读

读这份点评的方法

先看照片五秒，说出第一视觉落点和整体感受，再读文字。每张依次分为三页：明暗与清晰；快门、构图、色彩与光线；机位、主题与自己的练习。阅读不等于接受唯一答案，试着用图中证据支持或修正自己的判断。

哪些是事实，哪些是解释

曝光参数来自sources.json保存的Commons原图元数据；颜色、边缘与亮暗是现有图像上的观察；光向、焦点与氛围解释在证据不足时标明可能性。Z30设置均为教学建议，不能冒充作者使用过的参数。

先借鉴原则，再考虑复制外观

手机、小型相机和不同画幅镜头不能直接照抄焦距或光圈。套头不够微距、没有同样物候或没有相同场所时，可以换对象、距离与取景范围。每张最后都有可完成的对照练习和成片检查。

本题五张的阅读顺序

01｜红与白：先找清晰的一枝
02｜霜晶像山脊：从表面看到体积
03｜重叠的褐叶：让细节有秩序
04｜深绿与白霜：边缘如何分开主体
05｜透光的绿叶：寒冷也可以有暖色

素材与修订

照片与许可沿用原期，未新增替换照片。2026-11-10更正版重写全部九项解读，每张约1200汉字。Markdown原稿与PDF一起保存，便于搜索、引用和后续更正。

01｜红与白：先找清晰的一枝

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



01.jpg · Gerda Arendt · CC0

1．明暗与曝光

第一眼容易落在右上至中央那一组红叶上：叶缘的白霜比叶面更亮，周围褐色枝叶较暗，构成细线包围色块的关系。左上背景有一块浅灰亮区，也会牵走视线，所以这并非完全清理干净的背景。亮度总体接近自然日间场景，并不是“大面积黑”的低调风格。氛围来自温暖叶色与冷白霜线并置；不能仅凭缩略图断言原始高光是否溢出。

2．对焦与景深

右上伸向中央的一枝上，叶缘与霜粒相对容易辨认，左侧远处的小叶则更松散。这支持“用局部清晰挑出一枝”的阅读方式，但不证明作者实际用了哪个对焦点。前后叶片虽然颜色相似，清晰度差异仍建立了层次。仅有缩略图不能准确区分景深、缩图锐化和轻微失焦各自的贡献；不要把背景虚化程度直接等同于大光圈。

01｜红与白：先找清晰的一枝

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

没有明显的拖线、重影或被拉长的叶缘，画面呈现静止观察，快门的主要任务应是维持枝叶的可读性，而非制造运动效果。本图来源未提供可用曝光参数，不能反推成某个精确速度。有风时，即使防抖能减少手抖，也不能冻结叶片；练习应先提高快门，再考虑降低ISO，而不是把“静物”误解成“可以任意慢拍”。

4．构图与内容

主体可理解为右上向中央伸展、霜边较清楚的红叶枝；其他密集红叶是环境和重复节奏，细枝提供连接。视线从较大的近叶进入，再沿斜枝游走到较小叶片，画面同时保留了灌木的繁茂感。弱点是左下和上缘仍有较多切断的碎叶。若追求安静，可尝试稍向右移动，把主枝后方换成更均匀的暗部，而非一味收紧裁切。

5．色彩

主色是红橙与红褐，白霜作为低饱和的亮色强调，少量深绿退在后面。这更接近暖色近似色形成整体、由冷白提供触感对照，不宜简单称作强烈的红绿互补。白边面积虽小，却因亮度高而有很强的视觉权重。试着遮住霜边看叶色，再遮住红色看轮廓，就能理解：颜色负责吸引，霜线负责把相邻叶片分开。

6．光线与光影

多数叶面明暗过渡较柔，没有整齐一致的硬投影，可能是柔和自然光或分散反射光；局部亮斑不足以证明太阳的精确方位。霜在叶缘显得更亮，也与材质反射和位置有关，不能一概解释成逆光。学习时应观察同一叶片转动角度后，白霜是否从均匀白边变成闪点，以判断是光向变化还是仅仅换了更亮的背景。

01｜红与白：先找清晰的一枝

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

画面是接近叶丛高度的斜向近看，叶片大小与清晰度差异使近远关系可读，既不是正上方平铺，也没有明显的仰望气势。准确机位高度不可从图中确定。靠近主枝能扩大它与远处小叶的大小差，但也会缩小有效景深。向侧面横移，比站在原地变焦更可能消除背景枝条与主叶重叠，这正是拍摄时值得先做的动作。

8．主题、情绪与氛围

一种有依据的解读是“秋色仍在，寒意已经到达”。红色没有因结霜完全退去，白线又让每片叶显得脆而凉；繁密背景使它更像日常路边的小发现，而不是孤立的植物标本。暖色不必然意味着温暖天气，白霜也不必然意味着悲凉。这种冷暖并存的感受来自画面，可作为阅读方式，不能替作者宣称某种人生寓意。

9．学习与模仿

重点学“用清晰层次从相似颜色中挑出主体”。找一丛有红叶的矮灌木，无霜时可以找露珠叶缘；不要人为喷出结冰效果冒充现场。Z30配16-50mm，先退到能可靠合焦的位置，用约35–50mm、A档f/5.6作为建议起点，对准主叶边缘；有风争取1/250s或更快，必要时提高ISO。先不改焦距，左右各移约20厘米，拍背景亮斑保留与被遮住两版。自检：主叶是否能在两秒内被认出，霜边是否清楚，左上亮区是否抢眼。若最近对焦距离不够，就拍一整枝；应复制层次原则，而非强求一样的放大率。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：未提供可用曝光参数

作者：Gerda Arendt ｜ 授权：CC0

Commons文件页：File:Red leaves wih frost, Ehrenbach.jpg

许可证：http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。

02｜霜晶像山脊：从表面看到体积

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



02.jpg · Robert Flogaus-Faust · CC BY 4.0

1．明暗与曝光

下半部叶面和突起霜晶较亮，上方中央有一大片暗孔，晶体因此像从深色背景里竖起。亮点并非均匀撒满全图，而是集中在斜向叶缘上；这比单纯“拍亮霜”更能建立观看顺序。暗部容许背景枝叶失去细节，体现了取舍，但不能据此断言作者有意欠曝。最亮的晶尖很小，肉眼看着闪亮也不等于原始文件一定过曝。

2．对焦与景深

中部偏下那条霜晶边缘相对清楚，后方斜枝与叶片明显模糊，近距离的选择性清晰是画面成立的重要条件。焦点可读位置更接近晶体所在的边缘，不是整个褐色叶面。不同高度的晶尖并非全在同一平面，部分软掉是近摄常见现象。来源显示f/6.3，但小型相机的画幅和近摄距离与Z30不同，不能认为套头设同样光圈就会得到同样景深。

02｜霜晶像山脊：从表面看到体积

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

已记录快门为1/320s，叶缘没有明显方向性拖影，较短曝光有利于保留细小晶体。它并不能证明现场绝对无风，也不能证明用了三脚架。霜晶本身不在快速移动，主要风险是承载它的叶片晃动和相机轻微位移；近摄时，两者都会放大。此图的时间感是“暂停并仔细看”，不是表现结霜过程，更不能从单张照片得知晶体怎样生长。

4．构图与内容

主体是跨越画面中部、密集而直立的霜晶，褐色叶脊为它们提供基座。上方暗空间不是空缺，而是让透明晶尖与背景分离的负空间。斜向的叶脉和边缘把视线从左下引向右侧；后景另有一条模糊斜枝呼应方向。画面下方较厚的叶面会占据分量，若把镜头略抬高，应先确认晶尖还能落在暗背景上，不能只为了少拍地面而丢掉分离效果。

5．色彩

银白、灰褐与近黑构成低饱和配色，叶脉附近略暖的棕色使霜显得更冷。它不是靠鲜艳吸引人，而是靠白与褐的材质差异：白细而脆，褐厚而皱。即便转为黑白，晶尖与暗孔的关系仍大体成立。练习时不必把白平衡故意调得很蓝；如果整片叶变蓝而棕色基底消失，温差的微妙关系反而会被削弱。

6．光线与光影

叶片亮面的起伏、下方较深的阴影和晶尖闪亮，支持“有方向性的斜光”这一判断。光可能从画面上方偏左一侧照入，但晶体会折射反射，不能只凭单个亮尖精确定位光源。斜光比正面均匀照明更能使霜晶从背景里立起。观察叶脊两侧的明暗，比只找最白点更可靠；这能区分照明怎样塑形与曝光怎样分配亮度。

02｜霜晶像山脊：从表面看到体积

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

镜头非常接近叶片，并以较低、擦过叶缘的角度观看，使晶体在轮廓上获得“高度”。若改成垂直俯拍，观者更容易看到叶脉图案，晶体的立体竖线会减弱。原图实焦距约30.5mm，来自小型相机，并非Z30上的30.5mm视角。更重要的是光轴、叶缘与背景的关系：让晶尖后面有暗部，比单纯增加焦距更有效。

8．主题、情绪与氛围

这张可以被读成“小尺度上的冬日地形”：普通叶片在近看时变成山脊，晶体像一排细塔。暗背景让观看变得集中，褐色纹理带出粗粝，透明霜又显得易碎。这里的安静并非依赖大面积留白，而是让环境退到看不清的程度。这样的比喻是帮助理解形式的阅读，不是声称作者真的把叶片当作山岳来创作。

9．学习与模仿

学“用低角度和暗背景表现细节高度”。套头不一定能获得原图的微距放大率，可找更大的结霜叶缘、露珠草叶，保留完整叶片也成立。Z30配16-50mm，先确认能合焦，再用f/8、1/250s左右和Auto ISO作建议起点；若曝光不足就提高ISO，不要无限放慢快门。做两张对照：第一张垂直俯拍叶面，第二张降低光轴贴近叶缘，对焦都落在同一处霜上。检查第二张是否真正显出晶体高度、背景是否足够暗，以及主霜线是否清楚。不要踩入结霜草坪追逐机位，也不要把后期裁切造成的像素不足误认为镜头锐度不足。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：Canon PowerShot G11；实焦距mm：30.5；光圈f/：6.3；曝光秒：0.003125；ISO：100

作者：Robert Flogaus-Faust ｜ 授权：CC BY 4.0

Commons文件页：File:Carpinus betulus leaf with frost RF.jpg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。

03｜重叠的褐叶：让细节有秩序

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



03.jpg · Gerda Arendt · CC0

1．明暗与曝光

白霜覆盖叶缘和部分叶脉，比红褐叶面更亮；叶片之间的深色缝隙把相邻形状切开。中央偏右的大叶最容易成为视觉落点，周围叶片虽多，却没有全被提亮到同一程度。整体偏暗而不失细节，带来沉静、贴近地表的感受。这里应看的是亮线与暗缝的比例，不能把“褐叶较暗”简单当作曝光不足，也无法从展示图确定后期是否压暗。

2．对焦与景深

几片主要叶片的霜线和网状叶脉可读，后方深绿叶片与更远的小枝较弱。它不是只有一小点清楚的极浅景深，而是在较接近的物体平面上保留一定细节。来源记录来自手机、f/1.7；小画幅下的f/1.7不等于Z30同数值的景深。可见清晰区域支持“关注一组叠叶”，但实际对焦位置及是否有计算处理，无法仅靠成片确定。

03｜重叠的褐叶：让细节有秩序

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

记录快门为1/316s，画面中没有显著的方向性拖线，适合交代白霜细碎的边界。叶片整体稳定的外观，并不能证明它们始终没有摇动；较短快门只是降低了晃动暴露的机会。此图没有依赖决定性动作，时间选择更多在于霜尚未融化、光还柔和的状态。不能凭霜的存在推算精确拍摄时刻，更不能把作者的快门当成任何风速下都安全的保证。

4．构图与内容

主体不是一片孤叶，而是中央几片相互覆盖的褐叶。左侧大叶把视线送向中部，右侧主叶的锯齿边缘与霜线再引向下方；上方少量绿叶成为颜色和材质的陪衬。暗缝负责交代遮挡次序，否则白色纹理容易连成一团。画面边缘有被截断的叶片，说明作者选择了局部。学习时可尝试保留一片完整主叶，让其余碎片只在边缘提供环境，降低辨认负担。

5．色彩

红褐、深绿与灰白是主要配色，整体饱和度较低。褐叶偏暖，深绿偏冷，两者互相衬托，但不必把它们硬套成纯红与纯绿的标准互补。白霜像一层共同的颜色，把不同植物统一到同一个季节。若后期过分增加饱和度，褐叶会突然变得抢眼，细小白线不再主导；因此这张更值得学的是克制地保持颜色之间的相对关系。

6．光线与光影

叶片没有很长、边缘很硬的投影，白霜在多个方向的边缘都可见，整体更像柔和的自然光。具体是阴天还是开阔阴影，证据不足。柔光使叶脉能在一片叶内部逐渐显现，也避免强反差把纹理压成纯白或纯黑；暗缝仍提供形体分隔。模仿时若只有直射阳光，可换到建筑阴影旁，而不是直接加大对比试图“压出质感”。

03｜重叠的褐叶：让细节有秩序

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

画面接近斜俯视，既能看到叶面的网状结构，又保留了叶片翻卷和重叠的厚度。若完全平视，叶面会变窄，霜线可能变成重叠的一条；若垂直俯拍，厚度又会减弱。手机靠近拍摄并没有使所有背景消失，说明拍摄距离和物体之间的距离同样重要。横移几厘米就可能改变一片绿叶是否出现在主叶背后，这比事后修掉它更值得练习。

8．主题、情绪与氛围

可以把主题理解为“寒冷给不同叶片画上共同的边”。绿色与褐色本来代表不同状态，白霜却把它们放到同一套纹理里；画面因此有结束与延续并存的意味。这个解释来自颜色和覆盖关系，不需要编造某次清晨散步的故事。另一种读法只是欣赏植物纹理，也同样成立。观看时先问自己感受到的是凉、密、脆，还是衰败，再找具体形状支持。

9．学习与模仿

重点学“让重叠有先后，让纹理不打架”。找三片自然叠在一起、颜色不同的落叶，无霜可观察露水或叶脉；不要移动保护区植物。Z30用16-50mm，能合焦的位置上试35–50mm、f/8，选中间主叶合焦，有风时提高到约1/250s。固定光线与曝光，只改变俯视角度：一张稍平、一张更俯，比较哪张暗缝最清楚。成功标准是闭上眼再睁开，能先辨认主叶，再读到两层陪叶，而不是只看到杂乱白点。若不够清晰，先把主要叶面放在更接近同一对焦平面上，再考虑缩光圈；不必为追求全清楚把所有背景也拍得一样醒目。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：motorola one vision；实焦距mm：4.745；光圈f/：1.7；曝光秒：0.00316456；ISO：40

作者：Gerda Arendt ｜ 授权：CC0

Commons文件页：File:Frosted leaves, Ehrenbach.jpg

许可证：http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。

04｜深绿与白霜：边缘如何分开主体

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



04.jpg · wfmillar · CC BY-SA 2.0

1．明暗与曝光

前方中央几片叶子被厚白霜包边，成为画面最醒目的亮区；深绿叶面和叶间阴影形成暗底。后方也有许多霜叶，却因尺度和清晰度较弱而后退。这里的“白”是一条有宽度、有纹理的边，不是大面积白背景。曝光阅读应先检查前方白边是否仍有颗粒，再看绿叶是否还有叶脉；不要为了提亮背景而把白霜拍成没有层次的轮廓。

2．对焦与景深

前方伸向下方的大叶及中央叶缘相对清楚，远处重复叶片较软，符合用近景清晰建立主体的方式。来源相机是小型数码机，f/2.8并不能直接解释Z30应该开到多大。个别白边看似比叶面更清楚，也可能只是高反差带来的清晰感，不等于焦平面只落在白边。复拍时要放大检查叶脉与霜粒，而非只看缩略预览“够不够锐”。

04｜深绿与白霜：边缘如何分开主体

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

记录快门1/200s。主要叶缘没有明显拖影，画面强调晶粒与叶脉的空间关系，不靠动态模糊成立。1/200s对于一片轻摆的叶未必足够，原片也不能告诉我们当时风速。应从叶尖是否有重影去检验速度，而不是把EXIF数字当作标准答案。如果提高快门后仍不清楚，再检查合焦距离；快门无法解决把焦点落在后叶上的错误。

4．构图与内容

中央叶簇以不同方向展开，几片较大的叶子向下、向侧面伸出，近似放射形结构。背景同类叶片提供“重复”，而前方叶片更大、更清楚，提供“变化”，因此观者不会平均浏览每一片叶。主体并不完全孤立，这是它比标本照更自然的地方。上缘和右缘叶片略拥挤；若复拍，可把主叶与远处最亮的一小簇错开，让白边之间留下暗色间隔。

5．色彩

深绿与中性的白灰是主色，没有强烈暖色参与，整体显得清冷、湿润。主要对比来自明度和饱和度差别，而不是标准互补色。绿叶仍有几档深浅，白霜也有亮白与灰白，不应统统调成同一种白。若强加蓝调，会让霜显冷，却可能压掉植物本来的绿色层次；先准确保留两种材质的区别，比套冷色滤镜更有教学价值。

6．光线与光影

多片叶缘均被照得柔和，叶片阴影过渡较缓，没有足够证据指认一束强烈侧逆光。可能是云层散射光，也可能处于阴影中接收天空光。白霜本身反射率较高，即使没有逆光也会比叶面亮。学习时可用一张白纸观察环境光从哪里最强，再与叶片明暗相对照；这样能避免把“轮廓亮”一律误判为轮廓光。

04｜深绿与白霜：边缘如何分开主体

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

镜头接近叶簇，以斜俯视看到前方叶面的完整形状。不是极端微距，保留多个叶片使观者容易理解植物的尺度和生长方向。前叶大、后叶小的关系来自距离，不能单凭背景软就猜用了长焦。站高一点可能使深色叶间空隙缩小，站低一点又会让白边相互叠压；可在几厘米高度差内寻找既有叶面又有暗缝的平衡。

8．主题、情绪与氛围

一种解读是“仍在生长的绿色被冬天暂时包住”。厚白边与深绿核心并存，冷并没有消除叶子的形态。画面情绪更克制、细密，不是宏大严寒；观者需要靠近看颗粒，才会感到霜的存在。也可以只把它看作图案研究。重要的是用可见的白边厚度、绿色保留和重复结构解释感受，而不是用“高级”“治愈”代替分析。

9．学习与模仿

学“背景可以重复，但主体必须有等级”。找一簇叶片，无霜时可用天然浅色叶缘或露水纹理替代。Z30配16-50mm，建议从f/5.6–f/8开始，焦点放前方主叶；拍前确认白边不过曝，有风时把快门提高到约1/250s。先固定机位拍一张，再仅横移十厘米让后方亮叶与主叶错开，保持其余设置相同。检查：是否能明确指出第一眼看的叶片，背景是否仍能被认出却不争抢。若白边重叠成团，先换机位而非无限增大光圈；若套头不能近到原图尺度，保留更多叶片，以主次关系而非放大率作为作业目标。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：Canon DIGITAL IXUS 700；实焦距mm：7.7；光圈f/：2.8；曝光秒：0.005

作者：wfmillar ｜ 授权：CC BY-SA 2.0

Commons文件页：File:Frost on Bay Tree Leaves - geograph.org.uk - 431574.jpg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。

05｜透光的绿叶：寒冷也可以有暖色

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



05.jpg · Tord Dellsen · CC0

1．明暗与曝光

下方三片较大的叶子透出黄绿色，中间靠上的叶片表面覆霜而偏冷白，背景则是灰褐杂枝。最亮的霜边、透光叶面与暗色叶脉同时存在，所以画面不只是“把叶子拍亮”。明暗有利于展示不同叶片朝向，但背景局部亮枝仍可能分散注意。需要保留的是透光区域里的脉络和颜色，不能仅因叶缘发白就判断曝光正确。

2．对焦与景深

中央叶簇的边缘、叶脉比后方细枝更可辨，主焦点可读为落在这组叶附近；各片叶并不在同一平面，不能要求它们锐度完全相同。手机f/2.0和约4.67mm的实际焦距，不应被换成Z30直接照抄的组合。背景虽模糊，线条仍然多，说明“虚化”不自动等于“背景干净”。合焦之后还要用机位消除最亮、最接近主叶的背景交叉线。

05｜透光的绿叶：寒冷也可以有暖色

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

记录曝光时间约0.004825秒，即约1/207s。叶缘没有明显被拉成长线，因此本图主要表现静态细节，不能读成故意的运动模糊。手机可能有计算成像过程，但现有信息不足以确认多帧策略。复拍时以叶片是否晃动决定速度，若日光足够，可用1/250s或更快；不要因为作者用了约1/207s，就把这个数字当作逆光叶片的固定配方。

4．构图与内容

叶簇处于画面中部，以细茎连成上下关系；下方数片透光大叶形成较重的色块，上方小叶和芽向上延伸。背景杂枝提供野外环境，但也让边缘变忙。主体是“同时受光的这一簇”，而非某一片孤叶。若只想突出一片，应重新找机位使其他叶退为陪衬；事后裁得过紧容易切断叶尖，让原来的生长方向也消失。

5．色彩

黄绿、深绿与少量锈红斑点构成暖色叶面，霜则呈灰白、略冷的视觉感受；灰褐背景保持低饱和。暖绿与冷白并置，比全图统一偏蓝更能交代霜与日照共存。局部红褐斑不是需要修掉的“脏色”，它让叶片不再是纯装饰性的绿。不能凭这份黄绿判断作者提高了黄色饱和度，可能只是自然透光与叶片状态共同作用。

6．光线与光影

下方叶片内部发亮、叶脉成为较暗网线，支持光从叶后方穿透的判断；上方一些叶面又反射出亮霜，说明同一簇叶因倾角不同而同时呈现透射和反射。更准确的说法是具有逆光或侧逆光特征，无法仅凭此图定位太阳的精确方位。复拍时绕叶簇移动，观察叶面从不透变透的一刻，就能把光线方向和曝光补偿的作用分开。

05｜透光的绿叶：寒冷也可以有暖色

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

视线接近叶簇高度、略有俯视，既见到叶面，也见到叶缘上的霜。背景距离比主叶远，前后关系有助于分离，但没有被完全抹平。若站得更高，透光角度可能改变，叶面会变暗；如果只在原地拉近焦距，背景杂线的位置未必改善。先移动身体寻找透光和干净背景同时成立的位置，再决定拍整簇还是局部，是这张最实际的机位启发。

8．主题、情绪与氛围

可以把它看作“冷与暖同时存在的一小刻”：白霜提示冷，透光叶片提示太阳仍有温度，灰枝又交代季节的疏落。比起单纯展示严冬，它更有过渡感。照片本身不能证明霜马上会融化，也不能说明作者当时的情绪；我们能说的是颜色和光的组合让画面不像纯粹寒冷。应把这种感受建立在具体叶面差异上。

9．学习与模仿

学“先找透光角度，再决定曝光”。找一簇薄叶，只有普通绿叶也能练，不必等霜。Z30配16-50mm约35–50mm，建议A档f/5.6；先对一片透光主叶合焦，检查高光，快门尽量不低于1/250s。做两张只改机位的对照：绕叶簇移动，让第一张光从身后来，第二张光从叶后透来，白平衡保持一致。随后在同一逆光位置检查背景，必要时再横移避开亮枝。成片应能看到叶脉、叶面颜色不过白、背景不穿过主叶边缘。若光照使屏幕难看清，找遮挡后检查回放，不要直视太阳或把镜头长时间对准太阳。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：Pixel；实焦距mm：4.67；光圈f/：2；曝光秒：0.004825；ISO：50

作者：Tord Dellsen ｜ 授权：CC0

Commons文件页：File:Leaves with frost.jpg

许可证：http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。