

Liste non exhaustive de classiques

Tome I : Analyse

Une compilation d'exercice mathématiques
pour étudiants de classe préparatoire MP, PSI et PC



Auteur : Marconot Lorenzo , Esteve Arthur

Collection Prépas – Mathématiques

A M. Garcin et M. Teyssier
et aux 5/2 des promos 2023-2024 et 2024-2025.
"La prépa, c'est du sang, des larmes et de la sueur".

Avant Propos

Salut à toi jeune CPGEiste, alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple : savais-tu que 95 % des étudiants en prépa ne savent pas comment aborder un problème ? Alors, est-ce que tu veux en faire partie ? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié ou commencer très rapidement à accumuler du savoir avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir faire partie de l'élite ? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue.

Bon, en vrai sans déconner, Arthur et moi-même sommes passés par-là, on a fait 3 ans de classe préparatoire au lycée Dumont d'Urville, donc on connaît très bien la prépa et ses enjeux. On a voulu transmettre un morceau de ce que l'on pense qui vous sera utile, à l'instar de nos 5/2 (s/o Arsinoé Payet, Félix Gauci et Célian Rosello) qui ont écrit un formulaire en Chimie et en SI (que je ne saurais trop vous conseiller de lire avant chaque DS pour revoir les formules à connaître). On souhaite que soit transmis un héritage au sein de Dumont pour que chaque année, les prédécesseurs aident les suivants.

Déjà, à qui servent-ils ? Il est utile à tout étudiant peu importe son niveau ou son ambition. Dans cet ouvrage, on a essayé de compiler tous les exercices classiques (vus en colle, en DS ou en TD) que l'on a trouvés pertinents, car ils sont soit omniprésents aux concours, soit demandant un raisonnement qu'il est impératif d'avoir vu pour acquérir des réflexes très utiles si l'on est bloqué. Il est vrai que ce recueil d'exercices contient énormément d'exercices difficiles, mais il ne faut pas avoir peur : il y a énormément d'exercices abordables et que vous devez impérativement faire et puis, pour réussir en prépa, il faut « avoir les dents qui rayent le parquet », faut vouloir tout déchirer pour obtenir ce que l'on veut et c'est à cela que servent ces ouvrages : vous proposer une liste d'exercices qu'il faut voir (et revoir autant de fois que nécessaire) avant les concours. Ces ouvrages sont également destinés aux étudiants ne souhaitant pas faire d'études d'ingénieur et qui souhaitent aller en licence. Ils permettent d'avoir toutes les bases nécessaires pour appréhender en toute confiance les chapitres de la L3.

Bon, cet ouvrage est uniquement là en complément de cours : il faut d'abord assimiler le cours avec le prof pour pouvoir s'en sortir en prépa, donc on privilégie les exos du TD. On a créé ce recueil pour que les théorèmes ou résultats classiques soient recensés au même endroit.

P.-S. : On essaie de compléter au fur et à mesure les corrections des deux livres, cela demande un temps de dingue mais on promet de proposer un maximum de corrigés avant les concours.

P.-P.-S. : Ce message est destiné à tous les futurs 5/2, je souhaiterais que pendant votre temps de révision, vous envisagiez de perpétuer l'héritage pour que d'ici quelques années Dumont d'Urville soit au sommet. Je ne vous demande pas de faire un aussi gros projet, mais cela serait vraiment super de pouvoir aider les futurs élèves à relever le défi qu'est la prépa en toute confiance.

Légende et notations

Un exercice est affilié d'un certain nombre d'étoiles ★ relativement à sa difficulté :

- ★ Démonstration ou application directe du cours (le plus souvent E3A, CCINP) ;
- ★★ Application du cours/de méthodes usuelles (le plus souvent CCINP, Mines-Télécom) ;
- ★★★ Application du cours/de méthodes usuelles (le plus souvent Centrale, Mines-Ponts) ;
- ★★★★ Exercice exotique/peu ou pas guidé (Centrale, Mines-Pont, X-ENS) ;
- ★★★★★ Exercice exotique/peu ou pas guidé (le plus souvent X-ENS).

Ces étoiles suivent un code couleur indicatif du concours auquel l'exercice aurait le plus de chance d'être posé, à l'écrit ou à l'oral :

- Aucun concours spécifique ★
- E3A/CCINP ★
- Mines-Télécom ★
- Mines-Ponts/Centrale ★
- X-ENS ★

Pour des exercices considérés comme des "classiques" qui tombent régulièrement, le titre de l'exercice sera souligné.

Par exemple Série harmonique : ★★★ indique que l'exercice nommé "Série harmonique" est un incontournable de tous les candidats qui se préparent à E3A/CCINP.

Enfin, un exercice qui utilise ou traite des notions hors du programme (de MP) sera suivi d'un label (HP).

Table des matières

I Suite et série numérique	13
I.1 Lemme de Césarò ★★	13
I.2 Théorèmes Taubériens d'Hardy ★	13
I.3 Série Harmonique ★★★	14
I.4 Suite récurrente (1) ★★★	15
I.5 Suite récurrente (2) ★★★	15
I.6 Suite récurrente (3) ★★★	15
I.7 Suite récurrente (4) ★★	15
I.8 Suite récurrente (5) ★★	15
I.9 Suite récurrente (6) ★★★	16
I.10 Suite définie implicitement (1) ★★	16
I.11 Suite définie implicitement (2) ★★	16
I.12 Suite définie implicitement (3) ★★	17
I.13 Suite définie implicitement (4) ★★	17
I.14 Suite définie implicitement (5) ★★	17
I.15 Formule d'inversion de Pascal	18
I.16 Théorème de Pringsheim ★★	19
I.17 Lemme de Fekete ★★★	19
I.18 Théorème de Bolzano-Weierstrass ★★★	19
I.19 \mathbb{R} est complet ★★	19
I.20 Récurrence de Cauchy ★★★	20
I.21 Sommes de Riemann ★★	20
I.22 Formule d'Euler-Maclaurin ★★★	20
I.23 Nature d'une suite ★★	20
I.24 Valeurs d'adhérence d'une suite ★★	21

I.25	Nature d'une série (1)	★	21
I.26	Nature d'une série (2)	★★	21
I.27	Nature d'une série (3)	★★★	21
I.28	Nature d'une série (4)		21
I.29	Nature d'une série (5)		22
I.30	Calcul d'un équivalent	★★★	22
I.31	Sommation de relation de comparaison	★	22
I.32	Equivalent de séries de Riemann	★	22
I.33	Séries de Bertrand	★★	22
I.34	Critère de Raabe-Duhamel	★★	22
I.35	Règle de d'Alembert	★★	23
I.36	Règle de Cauchy	★★★	23
I.37	d'Alembert \Rightarrow Cauchy	★★	23
I.38	Transformation et règle d'Abel	★★★	24
I.39	Equation différentielle discrète	★★★	24
I.40	Critère spécial des série alternées	★	24
I.41	Calcul d'une somme de série (1)	★★★	25
I.42	Calcul d'une somme de série (2)	★	25
I.43	Calcul d'une somme de série (3)	★★★	25
I.44	Problème de Bâle		25
I.45	Nombre moyen de diviseurs d'un entier	★★★★	26
I.46	Théorème de réarrangement de Riemann	★★★★★	27
I.47	Moyennes arithmétique, géométrique et harmonique	★	27
I.48	Inégalité de Carleman	★★★	27

II Intégrale 29

II.1	Règle de Bioche	★	29
II.2	Intégrale de Wallis	★★	29
II.3	Formule de Stirling	★★	30
II.4	Intégrale de Gauss		30
II.5	Intégrale de Fresnel	★★★	30
II.6	Intégrale de Dirichlet		31
II.7	Intégrale du reste de l'intégrale de Dirichlet	★★★	32
II.8	Intégrale d'Euler	★★	32
II.9	Fonction intégrale	★★★	32
II.10	Intégrales de Bertrand		32
II.11	Intégrabilité des cosinus de polynôme		32
II.12	Nature d'une intégrale		33
II.13	Divergence grossière		33
II.14	Espace l^2 et dérivation		33
II.15	Intégrale de Frullani	★★★	33
II.16	Calcul d'une intégrale (1)	★★★	34
II.17	Calcul d'une intégrale (2)	★★	34

II.18	Calcul d'une intégrale (3)	★★★	34
II.19	Calcul d'une intégrale (4)	★★★	34
II.20	Permutation Série-intégrale (1)		34
II.21	Permutation série-intégrale (2)		34
II.22	Fonction d'écart logarithmique intégral	★★	35
II.23	Intégrale de Bernoulli	★★★	35
II.24	Lemme de Riemann-Lebesgue : cas des fonctions \mathcal{C}^1	★	35
II.25	Intégrale de Poisson (1)	★★	35
II.26	Intégrale de Poisson (2)	★★★	35
II.27	Mines-Ponts MP 2024 (Chaïma Prime)		36
II.28	Une suite d'intégrales (1)		36
II.29	Une suite d'intégrales (2)		36
II.30	Une suite d'intégrales (3)		37
II.31	Nombre d'Apéry		37
II.32	Comportement asymptotique (1)		37
II.33	Comportement asymptotique (2)		37
II.34	Théorème de d'Alembert-Gauss (1)	★★	38
II.35	Fonction Gamma d'Euler	★★	38
II.36	Fonction Bêta d'Euler	★★	40
II.37	Inégalité intégrale-dérivée		41
II.38	Majoration de l'erreur dans la méthode des trapèzes	★★	41
II.39	Inégalité de Young	★★	41
II.40	Transformée de Laplace	★★★★	41
II.41	Théorème des résidus (Version faible) (HP)	★★★★	42

III Fonctions réelles 43

III.1	Formule de Leibniz	★	43
III.2	Fonction discontinue en tout point	★	43
III.3	Fonction nulle part dérivable	★★★	43
III.4	Théorème de Rolle		43
III.5	Dérivée symétrique	★	44
III.6	Fonction de Pringsheim	★★	44
III.7	$f \circ f = \text{Id}_{\mathbb{R}_+}$	★★	44
III.8	Point fixe d'une fonction continue et décroissante sur \mathbb{R}	★	44
III.9	Un théorème du point fixe (1)	★	44
III.10	Un théorème du point fixe (2)	★★	44
III.11	Point fixe de $f \circ f$	★	45
III.12	Point fixe de $f \circ g$ et $g \circ f$	★★	45
III.13	Racine carrée de cos	★★★	45
III.14	Trigonométrie	★	45
III.15	Règle de l'Hôpital	★★	45
III.16	Théorème de Darboux	★★★	46
III.17	Dérivée et inverse confondu	★★★★	46

III.18	Fonction croissante et convexe sur \mathbb{R} ★	47
III.19	Convexité des fonctions continues sur un intervalle ★★★★★	47
III.20	Convexe sur un ouvert \implies continue ★★★★★	47
III.21	Fonctions logarithmiquement convexes ★★★★★	47
III.22	Etude d'une fonction définie implicitement ★★	48
III.23	Inégalités de Kolmogorov ★★★★★	48
III.24	Lemme de Croft ★★	49
III.25	Inégalité intégrale de Jensen ★	49
IV	Polynômes	51
IV.1	Théorème de d'Alembert-Gauss (2)	51
IV.2	Bernoulli ★★	52
IV.3	Lagrange ★	52
IV.4	Tchebychev ★★	53
IV.5	Hilbert ★★	54
IV.6	Laguerre ★★★★★	55
IV.7	Legendre ★★	56
IV.8	Hermite ★★★★★	56
IV.9	Bernstein ★★★★★	57
IV.10	Polynômes cyclotomiques ★★★★★	57
IV.11	Suite de polynômes défini par récurrence	58
IV.12	Théorème de la racine rationnelle	58
IV.13	Critère d'Eisenstein ★★★★★	58
IV.14	Zéros des polynômes de Taylor du sinus	59
IV.15	Intégrales de polynômes ★	59
IV.16	Théorème de Gauss-Lucas ★★	60
IV.17	Une condition nécessaire pour qu'un polynôme réel soit à racines réelles ★★★★★	60
IV.18	Polynômes qui commutent avec cosinus ★★★★★	60
IV.19	Relation trigonométrique polynomiale ★★★★★	61
IV.20	Logarithme polynomial? ★	61
IV.21	Une fraction rationnelle ★	61
IV.22	Théorème de Bernstein	61
IV.23	Etude d'un polynôme défini implicitement	61
IV.24	$P' P$ ★	62
IV.25	Polynômes positifs ★★	62
IV.26	Polynômes carrés	62
IV.27	Polynômes réciproques ★★	62
IV.28	Polynômes surjectifs ★★★★★★	63
IV.29	Résultant et discriminant ★★	63
IV.30	Théorème de Liouville : Fermat pour les polynômes ★★★★★	64

V	Espace vectoriels normés	67
V.1	Suite de Cauchy ★★	67
V.2	Théorème de Fréchet-Von Neumann-Jordan	67
V.3	Une norme non euclidienne	67
V.4	Norme invariante par similitude	68
V.5	Equivalence des normes dans un espace vectoriel normé de dimension finie	68
V.6	Normes non équivalentes	68
V.7	Normes semblables à la norme uniforme sur $\mathbb{K}[X]$	68
V.8	Comparaisons de deux normes sur $\mathbb{K}_n[X]$	69
V.9	Comparaisons de normes usuelles sur $\mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{K})$	69
V.10	Normes p	69
V.11	Normes de Sobolev	70
V.12	Norme duale	71
V.13	Norme à partir d'une famille libre	71
V.14	Quelques normes matricielles	71
V.15	Caractérisation des sous-espaces de dimension finie de $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{K})$	72
V.16	Distance	72
V.17	Distance à une partie	72
V.18	Distance d'un élément à une partie (1)	73
V.19	Distance d'un élément à une partie (2)	73
V.20	Passage par les matrices orthogonales	73
V.21	Diamètre d'une partie bornée	73
V.22	Détermination d'une borne inférieure	74
V.23	Normes usuelles sur $\mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{K})$	74
V.24	Intersection des boules unités subordonnées d'un espace vectoriel normé de dimension finie	74
V.25	Modes de convergence	74
V.26	Moyenne des itérés et projection sur l'espace des invariants d'une application linéaire contractante	75
V.27	Matrice de projecteur	75
V.28	Matrice de rotation	75
V.29	Applications contractantes	75
V.30	Une série vectorielle	76
V.31	Polytopes réguliers d'un espace vectoriel euclidien	76
VI	Suites et séries de fonctions	77
VI.1	Etude d'une suite de fonctions (1)	77
VI.2	Etude d'une suite de fonctions (2)	77
VI.3	Etude d'une suite de fonctions (3)	78
VI.4	Etude d'une suite de fonctions (4)	78
VI.5	Etude d'une suite de fonctions (5)	78
VI.6	Etude d'une suite de fonctions (6)	78
VI.7	Etude d'une suite de fonctions (7)	78

VI.8	Développement de la cotangente (1)	79
VI.9	Etude d'une fonction définie par une série alternée (1)	79
VI.10	Etude d'une fonction définie par une série alternée (2)	79
VI.11	Convergence vers une dérivée	80
VI.12	Limite ponctuelle et uniforme d'une suite de fonctions	80
VI.13	Convergence des suites de polynômes	80
VI.14	Un théorème de Weierstrass sur \mathbb{R} ?	80
VI.15	Approximation paire	81
VI.16	Approximation croissante	81
VI.17	Interversion Série-Intégrale	81
VI.18	Série de fonction matricielle	81
VI.19	Fonction ζ de Riemann	82
VI.20	Expression de suites sous forme de séries	82
VI.21	Etude d'une série de fonctions	82
VI.22	Théorème de Dini ★★★★★	83
VI.23	Suite de fonction lipschitzienne ★★★★★	83
VI.24	Phénomène de Runge	83
VI.25	Théorème de Weierstrass	84
VI.26	Théorème de Chudnovsky ★★★★★	85
VI.27	Théorème de sélection de Helly	85
VII	Série entière	87
VII.1	Lemme d'Abel	87
VII.2	Fonction non développable en série entière	87
VII.3	CCINP MP 2019	87
VII.4	Série entière de terme général binomial	88
VII.5	Formule de Cauchy	88
VII.6	Principe des zéros isolés	88
VII.7	Produit de Hadamard	88
VII.8	Théorème de Liouville	89
VII.9	Inverse d'une série entière	89
VII.10	Equivalent de séries entières	89
VII.11	Théorème de d'Alembert-Gauss	89
VII.12	Développement de fraction rationnelle autour de 0	90
VII.13	Fonction quasi-polynomiale	90
VII.14	Théorème de réalisation de Borel	91
VII.15	Série de Lambert	92
VII.16	Somme de Goldbach	92
VII.17	Une somme avec l'indicatrice d'Euler	92
VII.18	Coefficients définies par des intégrales	92
VII.19	Détermination des coefficients d'un développement en série entière	93
VII.20	Série génératrice du nombre de points à coordonnées entières dans un quart de disque	93

VII.21	Nombre d'involution	94
VII.22	Théorème d'Abel	94
VII.23	Théorèmes taubériens d'Abel	95
VIII	Topologie	99
VIII.1	Normes d'opérateur	99
VIII.2	\mathbb{Z} est fermé ★	99
VIII.3	Orthogonalité et topologie	100
VIII.4	Ensemble des valeurs d'adhérence d'une suite	100
VIII.5	Ensemble des suites convergentes	100
VIII.6	Partie ouverte et fermée simultanément	101
VIII.7	Opérations sur les adhérences/intérieurs	101
VIII.8	Les sept espaces de Kuratowski	101
VIII.9	Intérieur d'un sev	101
VIII.10	Adhérence d'un sev	101
VIII.11	Graphe fermé	102
VIII.12	Application linéaire continue	102
VIII.13	Application linéaire non continue	102
VIII.14	Polynômes réels de degré n scindés à racines simples sur \mathbb{R} ★★★★★	102
VIII.15	Lemme de Riemann-Lebesgue ★★★★★	102
VIII.16	Borel-Lebesgue	103
VIII.17	Parties compactes d'un espace vectoriel normé de dimension finie	103
VIII.18	Somme de sous-espaces	103
VIII.19	Un théorème du point fixe	104
VIII.20	Théorème de Heine	104
VIII.21	Lemme des compacts emboîtés ★	104
VIII.22	Théorème de Baire ★★★★★ (HP)	104
VIII.23	Volume d'une (hyper)boule ★★★★★ (HP)	106
VIII.24	Partie fermée bornée non compacte ★★★★★	107
VIII.25	Théorème de compacité de Riesz ★★★★★	107
VIII.26	Sphère et boule unité ★★★★★	107
VIII.27	Principe du maximum pour les polynômes	107
VIII.28	Applications 1-lipschitzienne surjective sur un compact	107
VIII.29	Une isométrie conserve les milieux	108
VIII.30	Fonctions coercives	108
VIII.31	Homéomorphisme de compacts	108
VIII.32	Distance à un fermé	109
VIII.33	Diamètre et frontière	109
VIII.34	Frontière	109
VIII.35	Projeté sur un convexe compact	109
VIII.36	Convexité de l'adhérence et de l'intérieur	109
VIII.37	Fonctions positivement homogènes	110
VIII.38	Enveloppe convexe	110

VIII.39	Théorème de Carathéodory	111
VIII.40	Théorème de Krein-Milman	111
VIII.41	Epigraphe	111
VIII.42	Partie convexe dense de \mathbb{R}^n	112
VIII.43	Complémentaire d'un hyperplan	112
VIII.44	Composantes connexes par arcs du complémentaire de la réunion de plusieurs hyperplans	112
VIII.45	Sphères d'un \mathbb{R} -espace vectoriel	112
VIII.46	Théorème du passage à la douane	112
VIII.47	Condition nécessaire de la connexité par arc	113
VIII.48	Entre un ensemble et son adhérence	113
VIII.49	Continuité d'applications matricielles	113
VIII.50	Points de continuité du polynôme minimal	113
VIII.51	Exponentielle matricielle et topologie	113
VIII.52	Lemme du déterminant	114
VIII.53	Matrice de déterminant 1 ★★ ★	114
VIII.54	Ensembles de matrices de rang fixé	114
VIII.55	Densité des matrices inversibles ★★ ★	114
VIII.56	Comatrice et topologie	115
VIII.57	Groupe orthogonal ★	115
VIII.58	Groupe (spécial) unitaire ★★ ★	115
VIII.59	Partie compacte et stable par produit de $GL_n(\mathbb{K})$ ★★ ★	115
VIII.60	Intérieur des matrices diagonalisables ★★ ★ ★ ★	115
VIII.61	Adhérence des matrices diagonalisables ★★ ★	116
VIII.62	Une preuve de Cayley-Hamilton (1) ★★ ★	116
VIII.63	Dimension du commutant d'une matrice	116
VIII.64	Topologie et réduction	116
VIII.65	Groupe spécial orthogonal et connexité	117
VIII.66	Matrices inversibles et connexité	117
VIII.67	Matrices nilpotentes et connexité	117
VIII.68	Raffinement sur les disques de Gershgorin	117
VIII.69	Matrices stochastiques et bistochastiques	118
VIII.70	Théorème de Birkhoff-Von Neumann ★★ ★ ★ ★	118

IX Fonctions à valeurs vectorielles 121

IX.1	Point fixe de l'exponentielle complexe	121
IX.2	Théorème du relèvement	121
IX.3	Equation fonctionnelle de l'exponentielle matricielle ★★ ★	122
IX.4	Formule de Trotter-Kato ★★	122
IX.5	Série entière de matrice ★★	123
IX.6	Expression d'un projecteur	123
IX.7	Une preuve analytique de Cayley-Hamilton ★★ ★	123
IX.8	Exemple de fonction lipschitzienne	123

IX.9	Condition de continuité sur un espace vectoriel normé	124
IX.10	Application linéaire (2)	124
IX.11	Mouvement à force centrale	124
IX.12	Dérivée d'un produit de deux matrices	125
IX.13	Inégalité des accroissements finis pour un espace euclidien	125
X	Equations différentielles	127
X.1	Equations différentielles du premier ordre	127
X.2	Equations différentielles du second ordre	127
X.3	Problèmes de raccordement	127
X.4	Suite d'équations différentielles	128
X.5	Equation de Bernoulli (1)	128
X.6	Equation de Bernoulli (2)	128
X.7	Etude asymptotique des solutions d'une équation différentielle ★★★★★	129
X.8	Inéquation différentielle	129
X.9	Solution 2π -périodique d'une équation différentielle	129
X.10	Superposition de solutions	129
X.11	Fonction de Bessel	130
X.12	Développement de la cotangente (2)	130
X.13	Wronskien	130
X.14	Utilité du wronskien	131
X.15	Principe d'entrelacement des zéros de Sturm	131
X.16	Solution qui s'annule	131
X.17	Solution qui s'annule une infinité de fois	132
X.18	Lemme de Grönwall	132
X.19	Théorème de Floquet	132
X.20	Méthode de Lagrange (1)	133
X.21	Méthode de Lagrange (2)	133
X.22	Equation différentielle matricielle non linéaire	133
X.23	Système dynamique	134
X.24	Solutions de norme constante ★★★★★	134
X.25	Exponentielles de matrices qui commutent ★★	134
X.26	Lemme de Hochschild	134
XI	Calcul Différentiel	135
XI.1	Calcul de dérivées partielles	135
XI.2	Existence de dérivées partielles	135
XI.3	Etude d'une fonction	135
XI.4	Une équation fonctionnelle ★★	136
XI.5	Application linéaire	136
XI.6	Opérateurs vectoriels	136
XI.7	Laplacien en polaires	137
XI.8	Fonction harmonique	137

XI.9	Mines ponts MP 2016	138
XI.10	Différentielle de l'exponentielle matricielle	138
XI.11	Différentielle de la norme euclidienne	138
XI.12	Différentielle de l'inversion matricielle	138
XI.13	Gradient et différentielle du déterminant	139
XI.14	Espace tangent aux matrices orthogonales en l'identité	139
XI.15	Vecteur propre d'un endomorphisme auto-adjoint	139
XI.16	Quotient de Rayleigh	139
XI.17	Différentielle du déterminant	140
XI.18	Equation de d'Alembert	140
XI.19	Utilisation des extrema liés (1)	140
XI.20	Utilisation des extrema liés (2)	140
XI.21	Utilisation des extrema liés (3)	140
XI.22	Sinus complexe	141
XI.23	Entropie	141
XI.24	Fonction convexe sur \mathbb{R}^n	141
XI.25	Chemin le plus court entre deux points	142
XI.26	Fonction homogène	142
XI.27	Problème de Dirichlet et principe faible du maximum	142
XI.28	La méthode des moindres carrés	143
XI.29	Equation de la chaleur	144
XII	Divers	145
XII.1	Développement décimal propre d'un réel ★★ ★	145
XII.2	Distribution du premier chiffre des puissances de 2 ★★ ★	145
XII.3	Série de Engel	146
XII.4	Théorème de Müntz	146
XIII	Correction	147
XIII.1	Correction Suite et série numérique	147
XIII.2	Correction Intégrale	174
XIII.3	Correction Fonctions réelles	198
XIII.4	Correction Polynômes	213
XIII.5	Correction Espaces vectoriels normés	233
XIII.6	Correction Suites et séries de fonctions	244
XIII.7	Correction Séries entières	253
XIII.8	Correction Topologie	257
XIII.9	Correction Fonctions à valeurs vectorielles	300
XIII.10	Correction Equations différentielles	303
XIII.11	Correction Calcul différentiel	309
XIII.12	Correction Divers	314

Suite et série numérique

I.1 Lemme de Césaro ★★

[\[Corrigé\]](#)

Soit $(u_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ une suite de limite $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$.

Démontrer que $(\sigma_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $\forall n \in \mathbb{N}, \sigma_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n u_k$ tend également vers ℓ .

I.1.1 Lemme de l'escalier ★

Montrer que si $u_{n+1} - u_n$ tend vers un nombre $\ell \neq 0$. Alors $u_n \sim \ell n$.

I.2 Théorèmes Taubériens d'Hardy ★

[\[Corrigé\]](#)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite quelconque à valeurs complexe.

On pose $\forall n \in \mathbb{N}, \sigma_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n u_k$ et $\varepsilon_n = u_{n+1} - u_n$

Vérifier que la réciproque du lemme de Césaro n'est pas toujours vraie en exhibant une suite $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ qui ne converge pas et telle que (σ_n) converge dans \mathbb{R} .

I.2.1 Hardy Faible ★★

Soit $\ell \in \mathbb{C}$.

Démontrer que si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sigma_n = \ell$ et $\varepsilon_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{n}\right)$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$.

Indication : on pourra démontrer que pour tout $n \geq 1$ $\sum_{k=0}^n k\varepsilon_k = nu_{n+1} - \sum_{k=1}^n u_k$.

I.2.2 Hardy Fort ★★

Soit $(u_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ et $\ell \in \mathbb{C}$.

On souhaite démontrer que si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sigma_n = \ell$ et $\varepsilon_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right)$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$.

1. Soit $0 \leq n < m$ deux entiers. Démontrer que $\sum_{k=n+1}^m u_k - (m-n)u_n = \sum_{k=n}^{m-1} (m-k)\varepsilon_k$
2. En déduire qu'il existe un entier positif N et une constante $C > 0$ telle que pour tous entier m et n tels que $N \leq n < m$, on ait :

$$\left| \frac{(m+1)\sigma_m - (n+1)\sigma_n}{m-n} - u_n \right| \leq C \ln \left(\frac{m-1}{n-1} \right)$$

et

$$|u_n - \ell| \leq C \ln \left(\frac{m-1}{n-1} \right) + \frac{m+1}{m-n} (|\sigma_m - \ell| + |\sigma_n - \ell|)$$

3. En déduire le théorème Taubérien de Hardy (Fort).

Indication : on pourra prendre $m = 1 + \lfloor \alpha n \rfloor$ avec un paramètre $\alpha > 1$ à choisir, où $\lfloor x \rfloor$ désigne la partie entière de $x \in \mathbb{R}$.

I.3 Série Harmonique ★★★

[\[Corrigé\]](#)

Soit $(H_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite définie par $\forall n \in \mathbb{N}^*, H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

1. Déterminer un équivalent simple de H_n .
2. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = H_n - \ln n$.
Montrer que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge. On notera γ sa limite.
3. Déterminer un développement asymptotique à 3 termes de H_n .
4. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $w_n = v_n - \frac{1}{2n}$.
Déterminer un développement asymptotique à 4 termes de H_n .
5. On note pour $n \in \mathbb{N}^*$, $k_n = \min\{k \in \mathbb{N}, H_k \geq n\}$.

Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{k_{n+1}}{k_n}$.

I.4 Suite récurrente (1) ★★

[\[Corrigé\]](#)

1. Déterminer un équivalent simple de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 \in \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sin(u_n)$.
2. Déterminer un développement asymptotique de cette même suite à l'ordre 2.

I.5 Suite récurrente (2) ★★

[\[Corrigé\]](#)

1. Déterminer un équivalent simple de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 \in \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \arctan(u_n)$.
2. Déterminer un développement asymptotique de cette même suite à l'ordre 2.

I.6 Suite récurrente (3) ★★

[\[Corrigé\]](#)

1. Déterminer un équivalent simple de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 > -1$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \ln(1 + u_n)$.
2. Déterminer un développement asymptotique de cette même suite à l'ordre 2.

I.7 Suite récurrente (4) ★★

[\[Corrigé\]](#)

Soit $\alpha > -1$.
Déterminer un équivalent simple de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 > 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n^\alpha}$.

I.8 Suite récurrente (5) ★★

[\[Corrigé\]](#)

Trouver un équivalent de la suite récurrente (x_n) qui vérifie :
$$\begin{cases} x_0 = 1 \\ x_{n+1} = x_n + \int_{x_n}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \end{cases}$$

I.9 Suite récurrente (6) ★★

[Corrigé]

Soient $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par $a_0 > 0$, $b_0 > 0$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \\ b_{n+1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a_n} + \frac{1}{b_n} \right) \end{cases}$$

1. Etudier la convergence des suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
2. En notant $\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$, déterminer un équivalent de $(a_n - \ell)_{n \in \mathbb{N}}$.

I.10 Suite définie implicitement (1) ★★

[Corrigé]

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation $\cos(x) = nx$ possède une unique solution $x_n \in [0, 1]$.
2. Déterminer la limite de (x_n) .
3. Etudier la monotonie de (x_n) .
4. Etablir que $x_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$.
5. Déterminer un équivalent de $x_n - \frac{1}{n}$.

I.11 Suite définie implicitement (2) ★★

[Corrigé]

1. Montrer que si n est un entier supérieur ou égal à 2 alors l'équation

$$\sin(x) = \frac{x}{n}$$

admet une unique solution $x_n \in]0, \pi[$.

2. Montrer que $(x_n)_{n \geq 2}$ converge. Quelle est sa limite ?
3. Déterminer un équivalent de $(x_n)_{n \geq 2}$.
4. Déterminer un développement asymptotique de $(x_n)_{n \geq 2}$ en $\mathcal{O}\left(\frac{1}{n^3}\right)$.

I.12 Suite définie implicitement (3) ★★

[\[Corrigé\]](#)

1. Montrer que si n est un entier supérieur ou égal à 2 alors l'équation

$$x^n - nx + 1 = 0$$

admet une unique solution $x_n \in [0, 1]$.

2. Etudier la monotonie et la convergence de $(x_n)_{n \geq 2}$.
3. Déterminer un équivalent de $(x_n)_{n \geq 2}$.
4. Déterminer un développement asymptotique à 2 termes de $(x_n)_{n \geq 2}$.

I.13 Suite définie implicitement (4) ★★★

[\[Corrigé\]](#)

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists! x_n \in \left] n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2} \right[$, $\tan(x_n) = x_n$.
2. Déterminer un équivalent de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.
3. Déterminer un développement asymptotique de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ en $\mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

I.14 Suite définie implicitement (5) ★★★

[\[Corrigé\]](#)

1. Montrer que si $n \in \mathbb{N}^*$ alors l'équation

$$\sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k} = 1$$

admet une unique solution $x_n \in \mathbb{R}_+$.

2. Etudier la convergence de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.
3. Calculer sa limite.

I.15 Formule d'inversion de Pascal

[Corrigé]

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites complexes telles que pour tout entier naturel n , on ait :

$$\forall p \in \llbracket 0; n \rrbracket, \quad b_p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a_k$$

On souhaite démontrer la formule d'inversion de Pascal : $\forall p \in \llbracket 0; n \rrbracket, \quad a_p = \sum_{k=0}^p (-1)^{p-k} \binom{p}{k} b_k$.

I.15.1 Première méthode : matrice de passage ★

1. Justifier que les familles $\mathcal{B}_c = (1, X, \dots, X^m)$ et $\mathcal{B}_t = (1, (X-1), \dots, (X-1)^m)$ sont des bases de $\mathbb{R}_m[X]$.
2. Calculer la matrice de passage de \mathcal{B}_c vers \mathcal{B}_t et calculer son inverse.
3. Conclure.

I.15.2 Deuxième méthode : binôme de Newton ★★

On pose $S : \begin{cases} \mathbb{C}^{\mathbb{N}} & \longrightarrow & \mathbb{C}^{\mathbb{N}} \\ (u_n)_{n \in \mathbb{N}} & \longmapsto & (u_{n+1})_{n \in \mathbb{N}} \end{cases}$. Pour simplifier les notations on note $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $b = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Démontrer la formule d'inversion de Pascal à l'aide de S .

I.15.3 Troisième méthode : par le calcul ★★

1. Montrer que $\sum_{i=0}^p (-1)^{p-i} \binom{p}{i} b_i = \sum_{j=0}^p \sum_{i=j}^p (-1)^{p-i} \binom{p}{i} \binom{j}{i} a_j$.
2. Montrer que $\sum_{i=0}^p (-1)^{p-i} \binom{p}{i} b_i = \sum_{j=0}^p \binom{p}{j} a_j \sum_{i=0}^{p-j} (-1)^{p-j-i} \binom{p-j}{i}$.
3. Conclure.

I.15.4 Dérangements ★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle dérangement de $\llbracket 1; n \rrbracket$ toute permutation $\sigma \in \mathcal{S}_n$ qui ne possède pas de point fixe.

Donner une expression du nombre de dérangement D_n de \mathcal{S}_n sous la forme d'une somme.

En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{D_n}{n!}$ et interpréter.

I.16 Théorème de Pringsheim

[\[Corrigé\]](#)

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite positive et décroissante telle que $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ converge.

Montrer que $(na_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

I.17 Lemme de Fekete

[\[Corrigé\]](#)

1. Soit $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telle que $\forall m, n \in \mathbb{N}^*, u_{n+m} \leq u_n + u_m$. On dit qu'une telle suite est *sous-additive*.

Montrer que si $\left(\frac{u_n}{n}\right)$ est minorée alors elle converge vers $\ell = \inf_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{u_n}{n}$

2. Soit $(v_n) \in \mathbb{R}_+^{\mathbb{N}}$ telle que $\forall n, m \in \mathbb{N}^*, v_{n+m} \leq v_n \times v_m$. On dit qu'une telle suite est *sous multiplicative*.

Montrer que si $(v_n^{\frac{1}{n}})$ est minorée alors elle converge vers $\ell = \inf_{n \in \mathbb{N}^*} v_n^{\frac{1}{n}}$

I.18 Théorème de Bolzano-Weierstrass

[\[Corrigé\]](#)

Le but de cet exercice est de démontrer le théorème de Bolzano-Weierstrass puis de l'étendre au cas des suites complexes. Soit $(u_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ une suite bornée.

1. Démontrer le lemme des pics : "De toute suite réelle on peut extraire une suite monotone".
2. En déduire que l'on peut extraire de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite convergente.

I.19 \mathbb{R} est complet

[\[Corrigé\]](#)

On dit qu'une suite $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ est de Cauchy lorsqu'elle vérifie :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall p, q \in \llbracket N; +\infty \llbracket, |u_p - u_q| \leq \varepsilon$$

Démontrer qu'une suite réelle est de Cauchy si et seulement si elle converge.

I.20 Récurrence de Cauchy ★★ ★

[\[Corrigé\]](#)

1. Soit A une partie de \mathbb{N} telle que :

- $1 \in A$;
- $\forall n \in A \setminus \{0\}, n-1 \in A$;
- $\forall n \in A, 2n \in A$.

Montrer que $A = \mathbb{N}$.

2. En déduire l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\forall (a_n) \in (\mathbb{R}^+)^{\mathbb{N}^*}, \forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \geq \left(\prod_{k=1}^n a_k \right)^{1/n}.$$

I.21 Sommes de Riemann ★ ★

[\[Corrigé\]](#)

Démontrer que $\forall f \in \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R}), \int_0^1 f(t) dt \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - \frac{1}{2n}(f(1) - f(0)) + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

I.22 Formule d'Euler-Maclaurin ★ ★ ★

[\[Corrigé\]](#)

Soient $(m, n) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $m < n$, $r \in \mathbb{N}^*$ et $f : [m, n] \rightarrow \mathbb{C}$ de classe \mathcal{C}^r .

Montrer que

$$\sum_{i=m}^n f(i) = \int_m^n f(t) dt + \frac{1}{2}(f(m) + f(n)) + \sum_{i=2}^r \frac{b_i}{2} [f^{(i-1)}(m) - f^{(i-1)}(n)] + \frac{(-1)^{r+1}}{r!} \int_m^n \tilde{B}_r(t) f^{(r)}(t) dt$$

Application : Déterminer un développement asymptotique à tout ordre de la série harmonique.

I.23 Nature d'une suite ★ ★

[\[Corrigé\]](#)

Déterminer la nature de la suite $(\sin n)_{n \in \mathbb{N}}$.

I.24 Valeurs d'adhérence d'une suite

[Corrigé]

On pose pour $n \in \mathbb{N}^*$, $z_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{i}{k}\right)$.

1. Montrer que la suite $(|z_n|)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge.
2. Déterminer l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite $(z_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

I.25 Nature d'une série (1)

[Corrigé]

Déterminer la nature de la série $\sum_{n \geq 0} \sin(\pi\sqrt{1+n^2})$.

I.26 Nature d'une série (2)

[Corrigé]

Déterminer la nature de la série $\sum_{n \geq 0} \sin(\pi(2+\sqrt{3})^n)$.

On pourra s'intéresser pour $n \in \mathbb{N}$ à la quantité $(2+\sqrt{3})^n + (2-\sqrt{3})^n$.

I.27 Nature d'une série (3)

[Corrigé]

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite strictement croissante d'entiers naturels non nuls.

Déterminer la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{\text{ppcm}(a_1, \dots, a_n)}$.

I.28 Nature d'une série (4)

[Corrigé]

Soit $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite d'entiers strictement positifs deux à deux distincts. Déterminer la nature de la série

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\alpha_n}{n^2}$$

I.29 Nature d'une série (5)

[Corrigé]

Déterminer la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \arccos\left(\frac{n^\alpha}{1+n^\alpha}\right)$ en fonction de la valeur de $\alpha \in \mathbb{R}$.

I.30 Calcul d'un équivalent ★★ ★

[Corrigé]

Déterminer un équivalent de $u_n = \left(\prod_{k=1}^n k^k\right)^{1/n}$.

I.31 Sommation de relation de comparaison ★

[Corrigé]

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites équivalentes.
Peut-on affirmer que $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ et $\sum_{n \in \mathbb{N}} v_n$ sont de mêmes natures? Justifier.

I.32 Equivalent de séries de Riemann ★

[Corrigé]

On considère pour $\alpha \in \mathbb{R}$ la série $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{n^\alpha}$.
Déterminer un équivalent simple de la somme partielle pour $\alpha < 1$ et du reste pour $\alpha > 1$.

I.33 Séries de Bertrand ★★ ★

[Corrigé]

Démontrer que $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^\alpha \ln(n)^\beta}$ converge $\iff \alpha > 1$ ou $(\alpha = 1 \text{ et } \beta > 1)$.

I.34 Critère de Raabe-Duhamel ★★ ★

[Corrigé]

1. Soient (u_n) et (v_n) de suites réels strictement positifs vérifiant $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}$ à partir d'un certain rang.
Montrer que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}(v_n)$.
2. Soit $(u_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ tel que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} 1 - \frac{a}{n} + \mathfrak{o}\left(\frac{1}{n}\right)$ Démontrer que :
 - si $a > 1$ alors $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ converge ;
 - si $a < 1$ alors $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ diverge ;
 - Si $a = 1$ alors on ne peut pas conclure quant à la nature de $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$.

I.35 Règle de d'Alembert ★★

[\[Corrigé\]](#)

Démontrer la règle de d'Alembert

I.36 Règle de Cauchy ★★★

[\[Corrigé\]](#)

Soit $(u_n) \in (\mathbb{R}_+)^{\mathbb{N}}$ tel que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{u_n} = l \in \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$.

Démontrer que :

- si $l < 1$ alors $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ converge ;
- si $l > 1$ alors $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ diverge ;
- Si $l = 1$ alors on ne peut pas conclure quant à la nature de $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$.

I.37 d'Alembert \implies Cauchy ★★

[\[Corrigé\]](#)

Soit $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ une série à termes strictement positifs.

Montrer que si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \ell$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{u_n} = \ell$.

I.38 Transformation et règle d'Abel ★★ ★

[Corrigé]

Soit $(a_n)_{n \geq n_0}$ et $(B_n)_{n \geq n_0}$ deux suites complexes. On définit $(A_n)_{n \geq n_0}$ et $(b_n)_{n \geq n_0}$ telles que :

$$\forall n \geq n_0, A_n = \sum_{k=n_0}^n a_k \text{ et } b_n = B_{n+1} - B_n$$

1. Démontrer que : $\forall n \geq n_0, \sum_{k=n_0}^n a_k B_k = A_n B_n - \sum_{k=n_0}^{n-1} A_k b_k$
2. Démontrer que si $(A_n)_{n \geq n_0}$ est bornée, alors $\sum |b_n - b_{n+1}|$ converge et $(b_n)_{n \geq n_0}$ tend vers 0. alors $\sum_{n \geq n_0} a_n b_n$ converge.

Remarque : On remarquera la ressemblance entre la transformation d'Abel et l'intégration par parties.

I.38.1 Une série de Dirichlet ★★ ★

Déterminer la nature de la série $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{\sin n}{n^\alpha}$ suivant la valeur du paramètre $\alpha \in \mathbb{R}$.

I.39 Equation différentielle discrète ★★ ★

[Corrigé]

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de réels strictement positifs telle que : $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n(a_1^2 + \dots + a_n^2) = 1$

1. Montrer que la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers 0 et que $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} a_n^2$ diverge.
2. On note $S_n = \sum_{k=1}^n a_k^2$. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{S_{n-1}}^{S_n} t^2 = 1$.
3. En déduire que $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt[3]{3n}}$

I.40 Critère spécial des série alternées ★

[Corrigé]

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle positive de limite nulle.

Peut-on affirmer que $\sum_{n \in \mathbb{N}} (-1)^n a_n$ converge ? Justifier.

I.41 Calcul d'une somme de série (1) ★★

[Corrigé]

On pose $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \sum_{k=1}^n k^2$. Calculer $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{u_n}$.

I.42 Calcul d'une somme de série (2) ★

[Corrigé]

On pose $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$. Déterminer la limite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

I.43 Calcul d'une somme de série (3) ★★★

[Corrigé]

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{\ln(k)}{k} - \frac{1}{2} \ln(n)^2$.

1. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge.
2. Calculer la somme $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n \ln(n)}{n}$.

I.44 Problème de Bâle

[Corrigé]

I.44.1 Lemme de Riemann-Lebesgue

1. Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$ et f une fonction de classe \mathcal{C}^1 sur $[a, b]$ à valeurs dans \mathbb{R} .
On pose pour $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$I(\lambda) = \int_a^b f(t) \cos(\lambda t) dt \quad \text{et} \quad J(\lambda) = \int_a^b f(t) \sin(\lambda t) dt$$

Montrer que $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} I(\lambda) = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} J(\lambda) = 0$.

2. Déterminer deux réels u et v tels que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\int_0^\pi (ux + vx^2) \cos(nx) dx = \frac{1}{n^2}$$

3. Montrer que la fonction $\varphi : x \in]0, \pi] \mapsto \frac{x}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$ est prolongeable en une fonction de classe \mathcal{C}^1 sur $[0, \pi]$.
4. En déduire que $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$.
5. Exprimer la somme de la série $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{(2n-1)^2}$ en fonction de $\zeta(2)$ et en déduire sa valeur.
6. En adaptant les réels de la question 2, justifier la convergence et calculer les sommes des séries $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ et $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{(2n-1)^2}$.

I.44.2 Série de fonctions ★★

Pour tout $m \in \mathbb{N}^*$ on pose $f_m : \theta \in]-\pi, \pi[\mapsto \frac{\sin((2m+1)\theta)}{\sin^{2m+1}(\theta)}$

1. Démontrer que f_m est une fonction polynomiale de $\cotan^2(\theta)$
2. En déduire que $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$

I.44.3 Série entière ★★★

En utilisant le développement en série entière de \arcsin et en intégrant termes à termes, démontrer que $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$

I.45 Nombre moyen de diviseurs d'un entier ★★★★★

[\[Corrigé\]](#)

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\tau(n)$ le nombre de diviseurs positifs de n et pour tout $x \geq 1$, on pose $F(x) = \sum_{1 \leq n \leq x} \tau(n)$.

1. Déterminer un équivalent en $+\infty$ de F .
2. Démontrer que $F(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} x \ln x + (2\gamma - 1)x + \mathcal{O}(\sqrt{x})$

Indication : on pourra remarquer que $\tau(n) = \sum_{d|n} 1$ où la somme porte sur les diviseurs positifs de n .

I.46 Théorème de réarrangement de Riemann ★★★★★

[Corrigé]

Soient $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ une série semi-convergente et $\alpha \in \mathbb{R}$.

Démontrer qu'il existe une permutation σ de \mathbb{N} telle que $\sum_{n=0}^{+\infty} a_{\sigma(n)} = \alpha$.

I.47 Moyennes arithmétique, géométrique et harmonique



[Corrigé]

Soit $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$ des réels strictement positifs. On pose $A_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k$, $G_n = \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n a_k}$ et

$$H_n = \frac{n}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}}$$

Démontrer que $H_n \leq G_n \leq A_n$.

I.48 Inégalité de Carleman ★★★

[Corrigé]

Soit $a_n \in (\mathbb{R}_+)^{\mathbb{N}^*}$ telle que $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} a_n$ converge.

Démontrer que $\sum_{n=1}^{+\infty} \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n a_k} \leq e \sum_{n=1}^{+\infty} a_n$.

Indication : On utilisera le résultat de l'exercice précédent et la formule de Stirling.

II.1 Règle de Bioche ★

[\[Corrigé\]](#)

Calculer :

1. $\int_0^\pi \frac{\sin(t)}{4 - \cos(t)^2} dt$ en posant $u = \cos(t)$;
2. $\int_{\pi/2}^x \frac{dt}{\sin(t)}$ pour tout $x \in]0, \pi[$ en posant $u = \cos(t)$;
3. $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{dt}{\cos(t)^3}$ en posant $u = \sin(t)$.
4. $\int_0^{\pi/2} \frac{dt}{\sin(t) + \cos(t)}$ en posant $u = \tan\left(\frac{t}{2}\right)$

II.2 Intégrale de Wallis ★★

[\[Corrigé\]](#)

$\forall n \in \mathbb{N}$, on pose $W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n(x) dx$.

1. Donner un équivalent simple de W_n
2. Trouver une expression de W_{2n} et W_{2n+1} à l'aide de factorielles.

II.3 Formule de Stirling ★★

[Corrigé]

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \frac{n^n e^n \sqrt{n}}{n!}$.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $v_n = \ln(u_n)$. Montrer que : $v_n = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$
2. En déduire que u_n converge vers un certain $\ell \in \mathbb{R}_+^*$.
3. Montrer que $\ell = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ et en déduire que un équivalent de $n!$.

II.4 Intégrale de Gauss

[Corrigé]

II.4.1 Wallis ★★★

En utilisant les intégrales de Wallis et la concavité du \ln , démontrer que $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

II.4.2 Intégrales auxiliaires ★★★

On pose $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $I_n = \int_0^1 \frac{1}{(1+t^2)^n} dt$ et $K_n = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+t^2)^n} dt$

1. Démontrer que $K_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} I_n$ et que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $K_n = K_{n+1} + \frac{K_n}{2n}$.
2. En déduire à l'aide du théorème de convergence dominée que $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

II.4.3 Equivalent du reste ★★

A l'aide d'une IPP, trouver un équivalent de $\int_x^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$ en $+\infty$.

II.5 Intégrale de Fresnel ★★★

[Corrigé]

1. Justifier que $I : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{e^{-(t^2+i)x^2}}{t^2+i} dt$ est \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R}_+^* et calculer sa dérivée.

2. Calculer l'intégrale de Fresnel : $\int_0^{+\infty} e^{-it^2} dt$.

On admettra le résultat sur l'intégrale de Gauss $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

II.6 Intégrale de Dirichlet

[Corrigé]

On pose $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt$.

II.6.1 Semi-convergence ★★

Démontrer que l'intégrale est semi-convergente.

II.6.2 Une autre expression ★★

Montrer que $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(t)}{t^2} dt$.

II.6.3 Premier calcul ★★

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin((2n+1)t)}{\sin(t)} dt$ et $v_n = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin((2n+1)t)}{t} dt$.

1. Démontrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est constante et égale à $\frac{\pi}{2}$.
2. En utilisant le lemme de Riemann-Lebesgue, démontrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n - u_n = 0$.
3. En déduire que $I = \frac{\pi}{2}$.

II.6.4 Second calcul ★★★

On pose $F : x \mapsto \int_0^{+\infty} e^{xt} \times \frac{\sin(t)}{t} dt$.

1. Démontrer que $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $F'(x) = -\frac{1}{1+x^2}$.
2. En déduire que $I = \frac{\pi}{2}$.

Remarque : Il s'agit d'un cas particulier de la méthode de Feynman.

II.7 Intégrale du reste de l'intégrale de Dirichlet ★★

[Corrigé]

Justifier l'existence et calculer l'intégrale $I = \int_0^{+\infty} \left(\int_x^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt \right) dx$.

II.8 Intégrale d'Euler ★★

[Corrigé]

On pose $I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin t) dt$ et $J = \int_0^{\pi/2} \ln(\cos t) dt$.

1. Montrer que $I = J$.
2. Exprimer $I + J$ en fonction de I .
3. En déduire la valeur de I .

II.9 Fonction intégrale ★★★

[Corrigé]

Soit $I : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{x^2 + t^2} dt$. Justifier que I est définie sur \mathbb{R}_+^* et déterminer $\sup_{x>0} I(x)$.

II.10 Intégrales de Bertrand

[Corrigé]

1. Pour quelles valeurs des réels α et β l'intégrale $\int_e^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha (\ln t)^\beta}$ converge ?
2. Même question pour $\int_0^{e^{-1}} \frac{dt}{t^\alpha (\ln t)^\beta}$.

II.11 Intégrabilité des cosinus de polynôme

[Corrigé]

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré supérieur ou égal à 2.

1. Déterminer la nature de l'intégrale $I = \int_0^{+\infty} \cos(P(x)) dx$.

2. Déterminer la nature de l'intégrale $J = \int_0^{+\infty} |\cos(P(x))| dx$.
3. Déterminer le signe de I dans le cas $P = X^2$.

II.12 Nature d'une intégrale

[Corrigé]

Pour quelles valeurs du réel α l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\alpha} dt$ converge ?

II.13 Divergence grossière

[Corrigé]

1. Soit f une application continue par morceaux de \mathbb{R}_+ dans \mathbb{R} admettant une limite ℓ en $+\infty$ et telle que l'intégrale $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ converge. Montrer que $\ell = 0$.
2. Soit f une application uniformément continue de \mathbb{R}_+ dans \mathbb{R} telle que l'intégrale $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ converge. Montrer que $\lim_{+\infty} f = 0$.

II.14 Espace l^2 et dérivation

[Corrigé]

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe \mathcal{C}^2 telle que f et f'' soit de carré intégrable sur \mathbb{R} .

1. Montrer que f' est également de carré intégrable sur \mathbb{R} .
2. Montrer que $\left(\int_{\mathbb{R}} f'^2 \right)^2 \leq \left(\int_{\mathbb{R}} f^2 \right) \left(\int_{\mathbb{R}} f''^2 \right)$.

II.15 Intégrale de Frullani ★ ★ ★

[Corrigé]

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{f(t)}{t} dt$ converge et soient a, b deux réels strictement positifs.

Démontrer que $\int_0^{+\infty} \frac{f(at) - f(bt)}{t} dt = f(0) \ln \left(\frac{b}{a} \right)$.

II.16 Calcul d'une intégrale (1) ★★[\[Corrigé\]](#)

Justifier l'existence et calculer pour tout entier $n \geq 2$, $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(t+1)\dots(t+n)}$.

II.17 Calcul d'une intégrale (2) ★★[\[Corrigé\]](#)

Justifier l'existence et calculer $I = \int_0^1 x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor dx$.

II.18 Calcul d'une intégrale (3) ★★[\[Corrigé\]](#)

Justifier l'existence et calculer $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^6}$.

II.19 Calcul d'une intégrale (4) ★★[\[Corrigé\]](#)

Soit $a > 0$.

Justifier l'existence et calculer $I = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(ax) - \arctan(x/a)}{1+x^2} dx$.

II.20 Permutation Série-intégrale (1)[\[Corrigé\]](#)

1. Montrer que $I = \int_0^{+\infty} e^{-x} \cos(\sqrt{x}) dx$ converge.
2. Montrer que $I = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n n!}{(2n)!}$

II.21 Permutation série-intégrale (2)[\[Corrigé\]](#)

Calculer l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+t)}{t\sqrt{1+t}} dt$ à l'aide d'une permutation série-intégrale.

II.22 Fonction d'écart logarithmique intégral ★★

[Corrigé]

On considère la fonction d'écart logarithmique intégral, qui est l'application définie par :

$$\forall x \geq 2, \operatorname{Li}(x) = \int_2^x \frac{dt}{\ln(t)}$$

Déterminer un développement asymptotique de $\operatorname{Li}(x)$ à tout ordre.

On donnera une expression en fonction de la somme $\sum_{k=0}^n \frac{k!}{(\ln x)^k}$.

II.23 Intégrale de Bernoulli ★★★

[Corrigé]

Démontrer que
$$\int_0^1 \frac{dx}{x^x} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^n}.$$

II.24 Lemme de Riemann-Lebesgue : cas des fonctions \mathcal{C}^1 ★

[Corrigé]

On considère un segment $[a, b]$ de \mathbb{R} et $\phi \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{C})$.

Montrer que $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b \phi(t) e^{i\lambda t} dt = 0$.

II.25 Intégrale de Poisson (1) ★★

[Corrigé]

Pour tout $\rho \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, on pose
$$I(\rho) = \int_0^\pi \ln(1 - 2 \cos(\theta) \rho + \rho^2) d\theta$$

Montrer en passant par des sommes de Riemann que
$$I(\rho) = \begin{cases} 0 & \text{si } \rho \in]-1, 1[\\ 2\pi \ln(|\rho|) & \text{si } \rho \in \mathbb{R} \setminus [-1, 1] \end{cases}$$

II.26 Intégrale de Poisson (2) ★★★

[Corrigé]

Pour tout $\rho \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, on pose
$$I(\rho) = \int_0^\pi \ln(1 - 2 \cos(\theta) \rho + \rho^2) d\theta$$

1. Montrer que $\forall \rho \in \mathbb{R}^* \setminus \{-1, 1\}, I(\rho) - I\left(\frac{1}{\rho}\right) = 2\pi \ln(|\rho|)$.

2. Démontrer que $\forall \rho \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}, \forall n \in \mathbb{N}, I(\rho) = \frac{1}{2^n} I(\rho^{2^n})$.
3. En déduire que
$$I(\rho) = \begin{cases} 0 & \text{si } \rho \in]-1, 1[\\ 2\pi \ln(|\rho|) & \text{si } \rho \in \mathbb{R} \setminus [-1, 1] \end{cases}$$

II.27 Mines-Ponts MP 2024 (Chaïma Prime)

[\[Corrigé\]](#)

On pose pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$h_n : x \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(t^2 + x^4)^n}$$

1. Montrer que h_n est dérivable sur \mathbb{R}_+^* et que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, h'_n(x) = -4nx^3 h_{n+1}(x)$$

2. Montrer qu'il existe une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, h_n(x) = a_n x^{2-4n}$$

3. Déterminer h_n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

II.28 Une suite d'intégrales (1)

[\[Corrigé\]](#)

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \int_0^1 (t \ln t)^n dt$. Montrer l'existence de I_n et calculer sa valeur pour tout $n \in \mathbb{N}$.

II.29 Une suite d'intégrales (2)

[\[Corrigé\]](#)

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^n}$

1. Montrer que (u_n) converge et donner sa limite.
2. A l'aide d'une intégration par parties, donner un développement asymptotique à deux termes de u_n .

II.30 Une suite d'intégrales (3)

[Corrigé]

Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose :

$$I_n = \int_0^1 \frac{x^{2n}}{1+x^n} dx \quad \text{et} \quad J_n = \int_0^1 \frac{x^{2n+1}}{1+x^n} dx$$

1. Justifier l'existence de I_n et J_n et calculer les limite de $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(J_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
2. Montrer que $|I_n - J_n| \leq \frac{1}{4n^2}$.
3. Calculer J_n .
4. En déduire un équivalent de I_n .

II.31 Nombre d'Apery

[Corrigé]

On définit une suite (u_n) de fonctions en posant :

$$\forall n \geq 2, \forall t \in]0, 1], u_n(t) = \frac{t^{n-1} \ln(t)}{n}$$

1. Calculer $\|u_n\|_\infty$.
2. Montrer que la fonction $f : t \mapsto \frac{\ln(t) \ln(1-t)}{t}$ est intégrable sur $]0, 1[$.
3. En déduire que $\int_0^1 f(t) dt = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^3}$

II.32 Comportement asymptotique (1)

[Corrigé]

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+^*)$ telle que $\frac{f'(x)}{f(x)} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2}{x}$.

Montrer que $\int_0^x f(t) dt \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{xf(x)}{3}$.

II.33 Comportement asymptotique (2)

[Corrigé]

Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+)$ décroissante.

Montrer que si f est intégrable sur \mathbb{R}_+ alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$. La réciproque est-elle vraie ?

II.34 Théorème de d'Alembert-Gauss (1) ★★

[Corrigé]

Le but de cet exercice est de démontrer le théorème de d'Alembert-Gauss. On suppose par l'absurde qu'il existe un polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant qui ne possède aucune racine complexe. On pose pour tout $r \geq 0$:

$$F(r) = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{P(re^{i\theta})}$$

1. Montrer que F est de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R}_+ .
2. Montrer que F est constante sur \mathbb{R}_+ .
3. Conclure.

II.35 Fonction Gamma d'Euler ★★

[Corrigé]

On pose, lorsque cela est définie, $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$.

1. Déterminer le domaine de définition de Γ .
2. Démontrer que $\forall x \in \text{dom}(\Gamma)$, $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ et en déduire que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\Gamma(n+1) = n!$.
3. Déterminer un équivalent simple en 0^+ de Γ .
4. Démontrer que Γ est \mathcal{C}^∞ sur son domaine de définition.
5. Démontrer que Γ est convexe sur \mathbb{R}_+^* .
6. Démontrer que Γ est log-convexe sur \mathbb{R}_+^* .

II.35.1 Point critique et limite en $+\infty$ ★★★

1. Montrer que Γ admet un minimum sur \mathbb{R}_+^* et qu'il est atteint en un unique point.
2. Déterminer la limite de Γ en $+\infty$.

II.35.2 Valeur en les demi-entiers ★★

Exprimer $\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right)$ en fonction de $n \in \mathbb{N}$.

On donne $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$.

II.35.3 Théorème de Bohr-Mollerup ★★★★★

Démontrer que Γ est l'unique fonction qui vérifie :

- $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f(x+1) = xf(x)$;
- $f(1) = 1$;
- f est log-convexe (c'est à dire $\ln f$ est convexe) sur $]0, +\infty[$.

II.35.4 Formules de Gauss et de Weierstrass

1. Démontrer que $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^n n!}{x(x+1) \cdots (x+n)} = \frac{1}{x} \prod_{n=1}^{+\infty} \frac{(1 + \frac{1}{n})^x}{1 + \frac{x}{n}} = \frac{e^{-\gamma x}}{x} \prod_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{\frac{x}{n}}}{1 + \frac{x}{n}}$$

2. Vérifier que Γ est de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R}_+^* et calculer $\Gamma'(1)$ en utilisant la formule du produit ci-dessus.
3. En déduire la valeur de l'intégrale :

$$\int_0^{+\infty} \ln(t) e^{-t} dt$$

II.35.5 Lien entre les gamma d'Euler ★★★★★

On utilisera les résultats sur la fonction gamma sans les redémontrer.

1. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n \ln(t) \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n dt = \Gamma'(1)$.
2. En déduire que $\Gamma'(1) = -\gamma$. On rappelle que $\gamma = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n)$.

II.35.6 Formule de duplication de Legendre

Montrer la formule de duplication de Γ :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \Gamma(x)\Gamma\left(x + \frac{1}{2}\right) = 2^{1-2x} \sqrt{\pi} \Gamma(2x)$$

- A l'aide de la formule du produit II.35.4;
- A l'aide du théorème de Bohr-Mollerup II.35.3.

II.35.7 Intégrale de Raabe

Montrer en utilisant la formule de duplication que pour tout $a \geq 0$ on a :

$$\int_a^{a+1} \ln(\Gamma(x)) dx = a \ln a - a + \frac{\ln(2\pi)}{2}$$

II.35.8 Généralisation de la formule de Stirling

Montrer que

$$\Gamma(x+1) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{2\pi x} \left(\frac{x}{e}\right)^x$$

A reformuler pour que ce soit accessible à tous

II.36 Fonction Bêta d'Euler ★ ★

[Corrigé]

On pose $B : (x, y) \mapsto \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1} dt$.

1. Déterminer le domaine de définition de B
2. Démontrer que $\forall (x, y) \in \text{dom}(B), B(x, y) = B(y, x)$
3. Démontrer que $\forall (x, y) \in \text{dom}(B), B(x+1, y) = \frac{x}{x+y} B(x, y)$
4. Déterminer une expression de $B(n, p)$ pour $n, p \in \mathbb{N}^*$.

II.36.1 Lien avec une intégrale d'Euler

On pose $I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin \theta) d\theta$.

1. Montrer que B est de classe \mathcal{C}^1 sur $(\mathbb{R}_+^*)^2$ et exprimer ses dérivées partielles sous forme d'intégrales.
2. Exprimer I à l'aide d'une dérivée partielle de B .

II.36.2 Lien entre Γ et B

1. Démontrer que $\forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$.

Indication : On pourra utiliser le théorème de Bohr-Mollerup. II.35.3

2. En déduire un calcul de l'intégrale de Gauss $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt$.
3. En déduire que B est de classe \mathcal{C}^1 sur son domaine de définition et exprimer ses dérivées partielles en fonction de Γ et de sa dérivée.
4. En utilisant II.8, II.36.1 et II.35.5, calculer $\Gamma'\left(\frac{1}{2}\right)$.

II.37 Inégalité intégrale-dérivée

[Corrigé]

Soit $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ une fonction de classe \mathcal{C}^1 telle que $f(a) = f(b) = 0$.

Démontrer que $\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \frac{(b-a)^2}{4} \|f'\|_\infty$.

II.38 Majoration de l'erreur dans la méthode des trapèzes ★★

[Corrigé]

Soit $f \in \mathcal{C}^2([a, b], \mathbb{R})$. Montrer que :

$$\left| \int_a^b f(t) dt - \frac{(b-a)}{2} (f(a) + f(b)) \right| \leq \frac{(b-a)^3}{12} \|f''\|_\infty$$

II.39 Inégalité de Young ★★

[Corrigé]

Soient $c > 0$ et $f : [0, c] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe \mathcal{C}^1 , strictement croissante sur $[0, c]$ et telle que $f(0) = 0$.

Démontrer que $\forall a \in [0, c], \forall b \in [0, f(c)], \int_0^a f(t) dt + \int_0^b f^{-1}(t) dt \geq ab$.

Quand est-ce qu'il y a égalité ?

Remarque : Il s'agit du cas général de $\frac{u^p}{p} + \frac{v^q}{q} \geq uv$ utilisée pour démontrer l'inégalité de Hölder.

II.40 Transformée de Laplace ★★★★★

[Corrigé]

Soit f une fonction continue par morceaux sur \mathbb{R}_+^* . On suppose qu'il existe $p \in \mathbb{R}$ tel que $t \mapsto f(t)e^{-pt}$ soit intégrable sur \mathbb{R}_+^* et on pose : $\alpha = \inf\{p \in \mathbb{R}, t \mapsto f(t)e^{-pt} \in L^1(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})\}$

Pour $p \in \mathbb{R}$, on pose $F(p) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt} dt$ lorsque cela est possible.

1. Justifier que F est définie sur $] \alpha, +\infty[$
2. Théorème de la valeur initiale : On suppose que $\lim_{0^+} f = l \in \mathbb{R}$. Montrer que $\lim_{p \rightarrow +\infty} pF(p) = l$
3. Théorème de la valeur finale : On suppose que $\lim_{+\infty} f = l \in \mathbb{R}$. Montrer que $\lim_{p \rightarrow 0^+} pF(p) = l$

II.41 Théorème des résidus (Version faible) (HP) ★★

[\[Corrigé\]](#)

On considère une fraction rationnelle R à coefficients complexes, intégrable sur \mathbb{R} . On note $\mathcal{H}^+ = \{z \in \mathbb{C}, \operatorname{Im}(z) > 0\}$ et a_1, \dots, a_n la liste des pôles distincts de R . Pour tout $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$, on note $\operatorname{Res}_R(a_k)$ le coefficient de $\frac{1}{X - a_k}$ dans l'écriture de R en éléments simples.

1. Montrer que $\sum_{k=1}^n \operatorname{Res}_R(a_k) = 0$.
2. Montrer que $\int_{-\infty}^{+\infty} R(t)dt = 2i\pi \sum_{a_k \in \mathcal{H}^+} \operatorname{Res}_R(a_k)$.

III

Fonctions réelles

III.1 Formule de Leibniz ★

[\[Corrigé\]](#)

Enoncer et démontrer la formule de Leibniz.

III.2 Fonction discontinue en tout point ★

[\[Corrigé\]](#)

Donner un exemple de fonction définie sur \mathbb{R} mais continue en aucun point de \mathbb{R} .

III.3 Fonction nulle part dérivable ★★★

[\[Corrigé\]](#)

Donner un exemple de fonction continue sur \mathbb{R} mais dérivable en aucun point de \mathbb{R} .

III.4 Théorème de Rolle

[\[Corrigé\]](#)

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable n fois.

1. On suppose que f s'annule en $(n + 1)$ points distincts de $[a, b]$.
Démontrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $f^{(n)}(c) = 0$.
2. On suppose que $f(a) = f'(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = f(b) = 0$.
Démontrer que qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $f^{(n)}(c) = 0$.

III.5 Dérivée symétrique ★

[Corrigé]

On dit qu'une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ admet une *dérivée symétrique* en $a \in \mathbb{R}$ lorsque le rapport $\frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}$ admet une limite finie lorsque h tend vers 0.

1. Prouver la dérivabilité en a est une condition suffisante de dérivabilité symétrique en a .
2. Est-ce une condition nécessaire?

III.6 Fonction de Pringsheim ★★

[Corrigé]

Reconnaitre la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{m \rightarrow +\infty} |\cos(n! \pi x)|^m$.

III.7 $f \circ f = \text{Id}_{\mathbb{R}_+}$ ★★

[Corrigé]

Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ une application continue telle que $f \circ f = \text{Id}_{\mathbb{R}_+}$. Déterminer f .

III.8 Point fixe d'une fonction continue et décroissante sur \mathbb{R} ★

[Corrigé]

Soit f une fonction continue et décroissante sur \mathbb{R} . Montrer que f admet un unique point fixe.

III.9 Un théorème du point fixe (1) ★

[Corrigé]

Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ continue. Montrer que f admet un point fixe.

III.10 Un théorème du point fixe (2) ★★

[Corrigé]

Soit f une fonction continue sur un segment $I = [a, b]$ telle que $I \subset f(I)$.

1. Montrer que f prend les valeurs a et b sur I .
2. Montrer que f admet un point fixe.

III.11 Point fixe de $f \circ f$ ★

[Corrigé]

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que $f \circ f$ admet un point fixe. f admet-elle un point fixe ?

III.12 Point fixe de $f \circ g$ et $g \circ f$ ★★

[Corrigé]

Soit f et g deux fonctions continues sur \mathbb{R} telles que $f \circ g$ est strictement décroissante.

1. Montrer que $f \circ g$ admet un unique point fixe.
2. Montrer que $g \circ f$ admet un unique point fixe.

III.13 Racine carrée de \cos ★★★

[Corrigé]

1. Montrer que \cos admet un unique point fixe sur \mathbb{R} .
2. Existe-t-il une fonction dérivable f de \mathbb{R} dans \mathbb{R} telle que $f \circ f = \cos$?
3. Même question si f est simplement continue.

III.14 Trigonométrie ★

[Corrigé]

Démontrer les identités suivantes :

1. $\forall x \in [-1, 1], \cos(\arcsin(x)) = \sin(\arccos(x)) = \sqrt{1 - x^2}$.
2. $\forall x \in]-1, 1[, \arcsin(x) = \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}\right)$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}^*, \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \operatorname{sgn}(x) \frac{\pi}{2}$.
4. $\forall x \in [-1, 1], \arcsin(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2}$.
5. *Formule de Machin* : Prouver l'égalité suivante, $4 \arctan\left(\frac{1}{5}\right) - \arctan\left(\frac{1}{239}\right) = \frac{\pi}{4}$.

III.15 Règle de l'Hôpital ★★

[Corrigé]

Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$, f et g deux fonctions de $[a, b]$ dans \mathbb{R} continues sur $[a, b]$ et dérivables sur $]a, b[$.

1. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$g'(c)(f(b) - f(a)) = f'(c)(g(b) - g(a)).$$

2. Soient I un intervalle de \mathbb{R} , $x_0 \in I$, f et g définies et continues sur I , dérivables sur $I \setminus \{x_0\}$ telles que pour tout $x \in I \setminus \{x_0\}$, $g'(x) \neq 0$ et telles que $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.

Montrer que le rapport $\frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)}$ tend vers ℓ quand x tend vers x_0 . (Règle de l'Hôpital)

3. Retrouver, en utilisant la règle de l'Hôpital, les développements limités suivants en 0 :

$$\text{— } \sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x + o(x)$$

$$\text{— } \cos(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$$

$$\text{— } \sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$$

III.16 Théorème de Darboux ★★ ★

[\[Corrigé\]](#)

Démontrer que pour toute fonction réelle f dérivable sur un intervalle I , $f'(I)$ est un intervalle.

III.16.1 Réciproque du TVI ★

La réciproque du théorème des valeurs intermédiaires est-elle vraie ?

III.16.2 Fonction non primitive ★

Donner un exemple de fonction qui n'admet pas de primitive.

III.16.3 Condition suffisante pour être de classe \mathcal{C}^1 ★★ ★

Soit I un intervalle de \mathbb{R} et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ convexe et dérivable sur I . Montrer que f est de classe \mathcal{C}^1 sur I .

III.17 Dérivée et inverse confondu ★★ ★

[\[Corrigé\]](#)

On note E l'ensemble des fonctions de classe \mathcal{C}^1 bijectives de $]0, +\infty[$ dans $]0, +\infty[$ telles que $f' = f^{-1}$.

1. Trouver un élément de E de la forme $x \mapsto \alpha x^\beta$ avec $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
2. Si $f \in E$, déterminer la limite en 0 de f et de f^{-1} .
3. Montrer que si $f \in E$, alors f est un \mathcal{C}^∞ difféomorphisme de $]0, +\infty[$ dans $]0, +\infty[$.
4. Montrer que toute fonction $f \in E$ admet un unique point fixe.
5. Soit f et g deux éléments de E . Montrer que f et g admettent le même point fixe.

III.18 Fonction croissante et convexe sur \mathbb{R} ★

[Corrigé]

Soit f une fonction réelle croissante et convexe sur \mathbb{R} non constante.

1. On suppose que f est dérivable sur \mathbb{R} . Montrer que $\lim_{+\infty} f = +\infty$.
2. Montrer le même résultat sans l'hypothèse de dérivabilité.

III.19 Convexité des fonctions continues sur un intervalle ★★★★★

[Corrigé]

Démontrer qu'une fonction réelle f continue sur un intervalle I est convexe sur I si et seulement si

$$\forall (x, y) \in I^2, f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2}$$

On pourra penser à faire une récurrence de Cauchy (cf. I.20).

III.20 Convexe sur un ouvert \implies continue ★★★

[Corrigé]

Soit f une fonction réelle convexe sur un intervalle ouvert I .

1. Montrer que f est continue sur I .
2. Le résultat est-il encore vrai pour un intervalle qui n'est pas ouvert ?
3. Démontrer que l'ensemble des points de I où f n'est pas dérivable est au plus dénombrable (on pourra penser au théorème de Froda cf. ??).

III.21 Fonctions logarithmiquement convexes ★★★

[Corrigé]

On dit qu'une fonction réelle f à valeurs dans $]0, +\infty[$ est logarithmiquement convexe si la fonction $\ln \circ f$ est convexe. Soit I un intervalle de \mathbb{R} et $f : I \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ une application.

1. Montrer que si f est log-convexe, alors f est convexe. La réciproque est-elle vraie ?
2. Montrer que f est log-convexe si et seulement si f^α est convexe quel que soit $\alpha > 0$.
3. Montrer que f est log-convexe si et seulement si l'application $\varphi_c : \begin{cases} I & \longrightarrow \mathbb{R}_+^* \\ x & \longmapsto f(x)c^x \end{cases}$ est convexe quel que soit $c > 0$.
4. Montrer que si f et g sont deux applications de I dans \mathbb{R}_+^* log-convexes alors $f + g$ et $f \times g$ le sont également.

III.22 Etude d'une fonction définie implicitement ★★

[Corrigé]

Soit une application continue $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\forall x \in \mathbb{R}, g^2(x) = g \circ g(x) = 2g(x) - x$.

1. Montrer que g est une bijection croissante de \mathbb{R} dans \mathbb{R} .
2. Déterminer la forme de g .

Indication : on pourra s'intéresser à la fonction $h = g - Id_{\mathbb{R}}$.

III.23 Inégalités de Kolmogorov ★★★★★

[Corrigé]

Soient $f \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ et un entier $n \geq 2$. On note $\forall k \in \llbracket 0; n \rrbracket, M_k = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f^{(k)}(x)|$.

On suppose que M_0 et M_n sont finis.

Le but de cet exercice est de démontrer que $\forall k \in \llbracket 1; n \rrbracket, M_k \leq 2^{\frac{k(n-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{n}} M_n^{\frac{k}{n}}$.

1. Que peut-on dire si l'un des M_k est nul ?
Dans la suite on considérera que $\forall k \in \llbracket 0; n \rrbracket, M_k > 0$.
2. a. On fixe $x \in \mathbb{R}$ ainsi que h_1, \dots, h_{n-1} des réels strictement positifs. Montrer qu'il existe $H > 0$ tel que,

$$\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, \left| f(x) + h_i f'(x) + \dots + \frac{h_i^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(x) \right| \leq 2M_0 + \frac{H^n M_n}{n!}$$

- b. En déduire que les M_k sont finis.

Indication : On pourra traduire les inégalités à l'aide de matrices

3. a. Soit $h > 0$. Montrer que $M_1 \leq \frac{M_2 h}{2} + \frac{M_0}{h}$.
b. En déduire que $M_1 \leq \sqrt{2M_0 M_2}$.
4. a. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite croissante. Soient $n \geq 2$ et $k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket$.

Montrer que $\frac{1}{k} \sum_{i=0}^k u_i \leq \frac{1}{n-k} \sum_{i=k+1}^n u_i$.

- b. On pose pour $k \in \llbracket 0; n \rrbracket$, $x_k = \ln(M_k) - \frac{\ln 2}{2}k(n-k)$.
 Montrer que $\forall k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket$, $2x_k \leq x_{k-1} + x_{k+1}$.
- c. Conclure.

III.24 Lemme de Croft ★★

[Corrigé]

Soit $f : \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}$ uniformément continue sur \mathbb{R}_+ telle que pour tout $x > 0$, la suite $(f(nx))_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers 0.

Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

III.25 Inégalité intégrale de Jensen ★

[Corrigé]

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue par morceaux à valeurs dans un intervalle J . Soit φ une fonction continue et convexe sur J . Démontrer que :

$$\varphi \left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt \right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b \varphi \circ f(t) dt$$

On pourra passer par des sommes de Riemann.

IV.1 Théorème de d'Alembert-Gauss (2)

[\[Corrigé\]](#)

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geq 1$. Notons $\mathcal{P} = \{|P(z)|, z \in \mathbb{C}\}$.

1. Montrer que \mathcal{P} admet une borne inférieure notée α .
2. Soit $r > 0$. Montrer que pour tout nombre complexe z de module r , $|P(z)| \geq |a_p|r^p - \sum_{k=0}^{p-1} |a_k|r^k$.
3. En déduire que $\lim_{|z| \rightarrow +\infty} |P(z)| = +\infty$.
4.
 - a. Montrer qu'il existe une suite $(u_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ bornée telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} |P(u_n)| = \alpha$
 - b. Montrer qu'il existe $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que $|P(z_0)| = \alpha$.
5. On suppose que $\alpha > 0$. On considère alors le polynôme $Q = \frac{P(X + z_0)}{P(z_0)}$
 - a. Montrer que $\inf_{z \in \mathbb{C}} |Q(z)| = |Q(0)| = 1$.
 - b. Montrer qu'il existe $p \in \llbracket 1; n \rrbracket$ et $b_p \neq 0, b_{p+1}, \dots, b_n \in \mathbb{C}$ tels que :

$$Q = \sum_{k=p+1}^n b_k X^k - b_p X^p + 1$$

- c. On pose $b_p = \rho e^{i\theta}$ avec $\rho > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$. Pour $z = r e^{i\frac{\theta}{p}}$ avec $r > 0$, montrer qu'il

existe $r_0 > 0$ tel que

$$\forall r \leq r_0, |Q(z)| - 1 \leq -\rho r^p + \sum_{k=p+1}^n |b_k| X^k$$

d. En déduire que $\alpha = 0$.

6. Conclure.

IV.2 Bernoulli ★★

[\[Corrigé\]](#)

1. Définition :

- (a) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Montrer qu'il existe un unique $Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que $Q' = P$ et $\int_0^1 Q(x)dx = 0$.
- (b) En déduire qu'il existe une unique suite de polynômes réels $(B_n(X))$ vérifiant :

$$B_0 = 1 ; \forall n \geq 1, B'_n = nB_{n-1} ; \forall n \geq 1, \int_0^1 B_n(x)dx = 0$$

- (c) Calculer B_1 et B_2 . En déduire b_1 et b_2 .
- (d) Quel est le degré de B_n pour $n \geq 0$.

On appelle (B_n) la suite des polynômes de Bernoulli. Pour tout $n \geq 0$, on pose $b_n = B_n(0)$. La suite de réels (b_n) est appelée suite des nombres de Bernoulli.

2. Propriétés

- (a) Montrer que pour tout $n \geq 2$, $B_n(0) = B_n(1)$.
- (b) Montrer que pour tout entier n , $B_n = (-1)^n B_n(1 - X)$. En déduire que $B_{2n+1}(0) = B_{2n+1}(1) = 0$.
- (c) A l'aide de la formule de Taylor, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $B_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} b_{n-k} X^k$.
- (d) En déduire que : $\forall n \in \mathbb{N}, b_{2n+2} = \sum_{k=0}^{2n+2} \binom{2n+2}{k} b_k$.

$$\text{Puis que : } \forall n \in \mathbb{N}^*, b_{2n} = -\frac{1}{(n+1)(2n+1)} \sum_{k=0}^{2n-2} \binom{2n+2}{k} b_k$$

IV.3 Lagrange ★

[\[Corrigé\]](#)

Soient n un entier naturel non nul et $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$

1. Démontrer que l'application $\Psi : \begin{cases} \mathbb{K}_{n-1}[X] & \longrightarrow \mathbb{K}^n \\ P & \longmapsto (P(x_1), P(x_2), \dots, P(x_n)) \end{cases}$ est un isomorphisme.
2. Montrer qu'il existe n polynômes L_1, \dots, L_n de $\mathbb{K}_{n-1}[X]$ tels que, pour tout polynôme $P \in \mathbb{K}_{n-1}[X]$ on ait :

$$P = \sum_{k=1}^n P(x_k) L_k$$

IV.4 Tchebychev ★★

[Corrigé]

On note E l'espace vectoriel des fonctions continues de $[-1, 1]$ dans \mathbb{R} . On désigne par E_n l'espace des fonctions polynomiales de $[-1, 1]$ dans \mathbb{R} de degré inférieur ou égal à n , où n est un entier naturel.

1. Existence et unicité
 - (a) Démontrer qu'il existe un polynôme T_n à coefficients réels de degré inférieur ou égal à n vérifiant la propriété suivante :

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, T(\cos(\theta)) = \cos(n\theta)$$

(On pourra remarquer que $\cos(n\theta)$ est la partie réelle de $(\cos(\theta) + i \sin(\theta))^n$.)

- (b) Démontrer qu'un tel polynôme est unique.
2. Montrer que, pour tout $x \in [-1, 1]$, $T_{n+2}(x) = 2xT_{n+1}(x) - T_n(x)$
 3. Quel est le degré de T_n ? Quel est son coefficient dominant?
 4. Montrer que T_n est à coefficients entiers, et que si n est impair alors son coefficient constant est nul.
 5. Racines et extremum :

- (a) Montrer que, pour tout $x \in [-1, 1]$, $T_n(x) = 2^{n-1} \prod_{k=0}^{n-1} (x - \cos(\theta_k))$ où $\theta_k = \frac{(2k+1)\pi}{2n}$

- (b) On pose, pour $k \in \llbracket 0; n \rrbracket$, $c_k = \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)$. Calculer $\|T_n\|_\infty = \sup_{x \in [-1, 1]} |T_n(x)|$ puis prouver que $|T_n(c_k)| = \|T_n\|_\infty$ pour tout $k \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket$

6. Orthogonalité :

- (a) Montrer que, pour toutes fonctions f, g dans E , l'application $t \mapsto \frac{f(t)g(t)}{\sqrt{1-t^2}}$ est intégrable sur $] -1, 1[$.
- (b) Pour f, g éléments de E , on pose $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 \frac{f(t)g(t)}{\sqrt{1-t^2}} dt$. Justifier que ceci définit un produit scalaire sur E .
- (c) Calculer $\langle T_n, T_m \rangle$ pour tous $n, m \in \mathbb{N}$.

IV.4.1 Angles rationnels dont le cosinus est rationnel ★★ (HP)

Soit $\alpha \in \pi\mathbb{Q}$.

1. On suppose que $\alpha \in \frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$. Que dire de $\cos(\alpha)$?

On suppose dans la suite que $\alpha \notin \frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$ et on écrit $\alpha = \pi \frac{p}{q}$ avec $p \wedge q = 1$ et $q > 2$. On suppose de plus que $\cos(\alpha) = \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ avec $b > 0$.

2. On suppose q impair.

- a. Montrer que $\cos(\alpha)$ est de la forme $\frac{\varepsilon}{2^r}$ avec $\varepsilon \in \{-1, 1\}$ et $r \in \mathbb{N}$.

- b. Conclure quand aux valeurs possibles de $\cos(\alpha)$.

3. On suppose que q est pair.

En distinguant deux cas suivant si q est multiple de 4 ou pas, conclure quand aux valeurs possibles de $\cos(\alpha)$.

4. Synthétiser.

5. Que peut-on dire des valeurs de α pour lesquelles $\sin(\alpha)$ est rationnel ?

6. Déterminer les valeurs de α pour lesquelles $\tan(\alpha)$ est rationnel.

IV.4.2 Triangle à angles rationnels dont tous les côtés ont une longueur rationnelle ★★ (HP)

On se place dans le plan \mathbb{R}^2 munit de sa structure euclidienne canonique et d'un repère orthonormé. Caractériser les triangles dont les angles sont rationnels et tous les côtés ont une longueur rationnelle.

IV.4.3 Triangles dont les sommets sont à coordonnées rationnelles ★★ (HP)

On se place dans le plan \mathbb{R}^2 munit de sa structure euclidienne canonique et d'un repère orthonormé. Caractériser les triangles dont les sommets ont des coordonnées rationnelles.

IV.5 Hilbert ★★

[\[Corrigé\]](#)

On pose pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $H_k = \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} (X - j)$ et $H_0 = 1$. On pose également pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$, $\Delta(P) = P(X+1) - P(X)$

1. Montrer que $(H_k)_{k \in \llbracket 0; n \rrbracket}$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

2. Calculer $\Delta(H_0)$ et, pour tout $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$, exprimer $\Delta(H_k)$ à l'aide de H_{k-1} .

3. Montrer que, pour tous $k, l \in \llbracket 0; n \rrbracket$, $\Delta^k(H_k)(0) = \begin{cases} 1 & \text{si } k = l \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$
4. Montrer que, pour tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$, $P = \sum_{k=0}^n (\Delta^k(P))(0)H_k$
5. Soit $k \in \mathbb{Z}$. Calculer $H_n(k)$. On distinguera trois cas : $k \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket$, $k \geq n$ et $k < 0$. Pour ce dernier, on posera $k = -\ell$.
6. En déduire que $H_n(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$.
7. Montrer que $P \in \mathbb{R}_n[X]$ est à valeurs entières sur les entiers si et seulement si ses coordonnées dans la base $(H_k)_{k \in \llbracket 0; n \rrbracket}$ sont entières.

IV.5.1 Points critiques des polynômes de Hilbert ★★

Soient n un entier supérieur ou égal à deux et $P_n = \prod_{k=0}^n (X - k)$.

1. En considérant $F_n = \frac{P'_n}{P_n}$, Montrer que P'_n admet une unique racine x_n sur $]0, 1[$.
2. Montrer que $(x_n)_{n \geq 2}$ converge vers 0.
3. Montrer que $x_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\ln n}$.

IV.6 Laguerre ★★

[\[Corrigé\]](#)

On pose, pour tout entier naturel n et pour tout réel x , $h_n(x) = x^n e^{-x}$ et $L_n(x) = \frac{e^x}{n!} h_n^{(n)}(x)$.

1. Montrer que, pour tout entier n , L_n est une fonction polynomiale. Préciser son degré et son coefficient dominant.
2. Pour tous, $P, Q \in \mathbb{R}[X]$ on pose $\langle P, Q \rangle = \int_0^{+\infty} P(x)Q(x)e^{-x}dx$.
Démontrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est bien définie et est un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$
3. Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\langle L_0, X_n \rangle$.
4. Montrer que, pour tout $k \in \llbracket 0; n \rrbracket$, il existe $Q_k \in \mathbb{R}[X]$ tel que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $h_n^{(k)}(x) = x^{n-k} e^{-x} Q_k(x)$
5. Etablir que : $\forall n \in \mathbb{N}, \forall P \in \mathbb{R}[X], \forall p \in \llbracket 0; n \rrbracket, \langle L_n, P \rangle = \frac{(-1)^p}{n!} \int_0^{+\infty} h_n^{(n-p)}(x) P^{(p)}(x) dx$.
6. En déduire que (L_n) est une famille orthonormée de $(\mathbb{R}[X], \langle \cdot, \cdot \rangle)$.

IV.7 Legendre ★★

[Corrigé]

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $Q_n = (X^2 - 1)^n$ et $P_n = \frac{1}{2^n n!} Q_n^{(n)}$. On pourra confondre polynôme et fonction polynomiale associée.

1. Calculer P_0, P_1, P_2 et P_3 .
2. Quel est le degré de P_n ?
3. Montrer que P_n a la parité de n . En déduire $P_n(0)$ pour n impair et $P_n'(0)$ pour n pair.
4. Calculer $P_n(0)$ pour n pair et $P_n'(0)$ pour n impair. On exprimera les résultats à l'aide de factorielles.
5. Vérifier que : $\forall n \in \mathbb{N}, (X^2 - 1)Q_n' = 2nXQ_n$. En déduire que : $\forall n \in \mathbb{N}, (X^2 - 1)P_n'' + 2XP_n' = n(n+1)P_n$.
6. Montrer que pour tout $k \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket$, $Q_n^{(k)}(-1) = Q_n^{(k)}(1) = 0$.
7. En appliquant le théorème de Rolle et à l'aide d'une récurrence, montrer que P_n admet exactement n racines réelles distinctes dans $] -1, 1[$.

IV.8 Hermite ★★★

[Corrigé]

On définit le n -ième polynôme d'Hermite par :

$$H_n(X) = (-1)^n e^{\frac{x^2}{2}} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-\frac{x^2}{2}})$$

On définit aussi le produit scalaire suivant sur $\mathbb{R}[X]$:

$$\langle P, Q \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} P(t)Q(t)e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

1. Montrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est bien un produit scalaire.
2. Soient $m, n \in \mathbb{N}$. Montrer que si $n \neq m$ alors $\langle H_n, H_m \rangle = 0$.
3. Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer $\langle H_n, H_n \rangle$.
4. Montrer qu'on a la relation de récurrence d'ordre 2 suivante :

$$\forall x \in \mathbb{R}, H_{n+1}(x) = xH_n(x) - nH_{n-1}(x)$$

5. Montrer que H_n vérifie l'équation différentielle suivante :

$$\forall x \in \mathbb{R}, H_n''(x) - xH_n'(x) + nH_n(x) = 0$$

IV.9 Bernstein ★★

[Corrigé]

On note $I = [0, 1]$ et \mathcal{C} l'espace vectoriel des fonctions continues de I dans \mathbb{C} .

On note, pour toute fonction $f \in \mathcal{C}$ et $n \in \mathbb{N}^*$:

$$B_n(f) : \begin{cases} I & \longrightarrow \mathbb{C} \\ x & \longmapsto \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) b_k^n(x) \end{cases} \quad \text{avec } b_k^n(x) = \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$$

1. Calculer explicitement l'expression $\sum_{k=0}^n \left(\frac{k}{n} - x\right) b_k^n(x)$, puis en déduire que :

$$\forall \mu > 0, \forall x \in I, \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ |\frac{k}{n} - x| \geq \mu}} b_k^n(x) \leq \frac{1}{n\mu^2}$$

2. *Théorème de Bernstein* : Pour tout $f \in \mathcal{C}$, montrer que la suite de fonctions $(B_n(f))$ converge uniformément vers f sur $[0, 1]$. En déduire le théorème de Weierstrass.

IV.10 Polynômes cyclotomiques ★★

[Corrigé]

Pour un entier n supérieur ou égal à 1, on dit qu'une racine n -ième de l'unité z est primitive si $z^d \neq 1$ pour tout entier d tel que $1 \leq d \leq n$. On note \mathbb{P}_n l'ensemble des racines primitives n -ième de l'unité. On a donc $P_1 = \{1\}$.

On définit $\Phi \in \mathbb{C}[X]$ par :

$$\Phi_n = \prod_{z \in \mathbb{P}_n} (X - z)$$

1. Montrer que pour tout $n \geq 1$, on a :

$$X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$$

2. Montrer que si p est un nombre premier et $k \geq 1$ est un entier, alors

$$\Phi_{p^k} = X^{(p-1)p^{k-1}} + X^{(p-2)p^{k-1}} + \cdots + X^{p^{k-1}} + 1$$

3. Calculer Φ_n pour $n \in \llbracket 1; 6 \rrbracket$.

On fixe $n \geq 2$ pour toute la suite de cette partie.

4. a. Calculer $\Phi_n(0)$.
b. Calculer $\Phi_n(1)$ en fonction de la décomposition en facteurs premiers de n .

5. a. Soient A et B deux polynômes à coefficient entiers avec B unitaire.
On suppose qu'il existe un polynôme C tel que $A = BC$. A l'aide d'un calcul de division euclidienne, établir que C est à coefficients entiers.
- b. En déduire que $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$.

IV.11 Suite de polynômes défini par récurrence

[Corrigé]

Soit $f : x \mapsto \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un polynôme P_n tel que $f^{(n)}(x) = x^{-3}P_n(x)f(x)$ pour tout $x \neq 0$ et donner le degré de P_n .
2. Montrer que f est prolongeable par continuité en une fonction de classe \mathcal{C}^∞ sur \mathbb{R} .
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, P_n a toutes ses racines réelles.

IV.12 Théorème de la racine rationnelle

[Corrigé]

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ ($a_n \neq 0$) un polynôme à coefficients entiers.

Montrer que si P admet une racine rationnelle $\frac{p}{q}$ alors $p|a_0$ et $q|a_n$.

IV.13 Critère d'Eisenstein ★★

[Corrigé]

Soit $A(X) = X^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$ un polynôme à coefficients entiers. On suppose qu'il existe un nombre premier p tel que $p^2 \nmid a_0$ et $\forall i \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket$, $p|a_i$.
Pour $P \in \mathbb{Z}[X]$ on note $c(P)$ le pgcd de ses coefficients. l'entier $c(P)$ est appelé *contenu* de P .

1. Soient P et Q deux polynômes unitaires à coefficients entiers.
 - a. Montrer que $c(PQ) = c(P)c(Q)$.
 - b. En déduire que le produit de deux polynômes à coefficients rationnels est à coefficients entiers si et seulement si les deux facteurs sont à coefficients entiers.
2. Montrer que A est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

IV.13.1 Irréductibilité des polynômes cyclotomiques d'indices premiers ★★

Soit p un nombre premier. On pose $\Phi_p(X) = \sum_{k=0}^{p-1} X^k$.

En considérant $\Psi_p = \Phi_p(X+1)$, montrer que Φ_p est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

IV.13.2 Dimension de \mathbb{R} en tant que \mathbb{Q} -espace vectoriel ★★★

Soient $n \geq 1$ un entier, a_0, \dots, a_n des entiers et p un nombre premier vérifiant le critère d'Eisenstein. On pose $P = X^{n+1} + \sum_{k=0}^n a_k X^k$ et on note α une racine complexe de P . On

note enfin $f_\alpha : \begin{cases} \mathbb{Q}[X] & \longrightarrow \mathbb{C} \\ Q & \longmapsto Q(\alpha) \end{cases}$.

1. Donner la structure de $\text{Ker}(f_\alpha)$ et montrer qu'il est engendré par un unique polynôme unitaire que l'on précisera.
2. Montrer que la famille $(1, \alpha, \dots, \alpha^n)$ est libre dans \mathbb{Q} .
3. En déduire la dimension de \mathbb{R} en tant que \mathbb{Q} -espace vectoriel.

IV.14 Zéros des polynômes de Taylor du sinus

[\[Corrigé\]](#)

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k X^{2k+1}}{(2k+1)!}$.

Montrer que le nombre c_n de racines réelles de P_n (comptées avec multiplicité) vérifie

$$c_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{4n}{e\pi}.$$

IV.15 Intégrales de polynômes ★

[\[Corrigé\]](#)

Soient $a \leq b$ deux réels et x_0, \dots, x_n une subdivision de $[a, b]$.

Montrer qu'il existe des réels $\lambda_0, \dots, \lambda_n$ tels que :

$$\forall P \in \mathbb{K}[X], \int_a^b P(x) dx = \sum_{i=0}^n \lambda_i P(x_i)$$

IV.16 Théorème de Gauss-Lucas ★★

[Corrigé]

Pour tout $P \in \mathbb{C}[X]$, on note R_P l'ensemble des racines de P . Soit $P = \Lambda \prod_{k=1}^r (X - z_k)^{n_k} \in \mathbb{C}[X]$ non constant avec $R_P = \{z_k, k \in \llbracket 1; r \rrbracket\}$.

1. Montrer que les racines de P' sont incluses dans l'enveloppe convexe de R_P :

$$\text{Conv}(R_P) = \left\{ \sum_{k=1}^r \lambda_k z_k \mid (\lambda_1, \dots, \lambda_r) \in (\mathbb{R}_+)^r, \sum_{k=1}^r \lambda_k = 1 \right\}$$

2. On suppose que P est à racines réelles. Que peut-on dire ?

IV.16.1 Une application ★★★

On reprend les notations précédentes.

On pourra utiliser, sans avoir à le démontrer, que l'enveloppe convexe d'une partie A de \mathbb{C} est la plus petite partie convexe de \mathbb{C} contenant A .

1. Montrer qu'il existe une sous partie $R_{P,\min}$ de R_P minimale pour l'inclusion telle que $\text{Conv}(R_P) = \text{Conv}(R_{P,\min})$ puis que $\text{Conv}(R_P) \setminus R_{P,\min}$ est convexe.
2. Démontrer que si $P''|P$, alors les racines de P sont alignées.
3. La réciproque est-elle vraie ?

IV.17 Une condition nécessaire pour qu'un polynôme réel soit à racines réelles ★★★

[Corrigé]

Soit $P = \sum_{k=1}^n a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$ à racines réelles.

1. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, P''(x)P(x) - (P'(x))^2 \leq 0$.
2. Montrer que $P', \dots, P^{(n-1)}$ sont à racines réelles.
3. Démontrer que $\forall k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket, a_k^2 \leq a_{k-1}a_{k+1}$.

IV.18 Polynômes qui commutent avec cosinus ★★★

[Corrigé]

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, P(\cos(x)) = \cos(P(x))$.

1. Déterminer P s'il est constant.
2. Déterminer P si $\deg(P) = 1$.
3. Déterminer toutes les solutions.

IV.19 Relation trigonométrique polynomiale ★★ ★

[Corrigé]

Déterminer l'ensemble des polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que

$$\forall t \in \mathbb{R}, P(\cos t) + P(\sin t) = 1$$

IV.20 Logarithme polynomial ? ★

[Corrigé]

Existe-il une fraction rationnelle $R \in \mathbb{K}(X)$ telle que $R'(X) = \frac{1}{X}$.

IV.21 Une fraction rationnelle ★

[Corrigé]

Décomposer en éléments simples sur $\mathbb{C}(X)$ la fraction rationnelle $F(X) = \frac{1}{X^n(1-X)^n}$.

IV.22 Théorème de Bernstein

[Corrigé]

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $P \in \mathbb{C}_n[X]$.

1. En décomposant la fraction rationnelle $\frac{X^k}{X^n + 1}$ en éléments simples, montrer qu'en notant ζ_1, \dots, ζ_n les racines de $X^n + 1$ on a :

$$XP'(X) = \frac{n}{2}P(X) + \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\zeta_k P(\zeta_k X)}{(\zeta_k - 1)^2}$$

2. En déduire que $\sup_{z \in \mathbb{U}} |P'(z)| \leq n \sum_{z \in \mathbb{U}} |P(z)|$.

IV.23 Etude d'un polynôme défini implicitement

[Corrigé]

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer qu'il existe un unique polynôme $A_n \in \mathbb{C}[X]$ tel que $A_n \left(X + \frac{1}{X} \right) = X^n + \frac{1}{X^n}$.
2. Déterminer les racines de A_n .
3. Décomposer $\frac{1}{A_n}$ en éléments simples.

IV.24 P'|P ★

[Corrigé]

Déterminer les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que P' divise P .

IV.25 Polynômes positifs ★★

[Corrigé]

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ non constant tel que $P(x) \geq 0$ pour tout réel x .

1. Montrer que le coefficient dominant de P est positif et que les racines réelles de P sont de multiplicité paire.
2. Montrer qu'il existe un polynôme $C \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P = C\overline{C}$.
3. En déduire qu'il existe A et B dans $\mathbb{R}[X]$ tels que $P = A^2 + B^2$.

IV.26 Polynômes carrés

[Corrigé]

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N}, P(n) = m^2$. On souhaite montrer qu'il existe un polynôme $Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P = Q^2$.

1. Soient $a \in \mathbb{R}$ et $f \in \mathcal{C}^\infty(]a, +\infty[, \mathbb{R})$. On définit $\Delta(f) : \begin{cases}]a, +\infty[& \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto f(x+1) - f(x) \end{cases}$.

Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x > a, \exists \theta \in [0, n], \Delta^n(f)(x) = f^{(n)}(x + \theta)$$

2. Conclure en appliquant la question 1 à $x \mapsto \sqrt{P(x)}$.

IV.27 Polynômes réciproques ★★

[Corrigé]

On dit qu'un polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré n est réciproque s'il s'écrit $P = a_n X^n + \dots + a_0$ avec $a_k = a_{n-k}$ pour tout $k \in \llbracket 0; n \rrbracket$.

1. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré n . Démontrer que P est réciproque si et seulement $P(X) = X^n P\left(\frac{1}{X}\right)$.
2. Montrer qu'un produit de polynômes réciproques est réciproque.
3. On suppose que P et Q sont réciproques et que $Q|P$. Démontrer que $\frac{P}{Q}$ est réciproque.
4. Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$, $a_n \neq 0$, un polynôme réciproque.
 - a. Démontrer que si α est une racine de P , alors $\alpha \neq 0$ et α^{-1} est une racine de P .
 - b. Démontrer que si 1 est une racine de P , alors sa multiplicité est supérieure ou égale à 2.
 - c. Démontrer que si le degré de P est impair, alors -1 est une racine de P .
 - d. Démontrer que si P est de degré pair et si -1 est une racine de P , alors sa multiplicité est supérieure ou égale à 2.
5. Démontrer que tout polynôme réciproque de $\mathbb{C}[X]$ de degré $2n$ se factorise en $P = a_{2n}(X^2 + b_1X + 1) \dots (X^2 + b_nX + 1)$.
Que peut-on dire si le degré de P est impair ?

IV.28 Polynômes surjectifs ★★★★★

[Corrigé]

Déterminer les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ vérifiant :

1. $P(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$
2. $P(\mathbb{U}) = \mathbb{U}$
3. $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$
4. $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$
5. $P(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$

IV.29 Résultant et discriminant ★★

[Corrigé]

Soit $(m, n) \in (\mathbb{N}^*)^2$ un couple d'entiers naturels non nuls. Soient $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}_n[X]$ et $Q = \sum_{k=0}^m b_k X^k \in \mathbb{K}_m[X]$ deux polynômes.

On pose le résultant de P et Q :

$$\text{Res}(P, Q) = \begin{vmatrix} a_0 & 0 & \dots & \dots & 0 & b_0 & 0 & \dots & 0 \\ a_1 & a_0 & \ddots & \ddots & \vdots & b_1 & b_0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & a_1 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots & b_1 & \ddots & 0 \\ a_n & \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots & & \ddots & b_0 \\ 0 & a_n & & \ddots & a_0 & b_m & & & b_1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & & a_1 & 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & a_n & 0 & \dots & 0 & b_m \end{vmatrix}$$

$\underbrace{\hspace{15em}}_m \quad \underbrace{\hspace{15em}}_n$

Le résultant des polynômes P et Q est défini comme le déterminant d'une matrice de taille $n + m$, appelée matrice de Sylvester et notée $\text{Syl}(P, Q)$.

On note \mathcal{B}_c la base canonique de $\mathbb{K}_{n+m-1}[X]$.

1. Montrer que $\mathcal{B} = ((1, 0), (X, 0), \dots, (X^{m-1}, 0), (0, 1), (0, X), \dots, (0, X^{n-1}))$ est une base de $\mathbb{K}_{m-1}[X] \times \mathbb{K}_{n-1}[X]$
2. On pose l'application $\varphi : \begin{cases} \mathbb{K}_{m-1}[X] \times \mathbb{K}_{n-1}[X] & \longrightarrow \mathbb{K}_{n+m-1}[X] \\ (U, V) & \longmapsto PU + QV \end{cases}$
Montrer que φ est une application linéaire.
3. Expliciter sa matrice M relativement aux bases \mathcal{B} et \mathcal{B}_c
4. Montrer que $P \wedge Q = 1 \iff \text{Res}(P, Q) \neq 0$.

On pose $\Delta(P) = \frac{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}{a_n} \text{Res}(P, P')$ appelé discriminant de P .

5. On suppose ici que P est de degré 2 et on pose $P = aX^2 + bX + c$. Calculer $\Delta(P)$.
6. On suppose ici que $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ et par conséquent que $P \in \mathbb{C}[X]$. Montrer que P est scindé à racines simples si et seulement $\Delta(P) \neq 0$

IV.30 Théorème de Liouville : Fermat pour les polynômes



[Corrigé]

Soit n un entier supérieur ou égal à 3. On souhaite montrer que si $(P, Q, R) \in \mathbb{C}[X]^3$ tel que $P^n + Q^n = R^n$ alors P, Q, R sont égaux à une constante multiplicative près. On se donne (P, Q, R) un tel triplet.

1. Montrer que l'on peut se ramener à $\tilde{P}, \tilde{Q}, \tilde{R}$ premiers entre eux deux à deux. Dorénavant on supposera P, Q, R premiers entre eux deux à deux et on cherche à montrer que P, Q, R sont constants.

2. On note ζ_1, \dots, ζ_n les racines de $X^n + 1$ et pour $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $T_i = P - \zeta_i Q$.
Montrer que $\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, \exists H_i \in \mathbb{C}[X], T_i = H_i^n$.
3. Conclure.



Espace vectoriels normés

V.1 Suite de Cauchy ★★

[\[Corrigé\]](#)

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé.

On dit qu'une suite $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ est de Cauchy lorsqu'elle vérifie :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall p, q \in \llbracket N; +\infty \llbracket, \|u_p - u_q\| \leq \varepsilon$$

Démontrer que toute suite convergente est une suite de Cauchy puis démontrer qu'en dimension finie il y a équivalence.

V.2 Théorème de Fréchet-Von Neumann-Jordan

[\[Corrigé\]](#)

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé.

Montrer que $\|\cdot\|$ est une norme euclidienne si et seulement si elle vérifie l'identité du parallélogramme :

$$\forall x, y \in E, \|x - y\|^2 + \|x + y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

V.3 Une norme non euclidienne

[\[Corrigé\]](#)

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $\alpha_0, \dots, \alpha_n$ des réels distincts.

Montrer que l'application N définie sur $\mathbb{R}_n[X]$ par $\forall P \in \mathbb{R}_n[X], N(P) = \sum_{k=0}^n |P(\alpha_k)|$ est une norme non euclidienne.

V.4 Norme invariante par similitude

[Corrigé]

Soit $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\|\cdot\|$ une norme sur E telle que :

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \forall P \in \text{GL}_n(\mathbb{K}), \|P^{-1}AP\| = \|A\|$$

1. Montrer que, pour tout $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$, $\|AB\| = \|BA\|$. On pensera à utiliser la densité de $\text{GL}_n(\mathbb{K})$.
2. En déduire une contradiction.

V.5 Equivalence des normes dans un espace vectoriel normé de dimension finie

[Corrigé]

Soient E un \mathbb{K} -espace vectoriel de dimension finie et (e_1, \dots, e_n) une base de E . Fixons une norme N sur E .

On définit l'application $N_0 : \begin{cases} E & \longrightarrow \mathbb{R}_+ \\ x = \sum_{i=1}^n x_i e_i & \longmapsto \sup_{1 \leq i \leq n} |x_i| \end{cases}$.

1. Montrer que N_0 définit une norme sur E .
2. Trouver une constante $\beta > 0$ tel que $\forall x \in E, N(x) \leq \beta N_0(x)$
3. On définit $T : \begin{cases} (\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_\infty) & \longrightarrow (E, N_0) \\ (x_1, \dots, x_n) & \longmapsto \sum_{i=1}^n x_i e_i \end{cases}$.
 - a. Montrer que T est continue.
 - b. En déduire que $S_{N_0} = \{x \in E, N_0(x) = 1\}$ est une partie compacte de (E, N_0) .
 - c. Déterminer une constante $\alpha > 0$ telle que $\forall x \in \mathbb{K}^n, N(x) \geq \alpha N_0(x)$.
4. Conclure que toutes les normes de E sont équivalentes.

V.6 Normes non équivalentes

[Corrigé]

Donner un exemple de deux normes non équivalentes sur un espace vectoriel normé.

V.7 Normes semblables à la norme uniforme sur $\mathbb{K}[X]$

[Corrigé]

On pose pour $A \subset \mathbb{K}$ et $P \in \mathbb{K}[X]$, $N_A(P) = \sup_{x \in A} |P(x)|$.

Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que N_A soit une norme sur $\mathbb{K}[X]$.

V.8 Comparaisons de deux normes sur $\mathbb{K}_n[X]$

[Corrigé]

Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour $P \in \mathbb{K}_n[X]$ on pose $\|P\|_1 = \int_0^1 |P(t)|dt$ et $\|P\| = \sum_{k=0}^n |P(k)|$.

1. Montrer que $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|$ sont des normes de $\mathbb{K}_n[X]$.
2. Trouver une constante $C_n > 0$ telle que $\forall P \in \mathbb{K}_n[X]$, $\|P\|_1 \leq C_n \|P\|$.
3. $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|$ sont-elles équivalentes ?

V.9 Comparaisons de normes usuelles sur $\mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{K})$

[Corrigé]

Soient $a \leq b$ deux réels. On note $E = \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{K})$. Pour $f \in E$ on définit :

$$\|f\|_\infty = \sup_{a \leq t \leq b} |f(t)| \quad \|f\|_1 = \int_a^b |f(t)|dt \quad \|f\|_2 = \sqrt{\int_a^b |f(t)|^2 dt}$$

1. Montrer que $\|\cdot\|_\infty$, $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$ sont des normes sur E .
2. Soit $f \in E$. Montrer que

$$\|f\|_1 \leq (b-a)\|f\|_\infty \quad \|f\|_2 \leq \sqrt{b-a}\|f\|_\infty \quad \|f\|_1 \leq \sqrt{b-a}\|f\|_2$$

3. Montrer que ces trois normes ne sont pas équivalentes.

V.10 Normes p

[Corrigé]

Pour $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ et $p \geq 1$, on pose $\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$.

V.10.1 Inégalités de Hölder et Minkowski

Soient p et q deux nombres réels strictement positifs tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

1. Prouver l'inégalité de Young,

$$\forall (u, v) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, uv \leq \frac{u^p}{p} + \frac{v^q}{q}.$$

2. Inégalité de Hölder

Soient x_1, \dots, x_n et y_1, \dots, y_n des réels strictement positifs. Prouver l'inégalité de Hölder,

$$\sum_{k=1}^n x_k y_k \leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n y_k^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

3. Inégalité de Minkowski

Soient $p \geq 1$, x_1, \dots, x_n et y_1, \dots, y_n des réels strictement positifs. Prouvez l'inégalité de Minkowski,

$$\left(\sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n y_k^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

4. En déduire que $\|\cdot\|_p$ est une norme sur \mathbb{K}^n .

V.10.2 Equivalence des normes p et q

1. Soit $p \geq 1$. Montrer que $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_p$ sont équivalentes.
2. Soit $1 \leq p \leq q < +\infty$. Montrer que $\forall x \in \mathbb{K}^n$, $\|x\|_q \leq \|x\|_p \leq n^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}} \|x\|_q$.

V.10.3 Norme infinie

On définit la norme infini $\|\cdot\|_\infty$ par $\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$, $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$.

Montrer que $\forall x \in \mathbb{K}^n$, $\|x\|_\infty = \lim_{p \rightarrow +\infty} \|x\|_p$.

V.11 Normes de Sobolev

[\[Corrigé\]](#)

Soit $E = \mathcal{C}^n([a, b], \mathbb{R})$ et $F = \mathcal{C}^{n-1}([a, b], \mathbb{R})$.

On définit la n -ième norme de Sobolev sur E par :

$$S_n(f) = \sum_{i=0}^n \left\| f^{(i)} \right\|_2$$

1. Montrer qu'il s'agit bien d'une norme.
2. Montrer que la dérivation

$$D : \begin{cases} E & \longrightarrow F \\ f & \longmapsto f' \end{cases}$$

est continue sur (E, S_n) .

3. Généralisation :

Soient (E, N_E) et (F, N_F) deux espaces vectoriels normés et soit $T : E \rightarrow F$ linéaire

La fonction

$$N_T : \begin{cases} E & \longrightarrow \mathbb{R}_+ \\ x & \longmapsto N_E(x) + N_F(T(x)) \end{cases}$$

est une norme rendant T continue.

V.12 Norme duale

[\[Corrigé\]](#)

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien et N une norme sur E (qui n'est pas forcément la norme associée au produit scalaire). On note S la sphère unité pour la norme N i.e $S = \{x \in E, N(x) = 1\}$ et on pose pour tout $x \in E$,

$$N^*(x) = \sup_{y \in S} |\langle x, y \rangle|$$

1. Montrer que l'application est bien définie sur E .

2. Montrer que N^* est une norme sur E .

3. On suppose que $E = \mathbb{R}^n$.

Déterminer N^* lorsque N est la norme $\|\cdot\|_2$, $\|\cdot\|_\infty$ ou $\|\cdot\|_1$.

V.13 Norme à partir d'une famille libre

[\[Corrigé\]](#)

Soit E un \mathbb{R} -espace vectoriel muni d'une norme $\|\cdot\|$. On se donne $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$.

Montrer que l'application $N : \begin{cases} \mathbb{R}^n & \longrightarrow \mathbb{R}_+ \\ (\lambda_1, \dots, \lambda_n) & \longmapsto \left\| \sum_{k=1}^n \lambda_k x_k \right\| \end{cases}$ est une norme sur \mathbb{R}^n si

et seulement si (x_1, \dots, x_n) est une famille libre.

V.14 Quelques normes matricielles

[\[Corrigé\]](#)

Pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, on pose :

$$N_1(A) = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^p |A_{i,j}|$$

$$N_2(A) = \max_{1 \leq j \leq p} \sum_{i=1}^n |A_{i,j}|$$

$$N_3(A) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p A_{i,j}^2}$$

$$N_4(A) = \sqrt{\max Sp(A^\top A)}$$

1. Montrer que N_1, N_2, N_3 et N_4 sont des normes sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.
2. Montrer que si $n = p$, ce sont des normes d'algèbre sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

V.15 Caractérisation des sous-espaces de dimension finie de $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{K})$

[Corrigé]

On note $E = \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{K})$. Pour $f \in E$ on pose $\|f\|_\infty = \sup_{[0,1]} |f|$ et $\|f\|_2 = \left(\int_{[0,1]} f^2 \right)^{1/2}$.

1. Montrer qu'il existe $b > 0$ tel que $\forall f \in E, \|f\|_2 \leq b\|f\|_\infty$.
2. Soit V un sous-espace vectoriel de E de dimension finie. Montrer qu'il existe $c > 0$ tel que $\forall f \in V, \|f\|_\infty \leq c\|f\|_2$.
3. Soit V un sous-espace vectoriel de E . On suppose qu'il existe un entier $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\forall f \in V, \|f\|_\infty \leq n\|f\|_2$.
Montrer que V est de dimension finie et que $\dim V \leq n^2$.

V.16 Distance

[Corrigé]

Soit A un ensemble. On appelle distance sur A toute application $d : A^2 \rightarrow \mathbb{R}_+$ qui vérifie les axiomes :

- De symétrie : $\forall (x, y) \in A^2, d(x, y) = d(y, x)$;
- De séparation : $\forall (x, y) \in A^2, d(x, y) = 0 \iff x = y$;
- D'inégalité triangulaire : $\forall (x, y, z) \in A^3, d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$.

1. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. montrer que $d : \begin{cases} E^2 & \longrightarrow \mathbb{R}_+ \\ (x, y) & \longmapsto \|x - y\| \end{cases}$ est une distance sur E .
2. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on pose $d(x, y) = \arctan |x - y|$. Montrer que d est une distance sur \mathbb{R} et qu'elle ne peut pas s'exprimer comme la distance de la question précédente.

V.17 Distance à une partie

[Corrigé]

Soit A une partie non vide d'un espace vectoriel normé E . On pose pour tout $x, y \in E^2, d(x, y) = \|x - y\|$ et $d(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a)$. Montrer que

$$\forall (x, y) \in E^2, |d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y)$$

V.18 Distance d'un élément à une partie (1)

[Corrigé]

On considère E l'espace des suites réelles bornées que l'on munit de la norme uniforme. Calculer la distance de $u = ((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ à l'ensemble des suites convergentes.

V.19 Distance d'un élément à une partie (2)

[Corrigé]

On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de son produit scalaire canonique.

1. Montrer que $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.
2. Montrer que $\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) = (\mathcal{A}_n(\mathbb{R}))^\perp$.
3. Soit $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$. Quelle est la distance de M à $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$?

V.20 Passage par les matrices orthogonales

[Corrigé]

Pour $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, on pose $N(X) = \max_{A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})} \|AX\|_\infty$.

1. Montrer que N est une norme sur $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.
2. Vérifier que : $\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), \forall A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}), \quad N(AX) = N(X)$.
3. Montrer que $N = \|\cdot\|_2$ la norme euclidienne canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

V.21 Diamètre d'une partie bornée

[Corrigé]

Lorsque A est une partie bornée non vide d'un espace vectoriel normé (E, N) , on définit le *diamètre* de A défini par :

$$\delta(A) = \sup_{(x,y) \in A^2} N(y - x).$$

1. Justifier l'existence du diamètre.

Soient A et B deux parties bornées et non vides de E .

2. Etablir que $A \subset B \Rightarrow \delta(A) \leq \delta(B)$.
3. On suppose de plus $A \cap B \neq \emptyset$. Montrer que $\delta(A \cup B) \leq \delta(A) + \delta(B)$
4. Montrer que dans le cas général, $\delta(A \cup B) \leq \delta(A) + \delta(B) + d(A, B)$ où $d(A, B) = \inf_{(a,b) \in A \times B} N(a - b)$.

V.22 Détermination d'une borne inférieure

[Corrigé]

On note $E = \{f \in \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{K}), f(0) = 0 \text{ et } f(1) = 1\}$.

Déterminer

$$\inf_{f \in E} \int_0^1 |f'(x) - f(x)| dx$$

V.23 Normes usuelles sur $\mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{K})$

[Corrigé]

Soit $E = \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{K})$. On pose pour tout $f \in E$:

- $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx$;
- $N_1(f) = \|f\|_1 + \|f'\|_1$;
- $N_2(f) = |f(0)| + \|f'\|_1$.

1. Montrer que N_1 et N_2 sont des normes sur E .
2. N_1 et N_2 sont-elles équivalentes ?

V.24 Intersection des boules unités subordonnées d'un espace vectoriel normé de dimension finie

[Corrigé]

On note \mathcal{N} l'ensemble des normes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ subordonnées à une norme de \mathbb{C}^n . Pour toute norme $N \in \mathcal{N}$ on note B_N la boule unité fermée de (E, N) , $B_N = \{x \in E, N(x) \leq 1\}$.

Déterminer $B = \bigcap_{N \in \mathcal{N}} B_N$.

V.25 Modes de convergence

[Corrigé]

Soit E un espace préhilbertien réel muni de son produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$. On note $\|\cdot\|$ la norme associée.

On dit qu'une suite $(x_n) \in E^{\mathbb{N}}$ converge fortement vers $x \in E$ si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|x_n - x\| = 0$ et que (x_n) converge faiblement vers x si pour tout $y \in E$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \langle x_n - x, y \rangle = 0$.

1.
 - a. Montrer que si (x_n) converge faiblement, sa limite est unique.
 - b. Montrer que la convergence forte implique la convergence faible.

2. Montrer que (x_n) converge fortement vers x si et seulement si (x_n) converge faiblement vers x et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|x_n\| = \|x\|$
3. Montrer que, en dimension finie, ces deux modes de convergence sont équivalents.
4. Donner un contre-exemple en dimension infinie.

V.26 Moyenne des itérés et projection sur l'espace des invariants d'une application linéaire contractante

[\[Corrigé\]](#)

Soit E un espace vectoriel normé de dimension finie. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\forall x \in E, \|u(x)\| \leq \|x\|$.

1. Montrer que $E = \text{Ker}(\text{Id}_E - u) \oplus \text{Im}(\text{Id}_E - u)$.
2. Soit $x \in E$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $x_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} u^k(x)$. Montrer que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers la projection de x sur $\text{Ker}(\text{Id}_E - u)$ parallèlement à $\text{Im}(\text{Id}_E - u)$.

V.27 Matrice de projecteur

[\[Corrigé\]](#)

Soit $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ telle que la suite $(A^n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une matrice L . Montrer que L est une matrice de projecteur.

V.28 Matrice de rotation

[\[Corrigé\]](#)

Soit $a \in \mathbb{R}$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $A_n = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{a}{n} \\ \frac{a}{n} & 1 \end{pmatrix}$.

Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n^n = \begin{pmatrix} \cos a & -\sin a \\ \sin a & \cos a \end{pmatrix}$.

V.29 Applications contractantes

[\[Corrigé\]](#)

Soient E un espace vectoriel normé de dimension finie, $k \in [0, 1[$ et $f : E \rightarrow E$ k -lipschitzienne. Soit $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$.

Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

Indication : on pourra considérer la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_{n+1} - u_n$.

V.30 Une série vectorielle

[Corrigé]

Soient E un espace vectoriel normé de dimension finie et $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ telle que $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ converge absolument.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n 2^k u_k$.

Montrer que la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} v_n$ converge absolument et calculer sa somme.

V.31 Polytopes réguliers d'un espace vectoriel euclidien

[Corrigé]

On note E un espace euclidien de dimension $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\langle \cdot, \cdot \rangle$ le produit scalaire et $\|\cdot\|$ la norme associée.

1. Montrer que si H est un hyperplan de E , alors il existe a dans E tel que $H = (\text{Vect}(a))^{\perp}$.
2. Dans cette question uniquement, on prend $E = \mathbb{R}^2$ et $\langle \cdot, \cdot \rangle$ désigne le produit scalaire canonique. On pose $e = (0, 1)$.
Trouver f, g dans E tels que $\|f\| = \|g\| = 1$ et le triangle (dont les sommets sont) e, f, g est équilatéral.
Prouver (à permutation près) l'unicité de cette solution.
3. On revient à E euclidien de dimension n .

- a. On suppose que x_1, \dots, x_{n+1} sont des vecteurs unitaires de E tels que :

$$\exists \alpha \in \mathbb{R}_-, \quad \forall (i, j) \in \llbracket 1; n+1 \rrbracket^2, (i \neq j \implies \langle x_i, x_j \rangle = \alpha)$$

- b. Expliquer comment trouver dans E une famille de $n+1$ vecteurs vérifiant les conditions précédentes.

Suites et séries de fonctions**VI.1 Etude d'une suite de fonctions (1)**[\[Corrigé\]](#)

Soit (P_n) la suite de fonctions définie sur $[0, 1]$ par :

— $P_0(x) = 0$

— $\forall n \in \mathbb{N}, P_{n+1} = P_n(x) + \frac{1}{2}(x - P_n(x))^2$

1. Montrer que pour tout $x \in [0, 1], 0 \leq P_n(x) \leq \sqrt{x}$.
2. Montrer que pour tout $x \in [0, 1], 0 \leq \sqrt{x} - P_n(x) \leq \sqrt{x} \left(1 - \frac{\sqrt{x}}{2}\right)^n$
3. En déduire que la suite (P_n) converge uniformément sur $[0, 1]$ vers la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$.

VI.2 Etude d'une suite de fonctions (2)[\[Corrigé\]](#)

On définit la suite de fonctions (g_n) de $[0, 1]$ dans \mathbb{R} par $g_0 = 1$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in [0, 1], g_{n+1}(x) = \int_0^x g_n(1-t)dt$$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, g_n est bornée et que, $\forall n \in \mathbb{N}^*, \|g_{n+1}\|_\infty \leq \frac{1}{2}\|g_{n-1}\|_\infty$
2. On pose $G : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} g_n(x)$
Montrer que G est bien définie sur $[0, 1]$ et déterminer une équation différentielle vérifiée par G .
3. En déduire l'expression de G .

VI.3 Etude d'une suite de fonctions (3)

[Corrigé]

Soit $f_n : x \mapsto n \cos(x)^n \sin(x)$. Etudier la convergence simple et uniforme de la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur \mathbb{R} .

VI.4 Etude d'une suite de fonctions (4)

[Corrigé]

Soit $f_n : x \mapsto \sin(x)^n \cos x$. Etudier la convergence simple et uniforme de la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur \mathbb{R} .

VI.5 Etude d'une suite de fonctions (5)

[Corrigé]

Soit $f_n : x \mapsto \frac{\sin(nx)}{n\sqrt{x}}$. Etudier la convergence simple et uniforme de la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur \mathbb{R}_+^* .

VI.6 Etude d'une suite de fonctions (6)

[Corrigé]

Soit $f_n : x \mapsto e^{\frac{n-1}{n}x}$. Etudier la convergence simple et uniforme de la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur \mathbb{R} , puis sur $] -\infty, a]$ pour $a \in \mathbb{R}$.

VI.7 Etude d'une suite de fonctions (7)

[Corrigé]

Pour tout réel x et tout entier naturel n non nul, on pose $P_n(x) = \prod_{k=1}^n \operatorname{ch}\left(\frac{x}{k}\right)$

1. Déterminer l'ensemble I des réels x pour lesquels la suite $(P_n(x))_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge.

On pourra utiliser la suite $(\ln(P_n(x)))_{n \in \mathbb{N}^*}$.

Pour $x \in I$ on note $\varphi(x)$ la limite de la suite $(P_n(x))$.

2. Etudier la parité et la monotonie de la fonction φ .
3. Démontrer que la fonction φ est continue sur I .
4. En étudiant $\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\operatorname{ch}}$, montrer que $\frac{1}{\varphi}$ est intégrable sur \mathbb{R} .

VI.8 Développement de la cotangente (1)

[Corrigé]

On pose pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, $f_n(x) = \sum_{k=-n}^n \frac{1}{x-k}$.

1. Montrer que la suite de fonction $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement vers une fonction f .
2. Montrer que la fonction g définie par $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, $g(x) = \pi \cotan(\pi x) - f(x)$ se prolonge en une fonction continue sur \mathbb{R} et 1-périodique, qu'on continuera d'appeler g .
3. Donner une expression pour tout $x \in \mathbb{R}$ de $g(x)$ en fonction de $g\left(\frac{x}{2}\right)$ et $g\left(\frac{x+1}{2}\right)$.
4. En déduire en utilisant la 1-périodicité de g qu'elle est nulle sur \mathbb{R} .

VI.9 Etude d'une fonction définie par une série alternée (1)

[Corrigé]

Pour $t > 0$, on pose :

$$S(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{1+nt}$$

1. Justifier que S est définie et continue sur $]0, +\infty[$.
2. Etablir la limite de S en $+\infty$.
3. Etablir que S est de classe \mathcal{C}^1 sur $]0, +\infty[$.

VI.10 Etude d'une fonction définie par une série alternée (2)

[Corrigé]

Pour $x > 0$, on pose

$$S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+x}$$

1. Justifier que S est définie et de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R}_+^* .
2. Préciser le sens de variation de S .
3. Etablir : $\forall x > 0$, $S(x+1) + S(x) = \frac{1}{x}$.
4. Donner un équivalent de S en 0.
5. Donner un équivalent de S en $+\infty$.

6. Montrer que pour $x > 0$,

$$F(x) = \int_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t} dt$$

VI.11 Convergence vers une dérivée

[Corrigé]

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivable de dérivée seconde bornée. Montrer que la suite des fonctions

$$g_n : x \mapsto n \left(f \left(x + \frac{1}{n} \right) - f(x) \right)$$

converge uniformément vers f' sur \mathbb{R} .

VI.12 Limite ponctuelle et uniforme d'une suite de fonctions

[Corrigé]

On suppose qu'une suite de fonctions (f_n) de $[a, b]$ vers \mathbb{R} converge uniformément vers $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue et on considère une suite (x_n) d'éléments de $[a, b]$ convergeant vers x .

Montrer que

$$f_n(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$$

VI.13 Convergence des suites de polynômes

[Corrigé]

Soient $d \in \mathbb{N}$ et $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de polynômes de $\mathbb{R}_d[X]$. Montrer que les propositions suivantes sont équivalentes :

- (i) (P_n) converge dans $\mathbb{R}_d[X]$.
- (ii) (P_n) converge simplement sur $[0, 1]$.
- (iii) (P_n) converge uniformément sur $[0, 1]$.

VI.14 Un théorème de Weierstrass sur \mathbb{R} ?

[Corrigé]

Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ limite uniforme sur \mathbb{R} d'une suite de fonctions polynomiales. Démontrer que f est une fonction polynomiale.

VI.15 Approximation paire

[Corrigé]

Soit S un segment de \mathbb{R}_+ . Montrer que toute fonction $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ continue est limite uniforme d'une suite de polynômes pairs.

VI.16 Approximation croissante

[Corrigé]

Montrer que toute fonction réelle croissante sur un segment s'approche uniformément sur ce segment par des polynômes croissants sur ce même segment.

VI.17 Intversion Série-Intégrale

[Corrigé]

Pour $x \in]-1, 1[$, on pose $F(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{1 - x \cos(t)} dt$

1. Etablir que pour tout $x \in]-1, 1[$, $F(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{4^n} \binom{n}{2n} x^{2n}$
2. Montrer que $\forall x \in]-1, 1[$, $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{4^n} \binom{n}{2n} x^{2n}$
3. $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3}{(2n+1)4^{2n}} \binom{2n}{n} = \pi$

VI.18 Série de fonction matricielle

[Corrigé]

On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ d'une norme d'algèbre $\|\cdot\|$.

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ non nulle et $I =]-\alpha, \alpha[$ avec $\alpha = \frac{1}{\|A\|}$. Pour tout $t \in I$, on pose

$$f(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} (tA)^k$$

1. Montrer que f est bien définie sur I et que $\forall t \in I$, $f(t) = (I_n - tA)^{-1}$.
2. Justifier que f est de classe \mathcal{C}^1 sur I et que $\forall t \in I$, $f'(t) = A(f(t))^2$.

VI.19 Fonction ζ de Riemann

[Corrigé]

On pose $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ $f_n : x \mapsto \frac{1}{n^x}$

On pose également $\eta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x}$

1. Donner le domaine de définition D_ζ de ζ .
2. Démontrer que $\sum f_n$ ne converge pas normalement sur D_ζ mais qu'elle converge normalement sur $[a, +\infty[$ pour tout $a > 1$.
3. Montrer que ζ est continue sur D_ζ .
4. Trouver un équivalent simple de ζ en 1^+ et donner la limite de ζ en $+\infty$.
5. Montrer que la série $\sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1} f_n$ converge uniformément sur $[a, +\infty[$ pour tout $a > 0$.
6. Montrer que η est continue sur \mathbb{R}_+^* .
7. Montrer que $\eta(x) = 1 - \frac{1}{2^x} + o_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2^x} \right)$
8. Montrer que : $\forall x \in]1, +\infty[, \zeta(x) - \eta(x) = 2^{1-x} \zeta(x)$. En déduire un développement asymptotique de ζ à l'ordre 2 en $+\infty$.
9. Montrer que ζ est C^∞ sur D_ζ . En déduire le sens de variation et la convexité de ζ sur D_ζ .

VI.20 Expression de suites sous forme de séries

[Corrigé]

1. Soit $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ une série complexe absolument convergente. On suppose que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n^k = 0$.
Montrer que la suite (a_n) est nulle.
2. Existe-t-il une suite (a_n) telle que $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n^k = k$?
3. Existe-t-il une suite (a_n) telle que $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n^k = \frac{1}{k^2}$?

VI.21 Etude d'une série de fonctions

[Corrigé]

Soit $(a_n)_{n \geq 1}$ une suite décroissante de limite nulle. On pose $f_n : x \mapsto \sin(nx)$

1. Montrer que la série $\sum_{n \geq 1} a_n f_n$ converge simplement.
2. Montrer que la série $\sum_{n \geq 1} a_n f_n$ converge uniformément sur \mathbb{R} si et seulement si la suite (na_n) converge vers 0.

VI.22 Théorème de Dini ★★★★★

[Corrigé]

1. Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante de fonctions réelles continues sur un segment $[a, b]$ de \mathbb{R} . Montrer que si $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement vers une fonction f continue sur $[a, b]$, alors la convergence est uniforme.
2. Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions réelles croissantes et continues sur un segment $[a, b]$ de \mathbb{R} . Montrer que si $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement vers une fonction f continue sur $[a, b]$, alors la convergence est uniforme.

VI.23 Suite de fonction lipschitzienne ★★★★★

[Corrigé]

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions réelles L -lipschitziennes convergeant simplement vers une fonction f sur un segment $[a, b]$ de \mathbb{R} .

1. Montrer que f est L -lipschitzienne.
2. Montrer que la convergence est uniforme.

VI.24 Phénomène de Runge

[Corrigé]

Soit $\alpha > 0$ et f_α la fonction $f_\alpha : x \in [-1, 1] \mapsto \frac{1}{x^2 + \alpha^2}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère les $2n$ points équirépartis dans $[-1, 1]$ définis par $a_k = \frac{2k+1}{2n}$ pour $-n \leq k \leq n-1$. On note P_n le polynôme d'interpolation de Lagrange de degré $< 2n$ déterminé par les conditions $P_n(a_k) = f_\alpha(a_k)$ pour $-n \leq k \leq n-1$.

1. Montrer $f_\alpha(x) - P_n(x) = \frac{1}{x^2 + \alpha^2} \frac{\omega_n(x)}{\omega(\alpha i)}$ avec $\omega_n(x) = \prod_{k=-n}^n (x - a_k)$
2. En déduire le premier terme du développement asymptotique de $\log(|f_\alpha(1) - P_n(1)|)$ quand n tend vers l'infini.
3. Montrer que si $\alpha > 0$ est suffisamment petit, la suite de fonctions (P_n) ne converge pas uniformément vers f_α .

Remarque : On vient de démontrer que l'augmentation du nombre de points d'interpolation n'est pas nécessairement une bonne stratégie d'approximation. Pour approcher une fonction avec des polynômes, on peut préférer utiliser des splines par exemple (polynômes par morceaux). Dans ce cas, pour améliorer l'approximation, on augmente le nombre de morceaux et non le degré des polynômes.

VI.25 Théorème de Weierstrass

[Corrigé]

On note E l'espace vectoriel des fonctions continues de \mathbb{R} dans \mathbb{C} et nulles en dehors d'un compact. On muni E de la loi de convolution $*$ en définissant, pour tout $(f, g) \in E^2$ la convolée :

$$f * g : x \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t)g(t)dt$$

1. (a) Montrer que la loi $*$ est commutative et distributive sur l'addition.
- (b) Séquence de Dirac On appelle séquence de Dirac toute suite (χ_n) de fonctions positives de E vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \int_{-\infty}^{+\infty} \chi_n(t)dt = 1 \text{ et } \forall \alpha > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{|t| \geq \alpha} \chi_n(t)dt = 0$$

Soit (χ_n) une telle suite et soit $f \in E$. Montrer que la suite de fonctions $(f * \chi_n)$ converge uniformément vers f sur \mathbb{R} .

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose :

$$a_n = \int_{-1}^1 (1-t^2)^n dt \text{ et } p_n : t \in \mathbb{R} \mapsto \begin{cases} \frac{(1-t^2)^n}{a_n} & \text{si } |t| \leq 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- (a) Montrer que (p_n) est une séquence de Dirac.
 - (b) Soit $f \in E$, nulle en dehors de $I = \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, montrer que $f * p_n$ est une fonction polynomiale. Conclure.
 - (c) En déduire le théorème de Weierstrass : si I est un segment de \mathbb{R} et si $f : I \mapsto \mathbb{C}$ est continue, alors f est limite uniforme sur I d'une suite de fonctions polynomiale.
3. Application :

- (a) Soit $f : [0, 1] \mapsto \mathbb{C}$ une fonction continue, telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\int_0^1 f(t)t^n dt = 0$. Montrer que f est la fonction nulle.

- (b) Soit $f : \mathbb{R}^+ \mapsto \mathbb{C}$ une fonction continue telle que l'intégrale $\int_0^{+\infty} f(t)dt$ existe.

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'intégrale $I_n = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-nt}dt$ existe.

Si $\forall n \in \mathbb{N}$, $I_n = 0$, montrer que f est la fonction nulle.

VI.26 Théorème de Chudnovsky ★★★★★

[Corrigé]

On se donne deux réels a, b tels que $0 < a \leq b < 1$. Le but de cet exercice est de démontrer que toute fonction continue sur $[a, b]$ est limite uniforme sur $[a, b]$ d'une suite de fonctions polynomiales à coefficients entiers. On munit $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ de sa norme uniforme.

1. Montrer que l'ensemble des nombres dyadiques $\mathcal{D} = \left\{ \frac{p}{2^q}, (p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \right\}$ est dense dans \mathbb{R} .
2. On pose $\varphi : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto 2x(1-x) \end{cases}$ et pour $n \in \mathbb{N}$ on définit $\varphi_n = \overbrace{\varphi \circ \dots \circ \varphi}^n$. Par convention $\varphi_0 = \varphi$.
 - a. Montrer que $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement vers la fonction constante égale à $\frac{1}{2}$ sur $[a, b]$.
 - b. Montrer que $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers la fonction constante égale à $\frac{1}{2}$ sur $[a, b]$.
3. On note \mathcal{Z} l'ensemble des limites uniformes de suites de fonctions polynomiales à coefficients entiers :

$$\mathcal{Z} = \{f \in \mathbb{R}^{[a,b]}, \exists (P_n) \in \mathbb{Z}[X]^{\mathbb{N}}, \lim_{n \rightarrow +\infty} \|x \mapsto f(x) - P_n(x)\|_{\infty} = 0\}$$

Montrer que \mathcal{Z} est stable par somme et par produit.

4. Conclure.
5. Le résultat est-il encore vrai pour $a \leq b$ des réels quelconques ? Que peut-on dire pour des fonctions à valeurs dans \mathbb{C} ?

VI.27 Théorème de sélection de Helly

[Corrigé]

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions croissantes d'un intervalle ouvert I dans \mathbb{R} telle que, pour tout $x \in I$, la suite $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée. Démontrer qu'il existe une sous-suite $(f_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ et une fonction croissante $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, telle que cette sous-suite converge simplement vers f .

VII

Série entière

VII.1 Lemme d'Abel

[\[Corrigé\]](#)

Énoncé et démontrer le lemme d'Abel

VII.2 Fonction non développable en série entière

[\[Corrigé\]](#)

On pose pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $f(x) = \exp\left(-\frac{1}{x^2}\right)$ et $f(0) = 0$.

1. Montrer que f est continue sur \mathbb{R} .
2. Montrer que f est de classe \mathcal{C}^∞ sur \mathbb{R} et calculer pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}(0)$.
3. En déduire que f n'est pas développable en série entière.

VII.3 CCINP MP 2019

[\[Corrigé\]](#)

On pose $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{2n}{n} x^n$

1. Déterminer le rayon de convergence de la série $\sum \binom{2n}{n} x^n$. On note R le rayon de convergence de cette série.
2. Pour tout $x \in]-R, R[$, prouver la relation $(1 - 4x)S'(x) - 2S(x) = 0$.
3. En déduire une expression de $S'(x)$.

VII.4 Série entière de terme général binomial

[\[Corrigé\]](#)

Soient $p \in \mathbb{N}$ et $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{n+p}{p} x^n$

1. Déterminer le rayon de convergence de la série entière définissant cette fonction.
2. Calculer $f(x)$ en étudiant $(1-x)f'(x)$.

VII.5 Formule de Cauchy

[\[Corrigé\]](#)

Soit $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$. On pose $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$

Soit $r \in [0, R[$ Montrer que $a_n r^n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(re^{i\theta}) e^{-in\theta} d\theta$

VII.6 Principe des zéros isolés

[\[Corrigé\]](#)

Soit f la somme de la série entière $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$ sur son disque de convergence. Montrer que s'il existe une suite $(z_p)_{p \in \mathbb{N}}$ de nombres complexes non nuls tendant vers 0 telle que pour tout $p \in \mathbb{N}$, $f(z_p) = 0$, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = 0$.

VII.7 Produit de Hadamard

[\[Corrigé\]](#)

1. Soit $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$ telle que $a_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Discuter en fonction du paramètres $\alpha \in \mathbb{R}$ le rayon de convergence R' de la série entière $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n^\alpha z^n$
2. Soient $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$ et $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n z^n$ deux séries entières de rayon respectifs R et R' . Que dire du rayon de convergence R'' de la série entière $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n b_n z^n$.

VII.8 Théorème de Liouville

[Corrigé]

Soit $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$ une série entière dont le rayon de convergence est infini. Soit $f : \mathbb{C} \mapsto \mathbb{C}$ la somme de cette série entière.

1. Si la fonction entière f est bornée sur \mathbb{C} , montrer que f est constante.
2. Plus généralement, s'il existe un polynôme P à coefficients positifs tel que $\forall z \in \mathbb{C}, |f(z)| \leq P(|z|)$, montrer que f est un polynôme.

VII.9 Inverse d'une série entière

[Corrigé]

Soit $1 + \sum_{n \geq 1} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence non nul, et S la somme de cette série sur son disque de convergence. Montrer que $\frac{1}{S}$ est développable en série entière autour de l'origine.

VII.10 Equivalent de séries entières

[Corrigé]

Soient $(a_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $(b_n) \in (\mathbb{R}_+)^{\mathbb{N}}$ telles que le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n x^n$ vaut 1, $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ diverge, la suite $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie à partir d'un certain rang et converge vers un réel ℓ .

1. Montrer que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} +\infty$$

2. Montrer que

$$\frac{\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n}{\sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n} \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} \ell$$

VII.11 Théorème de d'Alembert-Gauss

[Corrigé]

À l'aide du théorème de Liouville VII.8 et de VII.9, démontrer le théorème de d'Alembert-

Gauss.

VII.12 Développement de fraction rationnelle autour de 0

[\[Corrigé\]](#)

1. Soient P et Q deux polynômes à coefficients dans \mathbb{C} tels que $Q(0) \neq 0$. On pose, pour z non racine de Q , $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$.
Montrer que f est développable en série entière au voisinage de 0 et que les coefficients de son développement vérifient une relation de récurrence linéaire à coefficients constants. En outre, préciser le rayon de convergence.
2. Réciproquement, on se donne une suite $(u_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ vérifiant une relation de récurrence linéaire à coefficients constants. Montrer que la série entière $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n z^n$ a un rayon de convergence R non nul et qu'il existe deux polynômes $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ avec $Q(0) \neq 0$ tels que pour tout $z \in \mathbb{C}$, si $|z| > R$ alors $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n z^n = \frac{P(z)}{Q(z)}$.

VII.13 Fonction quasi-polynomiale

[\[Corrigé\]](#)

Une fonction $P : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$ est dite quasi-polynomiale s'il existe $k \in \mathbb{N}$ et $k+1$ fonctions périodiques $c_0, \dots, c_k \in \mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$ telles que $\forall n \in \mathbb{Z}$, $P(n) = \sum_{i=0}^k c_i(n)n^i$. Si la fonction c_k n'est pas nulle, on dira que le degré de la fonction P est k et que c_k est son coefficient dominant.

1. Montrer que l'ensemble des fonctions quasi-polynomiales forme une \mathbb{C} -algèbre.
2. Montrer que si $P, Q \in \mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$ sont deux fonctions quasi-polynomiales qui coïncident sur \mathbb{N} alors elles sont égales.

Dans la suite, on dira que $P : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$ est quasi-polynomiale si c'est la restriction à \mathbb{N} d'une fonction quasi-polynomiale (qui est bien définie uniquement d'après la question précédente).

3. Montrer que $P : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$ est quasi-polynomiale si et seulement si il existe un entier $m \in \mathbb{N}^*$ et m polynômes $P_0, \dots, P_m \in \mathbb{C}[X]$ tels que pour tout $j \in \llbracket 0; m-1 \rrbracket$ on ait : $\forall n \in \mathbb{Z}$, $n \equiv j[m] \implies P(n) = P_j(n)$.

VII.13.1 Série génératrice d'une fonction quasi-polynomiale

Soit P une fonction quasi-polynomiale. Montrer que le rayon de convergence de la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} P(n)x^n$ est supérieur ou égal à 1.

VII.13.2 Partitions d'un entier

Soient $k \geq 2$ un entier et $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{N}^*$ que l'on suppose premier entre eux dans leur ensemble. On définit une fonction $P : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$ en posant pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$P(n) = \text{Card} \left(\left\{ (n_1, \dots, n_k) \in \mathbb{N}^k, \sum_{i=1}^k a_i x_i = n \right\} \right)$$

On définit ensuite la série entière $F(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(n)x^n$.

1. Montrer que le rayon de convergence de F est supérieur ou égal à 1.

2. Prouver l'égalité $F(x) = \prod_{i=1}^k \frac{1}{1 - x^{a_i}}$ pour $x \in]-1, 1[$.

3. Soient ω une racine de l'unité et $p \in \mathbb{N}^*$. On note $f : x \mapsto \frac{1}{(1 - \omega x)^p}$ et $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} R(n)x^n$ son développement en série entière. Montrer que R est une fonction quasi-polynomiale, puis déterminer son degré et son coefficient dominant.

4. En déduire que P est quasi-polynomiale et déterminer son coefficient dominant.

VII.14 Théorème de réalisation de Borel

[\[Corrigé\]](#)

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite complexe quelconque.

Soit $\varphi : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ une application de classe \mathcal{C}^∞ telle que $\varphi(x) = 1$ pour $x \in [-1, 1]$ et $\varphi(x) = 0$ pour $|x| \geq 2$. On pose $\varphi_n = x^n \varphi(x)$, on note M_n un majorant de $|\varphi'|, |\varphi''|, \dots, |\varphi^{(n-1)}|$ sur \mathbb{R} , et on choisit une suite réelle $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifiant $\lambda_n \geq 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, tendant vers $+\infty$, et telle que $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{|a_n| M_n}{\lambda_n}$ converge.

Montrer que la fonction $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \varphi(\lambda_n x)$ est bien définie, de classe C^∞ sur \mathbb{R} et

vérifie $\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = a_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Remarque : On vient de montrer que pour suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de nombres complexes, il existe une fonction $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{C}$ de classe \mathcal{C}^∞ telle que, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}(0) = a_n$.

VII.15 Série de Lambert

[Corrigé]

Soient $\alpha \in \mathbb{N}^*$ et $x \in [0, 1[$.

1. Montrer que la série $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{n^\alpha x^n}{1 - x^n}$ converge.
2. Donner un équivalent, lorsque $x \rightarrow 1^-$, de sa somme $\varphi(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^\alpha x^n}{1 - x^n}$ sous la forme de la somme d'une série double.
Indication : On pourra considérer le développement en série entière de $\frac{\varphi(x)}{1 - x}$.

VII.16 Somme de Goldbach

[Corrigé]

Soit $R = \{m^n, (m, n) \in \llbracket 2; +\infty \rrbracket^2\}$. Calculer la somme :

$$\sum_{r \in R} \frac{1}{r - 1}$$

VII.17 Une somme avec l'indicatrice d'Euler

[Corrigé]

On note φ l'indicatrice d'Euler et on fixe $a > 1$. Calculer la somme :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\varphi(n)}{a^n - 1}$$

VII.18 Coefficients définies par des intégrales

[Corrigé]

On note $a_n = \int_0^1 \frac{dt}{(2 + t^2)^{n+1}}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

1. Donner le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n x^n$.
2. Calculer la somme de cette série entière sur son domaine de convergence.

VII.19 Détermination des coefficients d'un développement en série entière

[Corrigé]

Soit $f : x \in]-1, 1[\mapsto \frac{\arcsin(x)}{\sqrt{1-x^2}}$

1. Justifier que f est développable en série entière.
2. Montrer que f vérifie une équation différentielle d'ordre un.
3. En déduire le développement en série entière.

En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{2k+1} \binom{2k}{k} \binom{2n-2k}{n-k} = \frac{2^n (n!)^2}{(2n+1)!}$$

VII.20 Série génératrice du nombre de points à coordonnées entières dans un quart de disque

[Corrigé]

On note $p_n = \text{Card}\{(a, b) \in \mathbb{N}^2 \mid a^2 + b^2 \leq n\}$

1. Déterminer le rayon de convergence R de la série entière $\sum_{n \in \mathbb{N}} p_n x^n$.
2. Démontrer que $\forall x \in]-R, R[$,
$$\sum_{n=0}^{+\infty} p_n x^n = \frac{1}{1-x} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} x^{n^2} \right)^2.$$

VII.20.1 Nombres de points à coordonnées entières dans un disque

On munit \mathbb{R}^2 de sa norme euclidienne canonique $\|\cdot\|$. Pour $x \in \mathbb{R}_+$ on définit les ensembles $C(x) = \{u \in \mathbb{Z}^2, \|u\| \leq x\}$ et $C_+(x) = C(x) \cap \mathbb{N}^2$.

1. Ecrire un programme python qui calcule $N_+(x)$.
2. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}_+, 4N_+(x) - N(x) - 4[x] = 3$.
3. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, N_+(n) = \sum_{k=0}^n \left\lfloor \sqrt{n^2 - k^2} \right\rfloor + 1$.
4. Déterminer un équivalent de $N(x)$ lorsque $x \rightarrow +\infty$.

VII.20.2 Prolongement du problème

1. Dédire de VII.20 et VII.20.1 un équivalent en 1^- de $\sum_{n=0}^{+\infty} x^{n^2}$.

2. Montrer à l'aide d'une comparaison série intégrale que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} x^{n^2} \underset{x \rightarrow 1^-}{\sim} \frac{1}{\sqrt{x-1}} \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$$

3. En déduire la valeur de l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt$.

VII.21 Nombre d'involution

[Corrigé]

On rappelle qu'une involution d'un ensemble E est une application $f : E \mapsto E$ telle que $f \circ f = \text{Id}_E$. On note I_n le nombre d'involution de $\llbracket 1; n \rrbracket$. On convient que $I_0 = 1$.

- Montrer que pour tout entier $n \geq 2$, $I_n = I_{n-1} + (n-1)I_{n-2}$
- Montrer que le rayon de convergence de la série entière $\sum \frac{I_n}{n!} x^n$ est supérieur ou égal à
 - On note $S(x)$ sa somme.
- Montrer que : $\forall x \in]-1, 1[, S'(x) = (1+x)S(x)$
- En déduire une expression de $S(x)$ puis de I_n .

VII.22 Théorème d'Abel

[Corrigé]

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R \geq 1$ et de somme f . On note pour $\theta_0 \in [0, \frac{\pi}{2}[$,

$$\Delta_{\theta_0} = \{z \in \mathbb{C}; |z| < 1 \text{ et } \exists \rho > 0, \exists \theta \in [-\theta_0, \theta_0], z = 1 - \rho e^{i\theta}\}$$

1. Démontrer (Abel) pour $R > 1$.

A partir de maintenant, on suppose que $R = 1$ et que $\sum a_n$ converge, et on se donne un $\theta_0 \in [0, \frac{\pi}{2}[$

2. Démontrer que pour tous $N \in \mathbb{N}^*$ et $z \in \mathbb{C}, |z| < 1$, on a :

$$\sum_{n=0}^N a_n z^n - S_N = (z-1) \sum_{n=0}^{N-1} R_n z^n - R_N (z^N - 1)$$

3. En déduire que pour tout $z \in \mathbb{C}, |z| < 1$, on a :

$$f(z) - S = (z-1) \sum_{n=0}^{+\infty} R_n z^n$$

4. Soit $\varepsilon > 0$. Démontrer qu'il existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $z \in \mathbb{C}, |z| < 1$:

$$|f(z) - S| \leq |z - 1| \sum_{n=0}^{N_0} |R_n| + \varepsilon \frac{|z - 1|}{1 - |z|}$$

5. Démontrer qu'il existe $\rho(\theta) > 0$ tel que pour tout $z \in \Delta_{\theta_0}$ de la forme $z = 1 - \rho e^{i\theta}$ avec $0 < \rho \leq \rho(\theta_0)$, on a :

$$\frac{|z - 1|}{1 - |z|} \leq \frac{2}{\cos(\theta_0)}$$

6. En déduire le théorème d'Abel.

Application : Démontrer que $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1} = \frac{\pi}{4}$ et $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln(2)$

VII.23 Théorèmes taubériens d'Abel

[\[Corrigé\]](#)

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_n = \sum_{k=0}^n a_k$.

Si la série est convergente, on note S sa somme définie par : $S = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$

et (R_n) la suite des restes définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, R_n = S - S_n$

On s'intéresse aux réciproques partielles du théorème d'Abel.

Exhiber une série entière $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$ de rayon de convergence 1 et de somme f telle que

$f(z)$ converge quand $z \xrightarrow[|z|<1]{} 1$ et telle que la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ ne converge pas.

VII.23.1 Cas des séries à coefficients positifs

Démontrer que :

$$\left(\lim_{\substack{x \rightarrow 1^- \\ x \in \mathbb{R}}} f(x) = S \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, a_n \geq 0 \right) \implies \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n \text{ converge et } \sum_{n=0}^{+\infty} a_n = S \right)$$

VII.23.2 Théorème taubérien faible

Soit $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence 1 et de somme f . Soit $S \in \mathbb{C}$.

Le but de cette question est de démontrer que :

$$\left(\lim_{\substack{x \rightarrow 1^- \\ x \in \mathbb{R}}} f(x) = S \text{ et } a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \implies \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n \text{ converge et } \sum_{n=0}^{+\infty} a_n = S \right)$$

On suppose que $\lim_{\substack{x \rightarrow 1^- \\ x \in \mathbb{R}}} f(x) = S$ et que $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{n}\right)$.

1. Démontrer que pour tous $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in]0, 1[$, on a :

$$|S_n - f(x)| \leq (1-x) \sum_{k=1}^n k|a_k| + \frac{\sup_{k>n} (k|a_k|)}{n(1-x)}$$

2. En déduire le théorème taubérien faible. On pourra poser $x = x_n = 1 - \frac{1}{n}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

VII.23.3 Théorème taubérien fort

Soit $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence 1 et de somme f . Soit $S \in \mathbb{C}$.

Le but de cette question est de démontrer que :

$$\left(\lim_{\substack{x \rightarrow 1^- \\ x \in \mathbb{R}}} f(x) = S \text{ et } a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \implies \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n \text{ converge et } \sum_{n=0}^{+\infty} a_n = S \right)$$

1. Démontrer que, sans perte de généralité, on peut supposer que $S = 0$.

On suppose désormais que $\lim_{\substack{x \rightarrow 1^- \\ x \in \mathbb{R}}} f(x) = 0$ et que $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{n}\right)$.

2. On définit Θ de la manière suivante :

$$\Theta = \left\{ \theta : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} ; \forall x \in [0, 1] ; \sum_{n \geq 0} a_n \theta(x^n) \text{ converge et } \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n \theta(x_n) = 0 \right\}$$

Démontrer que Θ est un espace vectoriel sur \mathbb{R} .

3. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P(0) = 0$. Démontrer que $P \in \Theta$.

4. Démontrer que :

$$\forall P \in \mathbb{R}[X], \lim_{\substack{x \rightarrow 1^- \\ x \in \mathbb{R}}} (1-x) \sum_{n=0}^{+\infty} x^n P(x^n) = \int_0^1 P(t) dt$$

On définit la fonction $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par : $g(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

5. Démontrer que pour établir le théorème taubérien fort, il suffit de démontrer que $g \in \Theta$.

6. Soit

$$h(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x = 0, \\ \frac{g(x)-x}{x(1-x)} & \text{si } x \in]0, 1[, \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

Etant donné $\varepsilon > 0$, démontrer qu'il existe $s_1, s_2 \in \mathcal{C}^0([0, 1])$ vérifiant :

$$s_1 \leq h \leq s_2 \text{ et } \int_0^1 (s_2(t) - s_1(t)) dt \leq \varepsilon$$

Représenter graphiquement h et deux telles fonctions s_1, s_2 .

A partir de maintenant, $\varepsilon > 0$, s_1 et s_2 sont fixés.

7. Démontrer qu'il existe $T_1, T_2 \in \mathbb{R}[X]$ tels que :

$$\sup_{x \in [0, 1]} |T_1(x) - s_1(x)| \leq \varepsilon \quad \text{et} \quad \sup_{x \in [0, 1]} |T_2(x) - s_2(x)|$$

On pose, pour tout $x \in [0, 1]$,

$$P_1(x) = x + x(1-x)(T_1(x) - \varepsilon), \quad P_2(x) = x + x(1-x)(T_2(x) - \varepsilon), \quad \text{et} \quad Q(x) = \frac{P_2(x) - P_1(x)}{x(1-x)}$$

$$8. \quad P_1(0) = P_2(0) = 0, \quad P_1(1) = P_2(1) = 0, \quad P_1 \leq g \leq P_2 \quad \text{et} \quad 0 \leq \int_0^1 Q(x) dx \leq 5\varepsilon.$$

9. Démontrer qu'il existe $M > 0$ tel que pour tout $x \in]0, 1[$,

$$\left| \sum_{n=0}^{+\infty} a_n g(x^n) - \sum_{n=0}^{+\infty} a_n P_1(x^n) \right| \leq M(1-x) \sum_{n=0}^{+\infty} x^n Q(x^n)$$

10. Conclure.

VIII

Topologie

VIII.1 Normes d'opérateur

[\[Corrigé\]](#)

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.

1. On suppose que $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$ et $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ sont munis de leurs normes uniformes respectives.
Montrer que :

$$||| A |||_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^p |A_{i,j}|$$

2. On suppose que $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$ et $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ sont munis de leurs normes 1 respectives.
Montrer que :

$$||| A |||_1 = \max_{1 \leq j \leq p} \sum_{i=1}^n |A_{i,j}|$$

3. On suppose que $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$ et $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ sont munis de leurs normes 2 respectives.
Montrer que :

$$||| A |||_2 = \sqrt{\max \text{Sp}(A^{\top} A)}$$

VIII.2 \mathbb{Z} est fermé ★

[\[Corrigé\]](#)

Montrer que \mathbb{Z} est fermé.

VIII.3 Orthogonalité et topologie

[Corrigé]

Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace préhilbertien réel E que l'on munit de sa norme euclidienne.

1. Montrer que pour tout $y \in E$, $\varphi_y : x \in E \mapsto \langle x, y \rangle$ est continue.
2. Montrer que F^\perp est un fermé dans E .
3. Montrer que de manière général, $\overline{F} \subset (F^\perp)^\perp$

VIII.4 Ensemble des valeurs d'adhérence d'une suite

[Corrigé]

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à valeurs dans un espace vectoriel normé E . On note V l'ensemble des valeurs d'adhérence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Montrer que $V = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{\{u_k, k \geq n\}}$ et en déduire que V est fermé.

VIII.4.1 Valeur d'adhérence du cercle unité

[Corrigé]

1. Soit $z \in \mathbb{U}$. Montrer que 1 est une valeur d'adhérence de la suite $(z^n)_{n \in \mathbb{N}}$.

2. Soit $\begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_m \end{pmatrix} \in \mathbb{U}^m$. Montrer que $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ est une valeur d'adhérence de la suite $\begin{pmatrix} z_1^n \\ \vdots \\ z_m^n \end{pmatrix}_{n \in \mathbb{N}}$.

3. Que peut-on dire de complexes a_1, \dots, a_n tels que $\sum_{k=1}^n a_k^m$ converge pour $m \rightarrow \infty$?

VIII.5 Ensemble des suites convergentes

[Corrigé]

On note ℓ^∞ l'ensemble des suites bornées de $\mathbb{K}^\mathbb{N}$ que l'on munit de la norme $\|\cdot\|_\infty$.

1. Montrer que l'ensemble des suites convergeant vers 0 est un fermé de ℓ^∞ .
2. Montrer que l'ensemble des suites convergentes est un fermé de ℓ^∞ .

VIII.6 Partie ouverte et fermée simultanément

[Corrigé]

Montrer que les seules parties à la fois ouvertes et fermées d'un espace vectoriel normé E sont \emptyset et E .

VIII.7 Opérations sur les adhérences/intérieurs

[Corrigé]

Soit E un espace vectoriel normé et soit A, B deux parties de E .

1. Montrer que $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ et $\overset{\circ}{A \cap B} = \overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}$.
2. Montrer que $\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$ et $\overset{\circ}{A} \cup \overset{\circ}{B} \subset \overset{\circ}{A \cup B}$.
Montrer qu'il n'y a pas égalité en général.

VIII.8 Les sept espaces de Kuratowski

[Corrigé]

Trouver une partie A de \mathbb{R} telles que les sept ensembles suivants soient tous distincts :

$$A, \overset{\circ}{A}, \overline{A}, \overset{\circ}{\overline{A}}, \overline{\overset{\circ}{A}}, \overline{\overline{\overset{\circ}{A}}}, \overline{\overline{\overline{\overset{\circ}{A}}}}$$

VIII.9 Intérieur d'un sev

[Corrigé]

Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel normé E .

1. Montrer que si F est ouvert, alors $F = E$.
2. Montrer que si $F \neq E$, alors $\overset{\circ}{F} = \emptyset$.

VIII.10 Adhérence d'un sev

[Corrigé]

Soit E un espace vectoriel normée.

1. Soit F un sous-espace vectoriel de E . Montrer que \overline{F} est encore un sous-espace vectoriel.
2. Soit F un sous-espace vectoriel de dimension finie de E . Montrer que F est fermé dans E .
3. Soit H un hyperplan de E . Montrer que H est fermé ou dense dans E .

VIII.11 Graphe fermé

[Corrigé]

Soit f une fonction réelle. On note $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, y = f(x)\}$ le graphe de f .

1. Montrer que si f est continue alors G est fermé.
2. Montrer que si f est bornée et G est fermé alors f est continue.
3. Montrer que ce n'est plus vrai si on ne suppose plus f bornée.

VIII.12 Application linéaire continue

[Corrigé]

On considère les espaces vectoriels normés $E = (\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$ et $F = (\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R}), \|\cdot\|_1)$ avec $\forall f \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$:

$$\|f\|_\infty = \sup_{[0,1]} f \quad \text{et} \quad \|f\|_1 = \int_0^1 |f|$$

1. Trouver une forme linéaire continue sur F et pas sur E .
2. Peut-on trouver une forme linéaire continue sur E et pas sur F ?

VIII.13 Application linéaire non continue

[Corrigé]

On note $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Existe-il une application linéaire sur E continue pour aucune norme ?

VIII.14 Polynômes réels de degré n scindés à racines simples sur \mathbb{R} ★★☆☆

[Corrigé]

On note A l'ensemble des polynômes à coefficients réels de degré n scindé à racines simples sur \mathbb{R} .

1. Montrer que A est ouvert dans $\mathbb{R}_n[X]$.
2. Déterminer l'adhérence de A .

VIII.15 Lemme de Riemann-Lebesgue ★★★

[Corrigé]

On considère un segment $[a, b]$ de \mathbb{R} , $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé de dimension finie

et $\phi : [a, b] \rightarrow E$.

Démontrer que $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b e^{i\lambda t} \phi(t) dt = 0$ quand

- ϕ est une fonction en escalier sur $[a, b]$;
- ϕ est une fonction continue par morceaux sur $[a, b]$;
- ϕ est une fonction continue par morceaux et intégrable sur \mathbb{R} avec $a = -\infty$ et $b = +\infty$.

VIII.16 Borel-Lebesgue

[\[Corrigé\]](#)

Soit E un espace vectoriel normé dont on note \mathcal{T} l'ensemble des ouverts. On dit qu'une partie K de E est compacte au sens de Borel-Lebesgue lorsque :

$$\forall (O_i)_{i \in I} \subset \mathcal{T}, K \subset \bigcup_{i \in I} O_i \implies \exists p \in \mathbb{N}, \exists i_1, \dots, i_p \in I, K \subset \bigcup_{j=1}^p O_{i_j}$$

Autrement dit, de tout recouvrement de K composé d'ouverts, on peut extraire un sous-recouvrement fini.

Montrer qu'une partie de E est compacte au sens de Borel-Lebesgue si et seulement si elle l'est au sens de Bolzano-Weierstrass (définition par l'existence d'une valeur d'adhérence).

VIII.17 Parties compactes d'un espace vectoriel normé de dimension finie

[\[Corrigé\]](#)

Soit E un \mathbb{K} -espace vectoriel normé.

1. Montrer que les parties compactes de E sont fermées.
2. Montrer qu'une partie fermée de E incluse dans une partie compacte est compacte.
3. Montrer qu'un produit cartésien d'un nombre fini de compact de E est compact de E .
4. Justifier que les segments de \mathbb{R} sont compacts.
5. On suppose que E est de dimension finie. Démontrer que les parties compactes de E sont exactement les parties fermées bornées de E .

VIII.18 Somme de sous-espaces

[\[Corrigé\]](#)

1. Montrer que la somme de deux compacts est compacte.
2. Montrer que la somme d'un compact et d'un fermé est fermé.
3. Que peut-on dire de la somme de deux fermés ?

VIII.19 Un théorème du point fixe

[\[Corrigé\]](#)

Soit K un compact d'un espace vectoriel. Soit $f : K \rightarrow K$ une application vérifiant

$$\forall x, y \in K, x \neq y \implies \|f(x) - f(y)\| < \|x - y\|$$

1. Montrer que f admet un unique point fixe a .
2. Soit $x_0 \in K$. Montrer que la suite des itérés $(f^n(x_0))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers a .
3. Donner un contre-exemple en ne supposant plus K compact.

VIII.20 Théorème de Heine

[\[Corrigé\]](#)

Démontrer qu'une fonction continue sur un compact est uniformément continue sur ce compact.

VIII.21 Lemme des compacts emboîtés ★

[\[Corrigé\]](#)

Soient E un espace vectoriel normé et $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite décroissante de compacts non vides de E .

Montrer que $K = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n$ est non vide.

VIII.22 Théorème de Baire ★★★★★ (HP)

[\[Corrigé\]](#)

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace de Banach, c'est à dire un espace vectoriel normé complet, ou encore dans lequel toute suite de Cauchy V.1 converge.

1. Démontrer qu'une intersection dénombrable d'ouverts denses dans E est dense dans E .
2. Montrer que cette propriété est équivalente à ce qu'une réunion dénombrable de fermés d'intérieurs vides soit d'intérieur vide.

VIII.22.1 \mathbb{R} n'est pas dénombrable ★★ (HP)

Démontrer, à l'aide du théorème de Baire, que \mathbb{R} n'est pas dénombrable.

VIII.22.2 Base d'un espace de Banach ★★★ (HP)

Montrer qu'un espace de Banach ne peut pas admettre de base dénombrable.

VIII.22.3 Densité des fonctions nulle part dérivables (2) ★★★★★ (HP)

On souhaite montrer que l'ensemble A des fonctions continues mais nulle part dérivables sur $[0, 1]$ est dense dans l'ensemble E des fonctions continues sur $[0, 1]$ pour la norme uniforme. Pour cela on pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $F_n = \{f \in E, \exists x \in I, \forall y \in I, |f(x) - f(y)| \leq n|x - y|\}$.

1. Montrer que $A^c \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$.
2. Montrer que les F_n sont fermés.
3. Soient $f \in F_n$ et $\varepsilon > 0$.

Pour $N \in \mathbb{N}^*$ et on pose g_N la fonction périodique, de période $\frac{1}{N}$ défini par :

$$g_N(x) = \begin{cases} \frac{\varepsilon N}{2}x & \text{si } x \in [0, \frac{1}{2N}] \\ \frac{\varepsilon}{2} - \frac{\varepsilon N}{2}x & \text{si } x \in]\frac{1}{2N}, \frac{1}{N}] \end{cases}$$

Montrer que pour une fonction P et un certain N bien choisis la fonction $g = P + g_N$ appartient à $F_n^c \cap B(f, \varepsilon)$.

4. Conclure.

VIII.22.4 Caractérisation des endomorphismes nilpotents d'un espace de Banach ★★ (HP)

1. Soit E un espace de Banach. Soit $f \in \mathcal{L}_c(E)$ tel que,

$$\forall x \in E, \exists n_x \in \mathbb{N}^*, f^{n_x}(x) = 0$$

Montrer que f est nilpotent.

2. Donner un contre exemple dans $\mathbb{R}[X]$.

VIII.22.5 Caractérisation des polynômes réels ★★★★★ (HP)

Soit $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, f^{(n)}(x) = 0$. Le but de cet exercice est de montrer que f est polynomiale. On note pour $n \in \mathbb{N}$, $F_n = \{x \in \mathbb{R}, f^{(n)}(x) = 0\}$. On note

aussi $\Omega = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \overset{\circ}{F}_n$ et $\Phi = \mathbb{R} \setminus \Omega$. Enfin, on suppose que Φ n'est pas vide. On admettra que \mathbb{R} est complet (cf. V.1).

1. Montrer qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\overset{\circ}{F}_N \neq \emptyset$.
2. Soit I un intervalle ouvert non vide de F_N .
 - a. Soit $x \in I$. Montrer que $\forall k \geq N$, $x \in F_k$.
 - b. En déduire que f est polynomiale sur I .
3. Soit J une composante connexe par arcs de Ω et $x_0 \in J$.
 - a. Montrer l'existence d'un intervalle ouvert et non vide I et d'un polynôme P tels que :

$$\exists n \in \mathbb{N}, I \subset F_n \wedge \forall y \in I, f(y) = P(y)$$

On pose dans la suite $A = \{x \geq x_0 \mid \forall y \in [x_0, x], f(y) = P(y)\}$.

- b. Justifier que A est un sous-ensemble non vide de $\overset{\circ}{J}$. On note s sa borne supérieure.
- c. Montrer par l'absurde que $s \notin \Omega$ et en déduire que $s = \sup J$.
- d. En déduire que f est polynomiale sur $\overset{\circ}{J}$.
4. a. On dit qu'un point de $x \in \Phi$ est *isolé* lorsque, $\exists \varepsilon > 0$, $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\cap \Phi = \{x\}$.
Montrer que Φ n'a pas de point isolé.
- b. Montrer que Φ est complet.
- c. En déduire que l'on peut trouver un intervalle I ouvert qui vérifie :

$$(\exists n_0 \in \mathbb{N}, I \cap \Phi \subset F_{n_0}) \wedge I \cap \Phi \neq \emptyset$$

On pourra commencer par écrire $\Phi = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (\Phi \cap F_n)$.

- d. On se donne $x \in I \cap \Phi$. Montrer qu'il existe une suite de $I \cap \Phi$ qui converge, puis justifier que cette suite peut être prise croissante.
- e. Montrer que $\forall n \geq n_0$, $x \in F_n$.
- f. Soit $J = [u, v]$ une composante connexe par arcs de $I \cap \Omega$. Montrer que $u \in I \cap \Phi$ ou $v \in I \cap \Phi$ et en déduire que $J \subset F_{n_0}$.
- g. En déduire que $I \subset \Omega$.
5. Conclure.

VIII.23 Volume d'une (hyper)boule ★★ ★ (HP)

[\[Corrigé\]](#)

Soit $R \in \mathbb{R}_+^*$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $\mathcal{B}_n(R) = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \leq R^2\}$

1. Calculer le volume de $\mathcal{B}_n(R)$: $V_n(R) = \int \dots \int_{(x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{B}_n(R)} dx_1 \dots dx_n$.
2. Déterminer la limite de $V_n(R)$. Quelle interprétation peut-on en faire ? Est-ce surprenant ?

VIII.24 Partie fermée bornée non compacte ★★ ★

[\[Corrigé\]](#)

Donner un exemple de partie fermée bornée non compacte d'un espace vectoriel normé.

VIII.25 Théorème de compacité de Riesz ★★ ★★ ★

[\[Corrigé\]](#)

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un K -espace vectoriel normé.

1. Soit F un sous-espace vectoriel fermé de E tel que $F \neq E$.
 - a. Soit $x \in E \setminus F$. Justifier que $\delta = d(x, F) > 0$.
 - b. Justifier qu'il existe $v \in F$ tel que $0 < \|x - v\| \leq 2\delta$.
 - c. On pose $u = \frac{x - v}{\|x - v\|}$. Justifier que $d(u, F) \geq \frac{1}{2}$.
2. On note B la boule unité fermée de E i.e. $B = \{x \in E, \|x\| \leq 1\}$. Montrer que si E n'est pas de dimension finie, alors B n'est pas compacte.

VIII.26 Sphère et boule unité ★★ ★★ ★

[\[Corrigé\]](#)

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. On note B la boule unité fermée de E et S la sphère unité de E .

Montrer que B est compacte si et seulement si S est compacte.

VIII.27 Principe du maximum pour les polynômes

[\[Corrigé\]](#)

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$. On note $B = \{z \in \mathbb{C}, |z| \leq 1\}$ et $S = \{z \in \mathbb{C}, |z| = 1\}$.

Montrer que $\max_{z \in B} |P(z)| = \max_{z \in S} |P(z)|$.

VIII.28 Applications 1-lipschitzienne surjective sur un compact

[\[Corrigé\]](#)

Soient E un espace vectoriel normé, K un compact de E et $g : K \rightarrow K$ une application 1-lipschitzienne. On cherche à montrer que g est surjective si et seulement si c'est une isométrie (i.e. $\forall x, y \in E, \|g(x) - g(y)\| = \|x - y\|$).

1. On suppose g surjective. On considère $x, y \in K$ ainsi que x_n, y_n des antécédents par g^n de x et y respectivement. On note (x', y') une valeur d'adhérence de $(x_n, y_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Montrer que $x - y$ est une valeur d'adhérence de $(g^n(x') - g^n(y'))_{n \in \mathbb{N}}$.
2. Montrer que $\|g^n(x') - g^n(y')\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \|x - y\|$. En déduire que g est une isométrie de E .
3. On suppose maintenant que g est une isométrie de E . Montrer que g est surjective. Donner un contre-exemple lorsque K est seulement borné.

VIII.29 Une isométrie conserve les milieux

[Corrigé]

Soit E un \mathbb{R} -espace vectoriel normé de dimension finie.

1. Pour K un compact non vide on pose $\delta(K) = \sup_{(x,y) \in K^2} \|x - y\|$. Montrer que $\delta(K)$ est bien défini. La borne supérieure est-elle atteinte?
2. Pour $a \in E$, on note \mathcal{S}_a l'ensemble des compacts K de E symétriques par rapport à a (i.e $\forall x \in K, 2a - x \in K$).
Pour $B \subset E$ compacte, on pose

$$T(B) = \left\{ x \in B \mid \forall y \in B, \|x - y\| \leq \frac{1}{2} \delta(K) \right\}$$

Montrer que T induit une application de \mathcal{S}_a dans \mathcal{S}_a .

3. Soit $B_0 \in \mathcal{S}_a$. On pose pour $n \in \mathbb{N}$, $B_{n+1} = T(B_n)$. Déterminer $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n$.
4. En déduire que toute isométrie de E conserve les milieux.
Remarque : une isométrie de E est une application $u : E \rightarrow E$ telle que $\forall (x, y) \in E^2, \|u(x) - u(y)\| = \|x - y\|$.

VIII.30 Fonctions coercives

[Corrigé]

Soient $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé de dimension finie et $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ continue.

Montrer que $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ si et seulement si l'image réciproque par f de tout compact de \mathbb{R} est un compact de E .

VIII.31 Homéomorphisme de compacts

[Corrigé]

Soient E et F deux espaces vectoriels normés, K un compact de E et L une partie de F . Soit $f : K \rightarrow L$ bijective et continue. Montrer que f^{-1} est continue.

VIII.32 Distance à un fermé

[Corrigé]

Soient X une partie fermée, non vide d'un espace vectoriel normé $(E, \|\cdot\|)$ et $a \in E$. Montrer que la distance de a à X , $d(a, X) = \inf_{x \in X} \|a - x\|$ est atteinte.

VIII.33 Diamètre et frontière

[Corrigé]

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. Pour A une partie bornée de E on définit le *diamètre* de A : $\delta(A) = \sup_{(x,y) \in A^2} \|x - y\|$.

Montrer que pour toute partie bornée A de E on a :

$$\delta(A) = \delta(\text{Fr}(A))$$

VIII.34 Frontière

[Corrigé]

Soient E un espace vectoriel normé et F une partie fermée de E .

Montrer que $\text{Fr}(\text{Fr}(F)) = \text{Fr}(F)$.

VIII.35 Projeté sur un convexe compact

[Corrigé]

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien. Soient H une partie convexe et compacte de E et soit $x \in E$. On note

$$d(x, H) = \inf_{h \in H} \|x - h\|.$$

Soient $h, h' \in H$. On pose $q : t \in [0, 1] \mapsto \|x - th - (1 - t)h'\|^2$.

1. Montrer qu'il existe un unique élément $h_0 \in H$ tel que $d(x, H) = \|x - h_0\|$.
2. Montrer que h_0 est caractérisé par la condition : $\forall y \in H, \langle x - h_0, y - h_0 \rangle \leq 0$.

Le vecteur h_0 est appelé projeté de x sur H .

VIII.36 Convexité de l'adhérence et de l'intérieur

[Corrigé]

Soit A une partie convexe d'un espace vectoriel normé E . Montrer que \overline{A} et $\overset{\circ}{A}$ sont convexes.

VIII.37 Fonctions positivement homogènes

[Corrigé]

Soit E un \mathbb{R} -espace vectoriel. Une application $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ est dite positivement homogène de degré α (avec $\alpha > 0$) quand :

$$\forall x \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}_+, f(\lambda x) = \lambda^\alpha f(x)$$

On appelle semi-norme sur E une application $N : E \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ qui vérifie les axiomes définissant une norme hormis la séparation. On s'intéresse ici aux fonctions positivement homogènes de degré 1.

1. Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction homogène de degré 1.
 - (a) Montrer que f est convexe si et seulement si $\forall (x, y) \in E^2, f(x + y) \leq f(x) + f(y)$
 - (b) Si f est à valeurs positives, montrer que f est convexe sur E si et seulement si l'ensemble $C = \{x \in E | f(x) \leq 1\}$ est convexe.
 - (c) Si f est convexe, à valeurs positives et paire, montrer que f est une semi norme.
 - (d) On suppose ici que E est de dimension finie. Soit Ω un ouvert borné non vide de E . Montrer qu'il existe une norme N sur E telle que $\Omega = B_N(0, 1) = \{x \in E, N(x) < 1\}$ si et seulement si Ω est convexe et admet 0 comme centre de symétrie.
2. (Etude de normes particulières) Soit un réel $\alpha \geq 1$. Montrer, sans utiliser l'inégalité de Minkowski, que l'application

$$N_\alpha : \begin{cases} \mathbb{R}^n & \longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ (x_1, \dots, x_n) & \longmapsto (|x_1|^\alpha + \dots + |x_n|^\alpha) \end{cases}$$

définit une norme sur \mathbb{R}^n .

VIII.38 Enveloppe convexe

[Corrigé]

Soit E un espace euclidien.

1. Montrer que si A et B sont deux parties convexes de E alors $A \cap B$ est une partie convexe de E .
 Pour $A \subset E$, on définit l'enveloppe convexe de A , $\text{Conv}(A)$, comme la plus petite partie convexe de E contenant A , c'est à dire l'intersection de tous les convexes de E contenant A .
2. On dit que $x \in E$ est combinaison convexe de $x_1, \dots, x_p \in E$ lorsqu'il existe des réels positifs $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ tels que $x = \sum_{k=1}^p \lambda_k x_k$ et $\sum_{k=1}^p \lambda_k = 1$.
 Montrer que $\text{Conv}(A)$ est constitué des combinaisons convexes d'éléments de A .

VIII.39 Théorème de Carathéodory

[Corrigé]

Soit E un espace vectoriel de dimension n . Soit $A \subset E$. On souhaite montrer que l'enveloppe convexe de A (VIII.38) est constitué des combinaisons convexes d'au plus $n + 1$ éléments de A .

Soit $x = \sum_{k=1}^p \lambda_k x_k$ une combinaison convexe de $x_1, \dots, x_p \in A$ avec $p \geq n + 2$.

1. En considérant la famille $(x_2 - x_1, \dots, x_p - x_1)$, montrer qu'il existe p réels non tous nuls μ_1, \dots, μ_p tels que

$$\sum_{k=1}^p \mu_k x_k = 0 \text{ et } \sum_{k=1}^p \mu_k = 0$$

2. Conclure.

Corollaire : Montrer que l'enveloppe convexe d'une partie compacte est compacte.

VIII.40 Théorème de Krein-Milman

[Corrigé]

Soit E un espace euclidien.

Pour C une partie convexe de E on dit que $x \in C$ est un point extrémal de C si $C \setminus \{x\}$ est convexe, autrement dit, si x appartient à un segment de C alors x est une borne du segment : $x \in [a, b] \subset C \implies (x = a \text{ ou } x = b)$. On note $\text{Ext}(C)$ l'ensemble des points extrémaux de C .

Soit C un convexe compact de E .

On pourra librement utiliser dans cet exercice le théorème de projection sur un convexe compact VIII.35.

1. Soit $x \in \text{Fr}(C)$. Montrer qu'il existe une forme linéaire non nulle φ et $a \in E$ tels que $C \subset \varphi^{-1}(]-\infty, a])$. On note $H = \varphi^{-1}(a)$.
2. Montrer que $\text{Ext}(C) \cap H = \text{Ext}(C \cap H)$.
3. Montrer que $C = \text{Conv}(\text{Ext}(C))$.

VIII.41 Epigraphe

[Corrigé]

Soit f une fonction réelle. On note $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, y \geq f(x)\}$ l'épigraphe de f . Montrer que f est convexe si et seulement si E est convexe.

VIII.42 Partie convexe dense de \mathbb{R}^n

[\[Corrigé\]](#)

Soit A une partie convexe et dense de \mathbb{R}^n . Montrer que $A = \mathbb{R}^n$.

VIII.43 Complémentaire d'un hyperplan

[\[Corrigé\]](#)

Soit H un hyperplan d'un \mathbb{R} -espace vectoriel de dimension finie E .

Montrer que $E \setminus H$ n'est pas connexe par arcs. Quelles sont ses composantes connexes par arcs ?

VIII.44 Composantes connexes par arcs du complémentaire de la réunion de plusieurs hyperplans

[\[Corrigé\]](#)

Soit $r \in \mathbb{N}^*$

- Soit (f_1, \dots, f_r) une famille libre de $(\mathbb{R}^n)^*$. Quel est le nombre de composantes connexes par arcs de $\mathbb{R}^n \setminus \bigcup_{i=1}^r \ker f_i$?
 - Même question en remplaçant \mathbb{R} par \mathbb{C} .
- Soient H_1, \dots, H_r des hyperplans affines de \mathbb{R}^n . Quel est le nombre maximal de composantes connexes par arcs de $\mathbb{R}^n \setminus \bigcup_{i=1}^r H_i$?

VIII.45 Sphères d'un \mathbb{R} -espace vectoriel

[\[Corrigé\]](#)

Soit E un \mathbb{R} -espace vectoriel de dimension supérieure ou égale à 2.

- Montrer que la sphère unité S de E est connexe par arcs.
- En déduire que toutes les sphères de E sont connexes par arcs.

VIII.46 Théorème du passage à la douane

[\[Corrigé\]](#)

Soit E un \mathbb{R} -espace vectoriel normé, montrer que toute partie connexe par arcs qui rencontre une partie A et son complémentaire rencontre forcément la frontière de A .

VIII.47 Condition nécessaire de la connexité par arc

[\[Corrigé\]](#)

Soit C un connexe par arcs.

Montrer que toute application $f : C \rightarrow \{0, 1\}$ continue est constante.

VIII.48 Entre un ensemble et son adhérence

[\[Corrigé\]](#)

Soient E un \mathbb{R} -espace vectoriel normé, C une partie convexe de E et $D \subset E$ telles que $C \subset D \subset \overline{C}$.

Montrer que D est connexe par arcs.

VIII.49 Continuité d'applications matricielles

[\[Corrigé\]](#)

Montrer les propositions suivantes :

1. $f : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mapsto M^\top$ est continue.
2. $g : (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2 \mapsto AB$ est continue.
3. $h : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mapsto M^\top M$ est continue.
4. $\det : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mapsto \det M$ est continue.
5. $\text{Com} : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mapsto \text{Com}(M)$ est continue.
6. $\text{inv} : M \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \mapsto M^{-1}$ est continue.
7. $\Pi : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mapsto \pi_M$ n'est pas continue.

VIII.50 Points de continuité du polynôme minimal

[\[Corrigé\]](#)

Déterminer l'ensemble des points de continuité de l'application $\Pi : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mapsto \pi_M$.

VIII.51 Exponentielle matricielle et topologie

[\[Corrigé\]](#)

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que $\exp(M)$ est un polynôme en M .

VIII.52 Lemme du déterminant

[\[Corrigé\]](#)

1. Montrer que $\forall (U, V) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})^2$, $\det(I_n + UV^\top) = 1 + V^\top U$
2. Montrer que $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \forall (U, V) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})^2$, $\det(M + UV^\top) = \det(M) + V^\top \text{Com}(M)^\top U$

VIII.53 Matrice de déterminant 1 ★★

[\[Corrigé\]](#)

On pose $\text{SL}_n(\mathbb{K}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \det(M) = 1\}$ (appelé groupe spécial linéaire).

Montrer que :

1. $\text{SL}_n(\mathbb{K})$ est un groupe.
2. $\text{SL}_n(\mathbb{K})$ est fermé.
3. $\text{SL}_n(\mathbb{K})$ n'est pas borné.
4. $\text{SL}_n(\mathbb{K})$ est d'intérieur vide.
5. $\text{SL}_n(\mathbb{K})$ est connexe par arcs.

On admettra que $\text{SL}_n(\mathbb{K})$ est engendré par l'ensemble des matrices de transvection.

VIII.54 Ensembles de matrices de rang fixé

[\[Corrigé\]](#)

Soit $(p, r) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}$. On pose

$$A_r = \{M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \text{rg}(M) = r\}$$

$$B_r = \{M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \text{rg}(M) \leq r\}$$

$$C_r = \{M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \text{rg}(M) \geq r\}$$

Les ensembles A_r, B_r, C_r sont-ils ouverts ? Fermés ?

Déterminer leurs adhérence et leurs intérieur.

VIII.55 Densité des matrices inversibles ★★★

[\[Corrigé\]](#)

1. Montrer que $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
2. Montrer que $\forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$, $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.
3. Montrer que $\forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$, $\chi_{\exp(AB)} = \chi_{\exp(BA)}$.

VIII.56 Comatrice et topologie

[\[Corrigé\]](#)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que la transposée de la comatrice de A est un polynôme en A .

VIII.57 Groupe orthogonal ★

[\[Corrigé\]](#)

Montrer que $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe compact de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. Est-il connexe par arcs ?

VIII.58 Groupe (spécial) unitaire ★★★

[\[Corrigé\]](#)

On note pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\overline{M} = (\overline{M_{ij}})_{1 \leq i, j \leq n}$ la matrice dont les coefficients sont les conjugués de ceux de M et on pose $U_n(\mathbb{C}) = \left\{ M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mid \overline{M}^\top M = I_n \right\}$ ainsi que $SU_n(\mathbb{C}) = \{ M \in U_n(\mathbb{C}) \mid \det(M) = 1 \}$.

1. Montrer que $U_n(\mathbb{C})$ et $SU_n(\mathbb{C})$ sont deux sous-groupes compacts d'intérieurs vides de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.
2. a. Démontrer que toute matrice de $U_n(\mathbb{C})$ peut s'écrire sous la forme,

$$P \mathrm{diag}(e^{i\theta_1}, \dots, e^{i\theta_n}) P^{-1}$$

avec $P \in U_n(\mathbb{C})$ et $\theta_1, \dots, \theta_n$ des réels.

- b. Montrer que $U_n(\mathbb{C})$ et $SU_n(\mathbb{C})$ sont connexes par arcs.

VIII.59 Partie compacte et stable par produit de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$



[\[Corrigé\]](#)

Montrer que toute partie non vide, compacte et stable par produit de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ est un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$.

VIII.60 Intérieur des matrices diagonalisables ★★★★★

[\[Corrigé\]](#)

On note $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ diagonalisables ainsi que $\mathcal{B}_n(\mathbb{K}) = \{ M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \mathrm{Card}(\mathrm{Sp}(M)) = n \}$.

1. Montrer que $\widehat{\mathcal{D}_n(\mathbb{R})} = \mathcal{B}_n(\mathbb{R})$
2. Montrer que $\widehat{\mathcal{D}_n(\mathbb{C})} = \mathcal{B}_n(\mathbb{C})$

VIII.61 Adhérence des matrices diagonalisables ★★

[Corrigé]

On note $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$ (resp. $\mathcal{T}_n(\mathbb{K})$) l'ensemble des matrices diagonalisables (resp. trigonalisables) de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. Montrer que $\mathcal{D}_n(\mathbb{C})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
2. a. Soient $d \in \mathbb{N}$ et $P \in \mathbb{R}[X]$ unitaire de degré d . Montrer que P est scindé dans $\mathbb{R}[X]$ si et seulement si

$$\forall z \in \mathbb{C}, |P(z)| \geq |\operatorname{Im}(z)|^d$$

- b. En déduire que $\overline{\mathcal{D}_n(\mathbb{R})} = \mathcal{T}_n(\mathbb{R})$

VIII.62 Une preuve de Cayley-Hamilton (1) ★★

[Corrigé]

1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ diagonalisable. Montrer que $\chi_A(A) = 0$.
2. Montrer que $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \chi_A(A) = 0$.

VIII.63 Dimension du commutant d'une matrice

[Corrigé]

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On note $\mathcal{C}(M) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), AM = MA\}$.

1. Déterminer la dimension de $\mathcal{C}(M)$ lorsque M est une matrice diagonale dont tous les coefficients diagonaux sont distincts.
2. Soit $r \in \llbracket 0; n \rrbracket$. Montrer que $B_r = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \operatorname{rg}(A) \leq r\}$ est fermé.
3. En déduire que $\dim \mathcal{C}(M) \geq n$.

VIII.64 Topologie et réduction

[Corrigé]

Pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on désigne sa classe de similitude sur \mathbb{K} par :

$$S_{\mathbb{K}}(M) = \{PMP^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid P \in \operatorname{GL}_n(\mathbb{K})\}$$

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. Montrer que $S_{\mathbb{K}}(M)$ est une partie bornée de $\mathcal{M}(\mathbb{K})$ si et seulement si M est une matrice scalaire (de la forme αI_n avec $\alpha \in \mathbb{K}$).
2. Montrer que l'ensemble $S_{\mathbb{K}}(M)$ est une partie fermée de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ si et seulement la matrice M est diagonalisable.
3. Montrer que M est nilpotente si et seulement si la matrice nulle est un point adhérent à $S_{\mathbb{K}}(M)$.

VIII.65 Groupe spécial orthogonal et connexité

[\[Corrigé\]](#)

1. $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est-il connexe par arcs?
2. Montrer que $\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ est connexe par arcs.
3. Montrer que $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ est connexe par arcs.

VIII.66 Matrices inversibles et connexité

[\[Corrigé\]](#)

1. $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ est-il connexe par arc ?
2.
 - a. Soit $(A, B) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})^2$. On pose $d : z \in \mathbb{C} \mapsto \det((1-z)A + zB)$. Montrer que $V = \{z \in \mathbb{C}, d(z) \neq 0\}$ est connexe par arcs.
 - b. En déduire que $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs.

VIII.67 Matrices nilpotentes et connexité

[\[Corrigé\]](#)

L'ensemble des matrices nilpotentes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est-il convexe? Connexe par arcs? Et si on enlève 0_n ?

VIII.68 Raffinement sur les disques de Gershgorin

[\[Corrigé\]](#)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Pour $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$ on note $R_i = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$ et $\mathcal{D}_i = D(a_{ii}, R_i)$ le disque fermé de centre a_{ii} et de rayon R_i .

1.
 - a. Montrer que $\mathrm{Sp}(A) \subset \mathcal{D} = \bigcup_{i=1}^n \mathcal{D}_i$.

- b. Pour $j \in \llbracket 1; n \rrbracket$ on note $T_j = \sum_{i \neq j} |a_{ij}|$ et $\mathcal{D}_j^* = D(a_{jj}, T_j)$ et $\mathcal{D}^* = \bigcup_{j=1}^n \mathcal{D}_j^*$.

Montrer que $\text{Sp}(A) \subset \mathcal{D} \cap \mathcal{D}^*$.

2. On note $\mathcal{D} = \bigsqcup_{k=1}^p C_k$ la décomposition en composantes connexes par arcs de \mathcal{D} .

- a. Montrer que chacune des composantes connexes par arcs de \mathcal{D} est réunion d'un certain nombre des disques de Gershgorin \mathcal{D}_i .

En déduire que les composantes connexes par arcs de \mathcal{D} sont à la fois ouvertes dans \mathcal{D} et fermées dans \mathbb{C} .

On note dans la suite n_k le nombre de disques de Gershgorin inclus dans C_k .

- b. On souhaite montrer pour toute matrice A la proposition $\mathcal{P}(A)$: "Il y a exactement n_k valeurs de $t \in [0, 1]$ tels que $\mathcal{P}(A(t))$ est non vide".
Pour cela on fixe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et on pose pour $t \in [0, 1]$, $A(t) = (a_{ij}(t))_{1 \leq i, j \leq n}$ où $\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $a_{ii}(t) = a_{ii}$ et $\forall i, j \in \llbracket 1; n \rrbracket, i \neq j \implies a_{ij}(t) = ta_{ij}$, ainsi que I l'ensemble des $t \in [0, 1]$ tels que $\mathcal{P}(A(t))$ est non vide.

Montrer que I est non vide puis montrer $\mathcal{P}(A)$.

- c. Application : Montrer que si les disques de Gershgorin de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ sont deux à deux disjoints, alors A est diagonalisable.

VIII.69 Matrices stochastiques et bistochastiques

[\[Corrigé\]](#)

1. Montrer que $\mathcal{S}_{n,p} = \{M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R}^+) \mid \forall j \in \llbracket 1; p \rrbracket, \sum_{i=1}^n M_{ij} = 1\}$ l'ensemble des matrices stochastiques est une partie convexe et compacte de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$. Montrer que $\forall (A, B) \in \mathcal{S}_{n,p} \times \mathcal{S}_{p,q}$, $AB \in \mathcal{S}_{n,q}$.
2. Montrer que $\mathcal{B}_n = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}^+) \mid \forall j \in \llbracket 1; n \rrbracket, \sum_{i=1}^n M_{ij} = \sum_{i=1}^n M_{ji} = 1\}$ l'ensemble des matrices bistochastiques est une partie convexe et compacte de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

VIII.70 Théorème de Birkhoff-Von Neumann ★★★★★

[\[Corrigé\]](#)

On note \mathcal{P}_n l'ensemble des matrices de permutation d'ordre n (??) et \mathcal{B}_n l'ensemble des matrices bistochastiques d'ordre n (VIII.69). Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\text{Conv}(A)$ désigne l'enveloppe convexe de A (VIII.38). On souhaite montrer que $\mathcal{B}_n = \text{Conv}(\mathcal{P}_n)$.

1. Montrer que $\mathcal{B}_n \supset \text{Conv}(\mathcal{P}_n)$.

2. Pour l'inclusion réciproque, on raisonne par récurrence sur le nombre de coefficients différents de 0 des matrices bistochastiques en jeu.
 - a. Soit $B \in \mathcal{B}_n$ ayant exactement n coefficients non nuls. Montrer que $B \in \text{Conv}(\mathcal{P}_n)$.
 - b. On fixe un entier $n^2 \geq m > n$ et on suppose que toute matrice $M \in \mathcal{B}_n$ ayant moins de $m - 1$ coefficients non nuls appartient à l'enveloppe convexe de \mathcal{P}_n . Soit $B \in \mathcal{B}_n$ ayant exactement m coefficients non nuls. On note pour $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $A_i = \{j \in \llbracket 1; n \rrbracket, B_{ij} \neq 0\}$.
 A l'aide du théorème de Hall (Tome Algèbre), déterminer une matrice de permutation P_σ et un réel positif λ tels que $B_0 = \frac{1}{1-\lambda}(B - \lambda P_\sigma)$ soit une matrice bistochastique ayant au moins un coefficient nul de plus que B .
3. Conclure.

VIII.70.1 Points extrémaux des matrices bistochastiques

On note \mathcal{P}_n l'ensemble des matrices de permutation d'ordre n (Tome Algèbre) et \mathcal{B}_n l'ensemble des matrices bistochastiques d'ordre n (VIII.69).

1. Montrer que \mathcal{B}_n est convexe et compact.
2. Montrer que $\text{Ext}(\mathcal{B}_n) = \mathcal{P}_n$.

VIII.70.2 Points extrémaux des matrices orthogonales

Fonctions à valeurs vectorielles

Dans toute cette section, n désigne un entier naturel non nul.

IX.1 Point fixe de l'exponentielle complexe

[\[Corrigé\]](#)

Le but de cet exercice est de montrer l'existence de points fixes de l'exponentielle complexe, c'est à dire qu'il existe $z \in \mathbb{C}$ tel que $e^z = z$.

1. L'exponentielle a-t-elle des points fixes sur \mathbb{R} ?
2. Pour $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ on pose,

$$f(x) = \exp\left(\frac{x}{\tan x}\right) - \frac{x}{\sin x}$$

Déterminer les limites de f en 0 et en $\frac{\pi}{2}$.

3. En déduire qu'il existe $b \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ tel que $f(b) = 0$.
4. On pose $a = \frac{b}{\tan b}$ et $z = a + ib$. Montrer que $e^z = z$.

IX.2 Théorème du relèvement

[\[Corrigé\]](#)

Soient I un intervalle de \mathbb{R} , $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction de classe \mathcal{C}^n et $t_0 \in I$. Soit aussi θ_0 un argument de $f(t_0)$.

1. Montrer qu'il existe une unique fonction $\theta : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe \mathcal{C}^n telle que $\forall t \in I, f(t) = |f(t)|e^{2i\pi\theta(t)}$.
On dit que θ est un *argument* de f .
2. Supposons que $I = [a, b]$ avec $a < b$ et $f(a) = f(b)$. On définit $N_\theta(f) = \theta(b) - \theta(a)$ où θ est un argument de f . Montrer que $N_\theta(f)$ est indépendant de f .
On appelle cette quantité le *nombre de tours* de f .
3. Démontrer qu'il n'existe aucune fonction continue $L : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}$ telle que $\exp \circ L = \text{Id}_{\mathbb{C}^*}$.
On pourra montrer par exemple que si il en existe une, alors $t \mapsto \frac{1}{2i\pi} L(e^{2i\pi t})$ est un argument de $t \mapsto e^{2i\pi t}$.

IX.3 Equation fonctionnelle de l'exponentielle matricielle



[Corrigé]

Soit $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une application telle que $\forall (s, t) \in \mathbb{R}^2, \varphi(s+t) = \varphi(s)\varphi(t)$.

1. On suppose que φ est dérivable en 0. Déterminer φ .
2. On suppose que φ est continue en 0 et que $\varphi(\mathbb{R}) \subset \text{GL}_n(\mathbb{K})$. Déterminer φ .

IX.4 Formule de Trotter-Kato ★★

[Corrigé]

Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ que l'on munit d'une norme sous-multiplicative $\|\cdot\|$. Pour tout k entier naturel non nul, on pose :

$$X_k = \exp\left(\frac{A}{k}\right) \exp\left(\frac{B}{k}\right) \quad \text{et} \quad Y_k = \exp\left(\frac{A+B}{k}\right)$$

1. Prouver les majoration :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \|X_k\| \leq \exp\left(\frac{\|A\| + \|B\|}{k}\right) \quad \text{et} \quad \|Y_k\| \leq \exp\left(\frac{\|A\| + \|B\|}{k}\right)$$

On introduit la fonction $h : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ t & \longmapsto e^{tA}e^{tB} - e^{t(A+B)} \end{cases}$.

2. Montrer que $X_k - Y_k \underset{k \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}\left(\frac{1}{k^2}\right)$
3. Vérifier la relation $X_k^k - Y_k^k = \sum_{i=0}^{k-1} X_k^i (X_k - Y_k) Y_k^{k-i-1}$.
4. En déduire que $\lim_{k \rightarrow +\infty} \left(\exp\left(\frac{A}{k}\right) \exp\left(\frac{B}{k}\right) \right)^k = \exp(A+B)$.

IX.5 Série entière de matrice ★★

[Corrigé]

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

On définit $\cos(A) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} A^{2n}$ et $\sin(A) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} A^{2n+1}$.

Montrer que $\cos(A)^2 + \sin(A)^2 = I_n$.

IX.6 Expression d'un projecteur

[Corrigé]

Soit $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Justifier l'existence et calculer :

$$\int_0^{+\infty} A \cdot (A^2 + x^2 I_n)^{-1} dx$$

IX.7 Une preuve analytique de Cayley-Hamilton ★★★

[Corrigé]

On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ d'une norme d'algèbre $\|\cdot\|$ et on se donne $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

1. On suppose que $\|A\| < 1$. Montrer que $I_n - A$ est inversible et que $(I_n - A)^{-1} = \sum_{k=0}^{+\infty} A^k$.
2. Soit $k \in \mathbb{N}$. Montrer que pour $r \in \mathbb{R}$ assez grand, l'intégrale

$$I_k(r) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (re^{i\theta})^{k+1} (re^{i\theta} I_n - A)^{-1} d\theta$$

est définie et que $I_k(r) = A^k$.

3. Justifier que

$$\chi_A(A) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} re^{i\theta} \text{Com}(re^{i\theta} I_n - A)^{\top} d\theta$$

4. En déduire le théorème de Cayley-Hamilton.

IX.8 Exemple de fonction lipschitzienne

[Corrigé]

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel réel normé.

On pose :

$$f : \begin{cases} E & \longrightarrow E \\ x & \longmapsto \frac{x}{\max\{1, \|x\|\}} \end{cases}$$

1. Montrer que f est 2-lipschitzienne.
2. Montrer que si $\|\cdot\|$ est euclidienne alors f est 1-lipschitzienne.

IX.9 Condition de continuité sur un espace vectoriel normé

[\[Corrigé\]](#)

Soient E et F deux espaces vectoriels réels normés.

On note $\|\cdot\|_E$ (respectivement $\|\cdot\|_F$) la norme sur E .

Démontrer que si f est application linéaire de E dans F , alors les propriétés suivantes sont deux à deux équivalentes :

- f est continue sur E ,
- f est continue en O ,
- il existe $k > 0$ tel que pour tout $x \in E$, $\|f(x)\|_F \geq k\|x\|_E$.

IX.10 Application linéaire (2)

[\[Corrigé\]](#)

Soient E un espace vectoriel de dimension finie et $f : \mathbb{R} \rightarrow E$ dérivable en 0 telle que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(2x) = 2f(x)$$

Montrer que f est linéaire.

IX.11 Mouvement à force centrale

[\[Corrigé\]](#)

Soit I un intervalle de \mathbb{R} et $f : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ de classe \mathcal{C}^2 tel que pour tout $t \in I$, $f(t)$ et $f''(t)$ soient colinéaires. On suppose de plus qu'il existe $t_0 \in I$ tel que $(f(t_0), f'(t_0))$ est libre.

1. Montrer que f est à valeurs dans un plan vectoriel de \mathbb{R}^3 . On pourra utiliser le produit vectoriel.
2. Montrer que l'aire orientée du triangle porté par les vecteurs $f(t)$ et $f'(t)$.

IX.12 Dérivée d'un produit de deux matrices

[\[Corrigé\]](#)

Soit $M : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), t \mapsto M(t)$ une fonction dérivable.

1. Démontrer que la fonction $\varphi : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \\ t & \longmapsto M(t)M(t)^\top \end{cases}$ est dérivable.
2. On suppose que pour tout $t \in \mathbb{R}$, la matrice $M(t)$ est orthogonale.
Démontrer que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $M'(t)M(t)^\top$ est antisymétrique.

IX.13 Inégalité des accroissements finis pour un espace euclidien

[\[Corrigé\]](#)

Soit E un espace vectoriel euclidien et $f : [a, b] \rightarrow E$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.
En considérant $\varphi(t) = \langle f(b) - f(a), f(t) \rangle$, démontrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$\|f(b) - f(a)\| \leq (b - a) \|f'(c)\|$$



Equations différentielles

X.1 Equations différentielles du premier ordre

[\[Corrigé\]](#)

Résoudre ces équations différentielles :

1. $y' + y = x$ sur \mathbb{R} ;
2. $y' + \operatorname{th}(t)y = \operatorname{sh}(t)$ sur \mathbb{R} ;
3. $y' + 2xy = e^{x-x^2}$, $y(0)=0$, sur \mathbb{R} ;
4. $|x(x-1)|y' - y = x^2$ sur \mathbb{R} ;
5. $y' + \cotan(t)y = \cos^2(t)$ sur $]0, \pi[$.

X.2 Equations différentielles du second ordre

[\[Corrigé\]](#)

Résoudre ces équations différentielles

1. $y'' - 2y' - 3y = t^2 e^t$ sur \mathbb{R} ;
2. $y'' - 2y' + 2y = e^{-t} \cos(t)$ sur \mathbb{R} ;
3. $y'' + \lambda y = 0$ sur \mathbb{R} , pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$;
4. $y'' - (1-i)y' - 2(1+i)y = 0$ sur \mathbb{C} avec $y(0) = y'(0) = 1$.

X.3 Problèmes de raccordement

[\[Corrigé\]](#)

Résoudre sur \mathbb{R} l'équation différentielle : $xy' - y = x$.

X.4 Suite d'équations différentielles

[Corrigé]

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$.

1. Résoudre sur \mathbb{R}_+^* l'équation différentielle $xy' - \alpha y = 0$. Déterminer l'unique solution f vérifiant $f(1) = 1$.
2. Résoudre sur \mathbb{R}_+^* l'équation différentielle $xy' - \alpha y = f$. Déterminer l'unique solution vérifiant $g(1) = 0$.
3. On définit par récurrence une suite de fonctions (u_n) sur \mathbb{R}_+^* de la manière suivante :
 - $u_0 = f$,
 - pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_{n+1} est l'unique solution de l'équation différentielle $xy' - \alpha y = u_n$ sur \mathbb{R}_+^* valant 0 en 1.

Déterminer par récurrence u_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

X.5 Equation de Bernoulli (1)

[Corrigé]

On souhaite résoudre l'équation

$$(E) : x^2 y'' + 3xy' + y = \frac{1}{x^2}$$

sur l'intervalle $I =]0, +\infty[$.

1. Soient $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivable et $Y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $Y(t) = y(e^t)$.
 - a Calculer les dérivées y, y' et y'' en fonction de Y, Y' et Y''
 - b En déduire que y est solution de (E) si et seulement si Y est solution d'une équation différentielle linéaire du deuxième ordre à coefficients constants (E') que l'on précisera.
2. Résoudre (E') sur \mathbb{R} .
3. En déduire les solutions de (E') .
4. En déduire les solutions de (E) sur I .
5. Déterminer l'unique solution y de (E) sur I telle que $y(1) = y'(1) = 0$

X.6 Equation de Bernoulli (2)

[Corrigé]

Soient $I =]1, +\infty[$,

$$(E) : -t^2 y' + ty = y^2$$

1. Soit y une fonction ne s'annulant pas sur I . Prouver que y est solution de (E) si et seulement si $z = \frac{1}{y}$ est solution sur I d'une équation différentielle (E') linéaire d'ordre un.
2. Résoudre (E') sur I .
3. En déduire les solutions de (E) ne s'annulant pas sur l'intervalle I .

X.7 Etude asymptotique des solutions d'une équation différentielle ★★☆☆

[Corrigé]

1. Soient $a \in \mathbb{C}$ tel que $\Re(a) > 0$ et f une fonction de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R}_+ , à valeurs dans \mathbb{C} telle que $\lim_{+\infty} f' + af = 0$. Montrer que $\lim_{+\infty} f = 0$.
2. Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}_+, \mathbb{C})$ telle que $\lim_{+\infty} f'' + f' + f = 0$. Montrer que $\lim_{+\infty} f = 0$.
3. Démontrer que : pour tout $P \in \mathbb{C}[X]$ dont les racines sont toutes de parties réelles strictement négatives, si f est une fonction de classe \mathcal{C}^n sur \mathbb{R}_+ à valeurs dans \mathbb{C} avec $n = \deg(P)$ telle que $\lim_{+\infty} P(D)(f) = 0$, alors $\lim_{+\infty} f = 0$.
(D représente l'opérateur de dérivation)

X.8 Inéquation différentielle

[Corrigé]

Soit f une application de classe \mathcal{C}^2 de \mathbb{R} dans \mathbb{R} telle que $f'' + f \geq 0$. Montrer que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) + f(x + \pi) \geq 0$$

X.9 Solution 2π -périodique d'une équation différentielle

[Corrigé]

Soit f une fonction 2π -périodique de classe \mathcal{C}^2 . Montrer que l'équation différentielle $y'' + y = f$ admet des solutions 2π -périodiques si et seulement si

$$\int_0^{2\pi} f(t) \cos(t) dt = \int_0^{2\pi} f(t) \sin(t) dt = 0$$

X.10 Superposition de solutions

[Corrigé]

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Résoudre l'équation différentielle $y'' + y = \cos(nt)$.
2. Soit a_n une série absolument convergente. Résoudre l'équation différentielle

$$y'' + y = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \cos(nt)$$

X.11 Fonction de Bessel

[Corrigé]

On considère l'équation de Bessel, $(E) : xy'' + y' + xy = 0$.

1. Montrer que la fonction $J_0 : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin(\theta)) d\theta \end{cases}$ est solution de (E) (sur \mathbb{R} ?).
2. Montrer qu'il existe une unique solution f_0 de l'équation (E) qui est développable en série entière, définie sur tout \mathbb{R} et telle que $f_0(0) = 1$.
3. Soit $f :]0, a[\rightarrow \mathbb{R}$ une solution de l'équation (E) .
Montrer que (f, f_0) est libre si et seulement la fonction f n'est pas bornée au voisinage de 0.
4. En déduire que $\forall x \in \mathbb{R}, \int_0^\pi \cos(x \sin(\theta)) d\theta = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{4^n (n!)^2} x^{2n}$.

X.12 Développement de la cotangente (2)

[Corrigé]

On pose pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, $f_n(x) = \sum_{k=-n}^n \frac{1}{x - k}$.

1. Montrer que la suite de fonction $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une fonction f de classe \mathcal{C}^1 sur $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ et donner une expression de f' sous forme d'une série de fonctions.
2. Trouver une équation différentielle vérifiée par f .
3. En déduire que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \pi \cotan(\pi x)$.

X.13 Wronskien

[Corrigé]

1. Soient I un intervalle de \mathbb{R} et deux applications p et q de I dans \mathbb{C} continues. On considère deux solutions u et v de l'équation différentielle $(E) : y'' + py' + qy = 0$.
Calculer le wronskien de u et v en fonction de sa valeur en un point a et I .

2. On veut étendre ce résultat aux systèmes linéaires. Soient I un intervalle de \mathbb{R} et $A : I \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une fonction continue. On considère f_1, \dots, f_n n solutions sur I de l'équation différentielle $(S) : Y' = AY$.

Calculer le wronskien de f_1, \dots, f_n en fonction de sa valeur en un point a de I .

X.14 Utilité du wronskien

[\[Corrigé\]](#)

Soient q une fonction continue et intégrable sur \mathbb{R}_+ . On considère l'équation différentielle $(E) : y'' + qy = 0$.

1. Soit f une solution bornée de (E) sur \mathbb{R}_+ . Montrer que f' admet une limite en $+\infty$ puis déterminer la valeur de cette limite.
2. Soient f et g deux solutions bornées de (E) sur \mathbb{R}_+ . Etudier le wronskien $W = fg' - f'g$ des solutions f et g .

En déduire que f et g sont liées. Que peut-on en conclure?

X.15 Principe d'entrelacement des zéros de Sturm

[\[Corrigé\]](#)

1. Soient p et q deux fonctions continues sur \mathbb{R} telles que $p \leq q$ sur \mathbb{R} . Soient u et v deux fonctions de classe \mathcal{C}^2 telles que $u'' + pu = 0$ et $v'' + qv = 0$. On suppose que u s'annule en des réels a et b avec $a < b$ mais qu'elle n s'annule pas sur $]a, b[$.
 - a. On pose le *pseudo-wronskien* $W = uv' - u'v$. Déterminer W' .
 - b. En déduire que v s'annule sur $[a, b]$.
2. Application. Soient r une fonction continue sur \mathbb{R} , f de classe \mathcal{C} sur \mathbb{R} telle que $f'' + rf = 0$ et $M \in \mathbb{R}_+$.
 - a. On suppose $r \geq M^2$. Montrer que tout intervalle fermé de longueur $\frac{\pi}{M}$ contient au moins un zéro de f .
 - b. On suppose $r \leq M^2$. On suppose que f s'annule en des réels a et b tels que $a < b$ mais qu'elle ne s'annule pas sur $]a, b[$.
Montrer que $b - a \geq \frac{\pi}{M}$.

X.16 Solution qui s'annule

[\[Corrigé\]](#)

Soit $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ une fonction continue non identiquement nulle. On se propose de démontrer que toutes les solutions de l'équation différentielle $y'' + py = 0$ s'annulent. Pour cela, on raisonne par l'absurde et on suppose que f est une solution ne s'annulant pas.

1. Justifier que f est de signe constant.

On supposera que $f > 0$ quitte à changer f en $-f$.

2. Justifier que f est concave.
3. En déduire que f est constante sur \mathbb{R} .
4. Conclure.

X.17 Solution qui s'annule une infinité de fois

[\[Corrigé\]](#)

Soient p une application continue périodique non identiquement nulle de \mathbb{R} dans \mathbb{R}_+ et f une solution de l'équation différentielle $y'' + qy = 0$.

Montrer que f s'annule une infinité de fois sur \mathbb{R}_+ .

X.18 Lemme de Grönwall

[\[Corrigé\]](#)

1. Soient φ, ψ et y trois fonctions continues sur un segment $[a, b]$, à valeurs positives et vérifiant l'inégalité :

$$\forall t \in [a, b], \quad y(x) \leq \psi(x) + \int_a^x y(t)\varphi(t)dt$$

Montrer que :

$$\forall x \in [a, b], \quad y(x) \leq \psi(x) + \int_a^x \psi(t)\varphi(t) \exp\left(\int_t^x \varphi(u)du\right) dt$$

2. Quelle inégalité obtient-on lorsque ψ est une fonction constante égal à $c \in \mathbb{R}_+$.

X.18.1 Application du lemme de Grönwall

Soit $q : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe \mathcal{C}^1 , strictement positive et croissante.

Montrer que toutes les solutions de l'équation différentielle $(E) : y'' + qy = 0$ sont bornées sur \mathbb{R}_+ .

X.19 Théorème de Floquet

[\[Corrigé\]](#)

On considère un système différentielle sur \mathbb{C}^n , $(E) : Y' = AY$ où $A : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est une fonction continue et T -périodique.

1. Montrer que (E) admet une solution V non nulle telle que :

$$\exists \lambda \in \mathbb{C}, \forall t \in \mathbb{R}, \quad V(t+T) = \lambda V(t).$$

2. On considère n solutions V_1, \dots, V_n de (E) linéairement indépendantes. En notant $M(t)$ la matrice carrée dont les vecteurs colonnes sont V_1, \dots, V_n , montrer que :

$$\exists C \in \text{GL}_n(\mathbb{C}), \forall t \in \mathbb{R}, \quad M(t+T) = M(t)C$$

X.20 Méthode de Lagrange (1)

[\[Corrigé\]](#)

On étudie l'équation différentielle suivante sur $]0, +\infty[$,

$$(E) : xy'' + 3y' - 4x^3y = 0$$

1. Chercher une solution φ développable en série entière au voisinage de 0 et non nulle.
2. Terminer de résoudre l'équation par le changement de fonction inconnue $y(x) = \varphi(x)z(x)$.

X.21 Méthode de Lagrange (2)

[\[Corrigé\]](#)

On fixe un entier $n \geq 2$ et on introduit l'équation différentielle sur $]1, +\infty[$,

$$(E_n) : x(x-1)y'' + (1-2x)y' + n(n-1)y = 0$$

1. Chercher une solution φ de (E_n) développable en série entière en 0.
2. Résoudre (E_n) en effectuant le changement de fonction inconnue $y(x) = \varphi(x)z(x)$.
3. Déterminer les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ qui vérifient $P''|P$.

X.22 Equation différentielle matricielle non linéaire

[\[Corrigé\]](#)

Soit $A_0 \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ à spectre dans \mathbb{R}_- .

Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on considère le système différentiel $(E) : \begin{cases} A'(t) = A(t)^2 \\ A(0) = A_0 \end{cases}$.

Montrer que la solution $t \mapsto A(t)$ tend vers une limite finie en $+\infty$, à préciser.

X.23 Système dynamique

[Corrigé]

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $A : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de classe \mathcal{C}^1 et $B : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant :

$$\forall t \in \mathbb{R}, A'(t) = A(t)B(t) - B(t)A(t)$$

1. On suppose que B est constante égale à B_0 .
Montrer que $\chi_{A(t)}$ est indépendant de t .
2. Montrer que $\chi_{A(t)}$ est indépendant de t .

X.24 Solutions de norme constante ★★

[Corrigé]

On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de sa structure euclidienne canonique et on se donne $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que les solutions de l'équation différentielle $X' = AX$, $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ sont toutes de norme constante si et seulement si A est antisymétrique.

X.25 Exponentielles de matrices qui commutent ★★

[Corrigé]

Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui commutent.

On définit les applications $f_A : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ t & \longmapsto & e^{tA} \end{cases}$ et $g : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ t & \longmapsto & e^{t(A+B)}e^{-tB} \end{cases}$

1. Montrer que l'application f_A et l'application g sont solutions d'un même problème de Cauchy. En déduire une démonstration de la relation :

$$\forall t \in \mathbb{R}, e^{t(A+B)} = e^{tA}e^{tB}$$

2. Réciproquement, montrer que si $\forall t \in \mathbb{R}, e^{t(A+B)} = e^{tA}e^{tB}$ alors A et B commutent.

X.26 Lemme de Hochschild

[Corrigé]

On note $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et pour tout $f \in E$, $V_f = \text{Vect}(x \mapsto f(x+a), a \in \mathbb{R})$. Déterminer les fonctions $f \in E$ telles que V_f soit de dimension finie.

XI.1 Calcul de dérivées partielles

[\[Corrigé\]](#)

Soit f une application de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R}^2 . Calculer les dérivées partielles des fonctions suivantes en fonction des dérivées partielles de f .

- $g(x, y) = f(y, x)$
- $g(x) = f(x, x)$
- $g(x, y) = f(y, f(x, x))$
- $g(x) = f(x, f(x, x))$

XI.2 Existence de dérivées partielles

Etudier l'existence de dérivées partielles pour les fonctions suivantes.

- $f(x, y) = \max(|x|, |y|)$
- $f(x, y) = |x| + |y|$
- $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^2) + \sin(y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

XI.3 Etude d'une fonction

Soit $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

1. Etudier la continuité de f .
2. (a) Prouver l'existence de dérivées partielles premières de f sur \mathbb{R}^2 .
 (b) Etudier la continuité des dérivées partielles premières de f .
 (c) La fonction f est-elle de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R}^2 ?

XI.4 Une équation fonctionnelle ★★

[Corrigé]

Le but de cet exercice est de déterminer les fonctions f de classe \mathcal{C}^2 sur \mathbb{R} solutions de l'équation :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y) \quad (\text{XI.1})$$

1. Déterminer les solutions constantes de (XI.1).
2. Soit f une solution non constamment nulle de (XI.1).
 (a) Montrer que $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$.
 (b) Montrer que f est une fonction paire.
3. Soit f une fonction de classe \mathcal{C}^2 . on considère la fonction F définie sur \mathbb{R}^2 par

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, F(x, y) = f(x+y) + f(x-y)$$

- (a) Justifier que F est de classe \mathcal{C}^2 .
- (b) Calculer les dérivées partielles secondes de F .
- (c) On suppose que f est une solution non constamment nulle de (XI.1). Des expressions des dérivées partielles de F , déduire que f vérifie une équation différentielle de la forme $z'' - \alpha z = 0$.
- (d) Donner les solutions de l'équation différentielle $z'' - \alpha z = 0$ suivant les valeurs de α .
4. Déterminer toutes les solutions de (XI.1).

XI.5 Application linéaire

[Corrigé]

Soit $f : E \mapsto F$ une fonction différentiable en 0 vérifiant $f(\lambda x) = \lambda f(x)$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ et tout $x \in E$.

Montrer que l'application f est linéaire.

XI.6 Opérateurs vectoriels

[Corrigé]

Pour $f = (f_1, \dots, f_n)$ un *champ vectoriel* différentiable, c'est à dire une application de \mathbb{R}^n

dans \mathbb{R}^n différentiable, on définit la **divergence** de f par :

$$\operatorname{div}(f) = \sum_{i=1}^n \partial_i f_i$$

Pour $f = (f_1, f_2, f_3)$ un champ vectoriel de \mathbb{R}^3 dans \mathbb{R}^3 différentiable, on définit le **rotationnel** de f par :

$$\operatorname{rot}(f) = \left(\frac{\partial^2 f_z}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 f_y}{\partial z^2}, \frac{\partial^2 f_x}{\partial z^2} - \frac{\partial^2 f_z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 f_y}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 f_x}{\partial y^2} \right)$$

Pour f une application de \mathbb{R}^n dans \mathbb{R} de classe \mathcal{C}^2 , on définit le **laplacien** de f par :

$$\Delta f = \sum_{i=1}^n \partial_i^2 f$$

1. Soit f une application de classe \mathcal{C}^2 de \mathbb{R}^n dans \mathbb{R} . Montrer que

$$\operatorname{div}(\nabla f) = \Delta f$$

2. Soit f une application de classe \mathcal{C}^2 de \mathbb{R}^3 dans \mathbb{R} . Montrer que

$$\operatorname{rot}(\nabla f) = 0$$

3. Soit $f = (f_x, f_y, f_z)$ une application de classe \mathcal{C}^2 de \mathbb{R}^3 dans \mathbb{R}^3 . Montrer que

$$\operatorname{rot}(\operatorname{rot} f) = \nabla(\operatorname{div} f) - \Delta f_x - \Delta f_y - \Delta f_z$$

XI.7 Laplacien en polaires

[\[Corrigé\]](#)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$ de classe \mathcal{C}^2 . On appelle *laplacien* de f l'application $\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$.

Donner une expression du laplacien en coordonnées polaires.

XI.8 Fonction harmonique

[\[Corrigé\]](#)

Soit U un ouvert connexe par arcs de \mathbb{R}^n . On dit qu'une fonction f de classe \mathcal{C}^2 sur U à valeurs dans \mathbb{R} est harmonique si $\Delta f = 0$ sur U .

Montrer que si f et f^2 sont harmoniques sur U , alors f est constante sur U .

XI.9 Mines ponts MP 2016

[Corrigé]

On se donne $R \in \mathbb{R}_+^*$ et on définit $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 < R^2\}$. Soit f une fonction harmonique sur U . On définit également

$$F : \begin{cases}]-R, R[\times \mathbb{R} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ (r, \theta) & \longmapsto f(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) \end{cases}$$

1. Trouver une relation entre les dérivées partielles de F et f .
2. Soit $n \in \mathbb{Z}$. On définit

$$\varphi_n : \begin{cases}]-R, R[& \longrightarrow \mathbb{R} \\ r & \longmapsto \int_0^{2\pi} F(r, \theta) e^{-in\theta} d\theta \end{cases}$$

Trouver une équation différentielle vérifiée par φ_n et la résoudre. En déduire φ_n .

XI.10 Différentielle de l'exponentielle matricielle

[Corrigé]

Soit $M : \mathbb{R} \mapsto \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dérivable telle que pour tout $(s, t) \in \mathbb{R}^2$, $M(s)$ et $M(t)$ commutent.

1. Justifier que $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est différentiable en 0 et calculer sa différentielle en 0.
2. En déduire que $\varphi : t \in \mathbb{R} \mapsto \exp(A(t))$ est dérivable sur \mathbb{R} et que :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \varphi'(t) = A'(t) \exp(A(t)) = \exp(A(t)) A'(t)$$

XI.11 Différentielle de la norme euclidienne

[Corrigé]

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien. On pose $f : x \in E \mapsto \|x\|^2$ où $\|\cdot\|$ désigne la norme associée à $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Montrer que f est différentiable sur E et calculer la différentielle de f en tout point $a \in E$.

XI.12 Différentielle de l'inversion matricielle

[Corrigé]

On considère $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ muni d'une norme $\|\cdot\|$ sous-multiplicative.

1. Soit $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\|H\| < 1$. Montrer que $I_n - H$ est inversible, d'inverse

$$\sum_{n=0}^{+\infty} H^n.$$

2. Montrer que $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ est ouvert dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
3. Soit $f : M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \mapsto M^{-1}$.
 - a. Montrer que f est différentiable en I_n et que $df(I_n) \cdot H = -H$.
 - b. Montrer que f est différentiable en tout point de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. On remarquera que $(M + H)^{-1} = (M(I_n + M^{-1}H))^{-1}$.

XI.13 Gradient et différentielle du déterminant

[\[Corrigé\]](#)

On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de son produit scalaire usuel $(A, B) \mapsto \mathrm{Tr}(A^\top B)$. Déterminer le gradient et la différentielle de l'application $\det : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto \det(M)$.

XI.14 Espace tangent aux matrices orthogonales en l'identité

[\[Corrigé\]](#)

Montrer que l'ensemble des vecteurs tangents à l'ensemble des matrices orthogonales en la matrice identité $T_{I_n}(\mathcal{O}_n(\mathbb{R}))$ est l'ensemble des matrices antisymétriques réelles.

XI.15 Vecteur propre d'un endomorphisme auto-adjoint

[\[Corrigé\]](#)

Soit f un endomorphisme auto-adjoint d'un espace euclidien E de dimension finie non nulle.

Pour tout $x \in E \setminus \{0\}$, on pose $\varphi(x) = \frac{\langle f(x), x \rangle}{\|x\|^2}$

On n'utilisera pas le théorème spectral dans tout cet exercice.

1. Calculer le gradient de φ en tout point de $E \setminus \{0\}$.
2. Montrer que $x \in E \setminus \{0\}$ est un vecteur de f si et seulement $\nabla\varphi(x) = 0$.
3. Montrer que φ admet un maximum sur $E \setminus \{0\}$.
4. En déduire que f admet un vecteur propre.

XI.16 Quotient de Rayleigh

[\[Corrigé\]](#)

On munit \mathbb{R}^n de sa structure euclidienne canonique.

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique et $f_A : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ définie par $f_A(x) = x^\top Ax$.

1. Calculer les dérivées partielles de f_A et exprimer $\nabla f_A(x)$ en fonction de Ax pour tout $x \in \mathbb{R}^n$.

2. Pour $x \in \mathbb{R}^n$ non nul, on introduit le *quotient de Rayleigh* : $R(x) = \frac{x^\top Ax}{x^\top x}$.
Montrer que x est vecteur propre de A , si et seulement si $\nabla R(x) = 0$.

XI.17 Différentielle du déterminant

[Corrigé]

1. Montrer que l'application $\det : A \mapsto \det(A)$ est différentiable sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. Calculer sa différentielle en commençant par évaluer ses dérivées partielles.
3. On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ du produit scalaire canonique.
Déterminer le vecteur gradient de \det en A

XI.18 Equation de d'Alembert

[Corrigé]

Soit $c \neq 0$. chercher les solutions de classe \mathcal{C}^2 de l'équation aux dérivées partielles suivantes :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}$$

à l'aide d'un changement de variable de la forme $u = x + at, v = x + bt$.

XI.19 Utilisation des extrema liés (1)

[Corrigé]

Soit $f : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto xy$. Déterminer le minimum et le maximum éventuels de f sur $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 = 1\}$.

XI.20 Utilisation des extrema liés (2)

[Corrigé]

Etudier mes extrema globaux de $f : (x, y) \mapsto 2x - y$ sous la contrainte $g(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 1 = 0$.

XI.21 Utilisation des extrema liés (3)

[Corrigé]

Montrer que pour tous les $(x, y, z) \in (\mathbb{R}_+)^3$ tels que $x + y + z = \frac{\pi}{2}$,

$$\sin(x) \sin(y) \sin(z) \leq \frac{\pi}{8}$$

XI.22 Sinus complexe

[Corrigé]

On pose : $\forall z \in \mathbb{C}, \sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$.

1. Exprimer $|\sin(z)|^2$ en fonction de $\operatorname{Re}(z)$ et $\operatorname{Im}(z)$.
2. Déterminer $\max_{|z| \leq 1} |\sin(z)|$.

XI.23 Entropie

[Corrigé]

Soit un entier $n \geq 2$. On pose

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^n, f(x_1, \dots, x_n) = - \sum_{i=1}^n x_i \ln(x_i)$$

On note

$$C = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^n, \sum_{i=1}^n x_i = 1 \right\}$$

1. Justifier que f admet un maximum sur C .
2. Déterminer la valeur de ce maximum et le point où il est atteint.

XI.24 Fonction convexe sur \mathbb{R}^n

[Corrigé]

On considère une fonction $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

1. Pour tous $x, y \in \mathbb{R}^n$, soit $\varphi_{x,y} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$\forall t \in \mathbb{R}, \varphi_{x,y}(t) = f(x + t(y - x))$$

Montrer que f est convexe si et seulement si pour tous $x, y \in \mathbb{R}^n$, la fonction $\varphi_{x,y}$ est convexe.

2. On suppose que f est différentiable sur \mathbb{R}^n . Montrer que pour tout $x, y \in \mathbb{R}^n$, la fonction $\varphi_{x,y}$ est dérivable, et montrer que

$$\forall t \in \mathbb{R}, \varphi'_{x,y}(t) = \langle \nabla f(x + t(y - x)), y - x \rangle$$

3. En déduire que si f est différentiable sur \mathbb{R}^n , alors f est convexe si et seulement si pour tous $x, y \in \mathbb{R}^n$,

$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle$$

4. Montrer que si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est différentiable sur \mathbb{R}^n , alors f est convexe si et seulement si pour tous $x, y \in \mathbb{R}^n$,

$$\langle \nabla f(y) - \nabla f(x), y - x \rangle \geq 0$$

XI.25 Chemin le plus court entre deux points

[Corrigé]

On utilisera les résultats de XI.24.

Soient $a, b, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, avec $a < b$. On pose $F = \{f \in \mathcal{C}^1([a, b]), f(a) = \alpha, f(b) = \beta\}$.

Montrer que $\min_{f \in F} \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$ est atteint par une unique fonction affine de F .

XI.26 Fonction homogène

[Corrigé]

Soient $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. On dit que f est *homogène de degré α* si

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \forall t > 0, f(tx, ty) = t^\alpha f(x, y)$$

1. Montrer que f est homogène de degré α si et seulement si

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \alpha f(x, y)$$

2. Montrer que si f est de degré α , les dérivées partielles de f sont également homogènes et préciser leurs degrés.

XI.27 Problème de Dirichlet et principe faible du maximum

[Corrigé]

Soient U un ouvert borné non vide de \mathbb{R}^n . On note $\partial U = \overline{U} \setminus \overset{\circ}{U}$ la frontière de U . On se donne une fonction f à valeurs réelles continue sur \overline{U} et de classe \mathcal{C}^2 sur U . On pose alors :

$$\forall x \in U, \Delta f(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x)$$

1. Montrer que f admet un maximum sur \overline{U} . On note alors \bar{x} un point de \overline{U} où ce maximum est atteint.
2. On suppose que $\Delta f > 0$ sur U . Montrer que $\bar{x} \in \partial U$.

A partir de maintenant, on suppose $\Delta f = 0$ sur U .

3. On se donne $\varepsilon > 0$ et on pose :

$$\forall x \in \overline{U}, f_\varepsilon(x) = f(x) + \varepsilon \sum_{i=1}^n x_i^2$$

Montrer que f_ε est continue sur \overline{U} de classe \mathcal{C}^2 sur U et que $\Delta f_\varepsilon > 0$ sur U .

4. En déduire que le maximum de f sur \overline{U} est atteint sur ∂U .
5. Soient f_1 et f_2 deux fonctions continues sur \overline{U} , de classe \mathcal{C}^2 sur U et vérifiant $\Delta f_1 = \Delta f_2$ sur U . On supposera en outre que $f_1 = f_2$ sur ∂U . Montrer que $f_1 = f_2$ sur U .

XI.28 La méthode des moindres carrés

[Corrigé]

Etant donné un nuage de points $(x_i, y_i)_{0 \leq i \leq n}$ la droite des moindres carrés (ou droite de régression linéaire) est la droite d'équation $y = mx + p$ qui minimise la quantité :

$$F(m, p) = \sum_{i=1}^n (y_i - mx_i - p)^2$$

1. Démontrer que (m, p) est un couple où ce minimum est atteint, alors (m, p) est solution du système :

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n (y_i - mx_i - p) = 0 \\ \sum_{i=1}^n x_i (y_i - mx_i - p) = 0 \end{cases}$$

2. On note \bar{x} et \bar{y} les valeurs moyennes respectives de (x_i) et (y_i) . Démontrer que si $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \neq 0$ alors il existe au plus une droite des moindres carrés, avec

$$m = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

3. On veut démontrer prouver l'existence d'une droite des moindres carrés, toujours sous la condition $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \neq 0$

a. Pourquoi suffit-il de prouver que $\lim_{\|(m,p)\| \rightarrow +\infty} F(m, p) = +\infty$?

b. Démontrer que

$$F(m, p) = \sum_{i=1}^n u_i^2(m, p) + v(m, p) + c$$

où u_1, \dots, u_n, v sont des formes linéaires sur \mathbb{R}^2 et $c \in \mathbb{R}$.

c. Démontrer que le rang de (u_1, \dots, u_n) est 2.

d. On suppose que (u_1, \dots, u_n) sont indépendantes. Justifier que l'on peut écrire :

$$F(m, p) = u_1^2(m, p) + au_1(m, p) + u_2^2(m, p) + bu_2(m, p) + c + R(m, p)$$

où $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $R(m, p) \geq 0$.

- e. Justifier que $\|(m, p)\| \rightarrow +\infty \implies |u_1(m, p)| + |u_2(m, p)| \rightarrow +\infty$.
 f. Conclure.

XI.29 Equation de la chaleur

[Corrigé]

On se place dans le plan \mathbb{R}^2 dont les éléments sont notés (x, t) . Pour tout $T > 0$, on note :

- $R_T =]0, \pi[\times]0, T[$
- $C_T = (\{0\} \times [0, T]) \cap ([0, \pi] \times \{0\}) \cap (\{\pi\} \times [0, T])$
- $\Lambda_T =]0, \pi[\times \{T\}$.

de sorte que R_T, C_T et Λ_T soient disjoints et que leur réunion soit le rectangle fermé $\overline{R_T}$.

1. Soit $\varphi : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe \mathcal{C}^1 , telle que $\varphi(0) = \varphi(\pi) = 0$.

- a. Montrer l'existence d'une suite réelle $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $\sum_{n \in \mathbb{N}} |b_n|$ converge et telle que

$$\forall x \in [0, \pi], \varphi(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n \sin(nx).$$

- b. Soit $T_0 > 0$. Construire une fonction Φ continue sur $\overline{R_{T_0}}$ telle que :

- (i) φ est de classe \mathcal{C}^2 sur R_{T_0} et $\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} - \frac{\partial \Phi}{\partial t} = 0$ sur R_{T_0} ;
- (ii) pour tout $t \in [0, T_0]$, $\Phi(0, t) = \Phi(\pi, t) = 0$
- (iii) pour tout $x \in [0, \pi]$, $\Phi(x, 0) = \varphi(x)$.

- c. On veut montrer qu'il existe qu'une seule fonction Φ vérifiant (i), (ii) et (iii). Soit f une fonction à valeurs réelles, continue sur $\overline{R_{T_0}}$ et de classe \mathcal{C}^2 sur R_{T_0} .

- i. On suppose $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{\partial f}{\partial t} > 0$ sur R_{T_0} , montrer que f atteint son maximum sur C_{T_0} (on pourra commencer par prouver le résultat sur R_T et C_T pour tout $T \in]0, T_0[$).
- ii. On suppose $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{\partial f}{\partial t} \geq 0$ sur R_{T_0} , montrer que f atteint son maximum sur C_{T_0} .
- iii. On suppose f nulle sur C_{T_0} et $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{\partial f}{\partial t} = 0$ sur R_{T_0} , montrer que f est nulle.
- iv. En déduire que la fonction Φ construite à la question (1b) est la seule fonction vérifiant (i), (ii) et (iii).

XII

Divers

XII.1 Développement décimal propre d'un réel ★★ ★

[\[Corrigé\]](#)

Démontrer que tout réel $x \in [0, 1[$ s'écrit de manière unique $x = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{10^n}$ avec $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite à valeurs dans $\llbracket 0; 9 \rrbracket$ qui ne stationne pas à 9.

XII.1.1 Une caractérisation des rationnels ★★ ★

Soit $x \in [0, 1[$. Montrer que $x \in \mathbb{Q}$ si et seulement si son développement décimal propre est périodique à partir d'un certain rang.

XII.2 Distribution du premier chiffre des puissances de 2 ★★ ★

[\[Corrigé\]](#)

Soit $i \in \llbracket 1; 9 \rrbracket$. On note $N_i(n)$ le nombre d'éléments de $\{2, 2^2, \dots, 2^n\}$ dont le premier chiffre dans l'écriture décimale est i . On note pour $x \in \mathbb{R}$, $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ la partie fractionnaire de x .

1. Montrer qu'en notant $\theta = \log_{10}(2)$, $N_i(n)$ est exactement le nombre d'entier $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$ tels que $\{k\theta\}$ est dans $[\log_{10}(i), \log_{10}(i+1)[$.
2. Montrer que la suite $(\{k\theta\})_{k \in \mathbb{N}^*}$ est dense dans $[0, 1]$.
3. En déduire qu'il existe une infinité de puissances de 2 dont le premier chiffre est i .

XII.3 Série de Engel

[\[Corrigé\]](#)

Soit $x \in]0, 1]$.

1. Montrer qu'il existe une unique suite $(q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'entiers naturels supérieurs ou égaux à 2 telle que $x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{q_0 q_1 \dots q_n}$.
2. Montrer que x est rationnel si et seulement si la suite $(q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est stationnaire.
 - a. En déduire que e , $\text{ch}(1)$ et $\text{sh}(1)$ sont irrationnels.
 - b. En déduire que $e^{\sqrt{2}}$, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^{n^2}}$ et $\sqrt[n]{e}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$ sont irrationnels.

XII.4 Théorème de Müntz

[\[Corrigé\]](#)

On admettra ou démontrera les résultats sur le déterminant de Gram (cf. IV-7 tome Algèbre) et sur le déterminant de Cauchy (cf. IV-8 tome Algèbre).

Soit $(\mathcal{C}, \|\cdot\|_2)$ l'espace des fonctions continues sur $[0, 1]$, muni de la norme usuelle \mathcal{L}^2 .

Soit (α_n) une suite strictement croissante de réels positifs.

Alors, on a l'équivalence :

- $V := \text{Vect}((x \mapsto x^{\alpha_n})_{n \in \mathbb{N}})$ est dense dans \mathcal{C} .
- La série $\sum \frac{1}{\alpha_n}$

XIII

Correction

XIII.1 Correction Suite et série numérique

XIII.1.1 Lemme de Césaro ★★

[Enoncé]

Si $\ell \in \mathbb{R}$ alors $u_n - \ell \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(1)$.

Or $\sum_{n \geq 0} 1$ diverge et $(1)_{n \in \mathbb{N}}$ est de signe constant APCR donc

$$\sum_{k=0}^n (u_k - \ell) = \sum_{k=0}^n u_k - (n+1)\ell \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o\left(\sum_{k=0}^n 1\right) = o(n+1)$$

Ainsi,

$$\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n u_k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$$

Supposons que $\ell = +\infty$.

Fixons $A \in \mathbb{R}_+^*$. $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0, u_n \geq A+1$.

Alors pour tout $n > n_0$,

$$\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n u_k = \frac{1}{n+1} \left(\sum_{k=0}^{n_0} u_k + \sum_{k=n_0+1}^n u_k \right) \geq \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n_0} u_k + \frac{(n-n_0)(A+1)}{n+1}$$

$$\text{Or } \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n_0} u_k + \frac{(n-n_0)(A+1)}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} A+1.$$

$$\text{Donc } \exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n > n_1, \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n_0} u_k + \frac{(n-n_0)(A+1)}{n+1} \geq A.$$

Ainsi $\forall n > \max(n_0, n_1)$, $\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n u_k \geq A$.

Donc $\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n u_k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

Par le même raisonnement, si $\ell = -\infty$ alors $\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n u_k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$.

Lemme de l'escalier ★

On remarque que $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (u_{k+1} - u_k) = \frac{1}{n} (u_n - u_0)$

Et d'après le lemme de Césaire : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (u_{k+1} - u_k) = \ell$

Ainsi : on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} (u_n - u_0) = \ell$.

Par conséquent, on a bien : $u_n \sim \ell n$

XIII.1.2 Théorèmes Taubériens d'Hardy ★

[Énoncé]

Posons pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = (-1)^n$.

$\forall n \in \mathbb{N}$, $\begin{cases} \sigma_{2n} = \frac{1}{2n+1} \\ \sigma_{2n+1} = 0 \end{cases}$. Donc $\sigma_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ alors que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge.

Hardy Faible ★★

Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\sum_{k=0}^n k\varepsilon_k = \sum_{k=1}^n k(u_{k+1} - u_k) = \sum_{k=1}^n (ku_{k+1} - (k-1)u_k) - \sum_{k=1}^n u_k = nu_{n+1} - \sum_{k=1}^n u_k.$$

$$\text{Donc } (n+1)\sigma_n - u_0 = \sum_{k=1}^n u_k = nu_{n+1} - \sum_{k=1}^n k\varepsilon_k$$

$$\text{d'où } \forall n \geq 2, u_n = \frac{n}{n-1}\sigma_{n-1} + \frac{1}{n-1} \sum_{k=0}^{n-1} k\varepsilon_k - \frac{u_0}{n-1}.$$

Or, $n\varepsilon_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(1)$ et $\sum_{n \in \mathbb{N}} 1$ diverge donc $\sum_{k=0}^{n-1} k\varepsilon_k \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o\left(\sum_{k=0}^{n-1} 1\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n)$.

Ainsi, $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ell + o(1)$, c'est à dire $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$.

Hardy Fort ★★

1.

$$\begin{aligned}
\sum_{k=n}^{m-1} (m-k)\varepsilon_k &= \sum_{k=n}^{m-1} (m-k)(u_{k+1} - u_k) \\
&= \sum_{k=n}^{m-1} [(m-k)u_{k+1} - (m-(k-1))u_k] + \sum_{k=n}^{m-1} u_k \\
&= u_m - (m-n+1)u_n + \sum_{k=n}^{m-1} u_k \\
&= \sum_{k=n+1}^m u_k - (m-n)u_n
\end{aligned}$$

2. Soit m et n deux entiers supérieurs que 2.

$$\left| \frac{(m+1)\sigma_m - (n+1)\sigma_n}{m-n} - u_n \right| = \left| \frac{1}{m-n} \sum_{k=m+1}^n u_k - u_n \right| = \left| \sum_{k=n}^{m-1} \frac{m-k}{m-n} \varepsilon_k \right| \leq \sum_{k=n}^{m-1} \frac{m-k}{m-n} |\varepsilon_k|.$$

Or $\varepsilon_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right)$ donc $\exists N \in \mathbb{N}$, $\exists C \in \mathbb{R}_+^*$, $\forall n \geq N$, $|n\varepsilon_n| \leq C$.

Donc $\forall n \geq N$

$$\left| \frac{(m+1)\sigma_m - (n+1)\sigma_n}{m-n} - u_n \right| \leq \frac{C}{m-n} \sum_{k=n}^{m-1} \frac{m-k}{k} \leq \frac{C}{m-n} \sum_{k=n}^{m-1} \frac{m-n}{k} = C \sum_{k=n}^{m-1} \frac{1}{k}$$

Or $\forall k \geq 2$

$$\forall t \in [k-1, k], \quad \frac{1}{k} \leq \frac{1}{t} \implies \forall k \geq 2, \quad \frac{1}{k} = \int_{k-1}^k \frac{dt}{k} \leq \int_{k-1}^k \frac{dt}{t} = \ln(k) - \ln(k-1)$$

$$\text{Ainsi } \forall n \geq N, \quad \left| \frac{(m+1)\sigma_m - (n+1)\sigma_n}{m-n} - u_n \right| \leq C \sum_{k=n}^{m-1} (\ln(k) - \ln(k-1)) = C \ln\left(\frac{m-1}{n-1}\right).$$

Par conséquent si $n \geq N$ et $m < n$ sont deux entiers,

$$\begin{aligned}
|u_n - \ell| &\leq \left| u_n - \frac{(m+1)\sigma_m - (n+1)\sigma_n}{m-n} \right| + \left| \frac{(m+1)\sigma_m - (n+1)\sigma_n}{m-n} - \ell \right| \\
&\leq C \ln\left(\frac{m-1}{n-1}\right) + \frac{m+1}{m-n} \left| \sigma_m - \frac{n+1}{m+1} \sigma_n - \frac{m-n}{m+1} \ell \right| \\
&\leq C \ln\left(\frac{m-1}{n-1}\right) + \frac{m+1}{m-n} \left| \sigma_m - \ell + \frac{n+1}{m+1} (\ell - \sigma_n) \right| \\
&\leq C \ln\left(\frac{m-1}{n-1}\right) + \frac{m+1}{m-n} (|\sigma_m - \ell| + |\sigma_n - \ell|)
\end{aligned}$$

3. Fixons $\varepsilon > 0$. Soit $\alpha > 1$. On prend $m = 1 + \lfloor \alpha n \rfloor > \alpha n > n$ dans l'inéquation précédente :

$$\forall n \geq N, |u_n - \ell| \leq C \ln \left(\frac{\lfloor \alpha n \rfloor}{n-1} \right) + \frac{\lfloor \alpha n \rfloor + 2}{1 + \lfloor \alpha n \rfloor - n} (|\sigma_{1+\lfloor \alpha n \rfloor} - \ell| + |\sigma_n - \ell|).$$

Par définition de la partie entière, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $n\alpha - 1 < \lfloor n\alpha \rfloor \leq n\alpha$ Donc $\lfloor n\alpha \rfloor \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n\alpha$.

Ainsi par composition de limite, $\ln \left(\frac{\lfloor n\alpha \rfloor}{n-1} \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ln(\alpha)$.

Aussi $1 + \lfloor n\alpha \rfloor \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ donc $|\sigma_{1+\lfloor n\alpha \rfloor} - \ell| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Puis, $\frac{\lfloor n\alpha \rfloor + 2}{1 + \lfloor n\alpha \rfloor - n} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{\alpha n + o(n) + 2}{1 + \alpha n - n + o(n)} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{\alpha n + o(n)}{(\alpha - 1)n + o(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\alpha}{\alpha - 1}$.

Donc par produit $\frac{\lfloor \alpha n \rfloor + 2}{1 + \lfloor \alpha n \rfloor - n} (|\sigma_{1+\lfloor \alpha n \rfloor} - \ell| + |\sigma_n - \ell|) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

On sait alors qu'il existe $M \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \geq M, \ln \left(\frac{\lfloor \alpha n \rfloor}{n-1} \right) \leq \ln(\alpha) + \frac{\varepsilon}{4C} \text{ et } \frac{\lfloor \alpha n \rfloor + 2}{1 + \lfloor \alpha n \rfloor - n} (|\sigma_{1+\lfloor \alpha n \rfloor} - \ell| + |\sigma_n - \ell|) \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

Ainsi, $\forall n \geq \max(M, N)$, $|u_n - \ell| \leq C \left(\ln(\alpha) + \frac{\varepsilon}{4C} \right) + \frac{\varepsilon}{2}$.

Enfin, on prend $\alpha = 1 + \frac{\varepsilon}{4C} > 1$ et on utilise $\ln \left(1 + \frac{\varepsilon}{4C} \right) \leq \frac{\varepsilon}{4C}$. on obtient :

$$\forall n \geq \max(M, N), |u_n - \ell| \leq \varepsilon$$

C'est à dire $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$.

XIII.1.3 Série Harmonique ★★

[\[Énoncé\]](#)

1. Première méthode : Sommation de relations de comparaisons

On remarque que $\ln(n+1) - \ln(n) = \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$.

Or $(\ln(n+1) - \ln(n))_{n \in \mathbb{N}^*}$ est de signe constant APCR et $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \ln(n+1) - \ln(n)$ diverge puisque de même nature que la suite $(\ln n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

Donc $H_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln n$.

Seconde méthode : Comparaison série-intégrale

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned}
 & \forall t \in [n, n+1], \quad \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{t} \leq \frac{1}{n} \\
 \Rightarrow & \int_n^{n+1} \frac{dt}{n+1} = \frac{1}{n+1} \leq \int_n^{n+1} \frac{dt}{t} \leq \frac{1}{n} = \int_n^{n+1} \frac{dt}{n} \\
 \Rightarrow & \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k+1} \leq \sum_{k=1}^{n-1} \ln(k+1) - \ln(k) \leq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} \\
 \Rightarrow & H_n - 1 \leq \ln n \leq H_n - \frac{1}{n} \\
 \Rightarrow & \ln n + \frac{1}{n} \leq H_n \leq \ln n + 1
 \end{aligned}$$

Or, $\ln n + \frac{1}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln n + 1$. Donc $H_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln n$.

2. Fixons un entier $n \geq 2$.

$$v_n - v_{n-1} = \frac{1}{n} + \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{n} - \frac{1}{n} = 0$$

par l'inégalité de convexité classique du \ln .

De plus, la comparaison série intégrale donne $v_n \in [0, 1]$.

$(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est décroissante et minorée, d'après le théorème de la limite monotone, elle converge.

On peut donc écrire $H_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \gamma + \ln n + o(\ln n)$ où γ est appelée constante d'Euler.

3. La suite $(v_n - v_{n-1})_{n \geq 2}$ est convergente et de signe constant. On peut alors penser à chercher un équivalent du reste de la série $\sum_{n \geq 2} v_n - v_{n-1}$.

$$\text{On a } v_n - v_{n-1} = \frac{1}{n} + \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{n} - \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{1}{2n^2}.$$

Donc,

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k - v_{k-1} = \gamma - v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sum_{k=n+1}^{+\infty} -\frac{1}{2k^2} = \frac{1}{2} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k}\right) = -\frac{1}{2(n+1)} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{1}{2n}$$

$$\text{On en déduit } v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \gamma + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

Et finalement,

$$H_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

4. Sur le même principe on calcule :

$$\begin{aligned}
 w_n - w_{n-1} &= v_n - v_{n-1} + \frac{1}{2n-2} - \frac{1}{2n} \\
 &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} -\frac{1}{2n^2} - \frac{1}{3n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) + \frac{1}{2n(n-1)} \\
 &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{2n^2(n-1)} - \frac{1}{3n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \\
 &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{2+n}{6n^3(n-1)} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \\
 &\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{6n^3}
 \end{aligned}$$

la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*} = \left(\frac{1}{6n^3}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est positive et $\sum_{n \geq 2} u_n$ converge donc par comparaison de séries convergentes,

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} w_k - w_{k-1} = \left(\lim_{k \rightarrow +\infty} w_k\right) - w_n = -w_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{6n^3}.$$

Or $\frac{1}{n^3} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n+1/2}{n^2(n+1)^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}\right)$ donc :

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{6k^3} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{12} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+1)^2}\right) = \frac{1}{12(n+1)^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{12n^2}$$

Ainsi, $w_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{1}{12n^2}$ puis :

$$H_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

5. On écrit $H_n = \ln n + \gamma + \varepsilon_n$ avec $\varepsilon_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$.

Par définition de k_n on a :

$$\ln(k_n) + \gamma + \varepsilon_{k_n} \geq n \text{ et } \ln(k_n - 1) + \gamma + \varepsilon_{k_n-1} < n$$

Donc on a :

$$e^{n-\gamma-\varepsilon_{k_n}} \leq k_n < 1 + e^{n-\gamma-\varepsilon_{k_n-1}}$$

Or $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $H_n \leq n$ donc $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $k_n \geq n$ d'où $k_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$.

Ainsi $k_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} e^{n-\gamma}$ d'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{k_{n+1}}{k_n} = e$.

XIII.1.4 Suite récurrente (1) ★★

[\[Énoncé\]](#)

1. $u_1 = \sin(u_0) \in [-1, 1]$ et $\sin([-1, 1]) \subset [-1, 1]$ donc $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie et est bornée.

Tout d'abord, si $u_1 = 0$ alors $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = 0$.

De plus $\sin(]0, 1]) \subset]0, 1]$ et \sin est impaire on peut donc supposer, quitte à étudier $(-u_n)$, que $u_1 \in]0, 1]$.

$\forall x \in \mathbb{R}_+, \sin(x) \leq x \implies \forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} = \sin(u_n) \leq u_n$.

(u_n) est décroissante et minorée, d'après le théorème de la limite monotone, (u_n) converge. Notons $L = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

D'une part, \sin est continue en L donc $\sin(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \sin(L)$. D'autre part $(\sin(u_n)) = (u_{n+1})$ est une suite extraite de (u_n) donc $\sin(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} L$. Par unicité de la limite, $L = \sin(L)$.

Posons $f : x \mapsto x - \sin(x)$. f est dérivable sur \mathbb{R} et $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = 1 - \cos(x) \geq 0$. De plus f' ne s'annule qu'en des points isolés (pour $x \in 2\pi\mathbb{Z}$) donc f est strictement croissante sur \mathbb{R} . f étant continue et strictement monotone sur \mathbb{R} , elle est injective sur \mathbb{R} . Ainsi comme $f(L) = f(0)$, on a $L = 0$.

Cherchons $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $(u_{n+1}^\alpha - u_n^\alpha)$ converge en utilisant le DL de \sin en 0.

$$u_{n+1}^\alpha - u_n^\alpha \underset{n \rightarrow +\infty}{=} u_n^\alpha \left[\left(1 - \frac{u_n^2}{6} + o(u_n^2) \right)^\alpha - 1 \right] \underset{n \rightarrow +\infty}{=} u_n^\alpha \left[1 - \alpha \frac{u_n^2}{6} + o(u_n^2) - 1 \right] \underset{n \rightarrow +\infty}{=} -\frac{\alpha}{6} u_n^{\alpha+2} + o(u_n^{\alpha+2}).$$

On choisit alors $\alpha = -2$ et on a $u_{n+1}^{-2} - u_n^{-2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{3} \cdot \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{3}$ diverge et $\left(\frac{1}{3}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ est

de signe constant APCR donc $\sum_{k=0}^{n-1} (u_{k+1}^{-2} - u_k^{-2}) = \frac{1}{u_n^2} - \frac{1}{u_0^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n}{3} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{3}$. Or

$$\frac{1}{u_n^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty \text{ donc } \frac{1}{u_n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{u_n^2} - \frac{1}{u_0^2}.$$

On en déduit $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{3}{n}}$. Si $u_1 < 0$ on a alors $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\sqrt{\frac{3}{n}}$.

2. On reprend le calcul de $u_{n+1}^{-2} - u_n^{-2}$ en poussant le DL un ordre plus loin : $u_{n+1}^{-2} -$

$$u_n^{-2} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{3} - \frac{u_n^2}{60} + o(u_n^2).$$

$$\text{Avec } u_n^2 \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{3}{n} + o\left(\frac{3}{n}\right), \quad u_{n+1}^{-2} - u_n^{-2} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{3} - \frac{1}{20n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

Donc en sommant : $\frac{1}{u_n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{n}{3} - \frac{1}{20} H_{n-1} + o(H_{n-1})$ où $H_{n-1} = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}$ est le $n-1$ -ième terme de la série harmonique.

On montre classiquement que $H_{n-1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln(n-1) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln n$ pour en déduire :

$$\begin{aligned} u_n &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \left(\frac{n}{3} - \frac{1}{20} \ln n + o(\ln n) \right)^{-1/2} \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \sqrt{\frac{3}{n}} \left(1 - \frac{3}{20} \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right) \right)^{-1/2} \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \sqrt{\frac{3}{n}} \left(1 + \frac{3}{40} \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right) \right) \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \sqrt{\frac{3}{n}} + \frac{3\sqrt{3}}{40} \frac{\ln n}{n\sqrt{n}} + o\left(\frac{\ln n}{n\sqrt{n}}\right) \end{aligned}$$

Si $u_1 < 0$ alors le même raisonnement appliqué à $(-u_n)$ donne $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} -\sqrt{\frac{3}{n}} - \frac{3\sqrt{3}}{40} \frac{\ln n}{n\sqrt{n}} + o\left(\frac{\ln n}{n\sqrt{n}}\right)$.

XIII.1.5 Suite récurrente (2)

[\[Énoncé\]](#)

XIII.1.6 Suite récurrente (3)

[\[Énoncé\]](#)

XIII.1.7 Suite récurrente (4) ★★

[\[Énoncé\]](#)

$u_0 > 0$ donc par récurrence immédiate, $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$.

On en déduit que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{u_n^\alpha} > 0$. Donc $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et elle admet alors une limite l dans $\mathbb{R} \cup \{+\infty\}$.

Fixons $n \in \mathbb{N}^*$. En sommant l'égalité précédente, $\sum_{k=0}^{n-1} u_{k+1} - u_k = u_n - u_0 = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{u_k^\alpha}$.

Si (u_n) converge alors $u_n - u_0 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l - u_0 \in \mathbb{R}$ d'où $\sum_{k \geq 0} \frac{1}{u_k^\alpha}$ converge. Cependant,

$\frac{1}{u_k^\alpha} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{l^\alpha} \neq 0$ ($+\infty$ si $l = 0$) donc $\sum_{k \geq 0} \frac{1}{u_k^\alpha}$ diverge grossièrement. Ainsi $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Soit $\beta \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} u_{n+1}^\beta - u_n^\beta &= u_n^\beta \left[\left(1 + \frac{1}{u_n^{\alpha+1}} \right)^\beta - 1 \right] \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} u_n^\beta \left[1 + \frac{\beta}{u_n^{\alpha+1}} + o\left(\frac{1}{u_n^{\alpha+1}}\right) - 1 \right] \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \beta u_n^{\beta-\alpha-1} + o(u_n^{\beta-\alpha-1}) \end{aligned}$$

On choisit $\beta = \alpha + 1$ et on a alors $u_{n+1}^{\alpha+1} - u_n^{\alpha+1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \alpha + 1$ ($\alpha + 1 \neq 0$ puisque $\alpha > -1$).

La série $\sum_{n \geq 0} (\alpha + 1)$ diverge et $(\alpha + 1)_{n \in \mathbb{N}}$ est de signe constant APCR donc par sommation de relations de comparaisons,

$$\sum_{k=0}^{n-1} (u_{k+1}^{\alpha+1} - u_k^{\alpha+1}) = u_n^{\alpha+1} - u_0^{\alpha+1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} (\alpha + 1)n = \sum_{k=0}^{n-1} (\alpha + 1).$$

Or $u_n^{\alpha+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ donc $u_n^{\alpha+1} - u_0^{\alpha+1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} u_n^{\alpha+1}$. D'où $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} ((\alpha + 1)n)^{1/(\alpha+1)}$.

XIII.1.8 Suite récurrente (5)

[Enoncé]

On sait que la fonction $x \mapsto e^{-\frac{x^2}{2}}$ est continue et positive sur \mathbb{R} . Ainsi pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\int_{x_n}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$ est positive, ce qui montre la croissance de la suite (x_n) . Montrons, par l'absurde, que (x_n) n'est pas majorée. D'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, la suite (x_n) admet une sous-suite convergente de limite ℓ telle que :

$$\ell = \ell + \int_{\ell}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

Cette égalité n'est vérifiée pour aucune valeur $\ell \in \mathbb{R}$ par stricte positivité de l'intégrale.

Donc, on a montré que (x_n) n'est pas majorée et donc qu'elle tend vers $+\infty$.

On sait également que $\int_x^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{e^{-x^2}}{2x}$ d'après II.4.

Et donc puisque $x_n \rightarrow +\infty$, on a :

$$x_{n+1} - x_n \sim \frac{e^{-x_n^2}}{2x_n}$$

De plus, puisque $x_n \rightarrow +\infty$ et que $\int_0^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ converge, on en déduit que

$$x_{n+1} \sim x_n$$

On pose la fonction :

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto e^{x^2} \end{cases}$$

. D'après le théorème des accroissements finis, il existe $c_n \in]x_n, x_{n+1}[$ tel que

$$f(x_{n+1}) - f(x_n) = f'(c_n)(x_{n+1} - x_n)$$

Ainsi,

$$f(x_{n+1}) - f(x_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} f'(c_n) \frac{e^{-\frac{x_n^2}{2}}}{2x_n} = \frac{c_n}{x_n} e^{\frac{c_n^2 - x_n^2}{2}}$$

et

$$c_n \sim x_n \text{ par encadrement}$$

Montrons que $c_n^2 - x_n^2 \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} c_n^2 - x_n^2 &= (c_n + x_n)(c_n - x_n) \\ &\sim 2x_n(c_n - x_n) \end{aligned}$$

Or

$$0 \leq 2x_n(c_n - x_n) \leq 2x_n(x_{n+1} - x_n) \sim e^{-\frac{x_n^2}{2}}$$

Donc par encadrement,

$$c_n^2 - x_n^2 \rightarrow 0$$

Par conséquent, $f(x_{n+1}) - f(x_n) \rightarrow 1$.

D'après le lemme de l'escalier I.1, on a

$$e^{x_n^2} \sim n$$

et donc

$$x_n \sim \sqrt{\ln(n)}$$

XIII.1.9 Suite récurrente (6)

[\[Énoncé\]](#)

XIII.1.10 Suite définie implicitement (1) ★★

[\[Énoncé\]](#)

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Notons $f_n : x \in [0, 1] \mapsto nx - \cos(x)$. f_n est dérivable sur $[0, 1]$ et pour tout $x \in [0, 1]$,
 $f'_n(x) = n + \sin(x) \geq 0$ avec égalité si et seulement si $n = 1$ et $x \in -\frac{\pi}{2} + 2\pi\mathbb{Z}$. Ainsi f_n est strictement croissante et donc d'après le théorème de la bijection, f_n est bijective de $[0, 1]$ dans $[f_n(0), f_n(1)] = [-1, n - \cos(1)] \ni 0$.
Donc $\exists ! x_n \in [0, 1]$, $\cos(x_n) = nx_n$.

2. $\forall n \in \mathbb{N}^*, |x_n| = \frac{|\cos(x_n)|}{n} \leq \frac{1}{n}$. Donc $x_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$.
3. $\forall n \in \mathbb{N}^*, f_{n+1}(x_n) = (n+1)x_n - \cos(x_n) = f_n(x_n) + x_n = x_n \geq 0 = f_{n+1}(x_{n+1})$. De plus, il n'y a pas égalité par unicité de x_{n+1} . Donc comme f_n est strictement croissante, $x_n > x_{n+1}$.
Ainsi $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est décroissante.
4. En passant à la limite dans l'équation définissant x_n , on obtient $nx_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1$ c'est-à-dire $x_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$.
5. $x_n - \frac{1}{n} = \frac{\cos(x_n) - 1}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} -\frac{x_n^2}{2n} + o\left(\frac{x_n^2}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{x_n^2}{2n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{1}{2n^2}$.

XIII.1.11 Suite définie implicitement (2)

[\[Énoncé\]](#)

XIII.1.12 Suite définie implicitement (3)

[\[Énoncé\]](#)

XIII.1.13 Suite définie implicitement (4)

[\[Énoncé\]](#)

XIII.1.14 Suite définie implicitement (5) ★★

[\[Énoncé\]](#)

1. Posons pour $n \in \mathbb{N}^*, f_n : x \in \mathbb{R}_+ \mapsto \sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k}$ et fixons $n \in \mathbb{N}^*$.
 f_n est \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R}_+ et $\forall x \in \mathbb{R}_+, f'_n(x) = 1 + \sum_{k=2}^n x^{k-1} > 0$. De plus $f(0) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = +\infty$ donc d'après le théorème de la bijection $f_n - 1$ s'annule exactement une fois sur \mathbb{R}_+ .
2. On remarque que $f_{n+1} \geq f_n$ donc $f_{n+1}(x_n) \geq 0 = f_{n+1}(x_{n+1})$. Par croissance de f_{n+1} on sait alors que $x_{n+1} \leq x_n$.
 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est décroissante et minorée (par 0 par exemple), d'après le théorème de la limite monotone elle converge vers une limite ℓ .

3. $x_1 = 1$ donc $\forall n \geq 2, 0 < x_n \leq x_2 < 1$.

$$\forall n \geq 2, 1 = \sum_{k=1}^n \frac{x_n^k}{k} = \sum_{k=1}^n \int_0^{x_n} t^{k-1} dt = \int_0^{x_n} \sum_{k=1}^n t^{k-1} dt = \int_0^{x_n} \frac{1-t^n}{1-t} dt = -\ln(1-x_n) - \int_0^{x_n} \frac{t^n}{1-t} dt.$$

$$\text{Or } \forall n \geq 2, \left| \int_0^{x_n} \frac{t^n}{1-t} dt \right| \leq \int_0^1 \frac{x_2^n}{1-x_2} dt = \frac{x_2^n}{1-x_2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

$$\text{Donc } \ln(1-x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -1 \text{ i.e. } x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 - e^{-1}.$$

XIII.1.15 Formule d'inversion de Pascal ★★

[\[Énoncé\]](#)

Première méthode matrice de passage ★

1. Les familles \mathcal{B}_c et \mathcal{B}_t sont deux familles à degrés échelonnés de $m+1 = \dim \mathbb{K}_m[X]$ éléments de $\mathbb{K}_m[X]$. Ce sont donc des bases de $\mathbb{K}_m[X]$.

2. Soit $j \in \llbracket 0; m \rrbracket$.

$$(X-1)^j = \sum_{i=0}^j \binom{j}{i} (-1)^{j-i} X^i \text{ donc } \forall (i, j) \in \llbracket 0; m \rrbracket^2, (P_{\mathcal{B}_t}^{\mathcal{B}_c})_{i+1, j+1} = \binom{j}{i} (-1)^{j-i}$$

$$\text{Et, } X^j = (X-1+1)^j = \sum_{i=0}^j \binom{j}{i} (X-1)^i \text{ donc } \forall (i, j) \in \llbracket 0; m \rrbracket^2, (P_{\mathcal{B}_c}^{\mathcal{B}_t})_{i+1, j+1} = \binom{j}{i}$$

$$3. \text{ Fixons } n \in \mathbb{N} \text{ et notons } A_n = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \text{ et } B_n = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

$$\forall p \in \llbracket 0; n \rrbracket, b_p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a_k$$

$$\iff B_n = P_{\mathcal{B}_t}^{\mathcal{B}_c} A_n$$

$$\iff A_n = P_{\mathcal{B}_c}^{\mathcal{B}_t} B_n$$

$$\iff \forall p \in \llbracket 0; n \rrbracket, a_p = \sum_{k=0}^p (-1)^{p-k} \binom{p}{k} b_k$$

Deuxième méthode : binôme de Newton ★★

S est un endomorphisme de $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ qui commute trivialement avec $T = \text{Id}_{\mathbb{C}^{\mathbb{N}}}$.

$$\text{Donc } \forall n \in \mathbb{N}, ((T+S)^n(a))_0 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (S^k \circ T^{n-k})(a)_0 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (S^k(a))_0 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k =$$

b_n .

Et par conséquent,

$$\begin{aligned}
 \forall n \in \mathbb{N}, \quad a_n &= (S^n(a))_0 \\
 &= (T + S - T)^n(a)_0 \\
 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} ((T + S)^k(a))_0 \\
 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} b_k
 \end{aligned}$$

Troisième méthode : par le calcul ★★

$$\begin{aligned}
 1. \quad \sum_{i=0}^p (-1)^{p-i} \binom{p}{i} b_i &= \sum_{i=0}^p (-1)^{p-i} \binom{p}{i} \sum_{j=0}^i \binom{i}{j} a_j = \sum_{0 \leq j \leq i \leq p} (-1)^{p-i} \binom{p}{i} \binom{i}{j} a_j = \sum_{j=0}^p \sum_{i=j}^p (-1)^{p-i} \binom{p}{i} \binom{i}{j} a_j \\
 2. \quad &
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \sum_{j=0}^p \sum_{i=j}^p (-1)^{p-i} \binom{p}{i} \binom{i}{j} a_j &= \sum_{j=0}^p a_j \sum_{i=j}^p \frac{p!}{(p-i)!} \cdot \frac{1}{(i-j)! j!} (-1)^{p-i} \\
 &= \sum_{j=0}^p a_j \sum_{i=0}^{p-j} \frac{p!}{j!} \cdot \frac{1}{i! (p-j-i)!} (-1)^{p-j-i} \\
 &= \sum_{j=0}^p a_j \frac{p!}{j! (p-j)!} \sum_{i=0}^{p-j} (-1)^{p-j-i} \frac{(p-j)!}{i! (p-j-i)!} \\
 &= \sum_{j=0}^p \binom{p}{j} a_j \sum_{i=0}^{p-j} (-1)^{p-j-i} \binom{p-j}{i}
 \end{aligned}$$

$$3. \text{ Si } p-j \neq 0, \text{ alors } \sum_{i=0}^{p-j} (-1)^{p-j-i} \binom{p-j}{i} = (1-1)^{p-j} = 0. \text{ Pour } j=p, \text{ la somme vaut } 1.$$

$$\text{Ainsi, on a montré que } \sum_{i=0}^p (-1)^{p-i} \binom{p}{i} b_i = \binom{p}{p} a_p = a_p.$$

Dérangement ★★★

Notons pour $k \in \llbracket 0; n \rrbracket$, A_k l'ensemble des permutations de $\llbracket 1; n \rrbracket$ ayant exactement k points fixes. On a $\mathcal{S}_n = \bigsqcup_{k=0}^n A_k$ où \bigsqcup représente une union disjointe.

Or si $k \in \llbracket 0; n \rrbracket$, pour construire un élément de A_k on choisit k éléments dans $\llbracket 1; n \rrbracket$ qui reste fixe et on construit un dérangement à partir des $n-k$ éléments restant. Ainsi

$$\forall k \in \llbracket 0; n \rrbracket, \text{Card}(A_k) = \binom{n}{k} D_{n-k}.$$

$$\text{On obtient alors } n! = \text{Card}(S_n) = \sum_{k=0}^n \text{Card}(A_k) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D_{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{n-k} D_k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D_k.$$

$$\text{D'après la formule d'inversion de Pascal on a } D_n = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} k! = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \frac{n!}{(n-k)!} = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}.$$

$$\text{Par conséquent } \frac{D_n}{n!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k} = \frac{1}{e}.$$

Le quotient $\frac{D_n}{n!}$ peut s'interpréter comme la probabilité d'obtenir un dérangement quand on tire au hasard une permutation dans un ensemble à n éléments, en considérant qu'il y a équiprobabilité pour de toutes les issues. On a montré que cette probabilité tend vers $\frac{1}{e} \approx 0,37$ quand on augmente le nombre d'éléments.

XIII.1.16 Théorème de Pringsheim ★★

[\[Énoncé\]](#)

$$\text{On pose pour tout } n \in \mathbb{N}, S_n = \sum_{k=0}^n a_k.$$

$$\text{On a pour tout } n \in \mathbb{N}, S_{2n} - S_n = \sum_{k=n+1}^{2n} a_k \geq na_{2n} \geq 0 \text{ car } (a_n)_{n \geq 0} \text{ est décroissante.}$$

Or comme $\sum_{k \geq 0} a_k$ converge, on en déduit que $S_{2n} - S_n$ tend vers 0. Donc par encadrement, on en déduit que $(na_{2n})_{n \geq 0}$ tend vers 0.

De plus, on remarque que pour tout entier naturel n , $0 \leq (2n+1)a_{2n+1} \leq (2n+1)a_{2n}$. On sait que $a_{2n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ car $\sum_{n \geq 0} a_n$ converge et que $2na_{2n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ d'après ce qui précède. On

en déduit par encadrement que $(2n+1)a_{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Finalement, $na_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

XIII.1.17 Lemme de Fekete

[\[Énoncé\]](#)

XIII.1.18 Théorème de Bolzano-Weierstrass ★★

[Enoncé]

1. Soit $(v_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. On pose $A = \{n \in \mathbb{N} \mid \forall k > n, v_k \geq v_n\}$.
 Si A est infini alors n'importe quelle suite extraite de $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à valeur dans A est croissante.
 Et si A est fini alors il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N, n \notin A$. Autrement dit, $\forall n \geq N, \exists k_n > n, v_{k_n} < v_n$.
 On définit alors $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ par $\varphi(0) = N$ et $\forall n \in \mathbb{N}, \varphi(n+1) = k_{\varphi(n)}$.
 Par définition pour tout $n \in \mathbb{N}, \varphi(n+1) = k_{\varphi(n)} > \varphi(n)$ et $v_{\varphi(n+1)} = v_{k_{\varphi(n)}} < v_{\varphi(n)}$.
 Ainsi, $(v_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite extraite de $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ décroissante.
2. Attention! On ne peut pas utiliser le fait que $\{z \in \mathbb{C}, |z| \leq M\}$ est une partie compacte de \mathbb{C} car la démonstration de ce résultat est l'objet de l'exercice! Posons pour tout $n \in \mathbb{N}, x_n = \operatorname{Re}(u_n)$ et $y_n = \operatorname{Im}(u_n)$. Notons $M \in \mathbb{R}_+$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M$.
 $\forall n \in \mathbb{N}, |x_n| = \sqrt{x_n^2} \leq \sqrt{x_n^2 + y_n^2} = |u_n| \leq M$. De même, $\forall n \in \mathbb{N}, |y_n| \leq M$.
 D'après le lemme des pics appliqué à x_n qui est une suite réelle, il existe φ une application strictement croissante de \mathbb{N} dans \mathbb{N} telle que $(x_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ monotone. On pose alors $\theta = \varphi \circ \psi$. $(x_{\theta(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est monotone comme suite extraite d'une suite monotone. Ensuite, encore d'après le lemme des pics il existe $\alpha : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $(y_{\theta \circ \alpha(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ soit monotone. Alors en posant $\eta = \theta \circ \alpha$, $(y_{\eta(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est monotone par définition et $(x_{\eta(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est monotone en tant que suite extraite de $(x_{\theta(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ qui est elle-même monotone. Etant bornées en tant que suites extraites de suites bornées, d'après le théorème de la limite monotone elles convergent.
 Ainsi, $(u_{\eta(n)})_{n \in \mathbb{N}} = (x_{\eta(n)} + iy_{\eta(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite convergente extraite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Remarque : Le résultat s'étend de manière similaire à tout \mathbb{R} -espace vectoriel de dimension p finie (et donc à tout \mathbb{C} -espace vectoriel de dimension p finie, vu comme un \mathbb{R} -espace vectoriel de dimension $2p$) normé en procédant par récurrence, soit en extrayant de la suite des premières composantes, qui est bornée, une sous-suite convergente, puis une sous-sous-suite de cette sous-suite qui fait converger la suite des secondes composantes et ainsi de suite jusqu'à la suite des p -ième composantes, soit en montrant que le produit cartésien d'un nombre fini de compacts est un compact.

XIII.1.19 \mathbb{R} est complet ★★

[Enoncé]

Soit $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ une suite convergente. On note $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Soit $\varepsilon > 0$.

$\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - l| \leq \frac{\varepsilon}{2}$.

Alors, $\forall (p, q) \in \llbracket N; +\infty \rrbracket, |u_p - u_q| = |u_p - l + l - u_q| \leq |u_p - l| + |l - u_q| \leq \varepsilon$.

Donc $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy.

Soit $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ une suite de Cauchy.

Montrons que (u_n) est bornée, autrement dit que la suite $(|u_n|)$ ne tend pas vers $+\infty$.

Supposons par l'absurde que $\lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n| = +\infty$. Fixons $\varepsilon > 0$.

$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall p > q \geq n_0, |u_p - u_q| \leq \varepsilon$. Et $\exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall p \geq n_1, |u_p| > |u_q| + \varepsilon$.

Donc $\forall p \geq N = \max(q, n_1), \varepsilon < |u_p| - |u_q| \leq |u_p - u_q| \leq \varepsilon$.

Ceci est absurde donc (u_n) est bornée.

Alors d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass (u_n) admet une valeur d'adhérence ℓ .

On note $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $u_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$.

$\forall \varepsilon > 0, \exists n \in \mathbb{N}, \forall k \geq n, |u_{\varphi(n)} - u_n| \leq \varepsilon$.

C'est-à-dire $u_{\varphi(n)} - u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Mais alors par somme, $u_n = u_n - u_{\varphi(n)} + u_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$.

XIII.1.20 Récurrence de Cauchy

[\[Enoncé\]](#)

1. $1 \in A$ donc $0 = 1 - 1 \in A$. Fixons $n \in \mathbb{N}^*$.

Par récurrence immédiate en utilisant le troisième axiome de A , $\forall k \in \mathbb{N}, 2^k \in A$. Comme $(2^k)_{k \in \mathbb{N}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ on sait qu'il existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tel que $2^{k_0} > n$.

Par récurrence immédiate sur le en utilisant le deuxième axiome de A , si $p \in A$ alors $\forall q \in \mathbb{N}, q \leq p \implies q \in A$. Ainsi $n \in A$.

Par double inclusion, $A = \mathbb{N}$.

Remarque : On vient de définir un raisonnement par récurrence. Il est aussi intéressant de noter que le raisonnement fonctionne encore si on remplace la condition " $\forall n \in A, 2n \in A$ " par " $\forall n \in A, \varphi(n) \in A$ " avec φ n'importe quelle fonction de \mathbb{N} dans \mathbb{N} strictement croissante.

2. Notons pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{P}(n) : \forall (x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}_+)^n, \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \geq \left(\prod_{k=1}^n x_k \right)^{1/n}$.

Pour $n = 1$ il n'y a rien à faire. Supposons $\mathcal{P}(n)$ pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$.

Supposons que $n \geq 2$ et montrons $\mathcal{P}(n-1)$. On se donne $(x_1, \dots, x_{n-1}) \in (\mathbb{R}_+)^{n-1}$.

Posons $\forall k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket, y_k = x_k$ ainsi que $y_n = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n-1} x_k$.

On remarque que $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n y_k = \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^{n-1} x_k + \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n-1} x_k \right) = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n-1} x_k$.

$\forall k \in \llbracket 1; n \rrbracket, y_k \geq 0$. Donc par hypothèse de récurrence,

$$\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n-1} x_k = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n y_k \geq \left(\prod_{k=1}^n y_k \right)^{1/n} = \left(\prod_{k=1}^{n-1} x_k \right)^{1/n} \times \left(\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n-1} x_k \right)^{1/n}.$$

On en déduit $\left(\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n-1} x_k\right)^{1-1/n} \geq \left(\prod_{k=1}^{n-1} x_k\right)^{1/n}$ et puis en élevant à la puissance

$$\frac{n}{n-1} : \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n-1} x_k \geq \left(\prod_{k=1}^{n-1} x_k\right)^{1/(n-1)}.$$

D'où $\mathcal{P}(n-1)$.

Montrons maintenant $\mathcal{P}(2n)$. On se donne $(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n) \in (\mathbb{R}_+)^{2n}$. En appliquant deux fois $\mathcal{P}(n)$, une fois sur $\left(\frac{x_1}{2}, \dots, \frac{x_n}{2}\right)$ et une fois sur $\left(\frac{y_1}{2}, \dots, \frac{y_n}{2}\right)$ on a :

$$\frac{1}{2n} \left(\sum_{k=1}^n x_k + \sum_{k=1}^n y_k \right) \geq \left(\prod_{k=1}^n \frac{x_k}{2} \right)^{1/n} \times \left(\prod_{k=1}^n \frac{y_k}{2} \right)^{1/n} =$$

XIII.1.21 Sommes de Riemann

[\[Énoncé\]](#)

XIII.1.22 Formule d'Euler-Maclaurin

[\[Énoncé\]](#)

XIII.1.23 Nature d'une suite

[\[Énoncé\]](#)

XIII.1.24 Valeurs d'adhérence d'une suite

XIII.1.25 Nature d'une série (1) ★

[\[Énoncé\]](#)

On remarque que :

$$\begin{aligned} \sin(\pi\sqrt{1+n^2}) &= \sin\left(\pi n \sqrt{1+\frac{1}{n^2}}\right) \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \sin\left(\pi n \left[1 + \frac{1}{2n^2} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^3}\right)\right]\right) \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} (-1)^n \sin\left(\frac{\pi}{2n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} (-1)^n \frac{\pi}{2n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right) \end{aligned}$$

D'après le critère spécial des séries alternées, $\sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{\pi}{2n}$ converge et d'après le critère de Riemann, $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ converge. De plus $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{n^2} \geq 0$.
Donc $\sum_{n \geq 0} \sin(\pi \sqrt{1+n^2})$ converge.

XIII.1.26 Nature d'une série (2) ★★

[\[Énoncé\]](#)

XIII.1.27 Nature d'une série (3) ★★★

[\[Énoncé\]](#)

Soit $n \geq 2$ un entier.

$$\text{ppcm}(a_1, \dots, a_n) \geq \text{ppcm}(a_{n-1}, a_n) = \frac{a_{n-1}a_n}{\text{pgcd}(a_{n-1}, a_n)} > 0.$$

Or on remarque que $\text{pgcd}(a_{n-1}, a_n) | a_n - a_{n-1} > 0$. Donc $\text{pgcd}(a_{n-1}, a_n) \leq a_n - a_{n-1}$ d'où $\frac{\text{pgcd}(a_{n-1}, a_n)}{a_{n-1}a_n} \leq \frac{a_n - a_{n-1}}{a_{n-1}a_n} = \frac{1}{a_{n-1}} - \frac{1}{a_n}$.

On montre par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $a_n \geq a_1 + n - 1$ et on en déduit que $a_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$.

Ainsi $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{\text{ppcm}(a_1, \dots, a_n)}$ est une série à termes positifs majorée $\left(\text{par } \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{a_{n-1}} - \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a_1} \right)$: elle converge.

XIII.1.28 Nature d'une série (4)

[\[Énoncé\]](#)

XIII.1.29 Nature d'une série (5)

[\[Énoncé\]](#)

XIII.1.30 Calcul d'un équivalent ★★★

[\[Énoncé\]](#)

1^{re} méthode : Somme de Riemann

2nd méthode : Comparaison série-intégrale

Posons $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = n \ln(u_n) = \sum_{k=1}^n k \ln k$ ainsi que $f : t \in \mathbb{R}_+^* \mapsto t \ln t$.

On veut une estimation du type $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} U_n(1 + o(1))$ donc $\ln(u_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln(U_n) + \ln(1 + o(1)) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln(U_n) + o(1)$. Il faut donc estimer S_n à la précision $o(n)$.

f est dérivable sur \mathbb{R}_+^* et $\forall t > 0$, $f'(t) = \ln t + 1$. Donc f est croissante sur $[e^{-1}, +\infty[\subset [1, +\infty[$.

Ainsi si $k \geq 1$ et $t \in [k, k+1]$ on a

$$k \ln k \leq t \ln t \leq (k+1) \ln(k+1)$$

Puis en intégrant de k à $k+1$ et en sommant de 1 à n ,

$$S_n \leq \int_1^{n+1} t \ln t \, dt \leq S_n - 2 \ln 2 + (n+1) \ln(n+1)$$

C'est à dire :

$$2 \ln 2 - (n+1) \ln(n+1) + \int_1^{n+1} t \ln t \, dt \leq S_n \leq \int_1^{n+1} t \ln t \, dt$$

On va seulement utiliser la majoration et minorer S_n par 0. Calculons l'intégrale par IPP :

$$\int_1^{n+1} t \ln t \, dt = \left[\frac{t^2}{2} \ln t \right]_1^{n+1} - \int_1^{n+1} \frac{t}{2} \, dt = \frac{(n+1)^2}{2} \ln(n+1) - \frac{(n+1)^2}{4} + \frac{1}{4}.$$

On rappelle que $\ln(n+1) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln n$ car $\ln(n+1) - \ln n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(1) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(\ln n)$.

$$\text{Donc } \int_1^{n+1} t \ln t \, dt \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{n^2}{2} \ln n - \frac{n^2}{4} + o(n).$$

Posons $T_n = S_n - \frac{n^2}{2} \ln n - \frac{n^2}{4}$. On souhaite estimer T_n et comme sa définition fait intervenir une somme une bonne idée peut être d'essayer d'estimer $T_{n+1} - T_n$ puis de sommer l'estimation obtenue.

$$\begin{aligned} T_{n+1} - T_n &= (n+1) \ln(n+1) + \frac{(n+1)^2}{2} \ln(n+1) - \frac{(n+1)^2}{4} - \frac{n^2}{2} \ln n + \frac{n^2}{4} \\ &= \end{aligned}$$

XIII.1.31 Sommation de relation de comparaison

[\[Énoncé\]](#)

XIII.1.32 Equivalent de séries de Riemann

[\[Énoncé\]](#)

XIII.1.33 Séries de Bertrand

[\[Énoncé\]](#)

XIII.1.34 Critère de Raabe-Duhamel ★★

[\[Énoncé\]](#)

1. APCR, on a $\frac{v_n}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{u_{n+1}}$ c'est-à-dire $\left(\frac{v_n}{u_n}\right)$ est croissante APCR. Donc, pour un certain $N \in \mathbb{N}$, on a pour tout $n \geq N$, $\frac{v_N}{u_N} \leq \frac{v_n}{u_n}$, c'est-à-dire $0 \leq u_n \leq \frac{u_N}{v_N} v_n$.
Et donc $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}(v_n)$
2. — Soit $\gamma \in]1, \alpha[$. On remarque que $\left(\frac{n}{n+1}\right)^\gamma = \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^\gamma \underset{n \rightarrow +\infty}{=} 1 - \frac{\gamma}{n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right)$.
Ainsi $\frac{u_{n+1}}{u_n} - \frac{n^\gamma}{(n+1)^\gamma} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{\gamma - \alpha}{n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right)$.
Donc $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{n^\gamma}{(n+1)^\gamma}$. Et d'après la question 1, on a : $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^\gamma}\right)$.
Et donc $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge.
- On prend cette fois $\gamma \in]\alpha, 1[$. On a : $\frac{1}{n^\gamma} \mathcal{O}(u_n)$, et donc $\sum_{n \geq 0} u_n$ diverge.
- On peut prendre $u_n = \frac{1}{n}$ et $v_n = \frac{1}{n \ln(n)^2}$ pour montrer que l'on ne peut conclure quand $\alpha = 1$.

XIII.1.35 Règle de d'Alembert

[\[Énoncé\]](#)

XIII.1.36 Règle de Cauchy

[\[Énoncé\]](#)

XIII.1.37 d'Alembert \Rightarrow Cauchy[\[Énoncé\]](#)**XIII.1.38 Transformation d'Abel et règle d'Abel**[\[Énoncé\]](#)**Une série de Dirichlet****XIII.1.39 Equation différentielle discrète ★★ ★**[\[Énoncé\]](#)

1. La série $\sum a_n^2$ est à termes positifs donc la suite (S_n) converge ou diverge vers $+\infty$. Supposons qu'elle converge vers un certain $l \in \mathbb{R}$. Puisque pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n \geq a_1^2 > 0$, l est strictement positif. Donc (a_n) converge vers $\frac{1}{l}$. Or ceci est absurde car $\sum a_n^2$ divergerait grossièrement. Par conséquent, la série $\sum a_n^2$ diverge vers $+\infty$ et a_n tend vers 0.
2. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $y \in [S_{n-1}, S_n]$
Par croissance de $t \rightarrow t^2$ sur \mathbb{R}^+ ,

$$(S_n - S_{n-1})S_{n-1}^2 \leq \int_{S_{n-1}}^{S_n} t^2 dt \leq (S_n - S_{n-1})S_n^2$$

On remarque que $(S_n - S_{n-1})S_{n-1}^2 = a_n^2 S_{n-1}^2 = a_n^2 (S_n - a_n)^2 = a_n^2 S_n^2 - 2S_n a_n^3 + a_n^4$
Puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n S_n = 1$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$, on en déduit que $\int_{S_{n-1}}^{S_n} t^2 dt \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1$ d'après le théorème des gendarmes.

3. On remarque que $\sum_{k=1}^n \int_{S_{k-1}}^{S_k} t^2 dt = \int_0^{S_n} t^2 dt = \frac{S_n^3}{3}$.

Or $\int_{S_{n-1}}^{S_n} t^2 dt \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 1$ donc par sommation de relation de comparaison pour les séries divergentes à termes positifs, $\sum_{k=1}^n \int_{S_{k-1}}^{S_k} t^2 dt \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n$. Par conséquent, on a $S_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt[3]{3n}$.

Et finalement $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt[3]{3n}}$.

XIII.1.40 Critère spécial des séries alternées

[Enoncé]

XIII.1.41 Calcul d'une somme de série (1) ★★

[Enoncé]

$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \cdot \frac{1}{u_n} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^3}\right)$ donc $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{u_n}$ converge par comparaison

à une série de Riemann.

On décompose en éléments simples $F(X) = \frac{6}{X(X+1)(2X+1)} = \frac{a}{X} + \frac{b}{X+1} + \frac{c}{2X+1}$.

$$\begin{cases} a = \lim_{x \rightarrow 0} xF(x) = 6 \\ b = \lim_{x \rightarrow -1} (x+1)F(x) = 6 \\ c = \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} (2x+1)F(x) = -24 \end{cases} \quad \text{Donc} \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{u_n} = 6 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} - \frac{4}{2n+1}$$

Posons pour $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{u_k}$ ainsi que $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

On montre classiquement que $H_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln(n) + \gamma + \mathcal{O}(1)$ où γ est une constante.

Ainsi,

$$\begin{aligned} \frac{1}{6} S_n &= H_n + H_{n+1} - 1 - 4 \left(\sum_{k=2}^{2n+1} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k} \right) \\ &= H_n + H_{n+1} - 1 - 4(H_{2n+1} - 1) + 2H_n \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} 3 \ln(n) + \gamma + \ln(n+1) + 3\gamma + 3 - 4 \ln(2n+1) - 4\gamma + \mathcal{O}(1) \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln \left(\frac{n^3(n+1)}{(2n+1)^4} \right) + 3 + \mathcal{O}(1) \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} 3 - \ln(16) + \mathcal{O}(1) \end{aligned}$$

Finalement, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{u_n} = 18 - 24 \ln(2)$.

XIII.1.42 Calcul d'une somme de série (2) ★

[Enoncé]

1^{re} méthode :

$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}}$. La fonction $f : x \mapsto \frac{1}{1+x}$ est continue sur $[0, 1]$ donc $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$

converge et,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1-0}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)dx = \ln 2.$$

2^{me} méthode :

$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} = H_{2n} - H_n$, avec $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$. En utilisant le développement asymptotique classique de la série harmonique, $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln(2n) + \gamma - \ln(n) - \gamma + o(1) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln(2) + o(1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ln(2)$.

XIII.1.43 Calcul d'une somme de série (3) ★★

[\[Énoncé\]](#)

XIII.1.44 Problème de Bâle

[\[Énoncé\]](#)

Lemme de Riemann-Lebesgue

Série de fonctions

Série entière

XIII.1.45 Nombre moyen de diviseurs d'un entier ★★★★★

[\[Énoncé\]](#)

1. Soit $x \in [1, +\infty[$.

$$\begin{aligned}
 F(x) &= \sum_{n=1}^{\lfloor x \rfloor} \sum_{d|n} 1 \\
 &= \sum_{n=1}^{\lfloor x \rfloor} \sum_{\substack{(d,d') \in \llbracket 1;x \rrbracket^2 \\ dd'=n}} 1 \\
 &= \sum_{\substack{(d,d') \in \llbracket 1;x \rrbracket^2 \\ dd' \in \llbracket 1;x \rrbracket}} 1 \\
 &= \sum_{d \leq x} \sum_{d' \leq \frac{x}{d}} 1 \\
 &= \sum_{d=1}^{\lfloor x \rfloor} \left\lfloor \frac{x}{d} \right\rfloor
 \end{aligned}$$

Or, $\forall d \in \llbracket 1;x \rrbracket$, $\frac{x}{d} - 1 < \left\lfloor \frac{x}{d} \right\rfloor \leq \frac{x}{d}$.

On en déduit l'encadrement :

$$\sum_{d=1}^{\lfloor x \rfloor} \left(\frac{x}{d} - 1 \right) < F(x) \leq \sum_{d=1}^{\lfloor x \rfloor} \frac{x}{d}$$

Ou encore,

$$x \sum_{d=1}^{\lfloor x \rfloor} \frac{1}{d} - \lfloor x \rfloor < F(x) \leq x \sum_{d=1}^{\lfloor x \rfloor} \frac{1}{d}$$

Or on sait que $\sum_{d=1}^{\lfloor x \rfloor} \frac{1}{d} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \ln \lfloor x \rfloor \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \ln x$.

Donc par encadrement, $F(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} x \ln x$.

2. Il ne sert à rien de pousser le développement de $\sum_{d=1}^{\lfloor x \rfloor} \frac{1}{d}$ un cran plus loin car dans l'en-

cadrement de $F(x)$ ci-dessus, l'écart entre le majorant et le minorant est en $\mathcal{O}(x)$. Pour avoir un développement asymptotique à l'ordre 2 on va utiliser une autre expression de $F(x)$. L'idée est de couper la somme $F(x) = \sum_{\substack{(d,d') \in \llbracket 1;x \rrbracket^2 \\ dd' \in \llbracket 1;x \rrbracket}} 1$ selon la position de d et

d' par rapport à \sqrt{x} . Si $dd' \leq x$, on a toujours $d \leq \sqrt{x}$ ou $d' \leq \sqrt{x}$. Par conséquent, on a

$$F(x) = 2 \sum_{\substack{d \in \llbracket 1; \sqrt{x} \rrbracket \\ dd' \in \llbracket 1;x \rrbracket}} 1 - \sum_{(d,d') \in \llbracket 1; \sqrt{x} \rrbracket^2} 1$$

ce qui donne

$$F(x) = 2 \sum_{d \leq \sqrt{x}} \left\lfloor \frac{x}{d} \right\rfloor - \lfloor \sqrt{x} \rfloor^2$$

et alors,

$$\begin{aligned} \forall u \in \mathbb{R}, u - 1 < \lfloor u \rfloor \leq u &\implies 2 \sum_{d=1}^{\lfloor \sqrt{x} \rfloor} \left(\frac{x}{d} - 1 \right) - x \leq F(x) \leq 2 \sum_{d=1}^{\lfloor \sqrt{x} \rfloor} \frac{x}{d} - (\sqrt{x} - 1)^2 \\ &\implies F(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} 2x \sum_{d=1}^{\lfloor \sqrt{x} \rfloor} \frac{1}{d} + \mathcal{O}(\sqrt{x}) - x + \mathcal{O}(\sqrt{x}) \end{aligned}$$

Avec

$$\begin{aligned} \sum_{d=1}^{\lfloor \sqrt{x} \rfloor} \frac{1}{d} &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} \ln \lfloor \sqrt{x} \rfloor + \gamma + \mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} \ln(\sqrt{x} + \mathcal{O}(1)) + \gamma + \mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} \ln(\sqrt{x}) + \ln\left(1 + \mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\right) + \gamma + \mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{2} \ln x + \gamma + \mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) \end{aligned}$$

On obtient enfin,

$$F(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} x \ln x + (2\gamma - 1)x + \mathcal{O}(\sqrt{x})$$

XIII.1.46 Théorème de réarrangement de Riemann ★★★★★

[Enoncé]

Montrons dans un premier temps que la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ prend une infinité de valeurs positives et négatives. On note $P = \{n \in \mathbb{N}, a_n \geq 0\}$ et $N = \mathbb{N} \setminus P = \{n \in \mathbb{N}, a_n < 0\}$

Supposons par l'absurde que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ prenne un nombre fini de valeurs négatives.

Alors on peut noter $n_0 = \max N$ et dans ce cas la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ est de même nature que

$$\sum_{n > n_0} a_n = \sum_{n > n_0} |a_n|. \text{ Donc } \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n \text{ diverge ce qui est absurde.}$$

De même, $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne peut pas prendre un nombre fini de valeurs positives.

P admet alors un minimum en tant que partie non vide de \mathbb{N} .

On va construire σ par récurrence :

$$\text{on pose } \sigma(0) = 0, S_n = \sum_{k=0}^n a_{\sigma(k)} \text{ et pour tout } n \in \mathbb{N}, \sigma(n+1) = \begin{cases} \min(P \setminus \{\sigma(k), k \in \llbracket 0; n \rrbracket\}) & \text{si } S_n < 0 \\ \min(N \setminus \{\sigma(k), k \in \llbracket 0; n \rrbracket\}) & \text{si } S_n \geq 0 \end{cases}$$

σ est injective par définition. Montrons qu'elle est surjective.

Supposons par l'absurde qu'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ qui ne soit pas dans l'image de σ (0 l'est par définition). Deux cas se posent :

- Si $k \in P$, alors σ ne prend qu'un nombre fini de valeurs dans P (incluses dans $\llbracket 0; k-1 \rrbracket$), donc à partir du rang $k+1$, σ est à valeurs dans N et donc $\forall n \geq k+1, S_n \geq \alpha$. La suite $(S_n)_{n>k}$ est décroissante en tant que suite des sommes partielles d'une série à termes négatifs, étant minorée elle converge et donc $\sum_{n>k} a_{\sigma(n)}$ converge absolument.

Ceci contredit ce qui a été démontré en préambule donc $k \in \sigma(\mathbb{N})$.

- Si $k \in N$ alors de même, $\sum_{n>k} a_{\sigma(n)}$ ne peut pas converger absolument.

Ainsi σ est bien bijective de \mathbb{N} dans \mathbb{N} .

Montrons maintenant que $\sum_{n=0}^{+\infty} a_{\sigma(n)} = \alpha$. Fixons $\varepsilon > 0$.

Comme la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ converge, on a $a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. On a aussi $a_{\sigma(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. En effet,

$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |a_n| < \varepsilon$. Puis par injectivité de σ , $E = \{n \in \mathbb{N}, \sigma(n) < n_0\}$ est fini. On en déduit que $\forall n \geq n_1 = \max(n_0, \max(E))$, $|a_{\sigma(n)}| < \varepsilon$.

D'après ce qui a été fait en préambule, $\exists p > n_1, \sigma(p) \in P \wedge \sigma(p+1) \in N$. Montrons que $\forall n \geq p, |S_n - \alpha| \leq \varepsilon$.

$\sigma(p) \in P \implies S_{p-1} < \alpha$ et $\sigma(p+1) \in N \implies S_p \geq \alpha$. Or $|S_p - S_{p-1}| = |a_{\sigma(p+1)}| < \varepsilon$.

Ainsi $S_p \in [\alpha - \varepsilon, \alpha + \varepsilon]$. Fixons $n > p$.

Supposons par l'absurde que $S_n > \alpha + \varepsilon$. Comme on passe de S_{n-1} à S_n par un saut de longueur $a_{\sigma(n)} < \varepsilon$, on ne peut avoir $S_{n-1} < \alpha$. Cela entraîne $a_{\sigma(n)} < 0$ et donc $S_{n-1} > S_n$. Mais alors de proche en proche, on obtient $\alpha + \varepsilon < S_n < \dots < S_p$ ce qui est absurde. Donc $S_n \leq \alpha + \varepsilon$.

Supposons par l'absurde que $S_n < \alpha - \varepsilon$. Comme on passe de S_{n-1} à S_n par un saut de longueur $a_{\sigma(n)} < \varepsilon$, on ne peut avoir $S_{n-1} \geq \alpha$. Cela entraîne $a_{\sigma(n)} \geq 0$ et donc $S_{n-1} \leq S_n$. Mais alors de proche en proche, on obtient $\alpha - \varepsilon > S_n \geq S_{n-1} \geq \dots \geq S_p$ ce qui est absurde.

Donc $S_n \geq \alpha - \varepsilon$.

Finalement, $|S_n - \alpha| \leq \varepsilon$.

On a donc construit une bijection σ de \mathbb{N} dans \mathbb{N} telle que $\sum_{n=0}^{+\infty} a_{\sigma(n)} = \alpha$.

XIII.1.47 Moyennes arithmétique, géométrique et harmonique ★

[Enoncé]

On rappelle que \ln est concave sur \mathbb{R}_+^* .

$\sum_{k=1}^n \frac{1}{n} = 1$ et $\frac{1}{n} \geq 0$ donc d'après l'inégalité de Jensen :

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln(a_k) \leq \ln \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \right)$$

C'est à dire par passage à l'exponentielle,

$$G_n = \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n a_k} \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k = A_n$$

$-\ln$ est convexe sur \mathbb{R}_+^* .

$\sum_{k=1}^n \frac{1}{n} = 1$ et $\frac{1}{n} \geq 0$ donc d'après l'inégalité de Jensen :

$$-\ln(G_n) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(\frac{1}{a_k} \right) \leq \ln \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} \right) = -\ln(H_n)$$

D'où,

$$G_n \geq H_n$$

XIII.1.48 Inégalité de Carleman

[\[Énoncé\]](#)

XIII.2 Correction Intégrale

XIII.2.1 Règle de Bioche

[Enoncé]

XIII.2.2 Intégrale de Wallis ★★

[Enoncé]

Cet exercice n'est pas guidé car il s'agit d'un classique à connaître vraiment par cœur.

1. Trouvons une relation de récurrence.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Les fonctions \sin et $t \mapsto \sin(t)^{n+1}$ sont de classe \mathcal{C}^1 donc par IPP, on a :

$$\begin{aligned} W_{n+2} &= [-\cos(t) \sin(t)^{n+1}]_0^{\frac{\pi}{2}} + (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t)^2 \sin(t)^n dt \\ &= (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin(t)^2) \sin(t)^n dt \\ &= (n+1)W_n - (n+1)W_{n+2} \end{aligned}$$

C'est-à-dire : $(n+2)W_{n+2} = (n+1)W_n$.

Maintenant, montrons par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, (n+1)W_n W_{n+1} = \frac{\pi}{2}$

Pour $n=0$, on a $W_0 = \frac{\pi}{2}$ et $W_1 = 1$, donc la relation est bien vérifiée.

Supposons que pour un certain $n \in \mathbb{N}$, on a $(n+1)W_n W_{n+1} = \frac{\pi}{2}$

$$\begin{aligned} (n+2)W_{n+2}W_{n+1} &= (n+2) \frac{n+1}{n+2} W_n W_{n+1} && \text{d'après ce qui précède} \\ &= (n+1)W_n W_{n+1} \\ &= \frac{\pi}{2} && \text{d'après HR} \end{aligned}$$

Donc, on a montré par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(n+1)W_n W_{n+1} = \frac{\pi}{2}$

Il ne nous reste plus qu'à montrer que $W_n \sim W_{n+1}$.

Pour cela, montrons que (W_n) est décroissante.

On sait que pour tout $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $0 \leq \sin(t) \leq 1$. Ainsi pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$, on

a $0 \leq \sin(t)^{n+1} \leq \sin(t)^n$. Et donc par croissance de l'intégrale, on a, $0 \leq W_{n+1} \leq W_n$.

Ainsi, on en déduit que (W_n) est décroissante et donc : $\forall n \in \mathbb{N}$, $W_{n+2} \leq W_{n+1} \leq W_n$

cad $\frac{n+1}{n+2}W_n \leq W_{n+1} \leq W_n$.

Par conséquent, on a $W_{n+1} \sim W_n$.

Finalement, puisque $(n+1)W_n W_{n+1} = \frac{\pi}{2}$, on a $nW_n^2 \sim \frac{\pi}{2}$.

Et donc ainsi $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$.

2. On a démontré que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(n+2)W_{n+2} = (n+1)W_n$.

Ainsi, on a $\forall n \in \mathbb{N}$, $\frac{W_{2n+2}}{W_{2n}} = \frac{2n+1}{2n+2}$, donc

$$\begin{aligned} \prod_{k=0}^{n-1} \frac{W_{2k+2}}{W_{2k}} &= \prod_{k=0}^{n-1} \frac{2k+1}{2k+2} \\ \implies \frac{W_{2n}}{W_0} &= \frac{1}{2^{n-1}n!} \prod_{k=0}^{n-1} (2k+1) \\ \implies W_{2n} &= \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

De la même manière, on obtient : $\forall n \in \mathbb{N}$, $W_{2n+1} = \frac{2^{2p}(p!)^2}{(2p+1)!}$

On peut également montrer ces résultats par récurrence.

XIII.2.3 Formule de Stirling

[\[Enoncé\]](#)

XIII.2.4 Intégrale de Gauss

[\[Enoncé\]](#)

Wallis

Intégrales auxiliaires

Equivalent du reste

XIII.2.5 Intégrale de Fresnel ★★

[\[Enoncé\]](#)

$$1. \text{ Notons } f : \begin{cases} (\mathbb{R}_+)^2 & \longrightarrow \mathbb{C} \\ (x, t) & \longmapsto \frac{e^{-(t^2+i)x^2}}{t^2+i} \end{cases}.$$

— Pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $t \mapsto f(x, t) \in \text{CM}(\mathbb{R}_+, \mathbb{C})$ et $|f(x, t)| = \frac{e^{-(xt)^2}}{\sqrt{t^4+1}} \leq \frac{1}{\sqrt{t^4+1}} \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{t^2}$ donc $t \mapsto f(x, t) \in L^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{C})$;

- Pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, $x \mapsto f(x, t) \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{C})$ et $\forall (x, t) \in (\mathbb{R}_+)^2$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = -2xe^{-(t^2+i)x^2}$;
- $\forall x \in \mathbb{R}_+$, $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \in \text{CM}(\mathbb{R}_+, \mathbb{C})$;
- Soient a, b deux réels tels que $0 < a \leq b$.
 $\forall x \in [a, b]$, $\forall t \in \mathbb{R}_+$, $\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| = 2xe^{-(tx)^2} \leq 2be^{-(ta)^2}$.
 Et la fonction $\varphi : t \mapsto 2be^{-(ta)^2}$ est intégrable sur \mathbb{R}_+ puisqu'elle est continue par morceaux sur \mathbb{R}_+ et que $\varphi(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$ (car $a > 0$).

Ainsi d'après le théorème de transfert \mathcal{C}^1 , I est \mathcal{C}^1 sur $\bigcup_{0 < a \leq b} [a, b] = \mathbb{R}_+^*$ et, $\forall x \in$

$$\mathbb{R}_+^*, I'(x) = \int_0^{+\infty} -2xe^{-(t^2+i)x^2} dt.$$

2. Fixons $x \in \mathbb{R}_+^*$. Posons $u = tx$:

$$I'(x) = -2xe^{-ix^2} \int_0^{+\infty} e^{-(tx)^2} dt = -2e^{-ix^2} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = -\sqrt{\pi} e^{-ix^2}.$$

De plus, pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$, $f(x, t) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ et pour tout $(x, t) \in (\mathbb{R}_+)^2$, $|f(x, t)| \leq \frac{1}{\sqrt{t^4+1}}$. Donc d'après le théorème de convergence dominée, $\lim_{x \rightarrow +\infty} I(x) = \int_0^{+\infty} 0 dt = 0$.

Donc en intégrant l'expression de 0 à $+\infty$, $\int_0^{+\infty} e^{-it^2} dt = \frac{I(0)}{\sqrt{\pi}}$.

Enfin, $I(0) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{t^2+i} dt = \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{t^4+1} dt - i \int_0^{+\infty} \frac{1}{t^4+1} dt$. On pose $u = \frac{1}{t}$ dans la première intégrale pour avoir :

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^2}{t^4+1} dt = \int_{+\infty}^0 \frac{\frac{1}{u^2}}{\frac{1}{u^4}+1} \left(-\frac{du}{u^2}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{u^4+1} du.$$

On peut alors écrire

$$\begin{aligned} 4 \int_0^{+\infty} \frac{1}{u^4+1} du &= \int_0^{+\infty} \frac{2(u^2+1)}{u^4+1} du \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{2(u^2+1)}{(u^2+1)^2 - (u\sqrt{2})^2} du \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{u^2 - u\sqrt{2} + 1 + u^2 + u\sqrt{2} + 1}{(u^2 - u\sqrt{2} + 1)(u^2 + u\sqrt{2} + 1)} du \\ &= \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{u^2 - u\sqrt{2} + 1} + \frac{1}{u^2 + u\sqrt{2} + 1} \right) du \end{aligned}$$

Et donc $\int_0^{+\infty} \frac{1}{u^4+1} du = \sqrt{2} \left[\arctan(u\sqrt{2}-1) + \arctan(u\sqrt{2}+1) \right]_0^{+\infty} = \pi\sqrt{2}$ d'où

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{u^4 + 1} du = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

$$\text{Finalement, } \int_0^{+\infty} e^{-it^2} dt = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \times \frac{\pi}{2\sqrt{2}}(1-i) = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{1-i}{2}.$$

XIII.2.6 Intégrale de Dirichlet

[\[Enoncé\]](#)

Semi-convergence ★★

La fonction $f : t \mapsto \frac{\sin t}{t}$ est continue par morceaux sur \mathbb{R}_+^* et est prolongeable par continuité en 0 en posant $f(0) = 1$.

Convergence :

Les fonctions $t \mapsto -\cos t$ et $t \mapsto \frac{1}{t}$ sont \mathcal{C}^1 sur $[1, +\infty[$ (le crochet ne converge pas si on intègre en 0) et $\lim_{t \rightarrow +\infty} -\frac{\cos t}{t} = 0$ donc par IPP,

$$\int_1^{+\infty} f(t) dt = \left[-\frac{\cos(t)}{t} \right]_1^{+\infty} - \int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt = \cos(1) - \int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt.$$

La dernière intégrale converge puisque $\frac{\cos t}{t^2} \underset{t \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}\left(\frac{1}{t^2}\right)$.

$$\text{Ainsi } \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \int_0^1 \frac{\sin t}{t} dt + \cos(1) - \int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt \text{ converge.}$$

Non convergence absolue :

première méthode :

$$\text{Dans } \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}, \int_0^{+\infty} \frac{|\sin t|}{t} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt.$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt = \int_0^\pi \frac{|\sin(t+n\pi)|}{t+n\pi} dt = \int_0^\pi \frac{|\sin t|}{t+n\pi} dt = \int_0^\pi \frac{\sin t}{t+n\pi} dt \geq \int_0^\pi \frac{\sin t}{(n+1)\pi} dt = \frac{2}{(n+1)\pi}.$$

Ainsi $\int_0^{+\infty} \frac{|\sin t|}{t} dt$ diverge par comparaison à une série de Riemann.

deuxième méthode :

On remarque que comme pour tout réel positif t , $|\sin t| \leq 1$, On a l'inégalité $|\sin t| \geq \sin^2(t) = \frac{1 - \cos(2t)}{2}$.

D'une part, par une IPP similaire à celle que l'on a utilisé pour montrer la convergence de l'intégrale de Dirichlet on montre que $\int_1^{+\infty} \frac{\cos(2t)}{2t} dt$ converge. D'autre part $\int_0^{+\infty} \frac{1}{2t} dt = +\infty$

et enfin $\int_0^1 \frac{|\sin t|}{t} dt$ converge.

Finalement, $\int_0^{+\infty} \frac{|\sin t|}{t} dt \geq \int_0^1 \frac{|\sin t|}{t} dt + \int_1^{+\infty} \frac{1}{2t} dt + \int_1^{+\infty} \frac{\cos(2t)}{2t} dt$ diverge vers $+\infty$.

Une autre expression ★★

On remarque que $t \mapsto 1 - \cos(t)$ est une primitive de \sin sur \mathbb{R}_+^* et que $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(t)}{t} = -\cos'(0) = \sin(0) = 0$ donc par IPP :

$$I = \left[\frac{1 - \cos(t)}{t} \right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos(t)}{t^2} dt = \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos(2t)}{(2t)^2} \frac{dt}{2} = \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos(2t)}{2t^2} dt = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(t)}{t^2} dt.$$

Premier calcul ★★

1. Montrons d'abord que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie. Fixons $n \in \mathbb{N}$.

$f_n : t \mapsto \frac{\sin((2n+1)t)}{\sin(t)}$ est continue par morceaux sur $]0, \pi/2]$ et $f_n(t) \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \frac{(2n+1)t}{t} = 2n+1$ donc l'intégrale est faussement impropre en 0.

Ensuite, $\sin((2n+3)t) - \sin((2n+1)t) = \sin((2n+2)t+t) - \sin((2n+2)t-t) = 2\sin(t)\cos((2n+2)t)$.

Ainsi $u_{n+1} - u_n = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{\sin(t)} (\sin((2n+3)t) - \sin((2n+1)t)) dt = \int_0^{\pi/2} 2\cos((2n+2)t) dt = \left[\frac{\sin((2n+2)t)}{n+1} \right]_0^{\pi/2} = 0$. On en déduit que u_n est constamment égal à $u_0 = \int_0^{\pi/2} dt = \frac{\pi}{2}$.

2. Tout d'abord, v_n est bien défini pour tout $n \in \mathbb{N}$ pour les mêmes raisons que u_n . Notons

$$\varphi : t \mapsto \frac{1}{\sin(t)} - \frac{1}{t}.$$

φ est de classe \mathcal{C}^1 sur $]0, \pi/2]$ et,

$$\varphi(t) = \frac{t - \sin(t)}{t \sin(t)} \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \frac{\frac{t^3}{6} + o(t^3)}{t \sin(t)} \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \frac{\frac{t^3}{6}}{t^2} = \frac{t}{6} \underset{t \rightarrow 0}{\longrightarrow} 0 \text{ puis,}$$

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= -\frac{\cos(t)}{\sin^2(t)} + \frac{1}{t^2} = \frac{\sin^2(t) - t^2 \cos(t)}{t^2 \sin^2(t)} \underset{t \rightarrow 0}{=} \frac{t^2 \left(1 - \frac{t^2}{6} + o(t^2)\right)^2 - t^2 \left(1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2)\right)}{t^2 \sin^2(t)} \underset{t \rightarrow 0}{=} \\ &\frac{\frac{t^2}{3} + o(t^2)}{\sin^2(t)} \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{3} \underset{t \rightarrow 0}{\longrightarrow} \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Ainsi φ est prolongeable en une fonction de classe \mathcal{C}^1 sur $[0, \pi/2]$ en posant $\varphi(0) = \frac{1}{6}$ et

$$\varphi'(0) = \frac{1}{3}.$$

On peut donc faire une IPP :

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n - u_n = \int_0^{\pi/2} \sin((2n+1)t) \varphi(t) dt = \left[-\frac{\cos((2n+1)t)}{2n+1} \varphi(t) \right]_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \frac{\cos((2n+1)t)}{2n+1} \varphi'(t) dt$$

Or d'après le théorème des bornes atteintes, φ et φ' sont bornées sur $[0, \pi/2]$. Ainsi en notant M un majorant de φ et M' un majorant de φ' sur $[0, \pi/2]$,

$$\forall n \in \mathbb{N}, |v_n - u_n| \leq \frac{2M}{2n+1} + \frac{\pi M'}{2(2n+1)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Par conséquent $v_n - u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

3. D'après ce qui a été fait précédemment on sait que $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2}$.

$$\text{Or } \forall n \in \mathbb{N}, v_n = \int_0^{(2n+1)\pi} \frac{\sin(t)}{t} \cdot \frac{dt}{2n+1} = \int_0^{(2n+1)\pi} \frac{\sin(t)}{t} dt.$$

Il reste à montrer que l'intégrale de Dirichlet converge (cf. II.6) pour avoir $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = I$

et donc $I = \frac{\pi}{2}$.

Second calcul ★★

$$1. \text{ Notons } f : \begin{cases} (\mathbb{R}_+^*)^2 & \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, t) & \longmapsto \frac{\sin(t)}{t} e^{-xt} \end{cases}.$$

— Si $x \in \mathbb{R}_+^*$, $f(x, t) \xrightarrow{t \rightarrow 0} 1$ et $f(x, t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$. Donc $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $t \mapsto f(x, t) \in \text{CM}(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$;

— $\forall t \in \mathbb{R}_+^*$, $x \mapsto f(x, t) \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$. $\forall (x, t) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = -\sin(t)e^{-xt}$;

— $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \in \text{CM}(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$;

— Soit $a > 0$. $\forall x \in [a, +\infty[$, $\forall t \in \mathbb{R}_+^*$, $\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq e^{-at}$.

$$\varphi : t \mapsto \frac{|\sin(t)|}{t} e^{-at} \in L^1(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R}).$$

Ainsi d'après le théorème de transfert \mathcal{C}^1 , $F \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$ et $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $F'(x) = -\int_0^{+\infty} \sin(t) e^{-xt} dt$.

Pour calculer cette intégrale on passe en complexe : $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $F'(x) = -\text{Im} \left(\int_0^{+\infty} e^{(i-x)t} dt \right)$

(qui converge absolument).

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \int_0^{+\infty} e^{(i-x)t} dt = \left[\frac{e^{(i-x)t}}{i-x} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} = \frac{1}{x-i} = \frac{x+i}{|x-i|^2} = \frac{x}{1+x^2} + \frac{1}{1+x^2} i.$$

On en déduit que $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $F'(x) = -\frac{1}{1+x^2}$.

2. Donc $\exists C \in \mathbb{R}$, $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $F(x) = -\arctan(x) + C$.

Montrons que F tend vers 0 en $+\infty$ à l'aide du théorème de convergence dominée. On a

déjà fait la domination dans la question 1.

De plus, pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$, $f(x, t) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ et la fonction nulle est continue par morceaux sur \mathbb{R}_+^* .

Ainsi $F(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} 0 \, dt = 0$ et $C = \frac{\pi}{2}$.

Enfin arctan étant continue en 0, F l'est aussi et en faisant tendre x vers 0 on obtient :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt = F(0) = -\arctan(0) + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$$

XIII.2.7 Intégrale du reste de l'intégrale de Dirichlet ★★

[Enoncé]

On sait (cf. II.6) que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$ l'intégrale $\int_x^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ converge.

Alors d'après le théorème fondamental de l'analyse $F : x \mapsto \int_x^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ est \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R}_+ de dérivée $F' = x \mapsto -\frac{\sin x}{x}$. Fixons $A > 0$.

Par IPP, $\int_0^A 1 \cdot F(x) dx = [xF(x)]_0^A - \int_0^A xF'(x) dx = AF(A) + \int_0^A \sin x \, dx = AF(A) + 1 - \cos A$.

Ensuite encore par IPP, $F(A) = \int_A^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \left[-\frac{\cos t}{t} \right]_A^{+\infty} - \int_A^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt = \frac{\cos A}{A} - \int_A^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt$.

Donc $\int_0^A F(x) dx = 1 - A \int_A^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt$. Posons maintenant $u = \frac{t}{A}$ dans la dernière intégrale :

$$A \int_A^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt = A \int_1^{+\infty} \frac{\cos(Au)}{A^2 u^2} A du = \int_1^{+\infty} \frac{\cos(Au)}{u^2} du.$$

Enfin, une dernière IPP permet d'obtenir :

$$\int_1^{+\infty} \frac{\cos(Au)}{u^2} du = \left[-\frac{\sin(Au)}{Au^2} \right]_1^{+\infty} - \int_1^{+\infty} \frac{2 \sin(Au)}{Au^3} du = \frac{\sin A}{A} - \frac{2}{A} \int_1^{+\infty} \frac{\sin(Au)}{u^3} du.$$

On remarque que le premier terme de cette somme tend vers 0 lorsque A tend vers $+\infty$. Pour ce qui est du deuxième, on a par inégalité triangulaire $\left| \int_1^{+\infty} \frac{2 \sin(Au)}{u^3} du \right| \leq \int_1^{+\infty} \frac{2}{u^3} du =$

$$\left[-\frac{1}{u^2} \right]_1^{+\infty} = 1. \text{ Donc } \left| \frac{2}{A} \int_1^{+\infty} \frac{\sin(Au)}{u^3} du \right| \leq \frac{1}{A} \text{ d'où } \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{2}{A} \int_1^{+\infty} \frac{\sin(Au)}{u^3} du = 0.$$

Finalement, $\lim_{A \rightarrow +\infty} A \int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt = 0$ et $\int_0^{+\infty} \left(\int_x^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt \right) dx = 1$.

XIII.2.8 Intégrale d'Euler

[Enoncé]

Démontrons avant de commencer que I est bien défini.

La fonction $t \mapsto (\ln \sin(t))$ est continue par morceau sur $]0, \frac{\pi}{2}]$.

On sait que :

$$\sin(t) \underset{t \rightarrow 0}{\sim} t$$

Ainsi :

$$\ln(\sin(t)) = \ln(t + \underset{t \rightarrow 0}{o}(t)) = \ln(t) + \ln(1 + \underset{t \rightarrow 0}{o}(1))$$

Par conséquent,

$$\ln(\sin(t)) \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \ln(t) = \underset{t \rightarrow 0}{o}\left(\frac{1}{\sqrt{t}}\right)$$

Donc $t \mapsto \ln(\sin(t))$ est intégrale en 0.

Donc l'intégrale est bien définie.

1. On pose $t = \frac{\pi}{2} - u$

$$\int_0^{\pi/2} \ln(\sin(t)) dt = \int_{\pi/2}^0 \ln\left(\sin\left(\frac{\pi}{2} - u\right)\right) (-du) = \int_0^{\pi/2} \ln(\cos(u)) du$$

D'où :

$$I = J$$

2. On a :

$$I + J = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin(t) \cos(t)) dt = \int_0^{\pi/2} [\ln(\sin(2t)) - \ln(2)] dt$$

car $\sin(2t) = 2 \cos(t) \sin(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$. Ainsi, on a :

$$I + J = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin(2t)) dt - \frac{\pi \ln(2)}{2} = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \ln(\sin(u)) du - \frac{\pi \ln(2)}{2}$$

Montrons que $2I = \int_0^{\pi} \ln(\sin(t)) dt$.

On effectue le changement de variable $u = \pi - t$,

$$I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin(t)) dt = \int_{\pi}^{\pi/2} \ln(\sin(\pi - u)) (-du) = \int_{\pi/2}^{\pi} \ln(\sin(u)) du$$

Ainsi d'après la relation de Chasles,

$$2I = \int_0^{\pi} \ln(\sin(t)) dt$$

Donc :

$$I + J = I - \frac{\pi \ln(2)}{2}$$

3. On a donc aisément que :

$$I = -\frac{\pi \ln(2)}{2}$$

XIII.2.9 Fonction intégrale

[Enoncé]

Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$.

$t \mapsto \frac{\ln(t)}{x^2 + t^2}$ est continue par morceau sur $]0, +\infty[$. On remarque que

$$\frac{\ln(t)}{x^2 + t^2} = O_{t \rightarrow 0}(\ln(t)) = o_{t \rightarrow 0}\left(\frac{1}{\sqrt{t}}\right)$$

et

$$\frac{\ln(t)}{x^2 + t^2} = o_{t \rightarrow 0}\left(\frac{1}{t^{\frac{3}{2}}}\right)$$

Ainsi $t \mapsto \frac{\ln(t)}{x^2 + t^2}$ est intégrale sur \mathbb{R}_+^* .

Maintenant, donnons une expression de I à l'aide de fonctions usuelles.

Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$.

$$I(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{x^2 + t^2} dt = \frac{1}{x^2} \int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{1 + \left(\frac{t}{x}\right)^2} dt$$

On pose $t = ux$:

$$I(x) = \frac{1}{x^2} \int_0^{+\infty} \frac{\ln(ux)}{1 + u^2} x du = \frac{1}{x} \int_0^{+\infty} \frac{\ln(u)}{1 + u^2} du + \frac{\ln(x)}{x} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + u^2} du$$

Ainsi, on obtient l'expression suivante :

$$I(x) = \frac{I(1)}{x} + \frac{\pi \ln(x)}{2x}$$

Calculons maintenant que $I(1)$. On pose $u = \frac{1}{t}$.

$$I(0) = \int_{+\infty}^0 \frac{\ln\left(\frac{1}{u}\right)}{1 + \left(\frac{1}{u}\right)^2} \left(-\frac{1}{u^2}\right) du = - \int_0^{+\infty} \frac{\ln(u)}{1 + u^2} du = -I(0)$$

Donc $I(0) = 0$. Par conséquent, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$I(x) = \frac{\pi \ln(x)}{2x}$$

Reste plus qu'à prouver que I admet un maximum et le déterminer.

Il est clair que I est dérivable sur \mathbb{R}_+^* .

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, I'(x) = \frac{\pi}{2} \frac{1 - \ln(x)}{x^2}$$

x	0	e	$+\infty$
$I'(x)$	<div><div></div><div>+</div></div>	<div><div>0</div><div>+</div></div>	
$I(x)$	<div><div>$-\infty$</div><div>\nearrow</div></div>	<div><div>$\frac{\pi}{2e}$</div><div>\searrow</div><div>$+\infty$</div></div>	

Donc I admet un maximum sur \mathbb{R}_+^* qui est :

$$\max_{x \in \mathbb{R}_+^*} I = I(e) = \frac{\pi}{2e}$$

XIII.2.10 Intégrales de Bertrand

[\[Enoncé\]](#)

XIII.2.11 Intégrabilité des cosinus de polynômes

[\[Enoncé\]](#)

XIII.2.12 Nature d’une intégrale

[\[Enoncé\]](#)

XIII.2.13 Divergence grossière

[\[Enoncé\]](#)

XIII.2.14 Espace l^2 et dérivation

[\[Enoncé\]](#)

XIII.2.15 Intégrale de Frullani

[\[Enoncé\]](#)

XIII.2.16 Calcul d'une intégrale (1) ★★

[Enoncé]

Soit n un entier supérieur ou égal à 2.

Tout d'abord, $f_n : t \mapsto \prod_{k=1}^n \frac{1}{t+k}$ est continue par morceaux sur \mathbb{R}_+^* et $f_n(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{t^n}$. Donc

$I_n = \int_0^{+\infty} f_n(t) dt$ converge par comparaison à une intégrale de Riemann ($n > 1$).

Notons $F(X) = \prod_{k=1}^n \frac{1}{X+k} = \sum_{k=1}^n \frac{\lambda_k}{X+k}$ la décomposition en éléments simples de F .

$$\begin{aligned} \forall k \in \llbracket 1; n \rrbracket, \quad \lambda_k &= \lim_{t \rightarrow -k} (t+k)F(t) = \prod_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq k}} \frac{1}{i-k} = (-1)^{k-1} \prod_{i=1}^{k-1} \frac{1}{k-i} \prod_{i=k+1}^n \frac{1}{i-k} = \\ &= \frac{(-1)^{k-1}}{(k-1)!(n-k)!} = \frac{(-1)^{k-1}k}{n!} \binom{n}{k} = \frac{(-1)^{k-1}}{(n-1)!} \binom{n-1}{k-1}. \end{aligned}$$

Soit $A \in \mathbb{R}_+$.

$$\begin{aligned} \int_0^A f_n(t) dt &= \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{(n-1)!} \binom{n-1}{k-1} \int_0^A \frac{dt}{t+k} = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{(n-1)!} \binom{n-1}{k-1} (\ln(A+k) - \ln(k)) \\ \text{Or, } \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{(n-1)!} \binom{n-1}{k-1} \left(\ln(A) + \ln\left(1 + \frac{k}{A}\right) - \ln(k) \right) &\underset{A \rightarrow +\infty}{=} \ln(A) \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{(n-1)!} \binom{n-1}{k-1} + \\ &+ \circ(1) + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{(n-1)!} \binom{n-1}{k-1} \ln(k) \\ \text{Et, } \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{(n-1)!} \binom{n-1}{k-1} &= \frac{1}{(n-1)!} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \binom{n-1}{k-1} = \frac{1}{(n-1)!} (1-1)^{n-1} = 0. \\ \text{Donc } I_n &= \frac{1}{(n-1)!} \sum_{k=1}^n (-1)^k \binom{n-1}{k-1} \ln(k). \end{aligned}$$

XIII.2.17 Calcul d'une intégrale (2) ★★

[Enoncé]

$$\forall x \in]0, 1], \quad \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \geq 1 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor = n \iff n \leq \frac{1}{x} < n+1 \iff \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}.$$

La fonction $x \mapsto x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$ est continue par morceaux et positive sur $]0, 1]$. On peut donc calculer dans $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$:

$$\begin{aligned} I &= \sum_{n=1}^{+\infty} \int_{1/(n+1)}^{1/n} x n \, dx = \sum_{n=1}^{+\infty} n \left[\frac{x^2}{2} \right]_{1/(n+1)}^{1/n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{2} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right) \\ \text{Or, } \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad n \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right) &= \frac{1}{n} - \frac{n}{(n+1)^2} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)^2}. \end{aligned}$$

$$\text{Donc } I = \frac{1}{2} \left[\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^2} \right] = \frac{1}{2} \left[1 + \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^2} \right] = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

XIII.2.18 Calcul d'une intégrale (3)

[Enoncé]

XIII.2.19 Calcul d'une intégrale (4)

[Enoncé]

XIII.2.20 Permutation Série-intégrale (1)

[Enoncé]

XIII.2.21 Permutation Série-intégrale (2)

[Enoncé]

XIII.2.22 Fonction d'écart Logarithmique intégral ★★

[Enoncé]

Montrons par récurrence $\mathcal{P}(n) : \exists C_n \in \mathbb{R}, \forall x \geq 2, \text{Li}(x) = \frac{x}{\ln x} \sum_{k=0}^n \frac{k!}{(\ln x)^k} + \int_2^x \frac{(n+1)!}{(\ln t)^{n+2}} dt +$

C_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Fixons $x \geq 2$.

Tout d'abord, $\forall n \in \mathbb{N}, t \mapsto \frac{1}{(\ln t)^{n+2}} \in \mathcal{C}^1([2, x], \mathbb{R})$. Donc par IPP :

$$\text{Li}(x) = \int_2^x 1 \cdot \frac{1}{\ln t} dt = \left[\frac{t}{\ln t} \right]_2^x + \int_2^x t \cdot \frac{1}{t(\ln t)^2} dt = \frac{x}{\ln x} - \frac{2}{\ln 2} + \int_2^x \frac{dt}{(\ln t)^2}.$$

D'où $\mathcal{P}(0)$ en posant $C_0 = -\frac{2}{\ln 2}$.

Supposons $\mathcal{P}(n)$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Similairement par IPP :

$$\int_2^x \frac{(n+1)!}{(\ln t)^{n+2}} dt = \left[\frac{t}{\ln t} \cdot \frac{(n+1)!}{(\ln t)^{n+1}} \right] + \int_2^x \frac{(n+2)!}{(\ln t)^{n+3}} dt = \frac{x}{\ln x} \cdot \frac{(n+1)!}{(\ln x)^{n+1}} - \frac{2(n+1)!}{(\ln 2)^{n+2}} + \int_2^x \frac{(n+2)!}{(\ln t)^{n+3}} dt.$$

On en déduit $\mathcal{P}(n+1)$ en posant $C_{n+1} = C_n - \frac{2(n+1)!}{(\ln 2)^{n+2}}$.

Ainsi $\forall n \in \mathbb{N}, \mathcal{P}(n)$.

Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}, \text{Li}(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} \frac{x}{\ln x} \sum_{k=0}^n \frac{k!}{(\ln x)^k} + o\left(\frac{x}{(\ln x)^{n+1}}\right)$. Fixons $n \in \mathbb{N}$

$$\frac{x}{(\ln x)^{n+1}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty \text{ donc } C_n \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{x}{(\ln x)^{n+1}}\right).$$

$$\text{Ensuite, } \frac{d}{dx} \left(\frac{x}{(\ln x)^{n+1}} \right) = \frac{1}{(\ln x)^{n+1}} - \frac{n+1}{(\ln x)^{n+2}} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{(\ln x)^{n+1}} \text{ et } \frac{(n+1)!}{(\ln x)^{n+2}} \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{(\ln x)^{n+1}}\right).$$

Donc comme $x \mapsto \frac{1}{(\ln x)^{n+1}}$ est positive au voisinage de $+\infty$, d'après les théorèmes d'intégrations de relations de comparaisons,

$$\begin{aligned} & - \int_2^x \frac{(n+1)!}{(\ln t)^{n+2}} dt \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o\left(\int_2^x \frac{1}{(\ln t)^{n+1}} dt\right) \\ & - \int_2^x \frac{1}{(\ln t)^{n+1}} dt \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \int_2^x \left(\frac{1}{(\ln t)^{n+1}} - \frac{n+2}{(\ln t)^{n+2}} \right) dt = \frac{x}{(\ln x)^{n+1}} - \frac{2}{(\ln 2)^{n+1}} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{x}{(\ln x)^{n+1}}. \end{aligned}$$

$$\text{Ainsi } \int_2^x \frac{(n+1)!}{(\ln t)^{n+2}} dt \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{x}{(\ln x)^{n+1}}\right) \text{ d'où } \text{Li}(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} \frac{x}{\ln x} \sum_{k=0}^n \frac{k!}{(\ln x)^k} + o\left(\frac{x}{(\ln x)^{n+1}}\right).$$

XIII.2.23 Intégrale de Bernoulli

[\[Énoncé\]](#)

XIII.2.24 Lemme de Riemann-Lebesgue : cas des fonctions \mathcal{C}^1 ★

[\[Énoncé\]](#)

Soit $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$. $t \mapsto e^{i\lambda t}$ et ϕ sont de classes \mathcal{C}^1 sur $[a, b]$ donc par IPP :

$$\left| \int_a^b \phi(t) e^{i\lambda t} dt \right| = \left| \left[\frac{\phi(t) e^{i\lambda t}}{i\lambda} \right]_a^b - \int_a^b \frac{\phi'(t) e^{i\lambda t}}{i\lambda} dt \right| \leq \frac{2\|\phi\|_{\infty, [a, b]}}{\lambda} + \frac{(b-a)\|\phi'\|_{\infty, [a, b]}}{\lambda} \quad (\text{Le})$$

théorème des bornes atteintes justifie que ϕ et ϕ' sont bornées sur $[a, b]$.

$$\text{Donc } \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b \phi(t) e^{i\lambda t} dt = 0.$$

XIII.2.25 Intégrale de Poisson (1) ★★

[\[Énoncé\]](#)

Soit $\rho \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. On pose pour $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = \frac{\pi}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \ln \left(1 - 2 \cos \left(\frac{k\pi}{n} \right) \rho + \rho^2 \right)$. Fixons $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned}
S_n &= \frac{\pi}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \ln \left[(\rho - e^{ik\pi/n})(\rho - e^{-ik\pi/n}) \right] \\
&= \frac{\pi}{n} \ln \left(\prod_{k=0}^{n-1} (\rho - e^{ik\pi/n})(\rho - e^{-ik\pi/n}) \right) \\
&= \frac{\pi}{n} \ln \left(\frac{\rho-1}{\rho+1} \prod_{k=1}^n (\rho - e^{-ik\pi/n}) \prod_{k=0}^{n-1} (\rho - e^{ik\pi/n}) \right) \\
&= \frac{\pi}{n} \ln \left(\frac{\rho-1}{\rho+1} \prod_{k=1}^n (\rho - e^{-i(k-2n)\pi/n}) \prod_{k=0}^{n-1} (\rho - e^{ik\pi/n}) \right) \\
&= \frac{\pi}{n} \ln \left(\frac{\rho-1}{\rho+1} \prod_{k=1}^n (\rho - e^{i(2n-k)\pi/n}) \prod_{k=0}^{n-1} (\rho - e^{ik\pi/n}) \right) \\
&= \frac{\pi}{n} \ln \left(\frac{\rho-1}{\rho+1} \prod_{k=n}^{2n-1} (\rho - e^{ik\pi/n}) \prod_{k=0}^{n-1} (\rho - e^{ik\pi/n}) \right) \\
&= \frac{\pi}{n} \ln \left(\frac{\rho-1}{\rho+1} \prod_{k=0}^{2n-1} (\rho - e^{ik\pi/n}) \right) \\
&= \frac{\pi}{n} \ln \left(\frac{(\rho^{2n} - 1)(\rho - 1)}{\rho + 1} \right)
\end{aligned}$$

$\theta \mapsto \ln(1 - 2\cos(\theta)\rho + \rho^2)$ est continue sur $[0, \pi]$ donc $S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} I(\rho)$.

Si $\rho \in]-1, 1[$, $I(\rho) = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 0$,

et si $\rho \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, alors $S_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\pi}{n} \ln(\rho^{2n}) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 2\pi \ln(|\rho|)$ d'où $I(\rho) = 2\pi \ln(|\rho|)$.

XIII.2.26 Intégrale de Poisson (2) ★★

[\[Enoncé\]](#)

1. Soit $\rho \in \mathbb{R}^* \setminus \{-1, 1\}$.

$$\begin{aligned}
I\left(\frac{1}{\rho}\right) &= \int_0^\pi \ln\left(1 - 2\cos(\theta)\frac{1}{\rho} + \frac{1}{\rho^2}\right) d\theta = \int_0^\pi (\ln(1 - 2\cos(\theta)\rho + \rho^2) - \ln(\rho^2)) d\theta = \\
&= I(\rho) - 2\pi \ln(|\rho|).
\end{aligned}$$

2. Remarquons d'abord que I est paire. En effet en posant $\varphi = \pi - \theta$ on a,

$$I(-\rho) = \int_0^\pi \ln(1 + 2 \cos(\theta)\rho + \rho^2) d\theta = \int_0^\pi \ln(1 - 2 \cos(\varphi)\rho + \rho^2) d\varphi = I(\rho).$$

$$\begin{aligned} 2I(\rho) &= I(\rho) + I(-\rho) \\ &= \int_0^\pi \ln [(1 + 2 \cos(\theta)\rho + \rho^2)(1 - 2 \cos(\theta)\rho + \rho^2)] d\theta \\ &= \int_0^\pi \ln [(1 + \rho^2)^2 - 4 \cos^2(\theta)\rho^2] d\theta \\ &= \int_0^\pi \ln [1 + 2(1 - 2 \cos^2(\theta))\rho^2 + \rho^4] d\theta \\ &= \int_0^\pi \ln(1 - 2 \cos(2\theta)\rho^2 + \rho^4) d\theta \\ (\alpha = 2\theta) &= \int_0^{2\pi} \ln(1 - 2 \cos(\alpha)\rho^2 + \rho^4) \frac{d\alpha}{2} \\ (\beta = \alpha - \pi) &= \int_{-\pi}^\pi \frac{1}{2} \ln(1 + 2 \cos(\beta)\rho^2 + \rho^4) d\beta \\ (\text{Par parité}) &= \int_{-\pi}^0 \ln(1 + 2 \cos(\beta)\rho^2 + \rho^4) d\beta \\ (\gamma = \pi - \beta) &= \int_0^\pi \ln(1 - 2 \cos(\gamma)\rho^2 + \rho^4) d\gamma \\ &= I(\rho^2) \end{aligned}$$

Par récurrence immédiate, $\forall n \in \mathbb{N}^*, I(\rho^{2^n}) = 2^n I(\rho)$.

3. Montrons que I est continue sur $] -1, 1[$. Notons $\Phi : \begin{cases}] -1, 1[\times]0, \pi[& \longrightarrow \mathbb{R} \\ (\rho, \theta) & \longmapsto \ln(1 - 2 \cos(\theta)\rho + \rho^2) \end{cases}$

$\forall \rho \in] -1, 1[, \theta \mapsto \Phi(\rho, \theta) \in \text{CM}(]0, \pi[, \mathbb{R}) \times L^1(]0, \pi[, \mathbb{R})$;

$\forall \theta \in [0, \pi], \rho \mapsto \Phi(\rho, \theta) \in \mathcal{C}^0(] -1, 1[, \mathbb{R})$;

$$\begin{aligned} \forall (\rho, \theta) \in] -1, 1[\times]0, \pi[, |\Phi(\rho, \theta)| &= |\ln((\rho - \cos(\theta))^2 + \sin^2(\theta))| \\ &\leq \max\{|\Phi(\cos(\theta), \theta)|, |\Phi(-1, \theta)|, |\Phi(1, \cos(\theta))|\} \\ &= \max\{|\ln(\sin^2(\theta))|, |\ln(2 + 2 \cos(\theta))|, |\ln(2 - 2 \cos(\theta))|\} \end{aligned}$$

Or $f : \begin{cases}]0, \pi[& \longrightarrow \mathbb{R} \\ \theta & \longmapsto \ln(\sin^2(\theta)) = 2 \ln(\sin(\theta)) \end{cases} \in L^1(]0, \pi[, \mathbb{R})$, en effet f est continue par morceaux sur $]0, \pi[$ et

$$\begin{cases} f(\theta) \underset{\theta \rightarrow 0^+}{=} 2 \ln(\theta + o(\theta)) \underset{\theta \rightarrow 0^+}{=} 2 \ln(\theta) + o(1) \underset{\theta \rightarrow 0^+}{=} o\left(\frac{1}{\sqrt{\theta}}\right) \\ f(\theta) \underset{\theta \rightarrow \pi^-}{=} 2 \ln(\pi - \theta + o(\pi - \theta)) \underset{\theta \rightarrow \pi^-}{=} o\left(\frac{1}{\sqrt{\pi - \theta}}\right) \end{cases}$$

$g : \begin{cases}]0, \pi[& \longrightarrow \mathbb{R} \\ \theta & \longmapsto \ln(2 - 2\cos(\theta)) \end{cases} \in L^1(]0, \pi[, \mathbb{R}),$ en effet g est continue par morceaux sur $]0, \pi[$ et

$$g(\theta) \underset{\theta \rightarrow 0^+}{=} \ln(\theta^2 + o(\theta^2)) \underset{\theta \rightarrow 0^+}{=} 2\ln(\theta) + \ln(1 + o(1)) \underset{\theta \rightarrow 0^+}{=} o\left(\frac{1}{\sqrt{\theta}}\right).$$

Et de même, $h : \begin{cases} [0, \pi[& \longrightarrow \mathbb{R} \\ \theta & \longmapsto \ln(2 + 2\cos(\theta)) \end{cases} \in L^1([0, \pi[, \mathbb{R}).$

Donc finalement, $\Psi : \begin{cases}]0, \pi[& \longrightarrow \mathbb{R} \\ \theta & \longmapsto \max\{f(\theta), g(\theta), h(\theta)\} \end{cases} \in L^1(]0, \pi[, \mathbb{R})$ puisque

$$\Psi = \frac{1}{2}(f + \max(g, h) + |f - \max(g, h)|) = \frac{1}{2}\left(f + \frac{1}{2}(g + h + |g - h|) + \left|f - \frac{1}{2}(g + h + |g - h|)\right|\right).$$

Ainsi I est continue sur $] -1, 1[$ par transfert de continuité.

En particulier, I est continue en 0 donc,

$$\rho \in] -1, 1[\implies \rho^{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \implies 2^n I(\rho) = I(\rho^{2^n}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} I(0) = 0 \implies I(\rho) = 0$$

Maintenant, si $\rho \in \mathbb{R} \setminus [-1, 1]$, alors $\frac{1}{\rho} \in] -1, 1[$ et donc d'après la question 1, $I(\rho) =$

$$2\pi \ln(|\rho|) + I\left(\frac{1}{\rho}\right) = 2\pi \ln(|\rho|).$$

XIII.2.27 Mines-Ponts MP 2024 (Chaïma Prime)

[\[Énoncé\]](#)

XIII.2.28 Une suite d'intégrales (1)

[\[Énoncé\]](#)

XIII.2.29 Une suite d'intégrales (2)

[\[Énoncé\]](#)

XIII.2.30 Une suite d'intégrales (3)

[\[Énoncé\]](#)

XIII.2.31 Nombre d'Apéry

[\[Énoncé\]](#)

XIII.2.32 Comportement asymptotique (1)[\[Enoncé\]](#)**XIII.2.33 Comportement asymptotique (2)**[\[Enoncé\]](#)**XIII.2.34 Théorème de d'Alembert-Gauss (1) ★★**[\[Enoncé\]](#)

$$1. \text{ Notons } f : \begin{cases} \mathbb{R}_+ \times [0, 2\pi] & \longrightarrow \mathbb{C} \\ (r, \theta) & \longmapsto \frac{1}{P(re^{i\theta})} \end{cases}.$$

Puisque P ne s'annule pas sur \mathbb{C} ,

- $\forall r \in \mathbb{R}_+, \theta \mapsto f(r, \theta) \in \text{CM}([0, 2\pi], \mathbb{C})$;
- $\forall \theta \in [0, 2\pi], r \mapsto f(r, \theta) \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{C})$;
- $\forall (r, \theta) \in \mathbb{R}_+ \times [0, 2\pi], \left| \frac{\partial f}{\partial r}(r, \theta) \right| = \left| \frac{-e^{i\theta} P'(re^{i\theta})}{P(re^{i\theta})^2} \right| = \left| \frac{P'(re^{i\theta})}{P(re^{i\theta})^2} \right|.$

Fixons $a \in \mathbb{R}_+$ et notons $D_a = \{z \in \mathbb{C}, |z| \leq a\}$.

Les fonctions $z \mapsto P(z)^2$ et $z \mapsto P'(z)$ sont continues sur D_a et de plus P ne s'annule pas sur \mathbb{C} donc la fonction $z \mapsto \frac{P'(re^{i\theta})}{P(re^{i\theta})^2}$ est continue sur D_a qui est un compact.

Elle est donc bornée par un certain $M \in \mathbb{R}_+$ sur D_a .

Ainsi $\forall (r, \theta) \in [0, a] \times [0, 2\pi], re^{i\theta} \in D_a \implies \left| \frac{P'(re^{i\theta})}{P(re^{i\theta})^2} \right| \leq M.$

Enfin la fonction $\theta \mapsto M$ est intégrable sur $[0, 2\pi]$.

On en déduit d'après le théorème de transfert \mathcal{C}^1 que F est \mathcal{C}^1 sur $\bigcup_{a \in \mathbb{R}_+} D_a = \mathbb{R}_+$ et que

$$\forall r \in \mathbb{R}_+^*, F'(r) = \int_0^{2\pi} -\frac{e^{i\theta} P'(re^{i\theta})}{P(re^{i\theta})^2} d\theta.$$

$$2. \text{ On calcule } \forall r \in \mathbb{R}_+^*, F'(r) = \int_0^{2\pi} \frac{1}{ir} \cdot \frac{-ire^{i\theta} P'(re^{i\theta})}{P(re^{i\theta})^2} d\theta = \left[\frac{1}{ir P(re^{i\theta})} \right]_0^{2\pi} = 0.$$

Donc F est constante sur \mathbb{R}_+^* . Étant continue en 0 elle est constante sur \mathbb{R}_+ .

3. Appliquons le théorème de convergence dominée pour déterminer la limite de F en $+\infty$.

Par inégalité triangulaire, $\forall r \in \mathbb{R}_+, |F(r)| \leq \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{|P(re^{i\theta})|}$. Or comme P n'est pas constant, $|P(z)| \xrightarrow{|z| \rightarrow +\infty} +\infty$.

Alors, $\forall \theta \in [0, 2\pi]$, $|f(r, \theta)| \xrightarrow{r \rightarrow +\infty} 0$. Les autres hypothèses ont été vérifiées dans la question 1.

Par conséquent $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{|P(re^{i\theta})|} \xrightarrow{r \rightarrow +\infty} \int_0^{2\pi} 0 \, d\theta = 0$.

Ainsi F est constamment nulle.

Ceci est absurde car $F(0) = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{P(0)} = \frac{2\pi}{P(0)} \neq 0$.

On en déduit le théorème de d'Alembert-Gauss.

XIII.2.35 Fonction Gamma d'Euler

[Enoncé]

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ la fonction $f_x : t \mapsto t^{x-1}e^{-t}$ est continue par morceaux sur $]0, +\infty[$.

— $t^{x-1}e^{-t} \sim_{x \rightarrow +\infty} e^{-t}$ donc f_x est intégrable en $+\infty$.

— $t^{x-1}e^{-t} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} t^{x-1}$.

Ainsi, f_x est intégrable en 0 si et seulement si $1 - x < 1$ i.e. $0 < x$.

Donc Γ est défini sur \mathbb{R}_+^* .

2. Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$.

Les fonctions $t \mapsto t^x$ et $t \mapsto e^{-t}$ sont de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R}_+^* . Donc par intégration par parties :

$$\Gamma(x+1) = \int_0^{+\infty} t^x e^{-t} = [-t^x e^{-t}]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} = x\Gamma(x)$$

Montrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\Gamma(n+1) = n!$ Pour $n = 0$,

$$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = [-e^{-t}]_0^{+\infty} = 1 = 0!$$

Supposons que pour un certain $n \in \mathbb{N}$, $\Gamma(n+1) = n!$.

$$\Gamma(n+2) = (n+1)\Gamma(n+1)$$

d'après la question 2

$$= (n+1)n!$$

d'après l'hypothèse de récurrence $= (n+1)!$

On a donc montré par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\Gamma(n+1) = n!$

3. D'après la question 2, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+1)}{x}$$

On en déduit donc que

$$\Gamma(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{\Gamma(1)}{x} = \frac{1}{x}$$

4. On pose la fonction :

$$f : (x, t) \mapsto t^x e^{-t}$$

- Pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$, $x \mapsto f(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^{+\infty}$ sur \mathbb{R}_+^* ,
- Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $t \mapsto \frac{\partial^k f}{\partial x^k} = \ln(t)^k t^{x-1} e^{-t}$ est continue par morceaux sur \mathbb{R}_+^* .
- Soit $a, b \in \mathbb{R}_+^*$.

On définit $\varphi : t \mapsto \begin{cases} t^{a-1} & \text{quand } t \in]0, 1] \\ t^{b-1} e^{-t} & \text{quand } t \in]1, +\infty[\end{cases}$ On obtient la majoration suivante :

$$\forall x \in [a, b], \forall t \in \mathbb{R}_+^*, \quad \left| \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, t) \right| \leq |\ln(t)|^k \varphi(t)$$

Puisque $t \mapsto |\ln(t)|^k \varphi(t)$ est continue par morceaux sur \mathbb{R}_+^* ,

$$|\ln(t)|^k \varphi(t) = \underset{x \rightarrow 0^+}{o} \left(\frac{1}{t^{1-\frac{a}{2}}} \right)$$

et

$$|\ln(t)|^k \varphi(t) = \underset{x \rightarrow +\infty}{o} \left(\frac{1}{t^2} \right)$$

on en déduit que $t \mapsto |\ln(t)|^k \varphi(t)$ est intégrable sur \mathbb{R}_+^* .

Donc par transfert de classe, Γ est de classe \mathcal{C}^∞ sur \mathbb{R}_+^* .

5. $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$\Gamma''(x) = \int_0^{+\infty} \ln(t)^2 t^{x-1} e^{-t} dt$$

. Donc Γ'' est (stricte)-positive sur \mathbb{R}_+^* . Ainsi Γ est convexe (strictement) sur \mathbb{R}_+^* .

6. On pose $f : x \mapsto \ln(\Gamma(x))$.

f est de classe \mathcal{C}^2 sur \mathbb{R}_+^* .

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f'(x) = \frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)}$$

et

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f''(x) = \frac{\Gamma''(x)\Gamma(x) - \Gamma'(x)^2}{\Gamma(x)^2}$$

Pour montrer que f est convexe, il suffit de montrer que $\Gamma''(x)\Gamma(x) \geq \Gamma'(x)^2$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$.

Pour cela, on se place dans $\mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$ muni du produit scalaire canonique. Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$.

Les fonctions $t \mapsto \ln(t) t^{\frac{x-1}{2}} e^{-t/2}$ et $t \mapsto t^{\frac{x-1}{2}} e^{-t/2}$ sont continues sur \mathbb{R}_+^* .

D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$\left(\int_0^{+\infty} \ln(t) t^{\frac{x-1}{2}} e^{-t/2} t^{\frac{x-1}{2}} e^{-t/2} dt \right)^2 \leq \left(\int_0^{+\infty} \left(t^{\frac{x-1}{2}} e^{-t/2} \right)^2 dt \right) \left(\int_0^{+\infty} \left(\ln(t) t^{\frac{x-1}{2}} e^{-t/2} \right)^2 dt \right)$$

c'est-à-dire :

$$\Gamma'(x)^2 \leq \Gamma(x)\Gamma''(x)$$

Donc Γ est log-convexe.

Remarque : Une autre méthode consiste à utiliser l'inégalité de Hölder V.10. Cette démonstration est laissée au lecteur curieux.

Point critique et limite en $+\infty$

Valeur en les demi-entiers

Théorème de Bohr-Mollerup ★★★★★

On montre (cf. II.35) que Γ vérifie les conditions de l'énoncé. Donnons nous f qui vérifie les trois conditions de l'énoncé.

On va montrer que la fonction $W : x \mapsto \ln \circ f(x) - \ln \circ \Gamma(x)$ est constante. On remarque déjà que W est 1-périodique sur \mathbb{R}_+^* , en effet $\forall x > 0$, $W(x+1) = \ln(f(x+1)) - \ln(\Gamma(x+1)) = \ln(xf(x)) - \ln(x\Gamma(x)) = \ln(x) + \ln \circ f(x) - \ln(x) - \ln \circ \Gamma(x) = W(x)$. Fixons $n \in \mathbb{N}$ et $x \in]0, 1]$. On va utiliser la croissance des pentes sur $\ln \circ f$, qui est convexe, au points n , $n+1$, $n+x+1$, $n+2$:

$$\begin{aligned} \ln \circ f(n+1) - \ln \circ f(n) &\leq \frac{\ln \circ f(n+x+1) - \ln \circ f(n+1)}{x} \leq \ln \circ f(n+2) - \ln \circ f(n+1) \\ \iff \ln(n) &\leq \frac{\ln \circ f(n+x+1) - \ln \circ f(n+1)}{x} \leq \ln(n+1) \end{aligned}$$

Puis sur $\ln \circ \Gamma$:

$$\begin{aligned} \ln \circ \Gamma(n+1) - \ln \circ \Gamma(n) &\leq \frac{\ln \circ \Gamma(n+x+1) - \ln \circ \Gamma(n+1)}{x} \leq \ln \circ \Gamma(n+2) - \ln \circ \Gamma(n+1) \\ \iff \ln \circ \Gamma(n+1) - \ln \circ \Gamma(n+2) &\leq \frac{\ln \circ \Gamma(n+1) - \ln \circ \Gamma(n+x+1)}{x} \leq \ln \circ \Gamma(n) - \ln \circ \Gamma(n+1) \\ \iff -\ln(n+1) &\leq \frac{\ln \circ \Gamma(n+1) - \ln \circ \Gamma(n+x+1)}{x} \leq -\ln(n) \end{aligned}$$

D'où en sommant :

$$\begin{aligned} \ln(n) - \ln(n+1) &\leq \frac{W(n+x+1) - W(n+1)}{x} \leq \ln(n+1) - \ln(n) \\ \text{Par 1-périodicité } \iff -\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) &\leq \frac{W(x) - W(1)}{x} \leq \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \\ \iff -\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) &\leq \frac{W(x)}{x} \leq \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \end{aligned}$$

Et donc en faisant tendre n vers $+\infty$, $\frac{W(x)}{x} = 0$ c'est à dire $W(x) = 0$.

Ceci étant vrai pour tout $x \in]0, 1]$, par 1-périodicité W est nulle sur \mathbb{R}_+^* c'est à dire $f = \Gamma$.

Formules de Gauss et Weierstrass**Lien entre les gamma d'Euler****Formule de duplication de Legendre****Intégrale de Raabe****Généralisation de la formule de Stirling****XIII.2.36 Fonction Beta d'Euler**[\[Enoncé\]](#)**Lien avec une intégrale d'Euler****Lien entre Γ et B** **XIII.2.37 Inégalité intégrale-dérivée ★**[\[Enoncé\]](#)D'après l'inégalité de Taylor-Lagrange, $\forall c \in [a, b]$


$$\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^c |f(t) - f(a)| dt \leq \int_a^c (t - a) \|f'\|_\infty dt = \frac{(c - a)^2}{2} \|f'\|_\infty$$

En utilisant deux fois cela pour $c = \frac{a + b}{2}$,

$$\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \left| \int_a^c f(t) dt \right| + \left| - \int_b^c f(t) dt \right| \leq \frac{(c - a)^2}{2} M + \frac{(b - c)^2}{2} M = \frac{(b - a)^2}{4} \|f'\|_\infty$$

XIII.2.38 Majoration de l'erreur dans la méthode des trapèzes[\[Enoncé\]](#)

Déjà pour mettre les idées en place, représentons-nous à quoi correspond la méthode des trapèzes.



On définit la subdivision régulière (x_1, \dots, x_n) du segment $[a, b]$.

On pose f_i l'unique fonction affine tel que $f_i(x_i) = f(x_i)$ et $f_i(x_{i+1}) = f(x_{i+1})$.

Montrons que pour tout $x \in [x_i, x_{i+1}]$, il existe $c_x \in]x_i, x_{i+1}[$ tel que :

$$f(x) - f_i(x) = (x - x_i)(x_{i+1} - x) \frac{f''(c_x)}{2}$$

Si $x = x_i$ ou $x = x_{i+1}$, le résultat est immédiatement vrai.

Soit $x \in]x_i, x_{i+1}[$. On pose

$$g : t \mapsto f(t) - f_i(t) - \frac{(t - x_i)(t - x_{i+1})}{(x - x_i)(x - x_{i+1})} [f(x) - f_i(x)]$$

On vérifie aisément que cette fonction est de classe \mathcal{C}^2 sur $[x_i, x_{i+1}]$. On remarque que cette fonction s'annule en x_i , en x et en x_{i+1} .

Ainsi, d'après le théorème de Rolle, on en déduit :

- $\exists c_1 \in]x_i, x[$ tel que $g'(c_1) = 0$,
- $\exists c_2 \in]x, x_{i+1}[$ tel que $g'(c_2) = 0$.

De nouveau, d'après le théorème de Rolle, il existe $c_x \in]c_1, c_2[\subset]x_i, x_{i+1}[$ tel que $g''(c_x) = 0$.

Maintenant, calculons la dérivée seconde de g . Après calculs, on obtient :

$$\forall t \in [x_i, x_{i+1}], \quad g''(t) = f''(t) - 2 \frac{[f(x) - f_i(x)]}{(x - x_i)(x - x_{i+1})}$$

Par conséquent, en évaluant en c_x , on en déduit que :

$$f(x) - f_i(x) = (x - x_i)(x_{i+1} - x) \frac{f''(c_x)}{2}$$

Ainsi, en notant $M = \|f''\|_\infty$, on a :

$$|f(x) - f_i(x)| \leq (x - x_i)(x_{i+1} - x) \frac{M}{2}$$

Donc :

$$\left| \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) - f_i(x) dx \right| \leq \frac{M}{2} \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x - x_i)(x_{i+1} - x) dx$$

Or :

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} (x - x_i)(x_{i+1} - x) dx = \frac{(x_{i+1} - x_i)^3}{6}$$

Donc, on en déduit l'inégalité suivante,

$$\left| \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) - f_i(x) dx \right| \leq \frac{M(x_{i+1} - x_i)^3}{12}$$

Et puisque les (x_i) forment une subdivision régulière de $[a, b]$, on a $x_{i+1} - x_i = \frac{b-a}{n}$, donc :

$$\left| \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) - f_i(x) dx \right| \leq \frac{M(b-a)^3}{12n^3}$$

Donc en notant T_n la somme des aires de trapèzes, on a finalement :

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) dx - T_n \right| &\leq \sum_{i=0}^{n-1} \left| \int_{x_i}^{x_{i+1}} (f(x) - f_i(x)) dx \right| \\ &\leq \sum_{i=0}^{n-1} \frac{M(b-a)^3}{12n^3} \\ &\leq \frac{M(b-a)^3}{12n^2} \end{aligned}$$

Ce résultat est vrai pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, en particulier il est vrai pour $n = 1$. Donc

$$\left| \int_a^b f(t) dt - \frac{(b-a)}{2} (f(a) + f(b)) \right| \leq \frac{(b-a)^3}{12} \|f''\|_\infty$$

XIII.2.39 Inégalité de Young ★★

[Enoncé]

Soit $(a, b) \in [0, c] \times [0, f(c)]$. Tout d'abord d'après le théorème de la bijection, f est bijective de $[0, c]$ dans $[0, f(c)]$ et f^{-1} est continue sur $[0, f(c)]$.

De plus f est \mathcal{C}^1 et strictement croissante sur $[0, f^{-1}(b)]$, on peut donc effectuer le change-

ment de variable $t = f(u)$ dans la seconde intégrale : $\int_0^b f^{-1}(t) dt = \int_0^{f^{-1}(b)} u f'(u) du$.

Puis par IPP, $\int_0^{f^{-1}(b)} u f'(u) du = [u f(u)]_0^{f^{-1}(b)} - \int_0^{f^{-1}(b)} f(u) du = b f^{-1}(b) - \int_0^{f^{-1}(b)} f(t) dt$.

Donc $\int_0^a f(t) dt + \int_0^b f^{-1}(t) dt = \int_{f^{-1}(b)}^a f(t) dt + b f^{-1}(b)$.

Enfin par croissance de l'intégrale,

- Si $a \geq f^{-1}(b)$, $\int_{f^{-1}(b)}^a f(t)dt \geq (a - f^{-1}(b))b$ d'où $\int_0^a f(t)dt + \int_0^b f^{-1}(t)dt \geq ab$;
- Si $a \leq f^{-1}(b)$, $\int_a^{f^{-1}(b)} f(t)dt \leq (f^{-1}(b) - a)b$ c'est à dire $\int_{f^{-1}(b)}^a f(t)dt \geq (a - f^{-1}(b))b$
d'où $\int_0^a f(t)dt + \int_0^b f^{-1}(t)dt \geq ab$.

Dans tous les cas, $\int_0^a f(t)dt + \int_0^b f^{-1}(t)dt \geq ab$.

On remarque que si $a = f^{-1}(b)$ c'est à dire si $b = f(a)$, alors il y a égalité.

Réciproquement, s'il y a égalité alors l'inégalité $\int_{f^{-1}(b)}^a f(t)dt \geq (a - f^{-1}(b))b$ est une égalité.

Autrement dit $\int_{f^{-1}(b)}^a (f(t) - b)dt = 0$. Cependant par stricte croissance de f , la fonction $t \mapsto f(t) - b$ est de signe constant sur $I = [f^{-1}(b), a] \cup [a, f^{-1}(b)]$ qui est un intervalle. Cette fonction est continue donc d'après la stricte positivité de l'intégrale, $\forall t \in I$, $f(t) = b$. En particulier, $f(a) = b$.

XIII.2.40 Transformée de Laplace

[\[Énoncé\]](#)

XIII.2.41 Théorème des résidus (version faible)

[\[Énoncé\]](#)

XIII.3 Correction Fonctions réelles

XIII.3.1 Formule de Leibniz ★

[Énoncé]

Soient I un intervalle de \mathbb{R} , $n \in \mathbb{N}$ et f, g deux fonctions de classe \mathcal{C}^n sur I à valeurs dans \mathbb{R} . $f \times g$ est de classe \mathcal{C}^n sur I et :

$$(f \times g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$$

Démonstration :

$n = 0$:

Soient I un intervalle de \mathbb{R} et f, g deux fonctions continues sur I à valeurs dans \mathbb{R} . $f \times g$ est continue sur I et $(f \times g)^{(0)} = f \times g = \sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} f^{(k)} g^{(0-k)}$.

Supposons le résultat vrai pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Soient I un intervalle de \mathbb{R} et f, g deux fonctions de classe \mathcal{C}^{n+1} sur I à valeurs dans \mathbb{R} . A fortiori f et g sont de classe \mathcal{C}^n sur I donc par hypothèse de récurrence, $f \times g$ est de classe \mathcal{C}^n sur I et $(f \times g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$.

Pour tout $k \in \llbracket 0; n \rrbracket$, $f^{(k)}$ et $g^{(n-k)}$ sont de classe \mathcal{C}^1 sur I donc $(f \times g)^{(n)}$ est de classe \mathcal{C}^1 sur I c'est à dire $f \times g$ est de classe \mathcal{C}^{n+1} sur I .

De plus,

$$\begin{aligned} (f \times g)^{(n+1)} &= \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)} \right)' \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(f^{(k+1)} g^{(n-k)} + f^{(k)} g^{(n+1-k)} \right) \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k+1)} g^{(n-k)} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)} \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} f^{(k)} g^{(n+1-k)} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)} \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n}{k-1} f^{(k)} g^{(n+1-k)} + \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)} \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \left(\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right) f^{(k)} g^{(n+1-k)} \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)} \end{aligned}$$

Ainsi par récurrence simple, la propriété est vraie quel que soit $n \in \mathbb{N}$.

XIII.3.2 Fonction discontinue en tout point ★

[Enoncé]

L'exemple classique est la fonction indicatrice de \mathbb{Q} , $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}} : x \in \mathbb{R} \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$. Fixons

$a \in \mathbb{R}$ et supposons pas l'absurde que $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$ est continue en a .

Supposons que $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Comme \mathbb{Q} est dense dans \mathbb{R} , $\exists (x_n) \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$.

$\forall n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}}(x_n) = 1 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{1}_{\mathbb{Q}}(x_n) = 1$. Or par continuité de $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$ en a , $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{1}_{\mathbb{Q}}(x_n) = \mathbb{1}_{\mathbb{Q}}(a) = 0$ ce qui est absurde.

Donc $a \in \mathbb{Q}$. Cependant pas densité de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ dans \mathbb{R} , $\exists (y_n) \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})^{\mathbb{N}}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = a$.

De même, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}}(y_n) = 0 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{1}_{\mathbb{Q}}(y_n) = 0$. Or par continuité de $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$ en a , $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{1}_{\mathbb{Q}}(y_n) = \mathbb{1}_{\mathbb{Q}}(a) = 1$.

Ceci est absurde donc $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$ n'est pas continue en a .

Finalement $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$ n'est continue en aucun point de \mathbb{R} .

XIII.3.3 Fonction nulle part dérivable

[Enoncé]

XIII.3.4 Théorème de Rolle

[Enoncé]

XIII.3.5 Dérivée symétrique ★

[Enoncé]

- Supposons que f soit dérivable en un point $a \in \mathbb{R}$.

$$\frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} = \frac{f(a+h) - f(a)}{2h} + \frac{f(a) - f(a-h)}{2h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{f'(a)}{2} + \frac{f'(a)}{2} = f'(a) \text{ qui est finie par hypothèse.}$$

- Ce n'est pas une condition nécessaire. Considérons la fonction $f : x \mapsto |x|$.

$$f \text{ n'est pas dérivable en } 0 \text{ pourtant, } \frac{f(h) - f(-h)}{2h} = 0 \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0.$$

XIII.3.6 Fonction de Pringsheim ★★

[Enoncé]

On reconnaît bien évidemment la fonction indicatrice de \mathbb{Q} !

Soit $x \in \mathbb{Q}$. On note $x = \frac{a}{b}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$.

A partir du rang $n = b$, $n!x$ est un entier.

Ainsi, $\forall n \geq b$, $|\cos(n!\pi x)| = 1$. D'où $\forall n \geq b$, $\lim_{m \rightarrow +\infty} |\cos(n!\pi x)|^m = 1$.

Enfin $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{m \rightarrow +\infty} |\cos(n!\pi x)|^m = 1$.

Supposons maintenant que $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Alors, $\forall n \in \mathbb{N}$, $n!x \notin \mathbb{N}$.

En effet si il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $a = n!x \in \mathbb{N}$ alors $x = \frac{a}{n!} \in \mathbb{Q}$ ce qui est absurde.

Ainsi, $\forall n \in \mathbb{N}$, $|\cos(n!\pi x)| < 1$. D'où $\forall n \in \mathbb{N}$, $\lim_{m \rightarrow +\infty} |\cos(n!\pi x)|^m = 0$.

On en déduit que $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{m \rightarrow +\infty} |\cos(n!\pi x)|^m = 0$.

On a montré que $f = \mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$.

XIII.3.7 $f \circ f = \text{Id}_{\mathbb{R}_+}$ ★★

[Enoncé]

f est bijective donc en particulier injective. Etant continue, elle est strictement monotone sur \mathbb{R}_+ .

Supposons que f est décroissante.

$\forall x \in \mathbb{R}_+$, $f(x) \leq f(0)$. Donc $f(0) + 1 \notin f(\mathbb{R}_+)$ ce qui est absurde car f est surjective.

Ainsi f est strictement croissante. Supposons par l'absurde que $f \neq \text{Id}_{\mathbb{R}_+}$. Il existe alors $x \in \mathbb{R}_+$ tel que $f(x) \neq x$.

Mais alors $f(x) > x \iff f \circ f(x) > f(x) \iff x > f(x)$ ce qui est absurde.

Par conséquent $f = \text{Id}_{\mathbb{R}_+}$.

XIII.3.8 Point fixe d'une fonction continue et décroissante sur \mathbb{R}



[Enoncé]

$-f$ est croissante donc elle admet une limite $l_+ \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ en $+\infty$ et une limite $l_- \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ en $-\infty$.

Alors la fonction $g = \text{Id}_{\mathbb{R}} - f$ est continue et strictement croissante sur \mathbb{R} , $\lim_{-\infty} g = -\infty$ et $\lim_{+\infty} g = +\infty$. Ainsi d'après le théorème de la bijection, g est bijective de \mathbb{R} dans \mathbb{R} .

Par conséquent, $\exists! x \in \mathbb{R}$, $f(x) = x$.

XIII.3.9 Un théorème du point fixe (1) ★

[Enoncé]

Posons $g = f - \text{Id}_{[0,1]}$.

g est continue sur $[0, 1]$, $g(0) = f(0) \geq 0$ et $g(1) = f(1) - 1 \leq 0$.

Alors d'après le TVI, $\exists x \in [0, 1]$, $g(x) = 0$. c'est à dire $\exists x \in [0, 1]$, $f(x) = x$.

XIII.3.10 Un théorème du point fixe (2) ★★

[Enoncé]

Par hypothèse $(a, b) \in f(I)^2$ donc $\exists(\alpha, \beta) \in I^2$, $f(\alpha) = a$, $f(\beta) = b$.

Posons $g = f - \text{Id}_I$. g est continue sur I .

$(\alpha, \beta) \in I^2$ donc $a \leq \alpha$ et $\beta \leq b$.

Par conséquent, $g(\alpha) = f(\alpha) - \alpha = a - \alpha \leq 0$ et $g(\beta) = f(\beta) - \beta = b - \beta \geq 0$.

Alors d'après le TVI, $\exists x \in [a, b]$, $g(x) = 0$. C'est à dire $\exists x \in [a, b]$, $f(x) = x$.

XIII.3.11 Point fixe de $f \circ f$ ★

[Enoncé]

Supposons que f n'ait pas de point fixe. Alors étant continue, $f < \text{Id}_{\mathbb{R}}$ ou $f > \text{Id}_{\mathbb{R}}$.

Si $f < \text{Id}_{\mathbb{R}}$ alors $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(f(x)) < f(x) < x$. Or $f \circ f$ admet un point fixe et est continue donc ceci est absurde.

De même si $f > \text{Id}_{\mathbb{R}}$ alors $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(f(x)) > f(x) > x$ ce qui est absurde.

Finalement f admet un point fixe.

XIII.3.12 Point fixe de $f \circ g$ et $g \circ f$ ★★

[Enoncé]

1. La fonction $f \circ g - \text{Id}_{\mathbb{R}}$ est continue et strictement décroissante sur \mathbb{R} elle est donc injective.

Ensuite, par décroissance de $f \circ g$, $\forall x \in \mathbb{R}_+$, $f \circ g(x) - x \leq f \circ g(0) - x$ et $\forall x \in \mathbb{R}_-$, $f \circ g(x) - x \geq f \circ g(0) - x$.

Par conséquent $\lim_{x \rightarrow +\infty} f \circ g(x) - x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f \circ g(x) - x = +\infty$.

D'après le théorème des valeurs intermédiaire $f \circ g - \text{Id}$ s'annule sur \mathbb{R} c'est à dire $f \circ g$ admet un point fixe. De plus puisque qu'elle est injective sur \mathbb{R} ce point est unique.

2. Notons L le point fixe de $f \circ g$.

$f \circ g(L) = L \implies g \circ f(g(L)) = g(L)$ et donc $g \circ f$ admet $g(L)$ comme point fixe.

Soit L' un point fixe de $g \circ f$.

$g \circ f(L') = L' \implies f \circ g(f(L')) = f(L')$.

Alors d'après la question 1, $f(L') = L$ puis $g \circ f(L') = L' = g(L)$.

Ainsi $g(L)$ est l'unique point fixe de $g \circ f$.

XIII.3.13 Racine carrée de cos ★★★

[Enoncé]

- Posons $g = \text{Id}_{\mathbb{R}} - \cos$. g est dérivable sur \mathbb{R} et $\forall x \in \mathbb{R}$, $g'(x) = 1 + \sin(x) \geq 0$. De plus il n'y a égalité qu'en un nombre dénombrable de point donc g est strictement croissante sur \mathbb{R} .
Comme $g(0) = -1 < 0$, $g\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} \geq 0$ et comme g est continue sur \mathbb{R} , $\exists! x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $\cos(x) = x$.
- Supposons qu'une telle fonction existe.
Alors $f(x) = f(\cos(x)) = f \circ f(f(x)) = \cos(f(x))$.
Autrement dit $f(x)$ est un point fixe de \cos . Par unicité de ce point fixe, $f(x) = x$. Ensuite en dérivant $f \circ f = \cos$:
 $f' \times f' \circ f = -\sin$.
Puis en évaluant en x :
 $f'(x)f'(f(x)) = f'(x)^2 = -\sin(x) < 0$.
Ceci est absurde donc il n'existe pas de fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur \mathbb{R} telle que $f \circ f = \cos$.
- Supposons encore qu'une telle fonction existe.
Soient $x, y \in [0, \pi]$ tels que $f(x) = f(y)$.
Alors $f \circ f(x) = f \circ f(y)$ c'est à dire $\cos(x) = \cos(y)$ c'est à dire $x = y$ par injectivité de \cos sur $[0, \pi]$. Ainsi f est injective sur $[0, \pi]$. Etant continue elle est strictement monotone sur $[0, \pi]$.
Mais alors $f \circ f$ est strictement croissante sur $[0, \pi]$. En effet,
— f strictement croissante $\implies f(x) > f(y) \implies f(f(x)) > f(f(y))$;
— f strictement décroissante $\implies f(x) < f(y) \implies f(f(x)) > f(f(y))$.
Or ceci est absurde car \cos n'est pas strictement croissante sur $[0, \pi]$.
Finalement il n'existe pas de fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur \mathbb{R} telle que $f \circ f = \cos$.

XIII.3.14 Trigonométrie ★

[\[Énoncé\]](#)

- Soit $x \in [-1, 1]$. Posons $\alpha = \arcsin(x)$ et $\beta = \arccos(x)$. $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ et $\beta \in [0, \pi]$.

$$\sqrt{1-x^2} = \sqrt{1-\sin^2(\alpha)} = |\cos(\alpha)| = \cos(\arcsin(x)).$$

$$\sqrt{1-x^2} = \sqrt{1-\cos^2(\beta)} = |\sin(\beta)| = \sin(\arccos(x)).$$
- Posons $\theta = \arcsin(x) \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

$$\arctan\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right) = \arctan\left(\frac{\sin(\theta)}{\sqrt{1-\sin^2(\theta)}}\right) = \arctan\left(\frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}\right) = \arctan(\tan(\theta)) =$$

$$\theta = \arcsin(x).$$

Attention! L'avant dernière égalité est vraie car \arctan est la fonction réciproque de $\tan : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$.

3. Posons $f : x \mapsto \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$.

f est impaire : $\forall x \neq 0, f(-x) = \arctan(-x) + \arctan\left(-\frac{1}{x}\right) = -\arctan(x) - \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = -f(x)$.

f est dérivable sur \mathbb{R}_+^* .

$$\forall x > 0, f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2} \times \frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} = 0.$$

\mathbb{R}_+^* est un intervalle donc $\exists C \in \mathbb{R}, \forall x > 0, f(x) = C$.

$$\text{De plus } C = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{\pi}{2}.$$

$$\text{Donc } \begin{cases} \forall x > 0, \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2} \\ \forall x < 0, \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{\pi}{2} \end{cases}.$$

4. Posons $g : x \mapsto \arcsin(x) + \arccos(x)$. g est impaire sur $[-1, 1]$ et dérivable sur $] -1, 1[$ et,

$$\forall x \in] -1, 1[, g'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 0.$$

Donc $\exists C' \in \mathbb{R}, \forall x \in] -1, 1[, g(x) = C'$.

$$\text{On calcule } C' = \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = g(1) = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}.$$

$$\text{Ainsi } \forall x \in [-1, 1], \arcsin(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2}.$$

5. On déduit de la formule d'addition de $\tan : \forall (a, b) \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[, \tan(a) \tan(b) \neq 1 \implies$

$$\tan(a+b) = \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a) \tan(b)}, \text{ l'identité } \tan(4x) = \frac{2 \tan(2x)}{1 - \tan(2x)^2} = \frac{2 \frac{2 \tan(x)}{1 - \tan(x)^2}}{1 - \left(\frac{2 \tan(x)}{1 - \tan(x)^2} \right)^2} =$$

$$\frac{4 \tan(x)(1 - \tan^2(x))}{(1 - \tan^2(x))^2 - 4 \tan^2(x)}.$$

$$\tan\left(4 \arctan\left(\frac{1}{5}\right) - \arctan\left(\frac{1}{239}\right)\right) = \frac{\tan\left(4 \arctan\left(\frac{1}{5}\right)\right) - \tan\left(\arctan\left(\frac{1}{239}\right)\right)}{1 + \tan\left(4 \arctan\left(\frac{1}{5}\right)\right) \tan\left(\arctan\left(\frac{1}{239}\right)\right)}.$$

$$\text{On calcule } \tan\left(4 \arctan\left(\frac{1}{5}\right)\right) = \frac{\frac{4}{5} \left(1 - \left(\frac{1}{5}\right)^2\right)}{\left(1 - \left(\frac{1}{5}\right)^2\right)^2 - 4 \left(\frac{1}{5}\right)^2} = \frac{96}{\frac{576}{625} - \frac{4}{25}} = \frac{96}{125} \times \frac{625}{476} =$$

$$\frac{120}{119}.$$

$$\text{Puis } \tan\left(4 \arctan\left(\frac{1}{5}\right) - \arctan\left(\frac{1}{239}\right)\right) = \frac{\frac{120}{119} - \frac{1}{239}}{1 + \frac{120}{119} \times \frac{1}{239}} = 1.$$

Or $\frac{1}{5} \leq \frac{\sqrt{8}-2}{2}$ donc par croissance de \arctan ,

$$\arctan\left(\frac{1}{239}\right) \leq \arctan\left(\frac{1}{5}\right) \leq 4 \arctan\left(\frac{1}{5}\right) \leq 4 \arctan\left(\frac{\sqrt{8}-2}{2}\right) \text{ et } \arctan\left(\frac{1}{239}\right) \geq 0.$$

Posons $x = \tan\left(\frac{\pi}{8}\right)$.

On sait que $x \geq \arctan(0) = 0$ et que $1 = \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{2x}{1-x^2}$ donc que $1 - 2x - x^2 = 0$

$$\text{d'où } x = \frac{\sqrt{8}-2}{2}.$$

$$\text{Ainsi, } 0 \leq 4 \arctan\left(\frac{1}{5}\right) - \arctan\left(\frac{1}{239}\right) \leq \frac{\pi}{2}.$$

On en déduit par bijectivité de $\tan : \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[:$

$$4 \arctan\left(\frac{1}{5}\right) - \arctan\left(\frac{1}{239}\right) = \frac{\pi}{4}$$

XIII.3.15 Règle de l'Hôpital

[\[Énoncé\]](#)

XIII.3.16 Théorème de Darboux

[\[Énoncé\]](#)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur un intervalle I .

Réciproque du TVI ★

La réciproque est fausse, il suffit de prendre une fonction dérivable dont la dérivée n'est pas continue.

$$\text{L'exemple classique est } f : x \mapsto \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}.$$

D'après le théorème de Darboux, pour tout intervalle I de \mathbb{R} $f'(I)$ est un intervalle. Pourtant f' n'est pas continue sur \mathbb{R} .

Fonction non primitive ★

On considère une fonction partie entière $E : x \in \mathbb{R} \mapsto \lfloor x \rfloor$.

Supposons que E admette une primitive F sur un intervalle I d'intérieur non vide de \mathbb{R} .

Par définition, $\forall x \in I$, $F'(x) = E(x)$. Donc $F'(I)$ n'est pas un singleton et $F'(I) \subset E(\mathbb{R}) = \mathbb{Z}$. On en déduit que $F'(I)$ n'est pas un intervalle.

Ceci contredit le théorème de Darboux ainsi E n'admet pas de primitive.

Condition suffisante pour être de classe \mathcal{C}^1 ★★

f est convexe donc f' est croissante sur I . Fixons $c \in \overset{\circ}{I}$.

D'après le théorème de la limite monotone, f' admet des limites en c^+ et en c^- et $\lim_{c^-} f' \leq \lim_{c^+} f'$.

Or d'après le théorème de Darboux $f'(I)$ est un intervalle.

Alors $z < f'(c) \implies z \leq \lim_{c^-} f'$ et $f'(c) < z \implies \lim_{c^+} f' < z$.

Ainsi si $z \in \mathbb{R}$, $\lim_{c^-} f' = f'(c) = \lim_{c^+} f'$ et f' est continue en c .

Si I admet un maximum b alors en considérant $\lim_{b^-} f'$ et en utilisant le théorème de Darboux on obtient $\lim_{b^-} f' = f'(b)$.

De même si I admet un minimum a alors $\lim_{a^+} f' = f'(a)$.

Finalement f' est continue sur I c'est à dire f est de classe \mathcal{C}^1 sur I .

XIII.3.17 Dérivée et inverse confondu

[\[Énoncé\]](#)

XIII.3.18 Fonction croissante et convexe sur \mathbb{R} ★

[\[Énoncé\]](#)

1. On sait que $\forall x \in \mathbb{R}$, $f'(x) \geq 0$. De plus f n'est pas constante donc il existe $y \in \mathbb{R}$, $f'(y) > 0$.

Alors comme f est convexe, elle est au dessus de sa tangente en y :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq f'(y)(x - y) + f(y).$$

Or comme $f'(y) > 0$, $f'(y)(x - y) + f(y) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$. Ainsi $\lim_{+\infty} f = +\infty$.

2. Comme f n'est pas constante on sait qu'il existe deux réels x, y tels que $f(x) \neq f(y)$. Quitte à échanger x et y supposons que $x < y$. Par croissance, $f(x) < f(y)$.

Comme f est convexe, on sait que l'application $p : \begin{cases} \mathbb{R} \setminus \{x\} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ u & \longmapsto \frac{f(u) - f(x)}{u - x} \end{cases}$ est croissante.

Donc $\forall u \geq y$, $p(u) \geq p(y)$.

$$\text{Or, } \forall u \geq y, p(u) \geq p(y) \iff f(u) \geq \frac{u - x}{y - x}(f(y) - f(x)) + f(x).$$

$y - x > 0$ et $f(y) - f(x) > 0$ donc $\lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{u - x}{y - x}(f(y) - f(x)) + f(x) = +\infty$.

Ainsi $\lim_{+\infty} f = +\infty$.

XIII.3.19 Convexité des fonctions continues sur un intervalle ★★★★★

[Énoncé]

Si f est convexe sur I alors pour $\lambda = \frac{1}{2}$,

$$\forall (x, y) \in I^2, f\left(\frac{x+y}{2}\right) = f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y) = \frac{f(x) + f(y)}{2}$$

Réciproquement, supposons que $\forall (x, y) \in I^2, f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2}$.

Montrons par récurrence la propriété $\mathcal{P}(n)$: " $\forall (x_1, \dots, x_n) \in I^n, f\left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}\right) \leq \frac{f(x_1) + \dots + f(x_n)}{n}$ ", pour $n \geq 2$.

$\mathcal{P}(1)$ est vraie par hypothèse. Supposons $\mathcal{P}(n)$ pour un certain $n \geq 2$ puis montrons $\mathcal{P}(2n)$ et $\mathcal{P}(n-1)$ si $n \neq 2$. Fixons $(x_1, \dots, x_{2n}) \in I^{2n}$.

En posant $x = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$ et $y = \frac{x_{n+1} + \dots + x_{2n}}{n}$ on a $(x, y) \in I^2$ d'où :

$$f\left(\frac{x_1 + \dots + x_{2n}}{2n}\right) = f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2}.$$

Puis par hypothèse de récurrence, $f(x) \leq \frac{f(x_1) + \dots + f(x_n)}{n}$ et $f(y) \leq \frac{f(x_{n+1}) + \dots + f(x_{2n})}{n}$ d'où $\mathcal{P}(n+1)$.

Ensuite, supposons que $n \neq 2$ et donnons nous un $n-1$ -uplet (x_1, \dots, x_{n-1}) de I^{n-1} .

Posons $x_n = \frac{x_1 + \dots + x_{n-1}}{n-1}$. On a :

$$f(x_n) = f\left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}\right) \leq \frac{f(x_1) + \dots + f(x_n)}{n}.$$

C'est à dire $f(x_n) \leq \frac{f(x_1) + \dots + f(x_{n-1})}{n-1}$ d'où $\mathcal{P}(n-1)$.

Ainsi par récurrence de Cauchy, pour tout entier $n \geq 2$, $\mathcal{P}(n)$.

On peut alors en déduire que si $\lambda = \frac{a}{b} \in]0, 1[$ avec $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ alors, en posant $x_1 = \dots = x_a = x$ et $x_{a+1} = \dots = x_b = y$ on a par $\mathcal{P}(b)$:

$$\begin{aligned} \forall (x, y) \in I^2, f(\lambda x + (1-\lambda)y) &= f\left(\frac{ax + (b-a)y}{b}\right) = f\left(\frac{x_1 + \dots + x_b}{b}\right) \leq \frac{f(x_1) + \dots + f(x_b)}{b} = \\ &= \frac{af(x) + (b-a)f(y)}{b} = \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y). \end{aligned}$$

On conclut par densité de \mathbb{Q} dans \mathbb{R} et continuité de f .

XIII.3.20 Convexe sur un ouvert \implies continue ★★★★★

[Énoncé]

1. Soit $x \in I$.

La fonction $p_x : y \mapsto \frac{f(x) - f(y)}{x - y}$ est croissante sur $I \setminus \{x\}$ donc elle admet une limite en x par valeurs supérieures et par valeurs inférieures. Ces deux limites sont finies car x est un point intérieur à I donc f est dérivable, à gauche et à droite, en x . On note $f'_g(x)$ et $f'_d(x)$ ces deux limites.

On a $\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \underset{h \rightarrow 0^-}{=} f'_g(x) + o(1)$ donc $f(x+h) - f(x) \underset{h \rightarrow 0^-}{=} hf'_g(x) + o(h) \underset{h \rightarrow 0^-}{=} o(1)$.

Autrement dit $f(x+h) \xrightarrow{h \rightarrow 0^-} f(x)$.

De même, $\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \underset{h \rightarrow 0^+}{=} f'_d(x) + o(1)$ donc $f(x+h) \xrightarrow{h \rightarrow 0^+} f(x)$.

Ainsi $f(x+h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} f(x)$ c'est à dire f est continue en x .

2. L'hypothèse I ouvert est essentielle. Considérons $f : x \mapsto \begin{cases} e^x & \text{si } x > 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$.

f est deux fois dérivable sur \mathbb{R}_+^* et $\forall x > 0$, $f''(x) = e^x \geq 0$. Donc f est convexe sur \mathbb{R}_+^* . De plus, si $\lambda \in [0, 1]$ et $x > 0$, $f(\lambda x + (1-\lambda) \times 0) = e^{\lambda x} \leq \lambda e^x$ par convexité de la fonction exponentielle sur \mathbb{R}_+ .

Ainsi $f(\lambda x + (1-\lambda) \times 0) \leq \lambda e^x + (1-\lambda) = \lambda f(x) + (1-\lambda)f(0)$ d'où f est convexe sur \mathbb{R}_+ .

Pourtant f n'est pas continue en 0.

3. On sait que f est dérivable à droite et gauche en tout point de I . Soit $(x, y) \in I^2$ tel que $x < y$. Pour tous $s, t \in I$ tels que $x \neq s < y$ et $x < t \neq y$, $p_x(s) \leq p_x(y) = p_y(y) \leq p_x(t)$. En faisant tendre s vers x^\pm et t vers y^\pm on en déduit que $f'_g(x) \leq f'_g(y)$, $f'_d(x) \leq f'_d(y)$, $f'_g(x) \leq f'_d(y)$, $f'_d(x) \leq f'_g(y)$.

En particulier f'_d est croissante donc d'après le théorème de Froda (cf. ??) l'ensemble de ses points de discontinuité est au plus dénombrable. Montrons qu'en tous les points $x \in I$ où f'_d est continue, f'_g et f'_d coïncident, auquel cas f est dérivable en x .

Fixons $x \in I$ tel que f'_d est continue en I . Pour tout $s \in I$ tel que $s < x$, on a $f'_d(s) \leq f'_g(x) \leq f'_d(x)$. Donc par continuité de f'_g en x et le théorème des gendarmes, en faisant tendre s vers x , il suit que $f'_g(x) = f'_d(x)$.

XIII.3.21 Fonctions logarithmiquement convexes ★★

[Enoncé]

1. Supposons que f est log-convexe. Fixons $(x, y) \in I^2$ et $\lambda \in]0, 1[$. Par hypothèse, $\ln(f(\lambda x + (1-\lambda)y)) \leq \lambda \ln(f(x)) + (1-\lambda) \ln(f(y))$ puis par concavité du logarithme, $\lambda \ln(f(x)) + (1-\lambda) \ln(f(y)) \leq \ln(\lambda f(x) + (1-\lambda)f(y))$. Donc par passage à l'exponentielle, $f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)$ d'où f est convexe.

La réciproque est fautive, la fonction $x \mapsto x^2$ est convexe sur \mathbb{R}_+^* mais pas log-convexe.

2. Supposons que f est log-convexe. Fixons $\alpha > 0$.

$$\forall (x, y) \in I^2, \forall \lambda \in [0, 1], \ln(f(\lambda x + (1 - \lambda)y)^\alpha) = \alpha \ln(f(\lambda x + (1 - \lambda)y)) \leq \alpha[\lambda \ln(f(x)) + (1 - \lambda) \ln(f(y))] = \lambda \ln(f(x)^\alpha) + (1 - \lambda) \ln(f(y)^\alpha).$$

Donc f^α est log-convexe et donc f^α est convexe d'après la question précédente.

Réciproquement, supposons que pour tout $\alpha > 0$, f^α est convexe. Fixons $(x, y) \in I^2$ et $\lambda \in [0, 1]$.

$$\forall \alpha > 0, \frac{f(\lambda x + (1 - \lambda)y)^\alpha}{\alpha} \leq \frac{\lambda f(x)^\alpha + (1 - \lambda)f(y)^\alpha}{\alpha} \iff \ln(f(\lambda x + (1 - \lambda)y)) \leq \frac{\ln(\lambda f(x)^\alpha + (1 - \lambda)f(y)^\alpha)}{\alpha}.$$

Or

$$\begin{aligned} \lambda f(x)^\alpha + (1 - \lambda)f(y)^\alpha &= \lambda e^{\alpha \ln(f(x))} + (1 - \lambda)e^{\alpha \ln(f(y))} \\ &\underset{\alpha \rightarrow 0^+}{=} \lambda(1 + \alpha \ln(f(x)) + o(\alpha)) + (1 - \lambda)(1 + \alpha \ln(f(y)) + o(\alpha)) \\ &\underset{\alpha \rightarrow 0^+}{=} 1 + \alpha(\lambda \ln(f(x)) + (1 - \lambda) \ln(f(y))) \end{aligned}$$

Par conséquent $\ln(f(\lambda x + (1 - \lambda)y)) \leq \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\ln(\lambda f(x)^\alpha + (1 - \lambda)f(y)^\alpha)}{\alpha} = \lambda \ln(f(x)) + (1 - \lambda) \ln(f(y))$ et f est log-convexe.

3. Si f est log convexe alors pour tout $c > 0$ la fonction $\ln \circ \varphi_c = \ln \circ f + \ln(c) \text{Id}_I$ est convexe comme somme de fonctions convexes.

Réciproquement, supposons que φ_c soit convexe quel que soit $c > 0$.

$$\forall c > 0, f(\lambda x + (1 - \lambda)y)c^{\lambda x + (1 - \lambda)y} \leq \lambda f(x)c^x + (1 - \lambda)f(y)c^y.$$

$$\text{Posons } \Phi : c \mapsto \frac{\lambda f(x)c^x + (1 - \lambda)f(y)c^y}{c^{\lambda x + (1 - \lambda)y}} = \lambda f(x)c^{(1 - \lambda)(x - y)} + (1 - \lambda)f(y)c^{\lambda(y - x)}.$$


Φ est dérivable sur \mathbb{R}_+^* et $\forall c > 0$, $\Phi'(c) = \lambda(1 - \lambda)(x - y)(f(x)c^{(1 - \lambda)(x - y) - 1} - f(y)c^{\lambda(y - x) - 1})$.

Fixons $c > 0$. L'inégalité à vérifier est trivialement réalisée si $x = y$. On suppose donc $x \neq y$.

Supposons $x > y$:

$$\begin{aligned} \Phi'(c) \geq 0 &\iff f(x)c^{(1 - \lambda)(x - y) - 1} - f(y)c^{\lambda(y - x) - 1} \geq 0 \iff \frac{f(x)}{f(y)} \geq c^{y - x} \iff \ln(c) \geq \\ &\frac{\ln(f(x)) - \ln(f(y))}{y - x} = \ln(c_0). \end{aligned}$$

On obtient les mêmes variations pour $x < y$.

c	0	c_0	$+\infty$
$\Phi'(c)$	—	0	+
Variations de Φ			

La meilleure inégalité possible est celle pour $c = c_0$, il y a des chances que ce soit celle que l'on recherche.

$$\Phi(c_0) = \lambda f(x)c_0^{(1-\lambda)(x-y)} + (1-\lambda)f(y)c_0^{\lambda(y-x)} = \lambda f(x)e^{(\lambda-1)\ln(f(x)/f(y))} + (1-\lambda)f(y)e^{\lambda\ln(f(x)/f(y))} = \lambda f(x)^\lambda f(y)^{1-\lambda} + (1-\lambda)f(x)^\lambda f(y)^{1-\lambda} = f(x)^\lambda f(y)^{1-\lambda}.$$

Ainsi, $f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq f(x)^\lambda f(y)^{1-\lambda}$ c'est à dire f est log-convexe.

4. $\ln \circ (f \times g) = \ln \circ f + \ln \circ g$ est convexe comme somme de fonctions convexes donc $f \times g$ est log-convexe.

Soit $c > 0$. Notons $\varphi_c : x \mapsto f(x)c^x$ et $\psi_c : x \mapsto g(x)c^x$.

$x \mapsto (f+g)(x)c^x = \varphi_c + \psi_c$ est convexe comme somme de fonctions convexe.

Ainsi d'après la question précédente $f+g$ est log-convexe.

XIII.3.22 Etude d'une fonction définie implicitement

[Enoncé]

- On remarque que $g \circ (-g + 2Id_{\mathbb{R}}) = Id_{\mathbb{R}}$ donc g est bijective.
Puisque g est bijective, elle est a fortiori injective, et puisque g est continue, elle est strictement monotone.
Supposons que g est strictement décroissante.
Alors g^2 est strictement croissante, ce qui est absurde car une somme de deux fonctions décroissante est décroissante.
Donc g est strictement croissante.
- On pose $h = g - Id_{\mathbb{R}}$.
On remarque que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $h(g(x)) = h(x)$.
Montrons que h est une fonction constante.
Puisque g est bijective, pour tout $y \in \mathbb{R}$, il existe un unique $x \in \mathbb{R}$ tel que $g(x) = y$.
Ainsi, $h(y) = h(g(x)) = h(x)$. Par conséquent, en faisant parcourir y sur \mathbb{R} , x parcourt \mathbb{R} également, ce qui impose que h est constante.
Donc

$$\exists c \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, g(x) - x = c \text{ i.e. } g(x) = x + c$$

On vérifie que $\forall c \in \mathbb{R}$ la fonction $x \mapsto x + c$ vérifie la propriété.

XIII.3.23 Inégalités de Kolmogorov ★★★★★

[Enoncé]

- Si $M_k = 0$ alors $f^{(k)} = 0$ donc f est une fonction polynomiale. Or f est bornée car $M_0 < +\infty$ donc f est constante.
Par conséquent $\forall k \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $M_k = 0$. Les inégalités sont alors trivialement vérifiées.
- a. Soit $i \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket$. f est \mathcal{C}^n sur $[x, x+h_i]$ donc d'après l'inégalité de Taylor-Lagrange,

$$\left| f(x + h_i) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h_i^k}{k!} f^{(k)}(x) \right| \leq \frac{M_n}{n!} h_i^n.$$

Donc par inégalité triangulaire,

$$\left| \sum_{k=1}^{n-1} \frac{h_i^k}{k!} f^{(k)}(x) \right| = \left| \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h_i^k}{k!} f^{(k)}(x) - f(x + h_i) - f(x) + f(x + h_i) \right| \leq |f(x + h_i) - f(x)| + \frac{M_n}{n!} h_i^n \leq 2M_0 + \frac{M_n}{n!} h_i^n.$$

Pour conclure il suffit de poser $H = \max_{1 \leq i \leq n} h_i$.

- b. On note $X(x)$ le vecteur de \mathbb{C}^{n-1} dont les composantes sont les $\frac{f^{(k)}(x)}{k!}$ pour $1 \leq k \leq n-1$, $K = 2M_0 + \frac{M_n}{n!} H^n$ et $A = (h_i^j)_{1 \leq i, j \leq n-1}$. On vient de montrer que $\|AX(x)\|_\infty \leq K$. Or ceci étant vrai pour tout h_1, \dots, h_{n-1} strictement, ça l'est en particulier pour $(h_i)_{1 \leq i \leq n-1} = (i)_{1 \leq i \leq n-1}$. On reconnaît alors que la matrice A est de Vandermonde :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 2 & 2^2 & \dots & 2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ n-1 & (n-1)^2 & \dots & (n-1)^{n-1} \end{pmatrix}$$

Son déterminant est $(n-1)! \prod_{1 \leq i < j \leq n-1} (j-i) \neq 0$ donc elle est inversible.

Ainsi, on a $\|X(x)\|_\infty = \|A^{-1}AX(x)\|_\infty \leq \|A^{-1}\|_\infty \|AX(x)\|_\infty \leq K \|A^{-1}\|_\infty$. Ceci étant vrai pour tout $x \in \mathbb{R}$, on obtient par passage au sup que $\forall k \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $M_k \leq K \|A^{-1}\|_\infty < +\infty$.

3. a. Soit $x \in \mathbb{R}$.

D'après l'inégalité de Taylor-Lagrange, $|f(x+h) - f(x) - f'(x)h| \leq \frac{M_2}{2} h^2$ et $|f(x-h) - f(x) + f'(x)h| \leq \frac{M_2}{2} h^2$.

Donc

$$\begin{aligned} |f'(x)| &= \frac{1}{2h} |f'(x)h + f(x) - f(x+h) + f(x+h) - f(x) + f'(x)h + f(x) - f(x-h) + f(x-h) - f(x) + f'(x)h| \\ &\leq \frac{1}{2h} (|f'(x)h + f(x) - f(x+h)| + |f(x+h) - f(x-h)| + |f'(x)h - f(x) + f(x-h)|) \\ &\leq \frac{M_2 h}{2} + \frac{M_0}{h}. \end{aligned}$$

Puis par passage au sup, $M_1 \leq \frac{M_2 h}{2} + \frac{M_0}{h}$.

- b. On pose $G : h \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \frac{M_2 h}{2} + \frac{M_0}{h}$. G est dérivable sur \mathbb{R}_+^* et, $\forall h > 0$, $G'(h) = \frac{M_2}{2} - \frac{M_0}{h^2}$.

$$\text{Donc } \forall h > 0, G'(h) \geq 0 \iff h \geq \sqrt{\frac{2M_0}{M_2}}.$$

$$\text{Donc } G \text{ admet un minimum en } \sqrt{\frac{2M_0}{M_2}} \text{ et } M_1 \leq G\left(\sqrt{\frac{2M_0}{M_2}}\right) = \sqrt{2M_0 M_2}.$$

4. a. Par croissance de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$,

$$\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k u_i \leq \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k u_k = u_k \leq u_{k+1} = \frac{1}{n-k} \sum_{i=k+1}^n u_{k-1} \leq \frac{1}{n-k} \sum_{i=k+1}^n u_i.$$

- b. Soit $k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket$.

$$2x_k \leq x_{k-1} + x_{k+1}$$

$$\iff \ln(M_k^2) - k(n-k) \ln 2 \leq \ln(M_{k-1} M_{k+1}) - \frac{\ln 2}{2}((k-1)(n-k+1) + (k+1)(n-k-1))$$

$$\iff \ln(M_k^2) - k(n-k) \ln 2 \leq \ln(M_{k-1} M_{k+1}) - k(n-k) \ln 2 - \frac{\ln 2}{2}(k-n+k-1-k+n-1)$$

$$\iff \ln(M_k^2) \leq \ln(M_{k-1} M_{k+1}) + \ln 2$$

Or en appliquant la question 3.b à $f^{(k-1)}$ on a $M_k \leq \sqrt{2M_{k-1} M_{k+1}}$ d'où $\ln(M_k^2) \leq \ln 2 + \ln(M_{k-1} M_{k+1})$ d'où le résultat.

- c. D'après la question précédente $\forall k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket$, $x_k - x_{k-1} \leq x_{k+1} - x_k$.

$$\text{Donc d'après la question 4.a, si } k \in \llbracket 1; n \rrbracket \text{ alors } \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k (x_i - x_{i-1}) \leq \frac{1}{n-k} \sum_{i=k+1}^n (x_i - x_{i-1}).$$

$$\text{C'est à dire } \frac{x_k - x_0}{k} \leq \frac{x_n - x_k}{n-k} \text{ ou encore } n \left(\ln(M_k) - \frac{\ln 2}{2} k(n-k) \right) \leq k \ln(M_n) + (n-k) \ln(M_0).$$

$$\text{Enfin, par passage à l'exponentielle on obtient } M_k \leq 2^{\frac{k(n-k)}{2}} M_0^{1-\frac{n}{k}} M_n^{\frac{k}{n}}.$$

XIII.3.24 Lemme de Croft ★★

[Enoncé]

Soit $\varepsilon > 0$. Par uniforme continuité de f , $\exists \eta > 0$, $\forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^2$, $|x - y| \leq \eta \implies |f(x) - f(y)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$.

Par hypothèse la suite $(f(n\eta))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0. Donc $\exists N \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq N$, $|f(n\eta)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$.

Soit $x \geq N\eta$. $\exists n = \lfloor x \rfloor \geq N$, $n\eta \leq x < (n+1)\eta$.

D'une part, $|x - n\eta| \leq \eta$ donc $|f(x) - f(n\eta)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ et d'autre part, $n \geq N$ donc $|f(n\eta)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$.

Ainsi par inégalité triangulaire, $|f(x)| \leq |f(x) - f(n\eta)| + |f(n\eta)| \leq \varepsilon$.

Par conséquent $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

XIII.3.25 Inégalité intégrale de Jensen ★

[Enoncé]

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Notons pour $k \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket$, $x_k = a + k \times \frac{b-a}{n} \in [a, b]$.

$\frac{1}{n} \geq 0$ et $\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} = 1$ donc d'après l'inégalité de Jensen appliquée à φ qui est convexe :

$$\varphi \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} f(x_k) \right) \leq \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} \varphi \circ f(x_k).$$

Or comme $\varphi \circ f$ est continue par morceaux sur $[a, b]$, d'après le cours $\frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \varphi \circ f(x_k) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty}$

$$\int_a^b \varphi \circ f(t) dt.$$

De même, $\frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) dt$.

Ainsi par continuité de φ , le passage à la limite donne :

$$\varphi \left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt \right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b \varphi \circ f(t) dt$$

XIII.4 Correction Polynômes

XIII.4.1 Théorème de d'Alembert-Gauss (2)

[\[Enoncé\]](#)

XIII.4.2 Bernoulli

[\[Enoncé\]](#)

XIII.4.3 Lagrange ★

[\[Enoncé\]](#)

1. On sait que : $\dim(\mathbb{K}_{n-1}[X]) = n = \dim(\mathbb{K}^n)$, ainsi il suffit de montrer que Ψ est injective.

Soit $P \in \text{Ker}(\Psi)$

On a alors $(P(x_1), \dots, P(x_n)) = (0, \dots, 0)$. Donc P est un polynôme de degré au plus $n - 1$ qui admet n racines. Donc P est nul.

Ainsi Ψ est bijective.

2. On note (e_1, \dots, e_n) la base canonique de \mathbb{K}^n . On pose pour tout $k \in \llbracket 1; n \rrbracket, L_k = \Psi^{-1}(e_k)$ Ainsi pour tout $(i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2, L_i(x_j) = \delta_{i,j}$. Et on remarque que P et $\sum_{k=1}^n P(x_k) L_k$ coïncident sur n points et sont tous deux de degré au plus $n - 1$.

$$\text{Donc } P = \sum_{k=1}^n P(x_k) L_k$$

XIII.4.4 Tchebychev

[\[Enoncé\]](#)

Angles rationnels dont le cosinus est rationnel

Triangle à angles rationnels sont tous les côtés ont un longueur rationnelle

Triangles dont les sommets sont à coordonnées rationnelles

XIII.4.5 Hilbert

[\[Enoncé\]](#)

Points critiques des polynômes de Hilbert ★★

1. Notons $f_n : x \mapsto F_n(x)$. f_n est \mathcal{C}^∞ sur $]0, 1[$ car F_n n'admet pas de pôle dans cet intervalle.

Ensuite d'après le cours $F_n(X) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{X-k}$. Donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$.

De plus $\forall x \in]0, 1[$, $f'_n(x) = -\sum_{k=0}^n \frac{1}{(X-k)^2} < 0$. Donc f_n est strictement décroissante sur $]0, 1[$.

D'après le théorème de la bijection f_n s'annule exactement une fois sur $]0, 1[$.

2. Fixons $n \geq 2$. $f_n(x_n) = 0$ donc $\frac{1}{x_n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k-x_n} \geq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} := H_n$.

On sait que $H_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ donc $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

3. Fixons $n \geq 2$.

On réécrit de même $H_n \leq \frac{1}{x_n} = \frac{1}{1-x_n} + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k-x_n} \leq \frac{1}{1-x_n} + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k-1} = \frac{1}{1-x_n} +$

$$H_{n-1} = \frac{1}{1-x_n} - \frac{1}{n} + H_n.$$

Or on montre classiquement (cf. ??) que $H_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln n$ d'où $\frac{1}{1-x_n} - \frac{1}{n} + H_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln n$

puis $x_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\ln n}$.

XIII.4.6 Laguerre

[\[Énoncé\]](#)

XIII.4.7 Legendre

[\[Énoncé\]](#)

XIII.4.8 Hermite

[\[Énoncé\]](#)

XIII.4.9 Bernstein

[\[Énoncé\]](#)

XIII.4.10 Polynômes cyclotomiques

[Enoncé]

XIII.4.11 Suite de polynômes défini par récurrence

[Enoncé]

XIII.4.12 Théorème de la racine rationnelle

[Enoncé]

XIII.4.13 Critère d'Eisenstein ★★

[Enoncé]

1. a. Notons $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ et $Q = \sum_{k=0}^m b_k X^k$.

On considère $\tilde{P} = \frac{P}{c(P)}$ et $\tilde{Q} = \frac{Q}{c(Q)}$. \tilde{P} et \tilde{Q} sont à coefficients entiers et on montre aisément qu'ils sont de contenu 1 (on dit qu'ils sont *primitifs*). Il suffit donc de montrer le résultat pour P et Q de contenus égaux à 1. Dans ce cas il faut montrer que $c(PQ) = 1$.

Soit p un nombre premier. On sait, comme P et Q sont primitifs, qu'il existe des coefficients de P et Q qui ne sont pas divisibles par p . On note $i = \min\{k \in \llbracket 0; n \rrbracket, p \nmid a_k\}$ et $j = \min\{k \in \llbracket 0; m \rrbracket, p \nmid b_k\}$.

D'après la formule du produit de Cauchy le coefficient de X^{i+j} dans PQ est congrus à $a_i b_j$ modulo p . Il n'est donc pas divisible par p d'où $p \nmid c(PQ)$. On en déduit que $c(PQ) = 1$.

Preuve plus rapide qui sort un peu du programme :

Supposons que p est un diviseur premier de $c(PQ)$. Alors p divise tous les coefficients de PQ . On note \overline{P} le polynôme de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ dont les coefficients sont les classes des coefficients de P . On note de même \overline{Q} et $\overline{PQ} = \overline{P} \cdot \overline{Q}$.

On a $\overline{PQ} = 0$ donc comme $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$ est intègre (on l'a en fait remontré dans la première preuve) on en déduit que $\overline{P} = 0$ ou $\overline{Q} = 0$. Ceci est absurde car p ne divise ni $c(P)$ ni $c(Q)$. Ainsi $c(PQ) = 1$.

- b. Soient $P, Q \in \mathbb{Q}[X]$ unitaires. Il est évident que si $P, Q \in \mathbb{Z}[X]$ alors $S = PQ \in \mathbb{Z}[X]$. Supposons réciproquement que $PQ \in \mathbb{Z}[X]$. On note a le pgcd des dénominateurs des coefficients de P et b celui des dénominateurs des coefficients de Q , de sorte que

$aP, bQ \in \mathbb{Z}[X]$. On considère $\tilde{P} = \frac{aP}{c(aP)}$ et $\tilde{Q} = \frac{bQ}{c(bQ)}$ de sorte que $c(\tilde{P}) = c(\tilde{Q}) = 1$.

On sait que $\tilde{P}\tilde{Q} = \frac{a}{c(aP)} \cdot \frac{b}{c(bQ)} S$. On remarque que le contenu de S vaut 1 car il est unitaire. Donc en passant au contenu, $1 = c(\tilde{P})c(\tilde{Q}) = \frac{a}{c(aP)} \cdot \frac{b}{c(bQ)}$. De plus $\frac{a}{c(aP)}$ et $\frac{b}{c(bQ)}$ sont des entiers. Ils valent donc tous les deux ± 1 . Ainsi $P = \pm \tilde{P} \in \mathbb{Z}[X]$ et $Q = \pm \tilde{Q} \in \mathbb{Z}[X]$.

2. Supposons pas l'absurde qu'il existe deux polynômes à coefficients rationnels $B = \sum_{k=0}^d b_k X^k$

et $C = \sum_{k=0}^{n-d} c_k X^k$ tels que $A = BC$ et $0 < d = \deg(B) < n$. Quitte à les diviser par leur coefficient dominant on peut supposer que B et C sont unitaires.

Alors d'après la question 1, B et C sont à coefficients entiers. On sait que $p|a_0 = b_0 c_0$ et comme $p^2 \nmid a_0$, p divise un et un seul des deux entiers b_0, c_0 . On suppose sans perte de généralité que c'est b_0 .

Montrons par récurrence forte que $\forall k \in \llbracket 0; d \rrbracket$, $p|b_k$.

On vient de faire l'initialisation. Supposons que pour un certain entier $k \in \llbracket 0; d-1 \rrbracket$, $\forall i \in \llbracket 0; k \rrbracket$, $p|b_i$.

D'après l'hypothèse de l'énoncé $p|a_{k+1} = \sum_{i=\max(0, k+1+d-n)}^{k+1} b_i c_{k+1-i}$. Donc par hypothèse

de récurrence $p|b_{k+1}c_0$.

Or $p \nmid c_0$ donc d'après le lemme d'Euclide $p|b_{k+1}$.

Mais alors en particulier $p|b_d = 1$ ce qui est absurde. On en déduit que B ou C est constant et donc que A est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Preuve plus rapide qui sort un peu du programme :

On reprend à $A = BC$ avec $B, C \in \mathbb{Z}[X]$ unitaires. On note \overline{A} le polynôme de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ dont les coefficients sont les classes des coefficients de A . On note de même \overline{B} et \overline{C} et $\overline{BC} = \overline{B} \cdot \overline{C}$.

L'hypothèse de l'énoncé se traduit par $\overline{A} = X^n$. Donc $X^n = \overline{B} \cdot \overline{C}$ d'où comme $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$ est intègre (on l'a en fait montré dans la réponse à la question 1), $\overline{B} = X^k$ et $\overline{C} = X^{n-k}$.

On repasse dans $\mathbb{Z}[X]$: on a obtenu que $\forall i \in \llbracket 0; k-1 \rrbracket$, $p|b_i$ et $\forall j \in \llbracket 0; n-k-1 \rrbracket$, $p|c_j$. En particulier $p|b_0$ et $p|c_0$ d'où $p^2|b_0 c_0 = a_0$ ce qui est absurde.

Irréductibilité des polynômes cyclotomiques d'indices premiers ★★

$$\Phi_p(X) = \frac{X^p - 1}{X - 1} \text{ donc } \Psi_p(X) = \frac{(X+1)^p - 1}{X} = \sum_{k=1}^p \binom{p}{k} X^{k-1} = X^{p-1} + \sum_{k=0}^{p-2} \binom{p}{k+1} X^k.$$

Or si $k \in \llbracket 0; p-2 \rrbracket$ alors $p \mid \prod_{i=p-k}^p i = \binom{p}{k+1} (k+1)!$. Et comme p est premier et $0 < k+1 <$

p , $\text{pgcd}(p, (k+1)!) = 1$. Donc d'après le lemme de Gauss $p \mid \binom{p}{k+1}$.

De plus $p^2 \nmid \binom{p}{1} = p$.

Par conséquent d'après le critère d'Eisenstein Ψ_p est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Pour conclure il suffit d'évaluer, pour $B, C \in \mathbb{Q}[X]$, l'égalité $\Phi_p = BC$ en $X+1$. On obtient $B(X+1)$ ou $C(X+1)$ est constant d'où B ou C est constant et Φ_p est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Dimension de \mathbb{R} en tant que \mathbb{Q} -espace vectoriel ★★★

1. f_α est un morphisme d'algèbre donc son noyau est un idéal de $\mathbb{Q}[X]$.

Montrons que tous les idéaux de $\mathbb{Q}[X]$ sont principaux (i.e engendré par un seul élément). Soit I un idéal non nul de $\mathbb{Q}[X]$. L'ensemble des degrés des éléments de $I \setminus \{0\}$ est une partie non vide de \mathbb{N} , elle admet donc un minimum. On considère un polynôme Π qui réalise ce minimum. Quitte à le multiplier par l'inverse de son coefficient dominant (qui est dans \mathbb{Q} car \mathbb{Q} est un corps) on peut aussi supposer Π unitaire. Montrons que $I = \Pi\mathbb{Q}[X]$.

Par absorbance $\Pi\mathbb{Q}[X] \subset I$. Réciproquement si $P \in I$ alors on pose $P = Q\Pi + R$ la division euclidienne de P par Π . Comme \mathbb{Q} est un corps et comme $\Pi, P \in \mathbb{Q}[X]$, l'algorithme de division euclidienne assure que $Q, R \in \mathbb{Q}[X]$.

Alors $R = P - Q\Pi \in I$, par conséquent R ne peut pas être non nul car sinon la condition $\deg(R) < \deg(\Pi)$ contredirait la minimalité de π en degré. Ainsi $R = 0$ et $P \in \Pi\mathbb{Q}[X]$.

On peut alors se donner un polynôme unitaire Π_α tel que $\text{Ker}(f_\alpha) = \Pi_\alpha\mathbb{Q}[X]$. Comme $P \in \text{Ker}(f_\alpha)$ on a $\Pi_\alpha \mid P$. Or d'après le critère d'Eisenstein P est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$. On en déduit que P et Π_α sont associés, et donc qu'ils sont égaux étant tous deux unitaires.

2. Soit $(q_0, \dots, q_n) \in \mathbb{Q}^{n+1}$ tel que $\sum_{k=0}^n q_k \alpha^k = 0$.

On a donc $Q(\alpha) = 0$ avec $Q = \sum_{k=0}^n q_k X^k \in \mathbb{Q}[X]$ i.e $Q \in \text{Ker}(f_\alpha)$ d'où $P \mid Q$.

Enfin, $\deg(Q) \leq n < n+1 = \deg(P)$ donc $Q = 0$. C'est à dire $\forall k \in \llbracket 0; n \rrbracket$, $q_k = 0$.

En outre la famille $(1, \alpha, \dots, \alpha^n)$ est \mathbb{Q} -libre.

3. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ on considère la polynôme $P_n = X^n - 2$.

P_n vérifie le critère d'Eisenstein ($p = 2$). Donc la famille $(1, \sqrt{2}, \dots, \sqrt{2}^n)$ est libre dans \mathbb{Q} .

Ainsi \mathbb{R} n'admet pas de famille \mathbb{Q} -libre maximale : \mathbb{R} est un \mathbb{Q} -espace vectoriel de dimension infinie.

XIII.4.14 Zéros des polynômes de Taylor du sinus

[Enoncé]

XIII.4.15 Intégrales de polynômes ★

[Enoncé]

Notons (L_0, \dots, L_n) la base de Lagrange aux points x_0, \dots, x_n . Fixons $P \in \mathbb{K}_n[X]$.

On sait que $P = \sum_{i=0}^n P(x_i) L_i$.

$$\text{Donc } \int_a^b P(x) dx = \sum_{i=0}^n \int_a^b P(x_i) L_i(x) dx = \sum_{i=0}^n P(x_i) \int_a^b L_i(x) dx = \sum_{i=0}^n \lambda_i P(x_i) \text{ avec } \lambda_i = \int_a^b L_i(x) dx.$$

XIII.4.16 Théorème de Gauss-Lucas ★★

[Enoncé]

1. Soit α une racine de P' . Si α est racine de P , il n'y a rien à faire. Sinon, On sait que

$$\frac{P'}{P} = \sum_{k=1}^r \frac{n_k}{X - z_k}. \text{ Alors,}$$

$$0 = \frac{P'(\alpha)}{P(\alpha)} = \sum_{k=1}^r \frac{n_k}{\alpha - z_k} = \sum_{k=1}^r \frac{n_k \cdot \overline{\alpha - z_k}}{|\alpha - z_k|^2}$$

et en passant au conjugué :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^r \frac{n_k(\alpha - z_k)}{|\alpha - z_k|^2} &= 0 \\ \iff \alpha \sum_{k=1}^r \frac{n_k}{|\alpha - z_k|^2} &= \sum_{k=1}^r \frac{n_k}{|\alpha - z_k|^2} z_k \end{aligned}$$

Notons $\lambda = \sum_{k=1}^r \frac{n_k}{|\alpha - z_k|^2}$. En posant pour $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $\lambda_k = \frac{n_k}{\lambda |\alpha - z_k|^2} \geq 0$ on a

$$\alpha = \sum_{k=1}^r \lambda_k z_k \text{ et } \sum_{k=1}^r \lambda_k = 1$$

2. si les z_k sont tous réels alors α l'est aussi : P' est à racines réelles.

Une application ★★

1. Notons $\mathcal{C} = \{C \subset R_P, \text{Conv}(C) = \text{Conv}(R_P)\}$ et $\mathcal{D} = \{|C|, C \in \mathcal{C}\}$.

\mathcal{D} est une partie non vide ($R_P \in \mathcal{C}$) de \mathbb{N}^* ($\text{Conv}(\emptyset) = \emptyset \neq \text{Conv}(R_P)$ puisque P a une racine par le théorème de d'Alembert-Gauss), elle admet donc un minimum. Notons C_0 tel que $|C_0| = \min \mathcal{D}$.

Fixons $C \in \mathcal{C}$ telle que $C \subset C_0$. Alors $|C| \leq |C_0|$ et par définition de C_0 , $|C_0| \leq |C|$. Donc $|C| = |C_0|$ d'où $C = C_0$.

Fixons $a, b \in \text{Conv}(R_P) \setminus R_{P,\min}$ ainsi que $t \in]0, 1[$. $\text{Conv}(R_P)$ est convexe par définition donc $\gamma(t) = ta + (1-t)b \in \text{Conv}(R_P)$. Supposons que $\gamma(t) \in R_{P,\min}$.

Quitte à réindicer, on peut supposer que $R_{P,\min} = \{z_k, k \in \llbracket 1; m \rrbracket\}$ pour un certain $m \in \llbracket 1; r \rrbracket$. $a, b \in \text{Conv}(R_P) = \text{Conv}(R_{P,\min})$ donc il existe $(\lambda_1, \dots, \lambda_m), (\mu_1, \dots, \mu_m) \in (\mathbb{R}_+)^m$ tels que $\sum_{k=1}^m \lambda_k = 1 = \sum_{k=1}^m \mu_k$, $a = \sum_{k=1}^m \lambda_k z_k$ et $b = \sum_{k=1}^m \mu_k z_k$.

Notons $p \in \llbracket 1; m \rrbracket$ tel que $\sum_{k=1}^m (t\lambda_k + (1-t)\mu_k)z_k = z_p$, c'est à dire tel que $\sum_{\substack{1 \leq k \leq m \\ k \neq p}} \nu_k z_k =$

$(1 - \nu_p)z_p$. avec $\nu_k = t\lambda_k + (1-t)\mu_k$.

On remarque que $\sum_{k=1}^m \nu_k = 1$ et que $\forall k \in \llbracket 1; m \rrbracket$, $\nu_k \geq 0$.

Si $\nu_p < 1$ alors on a $z_p = \sum_{\substack{1 \leq k \leq m \\ k \neq p}} \frac{\nu_k}{1 - \nu_p} z_k$ avec $\sum_{\substack{1 \leq k \leq m \\ k \neq p}} \frac{\nu_k}{1 - \nu_p} = 1$ et $\forall k \in \llbracket 1; m \rrbracket \setminus$

$\{p\}$, $\frac{\nu_k}{1 - \nu_p} \geq 0$. Donc $z_p \in \text{Conv}(z_k, k \in \llbracket 1; m \rrbracket \setminus \{p\})$ ce qui contredit la minimalité de $R_{P,\min}$.

Et si $\nu_p = 1$ alors $\forall k \in \llbracket 1; m \rrbracket \setminus \{p\}$, $\nu_k = 0$. D'où, comme $0 < t < 1$, $\forall k \in \llbracket 1; m \rrbracket \setminus \{p\}$, $\lambda_k = \mu_k = 0$ d'où $a = b = z_p$. Ceci est absurde car $a \notin R_{P,\min}$ par exemple.

Ainsi, $\gamma(t) \notin R_{P,\min}$ et donc $\text{Conv}(R_P) \setminus R_{P,\min}$ est convexe.

2. Tout d'abord, si P n'a qu'une seule racine alors il n'y a rien à montrer. Supposons que P a au moins deux racines distinctes. $\exists Q \in \mathbb{C}[X]$, $n(n-1)P = QP''$ avec $n = \deg(P)$

(de manière à ce que Q soit unitaire). De plus, $(P \neq 0 \wedge P''|P) \implies P'' \neq 0$. Donc $n \geq 2$ et $\deg(Q) = 2$.

On dérive $\frac{P'}{P}$ sur \mathbb{R} :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, \quad \frac{P''(x)P(x) - P'(x)^2}{P(x)^2} &= \frac{\frac{n(n-1)P(x)^2}{Q(x)} - P'(x)^2}{P(x)^2} = \frac{n(n-1)}{Q(x)} - \left(\frac{P'(x)}{P(x)}\right)^2 = \\ &= -\sum_{k=1}^r \frac{n_k}{(x - z_k)^2}. \\ \iff \forall x \in \mathbb{R}, \quad \sum_{k=1}^r \frac{n_k}{(x - z_k)^2} &= \left(\sum_{k=1}^r \frac{n_k}{x - z_k}\right)^2 - \frac{n(n-1)}{Q(x)}. \end{aligned}$$

Soit $p \in \llbracket 1; r \rrbracket$. On multiplie dans la relation par $(x - z_p)^2$ puis on l'évalue en $x = z_p$:

Si z_p n'est pas racine double de Q alors, $n_p = n_p^2$ d'où $n_p = 1$ car $n_p > 0$.

Et si z_p est racine double de Q alors $Q = (X - z_p)^2$ et, $n_p(n_p - 1) = n(n - 1)$ d'où $n_p = n$ ce qui est absurde car dans ce cas z_p est la seule racine de P .

On en déduit que P est scindé à racines simples.

D'après la question 1, $R_{P'} \subset \text{Conv}(R_{P,\min})$. De plus, comme P est à racines simples, aucune racine de P' n'est racine de P . On a donc $R_{P'} \subset B = \text{Conv}(R_{P,\min}) \setminus R_{P,\min}$ puis $R_{P''} \subset \text{Conv}(R_{P'}) \subset \text{Conv}(B) = B$ puisque B est convexe.

D'autre part, $|R_{P''}| = |R_P| - 2$ et $P''|P \implies R_{P''} \subset R_P$.

Ainsi, il y a au moins $n - 2$ éléments de R_P qui ne sont pas dans $R_{P,\min}$, c'est à dire qu'il y a au plus deux racines de P qui sont dans $R_{P,\min}$, c'est à dire qu'il y a exactement deux racines de P qui permettent d'exprimer chaque racine de P comme barycentre à coefficients positifs d'elles mêmes (il ne peut pas en avoir une seule car on a vu que $|R_{P,\min}| > 1$).

Ceci montre que les racines de P sont alignées.

- La réciproque est fausse en général. Tous les polynômes à racines réelles ont leur racines alignées (sur la droite des réels), il suffit donc de trouver un contre exemple parmi ces polynômes.

On prend $P = X^2(X - 1) = X^3 - X^2$. $P'' = 6X - 2$ ne divise pas P .

XIII.4.17 Une condition nécessaire pour qu'un polynôme réel soit à racines réelles ★★

[Énoncé]

- On écrit $P = \Lambda \prod_{i=1}^r (X - x_i)^{m_i}$, où $S = \{x_i, i \in \llbracket 1; r \rrbracket\}$ est l'ensemble des racines de P .

On sait alors que $\frac{P'}{P} = \sum_{i=1}^r \frac{m_i}{X - x_i}$ et par dérivation, $\forall x \in \mathbb{R} \setminus S$, $\frac{P''(x)P(x) - (P'(x))^2}{(P(x))^2} =$

$$\sum_{i=1}^r -\frac{m_i}{(x-x_i)^2} \leq 0.$$

c'est à dire $\forall x \in \mathbb{R} \setminus S, P''(x)P(x) - (P'(x))^2 \leq 0$.

L'inégalité est trivialement vérifiée sur S .

2. Première méthode : théorème de Rolle

Initialisation :

Quitte à réindicer on peut supposer $x_1 < \dots < x_r$. Soit $i \in \llbracket 1; r-1 \rrbracket$. On sait que x_i est racine de P' de multiplicité $m_i - 1$ (en considérant que x_i n'est pas racine de P' si $m_i - 1 = 0$).

De plus $x_i < x_{i+1}$, $P(x_i) = 0 = P(x_{i+1})$ et $x \mapsto P(x)$ est continue sur $[x_i, x_{i+1}]$ et dérivable sur $]x_i, x_{i+1}[$ donc d'après le théorème de Rolle, $\exists y_i \in]x_i, x_{i+1}[$, $P'(y_i) = 0$.
De par la définition des y_i on a $y_1 < \dots < y_{r-1}$.

On a donc trouvé $r - 1 + \sum_{i=1}^r (m_i - 1) = \deg(P) - 1$ racines de P' , comptées avec multiplicité.

Comme $\deg(P') \leq \deg(P) - 1$, P' n'a pas d'autre racine. Elles sont donc bien toutes réelles.

Hérédité :

Soit $k \in \llbracket 1; n-2 \rrbracket$ tel que $P^{(k)}$ n'ai que des racines réelles. En appliquant le résultat précédant à $P^{(k)}$ on obtient directement le résultat voulu.

Conclusion : Pour tout $k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket$, $P^{(k)}$ est à racines réelles.

Deuxième méthode : théorème de Gauss-Lucas

l'exercice XIII.4.16 montre que si P est à racines réelles alors P' l'est aussi. Une récurrence similaire à celle de l'autre méthode permet de conclure.

3. On applique le résultat de la question 1 à $P, P', \dots, P^{(n-1)}$:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket, P^{(k+1)}(x)P^{(k-1)}(x) - (P^{(k)}(x))^2 \leq 0$$

En particulier d'après la formule de Taylor, pour $x = 0$:

$$\begin{aligned} \forall k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket, (k+1)! a_{k+1} \cdot (k-1)! a_{k-1} &\leq (k!)^2 a_k^2 \\ \iff a_{k+1} a_{k-1} \frac{k+1}{k} &\leq a_k^2 \end{aligned}$$

Enfin si $a_{k+1} a_{k-1} \leq 0$, l'inégalité est trivialement vérifiée,

$$\text{et si } a_{k+1} a_{k-1} > 0 \text{ alors } \frac{k+1}{k} \geq 1 \implies a_{k+1} a_{k-1} \leq a_{k+1} a_{k-1} \frac{k+1}{k} \leq a_k^2.$$

XIII.4.18 Polynômes qui commutent avec cosinus ★★ ★

[Enoncé]

On note $(*) : \forall x \in \mathbb{R}, P(\cos(x)) = \cos(P(x))$

1. Notons $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $P(X) = \lambda$.

En évaluant $(*)$ en n'importe quel point on obtient $\lambda = \cos(\lambda)$. Posons $f : x \mapsto x - \cos(x)$. f est dérivable sur \mathbb{R} et,

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = 1 - \sin(x) \geq 0$$

De plus, il n'y a égalité que sur un nombre dénombrable de points donc f est strictement croissante sur \mathbb{R} .

$\lim_{-\infty} f = -\infty < 0 < +\infty = \lim_{+\infty} f$ donc d'après le théorème de la bijection, $\exists! \lambda \in \mathbb{R}, f(\lambda) = 0$ i.e $\cos(\lambda) = \lambda$.

2. Notons $P(X) = aX + b$ avec $a \neq 0$.

On dérive deux fois la relation $(*)$, $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} -a \sin(x) &= -a \sin(ax + b) \\ \iff \sin(x) &= \sin(ax + b) \quad (\text{car } a \neq 0) \end{aligned}$$

puis :

$$\cos(x) = a \cos(ax + b) \stackrel{(*)}{=} a^2 \cos(x) + ab$$

Donc $(**)$: $\forall x \in \mathbb{R}, (a^2 - 1) \cos(x) = ab$ D'où $a^2 - 1 = 0$ c'est à dire $a = 1$ ou $a = -1$.

En reportant dans $(**)$ on a $ab = 0$. Or $a \neq 0$ donc on en déduit que $b = 0$.

On vérifie alors que $a = 1$, qui donne $P = X$, fonctionne et $a = -1$, qui donne $P = -X$, ne fonctionne pas.

3. Supposons que $\deg(P) \geq 2$.

En dérivant $(*)$:

$$(*)' : \forall x \in \mathbb{R}, -\sin(x)P'(\cos(x)) = -P'(x)\sin(P(x))$$

$\cos(\mathbb{R}) = [-1, 1]$ et $x \mapsto P'(x)$ est continue sur $[-1, 1]$ donc d'après le théorème des bornes atteintes, $x \mapsto P'(\cos(x))$ est bornée sur \mathbb{R} . Ainsi le membre de gauche de $(*)'$ est borné sur \mathbb{R} . Notons $M \in \mathbb{R}^+$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, |\sin(x)P'(\cos(x))| \leq M$.

$\deg(P) \geq 2$ assure que $|P'(x)| \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$, on peut alors se donner $A > 0$ tel que $\forall x > A, |P'(x)| > M$.

Enfin $x \mapsto P(x)$ est continue sur \mathbb{R} et $P(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \pm\infty$ donc $P([A, +\infty[) \cap \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z} \neq \emptyset$

ce qui permet d'assurer l'existence de $x_0 > A$ tel que $|\sin(P(x_0))| = 1$ de sorte que $M < |P'(x_0)\sin(P(x_0))| = |\sin(x_0)P'(\cos(x_0))| \leq M$.

Ceci est absurde donc les seuls polynômes solutions sont $P = X$ et $P = \lambda$.

XIII.4.19 Relation trigonométrique polynomiale ★★ ★

[Enoncé]

soit $P \in \mathbb{R}[X]$ vérifiant (0) : $\forall t \in \mathbb{R}, P(\cos t) + P(\sin t) = 1$. Fixons $t \in \mathbb{R}$

(1) : $P(\cos(-t)) + P(\sin(-t)) = P(\cos t) + P(-\sin t) = 1$

Donc (1) – (0) : $P(-\sin t) = P(\sin t)$

Ainsi, $\forall x \in [-1, 1]$, $P(-x) = P(x)$. Comme $[-1, 1]$ est infini, $P(-X) = P(X)$. Donc P est pair c'est à dire $P \in \mathbb{R}[X^2]$ c'est à dire $\exists Q \in \mathbb{R}[X]$, $P(X) = Q(X^2)$.

Alors $P(\cos t) + P(\sin t) = 1 \iff Q(\cos^2 t) + Q(\sin^2 t) = 1 \iff Q(\cos^2 t) + Q(1 - \cos^2 t) = 1$.

Ainsi, $\forall x \in [0, 1]$, $Q(x) + Q(1 - x) = 1$. Donc (2) : $Q(X) + Q(1 - X) = 1$.

Posons $R(X) = Q(X + 1/2) - 1/2$.

(2) $\iff R(X) + R(-X) = Q(1/2 + X) + Q(1/2 - X) - 1 = Q(1/2 + X) + Q(1 - (1/2 + X)) - 1 = 1 - 1 = 0$. donc R est impair c'est à dire $R \in X\mathbb{R}[X^2]$ c'est à dire $\exists S \in \mathbb{R}[X]$, $R(X) = XS(X^2)$. En reportant jusqu'à revenir à P on a obtenu qu'il existe $S \in \mathbb{R}[X]$ tel que :

$$P(X) = \left(X^2 - \frac{1}{2}\right) S \left[\left(X^2 - \frac{1}{2}\right)^2\right] + \frac{1}{2}$$

Réciproquement, fixons $S \in \mathbb{R}[X]$ et posons $P(X) = \left(X^2 - \frac{1}{2}\right) S \left[\left(X^2 - \frac{1}{2}\right)^2\right] + \frac{1}{2}$.

$$\forall t \in \mathbb{R}, P(\cos t) + P(\sin t) = 1 + \left(\cos^2 t - \frac{1}{2}\right) S \left[\left(\cos^2 t - \frac{1}{2}\right)^2\right] + \left(\sin^2 t - \frac{1}{2}\right) S \left[\left(\sin^2 t - \frac{1}{2}\right)^2\right]$$

Or on remarque que $\left(\cos^2 t - \frac{1}{2}\right)^2 - \left(\sin^2 t - \frac{1}{2}\right)^2 = (\cos^2 t + \sin^2 t - 1)(\cos^2 t - \sin^2 t) = 0$.

Donc $\forall t \in \mathbb{R}$, $P(\cos t) + P(\sin t) = 1 + (\cos^2 t + \sin^2 t - 1)S \left[\left(\sin^2 t - \frac{1}{2}\right)^2\right] = 1$.

Ainsi l'ensemble des solutions de (0) est $\mathcal{E} = \left\{ \left(X^2 - \frac{1}{2}\right) S \left[\left(X^2 - \frac{1}{2}\right)^2\right] + \frac{1}{2}, S \in \mathbb{R}[X] \right\}$

XIII.4.20 Logarithme polynomial? ★

[\[Enoncé\]](#)

1^{re} solution : par le degré

Supposons qu'une telle fraction rationnelle $R = \frac{P}{Q}$ existe.

$$R'(X) = \frac{1}{X} \iff \frac{P'(X)Q(X) - P(X)Q'(X)}{Q(X)^2} = \frac{1}{X} \iff X(P'(X)Q(X) - P(X)Q'(X)) = Q(X)^2.$$

Donc

$$\begin{aligned} 2 \deg(Q) &= \deg(Q^2) \\ &= \deg(X(P'(X)Q(X) - P(X)Q'(X))) \\ &= 1 + \deg(P'(X)Q(X) - P(X)Q'(X)) \\ &\leq 1 + \max(\deg(P'Q), \deg(QP')) \end{aligned}$$

(P, Q ne peuvent pas être tous les deux constants) $= 1 + \deg(P) + \deg(Q) - 1 = \deg(P) + \deg(Q)$.

On en déduit que $\deg(Q) \leq \deg(P)$ et donc que $R \in \mathbb{K}[X]$.

Mais alors $R' \in \mathbb{K}[X]$ ce qui est absurde donc il n'existe pas de fraction rationnelle dont la dérivée vaut $\frac{1}{X}$.

Cette solution a pour avantage d'être assez élémentaire, toutefois elle ne s'adapte pas vraiment à des fractions rationnelles plus sophistiquées que $\frac{1}{X}$.

2^{me} solution : par l'étude de fonction

Supposons qu'une telle fraction rationnelle R existe.

Notons z un pôle de R de module maximal parmi les pôles de R . $\forall x > |z|$, $R'(x) = \frac{1}{x}$.

Donc, $\exists C \in \mathbb{C}, \forall x > |z|$, $R(x) = \ln(x) + C$.

Alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} R(x) = +\infty$ ce qui implique $\deg(R) > 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{R(x)}{x} = 0$ ce qui implique $\deg\left(\frac{R(X)}{X}\right) < 0$ c'est à dire $\deg(R) < 1$.

Ceci est absurde donc il n'existe pas de fraction rationnelle dont la dérivée vaut $\frac{1}{X}$.

Cette solution, bien que très différente de la précédente, possède le même défaut que celle-ci pour ce qui est d'essayer de généraliser l'exercice...

3^{me} solution : par l'étude de la multiplicité de 0

Supposons qu'une telle fraction rationnelle $R = \frac{P}{Q}$ avec $P \wedge Q = 1$ existe.

$$R'(X) = \frac{1}{X} \iff \frac{P'(X)Q(X) - P(X)Q'(X)}{Q(X)^2} = \frac{1}{X} \iff X(P'(X)Q(X) - P(X)Q'(X)) = Q(X)^2 : (*)$$

Donc $X|Q^2$ et d'après le lemme d'Euclide, $X|Q$. Notons m la multiplicité de 0 en tant que racine de Q . On a montré que $m \geq 1$.

Ensuite, intéressons nous à la multiplicité de 0 dans $P'Q - PQ'$. D'une part, puisque $P \wedge Q = 1$, $P(0) \neq 0$ et donc la multiplicité de 0 dans PQ' est $m - 1$. D'autre part la multiplicité de 0 dans $P'Q$ est supérieure à m . Donc la multiplicité de 0 dans $P'Q - PQ'$ est $m - 1$.

Finalement d'après la relation (*), $1 + m - 1 = 2m$ c'est à dire $m = 0$.

Ceci est absurde donc il n'existe pas de fraction rationnelle dont la dérivée vaut $\frac{1}{X}$.

Cette solution a pour mérite de s'adapter à toutes les fractions rationnelles qui possèdent un pôle simple ! Il suffit d'étudier la multiplicité de ce pôle (au lieu de 0 ici).

XIII.4.21 Une fraction rationnelle

[\[Énoncé\]](#)

XIII.4.22 Théorème de Bernstein

[\[Enoncé\]](#)

XIII.4.23 Etude d'un polynôme défini implicitement

[\[Enoncé\]](#)

XIII.4.24 $P'|P$ ★

[\[Enoncé\]](#)

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P'|P$. Tout d'abord si $P' = 0$ alors $P'|P$ si et seulement si $P = 0$.

On suppose maintenant que ce n'est pas le cas. Notons $P = \prod_{i=1}^n (X - z_i)^{m_i}$ où m_i est la multiplicité de z_i en tant que racines de P . Alors pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, la multiplicité de z_i en tant que racine de P' est $m_i - 1$ (en considérant que z_i n'est pas racine si sa multiplicité est nulle).

On sait que P' n'a pas d'autre racine que celles de P donc $\deg(P') = \deg(P) - 1 = \sum_{i=1}^n (m_i - 1) = \sum_{i=1}^n m_i - n = \deg(P) - n$. On en déduit que $n = 1$: P n'a qu'une racine.

Réciproquement si il existe $\lambda \in \mathbb{C}$, $a \in \mathbb{C}^*$ et $n \in \mathbb{N}^*$ tels que $P = a(X - \lambda)^n$ alors $P' = an(X - \lambda)^{n-1}$ divise P .

Finalement, $P'|P \iff \exists (a, \lambda) \in \mathbb{C}^2, \exists n \in \mathbb{N}^*, P = a(X - \lambda)^n$.

XIII.4.25 Polynômes positifs ★★

[\[Enoncé\]](#)

1. Notons $P = \Lambda \prod_{i=1}^p (X^2 + a_i X + b_i)^{n_i} \prod_{j=1}^q (X - x_j)^{m_j}$ la décomposition de P en facteurs

irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.

Tout d'abord, $P(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \Lambda x^{\deg(P)}$. Donc $\Lambda x^{\deg(P)}$ est du signe de $P(x)$ au voisinage de $+\infty$ c'est à dire $\Lambda \geq 0$.

Ensuite, supposons qu'il existe $k \in \llbracket 1; q \rrbracket$ tel que m_k est impair.

En notant $Q = \frac{P}{(X - x_k)^{m_k}}$ on a $P(x) \underset{x \rightarrow x_k}{\sim} Q(x_k)(x - x_k)^{m_k}$. Or $x \mapsto Q(x_k)(x - x_k)^{m_k}$

change de signe en x_k . Ceci est absurde car $x \mapsto P(x)$ elle, ne change pas de signe. On en déduit que les racines réelles de P sont de multiplicités paires.

2. Chacun des polynômes $R_i = X^2 + a_i X + b_i$ peut s'écrire $R_i = (X - \omega_i)(X - \overline{\omega_i})$ pour un certain $\omega_i \in \mathbb{C}$.

Donc en posant $C = \sqrt{\Lambda} \prod_{j=1}^q (X - x_j)^{m_j/2} \prod_{i=1}^p (X - \omega_i)$ on a bien $P = C\overline{C}$ et $C \in \mathbb{C}[X]$.

3. $A = \operatorname{Re}(C)$ et $B = \operatorname{Im}(C)$ fonctionnent.

XIII.4.26 Polynômes carrés

[Enoncé]

XIII.4.27 Polynômes réciproques ★★

[Enoncé]

1. $X^n P\left(\frac{1}{X}\right) = X^n \sum_{k=0}^n a_k X^{-k} = \sum_{k=0}^n a_k X^{n-k} = \sum_{k=0}^n a_{n-k} X^k$. Donc P est un polynôme réciproque si et seulement si $\forall k \in \llbracket 0; n \rrbracket$, $a_k = a_{n-k}$.

2. Soient P, Q deux polynôme réciproques de degrés respectifs p et q . $R = PQ$ est de degré $r = p + q$ et $R(X) = P(X)Q(X) = X^p P\left(\frac{1}{X}\right) X^q Q\left(\frac{1}{X}\right) = X^r R\left(\frac{1}{X}\right)$. Donc $R = PQ$ est réciproque.

3. On note encore $p = \deg(P)$ et $q = \deg(Q)$. $F = \frac{P}{Q}$ est un polynôme de degré $f = p - q$

$$\text{et } F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)} = \frac{X^p P\left(\frac{1}{X}\right)}{X^q Q\left(\frac{1}{X}\right)} = X^f F\left(\frac{1}{X}\right). \text{ Donc } F = \frac{P}{Q} \text{ est réciproque.}$$

4. (a) On sait que $P(0) = a_0 = a_n \neq 0$ en tant que coefficient dominant. De plus $P\left(\frac{1}{\alpha}\right) = \frac{1}{\alpha^n} P(\alpha) = 0$.
- (b) On dérive la relation :

$$P'(X) = nX^{n-1}P\left(\frac{1}{X}\right) - X^{n-2}P'\left(\frac{1}{X}\right)$$

Donc en évaluant en 1 on obtient $P'(1) = -P'(1)$ d'où $P'(1) = 0$. Donc 1 est une racine de P de multiplicité supérieure ou égale à 2.

- (c) $P(-1) = (-1)^n P(-1) = -P(-1)$ donc $P(-1) = 0$.

- (d) On évalue la relation dérivée en -1 :

$$P'(-1) = n(-1)^{n-1}P(-1) + (-1)^{n-1}P'(-1) = -P'(-1)$$

Donc $P'(-1) = 0$.

5. Soit $P = \sum_{k=0}^{2n} a_k X^k$ un polynôme réciproque de degré $2n$. D'après la question 1, si α est racine de P alors α^{-1} l'est aussi. Donc si $\alpha \neq \alpha^{-1}$, c'est à dire si $\alpha \notin \{-1, 1\}$, $(X - \alpha)(X - \alpha^{-1}) = X^2 - (\alpha + \alpha^{-1})X + 1|P$. Et si $\varepsilon \in \{-1, 1\}$ est racine de P alors d'après les questions 4.b et 4.d, $(X - \varepsilon)^2 = X^2 - 2\varepsilon + 1|P$. Dans tous les cas, $\exists b_1 \in \mathbb{C}$, $X^2 + b_1 X + 1|P$

Supposons qu'il existe $p \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket$ et $b_1, \dots, b_p \in \mathbb{C}$ tels que $Q = \prod_{r=1}^p (X^2 + b_r X + 1)|P$.

On remarque que pour tout $r \in \llbracket 1; p \rrbracket$, $X^2 + b_r X + 1$ est réciproque. Donc d'après la question 2, Q est réciproque. Puis d'après la question 3, $R = \frac{P}{Q}$ est réciproque, de degré pair (car P et Q le sont) et non constant ($\deg(Q) = 2p < 2n = \deg(P)$). Donc

$\exists b_{p+1} \in \mathbb{C}$, $X^2 + b_{p+1} X + 1|R$. Ainsi, $\prod_{r=1}^{p+1} (X^2 + b_r X + 1)|P$.

Par récurrence, $\exists b_1, \dots, b_n \in \mathbb{C}$, $(X^2 + b_1 X + 1) \dots (X^2 + b_n X + 1)|P$. Comme ces deux polynômes ont même degré, $P = a_{2n}(X^2 + b_1 X + 1) \dots (X^2 + b_n X + 1)$.

Si $\deg(P) = 2n+1$ est impair alors d'après la question 4.c, $X+1|P$. Mais alors $Q = \frac{P}{X+1}$ est réciproque d'après la question 3.

Et donc on déduit de ce qui a été fait précédemment que P se factorise en $P = a_{2n}(X+1)(X^2 + b_1 X + 1) \dots (X^2 + b_n X + 1)$.

XIII.4.28 Polynômes surjectifs ★★★★★

[Enoncé]

1. On a déjà $P(\mathbb{C}) \subset \mathbb{C}$. Fixons $a \in \mathbb{C}$.

Si P n'est pas constant alors $Q = P - a$ n'est pas constant et d'après le théorème de d'Alembert-Gauss, Q s'annule sur \mathbb{C} . Il existe donc $z \in \mathbb{C}$ tel que $P(z) = a$ i.e $a \in P(\mathbb{C})$. Donc $P(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$. De plus si P est constant alors $P(\mathbb{C}) \neq \mathbb{C}$. Les polynômes recherchés sont les polynômes non constants.

2. Posons pour $Q = \sum_{k=0}^{+\infty} q_k X^k \in \mathbb{C}[X]$, $\overline{Q} = \sum_{k=0}^{+\infty} \overline{q_k} X^k$.

Supposons que $P(\mathbb{U}) = \mathbb{U}$. Tout d'abord, P n'est pas constant.

Notons $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ avec $n = \deg(P)$.

$$\forall z \in \mathbb{U}, \frac{1}{P(z)} = \overline{P(z)} = \overline{P}(\overline{z}) = \overline{P}\left(\frac{1}{z}\right).$$

$$\text{Donc } \forall z \in \mathbb{U}, P(z)\overline{P}\left(\frac{1}{z}\right) = 1.$$

Donc $\forall z \in \mathbb{U}, P(z) \cdot z^n \overline{P}\left(\frac{1}{z}\right) = z^n$.

Or $X^n \overline{P}\left(\frac{1}{X}\right) = \overline{X^n P\left(\frac{1}{X}\right)} = \sum_{k=0}^n \overline{a_{n-k}} X^k$ est un polynôme. Donc comme \mathbb{U} est infini on a l'égalité entre polynômes :

$$P(X) \cdot X^n \overline{P}\left(\frac{1}{X}\right) = X^n$$

Ainsi $P|X^n$. De plus $\deg(P) = n = \deg(X^n)$ donc $P(X) = a_n X^n$. Enfin, $1 = |P(1)| = |a_n|$ c'est à dire $a_n \in \mathbb{U}$.

Réciproquement, si il existe $\alpha \in \mathbb{U}$ et $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $P(X) = \alpha X^n$ alors :

$$\left\{ \begin{array}{l} (\forall z \in \mathbb{U}, |P(z)| = |\alpha| |z|^n = 1) \implies P(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U} \\ \left(\forall z \in \mathbb{U}, P\left(e^{i \frac{\arg(z) - \arg(\alpha)}{n}}\right) = z \right) \implies \mathbb{U} \subset P(\mathbb{U}) \end{array} \right.$$

3. Tout d'abord, si P est à coefficients réels alors $P(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}$. Si de plus P est de degré impair alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \pm\infty = -\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x)$. Donc comme $x \mapsto P(x)$ est continue sur \mathbb{R} , d'après le TVI $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

Réciproquement, supposons que $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$ vérifie $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. On note

$\overline{P} = \sum_{k=0}^{+\infty} \overline{a_k} X^k$. $\forall x \in \mathbb{R}, P(x) = \overline{P(x)} = \overline{P}(x)$. P et \overline{P} coïncident sur une infinité de points, ils sont donc égaux.

Donc $\forall k \in \mathbb{N}, \overline{a_k} = a_k$ i.e $\forall k \in \mathbb{N}, a_k \in \mathbb{R}$ i.e $P \in \mathbb{R}[X]$.

De plus si P est de degré pair alors $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} P(x) = \pm\infty$. Supposons que $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty$. Alors $\exists r \in \mathbb{R}^+, |x| > r \implies P(x) > P(0)$. De plus, $f_P : x \mapsto P(x)$ est continue sur $[-r, r]$ donc d'après le théorème des bornes atteintes f_P admet un minimum m sur $[-r, r]$. Par définition, $m \leq P(0)$. Ainsi, m est un minimum global de f_P et donc $m - 1$ par exemple n'est pas dans $P(\mathbb{R})$.

Similairement, si $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} P(x) = -\infty$ alors f_P admet un maximum M sur \mathbb{R} et donc $M + 1$ par exemple n'est pas dans $P(\mathbb{R})$. Ainsi P est de degré impair.

On conclut que $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ si et seulement si $P \in \mathbb{R}[X]$ et est de degré impair.

4. Supposons que $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$. Notons $d = \deg(P)$ et (L_0, \dots, L_d) la base de Lagrange aux points $0, \dots, d$.

On sait que $P = \sum_{k=0}^d P(k) L_k$. Or pour tout $k \in \llbracket 0; d \rrbracket$, $P(k) \in \mathbb{Q}$ et $L_k = \prod_{\substack{0 \leq i \leq d \\ i \neq k}} \frac{X - i}{k - i} \in \mathbb{Q}[X]$. Donc $P \in \mathbb{Q}[X]$.

Si P est constant alors $P(\mathbb{Q}) \neq \mathbb{Q}$.

Si $d = 1$ alors on peut écrire $P(X) = aX + b$ avec $(a, b) \in \mathbb{Q}^* \times \mathbb{Q}$. Dans ce cas pour tout $c \in \mathbb{Q}$, l'équation $P(x) = c$ admet une (unique) solution $x = \frac{c-b}{a} \in \mathbb{Q}$.

Enfin si $d \geq 2$ on écrit $P = \sum_{k=0}^d \frac{a_k}{b_k} X^k$ avec $(a_k, b_k) \in \mathbb{Z}^2$ pour tout $k \in \llbracket 0; d \rrbracket$. Posons

$Q = \text{ppcm}(b_0, \dots, b_d)P$ et pour tout $k \in \llbracket 0; d \rrbracket$, $c_k = \text{ppcm}(b_0, \dots, b_d) \frac{a_k}{b_k}$ de sorte que

$Q = \sum_{k=0}^d c_k X^k \in \mathbb{Z}[X]$ et $Q(\mathbb{Q}) = P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$. Soit p un nombre premier strictement

supérieur à $|c_d|$. $\frac{1}{p} \in Q(\mathbb{Q})$ donc il existe a et b deux entiers premiers entre eux tels que $x = \frac{a}{b}$ vérifie $Q(x) = \frac{1}{p}$. On a alors

$$Q(x) = \frac{1}{p} = \sum_{k=0}^d c_k b^{-k} a^k$$

c'est à dire

$$b^d = p \sum_{k=0}^d c_k b^{d-k} a^k$$

Donc $p|b^d$, puis par le lemme d'Euclide, $p|b$. Ecrivons $b = p^\nu b'$ avec ν la valuation p -adique de b . On reprend :

$$\begin{aligned} b^d &= p \sum_{k=0}^d c_k b^{d-k} a^k \\ \iff p^{\nu d-1} (b')^d &= \sum_{k=0}^d c_k (b')^{d-k} p^{\nu(d-k)} a^k \\ \implies 0 &\equiv c_d a^d [p] \quad (\nu \geq 1, d \geq 2) \end{aligned}$$

Or a et b sont premiers entre eux donc $p|b \implies p \nmid a$ et donc d'après le lemme d'Euclide, $p|c_d$. Ceci est absurde car $p > |c_d|$.

Finalement on conclut que $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q} \iff \exists a, b \in \mathbb{Q}^* \times \mathbb{Q}, P(X) = aX + b$.

5.

XIII.4.29 Résultant et discriminant ★★

[Enoncé]

1. On sait que $(1, X, \dots, X^{m-1})$ et $(1, X, \dots, X^{n-1})$ sont des bases de $\mathbb{K}_{m-1}[X]$ et $\mathbb{K}_{n-1}[X]$ respectivement. Ainsi d'après le cours, la famille $\mathcal{B} = ((1, 0), (X, 0), \dots, (X^{m-1}, 0), (0, 1), \dots, (0, X^{n-1}))$ est une base de l'espace vectoriel produit $\mathbb{K}_{m-1}[X] \times \mathbb{K}_{n-1}[X]$.

2. Soit $((U_1, V_1), (U_2, V_2), \lambda) \in (\mathbb{K}_{m-1}[X] \times \mathbb{K}_{n-1}[X])^2 \times \mathbb{K}$.
 $\deg(\varphi(U_1, V_1)) \leq \max(\deg(PU_1), \deg(QV_1)) = n = m - 1$ donc φ est bien une application.
 $\varphi((U_1, V_1) + \lambda(U_2, V_2)) = P(U_1 + \lambda U_2) + Q(V_1 + \lambda V_2) = PU_1 + QV_1 + \lambda(PU_2 + QV_2) = \varphi(U_1, V_1) + \lambda\varphi(U_2, V_2)$ donc φ est linéaire.
3. Soit $p \in \llbracket 0; m-1 \rrbracket$. Soit $l \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket$.

$$\begin{cases} \varphi(X^p, 0) = PX^p = \sum_{k=0}^n a_k X^{k+p} \\ \varphi(0, X^l) = QX^l = \sum_{k=0}^m b_k X^{k+l} \end{cases}$$
Donc $\text{Mat}_{B, B_c}(\varphi) = \text{Syl}(P, Q)$.
4. Supposons d'abord que $P \wedge Q \neq 1$. Alors d'après l'identité de Bézout, $1 \notin \text{Im}(\varphi)$ donc φ n'est pas surjective et donc n'est pas bijective. Supposons maintenant que $P \wedge Q = 1$. On remarque que $\dim(\mathbb{K}_{m-1}[X] \times \mathbb{K}_{n-1}[X]) = n + m = \dim(\mathbb{K}_{n+m-1}[X])$, il suffit donc de montrer au choix l'injectivité ou la surjectivité de φ . Soit $(U, V) \in \ker \varphi$. On a $PU = -QV$ donc $Q|PU$. Or $P \wedge Q = 1$ donc d'après le lemme de Bézout, $Q|U$ et donc $n = \deg(Q) \leq \deg(U) \leq m-1$. De même, $P|V$ et donc $m \leq n-1$. Ainsi on a par exemple $n+1 \leq m \leq n-1$ ce qui impose $n = m = -\infty$. Ainsi $(U, V) = (0, 0)$ et φ est injective, donc bijective.
Ainsi, $P \wedge Q = 1 \iff \det \varphi \neq 0 \iff \det \text{Mat}_{B, B_c}(\varphi) = \text{Res}(P, Q) \neq 0$.
5. $P = aX^2 + bX + c$, $P' = 2aX + b$.

$$\text{Res}(P, P') = \begin{vmatrix} c & b & 0 \\ b & 2a & b \\ a & 0 & 2a \end{vmatrix} = 4a^2c + ab^2 - 2ab^2 = 4ac^2 - ab^2$$

Donc $\Delta(P) = \frac{(-1)^{\frac{2(2-1)}{2}}}{a} \text{Res}(P, Q) = -\frac{1}{a} \text{Res}(P, Q) = b^2 - 4ac$. On retrouve le résultat bien connu.

6. P est scindé à racines simples si et seulement si toute racine de P n'est pas racine de P' . Or dans \mathbb{C} , les racines de $P \wedge P'$ sont les racines communes à P et P' . Ainsi P est scindé à racines simples sur \mathbb{C} si et seulement si $P \wedge P'$ n'a pas de racine complexe. D'après le théorème de d'Alembert-Gauss cela équivaut à ce que $P \wedge P'$ soit constant puis, étant donné que $P \wedge P'$ est unitaire, à $P \wedge P' = 1$.
D'après ce qui a été fait précédemment on peut donc affirmer que P est scindé à racines simples sur \mathbb{C} si et seulement si $\text{Res}(P, P') \neq 0$.

Le résultant est un outil intéressant sur certains problèmes car il permet de mettre en évidence une sorte de "continuité" des racines d'un polynôme via le déterminant, qui est lui continu.

XIII.4.30 Théorème de Liouville : Fermat pour les polynômes ★★★★★

[Énoncé]

1. Notons $D = P \wedge Q \wedge R$.

$$P^n + Q^n = R^n \implies \left(\frac{P}{D}\right)^n + \left(\frac{Q}{D}\right)^n = \left(\frac{R}{D}\right)^n. \text{ Posons } (\tilde{P}, \tilde{Q}, \tilde{R}) = \left(\left(\frac{P}{D}\right)^n, \left(\frac{Q}{D}\right)^n, \left(\frac{R}{D}\right)^n\right)$$

de sorte que $\tilde{P}, \tilde{Q}, \tilde{R}$ sont premiers entre eux dans leur ensemble. Soit S un facteur irréductible commun à \tilde{P} et \tilde{Q} .

$S|\tilde{P}^n + \tilde{Q}^n = \tilde{R}^n$ et comme S est irréductible, $S|\tilde{R}$. Donc S est constant d'où $\tilde{P} \wedge \tilde{Q} = 1$.

De même, $\tilde{P} \wedge \tilde{R} = 1$ et $\tilde{Q} \wedge \tilde{R} = 1$.

2. On calcule :

$$\begin{aligned} P^n + Q^n &= R^n \\ \iff \left(\frac{P}{Q}\right)^n + 1 &= \left(\frac{R}{Q}\right)^n \\ \iff \prod_{i=1}^n \left(\frac{P}{Q} - \zeta_i\right) &= \left(\frac{R}{Q}\right)^n \\ \iff \prod_{i=1}^n (P - \zeta_i Q) &= R^n \end{aligned}$$

Ainsi $\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $T_i = P - \zeta_i Q | R^n$.

Montrons que les T_i sont deux à deux premiers entre eux. On fixe $i, j \in \llbracket 1; n \rrbracket$ avec $i \neq j$. Soit S un diviseur commun à T_i et T_j .

$S|T_i - T_j = (\zeta_j - \zeta_i)Q$. Or les racines de $X^n + 1$ sont toutes distinctes donc $\zeta_j - \zeta_i \neq 0$ et on en déduit que $S|Q$. Mais alors $S|T_i + \zeta_i Q = P$. Donc S est constant c'est à dire $T_i \wedge T_j = 1$.

Soit maintenant x une racine de T_i . En notant pour $\alpha \in \mathbb{C}$ et $A \in \mathbb{C}[X]$, $v_A(\alpha)$ la multiplicité de α en tant que racine de A ($v_A(\alpha) = 0$ si α n'est pas racine de A) on calcule :

$$nv_R(x) = v_{R^n}(x) = v_{\prod_{k=1}^n T_k}(x) = \sum_{k=1}^n v_{T_k}(x) = v_{T_i}(x)$$

Ainsi la multiplicité de chaque racine de T_i est un multiple de n : $\exists H_i \in \mathbb{C}[X], T_i = H_i^n$.

3. Supposons que P, Q ou R n'est pas constant. Si R n'est pas constant alors P et Q ne peuvent pas l'être tous les deux à cause de la relation qui les définit. On a donc $\max(\deg(P), \deg(Q)) \geq 1$.

On sait que $n \geq 3$ donc on peut au moins considérer T_1, T_2, T_3 . Or par définition, ces polynômes sont dans $\text{Vect}(P, Q)$ qui est de dimension inférieure strictement à 3. Donc la famille (T_1, T_2, T_3) est liée :

$$\exists (a, b, c) \in \mathbb{C}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}, aT_1 + bT_2 + cT_3 = 0$$

posons α, β, γ des racines n -ième de $a, b, -c$ respectivement. Le triplet $(U, V, W) = (\alpha H_1, \beta H_2, \gamma H_3)$ vérifie :

$$\begin{cases} U^n + V^n = W^n \\ U \wedge V = U \wedge W = V \wedge W = 1 \\ \deg(U) \leq \deg(H_1) = \frac{\deg(T_1)}{n} < \deg(T_1) \leq \max(\deg(P), \deg(Q)) \\ \deg(V) < \max(\deg(P), \deg(Q)) \end{cases}$$

L'ensemble $\{\max(\deg(P), \deg(Q)) \mid (P, Q, R) \in \mathbb{C}[X]^3, P \wedge Q = P \wedge R = Q \wedge R = 1, P^n + Q^n = R^n\}$ est une partie non vide de \mathbb{N}^* , elle admet donc un minimum. Considérons $(P_0, Q_0, R_0) \in \mathbb{C}[X]^3$ qui réalise ce minimum. D'après le raisonnement précédent on peut construire (U_0, V_0, W_0) qui contredit la minimalité de (P_0, Q_0, R_0) . Ceci est absurde donc P, Q, R sont constants.

Finalement, si $(A, B, C) \in \mathbb{C}[X]^3$ tel que $A^n + B^n = C^n$ alors avec $D = A \wedge B \wedge C$: $\tilde{A} = \frac{A}{D}, \tilde{B} = \frac{B}{D}$ et $\tilde{C} = \frac{C}{D}$ sont constants d'où $A = \tilde{A}D, B = \tilde{B}D$ et $C = \tilde{C}D$ sont égaux à une constante multiplicative près.

XIII.5 Correction Espaces vectoriels normés

XIII.5.1 Suite de Cauchy ★★

[Enoncé]

Soit $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ une suite convergente. On note $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Soit $\varepsilon > 0$.

$\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \|u_n - l\| \leq \frac{\varepsilon}{2}$.

Alors, $\forall (p, q) \in \llbracket N; +\infty \rrbracket, \|u_p - u_q\| = \|u_p - l + l - u_q\| \leq \|u_p - l\| + \|l - u_q\| \leq \varepsilon$.

Donc $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy.

Montrons que (u_n) est bornée, autrement dit que la suite $(\|u_n\|)_{n \in \mathbb{N}}$ ne tend pas vers $+\infty$. Supposons par l'absurde que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|u_n\| = +\infty$. Fixons $\varepsilon > 0$.

$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall p > q \geq n_0, \|u_p - u_q\| \leq \varepsilon$. Et $\exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall p \geq n_1, \|u_p\| > \|u_q\| + \varepsilon$.

Donc d'après la seconde inégalité triangulaire, $\forall p \geq N = \max(q, n_1), \varepsilon < |\|u_p\| - \|u_q\|| \leq \|u_p - u_q\| \leq \varepsilon$.

Ceci est absurde donc (u_n) est bornée, disons par M .

$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est alors à valeurs dans le compact $B_f(0, M)$ (fermé borné dans E qui est de dimension finie).

$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet donc une valeur d'adhérence l . On note $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $u_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$.

$\forall \varepsilon > 0, \exists n \in \mathbb{N}, \forall k \geq n, \|u_{\varphi(n)} - u_n\| \leq \varepsilon$.

C'est-à-dire $u_{\varphi(n)} - u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Mais alors par somme, $u_n = u_n - u_{\varphi(n)} + u_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$.

XIII.5.2 Théorème de Fréchet-Von Neumann

[Enoncé]

D'après le cours, on sait que si $\|\cdot\|$ est euclidienne alors elle vérifie l'identité du parallélogramme.

Supposons que $\|\cdot\|$ vérifie l'identité du parallélogramme.

Montrons que

$$\varphi : \begin{cases} E \times E & \longrightarrow R \\ (x, y) & \longmapsto \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2) \end{cases}$$

est un produit scalaire. Il est clair que φ est symétrique et définie positive.

Montrons que φ est bilinéaire.

Soient $(x, y, z) \in E^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

D'après l'identité du parallélogramme, on a : Soient $x, z, y \in V$. On calcule :

$$4\varphi(x + z, y) = \|x + z + y\|^2 - \|x + z - y\|^2.$$

D'après l'identité du parallélogramme appliquée à $(x+z, y)$, (x, y) et (z, y) , on obtient après simplification

$$\|x+z+y\|^2 - \|x+z-y\|^2 = (\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2) + (\|z+y\|^2 - \|z-y\|^2).$$

Ainsi,

$$\varphi(x+z, y) = \varphi(x, y) + \varphi(z, y).$$

Pour $n \in \mathbb{Z}$, l'additivité donne $\langle nx, y \rangle = n\langle x, y \rangle$. Si $m \in \mathbb{N}^*$, alors

$$\varphi(x, y) = \varphi(m \cdot \frac{1}{m}x, y) = m\varphi(\frac{1}{m}x, y) \Rightarrow \varphi(\frac{1}{m}x, y) = \frac{1}{m}\varphi(x, y).$$

On en déduit que l'homogénéité vaut pour tous les rationnels, puis, par densité de \mathbb{Q} dans \mathbb{R} et par continuité de la norme, pour tout réel $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\varphi(\lambda x, y) = \lambda \varphi(x, y).$$

On a donc montré que φ est linéaire par rapport à sa première variable.

Donc φ est un produit scalaire de norme associée $\|\cdot\|$. Donc $\|\cdot\|$ est une norme euclidienne.

XIII.5.3 Une norme non euclidienne

[\[Enoncé\]](#)

Montrons dans un premier temps que N est une norme.

— Séparation

Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $N(P) = 0$.

Ainsi pour tout $k \in \llbracket 0; n \rrbracket$, $|P(\alpha_k)| = 0$ donc $P(\alpha_k) = 0$.

Donc $P \in \mathbb{R}_n[X]$ admet au moins $n+1$ racines, ce qui implique que $P = 0$.

— Homogénéité

Soient $P \in \mathbb{R}_n[X]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$N(\lambda P) = \sum_{k=0}^n |\lambda P(\alpha_k)| = |\lambda| \sum_{k=0}^n |P(\alpha_k)| = |\lambda| N(P)$$

— Inégalité triangulaire

Elle découle directement de l'inégalité triangulaire de la valeur absolue sur \mathbb{R} .

Montrons maintenant qu'elle n'est pas euclidienne. Alors N vérifie l'identité du parallélogramme V.2. Donc pour tout $P, Q \in \mathbb{R}_n[X]$, on a :

$$N(P+Q) + N(P-Q) = 2(N(P) + N(Q))$$

Par interpolation de Lagrange, il existe $P, Q \in \mathbb{R}_n[X]$ $P(\alpha_k) = \delta_{k,0}$ et $Q(\alpha_k) = \delta_{k,n}$ pour tout $k \in \llbracket 0; n \rrbracket$. Ainsi, on a $N(P+Q) = N(P-Q) = 2$ et $N(P) = N(Q) = 1$. ce qui contredit l'identité du parallélogramme.

XIII.5.4 Norme invariante par similitude

[Enoncé]

XIII.5.5 Equivalence des normes dans un espace vectoriel normé de dimension finie

[Enoncé]

XIII.5.6 Normes non équivalentes

[Enoncé]

XIII.5.7 Normes semblables à la norme uniforme sur $\mathbb{K}[X]$

[Enoncé]

Il est clair que N_A vérifie l'homogénéité et l'inégalité triangulaire, en revanche elle ne vérifie pas forcément la séparation.

Si A est un ensemble fini, il existe un polynôme qui s'annule en tous les points de A , mais pour autant qui ne soit pas nul (on pense à l'interpolation de Lagrange).

Alors, que si A est infini, cela signifie que pour un polynôme P tel que $N_A(P) = 0$, P s'annule une infinité de fois donc P est le polynôme nul.

Ainsi N_A est une norme si et seulement si A est infini.

XIII.5.8 Comparaisons de deux normes sur $\mathbb{K}_n[X]$

[Enoncé]

1. D'après le cours, $\|\cdot\|_1$ est une norme sur $K_n[X]$.

Montrons que $\|\cdot\|$ est une norme.

• Séparation :

Soit $P \in \mathbb{K}_n[X]$ tel que $\|P\| = 0$.

On a alors $\forall k \in \llbracket 0; n \rrbracket, |P(k)| = 0$ c'est-à-dire : $P(k) = 0$.

Donc P est un polynôme qui admet au moins $n + 1$ racines alors qu'il est de degré au plus n . Donc P est le polynôme nul.

• Homogénéité :

Soient $P \in \mathbb{K}_n[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

$$\|\lambda P\| = \sum_{i=0}^n |\lambda P(k)| = |\lambda| \sum_{i=0}^n |P(k)| = |\lambda| \|P\|$$

• **Inégalité triangulaire :**

Soient P et Q deux polynômes de $\mathbb{K}_n[X]$.

$$\|P + Q\| = \sum_{i=0}^n |p(k) + Q(k)| \leq \sum_{i=0}^n |P(k)| + \sum_{i=0}^n |Q(k)| = \|P\| + \|Q\|$$

Donc $\|\cdot\|$ est une norme.

2. Soit $P \in \mathbb{K}_n[X]$.

$$\begin{aligned} \|P\|_1 &\leq \int_0^1 |P(t)| dt \\ &\leq \int_0^n |P(t)| dt && \text{car } |P| \text{ est positif} \\ &\leq \sum_{i=0}^n \lambda_i |P(k)| && \text{avec } \lambda_i = \int_a^b |L_i|(x) dx \quad \text{cf. IV.15} \\ &\leq C_n \|P\| && \text{où } C_n = \max \lambda_i, i \in \llbracket 0; n \rrbracket \end{aligned}$$

3. Puisque $\mathbb{R}_n[X]$ est de dimension finie, ces normes sont équivalentes.

XIII.5.9 Comparaisons de normes usuelles sur $\mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{K})$

[Enoncé]

XIII.5.10 Normes p

[Enoncé]

Inégalité de Hölder et Minkowski

1. Soit $u, v \in \mathbb{R}_+^*$.

On sait que \ln est concave sur $]0, +\infty[$. Donc on en déduit que

$$\ln(uv) = \frac{1}{p} \ln(u^p) + \frac{1}{q} \ln(v^q) \leq \ln\left(\frac{u^p}{p} + \frac{v^q}{q}\right)$$

Ainsi par croissance de la fonction exponentielle, on en déduit que :

$$uv \leq \frac{u^p}{p} + \frac{v^q}{q}$$

2. On pose pour tout $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $x'_k = \frac{x_k}{\|x\|_p}$ et $y'_k = \frac{y_k}{\|y\|_q}$. D'après l'inégalité de Young, on a :

$$x'_k y'_k \leq \frac{x_k^p}{p} + \frac{y_k^q}{q}$$

Donc en sommant, on a :

$$\sum_{k=1}^n x'_k y'_k \leq \sum_{k=1}^n \frac{x_k'^p}{p} + \frac{y_k'^q}{q} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

On en déduit donc l'inégalité de Hölder :

$$\sum_{k=1}^n x_k y_k \leq \|x\|_p \|y\|_q$$

3.

$$\forall k \in \llbracket 1; n \rrbracket, (x_k + y_k)^p = x_k(x_k + y_k)^{p-1} + y_k(x_k + y_k)^{p-1}$$

Par sommation et d'après l'inégalité de Hölder :

$$\sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^p \leq \|x\|_p \|(x_k + y_k)^{p-1}\|_q + \|y\|_p \|(x_k + y_k)^{p-1}\|_q = (\|x\|_p + \|y\|_p) \|(x_k + y_k)^{p-1}\|_q$$

Or en remarquant que $q = \frac{p}{p-1}$:

$$\|(x_k + y_k)^{p-1}\|_q = \left(\sum_{i=1}^n (x_k + y_k)^p \right)^{\frac{p-1}{p}} = \|x + y\|_p^{p-1}$$

Ainsi, on en déduit que :

$$\|x + y\|_p^p \leq (\|x\|_p + \|y\|_p) \|(x_k + y_k)^{p-1}\|_q \leq \|x + y\|_p^{p-1}$$

Finalement, puisque les x_k et y_k sont strictement positifs, on a $\|x + y\|_p \neq 0$ donc :

$$\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p$$

4. — Séparation : Soit $x \in \mathbb{K}^n$ tel que $\|x\|_p = 0$.
On a donc pour tout $\sum_{i=1}^n |x_i|^p = 0$ donc $\forall k \in \llbracket 1; n \rrbracket, x_k = 0$.
Donc $x = 0$.
- Homogénéité : Soient $x \in \mathbb{K}^n$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

$$\|\lambda x\|_p^p = \sum_{k=1}^n |\lambda x_k|^p = |\lambda|^p \sum_{k=1}^n |x_k|^p = |\lambda|^p \|x\|_p^p$$

- Inégalité triangulaire : Il s'agit de l'inégalité de Minkowski démontré à la question 3.

Ainsi, $\|\cdot\|_p$ est une norme sur K^n .

Equivalence des normes p et q 1. Première méthode :

$$\forall x \in \mathbb{K}^n, \|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \geq (\|x\|_\infty^p)^{\frac{1}{p}} = \|x\|_\infty$$

car $\|x\|_\infty$ est l'un des termes de cette somme à termes positifs. et

$$\|x\|_p \leq \left(\sum_{i=1}^n \|x\|_\infty^p \right)^{\frac{1}{p}} = n^{\frac{1}{p}} \|x\|_\infty$$

Donc $\|\cdot\|_p$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont équivalentes sur \mathbb{K}^n .

Deuxième méthode :

\mathbb{K}^n est un espace vectoriel vectoriel de dimension finie donc toutes les normes sur \mathbb{K}^n sont équivalentes. En particulier, $\|\cdot\|_p$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont équivalentes sur \mathbb{K}^n .

2. Il est clair que quand $x = 0$, l'inégalité est vérifiée. Soit $x \in \mathbb{K}^n$ non nul. On applique l'inégalité de Hölder aux n -uplets $(|x_1|^p, \dots, |x_n|^p)$ et $(1, \dots, 1)$ pour $r = \frac{q}{p} \geq 1$ et $s \in [1, \infty[$ tel que $\frac{1}{r} + \frac{1}{s} = 1$.

$$\sum_{i=1}^n |x_i|^p \leq \left(\sum_{i=1}^n (|x_i|^p)^r \right)^{\frac{1}{r}} \left(\sum_{i=1}^n 1^s \right)^{\frac{1}{s}}$$

c'est-à-dire :

$$\|x\|_p^p \leq n^{\frac{1}{s}} \|x\|_q^p$$

Or $s = \frac{q}{q-p}$:

$$\|x\|_q^p \leq n^{\frac{q-p}{q}} \|x\|_q^p$$

D'où :

$$\|x\|_p \leq n^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \|x\|_q$$

Par homothétie, on se ramène au cas $\|x\|_p = 1$.

On a donc pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$ $|x_i| \geq 1$

Donc $|x_i|^q \leq |x_i|^p$ pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$.

Par conséquent,

$$\|x\|_q \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^q \right)^{\frac{1}{q}} = \|x\|_p^{\frac{q}{p}} = 1$$

Ainsi, on en déduit le résultat pour tout $x \in \mathbb{K}^n$,

$$\|x\|_q \leq \|x\|_p$$

Norme infinie

On a montré précédemment dans la sous-section précédente que :

$$\forall p \geq 1, \forall x \in \mathbb{K}^n, \quad \|x\|_\infty \leq \|x\|_p \leq n^{\frac{1}{p}} \|x\|_\infty$$

On en déduit que $p \mapsto \|x\|_p$ admet pour limite $\|x\|_\infty$ quand $p \rightarrow +\infty$.

XIII.5.11 Normes de Sobolev

[\[Enoncé\]](#)

XIII.5.12 Norme duale

[\[Enoncé\]](#)

XIII.5.13 Norme à partir d'une famille libre

[\[Enoncé\]](#)

On montre aisément que N vérifie l'homogénéité et l'inégalité triangulaire.

Montrons que N vérifie la séparation si et seulement si (x_1, \dots, x_n) est libre.

Supposons que $(x_1, \dots, x_n) \in E$ est libre.

Ainsi, pour $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ tel que $N(\lambda) = 0$.

On a alors :

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k x_k = 0$$

Donc : $\lambda = 0$ car $(x_1, \dots, x_n) \in E$ est libre.

Supposons que N vérifie la séparation. $\forall (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$,

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k x_k = 0 \iff \left\| \sum_{k=1}^n \lambda_k x_k \right\| = 0$$

. Donc par séparation, $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = 0$.

XIII.5.14 Quelques normes matricielles

[\[Enoncé\]](#)

XIII.5.15 Caractérisation des sous-espaces de dimension finie de $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{K})$

[\[Enoncé\]](#)

XIII.5.16 Distance[\[Enoncé\]](#)**XIII.5.17 Distance à une partie**[\[Enoncé\]](#)**XIII.5.18 Distance d'un élément à une partie (1)**[\[Enoncé\]](#)**XIII.5.19 Distance d'un élément à une partie (2)**[\[Enoncé\]](#)

1. On remarque que

$$M = \frac{M + M^\top}{2} + \frac{M - M^\top}{2}$$

et que $\frac{M + M^\top}{2} \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\frac{M - M^\top}{2} \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

Donc $\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) + \mathcal{A}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Et soit $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

On a alors :

$$M^\top = M$$

$$M^\top = -M$$

Donc $M=0$

Par conséquent, on a $\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

2. Soient $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

$$\langle A, S \rangle = \text{Tr}(A^\top S) = -\text{Tr}(AS)$$

et

$$\langle S, A \rangle = \text{Tr}(S^\top A) = \text{Tr}(SA)$$

Donc $\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) = (\mathcal{A}_n(\mathbb{R}))^\perp$.

3. Puisque $\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) = (\mathcal{A}_n(\mathbb{R}))^\perp$, on a :

$$d(M, \mathcal{S}_n(\mathbb{R})) = \|M - \pi_{\mathcal{S}_n(\mathbb{R})}(M)\|$$

D'après la question 1, on a :

$$\pi_{\mathcal{S}_n(\mathbb{R})}(M) = \frac{M+M^\top}{2} \text{ et } M - \pi_{\mathcal{S}_n(\mathbb{R})}(M) = \frac{1}{2}(M - M^\top) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \text{ Ainsi :}$$

$$d(M, \mathcal{S}_n(\mathbb{R}))^2 = \left\| \frac{M - M^\top}{2} \right\|^2 = \text{Tr} \begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix} = 12$$

Finalement, on a :

$$d(M, \mathcal{S}_n(\mathbb{R})) = 2\sqrt{3}$$

XIII.5.20 Passage par les matrices orthogonales

[Enoncé]

1. **•Séparation :**

Soit $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tel que $N(X) = 0$.

Donc $\forall A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}), \|AX\|_\infty = 0$.

En particulier, $\|I_n X\|_\infty = \|X\|_\infty = 0$.

Donc $X = 0$ car $\|\cdot\|_\infty$ est une norme.

•Homogénéité :

Soient $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$N(\lambda X) = \max_{A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})} \|\lambda AX\|_\infty = \max_{A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})} |\lambda| \|AX\|_\infty = |\lambda| N(X)$$

•Inégalité triangulaire :

$\forall A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}), \forall X, Y \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}),$

$$\|A(X + Y)\|_\infty \leq \|AX\|_\infty + \|AY\|_\infty \leq N(X) + N(Y)$$

D'où :

$$N(X + Y) \leq N(X) + N(Y)$$

2. Pour tous $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ et $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

$$N(AX) = \max_{B \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})} \|BAX\|_\infty = \max_{B \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})} \|BX\|_\infty = N(X)$$

car l'application $B \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \mapsto BA$ est bijective.

3. Soit $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. Si $X = 0$, il est clair que $N(X) = \|X\|_2$.

Sinon, pour $A \in \mathcal{O}(\mathbb{R})$,

$$\|AX\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \left| \sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j \right|$$

Soit $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$. D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$\left| \sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j \right| \leq \left(\sum_{j=1}^n a_{i,j}^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{j=1}^n x_j^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \|X\|_2$$

On en déduit que :

$$\|AX\|_\infty \leq \|X\|_2$$

. Puisque cela vaut pour tout les $A \in \mathcal{O}(\mathbb{R})$, on obtient, $N(X) \leq \|X\|_2$. Réciproquement, considérons la ligne $L = \frac{X^\top}{\|X\|_2}$. On peut compléter cette ligne unitaire en une base orthonormée de $\mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{R})$.

On pose $A \in \mathcal{O}(\mathbb{R})$ la matrice formée par cette base.

On a :

$$|(AX)_1| = \|X\|_2$$

et donc :

$$\|X\|_2 \leq \|AX\|_\infty \leq N(X)$$

Par double inégalité :

$$N(X) = \|X\|_2$$

XIII.5.21 Diamètre d'une partie bornée

[\[Enoncé\]](#)

XIII.5.22 Détermination d'une borne inférieure

[\[Enoncé\]](#)

XIII.5.23 Normes usuelles sur $\mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{K})$

[\[Enoncé\]](#)

XIII.5.24 Intersection des boules unités subordonnées d'un espace vectoriel normé de dimension finie

[\[Enoncé\]](#)

XIII.5.25 Modes de convergence[\[Énoncé\]](#)**XIII.5.26 Moyenne des itérés et projection sur l'espace des invariants d'une application linéaire contractante**[\[Énoncé\]](#)**XIII.5.27 Matrice de projecteur**[\[Énoncé\]](#)

Puisque (A^n) est une suite converge vers L , (A^{2n}) converge également vers L .

De plus, par continuité de la fonction $M \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}) \mapsto M^2$, on en déduit que (A^{2n}) converge vers L^2 .

Ainsi par unicité de la limite, $L^2 = L$, c'est-à-dire L est une matrice de projecteur.

XIII.5.28 Matrice de rotation[\[Énoncé\]](#)**XIII.5.29 Applications contractantes**[\[Énoncé\]](#)**XIII.5.30 Une série vectorielle**[\[Énoncé\]](#)**XIII.5.31 Polytopes réguliers d'un espace vectoriel euclidien**[\[Énoncé\]](#)

XIII.6 Correction Suites et séries de fonctions

XIII.6.1 Etude d'une suite de fonctions (1)

[\[Énoncé\]](#)

1. Soit $x \in [0, 1]$.

Pour $n = 0$, le résultat est immédiat.

Supposons que pour un certain $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq P_n(x) \leq \sqrt{x}$.

Alors $x - P_n(x)^2 \geq 0$ donc $P_{n+1} \geq P_n(x) \geq 0$ et

$$\sqrt{x} - P_{n+1}(x) = (\sqrt{x} - P_n(x)) \left(1_{\frac{1}{2}}(\sqrt{x} + P_n(x))\right) \geq 0$$

donc $P_{n+1} \leq \sqrt{x}$. Ainsi, on a montré par récurrence le résultat.

2. On reprend l'inégalité précédente, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\sqrt{x} - P_{n+1}(x) = (\sqrt{x} - P_n(x)) \left(1_{\frac{1}{2}}(\sqrt{x} + P_n(x))\right) \leq (\sqrt{x} - P_n(x)) \left(1 - \frac{\sqrt{x}}{2}\right)$$

On montre cette fois par récurrence que :

$$0 \leq \sqrt{x} - P_n(x) \leq (\sqrt{x} - P_0(x)) \left(1 - \frac{\sqrt{x}}{2}\right)^n$$

3. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $g_n : t \mapsto t \left(1 - \frac{t}{2}\right)^n$. L'étude de fonction montre que g_n atteint son maximum en $\frac{2}{n+1}$. Ainsi :

$$\forall x \in [0, 1], \forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq \sqrt{x} - P_n(x) \leq g_n(x) \leq g\left(\frac{2}{n+1}\right) = \frac{2}{n+1} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^n \leq \frac{2}{n+1}$$

On en déduit que (P_n) converge uniformément sur $[0, 1]$ vers la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$.

XIII.6.2 Etude d'une suite de fonctions (2)

[\[Énoncé\]](#)

1. On va montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$g_n \text{ est bornée}$$

Il est clair que g_0 est bornée. Supposons que pour un certain $n \in \mathbb{N}$, g_n est bornée.

$$\forall x \in [0, 1], |g_{n+1}(x)| \leq \int_0^x |g_n(1-t)| dt \leq \int_0^x \|g_n\|_{\infty} dt = x \|g_n\|_{\infty} \leq \|g_n\|_{\infty}$$

Donc g_n est bornée pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Affinons le résultat, on a montré que pour tout $x \in [0, 1]$ et $n \in \mathbb{N}$, $|g_{n+1}(x)| \leq x \|g_n\|_\infty$.

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$|g_{n+1}(x)| \leq \int_0^x |g_n(1-t)| dt \leq \int_0^x (1-t) \|g_{n-1}\|_\infty dt = \frac{1}{2} \|g_{n-1}\|_\infty$$

Ainsi,

$$\|g_{n+1}\| \leq \frac{1}{2} \|g_{n-1}\|_\infty$$

2. A l'aide de la question précédente, on a
$$\begin{cases} \|g_{2n}\|_\infty \leq \frac{1}{2^n} \|g_0\|_\infty, \\ \|g_{2n+1}\|_\infty \leq \frac{1}{2^n} \|g_1\|_\infty \end{cases}$$

On pose $K = \max(\|g_0\|_\infty, \|g_1\|_\infty)$, pour avoir

$$\forall n \in \mathbb{N}, \|g_n\|_\infty \leq \frac{K}{\sqrt{2}^n}$$

Comme la série $\sum \frac{1}{\sqrt{2}^n}$ est une série convergente, ainsi on en déduit que $\sum g_n$ converge normalement donc simplement sur $[0, 1]$. La fonction G est bien définie sur $[0, 1]$.

D'après le théorème fondamental de l'analyse, g_n est dérivable sur $[0, 1]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $g'_n(x) = g_{n-1}(1-x)$. Donc la série $\sum g'_n$ converge normalement donc uniformément sur $[0, 1]$. On en déduit que G est dérivable et que

$$\forall x \in [0, 1], G'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} g'_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} g_{n-1}(1-x) = \sum_{n=0}^{\infty} g_n(1-x) = G(1-x)$$

Par conséquent, G' est dérivable sur $[0, 1]$ et que

$$\forall x \in [0, 1], G''(x) = -G'(1-x) = -G(x)$$

3. G est donc solution de l'équation différentielle, $y'' + y = 0$.

Donc il existe $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tel que $G = \alpha \cos + \beta \sin$.

Et de plus pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $g_n(0) = 0$ donc $G(0) = 1$, et $G'(1) = G(0) = 1$. On en déduit que $\alpha = 1$ et $\beta = \frac{1 + \sin(1)}{\cos(1)}$.

XIII.6.3 Etude d'une suite de fonctions (3)

[Enoncé]

Soit $x \in \mathbb{R}$

Si $x \in \pi\mathbb{Z}$ alors $f_n(x) = 0$.

Si $x \notin \mathbb{Z}$ alors $|\cos(x)| < 1$ d'où par croissance comparées, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$.

Donc (f_n) converge simplement vers la fonction nulle.

Montrons que (f_n) ne converge pas uniformément sur \mathbb{R} vers la fonction nulle.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$

$$f_n\left(\frac{1}{n}\right) = n \cos\left(\frac{1}{n}\right)^n \sin\left(\frac{1}{n}\right)$$

On sait que :

$$\cos\left(\frac{1}{n}\right) = 1 - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{n^2}$$

Ainsi,

$$n \ln\left(\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2n}$$

puis par continuité de l'exponentielle ²

$$\exp\left(n \ln\left(\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right)\right) = 1$$

On sait également que

$$\sin\left(\frac{1}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$$

par conséquent, on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n\left(\frac{1}{n}\right) = 1$$

Donc (f_n) ne converge pas absolument vers la fonction nulle.

XIII.6.4 Etude d'une suite de fonctions (4)

[\[Énoncé\]](#)

XIII.6.5 Etude d'une suite de fonctions 5

[\[Énoncé\]](#)

XIII.6.6 Etude d'une suite de fonctions 6

[\[Énoncé\]](#)

XIII.6.7 Etude d'une suite de fonctions 7

[\[Énoncé\]](#)

XIII.6.8 Développement de la cotangente[\[Énoncé\]](#)**XIII.6.9 Etude d'une fonction définie par une série alternée (1)**[\[Énoncé\]](#)**XIII.6.10 Etude d'une fonction définie par une série alternée (2)**[\[Énoncé\]](#)**XIII.6.11 Convergence vers une dérivée**[\[Énoncé\]](#)

On sait que :

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} f'(x)$$

donc

$$\frac{f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x)}{\frac{1}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f'(x)$$

Donc (g_n) converge simplement vers f' sur \mathbb{R} .

D'après l'inégalité de Taylor Lagrange, on a :

$$\left| f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) - \frac{1}{n}f'(x) \right| \leq \frac{\|f''\|_{\infty}}{2n^2}$$

donc

$$|g_n(x) - f'(x)| \leq \frac{\|f''\|_{\infty}}{2n}$$

d'où

$$\|g_n - f'\|_{\infty} \leq \frac{\|f''\|_{\infty}}{2n} \rightarrow 0$$

Ainsi (g_n) converge uniformément vers f' sur \mathbb{R} .

XIII.6.12 Limite ponctuelle et uniforme d'une suite de fonctions[\[Énoncé\]](#)

XIII.6.13 Convergence des suites de polynômes[\[Enoncé\]](#)**XIII.6.14 Un théorème de Weierstrass sur \mathbb{R} ?**[\[Enoncé\]](#)**XIII.6.15 Approximation paire**[\[Enoncé\]](#)**XIII.6.16 Approximation croissante**[\[Enoncé\]](#)**XIII.6.17 Interversion Série-Intégrale**[\[Enoncé\]](#)**XIII.6.18 Série de fonction matricielle**[\[Enoncé\]](#)**XIII.6.19 Fonction ζ de Riemann**[\[Enoncé\]](#)**XIII.6.20 Expression de suites sous forme de séries**[\[Enoncé\]](#)**XIII.6.21 Etude d'une série de fonctions**[\[Enoncé\]](#)

XIII.6.22 Théorème de Dini ★★★★★

[Énoncé]

1. Soit $\varepsilon > 0$.

Tout d'abord, quel que soit $x \in [a, b]$, la suite $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et converge vers $f(x)$ donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n(x) \leq f(x)$.

Donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n \leq f_{n+1} \leq f$.

1^{re} méthode :

Fixons $x \in [a, b]$.

On pose $N \in \mathbb{N}^*$ tel que $\frac{b-a}{N} \leq \frac{\varepsilon}{3}$ et pour $k \in \llbracket 0; N \rrbracket$, $x_k = a + \frac{k(b-a)}{N}$. x_0, \dots, x_N

forme une subdivision régulière de $[a, b]$ donc $\exists k \in \llbracket 0; N \rrbracket$, $|x_k - x| \leq |x_1 - x_0| = \frac{b-a}{N}$.

Ensuite, par convergence simple de la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$, on peut se donner $M \in \mathbb{N}$ tel que $|f(x_k) - f_M(x_k)| \leq \frac{\varepsilon}{3}$.

Enfin f et f_M sont continues sur un segment, d'après le théorème de Heine elles sont uniformément continues sur ce segment. On sait donc que $\exists \eta > 0$, $\forall (x, y) \in [a, b]^2$, $|x - y| \leq \eta \implies |f(x) - f(y)| \leq \frac{\varepsilon}{3}$ et $|f_M(x) - f_M(y)| \leq \frac{\varepsilon}{3}$.

Finalement par inégalité triangulaire,

$\forall n \geq M$, $0 \leq f(x) - f_n(x) \leq f(x) - f_M(x) \leq |f(x) - f(x_k)| + |f(x_k) - f_M(x_k)| + |f_M(x_k) - f_M(x)| \leq \varepsilon$.

Ainsi par passage au sup, $\forall n \geq M$, $\|f - f_n\|_{\infty, [a, b]} \leq \varepsilon$ i.e. $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f sur $[a, b]$.

2nd méthode :

Posons pour tout $n \in \mathbb{N}$, $F_n = \{x \in [a, b], f(x) - f_n(x) \geq \varepsilon\}$.

$\forall n \in \mathbb{N}$, $F_{n+1} \subset F_n$. De plus les F_n sont des compacts de \mathbb{R} : en effet si $n \in \mathbb{N}$ et $(x_k) \in F_n^{\mathbb{N}}$ converge vers x alors $x \in [a, b]$ et $\forall k \in \mathbb{N}$, $f(x_k) - f_n(x_k) \geq \varepsilon$. Donc par continuité de f et f_n , en passant à la limite $f(x) - f_n(x) \geq \varepsilon$ et $x \in F_n$. Par caractérisation séquentielle F_n est un fermé inclus dans le compact $[a, b]$, c'est donc un compact de \mathbb{R} .

On sait en vertu de la convergence simple de $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n = \emptyset$. Donc par la contraposé du lemme des compacts emboîtés (cf. ??), $\exists N \in \mathbb{N}$, $F_N = \emptyset$.

Autrement dit, $\forall n \geq N$, $\forall x \in [a, b]$, $0 \leq f(x) - f_n(x) \leq f(x) - f_N(x) < \varepsilon$ ou encore, $\forall n \geq N$, $\|f - f_n\|_{\infty} < \varepsilon$.

Donc $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f sur $[a, b]$.

2. Soit $\varepsilon > 0$.

Tout d'abord on peut remarquer que f est croissante comme limite simple de fonctions croissantes.

Fixons $x \in [a, b]$. Fixons $N \in \mathbb{N}^*$ tel que $\frac{f(b) - f(a)}{N} \leq \frac{\varepsilon}{4}$.

Comme f est continue d'après le TVI, $\forall k \in \llbracket 0; N \rrbracket$, $\exists x_k \in [a, b]$, $f(x_k) = f(a) +$

$k \frac{f(b) - f(a)}{N}$. De plus par croissance de f on a $x_0 \leq x_1 \leq \dots \leq x_N$.

$f(x_0), \dots, f(x_N)$ forme une subdivision régulière de $[f(a), f(b)]$ donc il existe $k \in \llbracket 0; N-1 \rrbracket$ tel que $f(x) \in [f(x_k), f(x_{k+1})]$.

Alors $|f(x) - f(x_k)| \leq |f(x_{k+1}) - f(x_k)| = \frac{f(b) - f(a)}{N} \leq \frac{\varepsilon}{4}$.

Par convergence simple on sait qu'il existe $M \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq M$,

$|f(x_k) - f_n(x_k)| \leq \frac{\varepsilon}{4}$ et $|f_n(x_{k+1}) - f_n(x_k) - f(x_{k+1}) + f(x_k)| \leq \frac{\varepsilon}{4}$.

Donc par croissance des f_n et inégalité triangulaire, $\forall n \geq M$:

$$\begin{aligned} |f(x) - f_n(x)| &\leq |f(x) - f(x_k)| + |f(x_k) - f_n(x_k)| + |f_n(x_k) - f_n(x)| \\ &\leq |f(x) - f(x_k)| + |f(x_k) - f_n(x_k)| + |f_n(x_{k+1}) - f_n(x_k)| \\ &\leq |f(x) - f(x_k)| + |f(x_k) - f_n(x_k)| + |f_n(x_{k+1}) - f_n(x_k) - f(x_{k+1}) + f(x_k)| + |f(x_{k+1}) - f(x_k)| \\ &\leq \varepsilon \end{aligned}$$

Finalement, $\|f - f_n\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f .

XIII.6.23 Suite de fonction lipschitzienne ★★

[\[Enoncé\]](#)

1. Soit $(x, y) \in [a, b]^2$.

$\forall n \in \mathbb{N}$, $|f_n(x) - f_n(y)| \leq L|x - y|$.

Donc par passage à la limite à l'aide de la convergence simple $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$.

Ainsi f est L -lipschitzienne.

2. Soit $x \in [a, b]$. Fixons $\varepsilon > 0$ et $N \in \mathbb{N}^*$ tel que $\frac{b-a}{N} \leq \frac{\varepsilon}{4L}$. On pose pour $k \in \llbracket 0; N \rrbracket$, $x_k =$

$a + \frac{k(b-a)}{N}$. x_0, \dots, x_N forme une subdivision régulière de $[a, b]$ donc $\exists k \in \llbracket 0; N \rrbracket$, $|x_k -$

$x| \leq |x_1 - x_0| = \frac{b-a}{N}$.

On a alors par inégalité triangulaire $\forall n \in \mathbb{N}$,

$|f(x) - f_n(x)| \leq |f(x) - f(x_k)| + |f(x_k) - f_n(x_k)| + |f_n(x_k) - f_n(x)| \leq L|x - x_k| + |f(x_k) - f_n(x_k)| + L|x_k - x| \leq |f(x_k) - f_n(x_k)| + \frac{\varepsilon}{2}$.

De plus par convergence simple, $\exists M \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq M$, $|f(x_k) - f_n(x_k)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$.

Donc, $\forall n \geq M$, $|f(x) - f_n(x)| \leq \varepsilon$. Par passage à la borne sup, $\forall n \geq M$, $\|f - f_n\|_\infty \leq \varepsilon$. $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge donc uniformément vers f sur $[0, 1]$.

XIII.6.24 Phénomène de Runge

[\[Enoncé\]](#)

XIII.6.25 Théorème de Weierstrass

[Enoncé]

XIII.6.26 Théorème de Chudnovsky ★★★★★

[Enoncé]

- Soit $x \in \mathbb{R}$. Posons pour $n \in \mathbb{N}^*$, $x_n = \frac{\lfloor 2^n x \rfloor}{2^n}$. $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une suite à valeur dans \mathcal{D} .
De plus $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $x_n \leq x \leq x + \frac{1}{2^n}$. Donc $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$.
Ainsi \mathcal{D} est dense dans \mathbb{R} .
- Soit $x \in]0, 1[$. La suite de terme général $\varphi_n(x)$ est une suite numérique qui vérifie, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\varphi_{n+1}(x) = \varphi(\varphi_n(x))$.
 φ est continue sur $]0, 1[$ et une étude de φ montre que $\varphi(]0, 1[) =]0, 1[$ et que φ admet un unique point fixe sur $]0, 1[$ qui est $\frac{1}{2}$.
De plus, $\forall x \in]0, 1[$, $\varphi(x) - x = x(1 - 2x) \leq 0$.
Ainsi $(\varphi_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante. Elle est minorée donc d'après le théorème de la limite monotone elle converge vers une limite $\ell \in]0, 1[$.
De plus sa limite doit être un point fixe de φ donc $\ell = \frac{1}{2}$.
Ainsi $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ CVS vers la fonction constante égale à $\frac{1}{2}$ sur $]0, 1[$ et donc sur $[a, b]$.
 - D'après l'étude de φ , $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\varphi_n([a, b]) \subset \left[\varphi_{n-1}(c), \frac{1}{2}\right]$ avec $c = \min(\varphi(a), \varphi(b))$.
Ainsi $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\forall x \in [a, b]$, $\left|\varphi_n(x) - \frac{1}{2}\right| \leq \frac{1}{2} - \varphi_{n-1}(c)$.
Par conséquent $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\left\|\varphi_n - \frac{1}{2}\right\|_{\infty} \leq \frac{1}{2} - \varphi_{n-1}(c) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
On conclut que $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ CVU vers la fonction constante égale à $\frac{1}{2}$ sur $[a, b]$.
- Soient $f, g \in \mathcal{Z}$. Notons $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(Q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites de fonctions polynomiales qui convergent uniformément vers f et g respectivement. On peut d'abord remarquer que f, g sont continues comme limites uniformes de fonctions continues (polynomiales).
D'une part, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\|f + g - (P_n + Q_n)\|_{\infty} \leq \|f - P_n\|_{\infty} + \|g - Q_n\|_{\infty} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
Donc $(P_n + Q_n)_{n \in \mathbb{N}}$, qui est une suite de fonctions polynomiales à coefficients entiers, converge uniformément vers $f + g$ i.e $f + g \in \mathcal{Z}$.
D'autre part, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\|fg - P_n Q_n\|_{\infty} \leq \|fg - P_n g\|_{\infty} + \|P_n g - P_n Q_n\|_{\infty} = \|g\|_{\infty} \|f - P_n\|_{\infty} + \|P_n\|_{\infty} \|g - Q_n\|_{\infty}$.
La suite $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge pour la norme uniforme, elle est donc bornée pour cette norme d'où $\|fg - P_n Q_n\|_{\infty} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Ainsi $(P_n Q_n)_{n \in \mathbb{N}}$, qui est une suite de fonctions polynomiales à coefficients entiers, converge uniformément vers fg i.e $fg \in \mathcal{Z}$.

4. D'après la question 2, $x \mapsto \frac{1}{2} \in \mathcal{Z}$. De plus on remarque que toutes les f fonctions constantes égale à un entier sont dans \mathcal{Z} (comme limite de la suite constante égale à f)
Donc d'après la question 3, quel que soit $d \in \mathcal{D}$, $x \mapsto d \in \mathcal{Z}$. De plus n'importe quelle fonction polynomiale g associé à un monôme est aussi dans \mathcal{Z} (comme limite de la suite constante égale à g)

Ainsi, si $P = \sum_{k=0}^p a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$ alors d'après la question 1 on peut trouver des suites $(d_n^0), \dots, (d_n^p) \in \mathcal{D}^{\mathbb{N}}$ telles que $\forall k \in \llbracket 0; p \rrbracket$, $a_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} d_n^k$.

En posant pour $n \in \mathbb{N}$, $P_n = \sum_{k=0}^p d_n^k X^k$ on a alors $(P_n) \in \mathcal{Z}^{\mathbb{N}}$ et $\|x \mapsto P(x) - P_n(x)\|_{\infty} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

0. On en déduit que \mathcal{Z} contient l'ensemble des fonctions polynomiale à coefficients réels. Fixons maintenant $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$. D'après le théorème d'approximation de Weierstrass, il existe une suite $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions polynomiales à coefficients réels convergeant uniformément vers f . Finalement, $f \in \mathcal{Z}$.

Remarque : on aurait pu formuler la réponse à l'aide du théorème de la double limite

5. Le choix de a et b est important ! En effet si le segment $[a, b]$ contient un entier alors on ne peut pas atteindre toutes les fonctions continues de $[a, b]$:
si $k \in \mathbb{Z} \cap [a, b]$ et si $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de fonctions polynomiales à coefficients entiers convergeant uniformément vers une fonction P alors $(P_n(k))_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d'entier qui converge vers $P(k)$. $P(k)$ est donc un entier (cf. XIII.8.2).

Le résultat actuel ne permet pas d'obtenir une fonction qui prendrait une valeur complexe car un polynôme à coefficients entiers est à valeurs réelles sur $[a, b]$.

On peut cependant avoir un résultat analogue en considérant des polynômes à coefficients dans l'anneau des entiers de Gauss $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib, (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$. La preuve n'est pas bien plus compliquée, il suffit de montrer que la fonction constante égale à i est dans \mathcal{Z} ($(2i\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ fait l'affaire) puis d'utiliser la stabilité par produit et somme de \mathcal{Z} .

XIII.6.27 Théorème de sélection de Helly

[\[Enoncé\]](#)

XIII.7 Correction Séries entières

XIII.7.1 Lemme d'Abel

[Enoncé]

XIII.7.2 Fonction non développable en série entière

[Enoncé]

1. On remarque que :

$$\lim_{x \rightarrow 0} -\frac{1}{x^2} = -\infty$$

Ainsi,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \exp\left(-\frac{1}{x^2}\right) = 0$$

Donc f est continue sur \mathbb{R} .

2. Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\exists P_n \in \mathbb{R}[X], \forall x \in \mathbb{R}^* f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right) f(x)$$

Le résultat est clair pour $n = 0$.

Pour $n = 1$, pour tout $x \in \mathbb{R}$

$$f'(x) = \frac{2}{x^3} f(x)$$

Ainsi, en posant $P_1 = 2X^3$, le résultat est vérifié. Supposons que pour un certain $n \in \mathbb{N}$, il existe $P_n \in \mathbb{R}[X]$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$ $f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right) f(x)$ Alors ,

$$f^{(n+1)}(x) = -\frac{1}{x^2} P'_n\left(\frac{1}{x}\right) f(x) + P_n(x) f'(x) = \left[\frac{2}{x^3} P_n\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x^2} P'_n\left(\frac{1}{x}\right) \right] f(x)$$

De plus, par croissance comparées, on a

$$\lim_{x \rightarrow 0} f^{(n)}(x) = 0$$

Donc f est de classe \mathcal{C}^∞ sur \mathbb{R} et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)} = 0$.

3. Supposons que f est développable en série entière. Alors d'après la formule de Taylor,

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

Or d'après la question précédente, cela nous donnerait que f est la fonction nulle, ce qui est absurde.

Donc f n'est pas développable en série entière.

XIII.7.3 CCINP MP 2019[\[Énoncé\]](#)**XIII.7.4 Série entière de terme général binomial**[\[Énoncé\]](#)**XIII.7.5 Formule de Cauchy**[\[Énoncé\]](#)

Soit $r \in [0, R[$, pour tout $\theta \in [0, 2\pi[$, $|re^{i\theta}| = r \leq R$.

Puisque que $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k x^k$ est une série entière, on peut utiliser la théorème d'interversion série-intégrale :

$$\int_0^{2\pi} f(re^{i\theta})e^{-in\theta} d\theta = \int_0^{2\pi} \sum_{k=0}^{+\infty} a_k r^k e^{i(k-n)\theta} d\theta = \sum_{k=0}^{+\infty} \int_0^{2\pi} a_k r^k e^{i(k-n)\theta} d\theta$$

D'après calculs, on obtient :

$$\int_0^{2\pi} e^{i(k-n)\theta} d\theta = \begin{cases} 0 & \text{si } k \neq n \\ 2\pi & \text{sinon} \end{cases}$$

Ainsi, on en déduit que la formule de Cauchy :

$$\int_0^{2\pi} f(re^{i\theta})e^{-in\theta} d\theta = 2\pi a_n r^n$$

XIII.7.6 Principe des zéros isolés[\[Énoncé\]](#)**XIII.7.7 Produit de Hadamard**[\[Énoncé\]](#)**XIII.7.8 Théorème de Liouville**[\[Énoncé\]](#)

XIII.7.9 Inverse d’une série entière[\[Enoncé\]](#)**XIII.7.10 Equivalent de séries entières**[\[Enoncé\]](#)**XIII.7.11 Théorème de d’Alembert-Gauss**[\[Enoncé\]](#)**XIII.7.12 Développement de fraction rationnelle autour de 0**[\[Enoncé\]](#)**XIII.7.13 Fonction quasi-polynomiale**[\[Enoncé\]](#)

Série génératrice d’une fonction quasi-polynomiale

Partition d’un entier

XIII.7.14 Théorème de réalisation de Borel[\[Enoncé\]](#)**XIII.7.15 Série de Lambert**[\[Enoncé\]](#)**XIII.7.16 Somme de Goldbach**[\[Enoncé\]](#)

XIII.7.17 Une somme avec l'indicatrice d'Euler[\[Énoncé\]](#)**XIII.7.18 Coefficients définies par des intégrales**[\[Énoncé\]](#)**XIII.7.19 Détermination des coefficients d'un développement en série entière**[\[Énoncé\]](#)**XIII.7.20 Série génératrice du nombre de points à coordonnées entières dans un quart de disque**[\[Énoncé\]](#)

Nombre de points à coordonnées entières dans un disque

Prolongement du problème

XIII.7.21 Nombre d'involution[\[Énoncé\]](#)**XIII.7.22 Théorème d'Abel**[\[Énoncé\]](#)**XIII.7.23 Théorèmes taubériens d'Abel**[\[Énoncé\]](#)

Cas des séries à coefficients positifs

Théorème taubérien faible

Théorème taubérien fort

XIII.8 Correction Topologie

XIII.8.1 Normes d'opérateur

[Enoncé]

Dans tout l'exercice on ne se souciera pas de noter différemment les normes $\|\cdot\|_\infty, \|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ de $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$ et $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. Il doit être clair aux yeux du lecteur dans quels espaces vivent chaque objets.

1. Soit $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$. Soit $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$.

$$|(AX)_i| = \left| \sum_{j=1}^p A_{ij}x_j \right| \leq \sum_{j=1}^p |A_{ij}||x_j| \leq \|X\|_\infty \sum_{j=1}^p |A_{ij}| \leq \left(\max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^p |A_{ij}| \right) \|X\|_\infty.$$

$$\text{Donc } \|AX\|_\infty \leq \left(\max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^p |A_{ij}| \right) \|X\|_\infty \text{ i.e. } \|A\|_\infty \leq \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^p |A_{ij}|.$$

Pour qu'un vecteur X_0 satisfasse l'égalité, il est nécessaire et suffisant que toutes les inégalités soient des égalités.

Pour la première inégalité il faut que les $A_{ij}x_j$ soient tous de même signe et pour la deuxième il faut que tous les x_j valent $\|X_0\|_\infty$. On peut par exemple prendre

$$x_j = \begin{cases} 1 & \text{si } A_{ij} > 0 \\ -1 & \text{si } A_{ij} < 0 \\ 0 & \text{si } A_{ij} = 0 \end{cases}.$$

Pour la dernière inégalité on se donne $i_0 \in \llbracket 1; n \rrbracket$ tel que $\sum_{j=1}^p |A_{i_0j}| = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^p |A_{ij}|$.

Par construction $|(AX_0)_{i_0}| = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^p |A_{ij}| \|X_0\|_\infty$ d'où $\|AX\|_\infty \geq \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^p |A_{ij}| \|X_0\|_\infty$.

On en déduit que $\|A\|_\infty \geq \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^p |A_{ij}|$ puis que $\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^p |A_{ij}|$.

2. Soit $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$.

$$\sum_{i=1}^n |(AX)_i| = \sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^p A_{ij}x_j \right| \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p |A_{ij}||x_j| = \sum_{j=1}^p |x_j| \sum_{i=1}^n |A_{ij}| \leq \|X\|_1 \left(\max_{1 \leq j \leq p} \sum_{i=1}^n |A_{ij}| \right).$$

$$\text{Donc } \|AX\|_1 \leq \left(\max_{1 \leq j \leq p} \sum_{i=1}^n |A_{ij}| \right) \|X\|_1 \text{ i.e. } \|A\|_1 \leq \max_{1 \leq j \leq p} \sum_{i=1}^n |A_{ij}|.$$

Pour qu'un vecteur X_0 satisfasse l'égalité, il est nécessaire et suffisant que toutes les

inégalités soient des égalités.

Pour la première inégalité il faut que les $A_{ij}x_j$ soient tous de même signe et pour la deuxième il suffit que pour j_0 qui maximise la somme $\sum_{i=1}^n |A_{ij}|$ $x_{j_0} = 1$ et que $x_j = 0$ pour $j \neq j_0$. On peut par exemple prendre $X_0 = e_{j_0}$ où (e_1, \dots, e_p) est la base canonique de $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$.

Pour la deuxième inégalité on se donne $j_0 \in \llbracket 1; p \rrbracket$ tel que $\sum_{i=1}^n |A_{ij_0}| = \max_{1 \leq j \leq p} \sum_{i=1}^n |A_{ij}|$.

Par construction $\sum_{i=1}^n |(AX_0)_i| = \sum_{i=1}^n |A_{ij_0}| = \max_{1 \leq j \leq p} \sum_{i=1}^n |A_{ij}| \|X_0\|_1$ d'où $\|AX\|_1 \geq \max_{1 \leq j \leq p} \sum_{i=1}^n |A_{ij}| \|X_0\|_1$.

On en déduit que $\|A\|_1 \geq \max_{1 \leq j \leq p} \sum_{i=1}^n |A_{ij}|$ puis que $\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq p} \sum_{i=1}^n |A_{ij}|$.

3. Notons $\langle \cdot, \cdot \rangle$ le produit scalaire associé à $\|\cdot\|_2$. Encore une fois, on ne différencie par les notations dans $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$ et $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. Soit $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$.

$$\|AX\|_2^2 = \langle AX, AX \rangle = X^\top A^\top AX = \langle X, A^\top AX \rangle.$$

La matrice $A^\top A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ est symétrique réelle positive donc diagonalisable avec $\text{Sp}(A^\top A) \subset \mathbb{R}_+$. Il existe donc une base (X_1, \dots, X_p) orthonormée de $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$ formée de vecteurs propres de $A^\top A$. On note λ_k la valeur propre associée à X_k pour $k \in \llbracket 1; p \rrbracket$.

On note aussi $X = \sum_{k=1}^p t_k X_k$.

Alors $A^\top AX = \sum_{k=1}^p t_k A^\top AX_k = \sum_{k=1}^p t_k \lambda_k X_k$. Donc

$$\|AX\|_2^2 = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^p t_i t_j \lambda_j \langle X_i, X_j \rangle = \sum_{k=1}^p t_k^2 \lambda_k \leq \max(\text{Sp}(A^\top A)) \sum_{k=1}^p t_k^2 = \max(\text{Sp}(A^\top A)) \|X\|_2^2$$

Ainsi $\|A\|_2 \leq \sqrt{\max \text{Sp}(A^\top A)}$.

De plus, pour k tel que $\lambda_k = \max \text{Sp}(A^\top A)$, $\|AX_k\|_2^2 = \lambda_k^2 \|X_k\|_2^2 = \lambda_k^2$.

Ainsi $\|A\|_2 = \sqrt{\max \text{Sp}(A^\top A)}$.

XIII.8.2 \mathbb{Z} est fermé ★

[Enoncé]

Soit $(u_n) \in \mathbb{Z}^\mathbb{N}$ de limite $\ell \in \mathbb{C}$.

$\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| < \frac{1}{2}$.

Alors si $n \geq N$, $|u_n - u_{n+1}| \leq |u_n - \ell| + |\ell - u_{n+1}| < 1$.

Comme $(u_n, u_{n+1}) \in \mathbb{Z}$, $|u_n - u_{n+1}| \in \mathbb{N}$.

Donc $\forall n \geq N$, $u_n = u_{n+1}$. Ainsi $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} u_N$.

Par unicité de la limite, $\ell = u_N \in \mathbb{Z}$.

XIII.8.3 Orthogonalité et topologie

[Enoncé]

1. Soit $y \in E$. On sait que $\varphi_y \in (E)$.

De plus d'après l'inégalité de Cauchy-Schwartz, $\forall x \in E$, $|\varphi_y(x)| \leq \|y\| \|x\|$.

Donc φ_y est continue.

2. Pour $y \in E$ on note $\tilde{\varphi}_y = \varphi_y|_F$ la restriction de φ_y à F .

Posons $\varphi : y \in E \mapsto \tilde{\varphi}_y$. On sait que $\varphi \in (E, F^*)$ où F^* est le dual de F , l'ensemble des formes linéaires sur F (continues). Montrons qu'elle est continue pour la norme $\|\cdot\|_{E^*}$ subordonnée à la norme $\|\cdot\|$ de E . Soient $x, y \in E$.

$|\varphi(y)(x)| = |\tilde{\varphi}_y(x)| \leq \|y\| \|x\|$ donc $\|\varphi(y)\|_{E^*} \leq \|y\|$ d'où $\|\varphi\| \leq 1$.

Ainsi φ est continue et donc $F^\perp = \{y \in E, \forall x \in F, \langle x, y \rangle = 0\} = \{y \in E, \tilde{\varphi}_y = 0_{F^*}\} = \varphi^{-1}(0_{F^*})$ est un fermé de E .

3. D'après la question précédente $(F^\perp)^\perp$ est fermé, il suffit donc de montrer que $F \subset (F^\perp)^\perp$. Fixons $x \in F$.

Soit $y \in F^\perp$. Par définition de F^\perp , $\langle x, y \rangle = 0$. Donc $x \in (F^\perp)^\perp$.

Ainsi $(F^\perp)^\perp$ est un fermé qui contient F et par suite $\overline{F} \subset (F^\perp)^\perp$.

XIII.8.4 Ensemble des valeurs d'adhérence d'une suite

[Enoncé]

On raisonne par double inclusion.

Soit ℓ une valeur d'adhérence de $u := (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Fixons $n \in \mathbb{N}$.

Notons $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $\lim_{p \rightarrow +\infty} u_{\varphi(p)} = \ell$. $\varphi(n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \infty$ donc

$\exists N \in \mathbb{N}$, $\forall p \geq N$, $\varphi(p) \geq n$. Ainsi $(u_{\varphi(p)})_{p \geq N}$ est une suite à valeurs dans $\{u_k, k \geq n\}$ de limite $\ell : \ell \in \overline{\{u_k, k \geq n\}}$.

On en déduit que $V \subset \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{\{u_k, k \geq n\}}$.

Réciproquement soit $\ell \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{\{u_k, k \geq n\}}$.

On va construire par récurrence une extractrice ψ telle que $(u_{\psi(p)})_{p \in \mathbb{N}}$ tend vers ℓ .

$\ell \in \overline{\{u_k, k \geq 0\}} \implies \exists k_0 \in \mathbb{N}$, $\|\ell - u_{k_0}\| < 1 = \frac{1}{2^0}$.

Supposons que l'on dispose pour un certain $p \in \mathbb{N}$ d'entiers $k_0 < \dots < k_p$ tels que $\forall j \in \llbracket 0; p \rrbracket$, $\|\ell - u_{k_j}\| < \frac{1}{2^j}$.

Alors $\ell \in \overline{\{u_k, k \geq k_p\}} \implies \exists k_{p+1} \in \mathbb{N}$, $\|\ell - u_{k_{p+1}}\| < \frac{1}{2^{p+1}}$.

On définit alors $\psi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ par $\forall p \in \mathbb{N}$, $\psi(p) = k_p$. Par construction ψ est strictement

croissante et de plus, $\forall p \in \mathbb{N}$, $\|\ell - u_{\psi(p)}\| < \frac{1}{2^p}$. Donc $u_{\psi(p)} \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} \ell$ d'où $\ell \in V$.

On en déduit que $V = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{\{u_k, k \geq n\}}$. V est un fermé en tant qu'intersection de fermés.

Remarque : une manière plus simple/naturelle de traiter l'exercice est de caractériser le fait que ℓ soit une valeur d'adhérence de u par le fait qu'il existe une infinité de terme de la suite u à une distance inférieure à ε de ℓ . Cette caractérisation peut se voir comme définition d'une valeur d'adhérence et est parfois plus utile que le point de vue suite extraite.

Valeur d'adhérence du cercle unité

1. Déjà fait dans les groupes

2. Construisons une extractrice par extractions successives :

D'après la question précédente on dispose de $\varphi_1 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $z_1^{\varphi_1(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

Supposons que pour un certain $k \in \llbracket 1; m \rrbracket$ on dispose de ψ_{k-1} telle que

$$\begin{pmatrix} z_1^{\psi_{k-1}(n)} \\ \vdots \\ z_{k-1}^{\psi_{k-1}(n)} \end{pmatrix} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

$(z_k^{\varphi_{k-1}(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est à valeur dans le compact \mathbb{U} donc quitte à extraire on peut supposer qu'elle converge vers un certain $\lambda \in \mathbb{U}$.

Ainsi $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \\ \lambda \end{pmatrix}$ est une valeur d'adhérence de $\begin{pmatrix} z_1^n \\ \vdots \\ z_k^n \end{pmatrix}$. Mais quel que soit $p \in \mathbb{N}$,

$\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \\ \lambda^p \end{pmatrix}$ est une valeur d'adhérence de $\begin{pmatrix} z_1^n \\ \vdots \\ z_{k-1}^n \\ z_k^n \end{pmatrix}$. En effet en notant η une ex-

tractrice qui fait converger la suite vers $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \\ \lambda \end{pmatrix}$, il suffit de considérer $\xi(n) = p\eta(n)$.

On considère désormais la suite $(\lambda^n)_{n \in \mathbb{N}}$. D'après la question précédente, cette suite admet 1 pour valeur d'adhérence.

Par conséquent, comme l'ensemble des valeurs d'adhérence de $\begin{pmatrix} z_1^n \\ \vdots \\ z_k^n \end{pmatrix}_{n \in \mathbb{N}}$ est fermé,

$\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ est une valeur d'adhérence de $\begin{pmatrix} z_1^n \\ \vdots \\ z_k^n \end{pmatrix}_{n \in \mathbb{N}}$.

Par récurrence, pour tout $k \in \llbracket 1; m \rrbracket$ $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ est une valeur d'adhérence de $\begin{pmatrix} z_1^n \\ \vdots \\ z_k^n \end{pmatrix}_{n \in \mathbb{N}}$.

En particulier $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ est une valeur d'adhérence de $\begin{pmatrix} z_1^n \\ \vdots \\ z_m^n \end{pmatrix}_{n \in \mathbb{N}}$.

3. Notons $M = \max_{1 \leq k \leq n} |a_k|$. Il est clair que si $M < 1$ alors $\left| \sum_{k=1}^n a_k^m \right| \leq nM^m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0$ d'où

$$\sum_{k=1}^n a_k^m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0.$$

Supposons maintenant $M > 1$. On note $K = \{k \in \llbracket 1; n \rrbracket, |a_k| = M\}$.

$\forall k \in K, \frac{a_k}{M} \in \mathbb{U}$. Donc d'après la question précédente on peut trouver une extractrice

φ telle que $\forall k \in K, \left(\frac{a_k}{M}\right)^{\varphi(m)} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 1$.

Donc $\sum_{k=1}^n a_k^{\varphi(m)} = M^{\varphi(m)} \left(\sum_{k \in K} \left(\frac{a_k}{M}\right)^{\varphi(m)} + \sum_{k \notin K} \left(\frac{a_k}{M}\right)^{\varphi(m)} \right) \underset{m \rightarrow +\infty}{\sim} |K| M^{\varphi(m)} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} +\infty$ ce qui est absurde.

Enfin, si $M = 1$ le même calcul donne $\lim_{m \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n a_k^m = |K|$.

Au final, si $\left(\sum_{k=1}^n a_k^m\right)_{m \in \mathbb{N}}$ converge alors $\forall k \in \llbracket 1; n \rrbracket, |a_k| \leq 1$ et la limite est un entier entre 1 et k , égal au nombre des a_k de module 1.

XIII.8.5 Ensemble des suites convergentes

[\[Enoncé\]](#)

1. On note V l'ensemble des suites de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ convergeant vers 0.

Tout d'abord c'est bien une partie de ℓ^∞ puisqu'une suite convergente est bornée. Ensuite, donnons nous $(u_n^k)_{n \in \mathbb{N}} \in V^{\mathbb{N}}$ une suite de suites convergeant vers 0 qui converge vers une suite U dans $(\ell^\infty, \|\cdot\|_\infty)$.

La suite des limites $\lim_{k \rightarrow +\infty} u_n^k$ converge vers 0 puisqu'elle est constante égale à 0. De plus $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers U . Alors d'après le théorème de la double limite U converge vers $\lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{k \rightarrow +\infty} u_n^k = 0$.

Ainsi V est fermé.

2. On note C l'ensemble des suites convergentes de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$. C'est bien une partie de ℓ^∞ puisqu'une suite convergente est bornée.

Soit $(u_n^k)_{n \in \mathbb{N}} \in C^{\mathbb{N}}$ une suite de suites convergentes qui converge vers une suite $U = (U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans $(\ell^\infty, \|\cdot\|_\infty)$. On note pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\ell_n = \lim_{k \rightarrow +\infty} u_n^k$.

Montrons que la suite des limites $(\ell_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge. On va montrer qu'elle est de Cauchy ce qui justifiera qu'elle converge (cf. l'exo qui montre qu'un espace vectoriel de dimension finie est complet).

Soit $\varepsilon > 0$.

$\|u_n - U\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc $\exists N \in \mathbb{N}, \forall p, q \geq N, \|u_p - u_q\|_\infty < \frac{\varepsilon}{3}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}, u_n^k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} \ell_n$ donc $\exists K_n \in \mathbb{N}, \forall k \geq K_n, |u_n^k - \ell_n| < \frac{\varepsilon}{3}$.

Soient $p \geq N$ et $k \geq \max(K_p, K_N)$.

$$|\ell_p - \ell_N| \leq |\ell_p - u_p^k| + |u_p^k - u_N^k| + |u_N^k - \ell_N| \leq |u_p^k - \ell_p| + \|u_p - u_N\|_\infty + |u_N^k - \ell_N| < \varepsilon$$

On conclut comme la question précédente avec le théorème de la double limite.

XIII.8.6 Partie ouverte et fermée simultanément

[Enoncé]

Je rajouterai un joli dessin

$E \subset \bar{E} \implies E = \bar{E}$ et $\bar{\emptyset} = \bigcap_{F \text{ fermé dans } E} F \subset \bigcap_{r>0} B_f(0, r) = \emptyset \implies \bar{\emptyset} = \emptyset$. Donc E et \emptyset sont

fermés. Leurs complémentaires sont donc ouverts i.e E et \emptyset sont ouverts et fermés dans E . Fixons maintenant une partie $A \subset E$ ouverte et fermée dans E . Supposons qu'elle est non vide et donnons nous $a \in A$. On fixe $b \in E \setminus \{a\}$.

Posons $\varphi : \begin{cases} [0, 1] & \longrightarrow & [a, b] \\ t & \longmapsto & (1-t)a + tb \end{cases}$. On note $s = \sup\{t \in [0, 1], \varphi(t) \in A\}$ qui est bien définie puisque $\varphi(0) = a \in A$. On remarque d'ailleurs que le caractère ouvert de A assure que $s > 0$. On va montrer que $s = 1$.

Montrons d'abord que le sup est atteint. On sait qu'il existe une suite $s_n \in [0, 1]^{\mathbb{N}}$ telle que $s_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} s$ et $\forall n \in \mathbb{N}, \varphi(s_n) \in A$.

φ est continue car affine donc $\varphi(s_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \varphi(s)$.

De plus A est fermée donc $(\forall n \in \mathbb{N}, \varphi(s_n) \in A) \implies \varphi(s) \in A$. Ainsi $s \in \{t \in [0, 1], \varphi(t) \in A\}$.

Supposons maintenant par l'absurde $s < 1$. Comme A est ouverte, $\varphi(s) \in A \implies \exists r > 0, B(\varphi(s), r) \subset A$. On peut toujours supposer $r \leq 1$. Mais alors pour $s' = \frac{s+r}{2} \in [0, 1]$,

$$\|\varphi(s') - \varphi(s)\| = \|(s' - s)(b - a)\| = (s' - s) \|b - a\| = \frac{r-s}{2} \|b - a\|$$

$\frac{r-s}{2} \|b - a\| < r \iff r - s < \frac{2r}{\|b - a\|} \iff r < \frac{\|b - a\| s}{\|b - a\| - 2}$ donc quitte à prendre r plus petit on peut considérer que l'inégalité est vérifiée. (elle l'est automatiquement si

$\|b - a\| = 2)$.

Ainsi $s' > s$ et $s' \in \{t \in [0, 1], \varphi(t) \in A\}$. Ceci est absurde donc $s = 1$ et par suite $b \in A$.
Finalement $A = E$.

XIII.8.7 Opérations sur les adhérences/intérieurs

[\[Corrigé\]](#)

Il n'y a pas vraiment de méthode pour trouver un tel ensemble. On peut essayer de le construire par étape. Il faut jouer avec des parties de \mathbb{R} dont on connaît l'adhérence/l'intérieur comme par exemple les intervalles.

On veut $A \neq \mathring{A}$ et $A \neq \overline{A}$ il faut donc déjà une partie ni ouverte ni fermée. Prenons par exemple $I = [0, 1[$.

Cela ne suffit pas puisque $\overline{I} = [0, 1] = \overline{\overline{I}}$ par exemple. Un intervalle ne suffit donc pas, essayons avec plusieurs. Prenons $J = [0, 1[\cup]1, 2[$. Pour faciliter les calculs on a les relations de l'exercice précédant (cf. l'exo que j'ai rajouté avant). On a

$$\mathring{J} =]0, 1[\cup]1, 2[, \overline{J} = [0, 2], \mathring{\overline{J}} =]0, 2[, \overline{\mathring{J}} = [0, 2]$$

On peut éviter la dernière égalité en prenant $J' = J \cup \{3\} : \overline{J'} = [0, 2] \cup \{3\}$ et $\overline{\mathring{J'}} = [0, 2]$.

On sait aussi que $\mathbb{Q} = \mathbb{R}$ et $\mathring{\mathbb{Q}} = \emptyset$ (car \mathbb{R}/\mathbb{Q} est dense dans \mathbb{R}).

Finalement $A = [0, 1[\cup]1, 2[\cup \{3\} \cup]4, 5[\cap \mathbb{Q}$ fonctionne :

$$\mathring{A} =]0, 1[\cup]1, 2[, \overline{A} = [0, 2] \cup \{3\} \cup [4, 5], \mathring{\overline{A}} =]0, 2[\cup]4, 5[, \overline{\mathring{A}} = [0, 2], \overline{\mathring{\overline{A}}} =]0, 2[, \overline{\overline{\mathring{A}}} = [0, 2] \cup [4, 5]$$

XIII.8.8 Les sept espaces de Kuratowski

[\[Enoncé\]](#)

Il n'y a pas vraiment de méthode pour trouver un tel ensemble. On peut essayer de le construire par étape. Il faut jouer avec des parties de \mathbb{R} dont on connaît l'adhérence/l'intérieur comme par exemple les intervalles.

On veut $A \neq \mathring{A}$ et $A \neq \overline{A}$ il faut donc déjà une partie ni ouverte ni fermée. Prenons par exemple $I = [0, 1[$.

Cela ne suffit pas puisque $\overline{I} = [0, 1] = \overline{\overline{I}}$ par exemple. Un intervalle ne suffit donc pas, essayons avec plusieurs. Prenons $J = [0, 1[\cup]1, 2[$. Pour faciliter les calculs on a les relations de l'exercice précédant (cf. l'exo que j'ai rajouté avant). On a

$$\mathring{J} =]0, 1[\cup]1, 2[, \overline{J} = [0, 2], \mathring{\overline{J}} =]0, 2[, \overline{\mathring{J}} = [0, 2]$$

On peut éviter la dernière égalité en prenant $J' = J \cup \{3\} : \overline{J'} = [0, 2] \cup \{3\}$ et $\overline{\mathring{J'}} = [0, 2]$.

On sait aussi que $\mathbb{Q} = \mathbb{R}$ et $\mathring{\mathbb{Q}} = \emptyset$ (car \mathbb{R}/\mathbb{Q} est dense dans \mathbb{R}).

Finalement $A = [0, 1[\cup]1, 2[\cup \{3\} \cup]4, 5[\cap \mathbb{Q}$ fonctionne :

$$\mathring{A} =]0, 1[\cup]1, 2[, \overline{A} = [0, 2] \cup \{3\} \cup [4, 5], \mathring{\overline{A}} =]0, 2[\cup]4, 5[, \overline{\mathring{A}} = [0, 2], \overline{\mathring{\overline{A}}} =]0, 2[, \overline{\overline{\mathring{A}}} = [0, 2] \cup [4, 5]$$

XIII.8.9 Intérieur d'un sev

[Enoncé]

- Supposons que F est ouvert. Soit $x \in E \setminus \{0\}$.
 $0 \in F$ donc comme F est ouvert, $\exists r > 0$, $B(0, r) \subset F$. $y = \frac{r}{2\|x\|}x \in B(0, r)$ donc $y \in F$.
 Puis comme F est un espace vectoriel, $x = \frac{2\|x\|}{r}y \in F$.
 Ainsi $F = E$.
- Supposons que $\overset{\circ}{F} \neq \emptyset$. Il existe donc $x_0 \in F$ et $r > 0$ tel que $B(x_0, r) \subset F$. Soit $x \in E \setminus \{0\}$.
 $y = x_0 + \frac{r}{2\|x\|}x \in B(x_0, r)$ donc comme F est un espace vectoriel et comme $x_0 \in F$,
 $x = \frac{2\|x\|}{r}(y - x_0) \in F$.
 Ainsi $\overset{\circ}{F} = E$.

XIII.8.10 Adhérence d'un sev

[Enoncé]

- $F \subset \overline{F}$ donc $0 \in \overline{F}$. Fixons $x, y \in \overline{F}$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.
 Il existe des suites $(x_n), (y_n) \in F^{\mathbb{N}}$ qui convergent respectivement vers x et y .
 Alors comme F est un espace vectoriel $(x_n + \lambda y_n) \in F^{\mathbb{N}}$. De plus, $x_n + \lambda y_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x + \lambda y$.
 Donc $x + \lambda y \in \overline{F}$.
 On en déduit que \overline{F} est un sous-espace vectoriel de E .
- 1^{ère} méthode :
 Soit $(x_n) \in F^{\mathbb{N}}$ une suite qui converge vers $x \in E$. Puisque (x_n) converge, elle est bornée.
 Il existe donc $M > 0$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $x_n \in B_f(0, M)$. Alors (x_n) est une suite de $K := F \cap B_f(0, M)$ qui est un fermé relatif à F borné. Comme F est de dimension finie, K est compact et donc (x_n) admet une valeur d'adhérence dans K , a fortiori dans F .
 x étant la seule valeur d'adhérence de (x_n) , on en déduit que $x \in F$ puis que F est fermé.

2nd méthode :

Soit $(x_n) \in F^{\mathbb{N}}$ une suite qui converge vers $x \in E$. Fixons une base (e_1, \dots, e_d) de F . On la complète en une base $(e_i)_{i \in I}$ de E .

$\forall n \in \mathbb{N}$, $\exists a_1^n, \dots, a_d^n \in \mathbb{K}$, $x_n = \sum_{k=1}^d a_k^n e_k$. On note aussi $x = \sum_{j \in J} a_j e_j$ où J est une sous-famille finie de I .

Comme (x_n) converge vers x dans E , il y a convergence coordonnées par coordonnées.

Alors $\forall j \in J \setminus \llbracket 1; d \rrbracket$, $a_j = \lim_{n \rightarrow +\infty} 0 = 0$. Par conséquent $x = \sum_{j=1}^d a_j e_j \in F$.

Remarque : Cette preuve repose sur l'existence d'une base dans un espace vectoriel quelconque, ce qui se déduit du théorème de la base incomplète qui est équivalent à l'axiome du choix (ou plutôt au lemme de Zorn). La première preuve permet d'éviter de telles considérations.

3^{ème} méthode : (hors-programme)

On montre qu'un sous-espace vectoriel de dimension finie d'un espace vectoriel normé est complet et donc a fortiori fermé (cf. l'exo qui montre que \mathbb{R} est complet I.19 : je vais rajouter des questions pour arriver à ce résultat).

3. Soit $a \in E$ tel que $E = H \oplus \text{Vect}(a)$. Supposons que H n'est pas fermé dans E . Alors il existe une suite $(h_n) \in H^{\mathbb{N}}$ qui converge vers un élément $x \in E \setminus H$.

On sait alors qu'il existe un couple $(h, \lambda) \in H \times \mathbb{K}^*$ tel que $x = h + \lambda a$. Fixons $y = h' + \lambda' a \in E$.

$$y - \frac{\lambda'}{\lambda} x = h' - \frac{\lambda'}{\lambda} h \in H.$$

Ainsi $\lambda y = \lambda y - \lambda' x + \lambda' x = \lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda h' - \lambda' h + \lambda' h_n$ avec $\forall n \in \mathbb{N}, \lambda h' - \lambda' h + \lambda' h_n \in H$.

Ainsi $\lambda y \in \overline{H}$ et comme \overline{H} est un espace vectoriel et $\lambda \neq 0, y \in \overline{H}$.

Par conséquent $\overline{H} = E$ c'est-à-dire H est dense dans E .

XIII.8.11 Graphe fermé

[\[Enoncé\]](#)

1. Supposons f continue. Soit $(x_n, y_n) \in G^{\mathbb{N}}$ convergeant vers $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ i.e $x = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$ et $y = \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n$.
 $\forall n \in \mathbb{N}, y_n = f(x_n)$. Donc comme f est continue, $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$. Par unicité de la limite $y = f(x)$ i.e $(x, y) \in G$.

2. Supposons f bornée et G fermé. Soient $x \in \mathbb{R}$ et $(x_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ convergeant vers x .
 $(f(x_n))$ est une suite bornée de \mathbb{R} , d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass elle admet une sous-suite $f(x_{\varphi(n)})$ convergente. On note ℓ sa limite.
 $((x_{\varphi(n)}, f(x_{\varphi(n)}))$ est une suite convergente de G , sa limite est donc dans G . Par conséquent $(x, \ell) \in G$, c'est-à-dire $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_{\varphi(n)}) = \ell = f(x)$.

Ainsi f est continue.

3. La fonction $f : x \mapsto \begin{cases} \frac{1}{|x|} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ fournit un contre-exemple.

En effet, si $\left(x_n, \frac{1}{|x_n|}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} (x, y) \in \mathbb{R}^2$ alors :

- Si $x \neq 0$ on se retrouve dans le cas de la question 1 et $y = \frac{1}{|x|}$;
- Si $x = 0$ alors $y = +\infty$ ce qui est absurde.

Par conséquent le graphe de f est fermé, pourtant f n'est pas continue en 0.

XIII.8.12 Application linéaire continue

[Enoncé]

- On pose $\varphi : f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}) \mapsto f(1)$.
 $\forall f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}), |\varphi(f)| \leq \|f\|_\infty$ donc $\varphi \in E^*$.
 Pourtant, pour $f_n : x \mapsto x^n$, $\frac{\|f_n\|_1}{|\varphi(f_n)|} = \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Donc $\varphi \notin F^*$.
- On montre aisément que :

$$\|f\|_1 \leq \|f\|_\infty$$

Ainsi pour une application φ continue sur F , on a :

$$\exists C \in \mathbb{R}_+, \forall f \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R}), |\varphi(f)| \leq C\|f\|_1 \leq C\|f\|_\infty$$

Et donc φ est continue sur E .

XIII.8.13 Application linéaire non continue

[Enoncé]

Oui : On considère l'opérateur de dérivation $D : f \in E \mapsto f'$ et la suite des fonctions $f_n : x \mapsto e^{nx}$. On remarque alors que $D(f_n) = nf_n$

Si N est une norme sur E alors $\frac{N(D(f_n))}{N(f_n)} = n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$. Donc D n'est pas continue sur (E, N) .

XIII.8.14 Polynômes réels de degré n scindés à racines simples sur \mathbb{R} ★★☆☆

[Enoncé]

- Soit $P = \Lambda \prod_{i=1}^n (X - x_i) \in A$ avec $x_1 < \dots < x_n$. On fixe $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ telle que,

$$a_0 < x_1 < a_1 < x_2 < \dots < a_{n-1} < x_n < a_n$$

On pose l'application $\psi : \begin{cases} \mathbb{R}_n[X] & \longrightarrow \mathbb{R}^{n+1} \\ P & \longmapsto (P(a_0), \dots, P(a_n)) \end{cases}$.

D'après le TVI, $\forall i \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket$, $P(a_i)P(a_{i+1}) < 0$.

Ainsi, $P \in U = \psi^{-1} \left(\prod_{i=0}^n (-1)^i \mathbb{R}_+^* \right) \cup \psi^{-1} \left(\prod_{i=0}^n (-1)^{i+1} \mathbb{R}_+^* \right)$.

$\prod_{i=0}^n (-1)^i \mathbb{R}_+^*$ et $\prod_{i=0}^n (-1)^{i+1} \mathbb{R}_+^*$ sont des ouverts de \mathbb{R}^{n+1} et ψ est continue car linéaire sur $\mathbb{R}_n[X]$ qui est de dimension finie, donc U est un ouvert de $\mathbb{R}_n[X]$.

Enfin, un polynôme de U est dans A car il est de degré inférieur à n et change $n+1$ fois de signe.

On a donc montré que de tout polynôme de A on peut construire un ouvert inclus dans A et contenant ce polynôme : A est ouvert.

2. On va montrer que l'adhérence de A est l'ensemble S des polynômes de degré n scindés sur \mathbb{R} .

Fixons $P = \Lambda \prod_{i=1}^n (X - x_i) \in S$. (Les x_i sont donc potentiellement égaux).

Posons pour tout $k \in \mathbb{N}$, $P_k = \Lambda \prod_{i=1}^n (X - y_{k,i})$ avec $\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $y_{k,i} = x_i - \frac{1}{k+i}$.

Soient $k \in \mathbb{N}$ et $i, j \in \llbracket 1; n \rrbracket$ distincts.

Si $x_i = x_j$ alors $y_{k,i} \neq y_{k,j}$.

Sinon, $|y_{k,i} - y_{k,j}| = \left| x_i - x_j - \left(\frac{1}{k+j} - \frac{1}{k+i} \right) \right| \geq \left| |x_i - x_j| - \left| \frac{1}{k+j} - \frac{1}{k+i} \right| \right| = \left| |x_i - x_j| - \frac{|i-j|}{(k+j)(k+i)} \right|$.

Or $\text{APCR} \left(k \geq \sqrt{\frac{|i-j|}{|x_i - x_j|}} - \min(i, j) \right), |x_i - x_j| > \frac{|i-j|}{(k+j)(k+i)}$ d'où $\left| |x_i - x_j| - \frac{|i-j|}{(k+j)(k+i)} \right|$.

Ainsi, $P_k \in A$.

Comme $P_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} P$, on a $P \in \overline{A}$ puis $S \subset \overline{A}$.

Il reste à montrer que S est fermé.

On rappelle que $\mathbb{R}_n[X]$ est fermé en tant que sous-espace vectoriel de dimension finie.

On se donne une suite $(Q_k) = \left(\Lambda_k \prod_{i=1}^n (X - z_{k,i}) \right) \in S^{\mathbb{N}}$ qui converge vers un polynôme

$Q = \Lambda \prod_{i=1}^n (X - z_i) \in \mathbb{R}_n[X]$ avec z_1, \dots, z_n des complexes. On travaillera ici avec la norme

uniforme afin que la suite de fonction polynomiale associée à (Q_k) converge uniformément, et a fortiori simplement, vers la fonction polynomiale associée à Q .

Tout d'abord, chacun des coefficients de Q est limite des coefficients de (Q_k) donc $\Lambda_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} \Lambda$.

Montrons ensuite que si P est dans S de coefficient dominant μ , alors $\forall \omega \in \mathbb{C}$, $|P(\omega)| \geq |\mu| |\text{Im}(\omega)|^n$.

Soient $P = \mu \prod_{i=1}^n (X - \omega_i) \in S$ et $\omega \in \mathbb{C}$.

$$|P(\omega)| = |\mu| \prod_{i=1}^n |\omega - \omega_i| \geq |\mu| \prod_{i=1}^n \operatorname{Im}(\omega - \omega_i).$$

Or $\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, \omega_i \in \mathbb{R} \implies \operatorname{Im}(\omega - \omega_i) = \operatorname{Im}(\omega).$

Ainsi, $|P(\omega)| \geq |\mu| \prod_{i=1}^n \operatorname{Im}(\omega) = |\mu| |\operatorname{Im}(\omega)|^n.$

On peut alors écrire, $\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, \forall k \in \mathbb{N}, |Q_k(z_i)| \geq |\Lambda_k| |\operatorname{Im}(z_i)|^n.$

d'où en passant à la limite, $\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, 0 = |Q(z_i)| \geq |\Lambda| |\operatorname{Im}(z_i)|^n.$

Λ étant non nul en tant que coefficient dominant, on sait alors que $\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, \operatorname{Im}(z_i) = 0$ ou encore que $\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, z_i \in \mathbb{R}$ ou encore que $Q \in S.$

Finalement $\overline{A} = S.$

XIII.8.15 Lemme de Riemann-Lebesgue ★★ ★

[Enoncé]

— Posons (x_0, \dots, x_n) une subdivision de $[a, b]$ adaptée à ϕ , c'est à dire telle que $x_0 = a < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ et que ϕ soit constante sur les intervalles $]x_k, x_{k+1}[$ pour $k \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket.$ On note $\alpha_k = \phi(x_k).$

$$\left| \int_a^b e^{i\lambda t} \phi(t) dt \right| = \left| \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} e^{i\lambda t} \phi(t) dt \right| = \left| \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} e^{i\lambda t} \alpha_k dt \right| = \left| \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\alpha_k (e^{i\lambda x_{k+1}} - e^{i\lambda x_k})}{i\lambda} \right| \leq \sum_{k=0}^{n-1} \frac{2|\alpha_k|}{\lambda} \xrightarrow{\lambda \rightarrow +\infty} 0.$$

— ϕ est limite uniforme d'une suite de fonctions en escaliers $(\phi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur $[a, b]$:

Posons $I_n : \lambda \mapsto \int_a^b \phi_n(t) e^{i\lambda t} dt$ et $I : \lambda \mapsto \int_a^b \phi(t) e^{i\lambda t} dt.$

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall \lambda \in \mathbb{R}, |I(\lambda) - I_n(\lambda)| \leq \int_a^b |\phi(t) - \phi_n(t)| \cdot |e^{i\lambda t}| dt \leq (b-a) \|\phi - \phi_n\|_{\infty, [a, b]}.$$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}, \|I - I_n\|_{\infty, \mathbb{R}} \leq (b-a) \|\phi - \phi_n\|_{\infty, [a, b]}.$ D'où $\|I - I_n\|_{\infty, \mathbb{R}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et

$(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers I sur $\mathbb{R}.$

Ainsi d'après le théorème de la double limite :

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} I(\lambda) = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n(\lambda) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} I_n(\lambda) = \lim_{n \rightarrow +\infty} 0 = 0$$

— Soit $\varepsilon > 0.$ Puisque ϕ est intégrable sur $\mathbb{R},$ les intégrales $\int_0^{+\infty} \|\phi(t)\| dt$ et $\int_{-\infty}^0 \|\phi(t)\| dt$ convergent.

Donc $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_b^{+\infty} \|\phi(t)\| dt = 0$ et $\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_{-\infty}^a \|\phi(t)\| dt = 0.$

Ainsi, $\exists (a, b) \in \mathbb{R}^2, a < b \wedge \int_b^{+\infty} \|\phi(t)\| dt < \frac{\varepsilon}{3} \wedge \int_{-\infty}^a \|\phi(t)\| dt < \frac{\varepsilon}{3}.$

Aussi, d'après la question précédente, $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \left| \int_a^b \phi(t) e^{i\lambda t} dt \right| = 0$.

Donc $\exists \lambda_0 \in \mathbb{R}, \forall \lambda > \lambda_0, \left| \int_a^b \phi(t) e^{i\lambda t} dt \right| < \frac{\varepsilon}{3}$.

Finalement,

$$\begin{aligned} \forall \lambda > \lambda_0, \left| \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(t) e^{i\lambda t} dt \right| &\leq \left| \int_{-\infty}^a \phi(t) e^{i\lambda t} dt \right| + \left| \int_a^b \phi(t) e^{i\lambda t} dt \right| + \left| \int_b^{+\infty} \phi(t) e^{i\lambda t} dt \right| \\ &< \int_b^{+\infty} \|\phi(t)\| dt + \frac{\varepsilon}{3} + \int_{-\infty}^a \|\phi(t)\| dt \\ &< \varepsilon \end{aligned}$$

C'est à dire $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(t) e^{i\lambda t} dt = 0$.

XIII.8.16 Borel-Lebesgue

[\[Enoncé\]](#)

Par souci de facilité, on raccourcira Borel-Lebesgue par BL et Bolzano-Weierstrass par BW. Montrons que BL-compact implique BW-compact.

Supposons que E est BL-compact.

Soit (x_n) une suite de E .

Supposons que (x_n) n'a pas de valeur d'adhérence.

Alors pour tout $y \in E$, il existe un ouvert de E , U_y qui contient y tel que

$$\{k, x_k \in U_y\} \text{ est fini}$$

La famille (U_y) est un recouvrement de E donc il existe une famille finie (y_1, \dots, y_p) tel que :

$$\bigcup_{i=1}^p U_{y_i} = E$$

donc

$$\{k, x_k \in E\} \text{ est fini}$$

ce qui est absurde.

Réciproquement montrons que BW-compact implique BL-compact.

Supposons que E est BW-compact.

On pose $d(x, y) = \|x - y\|$ pour tout $(x, y) \in E^2$. Soit $(U_i)_{i \in I}$ un recouvrement de E par des ouverts.

On a la proposition suivante :

$$\exists r > 0 \text{ tel que } \forall x \in E, \exists i_x \text{ tel que } B(x, r) \subset U_{i_x}$$

En effet, si ce n'est pas le cas, il existe $(x_n) \in E^{\mathbb{N}}$ tel que pour tout $i \in I$, $B(x, \frac{1}{n}) \not\subset U_i$.
 Passant à une sous-suite $x_{\varphi(n)}$, on a que :

$$x_{\varphi(n)} \rightarrow x$$

Or il existe $i \in I$ tel que $x \in U_i$ donc il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B(x, \varepsilon) \subset U_i$ car U_i est un ouvert. Soit $n \in \mathbb{N}$,

$$d(x, x_{\varphi(n)}) + \frac{1}{\varphi(n)} < \varepsilon$$

de sorte que

$$B\left(x_{\varphi(n)}, \frac{1}{\varphi(n)}\right) \subset B(x, \varepsilon) \subset U_i$$

ce qui est absurde. Il suffit de montrer que le recouvrement $E = \bigcup_{x \in E} B(x, r)$ admet un sous-recouvrement fini.

En effet, s'il existe $x_1, \dots, x_n \in E$ tels que $E = \bigcup_{i=1}^n B(x_i, r)$ alors pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $\exists j_i \in I$, $B(x_i, r) \supset U_{j_i}$ donc $\bigcup_{i=1}^n U_{j_i} = E$.

S'il n'existe pas de sous-recouvrement fini de $E \bigcup_{i=1}^n B(x_i, r)$, on peut construire récursivement une suite (x_n) comme suit :

- i. x_0 un point quelconque de E
- ii. $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \notin \bigcap_{i=1}^{n-1} B(x_i, r)$

l'existence de x_n est garantie si E ne peut pas être recouvert par des boules de rayon r .

Ainsi :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall m < n, d(x_m, x_n) > r$$

Donc la suite (x_n) n'a pas de sous-suite de Cauchy, ce qui est impossible car E est BW-compact.

XIII.8.17 Parties compactes d'un espace vectoriel normé de dimension finie

[\[Énoncé\]](#)

1. Soit $K \subset E$ une partie compacte. Soit $(x_n) \in K^{\mathbb{N}}$ qui converge vers $x \in E$.
 Comme K est compacte, la suite (x_n) admet une valeur d'adhérence dans K . Par ailleurs (x_n) converge vers x donc sa seule valeur d'adhérence est x . On en déduit que $x \in K$ et donc que K est fermée.
2. Soient $F \subset K \subset E$ avec F fermée et K compacte. Soit $(x_n) \in F^{\mathbb{N}}$.
 $(x_n) \in K^{\mathbb{N}}$ donc comme K est compacte, il existe une sous-suite (y_n) de (x_n) qui converge dans K . Or $(y_n) \in F^{\mathbb{N}}$ donc comme F est fermée, (y_n) converge dans F .
 Ainsi F est compacte.

3. Montrons que le produit cartésien de deux compacts de E est compact. On procédera ensuite par récurrence sur le nombre de compacts dans le produit.

Soit K_1, K_2 deux compacts de E . Soit (u_n, v_n) une suite de vecteurs de $K_1 \times K_2$.

Comme K_1 est compact, il existe une extractrice φ telle que $(u_{\varphi(n)})$ converge dans K_1 . Alors $(v_{\varphi(n)}) \in K_2^{\mathbb{N}}$ donc comme K_2 est compact, il existe une extractrice ψ telle que $(v_{\varphi \circ \psi(n)})$ converge dans K_2 . Alors $(u_{\varphi \circ \psi(n)})$ converge en tant que sous-suite d'une suite convergente. De plus sa limite est dans K_1 . On conclut que $(u_{\varphi \circ \psi(n)}, v_{\varphi \circ \psi(n)})$ converge dans $K_1 \times K_2$.

Ainsi $K_1 \times K_2$ est compact.

Supposons que tout produit cartésien de p compacts de E est un compact de E . Fixons

K_1, \dots, K_{p+1} des compacts de E . Alors par hypothèse de récurrence $\prod_{i=1}^p K_i$ est compact.

Puis par ce que l'on vient de démontrer, $\left(\prod_{i=1}^p K_i\right) \times K_{p+1} = \prod_{i=1}^{p+1} K_i$ est compact.

4. C'est le théorème de Bolzano-Weierstrass (on peut mettre un lien à l'exo qui le démontre).
5. On fixe une base (e_1, \dots, e_d) de E .

On dispose d'un isomorphisme $f : E \rightarrow \mathbb{R}^d$. Comme E et \mathbb{R}^d sont de dimensions finies, f et f^{-1} sont continues. On sait de plus que l'image directe d'une partie compacte/bornée par une application continue est une partie compacte/bornée et que l'image réciproque d'une partie fermée par une application continue est fermée. Ainsi une partie A de E est compacte/fermée/bornée ssi $f(A)$ est compacte/fermée/bornée dans \mathbb{R}^d . Il suffit donc de montrer le résultat dans \mathbb{R}^d .

Soit K un compact de \mathbb{R}^d . D'après la question 1, K est fermé dans \mathbb{R}^d . Supposons par l'absurde que K n'est pas bornée.

Alors il existe une suite $(x_n) \in K^{\mathbb{N}}$ telle que $\|x_n\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$. K est compact donc il existe une sous-suite (y_n) de (x_n) qui converge. Mais alors par continuité de $\|\cdot\|$ qui est 1-lipschitzienne, $(\|y_n\|)$ converge. Par ailleurs $\|y_n\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ comme suite extraite de $(\|x_n\|)$. Ceci est absurde d'où K est bornée.

Réciproquement, soit K une partie fermée bornée de \mathbb{R}^d . On rappelle que toutes les normes de \mathbb{R}^n sont équivalentes, donc K est bornée pour la norme uniforme; càd qu'il existe $M \geq 0$ tel que $K \subset \{x \in \mathbb{R}^d, \|x\|_{\infty} \leq M\} = [-M, M]^d$. Or d'après les questions 3 et 4 $[-M, M]^d$ est un compact de \mathbb{R}^d . Enfin K est fermée donc d'après la question 2, K est compacte.

XIII.8.18 Somme de sous-espaces

[\[Enoncé\]](#)

1. Soient A, B des compacts de E . On munit E^2 de la norme $\|\cdot\|_1 : (a, b) \mapsto \|a\| + \|b\|$.

L'application

$$s : \begin{cases} E^2 & \longrightarrow E \\ (a, b) & \longmapsto a + b \end{cases}$$

est linéaire et de plus, $\forall (a, b) \in E^2$, $\|s(a, b)\| \leq \|(a, b)\|_1$. Donc s est continue. On sait que $A \times B$ est compact dans E^2 comme produit de compacts donc $s(A \times B) = A + B$ est compact dans E .

2. Soient K un compact et F un fermé de E . Fixons $(z_n) \in (K + F)^{\mathbb{N}}$ une suite convergente de limite $z \in E$.

$\forall n \in \mathbb{N}$, $\exists (k_n, f_n) \in K \times F$, $z_n = k_n + f_n$. Comme K est compact, on peut extraire de k_n une suite $(k_{\varphi(n)})$ convergente. On note k sa limite.

Alors par différence $f_{\varphi(n)} = z_{\varphi(n)} - k_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} z - k := f$. De surcroît F est fermé donc $f \in F$. Ainsi $z = k + f$ avec $(k, f) \in K \times F$.

On conclut que $K + F$ est fermé dans E .

3. On ne peut pas assurer que la somme de deux fermés est fermée :

- Dans $E = \mathbb{R}^2$ pour $F_1 = \mathbb{R} \times \{0\}$ et $F_2 = f^{-1}([1, +\infty[)$ avec $f : (x, y) \mapsto xy$, $F_1 + F_2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ n'est pas fermé.
- Dans $E = \mathbb{R}$ on peut prendre $F_1 = \mathbb{Z}$ et $F_2 = \pi\mathbb{Z}$. On montre classiquement (cf. sous-groupes de \mathbb{R}) que $\overline{F_1 + F_2} = \mathbb{R}$.

XIII.8.19 Un théorème du point fixe

[Enoncé]

1. On considère $g : x \mapsto \|f(x) - x\|$. On remarque que f est continue (cela découle directement de la propriété que vérifie f) donc g est continue par composition de fonctions continues. K est compact donc g atteint son minimum sur K . Notons a qui réalise ce minimum. Supposons $f(a) \neq a$.

Alors $g(f(a)) \|f^2(a) - f(a)\| < \|f(a) - a\| = g(a)$ ce qui est absurde. Ainsi $f(a) = a$.

Montrons l'unicité. Soit $b \neq a$ tel que $f(b) = b$.

Alors $\|b - a\| = \|f(b) - f(a)\| < \|b - a\|$ ce qui est absurde. Donc $b = a$.

2. On note pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_n = f^n(x_0)$.

$$\forall n \in \mathbb{N}, \|x_{n+1} - a\| = \|f(x_n) - f(a)\| \leq \|x_n - a\|$$

La suite $(\|x_n - a\|)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et minorée (par 0), d'après le théorème de la limite monotone elle converge vers un réel ℓ . Or la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est à valeurs dans K qui est compact, on peut donc en extraire une suite $(x_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge vers un vecteur $x \in K$. Par continuité de f , $x_{\varphi(n)+1} = f(x_{\varphi(n)}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$.

On sait que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|x_{\varphi(n)} - a\| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \|x_{\varphi(n)+1} - a\| = \|\ell - a\|$. Par ailleurs, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|x_{\varphi(n)} - a\| = \|x - a\|$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|x_{\varphi(n)+1} - a\| = \|f(x) - a\|$. Par unicité de la limite, $\|x - a\| = \|f(x) - a\| = \|f(x) - f(a)\|$. Donc $x = a$.

On a montré que la seule valeur d'adhérence de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est a , càd $\lim_{n \rightarrow +\infty} f^n(x_0) = a$.

XIII.8.20 Théorème de Heine

[Enoncé]

Soient $(E, \|\cdot\|_E)$, $(F, \|\cdot\|_F)$ deux espaces vectoriels normés, K un compact de E et $f : K \rightarrow F$ continue. Fixons $\varepsilon > 0$.

1^{ère} méthode :

On note $d_E : (x, y) \in E^2 \mapsto \|x - y\|_E$ et $d_F : (x, y) \in F^2 \mapsto \|x - y\|_F$ ainsi que $X = \{(x, y) \in K^2, d_F(f(x), f(y)) \geq \varepsilon\}$. On vérifie que d_E et d_F sont 1-lipschitziennes et donc continues. On en déduit que $g : (x, y) \in E^2 \mapsto d_F(f(x), f(y))$ est continue.

$X = g^{-1}([\varepsilon, +\infty[)$ est fermé dans K^2 qui est compact, c'est donc un compact. Ainsi d_E est minorée sur X et atteint sa borne inférieure sur X . On note η cette borne inférieure. Fixons $(x, y) \in K^2$ tels que $\|x - y\|_E < \eta$.

Par définition de η , $(x, y) \notin X$ alors $\|f(x) - f(y)\|_F = d_F(f(x), f(y)) < \varepsilon$.

Ainsi f est uniformément continue.

2^{ème} méthode :

On raisonne par contraposée. Supposons que f n'est pas uniformément continue. Alors :

$$\exists \varepsilon > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*, \exists (x_n, y_n) \in K^2, \left(\|x_n - y_n\|_E \leq \frac{1}{n} \wedge \|f(x_n) - f(y_n)\|_F \geq \varepsilon \right)$$

Comme K est compact on peut extraire une suite $(x_{\varphi(n)})$ qui converge vers un vecteur $x \in K$. Mais alors $\forall n \in \mathbb{N}^*, \|x - y_{\varphi(n)}\|_E \leq \|x - x_{\varphi(n)}\|_E + \|x_{\varphi(n)} - y_{\varphi(n)}\|_E \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Autrement dit $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_{\varphi(n)} = x$. Pourtant $(f(y_{\varphi(n)}))_{n \in \mathbb{N}^*}$ ne converge pas vers $f(x)$ puisque APCR,

$$\|f(x) - f(y_{\varphi(n)})\|_F \geq \|f(x_{\varphi(n)}) - f(y_{\varphi(n)})\|_F - \|f(x) - f(x_{\varphi(n)})\|_F \geq \frac{\varepsilon}{2}$$

XIII.8.21 Lemme des compacts emboîtés ★

[Enoncé]

$\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in K_n$. De plus, $\forall n \in \mathbb{N}, K_{n+1} \subset K_n \subset K_0$.

Donc $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est à valeurs dans K_0 qui est compact.

Ainsi il existe $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $(x_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ converge. On note x sa limite.

On va montrer que $x \in K$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \varphi(n_0) \geq n$.

La suite $(x_{\varphi(k)})_{k \geq n_0}$ est à valeur dans $K_n \supset K_{\varphi(n_0)}$ qui est un fermé. Ainsi sa limite $x \in K_n$

puis, $x \in K = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n$.

XIII.8.22 Théorème de Baire ★★★★★

[Enoncé]

1. Soit $(\Omega_n) \in E^{\mathbb{N}^*}$ une suite d'ouverts denses dans E .

Soit V un ouvert non vide de E . On va montrer que $V \cap \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} \Omega_n \neq \emptyset$.

Ω_1 et V sont ouverts donc $V \cap \Omega_1$ est ouvert comme intersection finie d'ouvert. De plus Ω_1 est dense dans E donc $V \cap \Omega_1 \neq \emptyset$.

Alors, $\exists x_1 \in V \cap \Omega_1$ et $\exists \varepsilon_1 \in \mathbb{R}_+^*$, $B(x_1, \varepsilon_1) \subset V \cap \Omega_1$.

Et alors, $\exists r_1 = \frac{\varepsilon_1}{2} \in \mathbb{R}_+^*$, $B_f(x_1, r_1) \subset V \cap \Omega_1$. Quitte à prendre plus petit on peut supposer $r_1 \leq 1$.

On va alors construire par récurrence des suites $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(r_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ telles que :

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}^*, r_n \leq \frac{1}{n} \\ \forall n \in \mathbb{[2; +\infty[}, B_f(x_n, r_n) \subset U_n = \Omega_n \cap B(x_{n-1}, r_{n-1}) \\ B_f(x_1, r_1) \subset \Omega_1 \cap V \end{cases}$$

Supposons que r_{n-1} est bien défini pour un certain entier $n \geq 2$.

$U_n = \Omega_n \cap B(x_{n-1}, r_{n-1})$ est ouvert comme intersection finie d'ouvert. De plus, Ω_n est dense dans E donc $U_n \neq \emptyset$.

Alors, $\exists x_n \in U_n$ et $\exists \varepsilon_n \in \mathbb{R}_+^*$, $B(x_n, \varepsilon_n) \subset U_n$.

Et alors, $\exists r_n = \frac{\varepsilon_n}{2} \in \mathbb{R}_+^*$, $B_f(x_n, r_n) \subset U_n$. Quitte à prendre plus petit on peut supposer $r_n \leq \frac{1}{n}$.

Montrons que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est de Cauchy.

Soit $k > n$ deux entiers non nuls.

Par définition, $x_k \in B(x_n, r_n)$ donc $\|x_n - x_k\| < r_n \leq \frac{1}{n}$. Ainsi, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est de Cauchy.

Or E est complet donc $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge. On note x sa limite.

Toujours par définition, $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall k \geq n, x_k \in B_f(x_n, r_n)$. Toutes ces boules sont des fermés donc par caractérisation séquentielle, $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} B_f(x_n, r_n)$.

Et donc, $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} \Omega_n$. et $x \in V$ car $x \in B_f(x_1, r_1)$.

Ainsi, $x \in V \cap \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} \Omega_n$.

2. Soit $(\Omega_n) \in E^{\mathbb{N}}$ une suite d'ouverts denses dans E .

Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, Ω_n^c le complémentaire dans E de Ω_n est fermé et $\overline{\Omega_n} = E$ d'où

$(\Omega_n^c) = (\overline{\Omega_n})^c = \emptyset$. Ainsi par passage au complémentaire,

$$\overline{\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \Omega_n} = E \iff \widehat{\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Omega_n^c} = \emptyset$$

\mathbb{R} n'est pas dénombrable

Base d'un espace de Banach ★★ ★

Soit E un espace de Banach. Supposons par l'absurde que E admette une base dénombrable $\mathcal{B} = (e_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

On pose pour $n \in \mathbb{N}$, $F_n = \text{Vect}(e_0, \dots, e_n)$. Fixons $n \in \mathbb{N}$.

F_n est un sous-espace vectoriel de E . Il est d'intérieur vide car c'est un sous-espace strict de E (cf. VIII.9) et il est fermé dans E car il est de dimension finie (cf. VIII.10).

On peut écrire $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ donc d'après le théorème de Baire on en déduit que E est d'intérieur vide ce qui est absurde.

Densité des fonctions nulle part dérivables (2) ★★ ★★

Notons $I = [0, 1]$ et $E = \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$.

1. Soit $f \in A^c$. Il existe alors un point $x \in I$ en lequel f est dérivable.

C'est à dire que la quantité $\frac{f(x) - f(y)}{x - y}$ admet une limite finie quand $y \rightarrow x$.

f étant continue sur I , la fonction $Y : \begin{cases} I \setminus \{x\} & \longrightarrow \mathbb{K} \\ y & \longmapsto \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \end{cases}$ est continue

sur $I \setminus \{x\}$ et prolongeable par continuité en x .

I étant un segment on en déduit que Y est bornée sur I . Ainsi $\exists N \in \mathbb{N}$, $N \geq \|f\|_\infty$ et donc $f \in F_N$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}$.

Soit $(f_k) \in F_n^\mathbb{N}$ qui converge (uniformément) vers $f \in E$.

$(*) : \forall k \in \mathbb{N}, \exists x_k \in I, \forall y \in I, |f_k(x_k) - f_k(y)| \leq n|x_k - y|$

$(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est une suite à valeur dans I qui est compact donc il existe une suite extraite $(x_{\varphi(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ qui converge. Notons x sa limite.

Soit $k \in \mathbb{N}$.

$$|f_{\varphi(k)}(x_{\varphi(k)}) - f(x)| \leq |f_{\varphi(k)}(x_{\varphi(k)}) - f(x_{\varphi(k)})| + |f(x_{\varphi(k)}) - f(x)| \leq \|f_{\varphi(k)} - f\|_\infty + |f(x_{\varphi(k)}) - f(x)|.$$

Or, $|f(x_{\varphi(k)}) - f(x)| \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 0$ par continuité de f et $\|f_{\varphi(k)} - f\|_\infty \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 0$ par convergence uniforme.

Donc $f_{\varphi(k)}(x_{\varphi(x_k)}) \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} f(x)$.

Par passage à la limite dans (*) on obtient directement $f \in F_n$.

3. Soit $n \in \mathbb{N}$.

D'après le théorème de Weierstrass, il existe une fonction polynomiale P telle que $\|f - P\|_\infty \leq \frac{\varepsilon}{2}$.

g_0 est continue et $\|g_N\|_\infty = \frac{\varepsilon}{4}$. On a $\|f - g\|_\infty \leq \|f - P\|_\infty + \|g_N\|_\infty \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{4} < \varepsilon$.

Ensuite, $\forall x, y \in I$, $|g(x) - g(y)| \geq |g_N(x) - g_N(y)| - |P(x) - P(y)|$.

De plus, $\forall x \in I$, $\exists k \in \llbracket 0; 2N - 1 \rrbracket$, $x \in \left[\frac{k}{2N}, \frac{k+1}{2N} \right]$.

Soit alors $y \in \left[\frac{k}{2N}, \frac{k+1}{2N} \right]$.

$|g_N(x) - g_N(y)| = \frac{\varepsilon N}{2} |x - y|$.

Aussi, par le théorème des accroissements finis, $|P(x) - P(y)| \leq \|P'\|_\infty |x - y|$.

Par conséquent, $\forall x \in I$, $\exists y \in I$, $|g(x) - g(y)| > \left(\frac{\varepsilon N}{2} - \|P'\|_\infty \right) |x - y|$.

Il suffit alors de prendre $N \geq \frac{2}{\varepsilon} (n + \|P'\|_\infty)$ pour obtenir $g \in F_n$.

4. On montré que $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de fermé d'intérieur vide de E . D'après le théorème de Baire, $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ est donc d'intérieur vide.

Mais alors d'après la question 1, $\hat{A}^c \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \hat{F}_n = \emptyset$ d'où $\hat{A}^c = \emptyset$ c'est à dire A est dense dans E .

Caractérisation des endomorphismes continus nilpotents dans un espace de Banach ★★

1. Posons pour $n \in \mathbb{N}^*$, $F_n = \{x \in E, f^n(x) = 0\}$. F_n est fermé.

$\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} F_n = E$. Donc d'après le théorème de Baire il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que $\mathring{F}_N \neq \emptyset$. On dispose donc d'un vecteur $a \in E$ et d'un réel $r > 0$ tel que $B_f(a, r) \subset F_N$.

$\forall x \in E \setminus \{0\}$, $f^N(x) = \frac{\|x\|}{r} \left[f^N \left(a + \frac{x}{\|x\|} r \right) - f^N(a) \right] = 0$.

Donc f est nilpotent.

Remarque : On pourra noter que dans un espace de dimension finie les hypothèses de continuité et de complétude sont automatiquement vérifiées.

2. On note $E = \mathbb{R}[X]$. Posons $D \in \mathcal{L}(E)$ l'endomorphisme de dérivation. Pour $P \in E$ on pose $N(P) = \sum_{n=0}^{+\infty} |P^{(n)}(0)|$.

Vérifions que N est une norme sur E . On fixe $P, Q \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Tout d'abord, N est bien une application de E dans \mathbb{R}_+ pour tout $P \in E$ la suite $(P^{(n)}(0))_{n \in \mathbb{N}}$ est nulle au moins à partir du rang $\deg P + 1$. Ensuite,

- $N(\lambda P) = \sum_{n=0}^{\deg P+1} |\lambda P^{(n)}(0)| = |\lambda| N(P).$
- $N(P+Q) = \sum_{n=0}^{\deg(P+Q)+1} |P^{(n)}(0)+Q^{(n)}(0)| \leq \sum_{n=0}^{\deg(P+Q)+1} |P^{(n)}(0)| + \sum_{n=0}^{\deg(P+Q)+1} |Q^{(n)}(0)| \leq N(P) + N(Q).$
- Si $N(P) = 0$ alors comme $\forall n \in \mathbb{N}, |P^{(n)}(0)| \geq 0$, on sait que $\forall n \in \mathbb{N}, |P^{(n)}(0)| = P^{(n)}(0) = 0.$

Ainsi d'après la formule de Taylor, $P = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{P^{(n)}(0)}{n!} X^n = 0.$

De plus, D est continue pour cette norme. En effet, $\forall P \in E, N(D(P)) = \sum_{n=1}^{+\infty} |P^{(n)}(0)| \leq N(P).$

D n'est pas nilpotent : D^n n'est pas nul puisque $\text{Ker}(D^n) = \mathbb{R}_{n-1}[X] \neq E$. Pourtant $\forall P \in E, D^{\deg P+1}(P) = 0.$

Caractérisation des polynômes réels ★★★★★

XIII.8.23 Volume d'une (hyper)boule ★★★

[\[Énoncé\]](#)

1. $n \in \mathbb{N}^*.$

Tout d'abord, en posant le changement de variable $y_i = \frac{x_i}{R}$ pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$,

$V_n(R) = \int \cdots \int_{(y_1, \dots, y_n) \in \mathcal{B}_n(1)} (R dy_1) \dots (R dy_n) = R^n V_n(1).$ Il suffit donc de déterminer $V_n(1) := V_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*.$

$\forall (x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathcal{B}_{n+1}(1) \iff (-1 \leq x_{n+1} \leq 1 \wedge (x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{B}_n(\sqrt{1-x_{n+1}^2}))$

Donc $V_{n+1} = \int_{-1}^1 \left(\int \cdots \int_{(x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{B}_n(\sqrt{1-x_{n+1}^2})} dx_1 \dots dx_n \right) dx_{n+1} = \int_{-1}^1 V_n(\sqrt{1-x_{n+1}^2}) dx_{n+1}$

Et donc $V_{n+1} = \int_{-1}^1 (\sqrt{1-x^2})^n V_n dx = 2V_n \int_0^1 (\sqrt{1-x^2})^n dx.$

Posons $x = \cos(\theta) : (*)$.

$\int_0^1 (\sqrt{1-x^2})^n dx = \int_0^{\pi/2} (\sqrt{1-\cos^2(\theta)})^n \sin(\theta) d\theta = \int_0^{\pi/2} \sin^{n+1}(\theta) d\theta.$

On reconnaît l'intégrale de Wallis et on montre alors classiquement que :

$$- \int_0^1 (\sqrt{1-x^2})^{2m} dx = \frac{2^{2m}(m!)^2}{(2m+1)!}$$

$$- \int_0^1 (\sqrt{1-x^2})^{2m-1} dx = \frac{(2m)!}{2^{2m}(m!)^2} \cdot \frac{\pi}{2}$$

Montrons par récurrence que pour tout entier naturel non nul n ,

$$V_n = \begin{cases} \frac{\pi^m}{m!} & \text{si } n = 2m \\ \frac{2^{2m+1}m!}{(2m+1)!} \pi^m & \text{si } n = 2m+1 \end{cases}$$

Pour $n = 1$:

$$V_1 = \int_{-1}^1 dx = 2 = \frac{2^1 \pi^0}{1!}.$$

Supposons le résultat vrai pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$.

Si n est pair alors on écrit $n = 2m$.

D'après (*) on sait que $V_{n+1} = 2V_{2m} \frac{2^{2m}(m!)^2}{(2m+1)!}$.

Par hypothèse de récurrence on a $V_{2m+1} = \frac{2^{2m+1}m!}{(2m+1)!} \pi^m$.

Et si n est impair alors on écrit $n = 2m-1$.

D'après (*) on sait que $V_{n+1} = 2V_{2m-1} \frac{(2m)!}{2^{2m}(m!)^2} \cdot \frac{\pi}{2}$.

Par hypothèse de récurrence on a $V_{2m} = \frac{\pi^m}{m!}$ ce qui conclut la récurrence.

$$\text{Finalement, } \forall n \in \mathbb{N}^*, V_n(R) = \begin{cases} \frac{\pi^m}{m!} R^{2m} & \text{si } n = 2m \\ \frac{2^{2m+1}m!}{(2m+1)!} \pi^m R^{2m+1} & \text{si } n = 2m+1 \end{cases}$$

Remarque : On retrouve les formules bien connus $V_1(R) = 2R$, $V_2(R) = \pi R^2$ et $V_3(R) = \frac{4}{3} \pi R^3$.

2. La formule de Stirling $n! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$ donne $\lim_{m \rightarrow +\infty} V_{2m}(R) = 0 = \lim_{m \rightarrow +\infty} V_{2m+1}(R)$.
Donc $V_n(R) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$.

Ce résultat montre que quand on augmente la dimension de l'espace, les boules ont tendances à se "contracter" en leur centre. Cela peut paraître surprenant car on pourrait penser que le volume ne fait qu'augmenter avec la dimension, comme il le fait pour des petites dimensions i.e celles auxquelles nous sommes habitués $n = 1, 2, 3$.

En fait le calcul donne pour la boule unité :

$$V_1 = 2, V_2 = \pi \approx 3,14, V_3 = \frac{4\pi}{3} \approx 4,19, V_4 = \frac{\pi^2}{2} \approx 4,93, V_5 = \frac{8\pi^2}{15} \approx 5,26, V_6 = \frac{\pi^3}{6} \approx 5,16.$$

À partir de $n = 6$ le volume ne cesse de décroître.

XIII.8.24 Partie fermée bornée non compacte ★★★

[Enoncé]

On se place dans l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}[X]$ que l'on muni de la norme uniforme $\left\| \sum_{n=0}^{+\infty} a_n X^n \right\|_{\infty} = \sup\{|a_n|, n \in \mathbb{N}\}$ et on va montrer que la boule unité fermé $B = B_f(0, 1)$ est fermée et bornée mais pas compacte dans E . (C'est un cas particulier du théorème de compacité de Riesz VIII.25)

Tout d'abord, B est évidemment fermée et bornée. Supposons par l'absurde que B est compacte.

$\forall n \in \mathbb{N}, \|X^n\|_{\infty} = 1$ donc $(X^n) \in B^{\mathbb{N}}$. Par conséquent il existe une suite extraite $(X^{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge.

Or, si $n \in \mathbb{N}$ alors $\varphi(n+1) > \varphi(n)$ d'où $\|X^{\varphi(n+1)} - X^{\varphi(n)}\|_{\infty} = 2$.

Pourtant, $X^{\varphi(n+1)} - X^{\varphi(n)} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$.

Ceci est absurde donc B n'est pas compacte.

(On a d'ailleurs montré que la sphère unité n'est pas compacte ce qui est plus fort).

XIII.8.25 Théorème de compacité de Riesz ★★★★★

[Enoncé]

1. a. $d(x, F) = \inf_{y \in F} \|x - y\|$.

$\forall y \in F, \|x - y\| \geq 0$. Alors par caractérisation séquentielle de la borne inférieure puis de l'adhérence,

$$d(x, F) = 0 \iff \exists (y_n) \in F^{\mathbb{N}}, \|x - y_n\| \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0 \iff \exists (y_n) \in F^{\mathbb{N}}, y_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} x \iff x \in \overline{F} = F.$$

Donc $d(x, F) > 0$.

- b. $2\delta > \delta = d(x, F)$ donc par définition de la borne inférieure $\exists v \in F, \|x - v\| \leq 2\delta$.
De plus comme $v \in F, \|x - v\| \geq d(x, F) > 0$.

- c. Soit $y \in F$.

$$\|u - y\| = \frac{\|x - v - \|x - v\|y\|}{\|x - v\|}.$$

Or $v + \|x - v\|y \in F$ donc $\|x - v - \|x - v\|y\| \geq \delta$.

Ainsi d'après la question précédente $\frac{1}{2}$ est un minorant de $\{\|x - y\|, y \in F\}$. On en

déduit que $d(u, F) \geq \frac{1}{2}$.

2. On suppose que E n'est pas de dimension finie. On peut alors se donner une suite $(e_n) \in E^{\mathbb{N}}$ libre.

Posons pour tout $n \in \mathbb{N}, F_n = \text{Vect}(e_0, \dots, e_n)$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. F_n est un sous-espace vectoriel de E de dimension finie donc d'après le cours c'est un fermé de E . De plus, $F_n \neq E$ car $e_{n+1} \notin F_n$ par liberté.

On peut donc à l'aide de la question 1 construire un vecteur $u_n \in B \cap F_{n+1}$ tel que $d(u_n, F_n) \geq \frac{1}{2}$. (On prend $u_n = \frac{e_{n+1} - v_n}{\|e_{n+1} - v_n\|}$ pour un certain $v_n \in F_n$)

Supposons par l'absurde que B est compacte. On peut alors extraire une suite $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge.

Mais alors $u_{\varphi(n+1)} - u_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Et de plus, $\forall n \in \mathbb{N}, \varphi(n+1) \geq \varphi(n) + 1$. Donc $\forall n \in \mathbb{N}, u_{\varphi(n)} \in F_{\varphi(n)+1} \subset F_{\varphi(n+1)}$.

On en déduit que $\forall n \in \mathbb{N}, \|u_{\varphi(n+1)} - u_{\varphi(n)}\| \geq d(u_{\varphi(n+1)}, F_{\varphi(n+1)}) \geq \frac{1}{2}$.

Ceci est absurde donc B n'est pas compacte.

XIII.8.26 Sphère et boule unité ★★

[Enoncé]

S est un fermé inclus dans B donc si B est fermée alors S l'est aussi.

Supposons que S soit compacte.

Donnons nous une suite $(x_n) \in B^{\mathbb{N}}$.

Si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est nulle APCR alors elle converge. Supposons maintenant que ce n'est pas le cas.

On peut donc extraire une suite $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dont tous les termes sont non nuls.

Considérons la suite $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $\forall n \in \mathbb{N}, z_n = \frac{y_n}{\|y_n\|}$.

La suite $(\|y_n\|)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite réelle bornée (par 1) donc d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe une suite extraite $(\|y_{\varphi(n)}\|)_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge.

Comme $z_{\varphi(n)} \in S^{\mathbb{N}}$, on peut extraire une suite $(z_{\varphi \circ \psi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge. Mais alors on sait que $(\|y_{\varphi \circ \psi(n)}\|)_{n \in \mathbb{N}}$ converge comme suite extraite de $(\|y_{\varphi(n)}\|)_{n \in \mathbb{N}}$. Ainsi par produit, la suite $(y_{\varphi \circ \psi(n)})_{n \in \mathbb{N}} = (\|y_{\varphi \circ \psi(n)}\| z_{\varphi \circ \psi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

Ainsi, B est compacte par caractérisation séquentielle.

XIII.8.27 Principe du maximum pour les polynômes

[Enoncé]

XIII.8.28 Applications 1-lipschitziennes surjectives sur un compact

[Enoncé]

XIII.8.29 Une isométrie conserve les milieux

[Enoncé]

XIII.8.30 Fonctions coercives[\[Enoncé\]](#)**XIII.8.31 Homéomorphisme de compacts**[\[Enoncé\]](#)**XIII.8.32 Distance à un fermé**[\[Enoncé\]](#)**XIII.8.33 Diamètre et frontière**[\[Enoncé\]](#)**XIII.8.34 Frontière**[\[Enoncé\]](#)

On sait que $\text{Fr}(F)$ est un fermé donc $\text{Fr}(F) = \overline{\text{Fr}(F)}$. Montrons que $\text{Fr}(F)$ est d'intérieur vide.

Soit $x \in \text{Fr}(F)$.

Alors pour tout $r > 0$, la boule $B(x, r)$ contient des points de $\overset{\circ}{F}$ qui ne sont par conséquent pas dans $\text{Fr}(F)$.

Ainsi aucune boule n'est contenue dans $\text{Fr}(F)$, ce qui donne que :

$$\text{Fr}(\overset{\circ}{F}) = \emptyset$$

Ainsi, on a :

$$\text{Fr}(\text{Fr}(F)) = \overline{\text{Fr}(F)} \setminus \text{Fr}(\overset{\circ}{F}) = \text{Fr}(F)$$

Montrons que

XIII.8.35 Projeté sur un convexe compact[\[Enoncé\]](#)

1. La fonction $h \in H \mapsto \|x - h\|$ est continue sur H qui est un compact donc elle admet un minimum. Il existe donc $h_0 \in H$ tel que

$$d(x, H) = \|x - h_0\|$$

Supposons qu'il existe $h_1 \in H$ tel que $\|x - h_1\| = \|x - h_0\| = d(x, H)$ et $h_1 \neq h_0$.
D'après l'identité du parallélogramme :

$$\left\| \frac{h_0 + h_1}{2} \right\|^2 + \left\| \frac{h_0 + h_1}{2} - x \right\|^2 = \frac{1}{2} (\|h_1 - x\|^2 + \|h_0 - x\|^2) = \frac{1}{2} d(x, H)^2$$

Puisque H est convexe, $\frac{h_0 + h_1}{2} \in H$, d'où $\left\| \frac{h_0 + h_1}{2} - x \right\| \geq d(x, H)$.

Ainsi, on a déduit que : $\left\| \frac{h_0 + h_1}{2} \right\| \leq 0$, ce qui impose que $\left\| \frac{h_0 + h_1}{2} \right\| = 0$. Ainsi,

$$\left\| \frac{h_0 + h_1}{2} - x \right\|^2 = \frac{1}{2} d(x, H)^2 \leq d(x, H)^2$$

ce qui est absurde par définition de $d(x, H)$.

Donc il existe un unique point $h_0 \in H$ tel que $d(x, H) = \|x - h_0\|$.

2. Soit $y \in H$.

On pose $q : t \in [0, 1] \mapsto \|x - th_0 - (1 - t)(y - h_0)\|$.

On remarque que pour tout $t \in [0, 1]$

$$q(t)^2 = \|x - h_0 - (1 - t)(h_0 - y)\|^2 = d(x, H)^2 + (1 - t)^2 \|y - h_0\|^2 - 2(1 - t) \langle x - h_0, y - h_0 \rangle$$

Puisque H est convexe, on en déduit que pour tout $t \in [0, 1]$ $th_0 + (1 - t)y \in H$.

Ainsi pour tout $t \in [0, 1]$, $q(t)^2 \geq d(x, H)^2$, par conséquent :

$$\forall t \in [0, 1], 2(1 - t) \langle x - h_0, y - h_0 \rangle \leq (1 - t)^2 \|y - h_0\|^2$$

Donc,

$$\forall t \in [0, 1[, 2 \langle x - h_0, y - h_0 \rangle \leq (1 - t) \|y - h_0\|^2$$

Et donc en faisant tendre t vers 1^- :

$$\langle x - h_0, y - h_0 \rangle \leq 0$$

Ce résultat étant vrai pour tout $y \in H$, on a

$$\forall y \in H, \langle x - h_0, y - h_0 \rangle \leq 0$$

Réciproquement, supposons que :

$$\forall y \in H, \langle x - h_0, y - h_0 \rangle \leq 0$$

On continue d'étudier la fonction q . On a toujours pour tout $t \in [0, 1]$:

$$q(t)^2 = \|x - h_0 - (1 - t)(h_0 - y)\|^2 = \|x - h_0\|^2 + (1 - t)^2 \|y - h_0\|^2 - 2(1 - t) \langle x - h_0, y - h_0 \rangle$$

Donc

$$q(t) = \|x - h_0 - (1 - t)(h_0 - y)\| \geq \|x - h_0\|$$

En particulier pour $t = 0$, on a :

$$q(0) = \|x - y\| \geq \|x - h_0\|$$

Et donc, on a $d(x, H) = \|x - h_0\|$

XIII.8.36 Convexité de l'adhérence et de l'intérieur

[Enoncé]

Montrons que \overline{A} est convexe.

Soient $x, y \in \overline{A}$.

Il existe $(x_n) \in A^{\mathbb{N}}$ (resp. $(y_n) \in A^{\mathbb{N}}$) tel que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$ (resp. $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = y$) On a :

$$\forall \lambda \in [0, 1], \forall n \in \mathbb{N}, \lambda x_n + (1 - \lambda)y_n \in A \quad (\text{car } A \text{ est convexe})$$

et

$$\forall \lambda \in [0, 1], \lambda x_n + (1 - \lambda)y_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \lambda x + (1 - \lambda)y$$

donc :

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in \overline{A}$$

Montrons que $\overset{\circ}{A}$ est convexe.

Soit $x, y \in \overset{\circ}{A}$.

Ils existent ε_1 et ε_2 tel que $B(x, \varepsilon_1) \subset A$ et $B(y, \varepsilon_2) \subset A$.

Posons $\varepsilon = \min(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$.

Soit $\lambda \in [0, 1]$. Posons $z = \lambda x + (1 - \lambda)y$.

Soit $v \in B(z, \varepsilon)$.

On pose $x' = x + (v - z)$ et $y' = y + (v - z)$.

$$x' + \lambda(y' - x') = z$$

On a choisi x' et y' de sorte que $x' \in B(x, \varepsilon_1)$ donc $x' \in A$ et $y' \in B(y, \varepsilon_2)$ donc $y' \in A$.

Donc par convexité $v \in A$ et donc $B(z, \varepsilon) \subset A$.

Par conséquent $z \in \overset{\circ}{A}$ d'où $\overset{\circ}{A}$ est convexe.

XIII.8.37 Fonctions positivement homogènes

[Enoncé]

XIII.8.38 Enveloppe convexe

[Enoncé]

XIII.8.39 Théorème de Carathéodory

[Enoncé]

XIII.8.40 Théorème de Krein-Milman[\[Enoncé\]](#)**XIII.8.41 Epigraphe**[\[Enoncé\]](#)**XIII.8.42 Partie convexe dense de \mathbb{R}^n** [\[Enoncé\]](#)**XIII.8.43 Complémentaire d'un hyperplan**[\[Enoncé\]](#)**XIII.8.44 Composantes connexes par arcs du complémentaire de la réunion de plusieurs hyperplans**[\[Enoncé\]](#)**XIII.8.45 Sphères d'un \mathbb{R} -espace vectoriel**[\[Enoncé\]](#)

1. Soient $x, y \in S$.

Supposons que $x \neq -y$. On pose :

$$\gamma : \begin{cases} [0, 1] & \longrightarrow S \\ t & \longmapsto \frac{(1-t)x + ty}{\|(1-t)x + ty\|} \end{cases} .$$

Cette application est continue sur $[0, 1]$. On vérifie aisément que $\gamma(0) = x$ et $\gamma(1) = y$.

Donc γ est un chemin continue de x vers y . Supposons que $x = -y$. On choisit un point $z \in S$ tels que $z \neq x$ et $z \neq y$.

Ainsi d'après ce qui précède, il existe un chemin continue entre x et z et un autre chemin continue entre y et z . Donc par transitivité, il existe un chemin continue entre x et y .

Donc S est connexe par arcs.

2. Soit S' une sphère de rayon $r > 0$ et de centre a . L'application

$$f : \begin{cases} S & \longrightarrow S' \\ x & \longmapsto r(x + a) \end{cases}$$

est une application continue de S dans S' car polynomiale.

Puisque l'on a montré que S est connexe par arcs, l'image de S par f est connexe par arcs.

Or cette image est S' donc S' est connexe par arcs

XIII.8.46 Théorème du passage à la douane

[\[Enoncé\]](#)

XIII.8.47 Condition nécessaire de la connexité par arc

[\[Enoncé\]](#)

On sait que l'image d'un connexe par arcs par une application continue est connexe par arcs.

Par conséquent, $f(C)$ est connexe par arcs.

Puisque $f(C) \subset \{0, 1\}$, on en déduit que :

$$f(C) = \{0\}, f(C) = \{1\} \text{ ou } f(C) = \{0, 1\}$$

Or $\{0, 1\}$ n'est pas connexe par arcs, donc $f(C) \neq \{0, 1\}$.

Dans les deux cas restant $f(C)$ est un singleton (qui est bien connexe par arcs), donc f est constante sur C .

XIII.8.48 Entre un ensemble et son adhérence

[\[Enoncé\]](#)

XIII.8.49 Continuité d'applications matricielles

[\[Enoncé\]](#)

XIII.8.50 Points de continuité du polynôme minimal

[\[Enoncé\]](#)

XIII.8.51 Exponentielle matricielle et topologie

[Enoncé]

XIII.8.52 Lemme du déterminant

[Enoncé]

1. Soit $(U, V) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})^2$. On remarque que $\det(I_n + UV^\top) = (-1)^n \chi_{UV^\top}(-1)$.
Or d'après ??, $\text{rg}(UV^\top) = 1$ et $\text{Sp}(UV^\top) = \{0, \text{Tr}(UV^\top)\}$.
Donc $\det(I_n + UV^\top) = (-1)^n(-1)^{n-1}(-1 - \text{Tr}(UV^\top)) = 1 + \text{Tr}(V^\top U) = 1 + V^\top U$.
2. L'idée ici est d'utiliser la densité de $\text{GL}_n(\mathbb{R})$
Soient $M \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ et $(U, V) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2$. $\det(M^{-1})\det(M + UV^\top) = \det(I_n + M^{-1}UV^\top)$.
la multiplication par une matrice inversible conserve le rang donc on a encore $\text{rg}(M^{-1}UV^\top) = 1$.
Donc $\det(I_n + M^{-1}UV^\top) = 1 + \text{Tr}(M^{-1}UV^\top) = 1 + \text{Tr}(V^\top M^{-1}U) = 1 + V^\top M^{-1}U$.
Par conséquent, $\det(M + UV^\top) = \det(M) + V^\top \det(M) M^{-1}U = \det(M) + V^\top \text{Com}(M)^\top U$
car $\det(M)I_n = M \text{Com}(M)^\top$.
Finalement, puisque $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et que \det est continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$
car $\det(M)$ est polynomiale en les coefficients de M ; la relation est vérifiée pour toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

XIII.8.53 Matrice de déterminant 1 ★★ ★

[Enoncé]

1. On considère le morphisme de groupe $\det : \text{GL}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}^*$.
 $\text{SL}_n(\mathbb{K}) = \ker(\det)$ donc $\text{SL}_n(\mathbb{K})$ est un sous-groupe de $\text{GL}_n(\mathbb{K})$.
2. L'application déterminant étant continue car polynomiale en les coefficients de la matrice $\text{SL}_n(\mathbb{K}) = \ker(\det) = \det^{-1}(\{1\})$ donne aussi que $\text{SL}_n(\mathbb{K})$ est fermé.
3. Pour $\varepsilon \in \mathbb{R}^*$ on pose $M_\varepsilon = \text{diag}\left(\varepsilon, \frac{1}{\varepsilon}, 1, \dots, 1\right) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
 $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}^*, M_\varepsilon \in \text{SL}_n(\mathbb{R})$.
Et, $\|M_\varepsilon\| = \sqrt{\text{Tr}(M_\varepsilon^\top M_\varepsilon)} = \sqrt{\varepsilon^2 + \frac{1}{\varepsilon^2} + n - 2} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow +\infty} +\infty$.
Donc $\text{SL}_n(\mathbb{R})$ n'est pas borné. $\text{SL}_n(\mathbb{C})$ ne l'est pas car il contient $\text{SL}_n(\mathbb{R})$ (Il peut prendre la norme définie par $\|M\| = \text{Tr}(\overline{M}^\top M)$ qui se trouve coïncider avec celle que l'on a utilisé sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$).
4. On va montrer que le complémentaire de $\text{SL}_n(\mathbb{K})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Si $M \notin \text{SL}_n(\mathbb{K})$ la suite constante égale à M est une suite à valeurs

dans le complémentaire de $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$ qui converge vers M .

Supposons que $M \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$.

Posons pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $M_k = M - \frac{1}{k}I_n$. $(M_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ converge vers M .

La suite $(\det(M_k))_{k \in \mathbb{N}^*} = \left((-1)^n \chi_M \left(\frac{1}{k} \right) \right)_{k \in \mathbb{N}^*}$ ne prend qu'un nombre fini de fois la valeur 1 car sinon χ_M serait constant égal à 1 (alors qu'il est de degré n). Ainsi $\mathrm{APCR}(\det(M_k))_{k \in \mathbb{N}^*} \neq 1$ i.e $M_k \notin \mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$.

On en déduit que $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$ est d'intérieur vide.

5. On rappelle qu'une matrice de transvection est une matrice de la forme

$T_{ij}(\lambda) = I_n + \lambda E_{ij}$ avec $\lambda \in \mathbb{K}^*$ et $(i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2$, $i \neq j$.

Soit $M \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$. Il existe $i_1, \dots, i_r, j_1, \dots, j_r \in \llbracket 1; n \rrbracket$ avec $i_k \neq j_k$ pour tout $k \in \llbracket 1; r \rrbracket$ ainsi que $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{K}^*$ tels que :

$$M = T_{i_1 j_1}(\lambda_1) \dots T_{i_r j_r}(\lambda_r)$$

On pose $\gamma : t \in [0, 1] \mapsto T_{i_1 j_1}(t\lambda_1) \dots T_{i_r j_r}(t\lambda_r)$.

La fonction $f : (A_1, \dots, A_r) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^r \mapsto A_1 \dots A_r$ est continue car r -linéaire avec $\dim(\mathcal{M}_n(\mathbb{K})) < +\infty$.

Pour toute matrice de transvection $T_{ij}(\lambda)$ la fonction $\varphi_{ij}(\lambda) : t \in [0, 1] \mapsto T_{ij}(t\lambda) = I_n + t\lambda E_{ij}$ est continue car affine. Par conséquent la fonction $h : t \in [0, 1] \mapsto (T_{i_1 j_1}(t\lambda_1), \dots, T_{i_r j_r}(t\lambda_r))$ est continue car toutes ses composantes le sont.

Enfin $\gamma = f \circ h$ est continue.

$\gamma(0) = I_n$ et $\gamma(1) = M$.

On en déduit que $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$ est connexe par arcs.

XIII.8.54 Ensembles de matrices de rang fixé

[\[Énoncé\]](#)

XIII.8.55 Densité des matrices inversibles ★★

[\[Énoncé\]](#)

1. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On pose pour $k \in \mathbb{N}^*$, $M_k = M - \frac{1}{k}I_n$. Il est clair que $M_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} M$.

On remarque que $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $M_k \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \iff \det(M_k) \neq 0 \iff \frac{1}{k} \notin \mathrm{Sp}(M)$. Or on sait que le spectre d'une matrice est un ensemble fini, c'est l'ensemble des racines d'un polynôme. Ainsi pour $k > \frac{1}{\min_{\lambda \in \mathrm{Sp}(M) \setminus \{0\}} |\lambda|}$, on sait que $\frac{1}{k} \notin \mathrm{Sp}(M)$.

La suite $(M_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ est donc à valeurs dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ APCR ce qui justifie que $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ par caractérisation séquentielle.

2. Soit $(A, B) \in M_n(\mathbb{K})$. D'après la question 1 il existe une suite $(B_k) \in \text{GL}_n(\mathbb{K})^{\mathbb{N}}$ de limite B .

Or $\forall k \in \mathbb{N}$, $AB_k = B_k^{-1}(B_k A)B_k$. Donc pour tout $k \in \mathbb{N}$, AB_k et $B_k A$ sont semblables. Elles ont donc même polynôme caractéristique.

Ensuite, les applications de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $L : M \mapsto MA$, $R : M \mapsto AM$ et $\chi : M \mapsto \chi_M$ sont continues. En effet les deux premières sont linéaires sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui est de dimension finie et pour la dernière, les coefficients de χ_M sont polynomiaux en les coefficients de M : ils sont issus d'un déterminant d'un polynôme en M . On en déduit par composition des limites que $\chi_{AB} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \chi_{AB_k}$ et $\chi_{BA} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \chi_{B_k A}$.

Ainsi par unicité de la limite, $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.

3. Soit $(A, B) \in M_n(\mathbb{K})$. D'après la question 1 il existe une suite $(B_k) \in \text{GL}_n(\mathbb{K})^{\mathbb{N}}$ de limite B .

Or $\forall k \in \mathbb{N}$, $AB_k = B_k^{-1}(B_k A)B_k$. Donc pour tout $k \in \mathbb{N}$, AB_k et $B_k A$ sont semblables. Montrons si $M, N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont semblables alors $\exp(M)$ et $\exp(N)$ le sont aussi. On note $M = PNP^{-1}$ avec $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$.

On montre classiquement par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}$, $M^n = P N^n P^{-1}$. De plus l'application $\varphi : L \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mapsto PLP^{-1}$ est linéaire. Donc $\forall R \in \mathbb{K}[X]$, $R(M) = PR(N)P^{-1}$.

En particulier, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^n \frac{M^k}{k!} = P \left(\sum_{k=0}^n \frac{N^k}{k!} \right) P^{-1}$. Les deux sommes ont pour limite respective $\exp(M)$ et $\exp(N)$ et φ est continue car linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui est de dimension finie ; par passage à la limite $\exp(M) = P \exp(N) P^{-1}$.

Remarque on a obtenu un résultat plus fort puisqu'on connaît la matrice de passage

On en déduit que $\forall k \in \mathbb{N}$, $\chi_{\exp(AB_k)} = \chi_{\exp(B_k A)}$. Comme vu précédemment les applications de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $L : M \mapsto MA$, $R : M \mapsto AM$ et $\chi : M \mapsto \chi_M$ sont continues.

Montrons que l'application $\exp : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mapsto \exp(M)$ est continue. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On se donne une norme d'algèbre $\|\cdot\|$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (on sait qu'il en existe d'après le cours sur les normes d'opérateur).

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'application $f_n : M \mapsto \frac{M^n}{n!}$ est continue pour la norme $\|\cdot\|$ car les coefficients de $f(M)$ sont polynomiaux en ceux de M . Par définition $\sum_{n \in \mathbb{N}} f_n$ converge simplement vers \exp .

De plus, dans $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$, $\sum_{n=0}^{+\infty} \left\| \frac{M^n}{n!} \right\| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\|M\|^n}{n!} = \exp(M) < +\infty$.

Ainsi la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} f_n$ converge normalement (a fortiori uniformément) vers \exp sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

D'après le théorème de transfert de continuité \exp est continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Finalement, par composition des limites, $\chi_{\exp(AB)} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \chi_{\exp(AB_k)}$ et $\chi_{\exp(BA)} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \chi_{\exp(B_k A)}$.

Ainsi par unicité de la limite, $\chi_{\exp(AB)} = \chi_{\exp(BA)}$.

XIII.8.56 Comatrice et topologie

[Enoncé]

XIII.8.57 Groupe orthogonal ★

[Enoncé]

Soient $U, V \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

Vérifions que $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$:

- V est inversible d'inverse V^\top donc $\mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \subset \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$;
- $(UV^{-1})^\top UV^{-1} = (V^{-1})^\top U^\top UV^{-1} = (V^\top)^{-1} V^{-1} = VV^{-1} = I_n$ donc $UV^{-1} \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

Ensuite, $\mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \subset \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ qui est de dimension finie donc il suffit de montrer que $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est fermé et borné.

Pour la norme $\|\cdot\|_2 : M \mapsto \sqrt{\mathrm{Tr}(M^\top M)}$, $\|V\|_2 = \sqrt{\mathrm{Tr}(I_n)} = \sqrt{n}$ d'où $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est borné.

On aurait aussi pu prendre la norme $\|\cdot\|_\infty : M \mapsto \max_{1 \leq i, j \leq n} |M_{ij}|$: On sait que la famille des colonnes de V forme une base orthonormée de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ pour son produit scalaire canonique. Alors en notant C_1, \dots, C_n les colonnes de V ,

$$\forall j \in \llbracket 1; n \rrbracket, \|C_j\|^2 = \sum_{i=1}^n V_{ij}^2 = 1. \text{ Donc } \forall i, j \in \llbracket 1; n \rrbracket, |V_{ij}| \leq 1. \text{ D'où } \|V\|_\infty \leq 1.$$

Enfin, $\mathcal{O}_n(\mathbb{R}) = f^{-1}(\{I_n\})$ avec $f : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto M^\top M$.

Or les coefficients de $M^\top M$ sont polynomiaux en ceux de M donc f est continue.

On en déduit, comme $\{I_n\}$ est fermé, que $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est fermé.

On remarque que $\det(\mathcal{O}_n(\mathbb{R})) = \{-1, 1\}$ n'est pas connexe par arcs.

L'application $\det : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ est continue car polynomiale en les coefficients de la matrice donc $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ ne peut pas être connexe par arcs.

XIII.8.58 Groupe (spécial) unitaire ★★★

[Enoncé]

1. On vérifie que $\varphi : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) & \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \\ M & \longmapsto \overline{M} \end{cases}$ est un morphisme d'algèbre.

Soient $A, B \in U_n(\mathbb{C})$.

Vérifions que $U_n(\mathbb{C})$ est un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$:

- $I_n \in U_n(\mathbb{C})$
- A est inversible d'inverse \overline{A}^\top donc $U_n(\mathbb{C}) \subset \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$;
- $(\overline{AB^{-1}})^\top AB^{-1} = (\overline{A \cdot \overline{B^{-1}}})^\top = (\overline{B^{-1}})^\top (\overline{A})^\top AB^{-1} = (\overline{B}^\top)^{-1} B^{-1} = BB^{-1} = I_n$
donc $AB^{-1} \in U_n(\mathbb{C})$.

Montrons ensuite que $U_n(\mathbb{C})$ est compact.

$U_n(\mathbb{C}) \subset \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui est de dimension finie il suffit donc $U_n(\mathbb{C})$ montrer que $U_n(\mathbb{C})$ est fermé et borné.

On commence par vérifier que l'application $\|.\| : M \mapsto \sqrt{\text{Tr}(\overline{M}^\top M)} = \sqrt{\sum_{1 \leq i, j \leq n} |M_{ij}|^2}$

définie une norme (qu'on dit hermitienne) sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

$\|A\| = \sqrt{\text{Tr}(I_n)} = \sqrt{n}$ d'où $U_n(\mathbb{C})$ est borné.

Enfin, $U_n(\mathbb{C}) = g^{-1}(\{I_n\})$ avec $g : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mapsto \overline{M}^\top M$.

Or les parties réelles et imaginaires des coefficients de $\overline{M}^\top M$ sont polynomiales en celles de M donc g est continue.

On en déduit, comme $\{I_n\}$ est fermé, que $U_n(\mathbb{C})$ est fermé.

Montrons maintenant que $\widehat{U_n(\mathbb{C})} = \emptyset$.

$U_n(\mathbb{C})$ est inclus dans l'ensemble $\mathcal{Z} = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), |\det(M)| = 1\}$.

Or si $M \in \mathcal{Z}$ alors en posant pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $M_k = M - \frac{1}{k}I_n$ on a :

- $(M_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ converge vers M
- APCR $M_k \notin \mathcal{Z}$ puisque sinon il existerait une infinité de $k \in \mathbb{N}^*$ pour lequel $\det(M_k) \neq 0$. Pour chacun de ces k on aurait $\frac{1}{k} \in \text{Sp}(M)$ et donc M aurait une infinité de valeurs propres.

Ainsi, aucune matrice de \mathcal{Z} n'est intérieure à \mathcal{Z} .

Finalement, $\widehat{U_n(\mathbb{C})} \subset \mathring{\mathcal{Z}} = \emptyset$ est vide.

Pour $SU_n(\mathbb{C})$ on remarque que $SU_n(\mathbb{C}) = U_n(\mathbb{C}) \cap \text{SL}_n(\mathbb{C})$ où $\text{SL}_n(\mathbb{C})$ désigne l'ensemble des matrices complexes dont le déterminant vaut 1.

$\text{SL}_n(\mathbb{C}) = \ker(\det)$ c'est donc un sous-groupe de $\text{GL}_n(\mathbb{C})$ et donc $SU_n(\mathbb{C})$ est un sous-groupe de $\text{GL}_n(\mathbb{C})$.

De plus comme l'application \det est continue on obtient aussi que $\text{SL}_n(\mathbb{C})$ est fermé et donc que $SU_n(\mathbb{C})$ est compact en tant que fermé inclus dans un compact ($U_n(\mathbb{C})$).

Enfin $SU_n(\mathbb{C}) \subset U_n(\mathbb{C}) \implies \widehat{SU_n(\mathbb{C})} = \emptyset$.

2. a. On résonne par récurrence sur la taille n de la matrice.

En préambule on montre que l'application $\langle , \rangle : \begin{cases} \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})^2 & \longrightarrow \mathbb{R}_+ \\ (X, Y) & \longmapsto \overline{X}^\top Y \end{cases}$ définie

un produit hermitien (équivalent des produits scalaires sur un espace pré-hilbertien) sur $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$. On note N la norme associée.

$n = 1$:

$U_1(\mathbb{C})$ est isomorphe à \mathbb{U} donc le résultat est vrai.

Soit $n \geq 2$ On suppose le résultat vrai pour $U_{n-1}(\mathbb{C})$. Fixons $M \in U_n(\mathbb{C})$.

χ_M est scindé sur \mathbb{C} dont M admet une valeur propre λ . Notons X un vecteur propre associé.

$$MX = \lambda X \implies \overline{M} \overline{X} = \overline{\lambda} \overline{X} \implies \overline{X}^\top \overline{M}^\top = \overline{\lambda} \overline{X}^\top.$$

Par conséquent, $\overline{X}^\top \overline{M}^\top MX = (\overline{\lambda} \overline{X}^\top)(\lambda X) = |\lambda|^2 \overline{X}^\top X$ et $\overline{X}^\top \overline{M}^\top MX = \overline{X}^\top I_n X = \overline{X}^\top X$.

Or, $\overline{X}^\top X = N(X) \neq 0$ puisque $X \neq 0$.

Ainsi $|\lambda|^2 = 1$ c'est à dire $|\lambda| = 1$ c'est à dire $\exists \theta_1 \in \mathbb{R}, \lambda = e^{i\theta_1}$.

De plus, puisque X est non nul on peut poser $e_1 = \frac{X}{N(X)}$ et compléter (e_1) en une base (e_1, \dots, e_n) de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ orthonormée pour le produit hermitien dont N est issue.

On sait alors que pour Q la matrice dont les colonnes sont e_1, \dots, e_n on a $Q \in U_n(\mathbb{C})$ et,

$$QMQ^{-1} = \left(\begin{array}{c|ccc} e^{i\theta_1} & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & M' & \\ 0 & & & \end{array} \right)$$

Vérifions que $M' \in U_{n-1}(\mathbb{C})$:

D'une part, on sait que $QMQ^{-1} \in U_n(\mathbb{C})$ car $(U_n(\mathbb{C}), \times)$ est un groupe. C'est à dire que $\overline{QMQ^{-1}}^\top QMQ^{-1} = I_n$.

$$\begin{aligned} \text{D'autre part, } \overline{QMQ^{-1}}^\top QMQ^{-1} &= \left(\begin{array}{c|ccc} e^{-i\theta_1} & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & \overline{M'}^\top & \\ 0 & & & \end{array} \right) \left(\begin{array}{c|ccc} e^{i\theta_1} & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & M' & \\ 0 & & & \end{array} \right) = \\ & \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & \overline{M'}^\top M' & \\ 0 & & & \end{array} \right) \text{ Donc } \overline{M'}^\top M' = I_{n-1} \text{ i.e } M' \in U_{n-1}(\mathbb{C}). \end{aligned}$$

On peut alors appliquer l'hypothèse de récurrence à M' :

$\exists P' \in U_{n-1}(\mathbb{C}), \exists (\theta_2, \dots, \theta_n) \in \mathbb{R}^{n-1}, M' = P' \text{diag}(e^{i\theta_2}, \dots, e^{i\theta_n})(P')^{-1}$.

On pose alors enfin $P = \left(\begin{array}{c|ccc} e_1 & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & P' & \\ 0 & & & \end{array} \right)$ et on vérifie que $M = P \text{diag}(e^{i\theta_1}, \dots, e^{i\theta_n}) P^{-1}$.

- b. Soit $M \in U_n(\mathbb{C})$. $\exists P \in U_n(\mathbb{C}), \exists (\theta_1, \dots, \theta_n) \in \mathbb{R}^n, M = P \text{diag}(e^{i\theta_1}, \dots, e^{i\theta_n}) P^{-1}$.

On pose $\gamma : \begin{cases} [0, 1] & \longrightarrow U_n(\mathbb{C}) \\ t & \longmapsto P \text{diag}(e^{ti\theta_1}, \dots, e^{ti\theta_n}) P^{-1} \end{cases}$. Il est clair que $\forall t \in [0, 1], \text{diag}(e^{ti\theta_1}, \dots, e^{ti\theta_n}) \in U_n(\mathbb{C})$. Donc comme $(U_n(\mathbb{C}), \times)$ est un groupe, $\forall t \in [0, 1], \gamma(t) \in U_n(\mathbb{C})$: γ est bien une application.

De plus, la fonction $\alpha : M \in U_n(\mathbb{C}) \mapsto PMP^{-1}$ est continue car linéaire sur $U_n(\mathbb{C}) \subset \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ avec $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de dimension finie et la fonction $\beta : t \in [0, 1] \mapsto$

$\text{diag}(e^{ti\theta_1}, \dots, e^{ti\theta_n})$ est continue car chacune de ses composantes l'est. Par conséquent $\gamma = \alpha \circ \beta$ est continue.

Enfin, $\gamma(0) = I_n$ et $\gamma(1) = M$.

Chaque matrice de $U_n(\mathbb{C})$ est reliée par un chemin continu dans $U_n(\mathbb{C})$ à la matrice identité donc $U_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs.

Pour $SU_n(\mathbb{C})$ il suffit de remarquer que $M = P \text{diag}(e^{i\theta_1}, \dots, e^{i\theta_n}) P^{-1} \in SU_n(\mathbb{C}) \iff$

$$\prod_{k=1}^n e^{i\theta_k} = 1 \iff \sum_{k=1}^n \theta_k \equiv 0[2\pi].$$

La même application fait alors l'affaire.

XIII.8.59 Partie compacte et stable par produit de $GL_n(\mathbb{K})$ ★★ ★

[Enoncé]

On se donne G une telle partie. Comme elle est non vide on se donne un élément $A \in G$. La stabilité par produit donne par récurrence immédiate $\forall n \in \mathbb{N}^*, A^n \in G$.

Ensuite comme G est compacte on sait qu'il existe une application $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^*$ strictement croissante telle que $(A^{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une matrice $B \in G$.

On sait que l'inversion matricielle est continue (cf. VIII.49) donc $A^{-\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} B^{-1}$.

Par stricte croissance de φ , $\varphi(n+2) - \varphi(n) - 1 > 0$ d'où $(A^{\varphi(n+2)-\varphi(n)-1}) \in G^{\mathbb{N}}$.

De plus $(M, N, P) \mapsto MNP$ est trilinéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui est de dimension finie.

Elle est donc continue et, $A^{\varphi(n+2)} A^{-\varphi(n)} A^{-1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} BB^{-1} A^{-1} = A^{-1}$. Donc $A^{-1} \in G$ par caractérisation séquentielle d'une partie fermée.

G est une partie non vide de $GL_n(\mathbb{K})$, stable par produit et passage à l'inverse : c'est un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{K})$.

XIII.8.60 Intérieur des matrices diagonalisable ★★ ★★ ★★ ★

[Enoncé]

1. Tout d'abord, $\mathcal{B}_n(\mathbb{R}) \subset \mathcal{D}_n(\mathbb{R})$. Montrons que $\mathcal{B}_n(\mathbb{R})$ est ouvert dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

On note A l'ensemble des polynôme unitaire de degré n scindé à racines simples sur $\mathbb{R}[X]$

et $\Phi : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow \mathbb{R}[X] \\ M & \longmapsto \chi_M \end{cases}$. $\mathcal{B}_n(\mathbb{R}) = \Phi^{-1}(A)$ et Φ est continue car les coefficients de

χ_M sont polynomiaux en ceux de M . On va alors montrer que A est ouvert dans $\mathbb{R}_n[X]$.

Soit $P = \prod_{i=1}^n (X - x_i) \in A$ avec $x_1 < \dots < x_n$. On fixe $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ telle que,

$$a_0 < x_1 < a_1 < x_2 < \dots < a_{n-1} < x_n < a_n$$

On pose l'application $\psi : \begin{cases} B & \longrightarrow \mathbb{R}^{n+1} \\ P & \longmapsto (P(a_0), \dots, P(a_n)) \end{cases}$ où B désigne l'ensemble des polynômes unitaires de degré n de $\mathbb{R}[X]$.

D'après le TVI, $\forall i \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket$, $P(a_i)P(a_{i+1}) < 0$.

Ainsi, $P \in U = \psi^{-1} \left(\prod_{i=0}^n (-1)^i \mathbb{R}_+^* \right) \cup \psi^{-1} \left(\prod_{i=0}^n (-1)^{i+1} \mathbb{R}_+^* \right)$.

$\prod_{i=0}^n (-1)^i \mathbb{R}_+^*$ et $\prod_{i=0}^n (-1)^{i+1} \mathbb{R}_+^*$ sont des ouverts de \mathbb{R}^{n+1} et ψ est continue car linéaire sur $\mathbb{R}_n[X]$ qui est de dimension finie, donc U est un ouvert de $\mathbb{R}_n[X]$.

Enfin, un polynôme de U est dans A car il est unitaire de degré n et change $n+1$ fois de signe.

On a donc montré que de tout polynôme de A on peut construire un ouvert inclus dans A et contenant ce polynôme : A est ouvert.

Ainsi $\mathcal{B}_n(\mathbb{R})$ est ouvert.

Donnons nous ensuite une matrice $M \in \mathcal{D}_n(\mathbb{R}) \setminus \mathcal{B}_n(\mathbb{R})$. Il existe $\lambda \in \mathbb{C}$, une matrice diago-

nale $D \in \mathcal{M}_{n-2}(\mathbb{C})$ et une matrice $P \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ tels que $M = \left(\begin{array}{cc|ccc} \lambda & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & 0 & & & \\ \vdots & \vdots & & D & \\ 0 & 0 & & & \end{array} \right) P^{-1}$.

On pose, pour $k \in \mathbb{N}^*$, $M_k = P \left(\begin{array}{cc|ccc} \lambda & 1/k & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & 0 & & & \\ \vdots & \vdots & & D & \\ 0 & 0 & & & \end{array} \right) P^{-1}$.

$(M_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ converge vers M et $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $M_k \notin \mathcal{D}_n(\mathbb{R})$.

Ceci montre que M n'est pas dans l'intérieur de $\mathcal{D}_n(\mathbb{R})$.

Finalement, $\widehat{\mathcal{D}_n(\mathbb{R})} = \mathcal{B}_n(\mathbb{R})$.

2. Pour montrer que $\mathcal{B}_n(\mathbb{C})$ est ouvert on utilise le résultant (cf. IV.29).

$\mathcal{B}_n(\mathbb{C}) = \varphi^{-1}(\mathbb{C}^*)$ pour $\varphi : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ M & \longmapsto & \text{Res}(\chi_M, \chi'_M) \end{cases}$. Les coefficients de χ_M sont polynomiaux en ceux de M et les coefficients de χ'_M sont polynomiaux en ceux de χ_M donc φ est polynomiale en les coefficients de M (c'est un calcul de déterminant) et donc continue.

La suite du raisonnement est identique au cas $\mathbb{K} = \mathbb{R}$:

Donnons nous une matrice $M \in \mathcal{D}_n(\mathbb{C}) \setminus \mathcal{B}_n(\mathbb{C})$. Il existe $\lambda \in \mathbb{C}$, une matrice diagonale

$$D \in \mathcal{M}_{n-2}(\mathbb{C}) \text{ et une matrice } P \in \text{GL}_n(\mathbb{C}) \text{ tels que } M = \left(\begin{array}{cc|ccc} \lambda & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & 0 & & & \\ \vdots & \vdots & & & \\ 0 & 0 & & D & \end{array} \right) P^{-1}.$$

$$\text{On pose, pour } k \in \mathbb{N}^*, M_k = P \left(\begin{array}{cc|ccc} \lambda & 1/k & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & 0 & & & \\ \vdots & \vdots & & & \\ 0 & 0 & & D & \end{array} \right) P^{-1}.$$

$(M_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ converge vers M et $\forall k \in \mathbb{N}^*, M_k \notin \mathcal{D}_n(\mathbb{C})$.

Ceci montre que M n'est pas dans l'intérieur de $\mathcal{D}_n(\mathbb{C})$.

Finalement, $\widehat{\mathcal{D}_n(\mathbb{C})} = \mathcal{B}_n(\mathbb{C})$.

XIII.8.61 Adhérence des matrices diagonalisables ★★

[Enoncé]

1. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) = \mathcal{T}_n(\mathbb{C})$. On note $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les valeurs propres de M , potentiellement égales. Il existe P une matrice inversible et T une matrice triangulaire supérieure telles que $M = PTP^{-1}$.

Posons, pour $k \in \mathbb{N}$, $M_k = P \left(T + \text{diag} \left(\frac{1}{k+1}, \dots, \frac{1}{k+n} \right) \right) P^{-1}$.

La suite $(M_k)_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers M . De plus si $k \in \mathbb{N}$, les valeurs propres de M_k sont les $\mu_{k,i} = \lambda_i + \frac{1}{k+i}$ pour $1 \leq i \leq n$ soient distincts.

Soit $i, j \in \llbracket 1; n \rrbracket$ distincts.

Si $\lambda_i = \lambda_j$ alors $\mu_{k,i} \neq \mu_{k,j}$.

Et si $\lambda_i \neq \lambda_j$ alors $|\mu_{k,i} - \mu_{k,j}| = \left| \lambda_i - \lambda_j - \left(\frac{1}{k+j} - \frac{1}{k+i} \right) \right| \geq \left| \lambda_i - \lambda_j \right| - \left| \frac{1}{k+j} - \frac{1}{k+i} \right|$.

APCR, $\left| \lambda_i - \lambda_j \right| - \left| \frac{1}{k+j} - \frac{1}{k+i} \right| = \left| \lambda_i - \lambda_j \right| - \left| \frac{1}{k+j} - \frac{1}{k+i} \right| > 0$ car $|\lambda_i - \lambda_j| > 0$.

Ainsi APCR M_k est diagonalisable car elle a n valeurs propres distinctes.

2. a. Supposons P est scindé sur $\mathbb{R}[X]$. On écrit $P = \prod_{k=1}^d (X - x_k)$. On sait alors que

$\forall k \in \llbracket 1; d \rrbracket, x_k \in \mathbb{R}$.

Fixons $z \in \mathbb{C}$.

Pour tout $k \in \llbracket 1; d \rrbracket, |z - x_k| = \sqrt{\text{Re}(z - x_k)^2 + \text{Im}(z - x_k)^2} \geq |\text{Im}(z - x_k)| = |\text{Im}(z)|$ car x_k est réel.

$$\text{Donc, } |P(z)| = \prod_{k=1}^d |z - x_k| \geq \prod_{k=1}^d |\operatorname{Im}(z)| = |\operatorname{Im}(z)|^d$$

Réciproquement si $\forall z \in \mathbb{C}$, $|P(z)| \geq |\operatorname{Im}(z)|^d$ alors pour toute racine z de P on a $|\operatorname{Im}(z)|^d \leq 0$ d'où $\operatorname{Im}(z) = 0$ c'est à dire $z \in \mathbb{R}$.

On sait que P est scindé sur \mathbb{C} et donc P est scindé sur \mathbb{R} .

- b. Comme $\mathcal{D}_n(R) \subset \mathcal{T}_n(\mathbb{R})$ on a $\overline{\mathcal{D}_n(R)} \subset \overline{\mathcal{T}_n(\mathbb{R})}$.

Par le même raisonnement qu'en question 1 on montre que $\mathcal{T}_n(\mathbb{R}) \subset \overline{\mathcal{D}_n(\mathbb{R})}$.

Il reste donc à montrer que $\mathcal{T}_n(\mathbb{R})$ est fermé dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Soit $(M_k) \in \mathcal{T}_n(\mathbb{R})^{\mathbb{N}}$ convergente.

L'application $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto \chi_M$ est continue car les coefficients de χ_M sont polynomiaux en ceux de M d'où $\chi_{M_k} \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} \chi_M$.

Soit z une racine de χ_M .

D'après la question précédente, $\forall k \in \mathbb{N}$, $|\chi_{M_k}(z)| \geq |\operatorname{Im}(z)|^n$.

Donc par passage à la limite, $|\operatorname{Im}(z)|^n \leq |\chi_M(z)| = 0$ c'est à dire $z \in \mathbb{R}$.

Ainsi χ_M est scindé sur \mathbb{R} i.e $M \in \mathcal{T}_n(\mathbb{R})$.

Finalement $\overline{\mathcal{D}_n(\mathbb{R})} = \mathcal{T}_n(\mathbb{R})$.

XIII.8.62 Une preuve de Cayley-Hamilton (1) ★★

[Enoncé]

- Notons $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les valeurs propres de A , potentiellement égale. Il existe une matrice inversible P telle que $A = P \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^{-1}$. Notons $\chi_A = \sum_{k=0}^n a_k X^k$.

On calcule :

$$\begin{aligned} \chi_A(A) &= \sum_{k=0}^n a_k (P \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^{-1})^k \\ &= \sum_{k=0}^n P \operatorname{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k) P^{-1} \\ &= P \operatorname{diag} \left(\sum_{k=0}^n a_k \lambda_1^k, \dots, \sum_{k=0}^n a_k \lambda_n^k \right) P^{-1} \\ &= P \operatorname{diag}(\chi_A(\lambda_1), \dots, \chi_A(\lambda_n)) P^{-1} \\ &= P \operatorname{diag}(0, \dots, 0) P^{-1} \\ &= 0 \end{aligned}$$

- On montre que l'ensemble des matrices à coefficients complexes diagonalisables est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ (cf. VIII.61).

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On se donne une suite $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ de matrices diagonalisables qui

converge vers A .

D'après la question 1, $\forall k \in \mathbb{N}$, $\chi_{A_k}(A_k) = 0$.

Or l'application $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mapsto \chi_M(M)$ est continue car les coefficients de $\chi_M(M)$ sont polynomiaux en ceux de M .

Ainsi par passage à la limite, $\chi_A(A) = 0$.

XIII.8.63 Dimension du commutant d'une matrice

[\[Enoncé\]](#)

XIII.8.64 Topologie et réduction

[\[Enoncé\]](#)

XIII.8.65 Groupe spécial orthogonal et connexité

[\[Enoncé\]](#)

XIII.8.66 Matrices inversibles et connexité

[\[Enoncé\]](#)

XIII.8.67 Matrices nilpotentes et connexité

[\[Enoncé\]](#)

XIII.8.68 Raffinement sur les disques de Gershgorin

[\[Enoncé\]](#)

XIII.8.69 Matrices stochastiques et bistochastiques

[\[Enoncé\]](#)

XIII.8.70 Théorème de Birkhoff-Von Neumann ★★★★★

[Enoncé]

1. Soit $P \in \text{Conv}(\mathcal{P}_n)$. $\exists(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in (\mathbb{R}_+)^n$, $\exists(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \in \mathcal{S}_n^n$, $\begin{cases} \sum_{k=1}^n \lambda_k = 1 \\ \sum_{k=1}^n \lambda_k P_{\sigma_k} = P \end{cases}$.
- Alors $P \in \mathcal{M}n\mathbb{R}_+$ et $\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket$,

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n P_{ij} &= \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \lambda_k (P_{\sigma_k})_{ij} \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \lambda_k \delta_{i\sigma_k(j)} \\ (\text{par bijectivité de } \sigma_k) &= \sum_{k=1}^n \lambda_k \sum_{j=1}^n \delta_{ij} \\ &= \sum_{k=1}^n \lambda_k \\ &= 1 \end{aligned}$$

De même, $\sum_{j=1}^n P_{ji} = 1$.

Ainsi $P \in \mathcal{B}_n$.

2. a. B ne peut pas avoir de colonne/ligne nulle. Il y a donc exactement un coefficient non nul par ligne et par colonne. Mais alors la condition " $\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $\sum_{j=1}^n B_{ij} = \sum_{j=1}^n B_{ji} = 1$ " impose qu'ils valent tous 1 : B est une matrice de permutation.
- b. Montrons que $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ vérifie la condition (ii) du théorème de Hall. Fixons $I \subset \llbracket 1; n \rrbracket$ et notons $A_I = \bigcup_{i \in I} A_i$.

$$\begin{aligned}
\text{Card}(A_I) &= \sum_{j \in A_I} 1 \\
&= \sum_{j \in A_I} \sum_{i=1}^n B_{ij} \\
(\text{Les sommes sont finies}) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j \in A_I} B_{ij} \\
&\geq \sum_{i \in I} \sum_{j \in A_I} B_{ij} \\
(\text{par définition de } A_I) &= \sum_{i \in I} \sum_{j=1}^n B_{ij} \\
&= \sum_{i \in I} 1 \\
&= \text{Card}(I)
\end{aligned}$$

Alors d'après le théorème de Hall (cf.??), $\exists(j_1, \dots, j_n) \in \prod_{i=1}^n A_i$, $\forall(k, l) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2$, ($k \neq l \implies j_k \neq j_l$).

Posons $\sigma : \begin{cases} \llbracket 1; n \rrbracket & \longrightarrow \llbracket 1; n \rrbracket \\ k & \longmapsto j_k \end{cases}$. $\sigma \in S_n$ puisqu'elle est injective par construction.

On pose aussi $\lambda = \min \left\{ B_{ij}, j \in \bigcup_{i=1}^n A_i \right\}$. $\lambda < 1$ car sinon on aurait $m = n$.

Enfin, posons $B_0 = \frac{1}{\lambda}(B - P_\sigma)$.

Le choix de λ garantit que $B_0 \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}_+)$ et $\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket$,

$$\sum_{j=1}^n (B_0)_{ij} = \frac{1}{1-\lambda} \left(\sum_{j=1}^n B_{ij} - \lambda \sum_{j=1}^n (P_\sigma)_{ij} \right) = \frac{1}{1-\lambda} (1 - \lambda) = 1. \text{ Ainsi } B_0 \in \mathcal{B}_n.$$

De plus, en notant j_0 un indice tel que $B_{ij_0} = \lambda$, on remarque que $(B_0)_{ij_0} = 0$ alors que $B_{ij_0} \neq 0$ par définition des A_i .

B_0 est donc bien une matrice bistochastique ayant au moins un coefficient nul de plus que B .

3. Par hypothèse de récurrence, $B_0 \in \text{Conv}(\mathcal{P}_n)$. Donc $\exists(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in (\mathbb{R}_+)^n$, $\exists(P_1, \dots, P_n) \in$

$$\mathcal{P}_n^n, \begin{cases} \sum_{k=1}^n \lambda_k = 1 \\ \sum_{k=1}^n \lambda_k P_k = B_0 \end{cases}.$$

Posons pour tout $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $\mu_k = (1 - \lambda)\lambda_k$, $P'_k = P_k$ ainsi que $\mu_{n+1} = \lambda$ et $P'_{n+1} = P_\sigma$.

On a :

$$\begin{aligned}
 &— \forall k \in \llbracket 1; n+1 \rrbracket, \mu_k \geq 0, P_k \in \mathcal{P}_n \\
 &— \sum_{k=1}^{n+1} \mu_k = \lambda + (1-\lambda) \sum_{k=1}^n \lambda_k = \lambda + (1-\lambda) = 1; \\
 &— \sum_{k=1}^{n+1} \mu_k P'_k = \lambda P_\sigma + (1-\lambda) \sum_{k=1}^n \lambda_k P_k = \lambda P_\sigma + (1-\lambda) B_0 = B.
 \end{aligned}$$

Ainsi par récurrence, pour tout $m \in \llbracket n; n^2 \rrbracket$, toute matrice bistochastique ayant exactement m coefficients non nuls appartient à l'enveloppe convexe de \mathcal{P}_n . Ceci rassemble toutes les matrices bistochastiques d'où $\mathcal{B}_n \subset \text{Conv}(\mathcal{P}_n)$ puis $\mathcal{B}_n = \text{Conv}(\mathcal{P}_n)$.

Points extrémaux des matrices bistochastiques

Points extrémaux des matrices orthogonales

XIII.9 Correction Fonctions à valeurs vectorielles

XIII.9.1 Point fixe de l'exponentielle complexe

[Enoncé]

XIII.9.2 Théorème du relèvement

[Enoncé]

XIII.9.3 Equation fonctionnelle de l'exponentielle matricielle ★★ ★

[Enoncé]

1. On remarque déjà que $\varphi(0) = \varphi(0)^2$ et que $\forall (s, t) \in \mathbb{R}^2$, $\varphi(s)\varphi(t) = \varphi(s+t) = \varphi(t)\varphi(s)$. Alors si l'on fixe $s \in \mathbb{R}$ et que l'on dérive par rapport à t en 0 : φ est dérivable en s et $\varphi(s)\varphi'(0) = \varphi'(s) = \varphi'(0)\varphi(s)$.

Notons $C_1(s), \dots, C_n(s)$ les colonnes de $\varphi(s)$, $f : \begin{cases} \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})^n & \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ (C_1, \dots, C_n) & \longmapsto (C_1 \mid \dots \mid C_n) \end{cases}$

et $g : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})^n \\ s & \longmapsto (C_1(s), \dots, C_n(s)) \end{cases}$.

f est linéaire et g est dérivable car toutes ses composantes le sont. Ainsi $\forall s \in \mathbb{R}$, $\varphi'(s) = (f \circ g)'(s) = f(g'(s)) = (C'_1(s) \mid \dots \mid C'_n(s))$. Par conséquent,

$\forall s \in \mathbb{R}$, $\varphi'(s) = \varphi'(0)\varphi(s) \implies \forall s \in \mathbb{R}$, $\forall k \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $C'_k(s) = \varphi'(0)C_k(s) \implies \forall s \in \mathbb{R}$, $\forall k \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $C_k(s) = e^{s\varphi'(0)}C_k(0) \implies \forall s \in \mathbb{R}$, $\varphi(s) = e^{s\varphi'(0)}\varphi(0)$.

De plus, on montre que comme $\varphi'(0)$ et $\varphi(0)$ commutent, $e^{s\varphi'(0)}$ et $\varphi(0)$ commutent pour tout réel s (par continuité du produit matriciel ou en montrant que $e^{s\varphi'(0)}$ est un polynôme en $\varphi'(0)$ par exemple).

Réciproquement donnons nous A une matrice de projection ainsi que B une matrice commutant avec A et vérifions que $\varphi : x \mapsto Ae^{xB}$ vérifie : $\forall (s, t) \in \mathbb{R}^2$, $\varphi(s+t) = \varphi(s)\varphi(t)$.

On sait que A commute avec e^{xB} quel que soit $x \in \mathbb{R}$ et que si M et N commutent, $e^{M+N} = e^M e^N$ d'où :

$\forall (s, t) \in \mathbb{R}^2$, $\varphi(s)\varphi(t) = Ae^{sB}Ae^{tB} = e^{sB}A^2e^{tB} = e^{sB}Ae^{tB} = Ae^{sB}e^{tB} = Ae^{(s+t)B} = \varphi(s+t)$.

2. φ est un morphisme de groupes donc $\varphi(0) = I_n$. Fixons $T > 0$ et $s \in \mathbb{R}$. En intégrant par rapport à t entre 0 et T :

$$\varphi(s) \int_0^T \varphi(t) dt = \int_0^T \varphi(s+t) dt = \int_s^{s+T} \varphi(t) dt.$$

Montrons que $A(T) = \int_0^T \varphi(t) dt$ est inversible pour T assez petit.

Soit $\varepsilon > 0$.

D'après le théorème fondamental de l'analyse, A est \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R} et $A(T) \underset{T \rightarrow 0}{=} A(0) + TA'(0) + o(T) \underset{T \rightarrow 0}{=} TI_n + o(T)$. Ainsi $\frac{1}{T}A(T) \xrightarrow{T \rightarrow 0} I_n$ d'où $\frac{1}{T^n} \det(A(T)) \xrightarrow{T \rightarrow 0} 1$ c'est à dire $\det(A(T)) \underset{T \rightarrow 0}{\sim} T^n$.

Or $T^n > 0$ lorsque $T > 0$. Donc $\exists T_1 \in \mathbb{R}_+^*$, $\det(A(T_1)) > 0$.

Ainsi, pour $T = T_1$, $\varphi(s) = A(T_1)^{-1}(\Phi(s + T_1) - \Phi(s))$. Cette dernière expression est \mathcal{C}^1 en s donc φ est \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R} et on se retrouve dans le cas de la question précédente.

XIII.9.4 Formule de Trotter-Kato ★★

[Enoncé]

1. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Par récurrence immédiate, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\|M^n\| \leq \|M\|^n$.

Comme toutes les sommes qu'on va écrire convergent, par inégalité triangulaire,

$$\|e^M\| = \left\| \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{M^n}{n!} \right\| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \left\| \frac{M^n}{n!} \right\| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\|M\|^n}{n!} = e^{\|M\|}.$$

$$\text{Ainsi, } \left\| \exp\left(\frac{A}{k}\right) \exp\left(\frac{B}{k}\right) \right\| \leq \left\| \exp\left(\frac{A}{k}\right) \right\| \left\| \exp\left(\frac{B}{k}\right) \right\| \leq \exp\left(\frac{\|A\|}{k}\right) \exp\left(\frac{\|B\|}{k}\right) = \exp\left(\frac{\|A\| + \|B\|}{k}\right).$$

2. D'après le cours, pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $f : t \mapsto e^{tM}$ est \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R} et $\forall t \in \mathbb{R}$, $f'(t) = Me^{tM}$. Ainsi h est \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R} par opérations et $\forall t \in \mathbb{R}$, $h'(t) = Ae^{tA}e^{tB} + e^{tA}Be^{tB} - (A+B)e^{t(A+B)}$.

On en déduit le développement limité en 0 de h à l'ordre 1 :

$$h(t) \underset{t \rightarrow 0}{=} h(0) + th'(0) + o(t^2) \underset{t \rightarrow 0}{=} o(t^2).$$

$$\text{Or } \frac{1}{k} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0 \text{ donc } h\left(\frac{1}{k}\right) = X_k - Y_k \underset{k \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{k^2}\right).$$

$$3. \sum_{i=0}^{k-1} X_k^i (X_k - Y_k) Y_k^{k-i-1} = \sum_{i=0}^{k-1} X_k^{i+1} Y_k^{k-i-1} - \sum_{i=0}^{k-1} X_k^i Y_k^{k-i} = \sum_{i=1}^k X_k^i Y_k^{k-i} - \sum_{i=0}^{k-1} X_k^i Y_k^{k-i} = X_k^k - Y_k^k.$$

4. On sait que $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $Y_k^k = \exp(A + B)$. Or, $\forall k \in \mathbb{N}^*$,

$$\|X_k^k - Y_k^k\| \leq \sum_{i=0}^{k-1} \|X_k\|^i \|X_k - Y_k\| \|Y_k\|^{k-i-1} = \|X_k - Y_k\| \sum_{i=0}^{k-1} \exp\left(\frac{\|A\| + \|B\|}{k}\right)^{k-1} = \|X_k - Y_k\| k \exp\left(\frac{\|A\| + \|B\|}{k}\right)^{k-1}.$$

$$\text{Et } k \|X_k - Y_k\| \underset{k \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{k}\right) \text{ et } \exp\left(\frac{\|A\| + \|B\|}{k}\right)^{k-1} = \exp\left(\frac{k-1}{k}(\|A\| + \|B\|)\right) \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} \exp(\|A\| + \|B\|).$$

$$\text{Donc } \|X_k^k - Y_k^k\| \underset{k \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{k}\right) \text{ d'où } \lim_{k \rightarrow +\infty} \left(\exp\left(\frac{A}{k}\right) \exp\left(\frac{B}{k}\right) \right)^k = \exp(A + B).$$

XIII.9.5 Série entière de matrice ★★

[Enoncé]

On sait que pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{M^n}{n!}$ converge absolument vers e^M . Donc d'après le théorème de Fubini :

$$\begin{aligned} e^{iA} + e^{-iA} &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{i^n}{n!} A^n + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-i)^n}{n!} A^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{i^{2n}}{(2n)!} A^{2n} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{i^{2n+1}}{(2n+1)!} A^{2n+1} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-i)^{2n}}{(2n)!} A^{2n} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-i)^{2n+1}}{(2n+1)!} A^{2n+1} \\ &= 2 \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{i^{2n}}{(2n)!} A^{2n} = 2 \cos(A) \end{aligned}$$

On montre de même que $e^{iA} - e^{-iA} = 2i \sin(A)$. De plus, iA et $-iA$ commutent donc $e^{iA} e^{-iA} = e^{iA-iA} = I_n$

Ainsi, $\cos^2(A) + \sin^2(A) = \left(\frac{e^{iA} + e^{-iA}}{2} \right)^2 + \left(\frac{e^{iA} - e^{-iA}}{2i} \right)^2 = \frac{1}{4} [e^{2iA} + 2I_n + e^{-2iA} - (e^{2iA} - 2I_n + e^{-2iA})] = I_n$.

XIII.9.6 Expression d'un projecteur

[Enoncé]

XIII.9.7 Une preuve analytique de Cayley-Hamilton

[Enoncé]

XIII.9.8 Exemple de fonctions lipschitzienne[\[Enoncé\]](#)**XIII.9.9 Condition de continuité sur un espace vectoriel normé**[\[Enoncé\]](#)**XIII.9.10 Application linéaire (2)**[\[Enoncé\]](#)**XIII.9.11 Mouvement à force centrale**[\[Enoncé\]](#)**XIII.9.12 Dérivée d'un produit de deux matrices**[\[Enoncé\]](#)**XIII.9.13 Inégalité des accroissements finis pour un espace euclidien**[\[Enoncé\]](#)**XIII.10 Correction Equations différentielles****XIII.10.1 Equations différentielles du premier ordre**[\[Enoncé\]](#)**XIII.10.2 Equations différentielles du second ordre**[\[Enoncé\]](#)

XIII.10.3 Problèmes de raccordement

[\[Enoncé\]](#)

XIII.10.4 Suite d'équations différentielles

[\[Enoncé\]](#)

XIII.10.5 Equation de Bernoulli (1)

[\[Enoncé\]](#)

XIII.10.6 Equation de Bernoulli (2)

[\[Enoncé\]](#)

XIII.10.7 Etude asymptotique des solutions d'une équation différentielle ★★☆☆

[\[Enoncé\]](#)

1. f est solution de $(E) : y' + ay = f' + af$ sur \mathbb{R}_+ .

Les solutions de (E) sur \mathbb{R}_+ sont les fonctions $f_C : \begin{cases} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow \mathbb{C} \\ x & \longmapsto Ce^{-ax} + e^{-ax} \int_0^x (f'(t) + af(t)) dt \end{cases}$

avec $C \in \mathbb{C}$.

Soit $C \in \mathbb{C}$ tel que $f = f_C$.

D'une part, $|Ce^{-ax}| = |C|e^{-\Re(a)x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ car $-\Re(a) < 0$.

D'autre part, $(f'(t) + af(t))e^{at} \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o(e^{at})$ et $\int_0^{+\infty} e^{at} dt$ diverge car $\Re(a) > 0$ donc,

$$\int_0^x (f'(t) + af(t))e^{at} dt \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o\left(\int_0^x e^{at} dt\right) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(e^{ax}).$$

D'où $\lim_{+\infty} f = \lim_{+\infty} f_C = 0$.

2. Notons $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$ et $g = f' - jf$. Alors $g' - \bar{j}g = f'' + f' + f$ admet une limite nulle en $+\infty$. Comme $\Re(-\bar{j}) > 0$, la question 1 montre que g admet une limite nulle en $+\infty$. et alors, comme $\Re(-j) > 0$, encore d'après la question 1, f admet une limite nulle en $+\infty$.

3. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme dont toutes les racines sont à parties réelles strictement négatives. Notons $n = \deg(P)$ et donnons nous une fonction $f \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R}_+, \mathbb{C})$ telle que $\lim_{+\infty} P(D)(f) = 0$.

Raisonnons par récurrence sur le degré de P .

Si $n = 0$ il n'y a rien à démontrer.

Supposons que $n \geq 1$ et que le résultat est vrai pour les polynômes de degré $n - 1$.

On se donne une racine a de P pour écrire $P = (X - a)Q$ avec $\deg(Q) = n$. Posons $g = Q(D)(f)$. Alors $g' - ag = D \circ Q(D)(f) - aQ(D)(f) = P(D)(f)$ admet une limite nulle en $+\infty$. Or $\Re(-a) > 0$ donc d'après la question 1, g admet une limite nulle en $+\infty$. Et alors d'après l'hypothèse de récurrence, f admet une limite nulle en $+\infty$.

Par récurrence, le résultat est vrai pour tout $n \in \mathbb{N}$.

XIII.10.8 Inéquation différentielle

[\[Enoncé\]](#)

XIII.10.9 Solution 2π -périodique d'une équation différentielle

[\[Enoncé\]](#)

XIII.10.10 Superposition de solutions

[\[Enoncé\]](#)

XIII.10.11 Fonction de Bessel

[\[Enoncé\]](#)

XIII.10.12 Développement de la cotangente (2)

[\[Enoncé\]](#)

XIII.10.13 Wronskien

[\[Enoncé\]](#)

XIII.10.14 Utilité du wronskien[\[Énoncé\]](#)**XIII.10.15 Principe d'entrelacement des zéros de Sturm**[\[Énoncé\]](#)**XIII.10.16 Solution qui s'annule**[\[Énoncé\]](#)**XIII.10.17 Solution qui s'annule une infinité de fois**[\[Énoncé\]](#)**XIII.10.18 Lemme de Grönwall**[\[Énoncé\]](#)

Application du lemme de Grönwall

XIII.10.19 Théorème de Floquet[\[Énoncé\]](#)**XIII.10.20 Méthode de Lagrange (1)**[\[Énoncé\]](#)**XIII.10.21 Méthode de Lagrange (2)**[\[Énoncé\]](#)**XIII.10.22 Équation différentielle matricielle non linéaire**[\[Énoncé\]](#)

XIII.10.23 Système dynamique

[Enoncé]

XIII.10.24 Solutions de norme constante ★★

[Enoncé]

Supposons que $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

Soit X une solution du système différentiel $Y' = AY$. On sait que $\forall t \in \mathbb{R}, X(t) = e^{tA}X(0)$.
 Or $\forall t \in \mathbb{R}, e^{tA} \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. En effet, par continuité de la transposition, $\forall t \in \mathbb{R}, (e^{tA})^\top = e^{tA^\top} = e^{-tA} = (e^{tA})^{-1}$.

Ainsi, $\forall t \in \mathbb{R}, \|X(t)\| = \|X(0)\|$.

Réciproquement, supposons que $X' = AX \implies \forall t \in \mathbb{R}, \|X(t)\| = \|X(0)\|$.

Donnons nous une solution X du système différentiel.

En notant $X_0 = X(0)$, $\forall t \in \mathbb{R}, \|X(t)\|^2 = \|X_0\|^2 \iff X(t)^\top X(t) = X_0^\top X_0 \iff X_0^\top e^{tA^\top} e^{tA} X_0 = X_0^\top X_0$.

On fait un développement à l'ordre 1 en 0 :

$X_0^\top (I_n + tA^\top + o(t))(I_n + tA + o(t))X_0 \underset{t \rightarrow 0}{=} X_0^\top X_0$ c'est à dire $X_0^\top X_0 \underset{t \rightarrow 0}{=} X_0^\top X_0 + tX_0^\top (A^\top + A)X_0 + t^2 X_0^\top A^\top A X_0 + o(t) \underset{t \rightarrow 0}{=} X_0^\top X_0 + tX_0^\top (A + A^\top)X_0 + o(t)$.

Ainsi $tX_0^\top (A^\top + A)X_0 + o(t) \underset{t \rightarrow 0}{=} 0$ puis $X_0^\top (A^\top + A)X_0 = 0$ par unicité du développement limité.

Ceci est vrai pour tout $X_0 \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ puisque $t \mapsto e^{tA}X_0$ est solution du système différentiel quel que soit $X_0 \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

Or $A^\top + A$ est symétrique réelle donc d'après le théorème spectral elle est diagonalisable.

Donnons nous $\lambda \in \text{Sp}(A^\top + A)$ et X_λ un vecteur propre associé.

$X_\lambda^\top (A^\top + A)X_\lambda = 0 \implies X_\lambda^\top (\lambda X_\lambda) = \lambda \|X_\lambda\|^2 = 0 \implies \lambda = 0$.

Ainsi $A^\top + A$ est semblable à la matrice nulle et est donc nulle, c'est à dire $A = -A^\top$ ou encore $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

XIII.10.25 Exponentielles de matrices qui commutent ★★

[Enoncé]

- On sait d'après le cours que f_M est \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R} quel que soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\forall t \in \mathbb{R}, f'_M(t) = M e^{tM} = e^{tM} M$. De plus l'application $h : (M, N) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2 \mapsto AB$ est bilinéaire. Ainsi $g = t \in \mathbb{R} \mapsto h(f_{A+B}(t), f_{-B}(t))$ est \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R} et,
 $\forall t \in \mathbb{R}, g'(t) = h(f'_{A+B}(t), f_{-B}(t)) + h(f_{A+B}(t), f'_{-B}(t)) = (A + B)e^{t(A+B)}e^{-tB} + e^{t(A+B)}(-B)e^{-tB}$.

Montrons que si deux matrices M et N commutent alors M et e^N commutent. On pose

pour tout $p \in \mathbb{N}$, $S_p = \sum_{k=0}^p \frac{N^k}{k!}$. Fixons $p \in \mathbb{N}$.

Comme S_p est un polynôme en N on a $h(M, S_p) = MS_p = S_pM = h(S_p, M)$. Or l'application h est bilinéaire et donc continue car $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est de dimension finie.

Ainsi comme $S_p \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} e^N$, on a $h(M, e^N) = h(e^N, M)$ c'est à dire $Me^N = e^N M$.

On en déduit comme $-B$ et $A+B$ commutent que $\forall t \in \mathbb{R}$, $h'(t) = (A+B)e^{t(A+B)}e^{-tB} - Be^{t(A+B)}e^{-tB} = Ae^{t(A+B)}e^{-tB}$.

Ainsi f_A et g vérifient le problème de Cauchy $\begin{cases} y' = Ay \\ y(0) = I_n \end{cases}$.

Par unicité de la solution d'un problème de Cauchy $g = f_A$.

Donc en sachant que $\forall t \in \mathbb{R}$, $e^{-tB} = (e^{tB})^{-1}$,

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad e^{t(A+B)} = e^{tA}e^{tB}$$

2. Supposons que $\forall t \in \mathbb{R}$, $e^{t(A+B)} = e^{tA}e^{tB}$.

On sait que quel que soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, f_M est de classe \mathcal{C}^2 sur \mathbb{R} . Alors en dérivant deux fois,

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad (A+B)e^{t(A+B)} = e^{tA}Ae^{tB} + e^{tA}Be^{tB} = e^{tA}(A+B)e^{tB}$$

Puis,

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad (A+B)^2 e^{t(A+B)} = e^{tA}A(A+B)e^{tB} + e^{tA}(A+B)Be^{tB}$$

En particulier pour $t = 0$:

$$(A+B)^2 = A(A+B) + (A+B)B$$

C'est à dire :

$$A^2 + AB + BA + B^2 = A^2 + AB + AB + B^2$$

Ou encore :

$$BA = AB$$

XIII.10.26 Lemme de Hochschild

[\[Enoncé\]](#)

XIII.11 Correction Calcul différentiel

XIII.11.1 Calcul de dérivées partielles

[Enoncé]

XIII.11.2 Existence de dérivées partielles

[Enoncé]

XIII.11.3 Etude d'une fonction

[Enoncé]

XIII.11.4 Une équation fonctionnelle ★★

[Enoncé]

1. Soit f une fonction constante égale à c solution (1). On a donc $2c = 2c^2$ donc $c = 0$ ou $c = 1$. Ainsi $f : x \rightarrow 0$ et $f : x \rightarrow 1$.
2. a. Pour $x = 0$ et $y = 0$, on a : $2f(0) = 2f(0)^2$ donc $f(0) = 1$ ou $f(0) = 0$.
Supposons que $f(0) = 0$. $\forall x \in \mathbb{R}$, $2f(x) = 2f(0)f(x) = 0$. On obtient donc que f est constamment nulle sur \mathbb{R} , ce qui est absurde.
Donc $f(0) = 1$.
Soit $x \in \mathbb{R}$,

$$\forall y \in \mathbb{R}, f'(x+y) - f'(x-y) = 2f(x)f'(y)$$
 En particulier, pour $x = 0, y = 0$, $2f'(0) = 0$.
- b. Pour $x = 0$, pour tout $y \in \mathbb{R}$, $f(y) + f(-y) = 2f(y)$.
On en déduit bien que f est paire.
3. a. Les fonctions $(x, y) \mapsto x + y$ et $(x, y) \mapsto x - y$ sont de classe \mathcal{C}^2 sur \mathbb{R}^2 . Et f est de classe \mathcal{C}^2 sur \mathbb{R} .
Donc F est de classe \mathcal{C}^2
- b. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, :$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = f''(x+y) + f''(x-y), \\ \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = f''(x+y) + f''(x-y), \\ \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial x} = f''(x+y) - f''(x-y) \end{array} \right.$$

c. On remarque que $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$. On a également :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \begin{cases} \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(x, y) = 2f'(x)f(y), \\ \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}(x, y) = 2f(x)f'(y) \end{cases}$$

Donc

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f''(x)f(y) = f(x)f''(y),$$

donc pour $y = 0$, $f''(x) - \alpha f(x) = 0$ avec $\alpha = f''(0)$.

d. Si $\alpha > 0$, alors $f = x \mapsto \text{ch}(\sqrt{\alpha}x)$.

Si $\alpha = 0$, alors $f = x \mapsto 1$

Si $\alpha < 0$, alors $f = x \mapsto \cos(\sqrt{|\alpha|}x)$.

4. On vérifie que tous ses solutions trouvées conviennent.

XIII.11.5 Application linéaire

[\[Enoncé\]](#)

XIII.11.6 Opérateurs vectoriels

[\[Enoncé\]](#)

XIII.11.7 Laplacien en polaires

[\[Enoncé\]](#)

XIII.11.8 Fonction harmonique

[\[Enoncé\]](#)

XIII.11.9 Mines ponts MP 2016

[\[Enoncé\]](#)

XIII.11.10 Différentielle de l'exponentielle matricielle

[\[Enoncé\]](#)

XIII.11.11 Différentielle de la norme euclidienne[\[Enoncé\]](#)**XIII.11.12 Différentielle de l'inversion matricielle**[\[Enoncé\]](#)**XIII.11.13 Gradient et différentielle du déterminant**[\[Enoncé\]](#)**XIII.11.14 Espace tangent aux matrices orthogonales en l'identité**

Soit $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. On pose $f : t \in \mathbb{R} \mapsto e^{tA}$.

Par continuité de la transposition, qui est linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, un espace vectoriel normé de dimension finie,

$$\forall t \in \mathbb{R}, (e^{tA})^\top = e^{(tA)^\top} = e^{-tA} = (e^{tA})^{-1}.$$

Ainsi f est à valeurs dans $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

De plus f est dérivable sur \mathbb{R} et $\forall t \in \mathbb{R}, f'(t) = Ae^{tA}$.

On a donc $f(0) = I_n$ et $f'(0) = A$ d'où $f \in T_{I_n}(\mathcal{O}_n(\mathbb{R}))$.

Réciproquement, donnons nous $A \in T_{I_n}(\mathcal{O}_n(\mathbb{R}))$.

Il existe $\varepsilon > 0$ et $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ dérivable en 0 telle que $\gamma(0) = I_n$ et $\gamma'(0) = A$.

$$(*) : \forall t \in]-\varepsilon, \varepsilon[, \gamma(t)^\top \gamma(t) = I_n.$$

Par linéarité de la transposition, $\psi : t \mapsto \gamma(t)^\top$ est dérivable en 0 et $\psi'(0) = \gamma'(0)^\top = A^\top$.

On peut alors dériver la relation (*) en 0 :

$$\gamma'(0)\gamma(0)^\top + \gamma(0)\gamma'(0)^\top = A^\top + A = 0$$

Ainsi $A^\top = -A$ c'est à dire $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

XIII.11.15 Vecteur propre d'un endomorphisme auto-adjoint[\[Enoncé\]](#)**XIII.11.16 Quotient de Rayleigh**[\[Enoncé\]](#)

XIII.11.17 Différentielle du déterminant[\[Enoncé\]](#)**XIII.11.18 Equation de d'Alembert**[\[Enoncé\]](#)**XIII.11.19 Utilisation des extrémis liés (1)**[\[Enoncé\]](#)**XIII.11.20 Utilisation des extrémis liés (2)**[\[Enoncé\]](#)**XIII.11.21 Utilisation des extrémis liés (3)**[\[Enoncé\]](#)**XIII.11.22 Sinus complexe**[\[Enoncé\]](#)**XIII.11.23 Entropie**[\[Enoncé\]](#)**XIII.11.24 Fonction convexe sur \mathbb{R}^n** [\[Enoncé\]](#)**XIII.11.25 Chemin le plus court entre deux points**[\[Enoncé\]](#)

XIII.11.26 Fonction homogène[\[Énoncé\]](#)**XIII.11.27 Problème de Dirichlet et principe du maximum**[\[Énoncé\]](#)**XIII.11.28 La méthode des moindres carrés**[\[Énoncé\]](#)**XIII.11.29 Equation de la chaleur**[\[Énoncé\]](#)

XIII.12 Correction Divers

XIII.12.1 Développement décimal propre d'un réel

[\[Énoncé\]](#)

Une caractéristique des rationnels

XIII.12.2 Distribution du premier chiffre des puissances de 2

[\[Énoncé\]](#)

XIII.12.3 Série de Engel

[\[Énoncé\]](#)

XIII.12.4 Théorème de Müntz

[\[Énoncé\]](#)