Liste non exhaustive de classiques

Tome I : Analyse

Une compilation d'exercice mathématiques
pour étudiants de classe préparatoire MP, PSI et PC



Auteur : Marconot Lorenzo , Esteve Arthur

Collection Prépas – Mathématiques

lycée Dumont D'Urville

A M. Garcin et M. Teyssier,
à Tan, la légende,
à Arsinoé, Félix et Célian qui nous ont inspiré,
et aux 5/2 de la promo 2024-2025.
"La prépa, c'est du sang, des larmes et de la sueur".

Avant Propos

Salut à toi jeune CPGEiste, alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple : savais-tu que 95 % des étudiants en prépa ne savent pas comment aborder un problème ? Alors, est-ce que tu veux en faire partie ? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié ou commencer très rapidement à accumuler du savoir avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir faire partie de l'élite ? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue.

Bon, en vrai sans déconner, Arthur et moi-même sommes passés par-là, on a fait 3 ans de classe préparatoire au lycée Dumont d'Urville, donc on connaît très bien la prépa et ses enjeux. On a voulu transmettre un morceau de ce que l'on pense qui vous sera utile, à l'instar de nos 5/2 (s/o Arsinoé Payet, Félix Gauci et Célian Rosello) qui ont écrit un formulaire en Chimie et en SI (que je ne saurais trop vous conseiller de lire avant chaque DS pour revoir les formules à connaître). On souhaite que soit transmis un héritage au sein de Dumont pour que chaque année, les prédécesseurs aident les suivants.

Déjà, à qui servent-ils ? Il est utile à tout étudiant peu importe son niveau ou son ambition. Dans cet ouvrage, on a essayé de compiler tous les exercices classiques (vus en colle, en DS ou en TD) que l'on a trouvés pertinents, car ils sont soit omniprésents aux concours, soit demandant un raisonnement qu'il est impératif d'avoir vu pour acquérir des réflexes très utiles si l'on est bloqué. Il est vrai que ce recueil d'exercices contient énormément d'exercices difficiles, mais il ne faut pas avoir peur : il y a énormément d'exercices abordables et que vous devez impérativement faire et puis, pour réussir en prépa, il faut « avoir les dents qui rayent le parquet », faut vouloir tout déchirer pour obtenir ce que l'on veut et c'est à cela que servent ces ouvrages : vous proposer une liste d'exercices qu'il faut voir (et revoir autant de fois que nécessaire) avant les concours. Ces ouvrages sont également destinés aux étudiants ne souhaitant pas faire d'études d'ingénieur et qui souhaitent aller en licence. Ils permettent d'avoir toutes les bases nécessaires pour appréhender en toute confiance les chapitres de la L3.

Bon, cet ouvrage est uniquement là en complément de cours : il faut d'abord assimiler le cours avec le prof pour pouvoir s'en sortir en prépa, donc on privilégie les exos du TD. On a créé ce recueil pour que les théorèmes ou résultats classiques soient recensés au même endroit.

P.-S. : On essaie de compléter au fur et à mesure les corrections des deux livres, cela demande un temps de dingue mais on promet de proposer un maximum de corrigés avant les concours.

P.-P.-S. : Ce message est destiné à tous les futurs 5/2, je souhaiterais que pendant votre temps de révision, vous envisagiez de perpétuer l'héritage pour que d'ici quelques années Dumont d'Urville soit au sommet. Je ne vous demande pas de faire un aussi gros projet, mais cela serait vraiment super de pouvoir aider les futurs élèves à relever le défi qu'est la prépa en toute confiance.

Légende et notations

Un exercice est affilié d'un certain nombre d'étoiles ☆ relativement à sa difficulté :

— ☆ Démonstration ou application directe du cours (le plus souvent E3A, CCINP) ;
— ☆☆ Application du cours/de méthodes usuelles (le plus souvent CCINP, Mines-Télécom) ;
— ☆☆☆ Application du cours/de méthodes usuelles (le plus souvent Centrale, Mines-Ponts) ;
— ☆☆☆☆ Exercice exotique/peu ou pas guidé (Centrale, Mines-Pont, X-ENS) ;
— ☆☆☆☆☆ Exercice exotique/peu ou pas guidé (le plus souvent X-ENS).

Ces étoiles suivent un code couleur indicatif du concours auquel l'exercice aurait le plus de chance d'être posé, à l'écrit ou à l'oral :

— Aucun concours spécifique ☆
— E3A/CCINP ☆
— Mines-Télécom ☆
— Mines-Ponts/Centrale ☆
— X-ENS ☆

Pour des exercices considérés comme des "classiques" qui tombent régulièrement, le titre de l'exercice sera souligné. Par exemple Série harmonique : ☆☆☆ indique que l'exercice nommé "Série harmonique" est un immanquable de tous les candidats qui se préparent à E3A/CCINP.
Enfin, un exercice qui utilise ou traite des notions hors du programme (de MP) sera suivi d'un label (HP).

Table des matières

I Suite et série numérique **13**

I.1 Lemme de Cesàro ★★ . . . 13
I.2 Théorèmes Taubériens d'Hardy ★ . . . 13
I.3 Série harmonique ★★★ . . . 14
I.4 Suite récurrente (1) ★★★ . . . 14
I.5 Suite récurrente (2) ★★★ . . . 14
I.6 Suite récurrente (3) ★★★ . . . 14
I.7 Suite récurrente (4) ★★ . . . 15
I.8 Suite récurrente (5) ★★★★ . . . 15
I.9 Suite récurrente (6) ★★★ . . . 15
I.10 Suite définie implicitement (1) ★★ . . . 15
I.11 Suite définie implicitement (2) ★★ . . . 15
I.12 Suite définie implicitement (3) ★★ . . . 16
I.13 Suite définie implicitement (4) ★★ . . . 16
I.14 Suite définie implicitement (5) ★★★ . . . 16
I.15 Formule d'inversion de Pascal . . . 16
I.16 Théorème de Pringsheim ★★★ . . . 17
I.17 Lemme de Fekete ★★★ . . . 17
I.18 Théorème de Bolzano-Weierstrass ★★★ . . . 18
I.19 Suites de Cauchy ★★ . . . 18
I.20 Récurrence de Cauchy ★★★ . . . 18
I.21 Sommes de Riemann ★★ . . . 18
I.22 Formule d'Euler-Maclaurin ★★★ . . . 18
I.23 Nature d'une suite ★★ . . . 19
I.24 Etude d'une suite avec une condition de convergence . . . 19
I.25 Valeurs d'adhérences d'une suite ★★★★ . . . 19
I.26 Nature d'une série (1) ★ . . . 19
I.27 Nature d'une série (2) ★★ . . . 19
I.28 Nature d'une série (3) ★★★ . . . 19
I.29 Nature d'une série (4) . . . 19
I.30 Nature d'une série (5) ★★★★ . . . 20
I.31 Nature d'une série (6) ★★★★ . . . 20
I.32 Nature d'une série (7) ★★★ . . . 20
I.33 Calcul d'un équivalent ★★★★ . . . 20
I.34 Sommation de relations de comparaison ★ . . . 20
I.35 Equivalent de séries de Riemann ★ . . . 20
I.36 Séries de Bertrand ★★ . . . 20
I.37 Critère de Raabe-Duhamel ★★ . . . 21

I.38 Règle de d'Alembert ★★ . . . 21
I.39 Règle de Cauchy ★★ . . . 21
I.40 d'Alembert $\Longrightarrow$ Cauchy ★★★ . . . 21
I.41 Transformation et règle d'Abel ★★ . . . 22
I.42 Equation différentielle discrète ★★★ . . . 22
I.43 Critère spécial des série alternées ★ . . . 22
I.44 Calcul d'une somme de série (1) ★★★ . . . 22
I.45 Calcul d'une somme de série (2) ★ . . . 22
I.46 Calcul d'une somme de série (3) ★★★ . . . 23
I.47 Calcul d'une somme de série (4) ★★ . . . 23
I.48 Calcul d'une somme de série (5) . . . 23
I.49 Calcul d'une somme de série (6) . . . 23
I.50 Calcul d'une somme de série (7) ★★ . . . 23
I.51 Calcul d'une somme de série (8) ★★★★ . . . 23
I.52 Calcul d'une somme de série (9) . . . 23
I.53 Décomposition en éléments simples infinie . . . 24
I.54 Problème de Bâle . . . 24
I.55 Nombre moyen de diviseurs d'un entier ★★★★ . . . 25
I.56 Théorème de réarrangement de Riemann ★★★★★ . . . 25
I.57 Moyennes arithmétique, géométrique et harmonique ★ . . . 25
I.58 Inégalité de Carleman ★★★ . . . 25

II Intégrale **27**
II.1 Règle de Bioche ★ . . . 27
II.2 Intégrale de Wallis ★★ . . . 27
II.3 Formule de Stirling ★★ . . . 27
II.4 Intégrale de Gauss . . . 27
II.5 Intégrale de Fresnel ★★★ . . . 28
II.6 Intégrale de Dirichlet . . . 28
II.7 Intégrale du reste de l'intégrale de Dirichlet ★★★ . . . 29
II.8 Intégrale d'Euler ★★ . . . 29
II.9 Fonction intégrale ★★★ . . . 29
II.10 Intégrales de Bertrand . . . 29
II.11 Intégrales de Hardy (1) . . . 30
II.12 Intégrabilité des cosinus de polynôme . . . 30
II.13 Nature d'une intégrale (1) ★★ . . . 30
II.14 Nature d'une intégrale (2) ★★ . . . 31
II.15 Nature d'une intégrale (3) ★★★ . . . 31
II.16 Nature d'une intégrale (4) ★★★★ . . . 31
II.17 Pondération par la fonction inverse . . . 31
II.18 Pondération par $\dfrac{1}{1+t^a}$ . . . 31
II.19 Pondération par le sinus . . . 31
II.20 Intégrale sur une période . . . 31
II.21 Changement de variable . . . 32
II.22 Divergence grossière . . . 32
II.23 Norme L^2 . . . 32
II.24 Inégalité de Kolmogorov . . . 32
II.25 ENS PC 2025 ★★★ . . . 32
II.26 Intégrale de Frullani (1) ★★★ . . . 33
II.27 Intégrales de Frullani (2) ★★★ . . . 33
II.28 Calcul d'une intégrale (1) ★★★ . . . 33
II.29 Calcul d'une intégrale (2) ★★ . . . 33
II.30 Calcul d'une intégrale (3) ★★★ . . . 33
II.31 Calcul d'une intégrale (4) ★★★ . . . 33
II.32 Permutation Série-intégrale (1) . . . 34

II.33 Permutation série-intégrale (2) . . . 34
II.34 Fonction d'écart logarithmique intégral ★★ . . . 34
II.35 Intégrale de Bernoulli ★★★ . . . 34
II.36 Lemme de Riemann-Lebesgue : cas des fonctions $\mathcal{C}^1$ ★ . . . 34
II.37 Intégrale de Poisson (1) ★★ . . . 34
II.38 Intégrale de Poisson (2) ★★★ . . . 34
II.39 Mines-Ponts MP 2024 . . . 35
II.40 Une suite d'intégrales (1) . . . 35
II.41 Une suite d'intégrales (2) . . . 35
II.42 Une suite d'intégrales (3) . . . 35
II.43 Constante d'Apéry . . . 36
II.44 Comportement asymptotique (1) . . . 36
II.45 Comportement asymptotique (2) . . . 36
II.46 Comportement asymptotique (3) . . . 36
II.47 Comportement asymptotique (4) . . . 36
II.48 Théorème de d'Alembert-Gauss (1) ★★ . . . 36
II.49 Fonction Gamma d'Euler ★★ . . . 37
II.50 Fonction Bêta d'Euler ★★ . . . 38
II.51 Inégalité intégrale-dérivée . . . 39
II.52 Majoration de l'erreur dans la méthode des trapèzes ★★ . . . 39
II.53 Inégalité de Young ★★ . . . 39
II.54 Transformée de Laplace ★★★★ . . . 39
II.55 Théorème des résidus (Version faible) (HP) ★★★ . . . 39

III Fonction réelle **41**
III.1 Formule de Leibniz ★ . . . 41
III.2 Fonction discontinue en tout point ★ . . . 41
III.3 Fonction nulle part dérivable ★★★ . . . 41
III.4 Théorème de Rolle . . . 41
III.5 Inégalité intégrale de Jensen ★ . . . 41
III.6 Lemme de Croft ★★ . . . 42
III.7 Dérivée symétrique ★ . . . 42
III.8 Continuité au sens de Cesàro ★★★ . . . 42
III.9 Une équation fonctionnelle (1) ★★★ . . . 42
III.10 Une équation fonctionnelle (2) . . . 42
III.11 Fonction de Pringsheim ★★ . . . 42
III.12 $f \circ f = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}_+}$ ★★ . . . 42
III.13 Point fixe d'une fonction continue et décroissante sur $\mathbb{R}$ ★ . . . 43
III.14 Un théorème du point fixe (1) ★ . . . 43
III.15 Un théorème du point fixe (2) ★★ . . . 43
III.16 Point fixe de $f \circ f$ ★★ . . . 43
III.17 Point fixe de $f \circ g$ et $g \circ f$ ★★ . . . 43
III.18 Racine carrée de cos ★★★ . . . 43
III.19 Trigonométrie ★ . . . 43
III.20 Règle de l'Hôpital ★★ . . . 44
III.21 Dérivabilité de la racine ★★★ . . . 44
III.22 Dérivée et inverse confondus ★★★ . . . 44
III.23 Fonction croissante et convexe sur $\mathbb{R}$ ★ . . . 44
III.24 Convexité des fonctions continues ★★★★ . . . 44
III.25 Continuité des fonctions convexes ★★ . . . 45
III.26 Théorème de Darboux ★★★★ . . . 45
III.27 Fonctions logarithmiquement convexes ★★★ . . . 45
III.28 Etude d'une fonction définie implicitement ★★★ . . . 45
III.29 Minoration de arctan ★ . . . 45
III.30 Majoration par un polynôme ★★ . . . 46
III.31 Inégalités de Kolmogorov ★★★★ . . . 46

III.32 Vers le principe des zéros isolés ★★★ . . . 46
III.33 Fonction test . . . 46
III.34 Fonction plateau . . . 47
III.35 Théorème de réalisation de Borel ★★★★ . . . 47

IV Polynôme **49**
IV.1 Théorème de d'Alembert-Gauss (2) ★★★ . . . 49
IV.2 Bernoulli ★★ . . . 49
IV.3 Lagrange ★ . . . 50
IV.4 Tchebychev ★★ . . . 50
IV.5 Hilbert ★★ . . . 51
IV.6 Laguerre ★★★ . . . 51
IV.7 Legendre ★★ . . . 52
IV.8 Hermite ★★★ . . . 52
IV.9 Bernstein ★★★ . . . 53
IV.10 Polynômes cyclotomiques ★★★ . . . 53
IV.11 Suite de polynômes définis par récurrence . . . 53
IV.12 Equation polynomiale (1) . . . 54
IV.13 Equation polynomiale (2) . . . 54
IV.14 Equation polynomiale (3) . . . 54
IV.15 Equation polynomiale (4) . . . 54
IV.16 Equation polynomiale (5) . . . 54
IV.17 Equation de Shapiro . . . 54
IV.18 Degré d'une différence ★ . . . 54
IV.19 Théorème de la racine rationnelle ★★ . . . 54
IV.20 Critère d'Eisenstein ★★★ . . . 55
IV.21 Points critiques des polynômes de Hilbert ★★★ . . . 55
IV.22 Zéros du sinus tronqué . . . 55
IV.23 Exponentielle tronquée ★ . . . 55
IV.24 Les fonctions localement polynomiales sont polynomiales ★★ . . . 56
IV.25 Intégrales de polynômes ★ . . . 56
IV.26 Théorème de Gauss-Lucas ★★ . . . 56
IV.27 Graphe d'un polynôme ★★ . . . 56
IV.28 Polynômes qui commutent avec cosinus ★★★ . . . 56
IV.29 Relation trigonométrique polynomiale ★★★ . . . 57
IV.30 Division euclidienne (1) ★★ . . . 57
IV.31 Division euclidienne (2) ★ . . . 57
IV.32 Fonctions trigonométriques polynomiale ? ★ . . . 57
IV.33 Logarithme rationnel ? ★★ . . . 57
IV.34 Une fraction rationnelle ★ . . . 57
IV.35 Dérivé d'un polynôme scindé sur $\mathbb{R}$ ★★★ . . . 57
IV.36 Une condition nécessaire pour qu'un polynôme soit scindé sur $\mathbb{R}$ ★★★ . . . 57
IV.37 Une condition nécessaire pour qu'un polynôme soit dissocié sur $\mathbb{R}$ ★★ . . . 58
IV.38 Suite de polynômes scindés sur $\mathbb{R}$ ★★★ . . . 58
IV.39 Nombre de racines d'un polynôme réel ★★ . . . 58
IV.40 Borne de Cauchy ★★ . . . 58
IV.41 Théorème d'Eneström-Kakeya ★★★ . . . 58
IV.42 Perturbations de polynômes . . . 59
IV.43 Polynômes à coefficients dans $\{-1, 0, 1\}$ . . . 59
IV.44 Théorème de Bernstein ★★★★ . . . 59
IV.45 Etude d'un polynôme défini implicitement . . . 60
IV.46 P'|P ★ . . . 60
IV.47 Polynôme positif (1) ★★★ . . . 60
IV.48 Théorème de Pythagore polynomial ★★★ . . . 60
IV.49 Polynômes à valeurs carrées . . . 60
IV.50 Polynômes réciproques ★★ . . . 60

IV.51 Polynômes surjectifs ★★★★★ . . . 61
IV.52 Résultant et discriminant ★★ . . . 61
IV.53 Théorème de Liouville : Fermat pour les polynômes ★★★★ . . . 62

V Espace vectoriel normé **63**
V.1 Suite de Cauchy ★★ . . . 63
V.2 Théorème de Fréchet-Von Neumann-Jordan . . . 63
V.3 Une norme non euclidienne . . . 63
V.4 Norme invariante par similitude . . . 63
V.5 Equivalence des normes dans un espace vectoriel normé de dimension finie . . . 64
V.6 Normes non équivalentes . . . 64
V.7 Normes semblables à la norme uniforme sur $\mathbb{K}[X]$ . . . 64
V.8 Comparaisons de deux normes sur $\mathbb{K}_n[X]$ . . . 64
V.9 Comparaisons de normes usuelles sur $\mathcal{C}^0([a,b],\mathbb{K})$ . . . 64
V.10 Normes p . . . 65
V.11 Normes de Sobolev . . . 65
V.12 Norme duale . . . 66
V.13 Norme à partir d'une famille libre . . . 66
V.14 Quelques normes matricielles . . . 66
V.15 Norme d'algèbre ★★ . . . 66
V.16 Caractérisation des sous-espaces de dimension finie de $\mathcal{C}^0([0,1],\mathbb{R})$ ★★★ . . . 67
V.17 Distance ★ . . . 67
V.18 Distance à une partie . . . 67
V.19 Distance d'un élément à une partie (1) . . . 67
V.20 Distance d'un élément à une partie (2) . . . 67
V.21 Passage par les matrices orthogonales . . . 68
V.22 Diamètre d'une partie bornée . . . 68
V.23 Détermination d'une borne inférieure . . . 68
V.24 Normes usuelles sur $\mathcal{C}^1([0,1],\mathbb{K})$ . . . 68
V.25 Intersection des boules unités subordonnées d'un espace vectoriel normé de dimension finie . . . 68
V.26 Modes de convergence . . . 69
V.27 Moyenne des itérés et projection sur l'espace des invariants d'une application linéaire contractante . . . 69
V.28 Matrice de projecteur . . . 69
V.29 Matrice de rotation . . . 69
V.30 Applications contractantes . . . 69
V.31 Une série vectorielle . . . 70
V.32 Polytopes réguliers d'un espace vectoriel euclidien . . . 70

VI Suite et série de fonctions **71**
VI.1 Etude d'une suite de fonctions (1) . . . 71
VI.2 Etude d'une suite de fonctions (2) . . . 71
VI.3 Etude d'une suite de fonctions (3) . . . 71
VI.4 Etude d'une suite de fonctions (4) . . . 71
VI.5 Etude d'une suite de fonctions (5) . . . 72
VI.6 Etude d'une suite de fonctions (6) . . . 72
VI.7 Etude d'une suite de fonctions (7) . . . 72
VI.8 Développement de la cotangente (1) . . . 72
VI.9 Etude d'une fonction définie par une série alternée (1) . . . 72
VI.10 Etude d'une fonction définie par une série alternée (2) . . . 73
VI.11 Convergence vers une dérivée . . . 73
VI.12 Limite ponctuelle et uniforme d'une suite de fonctions . . . 73
VI.13 Limite d'une suite implicite ★★ . . . 73
VI.14 Convergence des suites de polynômes ★★★ . . . 73
VI.15 Un théorème de Weierstrass sur $\mathbb{R}$? ★★★ . . . 74
VI.16 Approximation paire . . . 74
VI.17 Approximation croissante . . . 74

VI.18 Interversion Série-Intégrale . . . 74
VI.19 Série de fonction matricielle . . . 74
VI.20 Fonction ζ de Riemann . . . 74
VI.21 Expression de suites sous forme de séries . . . 75
VI.22 Etude d'une série de fonctions . . . 75
VI.23 Théorème de Dini ★★★★ . . . 75
VI.24 Suite de fonctions lipschitziennes ★★★ . . . 75
VI.25 Phénomène de Runge . . . 76
VI.26 Théorème de Weierstrass . . . 76
VI.27 Théorème de Chudnovsky ★★★★ . . . 77
VI.28 Théorème de Korovkin ★★★★ . . . 77
VI.29 Théorème de Fejér ★★★★★ . . . 77
VI.30 Théorème de sélection de Helly ★★★★ . . . 78

VII Série entière **79**
VII.1 Lemme d'Abel . . . 79
VII.2 Fonction non développable en série entière . . . 79
VII.3 CCINP MP 2019 . . . 79
VII.4 Série entière de terme général binomial . . . 79
VII.5 Formule de Cauchy . . . 80
VII.6 Principe des zéros isolés . . . 80
VII.7 Produit de Hadamard . . . 80
VII.8 Théorème de Liouville . . . 80
VII.9 Inverse d'une série entière . . . 80
VII.10 Equivalent de séries entières . . . 80
VII.11 Théorème de d'Alembert-Gauss . . . 81
VII.12 Développement de fraction rationnelle autour de 0 . . . 81
VII.13 Fonction quasi-polynomiale . . . 81
VII.14 Série de Lambert . . . 82
VII.15 Somme de Goldbach . . . 82
VII.16 Une somme avec l'indicatrice d'Euler . . . 82
VII.17 Coefficients définies par des intégrales . . . 82
VII.18 Détermination des coefficients d'un développement en série entière . . . 83
VII.19 Série génératrice du nombre de points à coordonnées entières dans un quart de disque . . . 83
VII.20 Nombre d'involution . . . 84
VII.21 Théorème d'André . . . 84
VII.22 Théorème d'Abel . . . 84
VII.23 Théorèmes taubériens d'Abel . . . 85

VIII Topologie **87**
VIII.1 Normes d'opérateur ★ . . . 87
VIII.2 $\mathbb{Z}$ est fermé ★ . . . 87
VIII.3 Orthogonalité et topologie ★★ . . . 87
VIII.4 Ensemble des valeurs d'adhérence d'une suite ★★★ . . . 87
VIII.5 Ensemble des suites convergents vers 0 ★★ . . . 88
VIII.6 Calcul d'une adhérence ★★★ . . . 88
VIII.7 Partie ouverte et fermée simultanément ★★★ . . . 88
VIII.8 Opérations sur les adhérences/intérieurs . . . 88
VIII.9 Les sept espaces de Kuratowski ★★★ . . . 88
VIII.10 Intérieur d'un sous-espace ★★ . . . 89
VIII.11 Adhérence d'un sous-espace ★★★ . . . 89
VIII.12 Graphe fermé ★★★ . . . 89
VIII.13 Application linéaire continue ★★ . . . 89
VIII.14 Application linéaire non continue ★★ . . . 89
VIII.15 Polynômes réels de degré n scindés à racines simples sur $\mathbb{R}$ ★★★★ . . . 89
VIII.16 Lemme de Riemann-Lebesgue ★★★ . . . 90

VIII.17 Borel-Lebesgue (HP) . . . 90
VIII.18 Parties compactes d'un espace vectoriel normé de dimension finie ★★ . . . 90
VIII.19 Somme de sous-espaces ★★★ . . . 90
VIII.20 Un théorème du point fixe ★★★ . . . 90
VIII.21 Espace des endomorphismes préservant un compact ★★★★ . . . 91
VIII.22 Théorème de Heine ★★ . . . 91
VIII.23 Lemme des compacts emboîtés ★ . . . 91
VIII.24 Théorème de Baire ★★★★★ (HP) . . . 91
VIII.25 Volume d'une (hyper)boule ★★★★ (HP) . . . 91
VIII.26 Partie fermée bornée non compacte ★★★ . . . 91
VIII.27 Théorème de compacité de Riesz ★★★★ . . . 91
VIII.28 Sphère et boule unité ★★★ . . . 92
VIII.29 Principe du maximum pour les polynômes ★★★ . . . 92
VIII.30 Applications 1-lipschitzienne surjective sur un compact ★★★★ . . . 92
VIII.31 Une isométrie conserve les milieux ★★★★ . . . 92
VIII.32 Fonctions coercives ★★★ . . . 93
VIII.33 Homéomorphisme de compacts ★★★ . . . 93
VIII.34 Distance à un fermé . . . 93
VIII.35 Diamètre et frontière . . . 93
VIII.36 Frontière ★★ . . . 93
VIII.37 Projeté sur un convexe compact ★★★ . . . 93
VIII.38 Convexité de l'adhérence et de l'intérieur ★★★ . . . 93
VIII.39 Fonctions positivement homogènes . . . 94
VIII.40 Enveloppe convexe . . . 94
VIII.41 Théorème de Carathéodory ★★★ . . . 94
VIII.42 Théorème de Krein-Milman . . . 95
VIII.43 Epigraphe ★ . . . 95
VIII.44 Partie convexe dense de $\mathbb{R}^n$ ★★★★ . . . 95
VIII.45 Complémentaire d'une partie convexe ouverte de $\mathbb{R}^n$ ★★★★ . . . 95
VIII.46 Partie convexe fermée non bornée de $\mathbb{R}^n$ ★★★★ . . . 95
VIII.47 Partie convexe ouverte non bornée de $\mathbb{R}^n$ ★★★★ . . . 95
VIII.48 Connexité de l'espace (1) ★★ . . . 96
VIII.49 Connexité de l'espace (2) . . . 96
VIII.50 Complémentaire d'un hyperplan ★★★ . . . 96
VIII.51 Composantes connexes par arcs du complémentaire de la réunion de plusieurs hyperplans ★★★★★ . . . 96
VIII.52 Sphères d'un $\mathbb{R}$-espace vectoriel ★★★ . . . 96
VIII.53 Théorème du passage à la douane ★★★ . . . 96
VIII.54 Condition nécessaire de la connexité par arc ★ . . . 97
VIII.55 Entre un ensemble et son adhérence . . . 97
VIII.56 Continuité d'applications matricielles . . . 97
VIII.57 Points de continuité du polynôme minimal . . . 97
VIII.58 Exponentielle matricielle et topologie . . . 97
VIII.59 Lemme du déterminant . . . 97
VIII.60 Matrice de déterminant 1 ★★★ . . . 97
VIII.61 Ensembles de matrices de rang fixé . . . 98
VIII.62 Densité des matrices inversibles ★★★ . . . 98
VIII.63 Comatrice et topologie . . . 98
VIII.64 Groupe orthogonal ★ . . . 98
VIII.65 Groupe (spécial) unitaire ★★★ . . . 98
VIII.66 Partie compacte et stable par produit de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ ★★★ . . . 98
VIII.67 Intérieur des matrices diagonalisables ★★★★★ . . . 99
VIII.68 Adhérence des matrices diagonalisables ★★★ . . . 99
VIII.69 Une preuve de Cayley-Hamilton (1) ★★★ . . . 99
VIII.70 Dimension du commutant d'une matrice . . . 99

VIII.71 Topologie et réduction . . . 99
VIII.72 Groupe spécial orthogonal et connexité . . . 100
VIII.73 Matrices inversibles et connexité . . . 100
VIII.74 Matrices nilpotentes et connexité . . . 100
VIII.75 Raffinement sur les disques de Gershgorin . . . 100
VIII.76 Matrices stochastiques et bistochastiques . . . 100
VIII.77 Théorème de Birkhoff-Von Neumann ★★★★ . . . 101

IX Fonction à valeurs vectorielles **103**
IX.1 Point fixe de l'exponentielle complexe . . . 103
IX.2 Théorème du relèvement . . . 103
IX.3 Equation fonctionnelle de l'exponentielle matricielle ★★★ . . . 103
IX.4 Formule de Trotter-Kato ★★ . . . 104
IX.5 Série entière de matrice ★★ . . . 104
IX.6 Expression d'un projecteur . . . 104
IX.7 Une preuve analytique de Cayley-Hamilton ★★★ . . . 104
IX.8 Exemple de fonction lipschitzienne . . . 105
IX.9 Condition de continuité sur un espace vectoriel normé . . . 105
IX.10 Application linéaire (2) . . . 105
IX.11 Mouvement à force centrale . . . 105
IX.12 Dérivée d'un produit de deux matrices . . . 105
IX.13 Inégalité des accroissements finis pour un espace euclidien . . . 106

X Equation différentielle **107**
X.1 Equations différentielles linéaires du premier ordre . . . 107
X.2 Equations différentielles linéaires du second ordre . . . 107
X.3 Une autre équation différentielle ★★ . . . 107
X.4 Problèmes de raccordement . . . 107
X.5 Suite d'équations différentielles . . . 107
X.6 Solution impaire ★★ . . . 108
X.7 Un principe des zéros isolés ★★★ . . . 108
X.8 Equation de Bernoulli (1) . . . 108
X.9 Equation de Bernoulli (2) . . . 108
X.10 Etude asymptotique des solutions d'une équation différentielle ★★★★ . . . 109
X.11 Inéquation différentielle . . . 109
X.12 Solution 2π-périodique d'une équation différentielle . . . 109
X.13 Superposition de solutions . . . 109
X.14 Fonction de Bessel . . . 109
X.15 Développement de la cotangente (2) . . . 110
X.16 Wronskien . . . 110
X.17 Solution non bornée ★★★ . . . 110
X.18 Principe d'entrelacement des zéros de Sturm . . . 110
X.19 Solution qui s'annule . . . 111
X.20 Solution qui s'annule une infinité de fois . . . 111
X.21 Lemme de Grönwall . . . 111
X.22 Théorème de Floquet . . . 111
X.23 Méthode de Lagrange (1) ★★★ . . . 112
X.24 Méthode de Lagrange (2) . . . 112
X.25 Solution de norme constante ★★★ . . . 112
X.26 Préservation d'un sous-espace ★★ . . . 112
X.27 Equation différentielle matricielle non linéaire . . . 112
X.28 Système de Lax ★★★★ . . . 112
X.29 Exponentielles de matrices qui commutent ★★ . . . 113
X.30 Exponentielles de matrice qui commutent avec le commutateur . . . 113

XI Calcul Différentiel **115**
XI.1 Calcul de dérivées partielles . . . 115
XI.2 Existence de dérivées partielles . . . 115
XI.3 Etude d'une fonction . . . 115
XI.4 Intégrales de Hardy (2) . . . 116
XI.5 Une équation fonctionnelle ★★ . . . 116
XI.6 Application linéaire . . . 116
XI.7 Opérateurs vectoriels . . . 116
XI.8 Laplacien en polaires . . . 117
XI.9 Fonction harmonique . . . 117
XI.10 Mines ponts MP 2016 . . . 117
XI.11 Différentielle de l'exponentielle matricielle . . . 117
XI.12 Différentielle de la norme euclidienne . . . 118
XI.13 Différentielle de l'inversion matricielle . . . 118
XI.14 Gradient et différentielle du déterminant . . . 118
XI.15 Espace tangent aux matrices orthogonales en l'identité . . . 118
XI.16 Vecteur propre d'un endomorphisme auto-adjoint . . . 118
XI.17 Quotient de Rayleigh . . . 118
XI.18 Différentielle du déterminant . . . 119
XI.19 Equation de d'Alembert . . . 119
XI.20 Utilisation des extrema liés (1) . . . 119
XI.21 Utilisation des extrema liés (2) . . . 119
XI.22 Utilisation des extrema liés (3) . . . 119
XI.23 Sinus complexe . . . 119
XI.24 Entropie . . . 119
XI.25 Fonction convexe sur $\mathbb{R}^n$ . . . 120
XI.26 Chemin le plus court entre deux points . . . 120
XI.27 Fonction homogène . . . 120
XI.28 Problème de Dirichlet et principe faible du maximum . . . 121
XI.29 La méthode des moindres carrés . . . 121

XII Divers **123**
XII.1 Développement décimal propre d'un réel ★★★ . . . 123
XII.2 Distribution du premier chiffre des puissances de 2 ★★★ . . . 123
XII.3 Série de Engel . . . 123
XII.4 Lemme d'Hadamard ★★★★ . . . 124
XII.5 Intégrale des puissances d'une fonction ★★★ . . . 124
XII.6 Lemme de Hochschild ★★★★★ . . . 124
XII.7 Théorème de Müntz ★★★★★ . . . 124

XIII Correction **125**
XIII.1 Correction Suite et série numérique . . . 125
XIII.2 Correction Intégrale . . . 155
XIII.3 Correction Fonction réelle . . . 179
XIII.4 Correction Polynôme . . . 193
XIII.5 Correction Espace vectoriel normé . . . 221
XIII.6 Correction Suite et série de fonctions . . . 238
XIII.7 Correction Série entière . . . 254
XIII.8 Correction Topologie . . . 260
XIII.9 Correction Fonction à valeurs vectorielles . . . 296
XIII.10 Correction Equation différentielle . . . 299
XIII.11 Correction Calcul différentiel . . . 308
XIII.12 Correction Divers . . . 313

I

Suite et série numérique

I.1 Lemme de Cesàro ★★

[Corrigé]

Soit $(u_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ une suite de limite $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$.

Démontrer que $(\sigma_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $\forall n \in \mathbb{N},\ \sigma_n = \dfrac{1}{n+1}\displaystyle\sum_{k=0}^{n} u_k$ tend également vers ℓ.

I.1.1 Lemme de l'escalier ★

[Corrigé]

Montrer que si $(u_{n+1} - u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tend vers un réel $\ell \neq 0$. Alors $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \ell n$.

I.2 Théorèmes Taubériens d'Hardy ★

[Corrigé]

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite quelconque à valeurs complexe.

On pose $\forall n \in \mathbb{N},\ \sigma_n = \dfrac{1}{n+1}\displaystyle\sum_{k=0}^{n} u_k$ et $\varepsilon_n = u_{n+1} - u_n$

Vérifier que la réciproque du lemme de Césarò n'est pas toujours vraie en exhibant une suite $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ qui ne converge pas et telle que (σ_n) converge dans $\mathbb{R}$.

I.2.1 Hardy Faible ★★

Soit $\ell \in \mathbb{C}$.

Démontrer que si $\lim\limits_{n\to+\infty} \sigma_n = \ell$ et $\varepsilon_n \underset{n\to+\infty}{=} o\left(\dfrac{1}{n}\right)$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$.

Indication : on pourra démontrer que pour tout $n \geq 1$ $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} k\varepsilon_k = nu_{n+1} - \sum_{k=1}^{n} u_k$.

I.2.2 Hardy Fort ★★★★

Soit $(u_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ et $\ell \in \mathbb{C}$.

On souhaite démontrer que si $\lim\limits_{n\to+\infty} \sigma_n = \ell$ et $\varepsilon_n \underset{n\to+\infty}{=} \mathcal{O}\left(\dfrac{1}{n}\right)$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$.

1. Soit $0 \leq n < m$ deux entiers. Démontrer que $\displaystyle\sum_{k=n+1}^{m} u_k - (m-n)u_n = \sum_{k=n}^{m-1} (m-k)\varepsilon_k$

2. En déduire qu'il existe un entier positif N et une constante $C > 0$ telle que pour tous entier m et n tels que $N \leq n < m$, on ai :
$$\left|\frac{(m+1)\sigma_m - (n+1)\sigma_n}{m-n} - u_n\right| \leq C \ln\left(\frac{m-1}{n-1}\right)$$
et
$$|u_n - \ell| \leq C \ln\left(\frac{m-1}{n-1}\right) + \frac{m+1}{m-n}(|\sigma_m - \ell| + |\sigma_n - \ell|)$$

3. En déduire le théorème Taubérien de Hardy (Fort).
Indication : on pourra prendre $m = 1 + \lfloor \alpha n \rfloor$ avec un paramètre $\alpha > 1$ à choisir, où $\lfloor x \rfloor$ désigne la partie entière de $x \in \mathbb{R}$.

I.3 Série harmonique ★★★

[Corrigé]

Soit $(H_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ la suite définie par $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

1. Déterminer un équivalent simple de H_n.
2. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*,\ v_n = H_n - \ln n$.
Montrer que $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge. On notera γ sa limite.
3. Déterminer un développement asymptotique à 3 termes de H_n.
4. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*,\ w_n = v_n - \frac{1}{2n}$.
Déterminer un développement asymptotique à 4 termes de H_n.
5. On note pour $n \in \mathbb{N}^*,\ k_n = \min\{k \in \mathbb{N},\ H_k \geq n\}$.
Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{k_{n+1}}{k_n}$.

I.4 Suite récurrente (1) ★★★

[Corrigé]

1. Déterminer un équivalent simple de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_0 \in \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \sin(u_n)$.
2. Déterminer un développement asymptotique de cette même suite à l'ordre 2.

I.5 Suite récurrente (2) ★★★

[Corrigé]

1. Déterminer un équivalent simple de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_0 \in \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \arctan(u_n)$.
2. Déterminer un développement asymptotique de cette même suite à l'ordre 2.

I.6 Suite récurrente (3) ★★★

[Corrigé]

1. Déterminer un équivalent simple de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_0 > -1$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \ln(1 + u_n)$.
2. Déterminer un développement asymptotique de cette même suite à l'ordre 2.

I.7 Suite récurrente (4) ★★

[Corrigé]

Soit $\alpha > -1$.

Déterminer un équivalent simple de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_0 > 0$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n + \dfrac{1}{u_n^\alpha}$.

I.8 Suite récurrente (5) ★★★★

[Corrigé]

Trouver un équivalent de la suite récurrente (x_n) qui vérifie : $\begin{cases} x_0 = 1 \\ x_{n+1} = x_n + \displaystyle\int_{x_n}^{+\infty} e^{\frac{-x^2}{2}}\,dx \end{cases}$

I.9 Suite récurrente (6) ★★★

[Corrigé]

Soient $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définies par $a_0 > 0,\ b_0 > 0$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} a_{n+1} = \dfrac{a_n + b_n}{2} \\ b_{n+1} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{a_n} + \dfrac{1}{b_n}\right) \end{cases}$$

1. Etudier la convergence des suites $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
2. En notant $\ell = \lim\limits_{n\to+\infty} a_n$, déterminer un équivalent de $(a_n - \ell)_{n\in\mathbb{N}}$.

I.10 Suite définie implicitement (1) ★★

[Corrigé]

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation $\cos(x) = nx$ possède une unique solution $x_n \in [0, 1]$.
2. Déterminer la limite de (x_n).
3. Etudier la monotonie de (x_n).
4. Etablir que $x_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \dfrac{1}{n}$.
5. Déterminer un équivalent de $x_n - \dfrac{1}{n}$.

I.11 Suite définie implicitement (2) ★★

[Corrigé]

1. Montrer que si n est un entier supérieur ou égal à 2 alors l'équation

$$\sin(x) = \frac{x}{n}$$

admet une unique solution $x_n \in]0, \pi[$.

2. Montrer que $(x_n)_{n\geq 2}$ converge. Quelle est sa limite ?
3. Déterminer un équivalent de $(x_n)_{n\geq 2}$.
4. Déterminer un développement asymptotique de $(x_n)_{n\geq 2}$ en $\mathcal{O}\left(\dfrac{1}{n^3}\right)$.

I.12 Suite définie implicitement (3) ★★

[Corrigé]

1. Montrer que si n est un entier supérieur ou égal à 2 alors l'équation
$$x^n - nx + 1 = 0$$
admet une unique solution $x_n \in [0, 1]$.
2. Etudier la monotonie et la convergence de $(x_n)_{n\geq 2}$.
3. Déterminer un équivalent de $(x_n)_{n\geq 2}$.
4. Déterminer un développement asymptotique à 2 termes de $(x_n)_{n\geq 2}$.

I.13 Suite définie implicitement (4) ★★

[Corrigé]

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \exists!\ x_n \in \left]n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}\right[,\ \tan(x_n) = x_n$.
2. Déterminer un équivalent de $(x_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$.
3. Déterminer un développement asymptotique de $(x_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ en $\mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

I.14 Suite définie implicitement (5) ★★★

[Corrigé]

1. Montrer que si $n \in \mathbb{N}^*$ alors l'équation
$$\sum_{k=1}^{n} \frac{x^k}{k} = 1$$
admet une unique solution $x_n \in \mathbb{R}_+$.
2. Etudier la convergence de la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$.
3. Calculer sa limite.

I.15 Formule d'inversion de Pascal

[Corrigé]
Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites complexes telles que pour tout entier naturel n, on ait :
$$\forall p \in [\![0; n]\!],\ b_p = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} a_k$$

On souhaite démontrer la formule d'inversion de Pascal : $\forall p \in [\![0; n]\!],\ a_p = \sum_{k=0}^{p} (-1)^{p-k} \binom{p}{k} b_k$.

I.15.1 Première méthode : matrice de passage ★

1. Justifier que les familles $\mathcal{B}_c = (1, X, \dots, X^m)$ et $\mathcal{B}_t = (1, (X-1), \dots, (X-1)^m)$ sont des bases de $\mathbb{R}_m[X]$.
2. Calculer la matrice de passage de $\mathcal{B}_c$ vers $\mathcal{B}_t$ et calculer son inverse.
3. Conclure.

I.15.2 Deuxième méthode : binôme de Newton ★★

On pose $S : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{C}^{\mathbb{N}} & \longrightarrow & \mathbb{C}^{\mathbb{N}} \\ (u_n)_{n\in\mathbb{N}} & \longmapsto & (u_{n+1})_{n\in\mathbb{N}} \end{array} \right.$. Pour simplifier les notations on note $a = (a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $b = (b_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
Démontrer la formule d'inversion de Pascal à l'aide de S.

I.15.3 Troisième méthode : par le calcul ★★

1. Montrer que $\displaystyle\sum_{i=0}^{p}(-1)^{p-i}\binom{p}{i}b_i = \sum_{j=0}^{p}\sum_{i=j}^{p}(-1)^{p-i}\binom{p}{i}\binom{j}{i}a_j$.
2. Montrer que $\displaystyle\sum_{i=0}^{p}(-1)^{p-i}\binom{p}{i}b_i = \sum_{j=0}^{p}\binom{p}{j}a_j\sum_{i=0}^{p-j}(-1)^{p-j-i}\binom{p-j}{i}$.
3. Conclure.

I.15.4 Dérangements ★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle dérangement de $[\![1;n]\!]$ toute permutation $\sigma \in \mathcal{S}_n$ qui ne possède pas de point fixe.
Donner une expression du nombre de dérangement D_n de $\mathcal{S}_n$ sous la forme d'une somme.
En déduire $\displaystyle\lim_{n\to+\infty}\frac{D_n}{n!}$ et interpréter.

I.16 Théorème de Pringsheim ★★★

[Corrigé]
Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite positive et décroissante telle que $\displaystyle\sum_{n\in\mathbb{N}} a_n$ converge.
Montrer que $(na_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers 0.

I.17 Lemme de Fekete ★★★

[Corrigé]
Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle *sous-additive*, c'est-à-dire vérifiant

$$\forall m, n \in \mathbb{N},\ u_{n+m} \leq u_n + u_m$$

On veut montrer que la suite $\left(\frac{u_n}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ tend vers $\ell := \displaystyle\inf_{n\in\mathbb{N}^*}\frac{u_n}{n}$.

1. Soient $n \leq N$ des entiers positifs. On note $n = qN + r$ la division euclidienne de n par N.
   Montrer que $u_n \leq qu_N + \displaystyle\max_{0\leq k<N} u_k$.
2. Conclure en distinguant les cas $\left(\frac{u_n}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ minorée ou non.

I.17.1 Chemins auto-évitant

[Corrigé]
On considère le réseau carré $\mathbb{Z}^2$: les voisins du point (i,j) sont exactement $(i-1,j)$, $(i+1,j)$, $(i,j-1)$ et $(i,j+1)$.
On appelle chemin de longueur n tout n-uplet $(M_1,\dots,M_n)$ de points de $\mathbb{Z}^2$ où $M_1 = (0,0)$ (les chemins partent de l'origine) et où pour tout i, M_{i+1} est un voisin de M_i.
Enfin on dit qu'un chemin $(M_1,\dots,M_n)$ est auto-évitant si les M_i sont distincts. On note c_n le nombre de chemins auto-évitant de longueurs n.

Montrer que la suite $(c_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge vers $\mu := \displaystyle\inf_{n\in\mathbb{N}^*} c_n^{1/n}$.

I.18 Théorème de Bolzano-Weierstrass ★★★

[Corrigé]

Le but de cet exercice est de démontrer le théorème de Bolzano-Weierstrass puis de l'étendre au cas des suites complexes. Soit $(u_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ une suite bornée.

1. Démontrer le lemme des pics : "De toute suite réelle on peut extraire une suite monotone".
2. En déduire que l'on peut extraire de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite convergente.

I.19 Suites de Cauchy ★★

[Corrigé]

1. On dit qu'une suite $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ est de Cauchy lorsqu'elle vérifie :
$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall p, q \in [\![N; +\infty[\![,\ |u_p - u_q| \leq \varepsilon$$
Démontrer qu'une suite réelle est de Cauchy si et seulement si elle converge.
2. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un $\mathbb{R}$-espace vectoriel normé. On dit qu'une suite $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ est de Cauchy lorsqu'elle vérifie :
$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall p, q \in [\![N; +\infty[\![,\ \|u_p - u_q\| \leq \varepsilon$$
Montrer que si E est de dimension finie alors ses suites de Cauchy sont les suites convergentes.

I.20 Récurrence de Cauchy ★★★

[Corrigé]

1. Soit A une partie de $\mathbb{N}$ telle que :
   — $1 \in A$;
   — $\forall n \in A \setminus \{0\},\ n-1 \in A$;
   — $\forall n \in A,\ 2n \in A$.
   Montrer que $A = \mathbb{N}$.
2. En déduire l'inégalité arithmético-géométrique :
$$\forall (a_n) \in (\mathbb{R}^+)^{\mathbb{N}^*},\ \forall n \in \mathbb{N}^*,\ \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k \geq \left(\prod_{k=1}^{n} a_k\right)^{1/n}.$$

I.21 Sommes de Riemann ★★

[Corrigé]

Démontrer que $\forall f \in \mathcal{C}^1([0,1], \mathbb{R}),\ \displaystyle\int_0^1 f(t)dt \underset{n\to+\infty}{=} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) - \frac{1}{2n}(f(1) - f(0)) + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

I.22 Formule d'Euler-Maclaurin ★★★

[Corrigé]

Soient $(m, n) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $m < n$, $r \in \mathbb{N}^*$ et $f : [m, n] \to \mathbb{C}$ de classe $\mathcal{C}^r$.
Montrer que
$$\sum_{i=m}^{n} f(i) = \int_m^n f(t)dt + \frac{1}{2}(f(m) + f(n)) + \sum_{i=2}^{r} \frac{b_i}{2}\left[f^{(i-1)}(m) - f^{(i-1)}(n)\right] + \frac{(-1)^{r+1}}{r!}\int_m^n \widetilde{B}_r(t) f^{(r)}(t)dt$$

Application : Déterminer un développement asymptotique à tout ordre de la série harmonique.

I.23 Nature d'une suite ★★

[Corrigé]
Déterminer la nature de la suite $(\sin n)_{n\in\mathbb{N}}$.

I.24 Etude d'une suite avec une condition de convergence

[Corrigé]
Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de réels positifs ou nuls telle que $n(u_n+u_{2n}) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$. Montrer que $(nu_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge et calculer sa limite.

I.25 Valeurs d'adhérences d'une suite ★★★★

[Corrigé]
On pose pour $n\in\mathbb{N}^*$, $z_n=\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{i}{k}\right)$.

1. Rappeler le théorème de sommation de relation de comparaison pour des suites équivalentes.
2. Montrer que la suite $(|z_n|)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge.
3. Déterminer l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite $(z_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$.

I.26 Nature d'une série (1) ★

[Corrigé]
Déterminer la nature de la série $\sum_{n\geq 0}\sin\left(\pi\sqrt{1+n^2}\right)$.

I.27 Nature d'une série (2) ★★

[Corrigé]
Déterminer la nature de la série $\sum_{n\geq 0}\sin\left(\pi(2+\sqrt{3})^n\right)$.
On pourra s'intéresser pour $n\in\mathbb{N}$ à la quantité $(2+\sqrt{3})^n+(2-\sqrt{3})^n$.

I.28 Nature d'une série (3) ★★★

[Corrigé]
Déterminer la nature de la série $\sum_{n\geq 1}\arccos\left(\frac{n^\alpha}{1+n^\alpha}\right)$ en fonction de la valeur de $\alpha\in\mathbb{R}$.

I.29 Nature d'une série (4)

[Corrigé]
Déterminer la nature de la série $\sum_{n\in\mathbb{N}}\sin(\pi en!)$.

I.30 Nature d'une série (5) ★★★★

[Corrigé]
Soit $(\alpha_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite d'entiers strictement positifs deux à deux distincts. Déterminer la nature de la série

$$\sum_{n\geq 1}\frac{\alpha_n}{n^2}$$

I.31 Nature d'une série (6) ★★★★

[Corrigé]
Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite strictement croissante d'entiers naturels non nuls.
Déterminer la nature de la série $\sum_{n\geq 1}\frac{1}{\text{ppcm}(a_1,\dots,a_n)}$.

I.32 Nature d'une série (7) ★★★

[Corrigé]
On appelle nombre *palindrome* tout entier naturel non nul dont l'écriture décimale est un palindrome : par exemple 3,11,161 et 5225 sont des nombres palindromes alors que 32 n'en est pas un car $32 \neq 23$.
On note P l'ensemble des nombres palindromes.
Déterminer la nature de la série $\sum_{n\in P}\frac{1}{n}$.

I.33 Calcul d'un équivalent ★★★★

[Corrigé]
Déterminer un équivalent de la suite de terme général $u_n = \left(\prod_{k=1}^{n} k^k\right)^{1/n}$.

I.34 Sommation de relations de comparaison ★

[Corrigé]
Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites équivalentes.
Peut-on affirmer que $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$ et $\sum_{n\in\mathbb{N}} v_n$ sont de mêmes natures ? Justifier.

I.35 Equivalent de séries de Riemann ★

[Corrigé]
On considère pour $\alpha\in\mathbb{R}$ la série $\sum_{n\in\mathbb{N}^*}\frac{1}{n^\alpha}$.
Déterminer un équivalent simple de la somme partielle pour $\alpha<1$ et du reste pour $\alpha>1$.

I.36 Séries de Bertrand ★★

[Corrigé]
Démontrer que $\sum_{n\geq 2}\frac{1}{n^\alpha \ln(n)^\beta}$ converge $\iff$ $\alpha>1$ ou ($\alpha=1$ et $\beta>1$).

I.37 Critère de Raabe-Duhamel ★★

[Corrigé]

1. Soient (u_n) et (v_n) de suites réels strictement positifs vérifiant $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} \leq \dfrac{v_{n+1}}{v_n}$ à partir d'un certain rang. Montrer que $u_n \underset{n\to+\infty}{=} \mathcal{O}(v_n)$.
2. Soit $(u_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ tel que $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} \underset{n\to+\infty}{=} 1 - \dfrac{a}{n} + o\left(\dfrac{1}{n}\right)$ Démontrer que :
   - si $a > 1$ alors $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$ converge ;
   - si $a < 1$ alors $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$ diverge ;
   - Si $a = 1$ alors on ne peut pas conclure quant à la nature de $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$.

I.38 Règle de d'Alembert ★★

[Corrigé]
Soit $(u_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}}$ telle que $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \ell \in \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$.
Démontrer que :

- si $\ell < 1$ alors $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$ converge ;
- si $\ell > 1$ alors $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$ diverge ;
- Si $\ell = 1$ alors on ne peut pas conclure quant à la nature de $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$.

I.39 Règle de Cauchy ★★

[Corrigé]
Soit $(u_n) \in (\mathbb{R}_+)^{\mathbb{N}}$ telle que $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt[n]{u_n} = \ell \in \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$.
Démontrer que :

- si $\ell < 1$ alors $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$ converge ;
- si $\ell > 1$ alors $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$ diverge ;
- Si $\ell = 1$ alors on ne peut pas conclure quant à la nature de $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$.

I.40 d'Alembert $\Longrightarrow$ Cauchy ★★★

[Corrigé]
Soit $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$ une série à termes strictement positifs.
Montrer que si $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \ell$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt[n]{u_n} = \ell$.

I.41 Transformation et règle d'Abel ★★

[Corrigé]

Soit $(a_n)_{n\geq n_0}$ et $(B_n)_{n\geq n_0}$ deux suites complexes. On définit $(A_n)_{n\geq n_0}$ et $(b_n)_{n\geq n_0}$ telles que :

$\forall n \geq n_0,\ A_n = \sum_{k=n_0}^{n} a_k$ et $b_n = B_{n+1} - B_n$

1. Démontrer que : $\forall n \geq n_0,\ \sum_{k=n_0}^{n} a_k B_k = A_n B_n - \sum_{k=n_0}^{n-1} A_k b_k$
2. Démontrer que si $(A_n)_{n\geq n_0}$ est bornée, si $\sum |b_n - b_{n+1}|$ converge et si $(b_n)_{n\geq n_0}$ tend vers 0 alors $\sum_{n\geq n_0} a_n b_n$ converge.

Remarque : On remarquera la ressemblance entre la transformation d'Abel et l'intégration par parties.

I.41.1 Une série de Dirichlet ★★★

Déterminer la nature de la série $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} \frac{\sin n}{n^\alpha}$ suivant la valeur du paramètre $\alpha \in \mathbb{R}$.

I.42 Equation différentielle discrète ★★★

[Corrigé]

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite de réels strictement positifs telle que : $\lim_{n\to\infty} a_n(a_1^2 + \cdots + a_n^2) = 1$

1. Montrer que la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge vers 0 et que $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} a_n^2$ diverge.
2. On note $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_n^2$. Montrer que $\lim_{n\to+\infty} \int_{S_{n-1}}^{S_n} t^2 = 1$.
3. En déduire que $a_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt[3]{3n}}$

I.43 Critère spécial des série alternées ★

[Corrigé]

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle positive de limite nulle.

Peut-on affirmer que $\sum_{n\in\mathbb{N}} (-1)^n a_n$ converge ? Justifier.

I.44 Calcul d'une somme de série (1) ★★★

[Corrigé]

On pose $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = \sum_{k=1}^{n} k^2$. Calculer $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{u_n}$.

I.45 Calcul d'une somme de série (2) ★

[Corrigé]

On pose $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k}$. Déterminer la limite de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$.

I.46 Calcul d'une somme de série (3) ★★★

[Corrigé]

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{\ln(k)}{k} - \frac{1}{2}\ln(n)^2$.

1. Montrer que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge.

2. Justifier la convergence et calculer la somme de la série $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} \frac{(-1)^n \ln(n)}{n}$.

I.47 Calcul d'une somme de série (4) ★★

[Corrigé]

Justifier la convergence et calculer la somme de la série $\sum_{n\in\mathbb{N}} \arctan\left(\frac{1}{n^2+n+1}\right)$.

Indication : faire apparaître un télescopage.

I.48 Calcul d'une somme de série (5)

[Corrigé]

Justifier la convergence et calculer la somme de la série $\sum_{m,n\in\mathbb{N}^*} \frac{(-1)^{mn}}{m^2n^2}$.

I.49 Calcul d'une somme de série (6)

[Corrigé]

Justifier la convergence et calculer la somme de la série $\sum_{\substack{a,b\in\mathbb{N}^* \\ a|b}} \frac{1}{a^2b^2}$

I.50 Calcul d'une somme de série (7) ★★

[Corrigé]

justifier la convergence et calculer la somme $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\zeta(n)-1}{n}$ où $\zeta(n) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^n}$.

I.51 Calcul d'une somme de série (8) ★★★★

[Corrigé]

Soit $a > 1$. On note φ la fonction indicatrice d'Euler. Calculer la somme $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\varphi(n)}{a^n-1}$.

I.52 Calcul d'une somme de série (9)

[Corrigé]

Soit $R = \{m^n,\ m,n \in [\![2,+\infty[\![\}$. Calculer la somme $\sum_{r\in R} \frac{1}{r-1}$.

I.53 Décomposition en éléments simples infinie

[Corrigé]

Soit $x > 0$. Montrer que $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{x(x+1)\cdots(x+n)} = -e\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!(x+k)}$

I.54 Problème de Bâle

[Corrigé]

On cherche à calculer la somme des $\frac{1}{n^2}$. On va noter

$$\zeta(2) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$$

I.54.1 Lemme de Riemann-Lebesgue

1. Soient $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$ et f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a,b]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. On pose pour $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$I(\lambda) = \int_a^b f(t)\cos(\lambda t)dt \quad \text{et} \quad J(\lambda) = \int_a^b f(t)\sin(\lambda t)dt$$

   Montrer que $\lim\limits_{\lambda\to+\infty} I(\lambda) = \lim\limits_{\lambda\to+\infty} J(\lambda) = 0$.

2. Déterminer deux réels u et v tels que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\int_0^{\pi} (ux + vx^2)\cos(nx)dx = \frac{1}{n^2}$$

3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que pour tout $x \in]0,\pi]$.

$$\sum_{k=1}^{n} \cos(kx) = \frac{\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)}{2\sin\left(\frac{x}{2}\right)} - \frac{1}{2}$$

4. Montrer que la fonction $\varphi : x \in]0,\pi] \mapsto \frac{x}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$ est prolongeable en une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,\pi]$.

5. En déduire que $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$.

6. Exprimer la somme de la série $\sum\limits_{n\in\mathbb{N}^*} \frac{1}{(2n-1)^2}$ en fonction de $\zeta(2)$ et en déduire sa valeur.

7. En adaptant les réels de la question 2, justifier la convergence et calculer les sommes des séries $\sum\limits_{n\in\mathbb{N}^*} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$.

I.54.2 Série de fonctions ★★★

Pour tout $m \in \mathbb{N}^*$ on pose $f_m : \theta \in]-\pi,\pi[\longmapsto \frac{\sin((2m+1)\theta)}{\sin^{2m+1}(\theta)}$

1. Démontrer que f_m est une fonction polynomiale de $\text{cotan}^2(\theta)$
2. En déduire que $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$

I.54.3 Série entière ★★★

En utilisant le développement en série entière de arcsin et en intégrant termes à termes, démontrer que $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$

I.55 Nombre moyen de diviseurs d'un entier ★★★★

[Corrigé]
Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\tau(n)$ le nombre de diviseurs positifs de n et pour tout $x \geq 1$, on pose $\mathrm{F}(x) = \sum_{1 \leq n \leq x} \tau(n)$.

1. Déterminer un équivalent en $+\infty$ de F.
2. Démontrer que $\mathrm{F}(x) \underset{x \to +\infty}{=} x \ln x + (2\gamma - 1)x + \mathcal{O}(\sqrt{x})$

Indication : on pourra remarquer que $\tau(n) = \sum_{d|n} 1$ où la somme porte sur les diviseurs positifs de n.

I.56 Théorème de réarrangement de Riemann ★★★★★

[Corrigé]
Soient $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ une série semi-convergente et $\alpha \in \mathbb{R}$.

Démontrer qu'il existe une permutation σ de $\mathbb{N}$ telle que $\sum_{n=0}^{+\infty} a_{\sigma(n)} = \alpha$.

I.57 Moyennes arithmétique, géométrique et harmonique ★

[Corrigé]

Soit $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$ des réels strictement positifs. On pose $A_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} a_k$, $G_n = \sqrt[n]{\prod_{k=1}^{n} a_k}$ et $H_n = \frac{n}{\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{a_k}}$

Démontrer que $H_n \leq G_n \leq A_n$.

I.58 Inégalité de Carleman ★★★

[Corrigé]
Soit $a_n \in (\mathbb{R}_+)^{\mathbb{N}^*}$ telle que $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} a_n$ converge.

Démontrer que $\sum_{n=1}^{+\infty} \sqrt[n]{\prod_{k=1}^{n} a_k} \leq e \sum_{n=1}^{+\infty} a_n$.
Indication : On utilisera le résultat de l'exercice précédent et la formule de Stirling.

II Intégrale

II.1 Règle de Bioche ★

[Corrigé]

Calculer :

1. $\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{\sin(t)}{4-\cos(t)^2}dt$ en posant $u=\cos(t)$;
2. $\displaystyle\int_{\pi/2}^{x} \frac{dt}{\sin(t)}$ pour tout $x \in]0,\pi[$ en posant $u=\cos(t)$;
3. $\displaystyle\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{dt}{\cos(t)^3}$ en posant $u=\sin(t)$.
4. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{dt}{\sin(t)+\cos(t)}$ en posant $u=\tan\left(\frac{t}{2}\right)$

II.2 Intégrale de Wallis ★★

[Corrigé]

$\forall n \in \mathbb{N}$, on pose $W_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^n(x)dx$.

1. Donner un équivalent simple de W_n
2. Trouver une expression de W_{2n} et W_{2n+1} à l'aide de factorielles.

II.3 Formule de Stirling ★★

[Corrigé]

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \dfrac{n^n e^{-n}\sqrt{n}}{n!}$.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $v_n = \ln\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right)$. Montrer que : $v_n = \underset{n\to+\infty}{\mathcal{O}}\left(\frac{1}{n^2}\right)$
2. En déduire que u_n converge vers un certain $\ell \in \mathbb{R}_+^*$.
3. Montrer que $\ell = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}$ et en déduire que un équivalent de $n!$.

II.4 Intégrale de Gauss

[Corrigé]

II.4.1 Wallis ★★★

1. On pose $u_n = \int_0^{\pi/2} \cos^{2n+1}(t)dt$. Calculer u_0.
2. Trouver une relation de récurrence vérifiée par $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, puis exprimer u_n à l'aide factorielles.
3. Sur $[0,+\infty[$, on pose $f_n : x \mapsto \begin{cases} \left(1-\frac{x^2}{n}\right)^n & \text{si } 0 \leq x \leq \sqrt{n} \\ 0 & \text{si } \sqrt{n} < x \end{cases}$. Montrer que

$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^{+\infty} f_n(x)dx = \int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx$$

4. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\int_0^{\sqrt{n}} f_n(x)dx = \sqrt{n}u_n$ puis en déduire la valeur de $\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx$.

II.4.2 Intégrales auxiliaires ★★★

On pose $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $I_n = \int_0^1 \frac{1}{(1+t^2)^n}dt$ et $K_n = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+t^2)^n}dt$

1. Démontrer que $K_n \underset{n\to+\infty}{\sim} I_n$ et que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $K_n = K_{n+1} + \frac{K_n}{2n}$.
2. En déduire à l'aide du théorème de convergence dominée que $\int_0^{+\infty} e^{-t^2}dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

II.4.3 Equivalent du reste ★★

A l'aide d'une IPP, trouver un équivalent de $\int_x^{+\infty} e^{\frac{-t^2}{2}}dt$ en $+\infty$.

II.5 Intégrale de Fresnel ★★★

[Corrigé]

1. Justifier que $I : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{e^{-(t^2+i)x^2}}{t^2+i}dt$ est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et calculer sa dérivée.
2. Calculer l'intégrale de Fresnel : $\int_0^{+\infty} e^{-it^2}dt$.

   On admettra le résultat sur l'intégrale de Gauss $\int_0^{+\infty} e^{-t^2}dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

II.6 Intégrale de Dirichlet

[Corrigé]

On pose $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t}dt$.

II.6.1 Semi-convergence ★★

Démontrer que l'intégrale est semi-convergente.

II.6.2 Une autre expression ★★

Montrer que $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(t)}{t^2}dt$.

II.6.3 Premier calcul ★★

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\sin((2n+1)t)}{\sin(t)} dt$ et $v_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\sin((2n+1)t)}{t} dt$.

1. Démontrer que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est constante et égale à $\dfrac{\pi}{2}$.
2. En utilisant le lemme de Riemann-Lebesgue, démontrer que $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n - u_n = 0$.
3. En déduire que $I = \dfrac{\pi}{2}$.

II.6.4 Second calcul ★★★

On pose $F : x \longmapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} e^{-xt} dt$.

1. Démontrer que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et exprimer sa dérivée sous la forme d'une intégrale.
2. Démontrer que $\forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ F'(x) = -\dfrac{1}{1+x^2}$.
3. Démontrer que $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x) = 0$ et en déduire que $I = \dfrac{\pi}{2}$.

Remarque : Il s'agit d'un cas particulier de la méthode de Feynman.

II.7 Intégrale du reste de l'intégrale de Dirichlet ★★★

[Corrigé]

Justifier l'existence et calculer l'intégrale $J = \displaystyle\int_0^{+\infty} \left(\int_x^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt \right) dx$.

II.8 Intégrale d'Euler ★★

[Corrigé]

On pose $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln(\sin t) dt$ et $J = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln(\cos t) dt$.

1. Montrer que $I = J$.
2. Exprimer $I + J$ en fonction de I.
3. En déduire la valeur de I.

II.9 Fonction intégrale ★★★

[Corrigé]

Soit $I : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{x^2+t^2} dt$. Justifier que I est définie sur $\mathbb{R}_+^*$ et déterminer $\sup\limits_{x>0} I(x)$.

II.10 Intégrales de Bertrand

[Corrigé]

1. Pour quelles valeurs des réels α et β l'intégrale $\displaystyle\int_e^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha (\ln t)^\beta}$ converge ?
2. Même question pour $\displaystyle\int_0^{e^{-1}} \frac{dt}{t^\alpha (\ln t)^\beta}$.

II.11 Intégrales de Hardy (1)

[Corrigé]

Soient $\alpha \geq 0$ et $\beta > 0$. On pose

$$I_{\alpha,\beta} = \int_0^{+\infty} \frac{t^\alpha}{1 + t^\beta \sin^2 t} dt$$

1. Calculer pour $x > -1$ l'intégrale

$$\varphi(x) = \int_0^{\pi} \frac{dt}{1 + x \sin^2 t} dt$$

2. Déterminer un équivalent de la suite $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de terme général

$$I_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{t^\alpha}{1 + t^\beta \sin^2 t} dt$$

3. En déduire que $I_{\alpha,\beta}$ converge si et seulement si $\beta > 2\alpha + 2$.
4. Etudier la limite de l'intégrande de $I_{\alpha,\beta}$.

On suppose maintenant $\beta > 2\alpha + 2$. On considère la fonction $g :]0, 1] \to \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$g(t) = \frac{t^{\alpha+\beta-2}}{t^\beta + \pi^\beta \sin^2\left(\frac{\pi}{t}\right)}$$

ainsi que l'intégrale $J = \displaystyle\int_0^1 g(t)dt$.

5. Démontrer à l'aide d'un changement de variable l'égalité

$$J = \int_{\pi}^{+\infty} \frac{t^\alpha}{1 + t^\beta \sin^2 t} dt$$

et en déduire la nature de J.

6. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n(g) = \dfrac{1}{n} \displaystyle\sum_{k=1}^{n} g\left(\frac{k}{n}\right)$. Montrer que $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n(g) = +\infty$.

II.12 Intégrabilité des cosinus de polynôme

[Corrigé]

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré supérieur ou égal à 2.

1. Déterminer la nature de l'intégrale $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} \cos(P(x))dx$.
2. Déterminer la nature de l'intégrale $J = \displaystyle\int_0^{+\infty} |\cos(P(x))|dx$.
3. Déterminer le signe de I dans le cas $P = X^2$.

II.13 Nature d'une intégrale (1) ★★

[Corrigé]

Pour quelles valeurs du réel α l'intégrale $\displaystyle\int_0^1 \frac{dt}{\arccos(t)^\alpha}$ converge-t-elle ?

II.14 Nature d'une intégrale (2) ★★

[Corrigé]

Soit $f : [0, +\infty[\to \mathbb{R}$ continue telle que $\int_0^{+\infty} f(t)dt$ converge.

1. Montrer que pour toute suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de réels divergeant vers $+\infty$, on a
$$\lim_{n\to+\infty} \int_{x_n}^{y_n} f(t)dt = 0$$
2. En déduire que $\int_0^{+\infty} e^{-t\sin t}dt$ diverge.

II.15 Nature d'une intégrale (3) ★★★

[Corrigé]

Etudier en fonction de la valeur du réel α la nature de l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\alpha}dt$.

II.16 Nature d'une intégrale (4) ★★★★

[Corrigé]

Soit $a \in \mathbb{R}$. Etudier la nature de l'intégrale $\int_0^{+\infty} \sin(t^a)dt$.

II.17 Pondération par la fonction inverse

[Corrigé]

Soit $f : [1, +\infty[\to \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $\int_1^{+\infty} f(t)dt$ converge.

Montrer que $\int_1^{+\infty} \frac{f(t)}{t}dt$ converge.

II.18 Pondération par $\frac{1}{1+t^a}$

[Corrigé]

Soit $f : [0, +\infty[\to \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $\int_0^{+\infty} f(t)dt$ converge.

Montrer que pour tout $a > 0$, $\int_0^{+\infty} \frac{f(t)}{1+t^a}dt$ converge.

II.19 Pondération par le sinus

[Corrigé]

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ une fonction continue positive et décroissante. On pose $g = f \times \sin$.
Montrer que g est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ si et seulement si f l'est.

II.20 Intégrale sur une période

[Corrigé]

Soit $T > 0$ et soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction T-périodique.

Montrer que $\int_0^T f(t)dt = 0$ si et seulement si $\int_T^{+\infty} \frac{f(t)}{t}dt$ converge.

II.21 Changement de variable

[Corrigé]

Soit f une fonction continue positive et intégrable sur $\mathbb{R}$. Montrer que $t \mapsto f\left(t - \frac{1}{t}\right)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_-^*$ et sur $\mathbb{R}_+^*$ et que l'on a

$$\int_{-\infty}^0 f\left(t - \frac{1}{t}\right) dt + \int_0^{+\infty} f\left(t - \frac{1}{t}\right) dt = \int_0^{+\infty} f(t)dt$$

II.22 Divergence grossière

[Corrigé]

1. Soit f une application continue par morceaux de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$ admettant une limite ℓ en $+\infty$ et telle que l'intégrale $\int_0^{+\infty} f(t)dt$ converge. Montrer que $\ell = 0$.
2. Soit f une application uniformément continue de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$ telle que l'intégrale $\int_0^{+\infty} f(t)dt$ converge. Montrer que $\lim\limits_{+\infty} f = 0$.

II.23 Norme L^2

[Corrigé]

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ vérifiant $f(0) = 0$.

1. Montrer que $t \mapsto \frac{f(t)}{t}$ est prolongeable par continuité en 0.
2. Montrer que $\forall x > 0$,
$$\int_0^x \left(\frac{f(t)}{t}\right)^2 \leq 2\frac{f'(t)f(t)}{t}dt$$
3. Montrer que si f' est de carré intégrable alors il en est de même pour $t \mapsto \frac{f(t)}{t}$ et que de plus :
$$\int_0^{+\infty} \left(\frac{f(t)}{t}\right)^2 dt \leq 4\int_0^{+\infty} f'(t)^2 dt$$

II.24 Inégalité de Kolmogorov

[Corrigé]

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ telle que f et f'' soit de carré intégrable sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que f' est également de carré intégrable sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que $\left(\int_{\mathbb{R}} f'^2\right)^2 \leq \left(\int_{\mathbb{R}} f^2\right)\left(\int_{\mathbb{R}} f''^2\right)$.

II.25 ENS PC 2025 ★★★

[Corrigé]

Soit $f \in \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R}_+^*)$ telle que :

$$\int_0^1 f = \int_0^1 \frac{1}{f} = 1$$

Déterminer f.

II.26 Intégrale de Frullani (1) ★★★

[Corrigé]

Soient $a < b$ des réels strictement positifs. Soit $f :]0, +\infty[\to \mathbb{R}$ continue admettant des limites finies ℓ en 0 et L en $+\infty$.

1. Montrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{f(at) - f(bt)}{t} dt = (\ell - L) \ln\left(\frac{b}{a}\right)$.
2. En déduire la valeur de $\displaystyle\int_0^1 \frac{t-1}{\ln t} dt$.

II.27 Intégrales de Frullani (2) ★★★

[Corrigé]

Soit $f : [0, +\infty[\to \mathbb{R}$ une fonction continue telle que l'intégrale $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{f(t)}{t} dt$ converge et soient $a < b$ deux réels strictement positifs.

Démontrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{f(at) - f(bt)}{t} dt = f(0) \ln\left(\frac{b}{a}\right)$.

II.27.1 Combinaisons linéaires de cosinus ★★★★

[Corrigé]

Soient $a_1, \dots, a_n$ des réels strictement positifs.

1. Donner une condition nécessaire et suffisante sur $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ pour que l'intégrale
$$I = \int_0^{+\infty} \frac{1}{t} \sum_{k=1}^{n} \lambda_k \cos(a_k t) dt$$
converge.
2. Calculer I lorsque qu'elle converge.

II.28 Calcul d'une intégrale (1) ★★★

[Corrigé]

Justifier l'existence et calculer pour tout entier $n \geq 2$, $I_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(t+1)\dots(t+n)}$.

II.29 Calcul d'une intégrale (2) ★★

[Corrigé]

Justifier l'existence et calculer $I = \displaystyle\int_0^1 x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor dx$.

II.30 Calcul d'une intégrale (3) ★★★

[Corrigé]

Justifier l'existence et calculer $I = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^6}$.

II.31 Calcul d'une intégrale (4) ★★★

[Corrigé]

Soit $a > 0$.

Justifier l'existence et calculer $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(ax) - \arctan(x/a)}{1+x^2} dx$.

II.32 Permutation Série-intégrale (1)

[Corrigé]

1. Montrer que $I = \int_0^{+\infty} e^{-x}\cos(\sqrt{x})dx$ converge.
2. Montrer que $I = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n n!}{(2n)!}$

II.33 Permutation série-intégrale (2)

[Corrigé]

Calculer l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+t)}{t\sqrt{1+t}}dt$ à l'aide d'une permutation série-intégrale.

II.34 Fonction d'écart logarithmique intégral ★★

[Corrigé]

On considère la fonction d'écart logarithmique intégral, qui est l'application définie par : $\forall 2 \geq x,\ \mathrm{Li}(x) = \int_2^x \frac{dt}{\ln(t)}$

Déterminer un développement asymptotique de $\mathrm{Li}(x)$ à tout ordre.

On donnera une expression en fonction de la somme $\sum_{k=0}^{n} \frac{k!}{(\ln x)^k}$.

II.35 Intégrale de Bernoulli ★★★

[Corrigé]

Démontrer que $\int_0^1 \frac{dx}{x^x} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^n}$.

II.36 Lemme de Riemann-Lebesgue : cas des fonctions $\mathcal{C}^1$ ★

[Corrigé]

On considère un segment $[a,b]$ de $\mathbb{R}$ et $\phi \in \mathcal{C}^1([a,b],\mathbb{C})$.

Montrer que $\lim_{\lambda\to+\infty} \int_a^b \phi(t)e^{i\lambda t}dt = 0$.

II.37 Intégrale de Poisson (1) ★★

[Corrigé]

Pour tout $\rho \in \mathbb{R}\setminus\{-1,1\}$, on pose $I(\rho) = \int_0^{\pi} \ln(1-2\cos(\theta)\rho+\rho^2)d\theta$

Montrer en passant par des sommes de Riemann que $I(\rho) = \begin{cases} 0 & \text{si } \rho \in]-1,1[\\ 2\pi\ln(|\rho|) & \text{si } \rho \in \mathbb{R}\setminus[-1,1] \end{cases}$

II.38 Intégrale de Poisson (2) ★★★

[Corrigé]

Pour tout $\rho \in \mathbb{R}\setminus\{-1,1\}$, on pose $I(\rho) = \int_0^{\pi} \ln(1-2\cos(\theta)\rho+\rho^2)d\theta$

1. Montrer que $\forall \rho \in \mathbb{R}^* \setminus \{-1,1\},\ I(\rho) - I\left(\frac{1}{\rho}\right) = 2\pi \ln(|\rho|)$.
2. Démontrer que $\forall \rho \in \mathbb{R} \setminus \{-1,1\},\ \forall n \in \mathbb{N},\ I(\rho) = \frac{1}{2^n} I\left(\rho^{2^n}\right)$.
3. En déduire que $I(\rho) = \begin{cases} 0 & \text{si } \rho \in]-1,1[\\ 2\pi \ln(|\rho|) & \text{si } \rho \in \mathbb{R} \setminus [-1,1] \end{cases}$

II.39 Mines-Ponts MP 2024

[Corrigé]

On pose pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$h_n : x \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(t^2+x^4)^n}$$

1. Montrer que h_n est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et que
$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ h_n'(x) = -4nx^3 h_{n+1}(x)$$
2. Montrer qu'il existe une suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ telle que
$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ h_n(x) = a_n x^{2-4n}$$
3. Déterminer h_n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

II.40 Une suite d'intégrales (1)

[Corrigé]

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \int_0^1 (t \ln t)^n dt$. Montrer l'existence de I_n et calculer sa valeur pour tout $n \in \mathbb{N}$.

II.41 Une suite d'intégrales (2)

[Corrigé]

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^n}$

1. Montrer que (u_n) converge et donner sa limite.
2. A l'aide d'une intégration par parties, donner un développement asymptotique à deux termes de u_n.

II.42 Une suite d'intégrales (3)

[Corrigé]

Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose :

$$I_n = \int_0^1 \frac{x^{2n}}{1+x^n} dx \quad \text{et} \quad J_n = \int_0^1 \frac{x^{2n+1}}{1+x^n} dx$$

1. Justifier l'existence de I_n et J_n et calculer les limite de $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(J_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
2. Montrer que $|I_n - J_n| \leq \frac{1}{4n^2}$.
3. Calculer J_n.
4. En déduire un équivalent de I_n.

II.43 Constante d'Apéry

[Corrigé]
On définit une suite (u_n) de fonctions en posant :

$$\forall n \geq 2,\ \forall t \in]0,1],\ u_n(t) = \frac{t^{n-1}\ln(t)}{n}$$

1. Calculer $\|u_n\|_\infty$.
2. Montrer que la fonction $f : t \mapsto \dfrac{\ln(t)\ln(1-t)}{t}$ est intégrable sur $]0,1[$.
3. En déduire que $\displaystyle\int_0^1 f(t)dt = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^3}$

II.44 Comportement asymptotique (1)

[Corrigé]
Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+^*)$ telle que $\dfrac{f'(x)}{f(x)} \underset{x\to+\infty}{\sim} \dfrac{2}{x}$.
Montrer que $\displaystyle\int_0^x f(t)dt \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{xf(x)}{3}$.

II.45 Comportement asymptotique (2)

[Corrigé]
Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+)$ décroissante.
Montrer que si f est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ alors $\lim\limits_{x\to+\infty} xf(x) = 0$. La réciproque est-elle vraie ?

II.46 Comportement asymptotique (3)

[Corrigé]
Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+^*)$ telle que

$$\exists \ell \in [0,1[,\ \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x+1)}{f(x)} = \ell$$

Montrer que f est intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

II.47 Comportement asymptotique (4)

[Corrigé]
Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+^*)$ telle que

$$\exists a < 0,\ \lim_{x\to+\infty} \frac{f'(x)}{f(x)} = a$$

Montrer que f et f' sont intégrables sur $\mathbb{R}_+$.

II.48 Théorème de d'Alembert-Gauss (1) ★★

[Corrigé]
Le but de cet exercice est de démontrer le théorème de d'Alembert-Gauss. On suppose par l'absurde qu'il existe un polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant qui ne possède aucune racine complexe. On pose pour tout $r \geq 0$:

$$F(r) = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{P(re^{i\theta})}$$

1. Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$.
2. Montrer que F est constante sur $\mathbb{R}_+$.
3. Conclure.

II.49 Fonction Gamma d'Euler ★★

[Corrigé]

On pose, lorsque cela est définie, $\Gamma(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}dt$.

1. Déterminer le domaine de définition de Γ.
2. Démontrer que $\forall x \in \text{dom}(\Gamma),\ \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ et en déduire que $\forall n \in \mathbb{N},\ \Gamma(n+1) = n!$.
3. Déterminer un équivalent simple en 0^+ de Γ.
4. Démontrer que Γ est $\mathcal{C}^\infty$ sur son domaine de définition.
5. Démontrer que Γ est convexe sur $\mathbb{R}_+^*$.
6. Démontrer que Γ est log-convexe sur $\mathbb{R}_+^*$.

II.49.1 Point critique et limite en $+\infty$ ★★★

1. Montrer que Γ admet un minimum sur $\mathbb{R}_+^*$ et qu'il est atteint en un unique point.
2. Déterminer la limite de Γ en $+\infty$.

II.49.2 Valeur en les demi-entiers ★★

Exprimer $\Gamma\left(n+\dfrac{1}{2}\right)$ en fonction de $n \in \mathbb{N}$.

On donne $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}dt = \sqrt{\pi}$.

II.49.3 Théorème de Bohr-Mollerup ★★★★

Démontrer que Γ est l'unique fonction qui vérifie :

— $\forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ f(x+1) = xf(x)$;

— $f(1) = 1$;

— f est log-convexe (c'est à dire $\ln f$ est convexe) sur $]0, +\infty[$.

II.49.4 Formules de Gauss et de Weierstrass

1. Démontrer que $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$\Gamma(x) = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^x n!}{x(x+1)\cdots(x+n)} = \frac{1}{x}\prod_{n=1}^{+\infty} \frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^x}{1+\frac{x}{n}} = \frac{e^{-\gamma x}}{x}\prod_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{\frac{x}{n}}}{1+\frac{x}{n}}$$

2. Vérifier que Γ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et calculer $\Gamma'(1)$ en utilisant la formule du produit ci-dessus.
3. En déduire la valeur de l'intégrale :

$$\int_0^{+\infty} \ln(t)e^{-t}dt$$

II.49.5 Lien entre les gamma d'Euler ★★★

On utilisera les résultats sur la fonction gamma sans les redémontrer.

1. Montrer que $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \int_0^n \ln(t)\left(1-\frac{t}{n}\right)^n dt = \Gamma'(1)$.
2. En déduire que $\Gamma'(1) = -\gamma$. On rappelle que $\gamma = \displaystyle\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln(n)$.

II.49.6 Formule de duplication de Legendre

Montrer la formule de duplication de Γ :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ \Gamma(x)\Gamma\left(x+\frac{1}{2}\right) = 2^{1-2x}\sqrt{\pi}\Gamma(2x)$$

— A l'aide de la formule du produit II.49.4 ;

— A l'aide du théorème de Bohr-Mollerup II.49.3.

II.49.7 Intégrale de Raabe

Montrer en utilisant la formule de duplication que pour tout $a \geq 0$ on a :

$$\int_a^{a+1} \ln(\Gamma(x))dx = a\ln a - a + \frac{\ln(2\pi)}{2}$$

II.49.8 Généralisation de la formule de Stirling

Montrer que

$$\Gamma(x+1) \underset{x\to+\infty}{\sim} \sqrt{2\pi x}\left(\frac{x}{e}\right)^x$$

A reformuler pour que ce soit accessible à tous

II.50 Fonction Bêta d'Euler ★★

[Corrigé]

On pose $B : (x,y) \mapsto \displaystyle\int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1}dt$.

1. Déterminer le domaine de définition de B
2. Démontrer que $\forall (x,y) \in \mathrm{dom}(B),\ B(x,y) = B(y,x)$
3. Démontrer que $\forall (x,y) \in \mathrm{dom}(B),\ B(x+1,y) = \dfrac{x}{x+y}B(x,y)$
4. Déterminer une expression de $B(n,p)$ pour $n,p \in \mathbb{N}^*$.

II.50.1 Lien avec une intégrale d'Euler

On pose $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln(\sin\theta)d\theta$.

1. Montrer que B est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\left(\mathbb{R}_+^*\right)^2$ et exprimer ses dérivées partielles sous forme d'intégrales.
2. Exprimer I à l'aide une dérivée partielle de B.

II.50.2 Lien entre Γ et B

1. Démontrer que $\forall (x,y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2,\ B(x,y) = \dfrac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$.
   Indication : On pourra utiliser le théorème de Bohr-Mollerup. II.49.3
2. En déduire un calcul de l'intégrale de Gauss $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}dt$.
3. En déduire que B est de classe $\mathcal{C}^1$ sur son domaine de définition et exprimer ses dérivées partielles en fonction de Γ et de sa dérivée.
4. En utilisant II.8, II.50.1 et II.49.5, calculer $\Gamma'\left(\dfrac{1}{2}\right)$.

II.51 Inégalité intégrale-dérivée

[Corrigé]
Soit $f : [a,b] \longmapsto \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $f(a) = f(b) = 0$.
Démontrer que $\left|\int_a^b f(t)dt\right| \leq \frac{(b-a)^2}{4}\|f'\|_\infty$.

II.52 Majoration de l'erreur dans la méthode des trapèzes ★★

[Corrigé]
Soit $f \in \mathcal{C}^2([a,b],\mathbb{R})$. Montrer que :

$$\left|\int_a^b f(t)dt - \frac{(b-a)}{2}(f(a)+f(b))\right| \leq \frac{(b-a)^3}{12}\|f''\|_\infty$$

II.53 Inégalité de Young ★★

[Corrigé]
Soient $c > 0$ et $f : [0,c] \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$, strictement croissante sur $[0,c]$ et telle que $f(0) = 0$.
Démontrer que $\forall a \in [0,c],\ \forall b \in [0, f(c)],\ \int_0^a f(t)dt + \int_0^b f^{-1}(t)dt \geq ab$.
Quand est-ce qu'il y a égalité ?
Remarque : Il s'agit du cas général de $\frac{u^p}{p} + \frac{v^q}{q} \geq uv$ utilisée pour démontrer l'inégalité de Hölder.

II.54 Transformée de Laplace ★★★★

[Corrigé]
Soit f une fonction continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$. On suppose qu'il existe $p \in \mathbb{R}$ tel que $t \longmapsto f(t)e^{-pt}$ soit intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$ et on pose : $\alpha = \inf\{p \in \mathbb{R}, t \mapsto f(t)e^{-pt} \in L^1(\mathbb{R}_+^*,\mathbb{R})\}$
Pour $p \in \mathbb{R}$, on pose $F(p) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt}dt$ lorsque cela est possible.

1. Justifier que F est définie sur $]\alpha, +\infty[$
2. *Théorème de la valeur initiale* : On suppose que $\lim_{0^+} f = l \in \mathbb{R}$. Montrer que $\lim_{p\to+\infty} pF(p) = l$
3. *Théorème de la valeur finale* : On suppose que $\lim_{+\infty} f = l \in \mathbb{R}$. Montrer que $\lim_{p\to 0^+} pF(p) = l$

II.55 Théorème des résidus (Version faible) (HP) ★★★

[Corrigé]
On considère une fraction rationnelle R à coefficients complexes, intégrable sur $\mathbb{R}$. On note $\mathcal{H}^+ = \{z \in \mathbb{C}, \mathrm{Im}(z) > 0\}$ et $a_1, \ldots, a_n$ la liste des pôles distincts de R. Pour tout $k \in [\![1;n]\!]$, on note $\mathrm{Res}_R(a_k)$ le coefficient de $\frac{1}{X-a_k}$ dans l'écriture de R en éléments simples.

1. Montrer que $\sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}_R(a_k) = 0$.
2. Montrer que $\int_{-\infty}^{+\infty} R(t)dt = 2i\pi \sum_{a_k \in \mathcal{H}^+} \mathrm{Res}_R(a_k)$.

III Fonction réelle

III.1 Formule de Leibniz ☆

[Corrigé]
Enoncer et démontrer la formule de Leibniz.

III.2 Fonction discontinue en tout point ★

[Corrigé]
Donner un exemple de fonction définie sur $\mathbb{R}$ mais continue en aucun point de $\mathbb{R}$.

III.3 Fonction nulle part dérivable ★★★

[Corrigé]
Donner un exemple de fonction continue sur $\mathbb{R}$ mais dérivable en aucun point de $\mathbb{R}$.

III.4 Théorème de Rolle

[Corrigé]
Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ dérivable n fois.

1. On suppose que f s'annule en $(n+1)$ points distincts de $[a, b]$.
   Démontrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $f^{(n)}(c) = 0$.
2. On suppose que $f(a) = f'(a) = \cdots = f^{(n-1)}(a) = f(b) = 0$.
   Démontrer que qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $f^{(n)}(c) = 0$.

III.5 Inégalité intégrale de Jensen ☆

[Corrigé]
Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ une fonction continue par morceaux à valeurs dans un intervalle J. Soit φ une fonction continue et convexe sur J. Démontrer que :

$$\varphi\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)dt\right) \leq \frac{1}{b-a}\int_a^b \varphi \circ f(t)dt$$

On pourra passer par des sommes de Riemann.

III.6 Lemme de Croft ★★

[Corrigé]

Soit $f : \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}$ uniformément continue sur $\mathbb{R}_+$ telle que pour tout $x > 0$ la suite $(f(nx))_{n\in\mathbb{N}}$ tend vers 0. Montrer que $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

III.7 Dérivée symétrique ★

[Corrigé]

On dit qu'une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ admet une *dérivée symétrique* en $a \in \mathbb{R}$ lorsque le rapport $\dfrac{f(a+h)-f(a-h)}{2h}$ admet une limite finie lorsque h tend vers 0.

1. Prouver la dérivabilité en a est une condition suffisante de dérivabilité symétrique en a.
2. Est-ce une condition nécessaire ?

III.8 Continuité au sens de Cesàro ★★★

[Corrigé]

Soit f une fonction réelle. On dit que f est *continue au sens de Cesàro* en $a \in \mathbb{R}$ lorsque

$$\forall (x_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}},\ \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} a \implies \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f(x_k) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} f(a)$$

1. Montrer que si f est continue au sens de Cesàro alors $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ f\left(\dfrac{x+y}{2}\right) = \dfrac{f(x)+f(y)}{2}$.
2. En déduire l'ensemble des fonctions réelles continues au sens de Cesàro.

III.9 Une équation fonctionnelle (1) ★★★

[Corrigé]

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que $\forall x, y \in \mathbb{R},\ f(x+y) = e^y f(x) + e^x f(y)$.

1. On suppose f dérivable en 0. Déterminer f.
2. On suppose f continue sur $\mathbb{R}$. Déterminer f.

III.10 Une équation fonctionnelle (2)

[Corrigé]

1. Trouver les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ monotones telles que $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ f(xy) = f(x)f(y)$.
2. Trouver les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ monotones telles que

$$\forall x \neq y \in \mathbb{R},\ f\left(\frac{x+y}{x-y}\right) = \frac{f(x)+f(y)}{f(x)-f(y)}$$

III.11 Fonction de Pringsheim ★★

[Corrigé]

Reconnaître la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \lim\limits_{n\to+\infty} \lim\limits_{m\to+\infty} |\cos(n!\pi x)|^m$.

III.12 $f \circ f = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}_+}$ ★★

[Corrigé]

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ une application continue telle que $f \circ f = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}_+}$. Déterminer f.

III.13 Point fixe d'une fonction continue et décroissante sur $\mathbb{R}$ ★

[Corrigé]

Soit f une fonction continue et décroissante sur $\mathbb{R}$. Montrer que f admet un unique point fixe.

III.14 Un théorème du point fixe (1) ★

[Corrigé]

Soit $f : [0,1] \to [0,1]$ continue. Montrer que f admet un point fixe.

III.15 Un théorème du point fixe (2) ★★

[Corrigé]

Soit f une fonction continue sur un segment $I = [a,b]$ telle que $I \subset f(I)$.

1. Montrer que f prend les valeurs a et b sur I.
2. Montrer que f admet un point fixe.

III.16 Point fixe de $f \circ f$ ★★

[Corrigé]

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue telle que $f \circ f$ admet un point fixe. f admet-elle un point fixe ?

III.17 Point fixe de $f \circ g$ et $g \circ f$ ★★

[Corrigé]

Soit f et g deux fonctions continues sur $\mathbb{R}$ telles que $f \circ g$ est strictement décroissante.

1. Montrer que $f \circ g$ admet un unique point fixe.
2. Montrer que $g \circ f$ admet un unique point fixe.

III.18 Racine carrée de cos ★★★

[Corrigé]

1. Montrer que cos admet un unique point fixe sur $\mathbb{R}$.
2. Existe-t-il une fonction dérivable f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que $f \circ f = \cos$?
3. Même question si f est simplement continue.

III.19 Trigonométrie ★

[Corrigé]

Démontrer les identités suivantes :

1. $\forall x \in [-1,1],\ \cos(\arcsin(x)) = \sin(\arccos(x)) = \sqrt{1-x^2}$.
2. $\forall x \in]-1,1[,\ \arcsin(x) = \arctan\left(\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}^*,\ \arctan(x) + \arctan\left(\dfrac{1}{x}\right) = \operatorname{sgn}(x)\dfrac{\pi}{2}$.
4. $\forall x \in [-1,1],\ \arcsin(x) + \arccos(x) = \dfrac{\pi}{2}$.
5. *Formule de Machin :* Prouver l'égalité suivante, $4\arctan\left(\dfrac{1}{5}\right) - \arctan\left(\dfrac{1}{239}\right) = \dfrac{\pi}{4}$.

III.20 Règle de l'Hôpital ★★

[Corrigé]

Soient $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$, f et g deux fonctions de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$ continues sur $[a,b]$ et dérivables sur $]a,b[$.

1. Montrer qu'il existe $c \in]a,b[$ tel que
$$g'(c)(f(b)-f(a)) = f'(c)(g(b)-g(a)).$$
2. Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $x_0 \in I$, f et g définies et continues sur I, dérivables sur $I \setminus \{x_0\}$ telles que pour tout $x \in I \setminus \{x_0\}$, $g'(x) \neq 0$ et telles que $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = \ell \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.
Montrer que le rapport $\dfrac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}$ tend vers ℓ quand x tend vers x_0. (Règle de l'Hôpital)
3. Retrouver, en utilisant la règle de l'Hôpital, les développement limités suivants en 0 :
   - $\sin(x) \underset{x\to 0}{=} x + o(x)$
   - $\cos(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - \dfrac{1}{2}x^2 + o\left(x^2\right)$
   - $\sin(x) \underset{x\to 0}{=} x - \dfrac{1}{6}x^3 + o\left(x^3\right)$

III.21 Dérivabilité de la racine ★★★

[Corrigé]

Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R}_+)$. Montrer que la fonction $\sqrt{f}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ si et seulement si :
$$\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = 0 \implies f''(x) = 0$$

III.22 Dérivée et inverse confondus ★★★

[Corrigé]

On note E l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ bijectives de $]0,+\infty[$ dans $]0,+\infty[$ telles que $f' = f^{-1}$.

1. Trouver un élément de E de la forme $x \mapsto \alpha x^\beta$ avec $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
2. Si $f \in E$, déterminer la limite en 0 de f et de f^{-1}.
3. Montrer que si $f \in E$, alors f est un $\mathcal{C}^\infty$ difféomorphisme de $]0,+\infty[$ dans $]0,+\infty[$.
4. Montrer que toute fonction $f \in E$ admet un unique point fixe.
5. Soit f et g deux éléments de E. Montrer que f et g admettent le même point fixe.

III.23 Fonction croissante et convexe sur $\mathbb{R}$ ★

[Corrigé]

Soit f une fonction réelle croissante et convexe sur $\mathbb{R}$ non constante.

1. On suppose que f est dérivable sur $\mathbb{R}$. Montrer que $\lim\limits_{+\infty} f = +\infty$.
2. Montrer le même résultat sans l'hypothèse de dérivabilité.

III.24 Convexité des fonctions continues ★★★★

[Corrigé]

Démontrer qu'une fonction réelle f continue sur un intervalle I est convexe sur I si et seulement si
$$\forall (x,y) \in I^2,\ f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}$$

III.25 Continuité des fonctions convexes ★★

[Corrigé]
Soit f une fonction réelle convexe sur un intervalle ouvert I.

1. Montrer que f est continue sur I.
2. Le résultat est-il encore vrai pour un intervalle qui n'est pas ouvert ?

III.26 Théorème de Darboux ★★★★

[Corrigé]
Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction dérivable.

1. Démontrer que $f'(I)$ est un intervalle.
2. On suppose de plus f convexe. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$.

III.26.1 Réciproque du TVI ★

[Corrigé]
La réciproque du théorème des valeurs intermédiaires est-elle vrai ?

III.26.2 Fonction non primitivable ★

[Corrigé]
Donner un exemple de fonction qui n'admet pas de primitive.

III.27 Fonctions logarithmiquement convexes ★★★

[Corrigé]
On dit qu'une fonction réelle f à valeurs dans $]0, +\infty[$ est logarithmiquement convexe si la fonction $\ln \circ f$ est convexe. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \to \mathbb{R}_+^*$.

1. Montrer que si f est log-convexe, alors f est convexe. La réciproque est-elle vraie ?
2. Montrer que f est log-convexe si et seulement si f^α est convexe quel que soit $\alpha > 0$.
3. Montrer que f est log-convexe si et seulement si l'application $\varphi_c : \left\{ \begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & \mathbb{R}_+^* \\ x & \longmapsto & f(x)c^x \end{array} \right.$ est convexe quel que soit $c > 0$.
4. Montrer que si f et g sont deux applications de I dans $\mathbb{R}_+^*$ log-convexes alors $f + g$ et $f \times g$ le sont également.

III.28 Etude d'une fonction définie implicitement ★★★

[Corrigé]
Soit une application continue $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que $\forall x \in \mathbb{R}$, $g^2(x) = g \circ g(x) = 2g(x) - x$.

1. Montrer que g est une bijection croissante de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
2. Déterminer la forme de g.
   Indication : on pourra s'intéresser à la fonction $h = g - Id_{\mathbb{R}}$.

III.29 Minoration de arctan ★

[Corrigé]
Montrer que $\forall t > 0,\ \arctan(t) > \dfrac{t}{1+t^2}$.

III.30 Majoration par un polynôme ★★

[Corrigé]

Soit $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. On suppose qu'il existe un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré impair vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in \mathbb{R},\ |f^{(n)}(x)| \leq |P(x)|$$

Montrer que f est nulle. Le résultat est-il toujours vrai si P est de degré pair ?

III.31 Inégalités de Kolmogorov ★★★★

[Corrigé]

Soient $f \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ et un entier $n \geq 2$ On note $\forall k \in [\![0; n]\!],\ M_k = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f^{(k)}(x)|$.

On suppose que M_0 et M_n sont finis.

Le but de cet exercice est de démontrer que $\forall k \in [\![1; n]\!],\ M_k \leq 2^{\frac{k(n-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{n}} M_n^{\frac{k}{n}}$.

1. Que peut-on dire si l'un des M_k est nul ?
   Dans la suite on considérera que $\forall k \in [\![0; n]\!],\ M_k > 0$.
2. a. On fixe $x \in \mathbb{R}$ ainsi que $h_1, \dots, h_{n-1}$ des réels strictement positifs. Montrer qu'il existe $H > 0$ tel que,
   $$\forall i \in [\![1; n]\!],\ \left| f(x) + h_i f'(x) + \cdots + \frac{h_i^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(x) \right| \leq 2M_0 + \frac{H^n M_n}{n!}$$
   b. En déduire que les M_k sont finis.
   Indication : On pourra traduire les inégalités à l'aide de matrices
3. a. Soit $h > 0$. Montrer que $M_1 \leq \frac{M_2 h}{2} + \frac{M_0}{h}$.
   b. En déduire que $M_1 \leq \sqrt{2M_0 M_2}$.
4. a. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite croissante. Soient $n \geq 2$ et $k \in [\![1; n-1]\!]$.
   Montrer que $\frac{1}{k} \sum_{i=0}^{k} u_i \leq \frac{1}{n-k} \sum_{i=k+1}^{n} u_i$.
   b. On pose pour $k \in [\![0; n]\!],\ x_k = \ln(M_k) - \frac{\ln 2}{2} k(n-k)$.
   Montrer que $\forall k \in [\![1; n-1]\!],\ 2x_k \leq x_{k-1} + x_{k+1}$.
   c. Conclure.

III.32 Vers le principe des zéros isolés ★★★

[Corrigé]

Soit $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

1. Soit $a \in \mathbb{R}$ tel que $f(a) = 0$. On suppose qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $f^{(n)}(a) \neq 0$. Montrer qu'il existe $h > 0$ tel que :
   $$\forall x \in]a-h, a+h[\setminus \{a\},\ f(x) \neq 0$$
2. Soit S un segment de $\mathbb{R}$. On suppose que pour tout zéro a de f, il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $f^{(n)}(a) \neq 0$. Montrer que f ne s'annule qu'un nombre fini de fois sur S.

III.33 Fonction test

[Corrigé]

Soient $a < b$ des réels. Le but de cet exercice est de construire une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ de support $[a, b]$, c'est-à-dire s'annulant exactement sur $\mathbb{R} \setminus [a, b]$. On pose

$$\varphi : t \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } t \leq 0 \\ e^{-1/t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N},\ \exists P_n \in \mathbb{R}[X],\ \forall t > 0,\ \varphi^{(n)}(t) = P_n\left(\frac{1}{t}\right) e^{-1/t}$.
2. En déduire que φ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.
3. Conclure.

III.34 Fonction plateau

[Corrigé]
Le but de cet exercice est de construire une fonction réelle positive ρ, de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et telle que $\forall t \in \mathbb{R},\ |t| \leq 1 \implies \rho(t) = 1$ et $|t| > 2 \implies \rho(t) = 0$. On pose

$$\psi : t \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } t \notin [-1,1] \\ e^{1/(t^2-1)} & \text{sinon} \end{cases}$$

1. En exprimant ψ à partir de φ, montrer que $\psi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R})$.
2. Soit θ l'unique primitive de ψ s'annulant en 0. Montrer que θ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, constante sur $]-\infty,1]$ et sur $[1,+\infty[$. Vérifier que les constantes en questions sont différentes.
3. Conclure.

III.35 Théorème de réalisation de Borel ★★★★

[Corrigé]
Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite complexe quelconque.
Soit $\varphi : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ une application de classe $\mathcal{C}^\infty$ telle que $\varphi(x) = 1$ pour $x \in [-1,1]$ et $\varphi(x) = 0$ pour $|x| > 2$ (l'exercice précédent en donne une construction). On pose pour $n \in \mathbb{N}$, $\varphi_n : x \mapsto x^n\varphi(x)$ et on note $M_n = \max\limits_{0\leq i\leq n-1} \left\|\varphi_n^{(i)}\right\|_\infty$, et on choisit une suite réelle $(\lambda_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vérifiant $\lambda_n \geq 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, tendant vers $+\infty$, et telle que $\sum\limits_{n\in\mathbb{N}} \frac{|a_n|M_n}{\lambda_n}$ converge.
Montrer que la fonction $f : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n \frac{x^n}{n!}\varphi(\lambda_n x)$ est bien définie, de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et vérifie $f^{(n)}(0) = a_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

III.35.1 Prolongement de classe $\mathcal{C}^\infty$ ★

[Corrigé]
Soient $a < b$ des réels.
Montrer que toute fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[a,b]$, c'est-à-dire $\mathcal{C}^\infty$ sur $]a,b[$ et qui admet des dérivées à tout ordre à droite en a et à gauche en b, est prolongeable en une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

III.35.2 Fonction paire de classe $\mathcal{C}^\infty$

[Corrigé]
Soit $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R})$ une fonction paire. Montrer qu'il existe $g \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R})$ telle que :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = g(x^2)$$

IV

Polynôme

IV.1 Théorème de d'Alembert-Gauss (2) ★★★

[Corrigé]

Soit $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geq 1$. Notons $\mathcal{P} = \{|P(z)|, z \in \mathbb{C}\}$.

1. Justifier que $\mathcal{P}$ admet une borne inférieure notée α.
2. Soit $r > 0$.

   Montrer que pour tout nombre complexe z de module r, $|P(z)| \geq |a_p| r^n - \sum_{k=0}^{n-1} |a_k| r^k$
3. En déduire que $\lim_{|z|\to+\infty} |P(z)| = +\infty$.
4. a. Montrer qu'il existe une suite $(u_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ bornée telle que $\lim_{n\to+\infty} |P(u_n)| = \alpha$

   b. Montrer qu'il existe $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que $|P(z_0)| = \alpha$.
5. On suppose que $\alpha > 0$. On considère alors le polynôme $Q = \dfrac{P(X + z_0)}{P(z_0)}$

   a. Montrer que $\inf_{z\in\mathbb{C}} |Q(z)| = |Q(0)| = 1$.

   b. Montrer qu'il existe $p \in [\![1; n]\!]$ et $b_p \neq 0, b_{p+1}, \ldots, b_n \in \mathbb{C}$ tels que :

   $$Q = \sum_{k=p+1}^{n} b_k X^k + b_p X^p + 1$$

   c. On pose $b_p = \rho e^{i\theta}$ avec $\rho < 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$. Montrer qu'il existe $r_0 > 0$ tel que

   $$\forall r \in]0, r_0], \ |Q(re^{i\theta/p})| - 1 < 0$$
6. Conclure.

IV.2 Bernoulli ★★

[Corrigé]

1. Définition :

   a. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Montrer qu'il existe un unique $Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que $Q' = P$ et $\int_0^1 Q(x)dx = 0$.

   b. En déduire qu'il existe une unique suite de polynômes réels $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vérifiant :

   $$B_0 = 1 \ ; \ \forall n \geq 1, \ B_n' = nB_{n-1} \ ; \ \forall n \geq 1, \ \int_0^1 B_n(x)dx = 0$$

c. Calculer B_1 et B_2.

d. Soit $n \in \mathbb{N}$. Quel est le degré de B_n.

On appelle $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite des polynômes de Bernoulli. Pour tout $n \geq 0$, on pose $b_n = B_n(0)$.
La suite de réels (b_n) est appelée suite des nombres de Bernoulli.

2. Propriétés :

a. Montrer que pour tout $n \geq 2$, $B_n(0) = B_n(1)$.

b. Montrer que pour tout entier positif n, $B_n = (-1)^n B_n(1-X)$. En déduire que $B_{2n+1}(0) = B_{2n+1}(1) = 0$.

c. A l'aide de la formule de Taylor, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $B_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} b_{n-k} X^k$.

d. En déduire que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $b_{2n+2} = \sum_{k=0}^{2n+2} \binom{2p+2}{k} b_k$.

Puis que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $b_{2n} = -\dfrac{1}{(n+1)(2n+1)} \sum_{k=0}^{2n-2} \binom{2n+2}{k} b_k$

IV.3 Lagrange ★

[Corrigé]

Soient n un entier naturel non nul et $(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{K}^n$

1. Démontrer que l'application $\Psi : \begin{cases} \mathbb{K}_{n-1}[X] & \longrightarrow & \mathbb{K}^n \\ P & \longmapsto & (P(x_1), P(x_2), \ldots, P(x_n)) \end{cases}$ est un isomorphisme.

2. Montrer qu'il existe n polynômes $L_1, \ldots, L_n$ de $\mathbb{K}_{n-1}[X]$ tels que, pour tout polynôme $P \in \mathbb{K}_{n-1}[X]$ on ait :

$$P = \sum_{k=1}^{n} P(x_k) L_k$$

IV.4 Tchebychev ★★

[Corrigé]

On note E l'espace vectoriel des fonctions continues de $[-1, 1]$ dans $\mathbb{R}$.

1. Existence et unicité

a. Démontrer qu'il existe un polynôme T_n à coefficients réels de degré inférieur ou égal à n vérifiant la propriété suivante :

$$\forall \theta \in \mathbb{R},\ T_n(\cos(\theta)) = \cos(n\theta)$$

(On pourra remarquer que $\cos(n\theta)$ est la partie réelle de $(\cos(\theta) + i\sin(\theta))^n$.)

b. Démontrer qu'un tel polynôme est unique.

2. Montrer que $\forall x \in [-1, 1]$, $T_{n+2}(x) = 2xT_{n+1}(x) - T_n(x)$

3. Quel est le degré de T_n ? Quel est son coefficient dominant ?

4. Montrer que T_n est à coefficients entiers, et que si n est impair alors son coefficient constant est nul.

5. Racines et extremum :

a. Montrer que, pour tout $x \in [-1, 1]$, $T_n(x) = 2^{n-1} \prod_{k=0}^{n-1} (x - \cos(\theta_k))$ où $\theta_k = \dfrac{(2k+1)\pi}{2n}$

b. On pose, pour $k \in [\![0; n]\!]$, $c_k = \cos\left(\dfrac{k\pi}{n}\right)$. Calculer $\|T_n\|_\infty = \sup_{x\in[-1,1]} |T_n(x)|$ puis prouver que $|T_n(c_k)| = \|T_n\|_\infty$ pour tout $k \in [\![0; n]\!]$

6. Orthogonalité :

a. Montrer que, pour toutes fonctions f, g dans E, l'application $t \mapsto \dfrac{f(t)g(t)}{\sqrt{1-t^2}}$ est intégrable sur $]-1, 1[$.

b. Pour f, g éléments de E, on pose $\langle f, g\rangle = \displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{f(t)g(t)}{\sqrt{1-t^2}} dt$. Justifier que ceci définit un produit scalaire sur E.

c. Calculer $\langle T_n, T_m\rangle$ pour tous $n, m \in \mathbb{N}$.

IV.4.1 Angles rationnels dont le cosinus est rationnel ★★★

Soit $\alpha \in \pi\mathbb{Q}$.

1. On suppose que $\alpha \in \frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$. Que dire de $\cos(\alpha)$?
   On suppose dans la suite que $\alpha \notin \frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$ et on écrit $\alpha = \pi\frac{p}{q}$ avec $p \wedge q = 1$ et $q > 2$. On suppose de plus que $\cos(\alpha) = \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ avec $a \wedge b = 1$ et $b > 0$.
2. On suppose q impair.
   a. Montrer que $\cos(\alpha)$ est de la forme $\frac{\varepsilon}{2^r}$ avec $\varepsilon \in \{-1, 1\}$ et $r \in \mathbb{N}$.
   b. Conclure quand aux valeurs possibles de $\cos(\alpha)$.
3. On suppose que q est pair.
   En distinguant deux cas suivant si q est multiple de 4 ou pas, conclure quand aux valeurs possibles de $\cos(\alpha)$.
4. Synthétiser.
5. Que peut-on dire des valeurs de α pour lesquelles $\sin(\alpha)$ est rationnel ?
6. Déterminer les valeurs de α pour lesquelles $\tan(\alpha)$ est rationnel.

IV.4.2 Triangle à angles rationnels dont tous les côtés ont une longueur rationnelle ★★

On se place dans le plan $\mathbb{R}^2$ munit de sa structure euclidienne canonique et d'un repère orthonormé. Caractériser les triangles non plats dont les angles exprimés en degrés sont rationnels et tous les côtés ont une longueur rationnelle.

IV.4.3 Triangles dont les sommets sont à coordonnées rationnelles ★★

On se place dans le plan $\mathbb{R}^2$ munit de sa structure euclidienne canonique et d'un repère orthonormé. Caractériser les triangles non plats dont les sommets ont des coordonnées rationnelles.

IV.5 Hilbert ★★

[Corrigé]

On pose pour tout $k \in \mathbb{N}^*, H_k = \frac{1}{k!}\prod_{j=0}^{k-1}(X-j)$ et $H_0 = 1$. On pose également pour tout $P \in \mathbb{C}[X]$, $\Delta(P) = P(X+1) - P(X)$

1. Montrer que $(H_k)_{0\leq k\leq n}$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.
2. Calculer $\Delta(H_0)$ et, pour tout $k \in [\![1; n]\!]$, exprimer $\Delta(H_k)$ à l'aide de H_{k-1}.
3. Montrer que, pour tous $k, l \in [\![0; n]\!]$, $\Delta^k(H_k)(0) = \begin{cases} 1 & \text{si } k = l \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$
4. Montrer que, pour tout $P \in \mathbb{C}_n[X]$, $P = \sum_{k=0}^{n}(\Delta^k(P))(0)H_k$
5. Calculer $H_n(k)$ pour $k \in \mathbb{Z}$.
   On distinguera trois cas : $k \in [\![0; n-1]\!]$, $k \geq n$ et $k < 0$.
6. En déduire que $H_n(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$.
7. Montrer que $P \in \mathbb{C}_n[X]$ est à valeurs entières sur les entiers si et seulement si ses coordonnées dans la base $(H_k)_{0\leq k\leq n}$ sont entières.

IV.6 Laguerre ★★★

[Corrigé]

On pose, pour tout entier naturel n et pour tout réel x, $h_n(x) = x^n e^{-x}$ et $L_n(x) = \frac{e^x}{n!}h_n^{(n)}(x)$.

1. Montrer que, pour tout entier n, L_n est une fonction polynomiale. Préciser son degré et son coefficient dominant.
2. Pour tous, $P, Q \in \mathbb{R}[X]$ on pose $\langle P, Q\rangle = \displaystyle\int_0^{+\infty} P(x)Q(x)e^{-x}dx$.
   Démontrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est bien définie et est un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$
3. Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\langle L_0, X^n\rangle$.
4. Montrer que pour tout $k \in [\![0; n]\!]$ il existe $Q_k \in \mathbb{R}[X]$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on ait :
$$h_n^{(k)}(x) = x^{n-k}e^{-x}Q_k(x)$$
5. Etablir que : $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall P \in \mathbb{R}[X], \forall p \in [\![0; n]\!], \langle L_n, P\rangle = \dfrac{(-1)^p}{n!}\displaystyle\int_0^{+\infty} h_n^{(n-p)}(x)P^{(p)}(x)dx$.
6. En déduire que (L_n) est une famille orthonormée de $(\mathbb{R}[X], \langle \cdot, \cdot \rangle)$.

IV.7 Legendre ★★

[Corrigé]

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $Q_n = (X^2-1)^n$ et $P_n = \dfrac{1}{2^n n!}Q_n^{(n)}$. On pourra confondre polynôme et fonction polynomiale associée.

1. Calculer P_0,P_1,P_2 et P_3.
2. Quel est le degré de P_n ?
3. Montrer que P_n a la parité de n. En déduire $P_n(0)$ pour n impair et $P_n'(0)$ pour n pair.
4. Calculer $P_n(0)$ pour n pair et $P_n'(0)$ pour n impair. On exprimera les résultats à l'aide de factorielles.
5. Vérifier que $\forall n \in \mathbb{N},\ (X^2-1)Q_n' = 2nXQ_n$.
   En déduire que $\forall n \in \mathbb{N},\ (X^2-1)P_n'' + 2XP_n' = n(n+1)P_n$.
6. Montrer que pour tout $k \in [\![0; n-1]\!],\ Q_n^{(k)}(-1) = Q_n^{(k)}(1) = 0$.
7. En appliquant le théorème de Rolle et à l'aide d'une récurrence, montrer que P_n admet exactement n racines réelles distinctes dans $]-1, 1[$.

IV.8 Hermite ★★★

[Corrigé]

On définit le n-ième polynôme d'Hermite par :
$$\forall x \in \mathbb{R},\ H_n(x) = (-1)^n e^{\frac{x^2}{2}}\frac{d^n}{dx^n}\left(e^{-\frac{x^2}{2}}\right)$$

On définit aussi le produit scalaire suivant sur $\mathbb{R}[X]$:
$$\langle P, Q\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} P(t)Q(t)e^{-\frac{t^2}{2}}dt$$

1. Montrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est bien un produit scalaire.
2. Soient $m, n \in \mathbb{N}$. Montrer que si $n \neq m$ alors $\langle H_n, H_m\rangle = 0$.
3. Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer $\langle H_n, H_n\rangle$.
4. Montrer qu'on a la relation de récurrence d'ordre 2 suivante :
$$\forall x \in \mathbb{R},\ H_{n+1}(x) = xH_n(x) - nH_{n-1}(x)$$
5. Montrer que H_n vérifie l'équation différentielle suivante :
$$\forall x \in \mathbb{R},\ H_n''(x) - xH_n'(x) + nH_n(x) = 0$$

IV.9 Bernstein ★★★

[Corrigé]

On note $I = [0,1]$ et $\mathcal{C}$ l'espace vectoriel des fonctions continues de I dans $\mathbb{C}$.
On note, pour toute fonction $f \in \mathcal{C}$ et $n \in \mathbb{N}^*$:

$$B_n(f) : \begin{cases} I & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ x & \longmapsto & \displaystyle\sum_{k=0}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) b_k^n(x) \end{cases} \quad \text{avec } b_k^n(x) = \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$$

1. Calculer explicitement l'expression $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \left(\frac{k}{n} - x\right)^2 b_k^n(x)$, puis en déduire que :

$$\forall \mu > 0,\ \forall x \in I,\ \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ |\frac{k}{n} - x| \geq \mu}} b_k^n(x) \leq \frac{1}{n\mu^2}$$

2. *Théorème de Bernstein* : Pour tout $f \in \mathcal{C}$, montrer que la suite de fonctions $(B_n(f))$ converge uniformément vers f sur $[0,1]$. En déduire le théorème de Weierstrass.

IV.10 Polynômes cyclotomiques ★★★

[Corrigé]

Pour un entier n supérieur ou égal à 1, on dit qu'une racine n-ième de l'unité z est primitive si $z^d \neq 1$ pour tout entier d tel que $1 \leq d < n$. On note $\mathbb{P}_n$ l'ensemble des racines primitives n-ième de l'unité. On a donc $\mathbb{P}_1 = \{1\}$.
On définit $\Phi \in \mathbb{C}[X]$ par :

$$\Phi_n = \prod_{z \in \mathbb{P}_n} (X - z)$$

1. Montrer que pour tout $n \geq 1$, on a :

$$X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$$

2. Montrer que si p est un nombre premier et $k \geq 1$ est un entier, alors

$$\Phi_{p^k} = X^{(p-1)p^{k-1}} + X^{(p-2)p^{k-1}} + \cdots + X^{p^{k-1}} + 1$$

3. Calculer Φ_n pour $n \in [\![1;6]\!]$.
On fixe $n \geq 2$ pour toute la suite de cette partie.

4. a. Calculer $\Phi_n(0)$.
   b. Calculer $\Phi_n(1)$ en fonction de la décomposition en facteurs premiers de n.

5. a. Soient A et B deux polynômes à coefficient entiers avec B unitaire.
   On suppose qu'il existe un polynôme C tel que $A = BC$. A l'aide d'un calcul de division euclidienne, établir que C est à coefficients entiers.
   b. En déduire que $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$.

IV.11 Suite de polynômes définis par récurrence

[Corrigé]

Soit $f : x \mapsto \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un polynôme P_n tel que $f^{(n)}(x) = x^{-3} P_n(x) f(x)$ pour tout $x \neq 0$ et donner le degré de P_n.
2. Montrer que f est prolongeable par continuité en une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, P_n a toutes ses racines réelles.

IV.12 Equation polynomiale (1)

[Corrigé]
Trouver les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que $(X^2 - X)P''(X) = 6P(X)$.

IV.13 Equation polynomiale (2)

[Corrigé]
Trouver les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que $P(X^2) = (X^3 + 1)P(X)$.

IV.14 Equation polynomiale (3)

[Corrigé]
Trouver les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(X^2) = P(X + 1)^2$.

IV.15 Equation polynomiale (4)

[Corrigé]
On cherche à déterminer les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ solutions de l'équation $(*) : P(X^2) = P(X + 1)P(X)$.

1. Déterminer les polynômes constants solutions de $(*)$.
2. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ non constant solution de $(*)$ et soit λ une racine complexe de P.
   Montrer que $\lambda \in \{0, 1\}$ ou $|\lambda| = |\lambda - 1| = 1$.
3. Tracer dans python l'ensemble des $\lambda \in \mathbb{C}$ vérifiant $|\lambda| = |\lambda - 1| = 1$.
4. En déduire l'ensemble des solutions de $(*)$.

IV.16 Equation polynomiale (5)

[Corrigé]
Trouver les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(X^2) = P(X + 1)P(X - 1)$.
On pourra considérer une racine de P de module maximal.

IV.17 Equation de Shapiro

[Corrigé]
Trouver les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que $P(X)P(X + 1) = P(X^2 + X + 1)$.

IV.18 Degré d'une différence ★

[Corrigé]
Soient $P \neq Q \in \mathbb{R}[X]$ de degrés $n \geq 0$. Montrer que $P^3 - Q^3$ est au moins de degré $2n$.

IV.19 Théorème de la racine rationnelle ★★

[Corrigé]
Soit $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ de degré $n \geq 1$ un polynôme à coefficients entiers.
Montrer que si P admet une racine rationnelle irréductible $\frac{p}{q}$ alors $p|a_0$ et $q|a_n$.

IV.20 Critère d'Eisenstein ★★★

[Corrigé]

Soit $A(X) = X^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$ un polynôme à coefficients entiers. On suppose qu'il existe un nombre premier p tel que $p^2 \nmid a_0$ et $\forall i \in [\![0; n-1]\!],\ p|a_i$.
Pour $P \in \mathbb{Z}[X]$ on note $c(P)$ le pgcd de ses coefficients. l'entier $c(P)$ est appelé *contenu* de P.

1. Soient P et Q deux polynômes unitaires à coefficients entiers.
   a. Montrer que $c(PQ) = c(P)c(Q)$.
   b. En déduire que le produit de deux polynômes à coefficients rationnels est à coefficients entiers si et seulement si les deux facteurs sont à coefficients entiers.
2. Montrer que A est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

IV.20.1 Irréductibilité des polynômes cyclotomiques d'indices premiers ★★

Soit p un nombre premier. On pose $\Phi_p(X) = \sum_{k=0}^{p-1} X^k$.
En considérant $\Psi_p = \Phi_p(X+1)$, montrer que Φ_p est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

IV.20.2 Dimension de $\mathbb{R}$ en tant que $\mathbb{Q}$-espace vectoriel ★★★

Soient $n \geq 1$ un entier, $a_0, \dots, a_n$ des entiers et p un nombre premier vérifiant le critère d'Eisenstein. On pose $P = X^{n+1} + \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ et on note α une racine complexe de P. On note enfin $f_\alpha : \begin{cases} \mathbb{Q}[X] & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ Q & \longmapsto & Q(\alpha) \end{cases}$.

1. Donner la structure de $\mathrm{Ker}(f_\alpha)$ et montrer qu'il est engendré par un unique polynôme unitaire que l'on précisera.
2. Montrer que la famille $(1, \alpha, \dots, \alpha^n)$ est libre dans $\mathbb{Q}$.
3. En déduire la dimension de $\mathbb{R}$ en tant que $\mathbb{Q}$-espace vectoriel.

IV.21 Points critiques des polynômes de Hilbert ★★★

[Corrigé]

Soient n un entier supérieur ou égal à deux et $P_n = \prod_{k=0}^{n} (X-k)$.

1. En considérant $F_n = \frac{P_n'}{P_n}$, Montrer que P_n' admet une unique racine x_n sur $]0,1[$.
2. Montrer que $(x_n)_{n\geq 2}$ converge vers 0.
3. Montrer que $x_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{\ln n}$.

IV.22 Zéros du sinus tronqué

[Corrigé]

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k X^{2k+1}}{(2k+1)!}$.
Montrer que le nombre c_n de racines réelles de P_n (comptées avec multiplicité) vérifie $c_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{4n}{e\pi}$.

IV.23 Exponentielle tronquée ★

[Corrigé]

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que le polynôme $P = \sum_{k=0}^{n} \frac{X^k}{k!}$ est scindé à racine simples.

IV.24 Les fonctions localement polynomiales sont polynomiales ★★

[Corrigé]
Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction *localement polynomiale* c'est-à-dire vérifiant :

$$\forall a \in \mathbb{R},\ \exists \varepsilon > 0,\ \exists P \in \mathbb{R}[X],\ \forall x \in]a-\varepsilon, a+\varepsilon[,\ f(x) = P(x)$$

Montrer que f est une fonction polynomiale.

IV.25 Intégrales de polynômes ★

[Corrigé]
Soient $a \leq b$ deux réels et $x_0, \dots, x_n$ une subdivision de $[a, b]$.
Montrer qu'il existe des réels $\lambda_0, \dots, \lambda_n$ tels que :

$$\forall P \in \mathbb{K}[X],\ \int_a^b P(x)dx = \sum_{i=0}^{n} \lambda_i P(x_i)$$

IV.26 Théorème de Gauss-Lucas ★★

[Corrigé]
Pour tout $P \in \mathbb{C}[X]$, on note R_P l'ensemble des racines de P. Soit $P = \Lambda \prod_{k=1}^{r} (X - z_k)^{n_k} \in \mathbb{C}[X]$ non constant avec $R_P = \{z_k,\ k \in [\![1; r]\!]\}$.

1. Montrer que les racines de P' sont incluses dans l'enveloppe convexe de R_P :

$$\text{Conv}(R_P) = \left\{ \sum_{k=1}^{r} \lambda_k z_k \mid (\lambda_1, \dots, \lambda_r) \in (\mathbb{R}_+)^r, \sum_{k=1}^{r} \lambda_k = 1 \right\}$$

2. On suppose que P est à racines réelles. Que peut-on dire ?

IV.26.1 Une application ★★★

On reprend les notations précédentes.
On pourra utiliser, sans avoir à le démontrer, que l'enveloppe convexe d'une partie A de $\mathbb{C}$ est la plus petite partie convexe de $\mathbb{C}$ contenant A.

1. Montrer qu'il existe une sous partie $R_{P,\min}$ de R_P minimale pour l'inclusion telle que $\text{Conv}(R_P) = \text{Conv}(R_{P,\min})$ puis que $\text{Conv}(R_P) \setminus R_{P,\min}$ est convexe.

2. Démontrer que si $P''|P$, alors les racines de P sont alignées.
3. La réciproque est-elle vraie ?

IV.27 Graphe d'un polynôme ★★

[Corrigé]
Soit P un polynôme de degré $n \geq 2$. Montrer que le graphe de P a au plus n points alignés.

IV.28 Polynômes qui commutent avec cosinus ★★★

[Corrigé]
Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\forall x \in \mathbb{R},\ P(\cos(x)) = \cos(P(x))$.

1. Déterminer P s'il est constant.
2. Déterminer P si $\deg(P) = 1$.
3. Déterminer toutes les solutions.

IV.29 Relation trigonométrique polynomiale ★★★

[Corrigé]

Déterminer l'ensemble des polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que

$$\forall t \in \mathbb{R},\ P(\cos t) + P(\sin t) = 1$$

IV.30 Division euclidienne (1) ★★

[Corrigé]

Déterminer le reste dans la division euclidienne de $X^{42} + X^{1729} + X^{11\,111}$ par $X^2 + X + 1$.

IV.31 Division euclidienne (2) ★

[Corrigé]

Soit $n \in \mathbb{N}$. Déterminer le reste dans la division euclidienne de $(\cos\theta + X\sin(\theta))^n$ par $X^2 + 1$.

IV.32 Fonctions trigonométriques polynomiale ? ★

[Corrigé]

1. Montrer que cos n'est pas une fonction polynomiale.
2. Montrer que tan n'est pas une fonction polynomiale.

IV.33 Logarithme rationnel ? ★★

[Corrigé]

Existe-il une fraction rationnelle $R \in \mathbb{K}(X)$ telle que $R'(X) = \dfrac{1}{X}$.

IV.34 Une fraction rationnelle ★

[Corrigé]

Décomposer en éléments simples sur $\mathbb{C}(X)$ la fraction rationnelle $F(X) = \dfrac{1}{X^n(1-X)^n}$.

IV.35 Dérivé d'un polynôme scindé sur $\mathbb{R}$ ★★★

[Corrigé]

Soit P un polynôme de degré supérieur ou égal à 2 scindé sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que P' l'est aussi.
2. On fixe $\alpha \in \mathbb{R}$. Montrer que $P' + \alpha P$ l'est aussi.

IV.36 Une condition nécessaire pour qu'un polynôme soit scindé sur $\mathbb{R}$ ★★★

[Corrigé]

Soit $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ scindé sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R},\ P''(x)P(x) - (P'(x))^2 \leq 0$.

2. Montrer que $P', \dots, P^{(n-1)}$ sont scindés sur $\mathbb{R}$.
3. Démontrer que $\forall k \in [\![1; n-1]\!],\ a_k^2 \leq a_{k-1}a_{k+1}$.

IV.37 Une condition nécessaire pour qu'un polynôme soit dissocié sur $\mathbb{R}$ ★★

[Corrigé]

Soit $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ de degré $n \geq 2$ scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que P' est scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que $\forall k \in [\![0; n-1]\!],\ a_k^2 + a_{k+1}^2 > 0$.

IV.38 Suite de polynômes scindés sur $\mathbb{R}$ ★★★

[Corrigé]

Soit $(P_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{R}_n[X]^{\mathbb{N}}$ une suite de polynômes unitaires scindés sur $\mathbb{R}$ convergeant simplement vers un polynôme P sur $\mathbb{C}$. Montrer que P est scindé sur $\mathbb{R}$.

IV.39 Nombre de racines d'un polynôme réel ★★

[Corrigé]

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ admettant exactement $k \in \mathbb{N}^*$ coefficients non nuls. Montrer que P a au plus $2k-1$ racines réelles distinctes. Cette majoration est-elle optimale ?

IV.40 Borne de Cauchy ★★

[Corrigé]

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $P = X^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$.

Montrer que pour toute racine z de P on a $|z| \leq 1 + \max_{0\leq k\leq n-1} |a_k|$.

IV.41 Théorème d'Eneström-Kakeya ★★★

[Corrigé]

Soit $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\forall k \in [\![0; n]\!],\ a_k > 0$.

1. On suppose $a_0 \leq a_1 \leq \cdots \leq a_n$. Montrer que les racines de P sont toutes de module au plus 1.
   On pourra considérer le polynôme $Q = (X-1)P$.
2. Montrer qu'en général les racines de P sont comprises dans la couronne

$$C(r, R) = \{z \in \mathbb{C} \mid r \leq |z| \leq R\}$$

où r et R sont respectivement le minimum et le maximum de $\left(\frac{a_k}{a_{k+1}}\right)_{0\leq k\leq n-1}$.

IV.42 Perturbations de polynômes

[Corrigé]
Montrer pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $(a_0, \dots, a_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^n$ tel que $\forall (\varepsilon_0, \dots, \varepsilon_n) \in \{-1, 1\}^n$, le polynôme

$$P = \sum_{k=0}^{n} a_k \varepsilon_k X^k$$

soit scindé sur $\mathbb{R}$.

IV.43 Polynômes à coefficients dans $\{-1, 0, 1\}$

On note S l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\{-1, 0, 1\}$ et R l'ensemble des racines réelles des polynômes non nuls de S.

IV.43.1 Polynômes scindés

[Corrigé]
Déterminer les polynômes unitaires de S qui sont scindés sur $\mathbb{R}$.

IV.43.2 Ensemble des racines (1)

[Corrigé]
Montrer que R est une partie dénombrable de $\left[-2, -\frac{1}{2}\right] \cup \{0\} \cup \left[\frac{1}{2}, 2\right]$.

IV.43.3 Ensemble des racines (2)

[Corrigé]
Montrer que R est dense dans $\left[-2, -\frac{1}{2}\right] \cup \{0\} \cup \left[\frac{1}{2}, 2\right]$.
On pourra construire pour $\alpha \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$ une partie I de $\mathbb{N}^*$ telle que $\sum_{n \in I} \alpha^n = 1$.

IV.44 Théorème de Bernstein ★★★★

[Corrigé]
Soient $n \in \mathbb{N}$ et $P \in \mathbb{C}_n[X]$. Pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$ on pose $Q_\lambda(X) = \dfrac{P(\lambda X) - P(\lambda)}{X - 1}$. On fixe $\lambda \in \mathbb{C}$.

1. En décomposant la fraction rationnelle $\dfrac{Q_\lambda(X)}{X^n + 1}$ en éléments simples, montrer qu'en notant $\zeta_1, \dots, \zeta_n$ les racines de $X^n + 1$ on a :
$$\lambda P'(\lambda) = \frac{2}{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{\zeta_k P(\zeta_k \lambda)}{(\zeta_k - 1)^2} - \frac{2}{n} P(\lambda) \sum_{k=1}^{n} \frac{\zeta_k}{(\zeta_k - 1)^2}$$
2. En déduire l'égalité :
$$XP'(X) = \frac{n}{2} P(X) + \frac{2}{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{\zeta_k P(\zeta_k X)}{(\zeta_k - 1)^2}$$
On pourra appliquer le résultat de la question 2 a un polynôme bien choisi.
3. En déduire que $\sup_{z \in \mathbb{U}} |P'(z)| \leq n \sum_{z \in \mathbb{U}} |P(z)|$.

IV.45 Etude d'un polynôme défini implicitement

[Corrigé]

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer qu'il existe un unique polynôme $A_n \in \mathbb{C}[X]$ tel que $A_n\left(X + \frac{1}{X}\right) = X^n + \frac{1}{X^n}$.
2. Déterminer les racines de A_n.
3. Décomposer $\frac{1}{A_n}$ en éléments simples.

IV.46 P'|P ★

[Corrigé]
Déterminer les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que P' divise P.

IV.47 Polynôme positif (1) ★★★

[Corrigé]
Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\forall x \in \mathbb{R},\ P(x) \geq 0$. On pose $Q = \sum_{k=0}^{n} P^{(k)}$.

1. Montrer que $\lim\limits_{|x| \to +\infty} Q(x) = +\infty$.
2. En déduire que Q admet un minimum sur $\mathbb{R}$.
3. En déduire que $\forall x \in \mathbb{R},\ Q(x) \geq 0$.

IV.48 Théorème de Pythagore polynomial ★★★

[Corrigé]
Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ non constant tel que $P(x) \geq 0$ pour tout réel x.

1. Montrer que le coefficient dominant de P est positif et que les racines réelles de P sont de multiplicité paire.
2. Montrer qu'il existe un polynôme $C \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P = C\overline{C}$.
3. En déduire qu'il existe A et B dans $\mathbb{R}[X]$ tels que $P = A^2 + B^2$.

IV.49 Polynômes à valeurs carrées

[Corrigé]
Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\forall n \in \mathbb{N},\ \exists m \in \mathbb{N},\ P(n) = m^2$. On souhaite montrer qu'il existe un polynôme $Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P = Q^2$.

1. Soient $a \in \mathbb{R}$ et $f \in \mathcal{C}^\infty(]a, +\infty[, \mathbb{R})$. On définit $\Delta(f) : \left\{ \begin{array}{ccc}]a, +\infty[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f(x+1) - f(x) \end{array} \right.$. Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \forall x > a,\ \exists \theta \in [0, n],\ \Delta^n(f)(x) = f^{(n)}(x + \theta)$$

2. Conclure en appliquant la question 1 à $x \mapsto \sqrt{P(x)}$.

IV.50 Polynômes réciproques ★★

[Corrigé]
On dit qu'un polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré n est réciproque s'il s'écrit $P = a_n X^n + \cdots + a_0$ avec $a_k = a_{n-k}$ pour tout $k \in [\![0; n]\!]$.

1. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré n. Démontrer que P est réciproque si et seulement $P(X) = X^n P\left(\frac{1}{X}\right)$.

2. Montrer qu'un produit de polynômes réciproques est réciproque.
3. On suppose que P et Q sont réciproques et que $Q|P$. Démontrer que $\dfrac{P}{Q}$ est réciproque.
4. Soit $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{C}[X],\ a_n \neq 0$, un polynôme réciproque.
   a. Démontrer que si α est une racine de P, alors $\alpha \neq 0$ et α^{-1} est une racine de P.
   b. Démontrer que si 1 est une racine de P, alors sa multiplicité est supérieure ou égale à 2.
   c. Démontrer que si le degré de P est impair, alors -1 est une racine de P.
   d. Démontrer que si P est de degré pair et si -1 est une racine de P, alors sa multiplicité est supérieure ou égale à 2.
5. Démontrer que tout polynôme réciproque de $\mathbb{C}[X]$ de degré $2n$ se factorise en $P = a_{2n}(X^2 + b_1 X + 1)\dots(X^2 + b_n X + 1)$.
   Que peut-on dire si le degré de P est impair ?

IV.51 Polynômes surjectifs ★★★★★

[Corrigé]

Déterminer les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ vérifiant :

1. $P(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$
2. $P(\mathbb{U}) = \mathbb{U}$
3. $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$
4. $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$
5. $P(\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}) = \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$
6. $P(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$

IV.52 Résultant et discriminant ★★

[Corrigé]

Soit $(m,n) \in (\mathbb{N}^*)^2$. Soient $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{K}_n[X]$ et $Q = \sum_{k=0}^{m} b_k X^k \in \mathbb{K}_m[X]$ deux polynômes.

On pose le résultant de P et Q :

$$\mathrm{Res}(P,Q) = \begin{vmatrix} a_0 & 0 & \dots & \dots & 0 & b_0 & 0 & \dots & 0 \\ a_1 & a_0 & \ddots & \ddots & \vdots & b_1 & b_0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & a_1 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots & b_1 & \ddots & 0 \\ a_n & \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots & & \ddots & b_0 \\ 0 & a_n & & \ddots & a_0 & b_m & & & b_1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & & a_1 & 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & a_n & 0 & \dots & 0 & b_m \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{matrix}$$

(m colonnes pour les a_k, n colonnes pour les b_k)

Le résultant des polynômes P et Q est défini comme le déterminant d'une matrice de taille $n+m$, appelée matrice de Sylvester et notée $\mathrm{Syl}(P,Q)$.

On note $\mathcal{B}_c$ la base canonique de $\mathbb{K}_{n+m-1}[X]$.

1. Montrer que $\mathcal{B} = ((1,0),(X,0),\dots,(X^{m-1},0),(0,1),(0,X),\dots,(0,X^{n-1}))$ est une base de $\mathbb{K}_{m-1}[X] \times \mathbb{K}_{n-1}[X]$
2. On pose l'application $\varphi : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{K}_{m-1}[X] \times \mathbb{K}_{n-1}[X] & \longrightarrow & \mathbb{K}_{n+m-1}[X] \\ (U,V) & \longmapsto & PU + QV \end{array} \right.$
   Montrer que φ est une application linéaire.

3. Expliciter sa matrice M relativement aux bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}_c$
4. Montrer que $P \wedge Q = 1 \iff \text{Res}(P,Q) \neq 0$.

On pose $\Delta(P) = \dfrac{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}{a_n} \text{Res}(P,P')$ appelé discriminant de P.

5. On suppose ici que P est de degré 2 et on pose $P = aX^2 + bX + c$. Calculer $\Delta(P)$.
6. On suppose ici que $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ et par conséquent que $P \in \mathbb{C}[X]$. Montrer que P est scindé à racines simples si et seulement $\Delta(P) \neq 0$

IV.53 Théorème de Liouville : Fermat pour les polynômes ★★★★

[Corrigé]

Soit n un entier supérieur ou égal à 3. On souhaite montrer que si $(P,Q,R) \in \mathbb{C}[X]^3$ tel que $P^n + Q^n = R^n$ alors P,Q,R sont égaux à une constante multiplicative près. On se donne (P,Q,R) un tel triplet.

1. Montrer que l'on peut se ramener à $\tilde{P}, \tilde{Q}, \tilde{R}$ premiers entre eux deux à deux.

Dorénavant on supposera P,Q,R premiers entre eux deux à deux et on cherche à montrer que P,Q,R sont constants.

2. On note $\zeta_1, \dots, \zeta_n$ les racines de $X^n + 1$ et pour $i \in [\![1;n]\!]$, $T_i = P - \zeta_i Q$.
   Montrer que $\forall i \in [\![1;n]\!], \exists H_i \in \mathbb{C}[X],\ T_i = H_i^n$.

3. Conclure.

V

Espace vectoriel normé

V.1 Suite de Cauchy ★★

[Corrigé]
Soit $(E, \|.\|)$ un espace vectoriel normé.
On dit qu'une suite $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ est de Cauchy lorsqu'elle vérifie :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall p, q \in [\![N; +\infty[\![,\ ||u_p - u_q|| \leq \varepsilon$$

Démontrer que toute suite convergente est une suite de Cauchy puis démontrer qu'en dimension finie il y a équivalence.

V.2 Théorème de Fréchet-Von Neumann-Jordan

[Corrigé]
Soit $(E, \|.\|)$ un espace vectoriel normé.
Montrer que $\|.\|$ est une norme euclidienne si et seulement si elle vérifie l'identité du parallélogramme :

$$\forall x, y \in E,\ \|x - y\|^2 + \|x + y\|^2 = 2\left(\|x\|^2 + \|y\|^2\right)$$

V.3 Une norme non euclidienne

[Corrigé]
Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $\alpha_0, \ldots, \alpha_n$ des réels distincts.
Montrer que l'application N définie sur $\mathbb{R}_n[X]$ par $\forall P \in \mathbb{R}_n[X],\ N(P) = \sum_{k=0}^{n} |P(\alpha_k)|$ est une norme non euclidienne.

V.4 Norme invariante par similitude

[Corrigé]
Soit $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\|.\|$ une norme sur E telle que :

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ \forall P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}),\ \left\|P^{-1}AP\right\| = \|A\|$$

1. Montrer que, pour tout $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$, $\|AB\| = \|BA\|$. On pensera à utiliser la densité de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$.
2. En déduire une contradiction.

V.5 Equivalence des normes dans un espace vectoriel normé de dimension finie

[Corrigé]

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E. Fixons une norme N sur E.

On définit l'application $N_0 : \left\{ \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i & \longmapsto & \sup_{1 \leq i \leq n} |x_i| \end{array} \right.$.

1. Montrer que N_0 définie une norme sur E.
2. Trouver une constante $\beta > 0$ tel que $\forall x \in E,\ N(x) \leq \beta N_0(x)$
3. On définit $T : \left\{ \begin{array}{ccc} (\mathbb{K}^n, \|.\|_\infty) & \longrightarrow & (E, N_0) \\ (x_1, \dots, x_n) & \longmapsto & \sum_{i=1}^{n} x_i e_i \end{array} \right.$.
   a. Montrer que T est continue.
   b. En déduire que $S_{N_0} = \{x \in E,\ N_0(x) = 1\}$ est une partie compacte de (E, N_0).
   c. Déterminer une constante $\alpha > 0$ telle que $\forall x \in \mathbb{K}^n,\ N(x) \geq \alpha N_0(x)$.
4. Conclure que toutes les normes de E sont équivalentes.

V.6 Normes non équivalentes

[Corrigé]

Donner un exemple de deux normes non équivalentes sur un espace vectoriel normé.

V.7 Normes semblables à la norme uniforme sur $\mathbb{K}[X]$

[Corrigé]

On pose pour $A \subset \mathbb{K}$ et $P \in \mathbb{K}[X]$, $N_A(P) = \sup_{x \in A} |P(x)|$.

Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que N_A soit une norme sur $\mathbb{K}[X]$.

V.8 Comparaisons de deux normes sur $\mathbb{K}_n[X]$

[Corrigé]

Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour $P \in \mathbb{K}_n[X]$ on pose $\|P\|_1 = \int_0^1 |P(t)|dt$ et $\|P\| = \sum_{k=0}^{n} |P(k)|$.

1. Montrer que $\|.\|_1$ et $\|.\|$ sont des normes de $\mathbb{K}_n[X]$.
2. Trouver une constante $C_n > 0$ telle que $\forall P \in \mathbb{K}_n[X],\ \|P\|_1 \leq C_n \|P\|$.
3. $\|.\|_1$ et $\|.\|$ sont-elles équivalentes ?

V.9 Comparaisons de normes usuelles sur $\mathcal{C}^0([a,b], \mathbb{K})$

[Corrigé]

Soient $a \leq b$ deux réels. On note $E = \mathcal{C}^0([a,b], \mathbb{K})$. Pour $f \in E$ on définit :

$$\|f\|_\infty = \sup_{a \leq t \leq b} |f(t)| \qquad \|f\|_1 = \int_a^b |f(t)|dt \qquad \|f\|_2 = \sqrt{\int_a^b |f(t)|^2 dt}$$

1. Montrer que $\|.\|_\infty$, $\|.\|_1$ et $\|.\|_2$ sont des normes sur E.
2. Soit $f \in E$. Montrer que
$$\|f\|_1 \leq (b-a)\|f\|_\infty \qquad \|f\|_2 \leq \sqrt{b-a}\|f\|_\infty \qquad \|f\|_1 \leq \sqrt{b-a}\|f\|_2$$
3. Montrer que ces trois normes ne sont pas équivalentes.

V.10 Normes p

[Corrigé]

Pour $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ et $p \geq 1$, on pose $\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}$.

V.10.1 Inégalités de Hölder et Minkowski

Soient p et q deux nombres réels strictement positifs tels que $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$.

1. Prouver l'inégalité de Young,
$$\forall (u, v) \in (\mathbb{R}_+^*)^2,\ uv \leq \frac{u^p}{p} + \frac{v^q}{q}.$$
2. *Inégalité de Hölder*
Soient $x_1, \dots, x_n$ et $y_1, \dots, y_n$ des réels strictement positifs. Prouver l'inégalité de Hölder,
$$\sum_{k=1}^{n} x_k y_k \leq \left(\sum_{k=1}^{n} x_k^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^{n} y_k^q\right)^{\frac{1}{q}}.$$
3. *Inégalité de Minkowski*
Soient $p \geq 1$, $x_1, \dots, x_n$ et $y_1, \dots, y_n$ des réels strictement positifs. Prouvez l'inégalité de Minkowski,
$$\left(\sum_{k=1}^{n} (x_k + y_k)^p\right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^{n} x_k^p\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^{n} y_k^p\right)^{\frac{1}{p}}$$
4. En déduire que $\|.\|_p$ est une norme sur $\mathbb{K}^n$.

V.10.2 Equivalence des normes p et q

1. Soit $p \geq 1$. Montrer que $\|.\|_\infty$ et $\|.\|_p$ sont équivalentes.
2. Soit $1 \leq p \leq q < +\infty$. Montrer que $\forall x \in \mathbb{K}^n,\ \|x\|_q \leq \|x\|_p \leq n^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \|x\|_q$.

V.10.3 Norme infinie

On définit la norme infini $\|.\|_\infty$ par $\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n,\ \|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$.
Montrer que $\forall x \in \mathbb{K}^n,\ \|x\|_\infty = \lim_{p \to +\infty} \|x\|_p$.

V.11 Normes de Sobolev

[Corrigé]
Soit $E = \mathcal{C}^n([a, b], \mathbb{R})$ et $F = \mathcal{C}^{n-1}([a, b], \mathbb{R})$.
On définit la n-ième norme de Sobolev sur E par :
$$S_n(f) = \sum_{i=0}^{n} \left\| f^{(i)} \right\|_2$$

1. Montrer qu'il s'agit bien d'une norme.
2. Montrer que la dérivation
$$D : \left\{ \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & F \\ f & \longmapsto & f' \end{array} \right.$$
est continue sur (E, S_n).

3. Généralisation :
   Soient (E, N_E) et (F, N_F) deux espaces vectoriels normés et soit $T : E \to F$ linéaire
   La fonction
   $$N_T : \left\{ \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ x & \longmapsto & N_E(x) + N_F(T(x)) \end{array} \right.$$
   est une norme rendant T continue.

V.12 Norme duale

[Corrigé]
Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien et N une norme sur E (qui n'est pas forcément la norme associée au produit scalaire). On note S la sphère unité pour la norme N i.e $S = \{x \in E,\ N(x) = 1\}$ et on pose pour tout $x \in E$,

$$N^*(x) = \sup_{y \in S} |\langle x, y \rangle|$$

1. Montrer que l'application est bien définie sur E.
2. Montrer que N^* est une norme sur E.
3. On suppose que $E = \mathbb{R}^n$.
   Déterminer N^* lorsque N est la norme $\|.\|_2$, $\|.\|_1$ ou $\|.\|_\infty$.

V.13 Norme à partir d'une famille libre

[Corrigé]
Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel muni d'une norme $\|.\|$. On se donne $(x_1, \dots x_n) \in E^n$.
Montrer que l'application $N : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ (\lambda_1, \dots, \lambda_n) & \longmapsto & \left\| \sum_{k=1}^{n} \lambda_k x_k \right\| \end{array} \right.$ est une norme sur $\mathbb{R}^n$ si et seulement si $(x_1, \dots, x_n)$ est une famille libre.

V.14 Quelques normes matricielles

[Corrigé]
Pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, on pose :

$$N_1(A) = \max_{1 \le i \le n} \sum_{j=1}^{n} |A_{i,j}| \qquad N_2(A) = \max_{1 \le j \le n} \sum_{i=1}^{n} |A_{i,j}|$$

$$N_3(A) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{p} A_{i,j}^2} \qquad N_4(A) = \sqrt{\max Sp(A^\top A)}$$

1. Montrer que N_1,N_2,N_3 et N_4 sont des normes sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.
2. Montrer que si $n = p$, ce sont des normes d'algèbre sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

V.15 Norme d'algèbre ★★

[Corrigé]
Soit $|| \cdot ||$ une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. Justifier l'existence d'une constante $k > 0$ telle que $\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ ||AB|| \le k||A|| \cdot ||B||$.
2. En déduire que $|| \cdot ||$ est proportionnelle à une norme d'algèbre.

V.16 Caractérisation des sous-espaces de dimension finie de $\mathcal{C}^0([0,1],\mathbb{R})$ ★★★

[Corrigé]

On note $E = \mathcal{C}^0([0,1],\mathbb{R})$. Pour $f \in E$ on pose $\|f\|_\infty = \sup_{[0,1]} |f|$ et $\|f\|_2 = \left(\int_0^1 f^2\right)^{1/2}$.

1. Montrer qu'il existe $b > 0$ tel que $\forall f \in E,\ \|f\|_2 \leq b\|f\|_\infty$.
2. Soit V un sous-espace vectoriel de E de dimension finie. Montrer qu'il existe $c > 0$ tel que $\forall f \in V,\ \|f\|_\infty \leq c\|f\|_2$.
3. Soit V un sous-espace vectoriel de E. On suppose qu'il existe un entier $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\forall f \in V,\ \|f\|_\infty \leq n\|f\|_2$. Montrer que V est de dimension finie et que $\dim V \leq n^2$.

V.17 Distance ★

[Corrigé]

Soit A un ensemble. On appelle distance sur A toute application $d : A^2 \to \mathbb{R}_+$ qui vérifie les axiomes :

— De symétrie : $\forall (x,y) \in A^2,\ d(x,y) = d(y,x)$;

— De séparation : $\forall (x,y) \in A^2,\ d(x,y) = 0 \iff x = y$;

— D'inégalité triangulaire : $\forall (x,y,z) \in A^3,\ d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y)$.

1. Soit $(E\,\|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. montrer que $d : \left\{ \begin{array}{ccc} E^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ (x,y) & \longmapsto & \|x-y\| \end{array} \right.$ est une distance sur E.
2. Pour $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ on pose $d(x,y) = \arctan|x-y|$. Montrer que d est une distance sur $\mathbb{R}$ et qu'elle ne peut pas s'exprimer comme la distance de la question précédente.

V.18 Distance à une partie

[Corrigé]

Soit A une partie non vide d'un espace vectoriel normé E. On pose pour tout $x,y \in E^2$, $d(x,y) = \|x-y\|$ et $d(x,A) = \inf_{a\in A} d(x,a)$. Montrer que

$$\forall (x,y) \in E^2,\ |d(x,A) - d(y,A)| \leq d(x,y)$$

V.19 Distance d'un élément à une partie (1)

[Corrigé]

On considère E l'espace des suites réelles bornées que l'on munit de la norme uniforme. Calculer la distance de $u = ((-1)^n)_{n\in\mathbb{N}}$ à l'ensemble des suites convergentes.

V.20 Distance d'un élément à une partie (2)

[Corrigé]

On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de son produit scalaire canonique.

1. Montrer que $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.
2. Montrer que $\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) = (\mathcal{A}_n(\mathbb{R}))^\perp$.
3. Soit $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$. Quelle est la distance de M à $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$?

V.21 Passage par les matrices orthogonales

[Corrigé]
Pour $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, on pose $N(X) = \max_{A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})} \|AX\|_\infty$.

1. Montrer que N est une norme sur $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.
2. Vérifier que : $\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), \forall A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}), \quad N(AX) = N(X)$.
3. Montrer que $N = \|.\|_2$ la norme euclidienne canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

V.22 Diamètre d'une partie bornée

[Corrigé]
Lorsque A est une partie bornée non vide d'un espace vectoriel normé (E, N), on définit le *diamètre* de A défini par :

$$\delta(A) = \sup_{(x,y) \in A^2} N(y - x).$$

1. Justifier l'existence du diamètre.

Soient A et B deux parties bornées et non vides de E.

2. Etablir que $A \subset B \Rightarrow \delta(A) \leq \delta(B)$.
3. On suppose de plus $A \cap B \neq \emptyset$. Montrer que $\delta(A \cup B) \leq \delta(A) + \delta(B)$
4. Montrer que dans le cas général, $\delta(A \cup B) \leq \delta(A) + \delta(B) + d(A, B)$ où $d(A, B) = \inf_{(a,b) \in A \times B} N(a - b)$.

V.23 Détermination d'une borne inférieure

[Corrigé]
On note $E = \left\{ f \in \mathcal{C}^1([0,1], \mathbb{K}),\ f(0) = 0 \text{ et } f(1) = 1 \right\}$.
Déterminer

$$\inf_{f \in E} \int_0^1 |f'(x) - f(x)| dx$$

V.24 Normes usuelles sur $\mathcal{C}^1([0,1], \mathbb{K})$

[Corrigé]
Soit $E = \mathcal{C}^1([0,1], \mathbb{K})$. On pose pour tout $f \in E$:

— $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx$;
— $N_1(f) = \|f\|_1 + \|f'\|_1$;
— $N_2(f) = |f(0)| + \|f'\|_1$.

1. Montrer que N_1 et N_2 sont des normes sur E.
2. N_1 et N_2 sont-elles équivalentes ?

V.25 Intersection des boules unités subordonnées d'un espace vectoriel normé de dimension finie

[Corrigé]
On note $\mathcal{N}$ l'ensemble des normes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ subordonnées à une norme de $\mathbb{C}^n$. Pour toute norme $N \in \mathcal{N}$ on note B_N la boule unité fermée de (E, N), $B_N = \{x \in E,\ N(x) \leq 1\}$.
Déterminer $B = \bigcap_{N \in \mathcal{N}} B_N$.

V.26 Modes de convergence

[Corrigé]
Soit E un espace préhilbertien réel muni de son produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$. On note $\|.\|$ la norme associée.
On dit qu'une suite $(x_n) \in E^{\mathbb{N}}$ *converge fortement* vers $x \in E$ si $\lim\limits_{n\to+\infty} \|x_n - x\| = 0$ et que (x_n) *converge faiblement* vers x si pour tout $y \in E$, $\lim\limits_{n\to+\infty} \langle x_n - x, y\rangle = 0$.

1. a. Montrer que si (x_n) converge faiblement, sa limite est unique.
   b. Montrer que la convergence forte implique la convergence faible.
2. Montrer que (x_n) converge fortement vers x si et seulement si (x_n) converge faiblement vers x et $\lim\limits_{n\to+\infty} \|x_n\| = \|x\|$
3. Montrer que, en dimension finie, ces deux modes de convergence sont équivalents.
4. Donner un contre-exemple en dimension infinie.

V.27 Moyenne des itérés et projection sur l'espace des invariants d'une application linéaire contractante

[Corrigé]
Soit E un espace vectoriel normé de dimension finie. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\forall x \in E,\ \|u(x)\| \leq \|x\|$.

1. Montrer que $E = \mathrm{Ker}(\mathrm{Id}_E - u) \oplus \mathrm{Im}(\mathrm{Id}_E - u)$.
2. Soit $x \in E$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $x_n = \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} u^k(x)$. Montrer que $(x_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge vers la projection de x sur $\mathrm{Ker}(\mathrm{Id}_E - u)$ parallèlement à $\mathrm{Im}(\mathrm{Id}_E - u)$.

V.28 Matrice de projecteur

[Corrigé]
Soit $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ telle que la suite $(A^n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers une matrice L. Montrer que L est une matrice de projecteur.

V.29 Matrice de rotation

[Corrigé]
Soit $a \in \mathbb{R}$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $A_n = \begin{pmatrix} 1 & -\dfrac{a}{n} \\ \dfrac{a}{n} & 1 \end{pmatrix}$.
Montrer que $\lim\limits_{n\to+\infty} A_n^n = \begin{pmatrix} \cos a & -\sin a \\ \sin a & \cos a \end{pmatrix}$.

V.30 Applications contractantes

[Corrigé]
Soient E un espace vectoriel normé de dimension finie, $k \in [0, 1[$ et $f : E \to E$ k-lipschitzienne. Soit $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ telle que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n)$.
Montrer que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge.
Indication : on pourra considérer la série $\displaystyle\sum_{n\in\mathbb{N}} u_{n+1} - u_n$.

V.31 Une série vectorielle

[Corrigé]

Soient E un espace vectoriel normé de dimension finie et $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ telle que $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$ converge absolument.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = \dfrac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n} 2^k u_k$.

Montrer que la série $\sum_{n\in\mathbb{N}} v_n$ converge absolument et calculer sa somme.

V.32 Polytopes réguliers d'un espace vectoriel euclidien

[Corrigé]

On note E un espace euclidien de dimension $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\langle\cdot,\cdot\rangle$ le produit scalaire et $\|.\|$ la norme associée.

1. Montrer que si H est un hyperplan de E, alors il existe a dans E tel que $H = (\mathrm{Vect}(a))^{\perp}$.
2. Dans cette question uniquement, on prend $E = \mathbb{R}^2$ et $\langle\cdot,\cdot\rangle$ désigne le produit scalaire canonique. On pose $e = (0,1)$.
   Trouver f, g dans E tels que $\|f\| = \|g\| = 1$ et le triangle (dont les sommets sont) e,f,g est équilatéral.
   Prouver (à permutation près) l'unicité de cette solution.
3. On revient à E euclidien de dimension n.
   a. On suppose que $x_1, \dots, x_{n+1}$ sont des vecteurs unitaires de E tels que :
   $$\exists \alpha \in \mathbb{R}_-^*, \quad \forall (i,j) \in [\![1; n+1]\!]^2, (i \neq j \implies \langle x_i, x_j\rangle = \alpha)$$
   b. Expliquer comment trouver dans E une famille de $n+1$ vecteurs vérifiant les conditions précédentes.

VI

Suite et série de fonctions

VI.1 Etude d'une suite de fonctions (1)

[Corrigé]

Soit (P_n) la suite de fonctions définie sur $[0,1]$ par :

— $P_0(x) = 0$

— $\forall n \in \mathbb{N},\ P_{n+1} = P_n(x) + \frac{1}{2}(x - P_n(x)^2)$

1. Montrer que pour tout $x \in [0,1], 0 \leq P_n(x) \leq \sqrt{x}$.
2. Montrer que pour tout $x \in [0,1], 0 \leq \sqrt{x} - P_n(x) \leq \sqrt{x}\left(1 - \frac{\sqrt{x}}{2}\right)^n$
3. En déduire que la suite (P_n) converge uniformément sur $[0,1]$ vers la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$.

VI.2 Etude d'une suite de fonctions (2)

[Corrigé]

On définit la suite de fonctions (g_n) de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$ par $g_0 = 1$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in [0,1], g_{n+1}(x) = \int_0^x g_n(1-t)dt$$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N},\ g_n$ est bornée et que, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\|g_{n+1}\|_\infty \leq \frac{1}{2}\|g_{n-1}\|_\infty$
2. On pose $G : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} g_n(x)$
   Montrer que G est bien définie sur $[0,1]$ et déterminer une équation différentielle vérifiée par G.
3. En déduire l'expression de G.

VI.3 Etude d'une suite de fonctions (3)

[Corrigé]

Soit $f_n : x \mapsto n\cos(x)^n \sin(x)$. Etudier la convergence simple et uniforme de la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sur $\mathbb{R}$.

VI.4 Etude d'une suite de fonctions (4)

[Corrigé]

Soit $f_n : x \mapsto \sin(x)^n \cos x$. Etudier la convergence simple et uniforme de la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sur $\mathbb{R}$.

VI.5 Etude d'une suite de fonctions (5)

[Corrigé]

Soit $f_n : x \mapsto \dfrac{\sin(nx)}{n\sqrt{x}}$. Etudier la convergence simple et uniforme de la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

VI.6 Etude d'une suite de fonctions (6)

[Corrigé]

Soit $f_n : x \mapsto e^{\frac{n-1}{n}x}$. Etudier la convergence simple et uniforme de la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sur $\mathbb{R}$, puis sur $]-\infty, a]$ pour $a \in \mathbb{R}$.

VI.7 Etude d'une suite de fonctions (7)

[Corrigé]

Pour tout réel x et tout entier naturel n non nul, on pose $P_n(x) = \displaystyle\prod_{k=1}^{n} \operatorname{ch}\left(\frac{x}{k}\right)$

1. Déterminer l'ensemble I des réels x pour lesquels la suite $(P_n(x))_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge.
   On pourra utiliser la suite $(\ln(P_n(x)))_{n\in\mathbb{N}^*}$.
   Pour $x \in I$ on note $\varphi(x)$ la limite de la suite $(P_n(x))$.
2. Etudier la parité et la monotonie de la fonction φ.
3. Démontrer que la fonction φ est continue sur I.
4. En étudiant $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\operatorname{ch}}$, montrer que $\dfrac{1}{\varphi}$ est intégrable sur $\mathbb{R}$.

VI.8 Développement de la cotangente (1)

[Corrigé]

On pose pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}$, $f_n(x) = \displaystyle\sum_{k=-n}^{n} \frac{1}{x-k}$.

1. Montrer que la suite de fonction $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers une fonction f.
2. Montrer que la fonction g définie par $\forall x \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Z},\ g(x) = \pi\operatorname{cotan}(\pi x) - f(x)$ se prolonge en une fonction continue sur $\mathbb{R}$ et 1-périodique, qu'on continuera d'appeler g.
3. Donner une expression pour tout $x \in \mathbb{R}$ de $g(x)$ en fonction de $g\left(\dfrac{x}{2}\right)$ et $g\left(\dfrac{x+1}{2}\right)$.
4. En déduire en utilisant la 1-périodicité de g qu'elle est nulle sur $\mathbb{R}$.

VI.9 Etude d'une fonction définie par une série alternée (1)

[Corrigé]

Pour $t > 0$, on pose :

$$S(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{1+nt}$$

1. Justifier que S est définie et continue sur $]0, +\infty[$.
2. Etablir la limite de S en $+\infty$.
3. Etablir que S est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$

VI.10 Etude d'une fonction définie par une série alternée (2)

[Corrigé]
Pour $x > 0$, on pose

$$S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+x}$$

1. Justifier que S est définie et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$.
2. Préciser le sens de variation de S.
3. Etablir : $\forall x > 0,\ S(x+1) + S(x) = \dfrac{1}{x}$.
4. Donner un équivalent de S en 0.
5. Donner un équivalent de S en $+\infty$.
6. Montrer que pour $x > 0$,

$$F(x) = \int_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t} dt$$

VI.11 Convergence vers une dérivée

[Corrigé]
Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivable de dérivée seconde bornée.
Montrer que la suite des fonctions

$$g_n : x \mapsto n\left(f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x)\right)$$

converge uniformément vers f' sur $\mathbb{R}$.

VI.12 Limite ponctuelle et uniforme d'une suite de fonctions

[Corrigé]
On suppose qu'une suite de fonctions (f_n) de $[a,b]$ vers $\mathbb{R}$ converge uniformément vers $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ continue et on considère une suite (x_n) d'éléments de $[a,b]$ convergeant vers x.
Montrer que

$$f_n(x_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} f(x)$$

VI.13 Limite d'une suite implicite ★★

[Corrigé]
On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P_n : x \in \mathbb{R} \mapsto \sum_{k=0}^{n} \dfrac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$. On fixe $\alpha \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N},\ \exists!\, x_n \in \mathbb{R},\ P_n(x_n) = \alpha$.
2. Montrer que $x_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ln\left(\alpha + \sqrt{\alpha^2+1}\right)$.

VI.14 Convergence des suites de polynômes ★★★

[Corrigé]
Soient $d \in \mathbb{N}$ et $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de polynômes de $\mathbb{R}_d[X]$. Montrer que les propositions suivantes sont équivalentes :

(i) $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge dans $\mathbb{R}_d[X]$.

(ii) $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement sur $[0,1]$.

(iii) $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément sur $[0,1]$.

VI.15 Un théorème de Weierstrass sur $\mathbb{R}$? ★★★

[Corrigé]

Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ limite uniforme sur $\mathbb{R}$ d'une suite de fonctions polynomiales. Démontrer que f est une fonction polynomiale.

VI.16 Approximation paire

[Corrigé]

Soit S un segment de $\mathbb{R}_+$. Montrer que toute fonction $f : S \to \mathbb{R}$ continue est limite uniforme d'une suite de polynômes pairs.

VI.17 Approximation croissante

[Corrigé]

Montrer que toute fonction réelle croissante sur un segment s'approche uniformément sur ce segment par des polynômes croissants sur ce même segment.

VI.18 Interversion Série-Intégrale

[Corrigé]

Pour $x \in]-1,1[$, on pose $F(x) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{1 - x\cos(t)} dt$.

1. Etablir que pour tout $x \in]-1,1[$, $F(x) = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{4^n}\binom{2n}{n} x^{2n}$.
2. Montrer que $\forall x \in]-1,1[$, $\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{4^n}\binom{2n}{n} x^{2n}$.
3. $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3}{(2n+1)4^{2n}}\binom{2n}{n} = \pi$.

VI.19 Série de fonction matricielle

[Corrigé]

On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ d'une norme d'algèbre $\|\cdot\|$.

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ non nulle et $I =]-\alpha, \alpha[$ avec $\alpha = \dfrac{1}{\|A\|}$. Pour tout $t \in I$, on pose $f(t) = \displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} (tA)^k$

1. Montrer que f est bien définie sur I et que $\forall t \in I,\ f(t) = (I_n - tA)^{-1}$.
2. Justifier que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et que $\forall t \in I,\ f'(t) = Af(t)^2$.

VI.20 Fonction ζ de Riemann

[Corrigé]

On pose $\zeta(x) = \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^* f_n : x \mapsto \dfrac{1}{n^x}$

On pose également $\eta(x) = \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x}$

1. Donner le domaine de définition D_ζ de ζ.

2. Démontrer que $\sum f_n$ ne converge pas normalement sur D_ζ mais qu'elle converge normalement sur $[a, +\infty[$ pour tout $a > 1$.
3. Montrer que ζ est continue sur D_ζ.
4. Trouver un équivalent simple de ζ en 1^+ et donner la limite de ζ en $+\infty$.
5. Montrer que la série $\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}f_n$ converge uniformément sur $[a, +\infty[$. pour tout $a > 0$.
6. Montrer que η est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.
7. Montrer que $\eta(x) = 1 - \dfrac{1}{2^x} + \underset{x\to+\infty}{o}\left(\dfrac{1}{2^x}\right)$
8. Montrer que : $\forall x \in]1, +\infty[, \zeta(x) - \eta(x) = 2^{1-x}\zeta(x)$. En déduire un développement asymptotique de ζ à l'ordre 2 en $+\infty$.
9. Montrer que ζ est C^∞ sur D_ζ. En déduire le sens de variation et la convexité de ζ sur D_ζ.

VI.21 Expression de suites sous forme de séries

[Corrigé]

1. Soit $\sum a_n$ une série complexe absolument convergence. On suppose que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} a_n^k = 0$.
   Montrer que la suite (a_n) est nulle.
2. Existe-t-il une suite (a_n) telle que $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} a_n^k = k$?
3. Existe-t-il une suite (a_n) telle que $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} a_n^k = \frac{1}{k^2}$?

VI.22 Etude d'une série de fonctions

[Corrigé]
Soit $(a_n)_{n\geq 1}$ une suite décroissante de limite nulle. On pose $f_n : x \mapsto \sin(nx)$

1. Montrer que la série $\displaystyle\sum_{n\geq 1} a_n f_n$ converge simplement.
2. Montrer que la série $\displaystyle\sum_{n\geq 1} a_n f_n$ converge uniformément sur $\mathbb{R}$ si et seulement si la suite (na_n) converge vers 0.

VI.23 Théorème de Dini ★★★★

[Corrigé]

1. Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite croissante de fonctions réelles continues sur un segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}$. Montrer que si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers une fonction f continue sur $[a, b]$, alors la convergence est uniforme.
2. Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions réelles croissantes et continues sur un segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}$. Montrer que si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers une fonction f continue sur $[a, b]$, alors la converge est uniforme.

VI.24 Suite de fonctions lipschitziennes ★★★

[Corrigé]
Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions réelles L-lipschitziennes convergeant simplement vers une fonction f sur un segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}$.

1. Montrer que f est L-lipschitzienne.
2. Montrer que la convergence est uniforme.

VI.25 Phénomène de Runge

[Corrigé]

Soit $\alpha > 0$ et f_α la fonction $f_\alpha : x \in [-1,1] \mapsto \dfrac{1}{x^2+\alpha^2}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère les $2n$ points équirépartis dans $[-1,1]$ définis par $a_k = \dfrac{2k+1}{2n}$ pour $-n \leq k \leq n-1$. On note P_n le polynôme d'interpolation de Lagrange de degré $< 2n$ déterminé par les conditions $P_n(a_k) = f_\alpha(a_k)$ pour $-n \leq k \leq n-1$.

1. Montrer $f_\alpha(x) - P_n(x) = \dfrac{1}{x^2+\alpha^2}\dfrac{\omega_n(x)}{\omega(\alpha i)}$ avec $\omega_n(x) = \displaystyle\prod_{k=-n}^{n}(x-a_k)$
2. En déduire le premier terme du développement asymptotique de $\log(|f_\alpha(1) - P_n(1)|)$ quand n tend vers l'infini.
3. Montrer que si $\alpha > 0$ est suffisamment petit, la suite de fonctions (P_n) ne converge pas uniformément vers f_α.

Remarque : On vient de démontrer que l'augmentation du nombre de points d'interpolation n'est pas nécessairement une bonne stratégie d'approximation. Pour approcher une fonction avec des polynômes, on peut préférer utiliser des splines par exemple (polynômes par morceaux). Dans ce cas, pour améliorer l'approximation, on augmente le nombre de morceaux et non le degré des polynômes.

VI.26 Théorème de Weierstrass

[Corrigé]

On note E l'espace vectoriel des fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ et nulles en dehors d'un compact. On muni E de la loi de convolution $*$ en définissant, pour tout $(f,g) \in E^2$ la convolée :

$$f * g : x \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t)g(t)dt$$

1. (a) Montrer que la loi * est commutative et distributive sur l'addition.
   (b) *Séquence de Dirac* On appelle séquence de Dirac toute suite (χ_n) de fonctions positives de E vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \int_{-\infty}^{+\infty} \chi_n(t)dt = 1 \text{ et } \forall \alpha > 0, \lim_{n\to+\infty} \int_{|t|\geq\alpha} \chi_n(t)dt = 0$$

Soit (χ_n) une telle suite et soit $f \in E$. Montrer que la suite de fonctions $(f * \chi_n)$ converge uniformément vers f sur $\mathbb{R}$.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose :

$$a_n = \int_{-1}^{1}(1-t^2)^n dt \text{ et } p_n : t \in \mathbb{R} \mapsto \begin{cases} \frac{(1-t^2)^n}{a_n} & \text{si } |t| \leq 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

   (a) Montrer que (p_n) est une séquence de Dirac.
   (b) Soit $f \in E$, nulle en dehors de $I = \left[-\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2}\right]$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, montrer que $f * p_n$ est une fonction polynomiale. Conclure.
   (c) En déduire le théorème de Weierstrass : si I est un segment de $\mathbb{R}$ et si $f : I \mapsto \mathbb{C}$ est continue, alors f est limite uniforme sur I d'une suite de fonctions polynomiales.

3. Application :
   (a) Soit $f : [0,1] \mapsto \mathbb{C}$ une fonction continue, telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\displaystyle\int_0^1 f(t)t^n dt = 0$.
   Montrer que f est la fonction nulle.
   (b) Soit $f : \mathbb{R}^+ \mapsto \mathbb{C}$ une fonction continue telle que l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} f(t)dt$ existe.
   Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'intégrale $I_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} f(t)e^{-nt}dt$ existe.
   Si $\forall n \in \mathbb{N},\ I_n = 0$, montrer que f est la fonction nulle.

VI.27 Théorème de Chudnovsky ★★★★

[Corrigé]

On se donne deux réels a, b tels que $0 < a \leq b < 1$. Le but de cet exercice est de démontrer que toute fonction continue sur $[a, b]$ est limite uniforme sur $[a, b]$ d'une suite de fonctions polynomiales à coefficients entiers. On munit $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ de la norme uniforme.

1. Montrer que l'ensemble des nombres dyadiques $\mathcal{D} = \left\{ \frac{p}{2^q},\ (p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \right\}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
2. On pose $\varphi : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & 2x(1-x) \end{array} \right.$ et pour $n \in \mathbb{N}$ on définit $\varphi_n = \varphi \overbrace{\circ \cdots \circ}^{n} \varphi$. Par convention $\varphi_0 = \varphi$.
   a. Montrer que $(\varphi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers la fonction constante égale à $\frac{1}{2}$ sur $[a, b]$.
   b. Montrer que $(\varphi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers la fonction constante égale à $\frac{1}{2}$ sur $[a, b]$.
3. Montrer que $\mathcal{Z}$, l'adhérence de l'ensemble des fonctions polynomiales à coefficients entiers, est un sous-anneau de $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$.
4. Conclure.
5. Le résultat est-il encore vrai pour $a \leq b$ des réels quelconques ? Que peut-on dire pour des fonctions à valeurs dans $\mathbb{C}$?

VI.28 Théorème de Korovkin ★★★★

[Corrigé]

Soit $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ muni de la norme uniforme.
Pour $u \in \mathcal{L}(E)$ on dit que u est un *opérateur positif* (ce que l'on note $u \geq 0$) si :

$$\forall f \in E,\ f \geq 0 \implies u(f) \geq 0$$

1. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un opérateur positif. Montrer que u est continu.
   Indication : on pourra commencer par montrer que $|u(f)| \leq u(|f|)$.
2. Soit $f \in E$. On fixe $\varepsilon > 0$.
   Montrer que $\exists c > 0,\ \forall (x, y) \in [0, 1]^2,\ |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon + c(x - y)^2$.
3. Pour $k \in \mathbb{N}$, on note $e_k : x \in [0, 1] \mapsto x^k$.
   Soit $(u_n) \in \mathcal{L}(E)^{\mathbb{N}}$ une suite d'opérateurs positifs. On suppose que pour $k \in \{0, 1, 2\}$, la suite $(u_n(e_k))$ converge uniformément vers e_k.
   Prouver que pour toute fonction $f \in E$, la suite $(u_n(f))$ converge uniformément vers f.
4. Bonus : en déduire le théorème d'approximation de Weierstrass.

VI.29 Théorème de Fejér ★★★★★

[Corrigé]

On note $E = \mathcal{C}_{2\pi}(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions réelle continue sur $\mathbb{R}$ et 2π-périodique, muni de la norme uniforme.
Pour $u \in \mathcal{L}(E)$ on dit que u est un *opérateur positif* (ce que l'on note $u \geq 0$) si :

$$\forall f \in E,\ f \geq 0 \implies u(f) \geq 0$$

1. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un opérateur positif. Montrer que u est continu.
   Indication : on pourra commencer par montrer que $|u(f)| \leq u(|f|)$.
2. Soit $f \in E$. On fixe $\varepsilon > 0$.
   Montrer que $\exists c > 0,\ \forall x, y \in \mathbb{R},\ |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon + c(1 - \cos(x - y))$.
3. On note $f_0 \in E$ la fonction constante égale à 1.
   Soit $(u_n) \in \mathcal{L}(E)^{\mathbb{N}}$ une suite d'opérateurs positifs. On suppose que les suites $(u_n(f_0))$, $(u_n(\cos))$ et $(u_n(\sin))$ convergent uniformément vers $f_0, \cos$ et $\sin$ respectivement.
   Prouver que pour toute fonction $f \in E$, la suite $(u_n(f))$ converge uniformément vers f.

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ une fonction continue et 2π-périodique. On note pour $k \in \mathbb{Z}$, $c_k(f) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-ikt}dt$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$S_n : x \mapsto \sum_{k=-n}^{n} c_k(f)e^{ikx} \quad \text{et} \quad \sigma_n(f) = \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} S_k(f)$$

On appelle polynôme trigonométrique complexes (resp. réels) toute fonction P à valeurs complexes (resp. réelles) définie par une somme finie d'exponentielles :

$\forall x \in \mathbb{R},\ P(x) = \displaystyle\sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k e^{ikx}$, avec c_k des complexes nuls pour $|k|$ assez grand.

4. Montrer que si $P : x \mapsto \displaystyle\sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k e^{ikx}$ est un polynôme trigonométrique alors $\forall k \in \mathbb{Z},\ c_k(P) = c_k$.
5. En déduire qu'un polynôme trigonométrique P est à valeurs réelles si et seulement si $\forall k \in \mathbb{N},\ c_{-k}(P) = \overline{c_k(P)}$, si et seulement si P est une combinaisons linéaires à coefficients réels des fonctions $x \mapsto \cos(kx),\ x \mapsto \sin(kx)$ pour $k \in \mathbb{N}$.
6. En appliquant la question 3 à (σ_n), démontrer que les polynômes trigonométriques réels sont denses dans $\mathcal{C}_{2\pi}(\mathbb{R})$ muni de la norme uniforme.
7. Démontrer que les polynômes trigonométrique complexes sont denses dans l'espace $\mathcal{C}_{2\pi}(\mathbb{C})$ des fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ continue 2π-périodique muni de la norme uniforme.

VI.30 Théorème de sélection de Helly ★★★★

[Corrigé]

Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle ouvert.

Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions croissantes de I dans $\mathbb{R}$ telle que, pour tout $x \in I$, la suite $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée.

1. Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction croissante.
   Montrer que l'ensemble des points de discontinuité de f est au plus dénombrable.
2. Démontrer qu'il existe une sous-suite $(f_{\varphi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ et une fonction croissante $f : I\cap\mathbb{Q} \to \mathbb{R}$ telle que cette sous-suite converge simplement vers f sur $I \cap \mathbb{Q}$.
3. Démontrer qu'il existe une sous-suite $(f_{\varphi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ et une fonction croissante $f : I \to \mathbb{R}$ telle que cette sous-suite converge simplement vers f sur I.

VII

Série entière

VII.1 Lemme d'Abel

[Corrigé]
Enoncer et démontrer le lemme d'Abel

VII.2 Fonction non développable en série entière

[Corrigé]
On pose pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $f(x) = \exp\left(-\frac{1}{x^2}\right)$ et $f(0) = 0$.

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et calculer pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}(0)$.
3. En déduire que f n'est pas développable en série entière.

VII.3 CCINP MP 2019

[Corrigé]
On pose $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{2n}{n} x^n$

1. Déterminer le rayon de convergence de la série $\sum \binom{2n}{n} x^n$. On note R le rayon de convergence de cette série.
2. Pour tout $x \in]-R, R[$, prouver la relation $(1-4x)S'(x) - 2S(x) = 0$.
3. En déduire une expression de $S'(x)$.

VII.4 Série entière de terme général binomial

[Corrigé]
Soient $p \in \mathbb{N}$ et $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{n+p}{p} x^n$

1. Déterminer le rayon de convergence de la série entière définissant cette fonction.
2. Calculer $f(x)$ en étudiant $(1-x)f'(x)$.

VII.5 Formule de Cauchy

[Corrigé]

Soit $\sum_{n\in\mathbb{N}} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R>0$. On pose $f(z)=\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$

Soit $r\in[0,R[$ Montrer que $a_n r^n = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(re^{i\theta})e^{-in\theta}d\theta$

VII.6 Principe des zéros isolés

[Corrigé]

Soit f la somme de la série entière $\sum_{n\in\mathbb{N}} a_n z^n$ sur son disque de convergence. Montrer que s'il existe une suite $(z_p)_{p\in\mathbb{N}}$ de nombres complexes non nuls tendant vers 0 telle que pour tout $p\in\mathbb{N}, f(z_p)=0$, alors pour tout $n\in\mathbb{N}, a_n=0$.

VII.7 Produit de Hadamard

[Corrigé]

1. Soit $\sum_{n\in\mathbb{N}} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R>0$ telle que $a_n>0$ pour tout $n\in\mathbb{N}$. Discuter en fonction du paramètres $\alpha\in\mathbb{R}$ le rayon de convergence R' de la série entière $\sum_{n\in\mathbb{N}} a_n^\alpha z^n$
2. Soient $\sum_{n\in\mathbb{N}} a_n z^n$ et $\sum_{n\in\mathbb{N}} b_n z^n$ deux séries entières de rayon respectifs R et R'. Que dire du rayon de convergence R'' de la série entière $\sum_{n\in\mathbb{N}} a_n b_n z^n$.

VII.8 Théorème de Liouville

[Corrigé]

Soit $\sum_{n\in\mathbb{N}} a_n z^n$ une série entière dont le rayon de convergence est infini. Soit $f:\mathbb{C}\mapsto\mathbb{C}$ la somme de cette série entière.

1. Si la fonction entière f est bornée sur $\mathbb{C}$, montrer que f est constante.
2. Plus généralement, s'il existe un polynôme P à coefficients positifs tel que $\forall z\in\mathbb{C}, |f(z)|\leq P(|z|)$, montrer que f est un polynôme.

VII.9 Inverse d'une série entière

[Corrigé]

Soit $1+\sum_{n\geq 1} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence non nul, et S la somme de cette série sur son disque de convergence. Montrer que $\frac{1}{S}$ est développable en série entière autour de l'origine.

VII.10 Equivalent de séries entières

[Corrigé]

Soient $(a_n)\in\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $(b_n)\in(\mathbb{R}_+)^{\mathbb{N}}$ telles que le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n\in\mathbb{N}} b_n x^n$ vaut 1, $\sum_{n\in\mathbb{N}} b_n$ diverge, la suite $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ est définie à partir d'un certain rang et converge vers un réel ℓ.

1. Montrer que
$$\sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n \underset{x\to 1^-}{\longrightarrow} +\infty$$
2. Montrer que
$$\frac{\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n}{\sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n} \underset{x\to 1^-}{\longrightarrow} \ell$$

VII.11 Théorème de d'Alembert-Gauss

[Corrigé]
A l'aide du théorème de Liouville VII.8 et de VII.9, démontrer le théorème de d'Alembert-Gauss.

VII.12 Développement de fraction rationnelle autour de 0

[Corrigé]

1. Soient P et Q deux polynômes à coefficients dans $\mathbb{C}$ tels que $Q(0) \neq 0$. On pose, pour z non racine de Q, $f(z) = \dfrac{P(z)}{Q(z)}$. Montrer que f est développable en série entière au voisinage de 0 et que les coefficients de son développement vérifient une relation de récurrence linéaire à coefficients constants. En outre, préciser le rayon de convergence.
2. Réciproquement, on se donne une suite $(u_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ vérifiant une relation de récurrence linéaire à coefficients constants. Montrer que la série entière $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n z^n$ a un rayon de convergence R non nul et qu'il existe deux polynômes $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ avec $Q(0) \neq 0$ tels que pour tout $z \in \mathbb{C}$, si $|z| > R$ alors $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n z^n = \dfrac{P(z)}{Q(z)}$.

VII.13 Fonction quasi-polynomiale

[Corrigé]
Une fonction $P : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ est dite quasi-polynomiale s'il existe $k \in \mathbb{N}$ et $k+1$ fonctions périodiques $c_0, \dots, c_k \in \mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$ telles que $\forall n \in \mathbb{Z},\ P(n) = \sum_{i=0}^{k} c_i(n) n^i$. Si la fonction c_k n'est pas nulle, on dira que le degré de la fonction P est k et que c_k est son coefficient dominant.

1. Montrer que l'ensemble des fonctions quasi-polynomiales forme une $\mathbb{C}$-algèbre.
2. Montrer que si $P, Q \in \mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$ sont deux fonctions quasi-polynomiales qui coïncident sur $\mathbb{N}$ alors elles sont égales.

Dans la suite, on dira que $P : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$ est quasi-polynomiale si c'est la restriction à $\mathbb{N}$ d'une fonction quasi-polynomiale (qui est bien définie uniquement d'après la question précédente).

3. Montrer que $P : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ est quasi-polynomiale si et seulement s'il existe un entier $m \in \mathbb{N}^*$ et m polynômes $P_0, \dots, P_m \in \mathbb{C}[X]$ tels que pour tout $j \in [\![0; m-1]\!]$ on ait : $\forall n \in \mathbb{Z},\ n \equiv j[m] \implies P(n) = P_j(n)$.

VII.13.1 Série génératrice d'une fonction quasi-polynomiale

Soit P une fonction quasi-polynomiale. Montrer que le rayon de convergence de la série $\sum_{n\in\mathbb{N}} P(n)x^n$ est supérieur ou égal à 1.

VII.13.2 Partitions d'un entier

Soient $k \geq 2$ un entier et $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{N}^*$ que l'on suppose premier entre eux dans leur ensemble. On définit une fonction $P : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$ en posant pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$P(n) = \text{Card}\left(\left\{(n_1, \dots, n_k) \in \mathbb{N}^k,\ \sum_{i=1}^{k} a_i x_i = n\right\}\right)$$

On définit ensuite la série entière $F(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(n)x^n$.

1. Montrer que le rayon de convergence de F est supérieur ou égal à 1.
2. Prouver l'égalité $F(x) = \prod_{i=1}^{k} \frac{1}{1-x^{a_i}}$ pour $x \in]-1, 1[$.
3. Soient ω une racine de l'unité et $p \in \mathbb{N}^*$. On note $f : x \mapsto \frac{1}{(1-\omega x)^p}$ et $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} R(n)x^n$ son développement en série entière. Montrer que R est une fonction quasi-polynomiale, puis déterminer son degré et son coefficient dominant.
4. En déduire que P est quasi-polynomiale et déterminer son coefficient dominant.

VII.14 Série de Lambert

[Corrigé]
Soient $\alpha \in \mathbb{N}^*$ et $x \in [0, 1[$.

1. Montrer que la série $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{n^\alpha x^n}{1-x^n}$ converge.
2. Donner un équivalent, lorsque $x \to 1^-$, de sa somme $\varphi(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^\alpha x^n}{1-x^n}$ sous la forme de la somme d'une série double.
   Indication : On pourra considérer le développement en série entière de $\frac{\varphi(x)}{1-x}$.

VII.15 Somme de Goldbach

[Corrigé]
Soit $R = \{m^n,\ (m, n) \in [\![2; +\infty[\![^2\}$. Calculer la somme :

$$\sum_{r \in R} \frac{1}{r-1}$$

VII.16 Une somme avec l'indicatrice d'Euler

[Corrigé]
On note φ l'indicatrice d'Euler et on fixe $a > 1$. Calculer la somme :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\varphi(n)}{a^n - 1}$$

VII.17 Coefficients définies par des intégrales

[Corrigé]
On note $a_n = \int_0^1 \frac{dt}{(2+t^2)^{n+1}}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

1. Donner le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n\in\mathbb{N}} a_n x^n$.
2. Calculer la somme de cette série entière sur son domaine de convergence.

VII.18 Détermination des coefficients d'un développement en série entière

[Corrigé]

Soit $f : x \in]-1,1[\mapsto \dfrac{\arcsin(x)}{\sqrt{1-x^2}}$

1. Justifier que f est développable en série entière.
2. Montrer que f vérifie une équation différentielle d'ordre un.
3. En déduire le développement en série entière.

   En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{2k+1}\binom{2k}{k}\binom{2n-2k}{n-k} = \frac{2^n (n!)^2}{(2n+1)!}$

VII.19 Série génératrice du nombre de points à coordonnées entières dans un quart de disque

[Corrigé]

On note $p_n = \text{Card}\{(a,b) \in \mathbb{N}^2 \mid a^2+b^2 \leq n\}$

1. Déterminer le rayon de convergence R de la série entière $\sum_{n\in\mathbb{N}} p_n x^n$.
2. Démontrer que $\forall x \in]-R,R[$, $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} p_n x^n = \frac{1}{1-x}\left(\sum_{n=0}^{+\infty} x^{n^2}\right)^2$.

VII.19.1 Nombres de points à coordonnées entières dans un disque

On munit $\mathbb{R}^2$ de sa norme euclidienne canonique $\|\cdot\|$. Pour $x \in \mathbb{R}_+$ on définit les ensembles $C(x) = \{u \in \mathbb{Z}^2,\ \|u\| \leq x\}$ et $C_+(x) = C(x) \cap \mathbb{N}^2$.

1. Ecrire un programme python qui calcule $N_+(x)$.
2. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}_+,\ 4N_+(x) - N(x) - 4\lfloor x \rfloor = 3$.
3. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N},\ N_+(n) = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \left\lfloor \sqrt{n^2-k^2} \right\rfloor + 1$.
4. Déterminer un équivalent de $N(x)$ lorsque $x \to +\infty$.

VII.19.2 Prolongement du problème

1. Déduire de VII.19 et VII.19.1 un équivalent en 1^- de $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} x^{n^2}$.
2. Montrer à l'aide d'une comparaison série intégrale que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} x^{n^2} \underset{x\to 1^-}{\sim} \frac{1}{\sqrt{1-x}} \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$$

3. En déduire la valeur de l'intégrale $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt$.

VII.20 Nombre d'involution

[Corrigé]
On rappelle qu'une involution d'un ensemble E est une application $f : E \mapsto E$ telle que $f \circ f = \mathrm{Id}_E$. On note I_n le nombre d'involution de $[\![1; n]\!]$. On convient que $I_0 = 1$.

1. Montrer que pour tout entier $n \geq 2$, $I_n = I_{n-1} + (n-1)I_{n-2}$
2. Montrer que le rayon de convergence de la série entière $\sum \frac{I_n}{n!}x^n$ est supérieur ou égal à 1. On note $S(x)$ sa somme.
3. Montrer que : $\forall x \in]-1, 1[, S'(x) = (1+x)S(x)$
4. En déduire une expression de $S(x)$ puis de I_n.

VII.21 Théorème d'André

[Corrigé]
Soit $\sigma \in \mathcal{S}_n$. On dit que σ est une permutation *alternée* si les $n-1$ différences $\sigma(2)-\sigma(1), \sigma(3)-\sigma(2), \cdots, \sigma(n)-\sigma(n-1)$ alternent de signes. On dit plus précisément que σ est *ascendante* si $\sigma(1) < \sigma(2)$ et on dit qu'elle est *descendante* sinon.
On note A_n le nombre de permutation alternée ascendante de $\mathcal{S}_n$. Par convention $A_0 = A_1 = 1$.

1. Montrer qu'il y a autant de permutations alternées ascendantes que descendantes.
2. Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N},\ 2A_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} A_k A_{n-k}$.
3. Montrer que la série entière $\sum_{n\in\mathbb{N}} \frac{A_n}{n!}x^n$ a un rayon de convergence R non nul. On note A sa somme.
4. Démontrer que $\forall x \in]-R, R[,\ 2A'(x) = A(x)^2 + 1$.
5. En déduire que $\forall x \in]-R, R[,\ A(x) = \frac{1}{\cos x} + \tan x$ et la valeur de R.

VII.22 Théorème d'Abel

[Corrigé]
Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R \geq 1$ et de somme f. On note pour $\theta_0 \in [0, \frac{\pi}{2}[$,

$$\Delta_{\theta_0} = \{z \in \mathbb{C}; |z| < 1 \text{ et } \exists \rho > 0, \exists \theta \in [-\theta_0, \theta_0],\ z = 1 - \rho e^{i\theta}\}$$

1. Démontrer (Abel) pour $R > 1$.

A partir de maintenant, on suppose que $R = 1$ et que $\sum a_n$ converge, et on se donne un $\theta_0 \in [0, \frac{\pi}{2}[$

2. Démontrer que pour tous $N \in \mathbb{N}^*$ et $z \in \mathbb{C}, |z| < 1$, on a :

$$\sum_{n=0}^{N} a_n z^n - S_N = (z-1)\sum_{n=0}^{N-1} R_n z^n - R_N(z^N - 1)$$

3. En déduire que pour tout $z \in \mathbb{C}, |z| < 1$, on a :

$$f(z) - S = (z-1)\sum_{n=0}^{+\infty} R_n z^n$$

4. Soit $\varepsilon > 0$. Démontrer qu'il existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $z \in \mathbb{C}, |z| < 1$:

$$|f(z) - S| \leq |z-1|\sum_{n=0}^{N_0} |R_N| + \varepsilon\frac{|z-1|}{1-|z|}$$

5. Démontrer qu'il existe $\rho(\theta) > 0$ tel que pour tout $z \in \Delta_{\theta_0}$ de la forme $z = 1 - \rho e^{i\theta}$ avec $0 < \rho \leq \rho(\theta_0)$, on a :
$$\frac{|z-1|}{1-|z|} \leq \frac{2}{\cos(\theta_0)}$$
6. En déduire le théorème d'Abel.

Application : Démontrer que $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1} = \frac{\pi}{4}$ et $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln(2)$

VII.23 Théorèmes taubériens d'Abel

[Corrigé]

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$.
Si la série est convergente, on note S sa somme définie par : $S = \lim_{n\to+\infty} S_n$
et (R_n) la suite des restes définie par : $\forall n \in \mathbb{N}$, $R_n = S - S_n$
On s'intéresse aux réciproques partielles du théorème d'Abel.

Exhiber une série entière $\sum_{n\in\mathbb{N}} a_n z^n$ de rayon de convergence 1 et de somme f telle que $f(z)$ converge quand $z \underset{|z|<1}{\longrightarrow} 1$ et telle que la série $\sum_{n\in\mathbb{N}} a_n$ ne converge pas.

VII.23.1 Cas des séries à coefficients positifs

Démontrer que :
$$\left(\lim_{\substack{x\to1^-\\x\in\mathbb{R}}} f(x) = S \text{ et } \forall n \in \mathbb{N},\ a_n \geq 0\right) \Longrightarrow \left(\sum_{n\in\mathbb{N}} a_n \text{ converge et } \sum_{n=0}^{+\infty} a_n = S\right)$$

VII.23.2 Théorème taubérien faible

Soit $\sum_{n\in\mathbb{N}} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence 1 et de somme f. Soit $S \in \mathbb{C}$.
Le but de cette question est de démontrer que :
$$\left(\lim_{\substack{x\to1^-\\x\in\mathbb{R}}} f(x) = S \text{ et } a_n \underset{n\to+\infty}{=} o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \Longrightarrow \left(\sum_{n\in\mathbb{N}} a_n \text{ converge et } \sum_{n=0}^{+\infty} a_n = S\right)$$
On suppose que $\lim_{\substack{x\to1^-\\x\in\mathbb{R}}} f(x) = S$ et que $a_n \underset{n\to+\infty}{=} o\left(\frac{1}{n}\right)$.

1. Démontrer que pour tous $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in]0,1[$, on a :
$$|S_n - f(x)| \leq (1-x)\sum_{k=1}^{n} k|a_k| + \frac{\sup_{k>n}(k|a_k|)}{n(1-x)}$$
2. En déduire le théorème taubérien faible. On pourra poser $x = x_n = 1 - \frac{1}{n}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

VII.23.3 Théorème taubérien fort

Soit $\sum_{n\in\mathbb{N}} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence 1 et de somme f. Soit $S \in \mathbb{C}$.
Le but de cette question est de démontrer que :
$$\left(\lim_{\substack{x\to1^-\\x\in\mathbb{R}}} f(x) = S \text{ et } a_n \underset{n\to+\infty}{=} O\left(\frac{1}{n}\right)\right) \Longrightarrow \left(\sum_{n\in\mathbb{N}} a_n \text{ converge et } \sum_{n=0}^{+\infty} a_n = S\right)$$

1. Démontrer que, sans perte de généralité, on peut supposer que $S = 0$.

On suppose désormais que $\lim\limits_{\substack{x\to 1^-\\ x\in\mathbb{R}}} f(x) = 0$ et que $a_n \underset{n\to+\infty}{=} \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right)$.

2. On définit Θ de la manière suivante :

$$\Theta = \left\{ \theta : [0,1] \to \mathbb{R} \ ; \ \forall x \in [0,1] \ ; \ \sum_{n\geq 0} a_n \theta(x^n) \text{ converge et } \lim_{x\to 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n \theta(x_n) = 0 \right\}$$

Démontrer que Θ est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.

3. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P(0) = 0$. Démontrer que $P \in \Theta$.

4. Démontrer que :

$$\forall P \in \mathbb{R}[X], \ \lim_{\substack{x\to 1^-\\ x\in\mathbb{R}}} (1-x) \sum_{n=0}^{+\infty} x^n P(x^n) = \int_0^1 P(t)dt$$

On définit la fonction $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ par : $g(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

5. Démontrer que pour établir le théorème taubérien fort, il suffit de démontrer que $g \in \Theta$.

6. Soit

$$h(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x = 0, \\ \frac{g(x)-x}{x(1-x)} & \text{si } x \in]0,1[, \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

Etant donné $\varepsilon > 0$, démontrer qu'il existe $s_1, s_2 \in \mathcal{C}^0([0,1])$ vérifiant :

$$s_1 \leq h \leq s_2 \text{ et } \int_0^1 (s_2(t) - s_1(t))dt \leq \varepsilon$$

Représenter graphiquement h et deux telles fonctions s_1, s_2.

A partir de maintenant, $\varepsilon > 0$, s_1 et s_2 sont fixés.

7. Démontrer qu'il existe $T_1, T_2 \in \mathbb{R}[X]$ tels que :

$$\sup_{x\in[0,1]} |T_1(x) - s_1(x)| \leq \varepsilon \quad \text{et} \quad \sup_{x\in[0,1]} |T_2(x) - s_2(x)|$$

On pose, pour tout $x \in [0,1]$,

$$P_1(x) = x + x(1-x)(T_1(x) - \varepsilon), \ P_2(x) = x + x(1-x)(T_2(x) - \varepsilon), \text{ et } Q(x) = \frac{P_2(x) - P_1(x)}{x(1-x)}$$

8. $P_1(0) = P_2(0) = 0$, $P_1(1) = P_2(1) = 0$, $P_1 \leq g \leq P_2$ et $0 \leq \int_0^1 Q(x)dx \leq 5\varepsilon$.

9. Démontrer qu'il existe $M > 0$ tel que pour tout $x \in]0,1[$,

$$\left| \sum_{n=0}^{+\infty} a_n g(x^n) - \sum_{n=0}^{+\infty} a_n P_1(x^n) \right| \leq M(1-x) \sum_{n=0}^{+\infty} x^n Q(x^n)$$

10. Conclure.

VIII Topologie

VIII.1 Normes d'opérateur ★

[Corrigé]
Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.

1. On suppose que $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$ et $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ sont munis de leurs normes uniformes respectives.
   Montrer que :
$$|||\ A\ |||_\infty = \max_{1\leq i\leq n} \sum_{j=1}^{p} |A_{i,j}|$$
2. On suppose que $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$ et $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ sont munis de leurs normes 1 respectives.
   Montrer que :
$$|||\ A\ |||_1 = \max_{1\leq j\leq p} \sum_{i=1}^{n} |A_{i,j}|$$
3. On suppose que $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$ et $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ sont munis de leurs normes 2 respectives.
   Montrer que :
$$|||\ A\ |||_2 = \sqrt{\max \mathrm{Sp}(A^\top A)}$$

VIII.2 $\mathbb{Z}$ est fermé ★

[Corrigé]
Montrer que $\mathbb{Z}$ est fermé.

VIII.3 Orthogonalité et topologie ★★

[Corrigé]
Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace préhilbertien réel E que l'on munit de sa norme euclidienne.

1. Montrer que pour tout $y \in E$, $\varphi_y : x \in E \mapsto \langle x, y\rangle$ est continue.
2. Montrer que $F^\perp$ est un fermé dans E.
3. Montrer que de manière général, $\overline{F} \subset (F^\perp)^\perp$

VIII.4 Ensemble des valeurs d'adhérence d'une suite ★★★

[Corrigé]
Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite à valeurs dans un espace vectoriel normé E. On note V l'ensemble des valeurs d'adhérence de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
Montrer que $V = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \overline{\{u_k,\ k \geq n\}}$ et en déduire que V est fermé.

VIII.4.1 Une application ★★★★

[Corrigé]

1. Soit $z \in \mathbb{U}$. Montrer que 1 est une valeur d'adhérence de la suite $(z^n)_{n\in\mathbb{N}}$.
2. Soit $\begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_m \end{pmatrix} \in \mathbb{U}^m$. Montrer que $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ est une valeur d'adhérence de la suite $\begin{pmatrix} z_1^n \\ \vdots \\ z_m^n \end{pmatrix}_{n\in\mathbb{N}}$.
3. Que peut-on dire de complexes $a_1, \dots, a_n$ tels que $\sum_{k=1}^{n} a_k^m$ converge pour $m \to \infty$?

VIII.5 Ensemble des suites convergents vers 0 ★★

[Corrigé]
On note ℓ^∞ l'ensemble des suites bornées de $\mathbb{K}^\mathbb{N}$ que l'on munit de la norme $\|\cdot\|_\infty$.
Montrer que l'ensemble des suites convergeant vers 0 est un fermé de ℓ^∞.

VIII.5.1 Ensemble des suites convergentes ★★★ (HP)

[Corrigé]
Montrer que l'ensemble des suites convergentes est un fermé de ℓ^∞.
On pourra utiliser l'exercice V.1.

VIII.6 Calcul d'une adhérence ★★★

[Corrigé]
Quelle est l'adhérence de $E = \left\{ \frac{1}{p} + \frac{1}{q},\ (p,q) \in (\mathbb{N}^*)^2 \right\}$?

VIII.7 Partie ouverte et fermée simultanément ★★★

[Corrigé]
Montrer que les seules parties à la fois ouvertes et fermées d'un espace vectoriel normé E sont $\varnothing$ et E.

VIII.8 Opérations sur les adhérences/intérieurs

[Corrigé]
Soit E un espace vectoriel normé et soit A, B deux parties de E.

1. Montrer que $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ et $\overset{\circ}{\widehat{A \cap B}} = \mathring{A} \cap \mathring{B}$.
2. Montrer que $\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$ et $\mathring{A} \cup \mathring{B} \subset \overset{\circ}{\widehat{A \cup B}}$.
   Montrer qu'il n'y a pas égalité en général.

VIII.9 Les sept espaces de Kuratowski ★★★

[Corrigé]
Trouver une partie A de $\mathbb{R}$ telles que les sept ensembles suivants soient tous distincts :

$$A, \mathring{A}, \overline{A}, \overline{\mathring{A}}, \mathring{\overline{A}}, \overline{\mathring{\overline{A}}}, \mathring{\overline{\mathring{A}}}$$

VIII.10 Intérieur d'un sous-espace ★★

[Corrigé]
Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel normé E.

1. Montrer que si F est ouvert, alors $F = E$.
2. Montrer que si $F \neq E$, alors $\overset{\circ}{F} = \varnothing$.

VIII.11 Adhérence d'un sous-espace ★★★

[Corrigé]
Soit E un espace vectoriel normé.

1. Soit F un sous-espace vectoriel de E. Montrer que $\overline{F}$ est encore un sous-espace vectoriel.
2. Soit F un sous-espace vectoriel de dimension finie de E. Montrer que F est fermé dans E.
3. Soit H un hyperplan de E. Montrer que H est fermé ou dense dans E.

VIII.12 Graphe fermé ★★★

[Corrigé]
Soit f une fonction réelle. On note $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2,\ y = f(x)\}$ le graphe de f.

1. Montrer que si f est continue alors G est fermé.
2. Montrer que si f est bornée et G est fermé alors f est continue.
3. Montrer que ce n'est plus vrai si on ne suppose plus f bornée.

VIII.13 Application linéaire continue ★★

[Corrigé]
On considère les espaces vectoriels normés $E = (\mathcal{C}^0([0,1], \mathbb{R}), \|.\|_\infty)$ et $F = (\mathcal{C}^0([0,1], \mathbb{R}), \|.\|_1)$ avec $\forall f \in \mathcal{C}^0([0,1], \mathbb{R})$:

$$\|f\|_\infty = \sup_{[0,1]} f \quad \text{et} \quad \|f\|_1 = \int_0^1 |f|$$

1. Trouver une forme linéaire continue sur F et pas sur E.
2. Peut-on trouver une forme linéaire continue sur E et pas sur F ?

VIII.14 Application linéaire non continue ★★

[Corrigé]
On note $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Existe-il une application linéaire sur E continue pour aucune norme ?

VIII.15 Polynômes réels de degré n scindés à racines simples sur $\mathbb{R}$ ★★★★

[Corrigé]
On note A l'ensemble des polynômes à coefficients réels de degré n scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que A est ouvert dans $\mathbb{R}_n[X]$.
2. Déterminer l'adhérence de A.

VIII.16 Lemme de Riemann-Lebesgue ★★★

[Corrigé]
On considère un segment $[a,b]$ de $\mathbb{R}$, $(E,||.||)$ un espace vectoriel normé de dimension finie et $\phi : [a,b] \to E$.
Démontrer que $\lim\limits_{\lambda\to+\infty} \int_a^b e^{i\lambda t}\phi(t)dt = 0$ quand

- ϕ est une fonction en escalier sur $[a,b]$;
- ϕ est une fonction continue par morceaux sur $[a,b]$;
- ϕ est une fonction continue par morceaux et intégrable sur $\mathbb{R}$ avec $a = -\infty$ et $b = +\infty$.

VIII.17 Borel-Lebesgue (HP)

[Corrigé]
Soit E un espace vectoriel normé dont on note $\mathcal{T}$ l'ensemble des ouverts. On dit qu'une partie K de E est compacte au sens de Borel-Lebesgue lorsque :

$$\forall (O_i)_{i\in I} \subset \mathcal{T},\ K \subset \bigcup_{i\in I} O_i \implies \exists p \in \mathbb{N},\ \exists i_1,\dots,i_p \in I,\ K \subset \bigcup_{j=1}^{p} O_{i_j}$$

Autrement dit, de tout recouvrement de K composé d'ouverts, on peut extraire un sous-recouvrement fini.
Montrer qu'une partie de E est compacte au sens de Borel-Lebesgue si et seulement si elle l'est au sens de Bolzano-Weierstrass (définition par l'existence d'une valeur d'adhérence).

VIII.18 Parties compactes d'un espace vectoriel normé de dimension finie ★★

[Corrigé]
Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé.

1. Montrer que les parties compactes de E sont fermées.
2. Montrer qu'une partie fermée de E incluse dans une partie compacte est compacte.
3. Montrer qu'un produit cartésien d'un nombre fini de compact de E est compact de E.
4. Justifier que les segments de $\mathbb{R}$ sont compacts.
5. On suppose que E est de dimension finie. Démontrer que les parties compactes de E sont exactement les parties fermées bornées de E.

VIII.19 Somme de sous-espaces ★★★

[Corrigé]

1. Montrer que la somme de deux compacts est compacte.
2. Montrer que la somme d'un compact et d'un fermé est fermé.
3. Que peut-on dire de la somme de deux fermés ?

VIII.20 Un théorème du point fixe ★★★

[Corrigé]
Soit K un compact d'un espace vectoriel. Soit $f : K \to K$ une application vérifiant

$$\forall x,y \in K,\ x \neq y \implies \|f(x) - f(y)\| < \|x - y\|$$

1. Montrer que f admet un unique point fixe a.
2. Soit $x_0 \in K$. Montrer que la suite des itérés $(f^n(x_0))_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers a.
3. Donner un contre-exemple en ne supposant plus K compact.

VIII.21 Espace des endomorphismes préservant un compact ★★★★

[Corrigé]
Soit K un compact d'un espace vectoriel E de dimension finie $n \geq 1$. On pose $\mathcal{L}_K = \{f \in \mathcal{L}(E),\ f(K) \subset K\}$.
Montrer que $\mathcal{L}_K$ est compact dans $\mathcal{L}(E)$ si et seulement si $\text{Vect}(K) = E$.

VIII.22 Théorème de Heine ★★

[Corrigé]
Démontrer qu'une fonction continue sur un compact est uniformément continue sur ce compact.

VIII.23 Lemme des compacts emboîtés ★

[Corrigé]
Soient E un espace vectoriel normé et $(K_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite décroissante de compacts non vides de E.
Montrer que $K = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} K_n$ est non vide.

VIII.24 Théorème de Baire ★★★★★ (HP)

[Corrigé]
Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace de Banach, c'est à dire un espace vectoriel normée complet, ou encore dans lequel toute suite de Cauchy V.1 converge.

1. Démontrer qu'une intersection dénombrable d'ouverts denses dans E est dense dans E.
2. Montrer que cette propriété est équivalente à ce qu'une réunion dénombrable de fermés d'intérieurs vide soit d'intérieur vide.

VIII.25 Volume d'une (hyper)boule ★★★★ (HP)

[Corrigé]
Soit $R \in \mathbb{R}_+^*$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $\mathcal{B}_n(R) = \left\{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \leq R^2\right\}$

1. Calculer le volume de $\mathcal{B}_n(R)$: $V_n(R) = \int \cdots \int_{(x_1,\ldots,x_n)\in\mathcal{B}_n(R)} dx_1 \ldots dx_n$.
2. Déterminer la limite de $V_n(R)$. Quelle interprétation peut-on en faire ? Est-ce surprenant ?

VIII.26 Partie fermée bornée non compacte ★★★

[Corrigé]
Donner un exemple de partie fermée bornée non compacte d'un espace vectoriel normé.

VIII.27 Théorème de compacité de Riesz ★★★★

[Corrigé]
Soit $(E, \|.\|)$ un K-espace vectoriel normé.

1. Soit F un sous-espace vectoriel fermé de E tel que $F \neq E$.

a. Soit $x \in E \backslash F$. Justifier que $\delta = d(x, F) > 0$.
b. Justifier qu'il existe $v \in F$ tel que $0 < \|x - v\| \leq 2\delta$.
c. On pose $u = \dfrac{x - v}{\|x - v\|}$. Justifier que $d(u, F) \geq \dfrac{1}{2}$.

2. On note B la boule unité fermée de E i.e. $B = \{x \in E,\ \|x\| \leq 1\}$. Montrer que si E n'est pas de dimension finie, alors B n'est pas compacte.

VIII.28 Sphère et boule unité ★★★

[Corrigé]
Soit $(E, ||.||)$ un espace vectoriel normé. On note B la boule unité fermée de E et S la sphère unité de E.
Montrer que B est compacte si et seulement si S est compacte.

VIII.29 Principe du maximum pour les polynômes ★★★

[Corrigé]
Soit $P \in \mathbb{C}[X]$. On note $B = \{z \in \mathbb{C},\ |z| \leq 1\}$ et $S = \{z \in \mathbb{C},\ |z| = 1\}$.

Montrer que $\max\limits_{z \in B} |P(z)| = \max\limits_{z \in S} |P(z)|$.

VIII.30 Applications 1-lipschitzienne surjective sur un compact ★★★★

[Corrigé]
Soient E un espace vectoriel normé, K un compact de E et $g : K \to K$ une application 1-lipschitzienne. On cherche à montrer que g est surjective si et seulement si c'est une isométrie (i.e $\forall x, y \in E,\ ||g(x) - g(y)|| = ||u(x) - u(y)||$).

1. On suppose g surjective. On considère $x, y \in K$ ainsi que x_n, y_n des antécédents par g^n de x et y respectivement. On note (x', y') une valeur d'adhérence de $(x_n, y_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Montrer que $x - y$ est une valeur d'adhérence de $(g^n(x') - g^n(y'))_{n \in \mathbb{N}}$.
2. Montrer que $||g^n(x') - g^n(y')|| \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} ||x - y||$. En déduire que g est une isométrie de E.
3. On suppose maintenant que g est une isométrie de E. Montrer que g est surjective. Donner un contre-exemple lorsque K est seulement borné.

VIII.31 Une isométrie conserve les milieux ★★★★

[Corrigé]
Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel normé de dimension finie.

1. Pour K un compact non vide on pose $\delta(K) = \sup\limits_{(x,y) \in K^2} ||x - y||$. Montrer que $\delta(K)$ est bien défini. La borne supérieure est-elle atteinte ?
2. Pour $a \in E$, on note $\mathcal{S}_a$ l'ensemble des compacts K de E symétriques par rapport à a (i.e $\forall x \in K,\ 2a - x \in K$). Pour $B \subset E$ compacte, on pose

$$T(B) = \left\{ x \in B \mid \forall y \in B,\ ||x - y|| \leq \frac{1}{2}\delta(K) \right\}$$

Montrer que T induit une application de $\mathcal{S}_a$ dans $\mathcal{S}_a$.
3. Soit $B_0 \in \mathcal{S}_a$. On pose pour $n \in \mathbb{N},\ B_{n+1} = T(B_n)$. Déterminer $\bigcap\limits_{n \in \mathbb{N}} B_n$.
4. En déduire que toute isométrie de E conserve les milieux.
Remarque : une isométrie de E est une application $u : E \to E$ telle que $\forall (x, y) \in E^2,\ ||u(x) - u(y)|| = ||x - y||$.

VIII.32 Fonctions coercives ★★★

[Corrigé]
Soient $(E, \|.\|)$ un espace vectoriel normé de dimension finie et $f : E \to \mathbb{R}$ continue.
Montrer que $\lim\limits_{\|x\| \to +\infty} f(x) = +\infty$ si et seulement si l'image réciproque par f de tout compact de $\mathbb{R}$ est un compact de E.

VIII.33 Homéomorphisme de compacts ★★★

[Corrigé]
Soient E et F deux espaces vectoriels normés, K un compact de E et L une partie de F. Soit $f : K \to L$ bijective et continue. Montrer que f^{-1} est continue.

VIII.34 Distance à un fermé

[Corrigé]
Soient X une partie fermée, non vide d'un espace vectoriel normé $(E, \|.\|)$ et $a \in E$. Montrer que la distance de a à X, $d(a, X) = \inf\limits_{x \in X} \|a - x\|$ est atteinte.

VIII.35 Diamètre et frontière

[Corrigé]
Soit $(E, \|.\|)$ un espace vectoriel normé. Pour A une partie bornée de E on définit le *diamètre* de A : $\delta(A) = \sup\limits_{(x,y) \in A^2} \|x - y\|$.
Montrer que pour toute partie bornée A de E on a :

$$\delta(A) = \delta(\mathrm{Fr}(A))$$

VIII.36 Frontière ★★

[Corrigé]
Soient E un espace vectoriel normé et F une partie fermée de E.
Montrer que $\mathrm{Fr}(\mathrm{Fr}(F)) = \mathrm{Fr}(F)$.

VIII.37 Projeté sur un convexe compact ★★★

[Corrigé]
Soit $(E, \langle ., . \rangle)$ un espace euclidien. Soient H une partie convexe et compacte de E et soit $x \in E$. On note

$$d(x, H) = \inf_{h \in H} ||x - h||.$$

Soient $h, h' \in H$. On pose $q : t \in [0, 1] \longmapsto ||x - th - (1 - t)h'||^2$.

1. Montrer qu'il existe un unique élément $h_0 \in H$ tel que $d(x, H) = ||x - h_0||$.

2. Montrer que h_0 est caractérisé par la condition : $\forall y \in H,\ \langle x - h_0, y - h_0 \rangle \leq 0$.

Le vecteur h_0 est appelé projeté de x sur H.

VIII.38 Convexité de l'adhérence et de l'intérieur ★★★

[Corrigé]
Soit A une partie convexe d'un espace vectoriel normé E. Montrer que $\overline{A}$ et $\mathring{A}$ sont convexes.

VIII.39 Fonctions positivement homogènes

[Corrigé]
Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel. Une application $f : E \to \mathbb{R}$ est dite positivement homogène de degré α (avec $\alpha>0$) quand :

$$\forall x \in E,\ \forall \lambda \in \mathbb{R}_+,\ f(\lambda x) = \lambda^\alpha f(x)$$

On appelle semi-norme sur E une application $N : E \to \mathbb{R}_+^*$ qui vérifie les axiomes définissant une norme hormis la séparation. On s'intéresse ici aux fonctions positivement homogènes de degré 1.

1. Soit $f : E \to \mathbb{R}$ une fonction homogène de degré 1.
   (a) Montrer que f est convexe si et seulement si $\forall (x,y) \in E^2,\ f(x+y) \leq f(x) + f(y)$
   (b) Si f est à valeurs positives, montrer que f est convexe sur E si et seulement si l'ensemble $C = \{x \in E | f(x) \leq 1\}$ est convexe.
   (c) Si f est convexe, à valeurs positives et paire, montrer que f est une semi norme.
   (d) On suppose ici que E est de dimension finie. Soit Ω un ouvert borné non vide de E. Montrer qu'il existe une norme N sur E telle que $\Omega = B_N(0,1) = \{x \in E,\ N(x) < 1\}$ si et seulement si Ω est convexe et admet 0 comme centre de symétrie.
2. (Etude de normes particulières) Soit un réel $\alpha \geq 1$. Montrer, sans utiliser l'inégalité de Minkowski, que l'application

$$N_\alpha : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R}^+ \\ (x_1, \dots, x_n) & \longmapsto & (|x_1|^\alpha + \dots + |x_n|^\alpha) \end{array} \right.$$

   définit une norme sur $\mathbb{R}^n$.

VIII.40 Enveloppe convexe

[Corrigé]
Soit E un espace euclidien.

1. Montrer que si A et B sont deux parties convexes de E alors $A \cap B$ est une partie convexe de E.
   Pour $A \subset E$, on définit l'enveloppe convexe de A, $\text{Conv}(A)$, comme la plus petite partie convexe de E contenant A, c'est à dire l'intersection de tous les convexes de E contenant A.
2. On dit que $x \in E$ est combinaison convexe de $x_1, \dots, x_p \in E$ lorsqu'il existe des réels positifs $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ tels que $x = \sum_{k=1}^{p} \lambda_k x_k$ et $\sum_{k=1}^{p} \lambda_k = 1$.
   Montrer que $\text{Conv}(A)$ est constitué des combinaisons convexes d'éléments de A.

VIII.41 Théorème de Carathéodory ★★★

[Corrigé]
Soit E un espace vectoriel de dimension n. Soit $A \subset E$. On souhaite montrer que l'enveloppe convexe de A (VIII.40) est constitué des combinaisons convexes d'au plus $n+1$ éléments de A.

Soit $x = \sum_{k=1}^{p} \lambda_k x_k$ une combinaison convexe de $x_1, \dots, x_p \in A$ avec $p \geq n+2$.

1. En considérant la famille $(x_2 - x_1, \dots, x_p - x_1)$, montrer qu'il existe p réels non tous nuls $\mu_1, \dots, \mu_p$ tels que

$$\sum_{k=1}^{p} \mu_k x_k = 0 \text{ et } \sum_{k=1}^{p} \mu_k = 0$$

2. Conclure.

VIII.41.1 Enveloppe convexe d'une partie compacte ★★

[Corrigé] En déduire que l'enveloppe convexe d'une partie compacte est compacte.

VIII.42 Théorème de Krein-Milman

[Corrigé]
Soit E un espace euclidien.
Pour C une partie convexe de E on dit que $x \in C$ est un point extrémal de C si $C \setminus \{x\}$ est convexe, autrement dit, si x appartient à un segment de C alors x est une borne du segment : $x \in [a,b] \subset C \implies (x = a \text{ ou } x = b)$. On note $\text{Ext}(C)$ l'ensemble des points extrémaux de C.
Soit C un convexe compact de E.
On pourra librement utiliser dans cet exercice le théorème de projection sur un convexe compact VIII.37.

1. Soit $x \in \text{Fr}(C)$. Montrer qu'il existe une forme linéaire non nulle φ et $a \in E$ tels que $C \subset \varphi^{-1}(]-\infty, a])$. On note $H = \varphi^{-1}(a)$.
2. Montrer que $\text{Ext}(C) \cap H = \text{Ext}(C \cap H)$.
3. Montrer que $C = \text{Conv}(\text{Ext}(C))$.

VIII.43 Epigraphe ★

[Corrigé]
Soit f une fonction réelle. On note $E = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ y \geq f(x)\}$ l'épigraphe de f.
Montrer que f est convexe si et seulement si E est convexe.

VIII.44 Partie convexe dense de $\mathbb{R}^n$ ★★★★

[Corrigé]
Soit A une partie convexe et dense de $\mathbb{R}^n$. Montrer que $A = \mathbb{R}^n$.

VIII.45 Complémentaire d'une partie convexe ouverte de $\mathbb{R}^n$ ★★★★

[Corrigé]

1. Soit A une partie convexe et ouverte de $\mathbb{R}^2$. Montrer que le complémentaire de A contient une droite vectorielle.
2. Soit A une partie convexe et ouverte de $\mathbb{R}^n$, $n \geq 2$. Montrer que le complémentaire de A contient une droite vectorielle.

VIII.46 Partie convexe fermée non bornée de $\mathbb{R}^n$ ★★★★

[Corrigé]
Soit A une partie convexe, fermée et non bornée de $\mathbb{R}^n$. Montrer que A contient une demi-droite.

VIII.47 Partie convexe ouverte non bornée de $\mathbb{R}^n$ ★★★★

[Corrigé]
Soit A une partie convexe, ouverte et non bornée de $\mathbb{R}^n$. Montrer que A contient une demi-droite.

VIII.47.1 Partie convexe non bornée de $\mathbb{R}^n$ (HP) ★★★★★

[Corrigé]
Soit A une partie convexe et non bornée de $\mathbb{R}^n$. Montrer que A contient une demi-droite.

VIII.48 Connexité de l'espace (1) ★★

[Corrigé]

1. Déterminer les composantes connexes par arcs de $\mathbb{R}^*$.
2. Montrer que $\mathbb{U}$ privé d'un point est connexe par arcs. $\mathbb{U}$ privé de deux points est-t-il connexe par arcs ? En déduire les parties connexes par arcs de $\mathbb{U}$.
3. Montrer que $\mathbb{C}$ privé d'un nombre fini de points est connexe par arcs.
4. Montrer que $\mathbb{R}^3$ privé d'un nombre fini de droites est connexe par arcs.

VIII.49 Connexité de l'espace (2)

[Corrigé]
Montrer que $\mathbb{R}^2\backslash\mathbb{Q}^2$ est connexe par arcs.

VIII.50 Complémentaire d'un hyperplan ★★★

[Corrigé]
Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension n finie.

1. Soit H un hyperplan de E. Montrer que $E\backslash H$ n'est pas connexe par arcs. Quelles sont ses composantes connexes par arcs ?
2. Soit F un sous-espace vectoriel de E de dimension $d \leq n-2$. $E\backslash F$ est-t-il connexe par arcs ?
3. Reprendre la première question avec E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel.

VIII.51 Composantes connexes par arcs du complémentaire de la réunion de plusieurs hyperplans ★★★★★

[Corrigé]
Soient $n, r \in \mathbb{N}^*$.

1. Soit $(f_1, \dots, f_r)$ une famille libre de $(\mathbb{R}^n)^*$. Quel est le nombre de composantes connexes par arcs de $\mathbb{R}^n \backslash \bigcup_{i=1}^{r} \operatorname{Ker} f_i$?
2. Même question en remplaçant $\mathbb{R}$ par $\mathbb{C}$.

VIII.52 Sphères d'un $\mathbb{R}$-espace vectoriel ★★★

[Corrigé]
Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension supérieure ou égale à 2.

1. Montrer que la sphère unité S de E est connexe par arcs.
2. En déduire que toutes les sphères de E sont connexes par arcs.

VIII.53 Théorème du passage à la douane ★★★

[Corrigé]
Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel normé, montrer que toute partie connexe par arcs qui rencontre une partie A et son complémentaire rencontre forcément la frontière de A.

VIII.54 Condition nécessaire de la connexité par arc ★

[Corrigé]
Soit C un connexe par arcs.
Montrer que toute application $f : C \to \{0, 1\}$ continue est constante.

VIII.55 Entre un ensemble et son adhérence

[Corrigé]
Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel normé, C une partie convexe de E et $D \subset E$ telles que $C \subset D \subset \overline{C}$.
Montrer que D est connexe par arcs.

VIII.56 Continuité d'applications matricielles

[Corrigé]
Montrer les propositions suivantes :

1. $f : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mapsto M^\top$ est continue.
2. $g : (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2 \mapsto AB$ est continue.
3. $h : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mapsto M^\top M$ est continue.
4. $\det : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mapsto \det M$ est continue.
5. $\mathrm{Com} : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mapsto \mathrm{Com}(M)$ est continue.
6. $\mathrm{inv} : M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \mapsto M^{-1}$ est continue.
7. $\Pi : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mapsto \pi_M$ n'est pas continue.

VIII.57 Points de continuité du polynôme minimal

[Corrigé]
Déterminer l'ensemble des points de continuité de l'application $\Pi : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mapsto \pi_M$.

VIII.58 Exponentielle matricielle et topologie

[Corrigé]
Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que $\exp(M)$ est un polynôme en M.

VIII.59 Lemme du déterminant

[Corrigé]

1. Montrer que $\forall (U, V) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})^2,\ \det\left(I_n + UV^\top\right) = 1 + V^\top U$
2. Montrer que $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \forall (U, V) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})^2,\ \det\left(M + UV^\top\right) = \det(M) + V^\top \mathrm{Com}(M)^\top U$

VIII.60 Matrice de déterminant 1 ★★★

[Corrigé]
On pose $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) | \det(M) = 1\}$ (appelé groupe spécial linéaire).
Montrer que :

1. $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$ est un groupe.
2. $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$ est fermé.
3. $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$ n'est pas borné.

4. $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$ est d'intérieur vide.
5. $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$ est connexe par arcs.
   On admettra que $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$ *est engendré par l'ensemble des matrices de transvection.*

VIII.61 Ensembles de matrices de rang fixé

[Corrigé]
Soit $(p,r) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}$. On pose

$$A_r = \{M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}),\ \mathrm{rg}(M) = r\}$$
$$B_r = \{M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}),\ \mathrm{rg}(M) \leq r\}$$
$$C_r = \{M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}),\ \mathrm{rg}(M) \geq r\}$$

Les ensembles A_r, B_r, C_r sont-ils ouverts ? Fermés ?
Déterminer leurs adhérence et leurs intérieur.

VIII.62 Densité des matrices inversibles ★★★

[Corrigé]

1. Montrer que $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
2. Montrer que $\forall (A,B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2,\ \chi_{AB} = \chi_{BA}$.
3. Montrer que $\forall (A,B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2,\ \chi_{\exp(AB)} = \chi_{\exp(BA)}$.

VIII.63 Comatrice et topologie

[Corrigé]
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que la transposée de la comatrice de A est un polynôme en A.

VIII.64 Groupe orthogonal ★

[Corrigé]
Montrer que $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe compact de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. Est-il connexe par arcs ?

VIII.65 Groupe (spécial) unitaire ★★★

[Corrigé]
On note pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\overline{M} = \left(\overline{M_{ij}}\right)_{1\leq i,j\leq n}$ la matrice dont les coefficients sont les conjugués de ceux de M et on pose $U_n(\mathbb{C}) = \left\{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mid \overline{M}^\top M = I_n\right\}$ ainsi que $SU_n(\mathbb{C}) = \{M \in U_n(\mathbb{C}) \mid \det(M) = 1\}$.

1. Montrer que $U_n(\mathbb{C})$ et $SU_n(\mathbb{C})$ sont deux sous-groupes compacts d'intérieurs vides de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.
2. a. Démontrer que toute matrice de $U_n(\mathbb{C})$ peut s'écrire sous la forme,

$$P\mathrm{diag}(e^{i\theta_1}, \dots, e^{i\theta_n})P^{-1}$$

   avec $P \in U_n(\mathbb{C})$ et $\theta_1, \dots, \theta_n$ des réels.

   b. Montrer que $U_n(\mathbb{C})$ et $SU_n(\mathbb{C})$ sont connexes par arcs.

VIII.66 Partie compacte et stable par produit de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ ★★★

[Corrigé]
Montrer que toute partie non vide, compacte et stable par produit de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ est un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$.

VIII.67 Intérieur des matrices diagonalisables ★★★★★

[Corrigé]
On note $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ diagonalisables ainsi que $\mathcal{B}_n(\mathbb{K}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ \text{Card}(\text{Sp}(M)) = n\}$.

1. Montrer que $\overset{\circ}{\mathcal{D}_n(\mathbb{R})} = \mathcal{B}_n(\mathbb{R})$
2. Montrer que $\overset{\circ}{\mathcal{D}_n(\mathbb{C})} = \mathcal{B}_n(\mathbb{C})$

VIII.68 Adhérence des matrices diagonalisables ★★★

[Corrigé]
On note $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$ (resp. $\mathcal{T}_n(\mathbb{K})$) l'ensemble des matrices diagonalisables (resp. trigonalisables) de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. Montrer que $\mathcal{D}_n(\mathbb{C})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
2. a. Soient $d \in \mathbb{N}$ et $P \in \mathbb{R}[X]$ unitaire de degré d. Montrer que P est scindé dans $\mathbb{R}[X]$ si et seulement si
$$\forall z \in \mathbb{C},\ |P(z)| \geq |\text{Im}(z)|^d$$
b. En déduire que $\overline{\mathcal{D}_n(\mathbb{R})} = \mathcal{T}_n(\mathbb{R})$

VIII.69 Une preuve de Cayley-Hamilton (1) ★★★

[Corrigé]

1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ diagonalisable. Montrer que $\chi_A(A) = 0$.
2. Montrer que $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ \chi_A(A) = 0$.

VIII.70 Dimension du commutant d'une matrice

[Corrigé]
Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On note $\mathcal{C}(M) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ AM = MA\}$.

1. Déterminer la dimension de $\mathcal{C}(M)$ lorsque M est une matrice diagonale dont tous les coefficients diagonaux sont distincts.
2. Soit $r \in [\![0; n]\!]$. Montrer que $B_r = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ \text{rg}(A) \leq r\}$ est fermé.
3. En déduire que $\dim \mathcal{C}(M) \geq n$.

VIII.71 Topologie et réduction

[Corrigé]
Pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on désigne sa classe de similitude sur $\mathbb{K}$ par :
$$S_{\mathbb{K}}(M) = \left\{PMP^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})\right\}$$

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. Montrer que $S_{\mathbb{K}}(M)$ est une partie bornée de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ si et seulement si M est une matrice scalaire (de la forme αI_n avec $\alpha \in \mathbb{K}$).
2. Montrer que l'ensemble $S_{\mathbb{K}}(M)$ est une partie fermée de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ si et seulement la matrice M est diagonalisable.
3. Montrer que M est nilpotente si et seulement si la matrice nulle est un point adhérent à $S_{\mathbb{K}}(M)$.

VIII.72 Groupe spécial orthogonal et connexité

[Corrigé]

1. $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est-il connexe par arcs ?
2. Montrer que $\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ est connexe par arcs.
3. Montrer que $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ est connexe par arcs.

VIII.73 Matrices inversibles et connexité

[Corrigé]

1. $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ est-il connexe par arc ?
2. a. Soit $(A,B) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})^2$. On pose $d : z \in \mathbb{C} \mapsto \det((1-z)A + zB)$
   Montrer que $V = \{z \in \mathbb{C},\ d(z) \neq 0\}$ est connexe par arcs.
   b. En déduire que $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs.

VIII.74 Matrices nilpotentes et connexité

[Corrigé]
L'ensemble des matrices nilpotentes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est-il convexe ? Connexe par arcs ? Et si on enlève 0_n ?

VIII.75 Raffinement sur les disques de Gershgorin

[Corrigé]
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Pour $i \in [\![1;n]\!]$ on note $R_i = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$ et $\mathcal{D}_i = D(a_{ii}, R_i)$ le disque fermé de centre a_{ii} et de rayon R_i.

1. a. Montrer que $\mathrm{Sp}(A) \subset \mathcal{D} = \bigcup_{i=1}^{n} \mathcal{D}_i$.
   b. Pour $j \in [\![1;n]\!]$ on note $T_j = \sum_{i \neq j} |a_{ij}|$ et $\mathcal{D}_j^* = D(a_{jj}, T_j)$ et $\mathcal{D}^* = \bigcup_{j=1}^{n} \mathcal{D}_j^*$.
   Montrer que $\mathrm{Sp}(A) \subset \mathcal{D} \cap \mathcal{D}^*$.
2. On note $\mathcal{D} = \bigsqcup_{k=1}^{p} C_k$ la décomposition en composantes connexes par arcs de $\mathcal{D}$.
   a. Montrer que chacune des composantes connexes par arcs de $\mathcal{D}$ est réunion d'un certain nombre des disques de Gershgorin $\mathcal{D}_i$.
   En déduire que les composantes connexes par arcs de $\mathcal{D}$ sont à la fois ouvertes dans $\mathcal{D}$ et fermées dans $\mathbb{C}$.
   On note dans la suite n_k le nombre de disques de Gershgorin inclus dans C_k.
   b. On souhaite montrer pour toute matrice A la proposition $\mathcal{P}(A)$: "Il y a exactement n_k valeurs propres de A dans C_k"
   Pour cela on fixe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et on pose pour $t \in [0,1]$, $A(t) = (a_{ij}(t))_{1 \leq i,j \leq n}$ où $\forall i \in [\![1;n]\!]$, $a_{ii}(t) = a_{ii}$ et $\forall i,j \in [\![1;n]\!], i \neq j \implies a_{ij}(t) = t a_{ij}$, ainsi que I l'ensemble des $t \in [0,1]$ tels que $\mathcal{P}(A(t))$.

   Montrer que I est non vide puis montrer $\mathcal{P}(A)$.
   c. Application : Montrer que si les disques de Gershgorin de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ sont deux à deux disjoints, alors A est diagonalisable.

VIII.76 Matrices stochastiques et bistochastiques

[Corrigé]

1. Montrer que $\mathcal{S}_{n,p} = \{M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R}^+) \mid \forall j \in [\![1;p]\!], \sum_{i=1}^{n} M_{ij} = 1\}$ l'ensemble des matrices stochastiques est une partie convexe et compacte de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$. Montrer que $\forall (A,B) \in \mathcal{S}_{n,p} \times \mathcal{S}_{p,q},\ AB \in \mathcal{S}_{n,q}$.
2. Montrer que $\mathcal{B}_n = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}^+) \mid \forall j \in [\![1;n]\!], \sum_{i=1}^{n} M_{ij} = \sum_{i=1}^{n} M_{ji} = 1\}$ l'ensemble des matrices bistochastiques est une partie convexe et compacte de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

VIII.77 Théorème de Birkhoff-Von Neumann ★★★★

[Corrigé]
On note $\mathcal{P}_n$ l'ensemble des matrices de permutation d'ordre n (??) et $\mathcal{B}_n$ l'ensemble des matrices bistochastiques d'ordre n (VIII.76). Pour $A \subset \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\text{Conv}(A)$ désigne l'enveloppe convexe de A (VIII.40). On souhaite montrer que $\mathcal{B}_n = \text{Conv}(\mathcal{P}_n)$.

1. Montrer que $\mathcal{B}_n \supset \text{Conv}(\mathcal{P}_n)$.
2. Pour l'inclusion réciproque, on raisonne par récurrence sur le nombre de coefficients différents de 0 des matrices bistochastiques en jeu.
   a. Soit $B \in \mathcal{B}_n$ ayant exactement n coefficients non nuls. Montrer que $B \in \text{Conv}(\mathcal{P}_n)$.
   b. On fixe un entier $n^2 \geq m > n$ et on suppose que toute matrice $M \in \mathcal{B}_n$ ayant moins de $m-1$ coefficients non nuls appartient à l'enveloppe convexe de $\mathcal{P}_n$. Soit $B \in \mathcal{B}_n$ ayant exactement m coefficients non nuls. On note pour $i \in [\![1;n]\!],\ A_i = \{j \in [\![1;n]\!],\ B_{ij} \neq 0\}$.
   A l'aide du théorème de Hall (Tome Algèbre), déterminer une matrice de permutation P_σ et un réel positif λ tels que $B_0 = \dfrac{1}{1-\lambda}(B - \lambda P_\sigma)$ soit une matrice bistochastique ayant au moins un coefficient nul de plus que B.
3. Conclure.

VIII.77.1 Points extrémaux des matrices bistochastiques

On note $\mathcal{P}_n$ l'ensemble des matrices de permutation d'ordre n (Tome Algèbre) et $\mathcal{B}_n$ l'ensemble des matrices bistochastiques d'ordre n (VIII.76).

1. Montrer que $\mathcal{B}_n$ est convexe et compact.
2. Montrer que $\text{Ext}(\mathcal{B}_n) = \mathcal{P}_n$.

IX

Fonction à valeurs vectorielles

Dans toute cette section, n désigne un entier naturel non nul.

IX.1 Point fixe de l'exponentielle complexe

[Corrigé]

Le but de cet exercice est de montrer l'existence de points fixes de l'exponentielle complexe, c'est à dire qu'il existe $z \in \mathbb{C}$ tel que $e^z = z$.

1. L'exponentielle a-t-elle des points fixes sur $\mathbb{R}$?
2. Pour $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ on pose,
$$f(x) = \exp\left(\frac{x}{\tan x}\right) - \frac{x}{\sin x}$$
Déterminer les limites de f en 0 et en $\frac{\pi}{2}$.
3. En déduire qu'il existe $b \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ tel que $f(b) = 0$.
4. On pose $a = \frac{b}{\tan b}$ et $z = a + ib$. Montrer que $e^z = z$.

IX.2 Théorème du relèvement

[Corrigé]

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f : I \to \mathbb{C}^*$ une fonction de classe $\mathcal{C}^n$.

1. Montrer qu'il existe une unique fonction $\theta : I \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^n$ telle que $\forall t \in I,\ f(t) = |f(t)|e^{2i\pi\theta(t)}$ à une constante additive près.
On dit que θ est un *argument* de f.
2. Supposons que $I = [a, b]$ avec $a < b$ et $f(a) = f(b)$. On définit $N_\theta(f) = \theta(b) - \theta(a)$ où θ est un argument de f. Montrer que $N_\theta(f)$ est indépendant de θ.
On appelle cette quantité le *nombre de tours* de f.
3. Démontrer qu'il n'existe aucune fonction continue $L : \mathbb{C}^* \to \mathbb{C}$ telle que $\exp \circ L = \mathrm{Id}_{\mathbb{C}^*}$.
On pourra montrer par exemple que si il en existe une, alors $t \mapsto \frac{1}{2i\pi}L(e^{2i\pi t})$ est un argument de $t \mapsto e^{2i\pi t}$.

IX.3 Equation fonctionnelle de l'exponentielle matricielle ★★★

[Corrigé]

Soit $\varphi : \mathbb{R} \to \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une application telle que $\forall (s,t) \in \mathbb{R}^2,\ \varphi(s+t) = \varphi(s)\varphi(t)$.

1. On suppose que φ est dérivable en 0. Déterminer φ.
2. On suppose que φ est continue en 0 et que $\varphi(\mathbb{R}) \subset \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$. Déterminer φ.

IX.4 Formule de Trotter-Kato ★★

[Corrigé]

Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ que l'on munit d'une norme sous-multiplicative $\|\cdot\|$. Pour tout k entier naturel non nul, on pose :

$$X_k = \exp\left(\frac{A}{k}\right)\exp\left(\frac{B}{k}\right) \qquad \text{et} \qquad Y_k = \exp\left(\frac{A+B}{k}\right)$$

1. Prouver les majoration :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \|X_k\| \leq \exp\left(\frac{\|A\|+\|B\|}{k}\right) \quad \text{et} \quad \|Y_k\| \leq \exp\left(\frac{\|A\|+\|B\|}{k}\right)$$

On introduit la fonction $h : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ t & \longmapsto & e^{tA}e^{tB} - e^{t(A+B)} \end{array} \right.$.

2. Montrer que $X_k - Y_k \underset{k\to+\infty}{=} \mathcal{O}\left(\frac{1}{k^2}\right)$

3. Vérifier la relation $X_k^k - Y_k^k = \sum_{i=0}^{k-1} X_k^i (X_k - Y_k) Y_k^{k-i-1}$.

4. En déduire que $\lim_{k\to+\infty} \left(\exp\left(\frac{A}{k}\right)\exp\left(\frac{B}{k}\right)\right)^k = \exp(A+B)$.

IX.5 Série entière de matrice ★★

[Corrigé]

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

On définit $\cos(A) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} A^{2n}$ et $\sin(A) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} A^{2n+1}$.

Montrer que $\cos(A)^2 + \sin(A)^2 = I_n$.

IX.6 Expression d'un projecteur

[Corrigé]

Soit $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Justifier l'existence et calculer :

$$\int_0^{+\infty} A \cdot (A^2 + x^2 I_n)^{-1} dx$$

IX.7 Une preuve analytique de Cayley-Hamilton ★★★

[Corrigé]

On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ d'une norme d'algèbre $\|.\|$ et on se donne $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

1. On suppose que $\|A\| < 1$. Montrer que $I_n - A$ est inversible et que $(I_n - A)^{-1} = \sum_{k=0}^{+\infty} A^k$.

2. Soit $k \in \mathbb{N}$. Montrer que pour $r \in \mathbb{R}$ assez grand, l'intégrale

$$I_k(r) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(re^{i\theta}\right)^{k+1} \left(re^{i\theta} I_n - A\right)^{-1} d\theta$$

est définie et que $I_k(r) = A^k$.

3. Justifier que

$$\chi_A(A) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} re^{i\theta} \operatorname{Com}(re^{i\theta} I_n - A)^\top d\theta$$

4. En déduire le théorème de Cayley-Hamilton.

IX.8 Exemple de fonction lipschitzienne

[Corrigé]
Soit $(E, \|\|)$ un espace vectoriel réel normé.
On pose :

$$f : \left\{ \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & E \\ x & \longmapsto & \frac{x}{\max\{1, \|x\|\}} \end{array} \right.$$

1. Montrer que f est 2-lipschitzienne.
2. Montrer que si $\|.\|$ est euclidienne alors f est 1-lipschitzienne.

IX.9 Condition de continuité sur un espace vectoriel normé

[Corrigé]
Soient E et F deux espaces vectoriels réels normés.
On note $\|.\|_E$ (respectivement $\|.\|_F$) la norme sur E.
Démontrer que si f est application linéaire de E dans F, alors les propriétés suivantes sont deux à deux équivalentes :

— f est continue sur E,
— f est continue en O,
— il existe $k > 0$ tel que pour tout $x \in E$, $\|f(x)\|_F \geq k\|x\|_E$.

IX.10 Application linéaire (2)

[Corrigé]
Soient E un espace vectoriel de dimension finie et $f : \mathbb{R} \to E$ dérivable en 0 telle que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(2x) = 2f(x)$$

Montrer que f est linéaire.

IX.11 Mouvement à force centrale

[Corrigé]
Soit I un intervalle de R et $f : I \to \mathbb{R}^3$ de classe $\mathcal{C}^2$ tel que pour tout $t \in I$, $f(t)$ et $f''(t)$ soient colinéaires. On suppose de plus qu'il existe $t_0 \in I$ tel que $(f(t_0), f'(t_0))$ est libre.

1. Montrer que f est à valeurs dans un plan vectoriel de $\mathbb{R}^3$. On pourra utiliser le produit vectoriel.
2. Montrer que l'aire orientée du triangle porté par les vecteurs $f(t)$ et $f'(t)$.

IX.12 Dérivée d'un produit de deux matrices

[Corrigé]
Soit $M : \mathbb{R} \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), t \mapsto M(t)$ une fonction dérivable.

1. Démontrer que la fonction $\varphi : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \\ t & \longmapsto & M(t)M(t)^\top \end{array} \right.$ est dérivable.
2. On suppose que pour tout $t \in \mathbb{R}$, la matrice $M(t)$ est orthogonale.
   Démontrer que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $M'(t)M(t)^\top$ est antisymétrique.

IX.13 Inégalité des accroissements finis pour un espace euclidien

[Corrigé]
Soit E un espace vectoriel euclidien et $f : [a, b] \to E$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. En considérant $\varphi(t) = \langle f(b) - f(a), f(t)\rangle$, démontrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$\|f(b) - f(a)\| \leq (b - a)\,\|f'(c)\|$$

X

Equation différentielle

X.1 Equations différentielles linéaires du premier ordre

[Corrigé]

Résoudre ces équations différentielles :

1. $y' + y = x$ sur $\mathbb{R}$;
2. $y' + \text{th}(t)y = \text{sh}(t)$ sur $\mathbb{R}$;
3. $y' + 2xy = e^{x-x^2}$, y(0)=0, sur $\mathbb{R}$;
4. $|x(x-1)|y' - y = x^2$ sur $\mathbb{R}$;
5. $y' + \text{cotan}(t)y = \cos^2(t)$ sur $]0, \pi[$.

X.2 Equations différentielles linéaires du second ordre

[Corrigé]

Résoudre ces équations différentielles

1. $y'' - 2y' - 3y = t^2 e^t$ sur $\mathbb{R}$;
2. $y'' - 2y' + 2y = e^{-t}\cos(t)$ sur $\mathbb{R}$;
3. $y'' + \lambda y = 0$ sur $\mathbb{R}$, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$;
4. $y'' - (1-i)y' - 2(1+i)y = 0$ sur $\mathbb{C}$ avec $y(0) = y'(0) = 1$.

X.3 Une autre équation différentielle ★★

[Corrigé]

1. Déterminer l'ensemble des fonctions $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ telles que $\forall x \in \mathbb{R},\ f'(x) = f(-x)$.
2. Soit $\gamma \in [-1, 1]$. Déterminer l'ensemble des fonctions $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ telles que $\forall x \in \mathbb{R},\ f'(x) = f(\gamma x)$.

X.4 Problèmes de raccordement

[Corrigé]

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle : $xy' - y = x$.

X.5 Suite d'équations différentielles

[Corrigé]

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$.

1. Résoudre sur $\mathbb{R}_+^*$ l'équation différentielle $xy' - \alpha y = 0$. Déterminer l'unique solution f vérifiant $f(1) = 1$.
2. Résoudre sur $\mathbb{R}_+^*$ l'équation différentielle $xy' - \alpha y = f$. Déterminer l'unique solution vérifiant $g(1) = 0$.
3. On définit par récurrence une suite de fonctions (u_n) sur $\mathbb{R}_+^*$ de la manière suivante :
   — $u_0 = f$,
   — pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_{n+1} est l'unique solution de l'équation différentielle $xy' - \alpha y = u_n$ sur $\mathbb{R}_+^*$ valant 0 en 1.
   Déterminer par récurrence u_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

X.6 Solution impaire ★★

[Corrigé]
Soient $a, b \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

1. On suppose a impaire et b paire.
   Montrer qu'il existe une unique solution impaire à l'équation $y' + ay + b = 0$.
2. Donner des conditions sur a et b pour que l'équation $y' + ay + b = 0$ admette une solution impaire.

X.7 Un principe des zéros isolés ★★★

[Corrigé]
Soient I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$.
Montrer que toute solution non nulle de $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_0 y = 0$ a ses zéros isolés.
Autrement dit, $\forall x \in I,\ y(x) = 0 \implies \exists \varepsilon > 0,\ \forall x_0 \in]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\setminus \{x\},\ y(x_0) \neq 0$.

X.8 Equation de Bernoulli (1)

[Corrigé]
On souhaite résoudre l'équation

$$(E) : x^2y'' + 3xy' + y = \frac{1}{x^2}$$

sur l'intervalle $I =]0, +\infty[$.

1. Soient $y : I \to \mathbb{R}$ deux fois dérivable et $Y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par $Y(t) = y(e^t)$.
   a Calculer les dérivées y,y' et y'' en fonction de Y,Y' et Y''
   b En déduire que y est solution de (E) si et seulement si Y est solution d'une équation différentielle linéaire du deuxième ordre à coefficients constants (E') que l'on précisera.
2. Résoudre (E') sur $\mathbb{R}$.
3. En déduire les solutions de (E').
4. En déduire les solutions de (E) sur I.
5. Déterminer l'unique solution y de (E) sur I telle que $y(1) = y'(1) = 0$

X.9 Equation de Bernoulli (2)

[Corrigé]
Soient I=$]1, +\infty[$,

$$(E) : -t^2y' + ty = y^2$$

1. Soit y une fonction ne s'annulant par sur I. Prouver que y est solution de (E) si et seulement si $z = \dfrac{1}{y}$ est solution sur I d'une équation différentielle (E') linéaire d'ordre un.
2. Résoudre (E') sur I.
3. En déduire les solutions de (E) ne s'annulant pas sur l'intervalle I.

X.10 Etude asymptotique des solutions d'une équation différentielle ★★★★

[Corrigé]

1. Soient $a \in \mathbb{C}$ tel que $\Re(a) > 0$ et f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$, à valeurs dans $\mathbb{C}$ telle que $\lim\limits_{+\infty} f' + af = 0$. Montrer que $\lim\limits_{+\infty} f = 0$.
2. Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}_+, \mathbb{C})$ telle que $\lim\limits_{+\infty} f'' + f' + f = 0$. Montrer que $\lim\limits_{+\infty} f = 0$.
3. Démontrer que : pour tout $P \in \mathbb{C}[X]$ dont les racines sont toutes de parties réelles strictement négatives, si f est une fonction de classe $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}_+$ à valeurs dans $\mathbb{C}$ avec $n = \deg(P)$ telle que $\lim\limits_{+\infty} P(D)(f) = 0$, alors $\lim\limits_{+\infty} f = 0$.
(D représente l'opérateur de dérivation)

X.11 Inéquation différentielle

[Corrigé]

Soit f une application de classe $\mathcal{C}^2$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que $f'' + f \geq 0$. Montrer que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) + f(x+\pi) \geq 0$$

X.12 Solution 2π-périodique d'une équation différentielle

[Corrigé]

Soit f une fonction 2π-périodique de classe $\mathcal{C}^2$. Montrer que l'équation différentielle $y'' + y = f$ admet des solutions 2π-périodiques si et seulement si

$$\int_0^{2\pi} f(t)\cos(t)dt = \int_0^{2\pi} f(t)\sin(t)dt = 0$$

X.13 Superposition de solutions

[Corrigé]

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Résoudre l'équation différentielle $y'' + y = \cos(nt)$.
2. Soit $\sum\limits_{n\in\mathbb{N}} a_n$ une série absolument convergente. Résoudre l'équation différentielle

$$y'' + y = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \cos(nt)$$

X.14 Fonction de Bessel

[Corrigé]

On considère l'équation de Bessel, $(E) : xy'' + y' + xy = 0$.

1. Montrer que la fonction $J_0 : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \cos(x\sin(\theta))d\theta \end{array} \right.$ est solution de (E) (sur $\mathbb{R}$?).
2. Montrer qu'il existe une unique solution f_0 de l'équation (E) qui est développable en série entière, définie sur tout $\mathbb{R}$ et telle que $f_0(0) = 1$.
3. Soit $f :]0, a[\to \mathbb{R}$ une solution de l'équation (E).
Montrer que (f, f_0) est libre si et seulement la fonction f n'est pas bornée au voisinage de 0.
4. En déduire que $\forall x \in \mathbb{R}$, $\displaystyle\int_0^\pi \cos(x\sin(\theta))d\theta = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{4^n(n!)^2}x^n$.

X.15 Développement de la cotangente (2)

[Corrigé]

On pose pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, $f_n(x) = \sum_{k=-n}^{n} \frac{1}{x-k}$.

1. Montrer que la suite de fonction $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers une fonction f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ et donner une expression de f' sous forme d'une série de fonctions.
2. Trouver une équation différentielle vérifiée par f.
3. En déduire que $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = \pi \operatorname{cotan}(\pi x)$.

X.16 Wronskien

[Corrigé]

1. Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et deux applications p et q de I dans $\mathbb{C}$ continues. On considère deux solutions u et v de l'équation différentielle $(E) : y'' + py' + qy = 0$.
   Calculer le wronskien de u et v en fonction de sa valeur en un point a et I.
2. On veut étendre ce résultat aux systèmes linéaires. Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $A : I \to \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une fonction continue. On considère $f_1, \dots, f_n$ n solutions sur I de l'équation différentielle $(S) : Y' = AY$.
   Calculer le wronskien de $f_1, \dots, f_n$ en fonction de sa valeur en un point a de I.

X.17 Solution non bornée ★★★

[Corrigé]

Soit $p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue et intégrable. On considère l'équation $(E) : y'' + py = 0$.

1. Rappeler la définition du wronskien et son lien avec les solutions d'une équation linéaire homogène d'ordre 2.
2. Montrer que Φ' admet une limite finie ℓ en $+\infty$.
3. Montrer que $\ell = 0$.
4. En déduire que (E) admet une solution non bornée.

X.18 Principe d'entrelacement des zéros de Sturm

[Corrigé]

1. Soient p et q deux fonctions continues sur $\mathbb{R}$ telles que $p \leq q$ sur $\mathbb{R}$. Soient u et v deux fonctions de classe $\mathcal{C}^2$ telles que $u'' + pu = 0$ et $v'' + qv = 0$. On suppose que u s'annule en des réels a et b avec $a < b$ mais qu'elle n s'annule pas sur $]a, b[$.
   a. On pose le *pseudo-wronskien* $W = u'v - uv'$. Déterminer W'.
   b. En déduire que v s'annule sur $[a, b]$.
2. Application. Soient r une fonction continue sur $\mathbb{R}$, f de classe $\mathcal{C}$ sur $\mathbb{R}$ telle que $f'' + rf = 0$ et $M \in \mathbb{R}_+^*$.
   a On suppose $r \geq M^2$. Montrer que tout intervalle fermé de longueur $\frac{\pi}{M}$ contient au moins un zéro de f.
   b On suppose $r \leq M^2$. On suppose que f s'annule en des réels a et b tels que $a < b$ mais qu'elle ne s'annule pas sur $]a, b[$.
   Montrer que $b - a \geq \frac{\pi}{M}$.

X.19 Solution qui s'annule

[Corrigé]
Soit $p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$ une fonction continue non identiquement nulle. On se propose de démontrer que toutes les solutions de l'équation différentielle $y'' + py = 0$ s'annulent. Pour cela, on raisonne par l'absurde et on suppose que f est une solution ne s'annulant pas.

1. Justifier que f est de signe constant.

On supposera que $f > 0$ quitte à changer f en $-f$.

2. Justifier que f est concave.
3. En déduire que f est constante sur $\mathbb{R}$.
4. Conclure.

X.20 Solution qui s'annule une infinité de fois

[Corrigé]
Soient p une application continue périodique non identiquement nulle de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}_+$ et f une solution de l'équation différentielle $y'' + qy = 0$.
Montrer que f s'annule une infinité de fois sur $\mathbb{R}_+$.

X.21 Lemme de Grönwall

[Corrigé]

1. Soient φ, ψ et y trois fonctions continues sur un segment $[a, b]$, à valeurs positives et vérifiant l'inégalité :

$$\forall x \in [a, b], \quad y(x) \leq \psi(x) + \int_a^x y(t)\varphi(t)dt$$

Montrer que :

$$\forall x \in [a, b], \quad y(x) \leq \psi(x) + \int_a^x \psi(t)\varphi(t) \exp\left(\int_t^x \varphi(u)du\right) dt$$

2. Quelle inégalité obtient-on lorsque ψ est une fonction constante égale à $c \in \mathbb{R}_+$?

X.21.1 Application du lemme de Grönwall

Soit $q : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$, strictement positive et croissante.
Montrer que que toutes les solutions de l'équation différentielle $y'' + qy = 0$ sont bornées sur $\mathbb{R}_+$.

X.22 Théorème de Floquet

[Corrigé]
On considère un système différentiel sur $\mathbb{C}^n$, $(E) : Y' = AY$ où $A : \mathbb{R} \to \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est une fonction continue et T-périodique.

1. Montrer que (E) admet une solution V non nulle telle que :

$$\exists \lambda \in \mathbb{C}, \forall t \in \mathbb{R}, \quad V(t + T) = \lambda V(t).$$

2. On considère n solutions $V_1, \ldots, V_n$ de (E) linéairement indépendantes. En notant $M(t)$ la matrice carrée dont les vecteurs colonnes sont $V_1, \ldots, V_n$, montrer que :

$$\exists C \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}), \forall t \in \mathbb{R}, \quad M(t + T) = M(t)C$$

X.23 Méthode de Lagrange (1) ★★★

[Corrigé]
On étudie l'équation différentielle suivante sur $]0,+\infty[$,

$$(E) : xy'' + 3y' - 4x^3y = 0$$

1. Chercher une solution φ non nulle de (E) développable en série entière au voisinage de 0 à droite.
2. Terminer de résoudre l'équation par le changement de fonction inconnue $y(x) = \varphi(x)z(x)$.

X.24 Méthode de Lagrange (2)

[Corrigé]
On fixe un entier $n \geq 2$ et on introduit l'équation différentielle sur $]1,+\infty[$,

$$(E_n) : x(x-1)y'' + (1-2x)y' + n(n-1)y = 0$$

1. Chercher une solution φ de (E_n) développable en série entière en 0.
2. Résoudre (E_n) en effectuant le changement de fonction inconnue $y(x) = \varphi(x)z(x)$.
3. Déterminer les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ qui vérifient $P''|P$.

X.25 Solution de norme constante ★★★

[Corrigé]
On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de sa structure euclidienne canonique et on se donne $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que les solutions de l'équation différentielle $X' = AX$, $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ sont toutes de norme constante si et seulement si A est antisymétrique.

X.26 Préservation d'un sous-espace ★★

[Corrigé]
Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$ et F un sous-espace vectoriel de E.
Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ qui préserve F.
Montrer que si x est solution de l'équation différentielle $x' = u(x)$ et s'il existe $t_0 \in \mathbb{R}$ tel que $x(t_0) \in F$ alors x est à valeur dans F.

X.27 Equation différentielle matricielle non linéaire

[Corrigé]
Soit $A_0 \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ à spectre dans $\mathbb{R}_-$.
Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on considère le système différentiel $(E) : \begin{cases} A'(t) = A(t)^2 \\ A(0) = A_0 \end{cases}$.
Montrer que la solution $t \mapsto A(t)$ tend vers une limite finie en $+\infty$, à préciser.

X.28 Système de Lax ★★★★

[Corrigé]
Soient $A : \mathbb{R} \to \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $B : \mathbb{R} \to \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ continue telles que :

$$\forall t \in \mathbb{R},\ A'(t) = A(t)B(t) - B(t)A(t)$$

1. On suppose que B est constante. Montrer que $\mathrm{Sp}(A(t))$ ne dépend pas de t.
   Indication : on pourra étudier l'application $t \mapsto e^{-tB}Ce^{tB}$ pour une matrice $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ bien choisie.
2. justifier la dérivabilité et calculer la dérivée de l'application $t \mapsto \mathrm{Tr}(A(t)^k)$ pour $k \in \mathbb{N}^*$.
3. Montrer que $\mathrm{Sp}(A(t))$ ne dépend pas de t.

X.29 Exponentielles de matrices qui commutent ★★

[Corrigé]

Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui commutent.

On définit les applications $f_A : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ t & \longmapsto & e^{tA} \end{array} \right.$ et $g : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ t & \longmapsto & e^{t(A+B)}e^{-tB} \end{array} \right.$

1. Montrer que l'application f_A et l'application g sont solutions d'un même problème de Cauchy. En déduire une démonstration de la relation :
$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad e^{t(A+B)} = e^{tA}e^{tB}$$
2. Réciproquement, montrer que si $\forall t \in \mathbb{R}, \quad e^{t(A+B)} = e^{tA}e^{tB}$ alors A et B commutent.

X.30 Exponentielles de matrice qui commutent avec le commutateur

[Corrigé]

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

On définit les applications $\phi : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ t & \longmapsto & e^{tA}e^{tB}e^{-t(A+B)} \end{array} \right.$ et $f : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ t & \longmapsto & e^{tB}Ae^{-tB} \end{array} \right.$.

1. Montrer qu'en général $e^{A+B} \neq e^Ae^B$.

On suppose que A et B commutent avec leur commutateur $[A, B] := AB - BA$.

2. Montrer que $\forall t \in \mathbb{R}, \ f(t) = A - t[A, B]$.
3. Montrer que $\forall t \in \mathbb{R}, \ \phi'(t) = A\phi(t) - e^{tA}e^{tB}Ae^{-t(A+B)}$.
4. En déduire la relation :
$$e^Ae^B = e^{A+B+\frac{1}{2}[A,B]}$$

XI

Calcul Différentiel

XI.1 Calcul de dérivées partielles

[Corrigé]

Soit f une application de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$. Calculer les dérivées partielles des fonctions suivantes en fonction des dérivées partielles de f.

- $g(x,y) = f(y,x)$
- $g(x) = f(x,x)$
- $g(x,y) = f(y, f(x,x))$
- $g(x) = f(x, f(x,x))$

XI.2 Existence de dérivées partielles

[Corrigé]

Etudier l'existence de dérivées partielles pour les fonctions suivantes.

- $f(x,y) = \max(|x|,|y|)$
- $f(x,y) = |x| + |y|$
- $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{\sin(x^2)+\sin(y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$

XI.3 Etude d'une fonction

[Corrigé]

Soit $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$ définie par $f(x,y) = \begin{cases} (x^2+y^2)\sin\left(\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right) & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

1. Etudier la continuité de f.
2. (a) Prouver l'existence de dérivées partielles premières de f sur $\mathbb{R}^2$.
   (b) Etudier la continuité des dérivées partielles premières de f.
   (c) La fonction f est-elle de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$?

XI.4 Intégrales de Hardy (2)

[Corrigé]
Soient $a, b \in \mathbb{R}$. On pose pour $n \in \mathbb{N}^*$

$$I_n(a,b) = \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{(a\cos^2 x + b\sin^2 x)^n}$$

1. Calculer I_1.
2. Justifier que I_n est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2$.
3. Montrer que $\dfrac{\partial I_n}{\partial a}(a,b) + \dfrac{\partial I_n}{\partial b}(a,b) = -nI_{n+1}(a,b)$
4. En déduire l'expression $I_{n+1}(a,b) = \dfrac{(-1)^n\pi}{2}\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{-1/2}{k}\binom{-1/2}{n-k}a^{-1/2-k}b^{-1/2+n-k}$.

XI.5 Une équation fonctionnelle ★★

[Corrigé]
Le but de cet exercice est de déterminer les fonctions f de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ solutions de l'équation :

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2, f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y) \tag{XI.1}$$

1. Déterminer les solutions constantes de (XI.1).
2. Soit f une solution non constamment nulle de (XI.1).
   (a) Montrer que $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$.
   (b) Montrer que f est une fonction paire.
3. Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$. on considère la fonction F définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2, F(x,y) = f(x+y) + f(x-y)$$

   (a) Justifier que F est de classe $\mathcal{C}^2$.
   (b) Calculer les dérivées partielles secondes de F.
   (c) On suppose que f est une solution non constamment nulle de (XI.1). Des expressions des dérivées partielles de F, déduire que f vérifie une équation différentielle de la forme $z'' - \alpha z = 0$.
   (d) Donner les solutions de l'équation différentielle $z'' - \alpha z = 0$ suivant les valeurs de α.
4. Déterminer toutes les solutions de (XI.1).

XI.6 Application linéaire

[Corrigé]
Soit $f : E \mapsto F$ une fonction différentiable en 0 vérifiant $f(\lambda x) = \lambda f(x)$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ et tout $x \in E$.
Montrer que l'application f est linéaire.

XI.7 Opérateurs vectoriels

[Corrigé]
Pour $f = (f_1, \dots, f_n)$ un *champ vectoriel* différentiable, c'est à dire une application de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^n$ différentiable, on définit la **divergence** de f par :

$$\operatorname{div}(f) = \sum_{i=1}^{n} \partial_i f_i$$

Pour $f = (f_1, f_2, f_3)$ un champ vectoriel de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ différentiable, on définit le **rotationnel** de f par :

$$\operatorname{rot}(f) = \left(\frac{\partial^2 f_z}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 f_y}{\partial z^2}, \frac{\partial^2 f_x}{\partial z^2} - \frac{\partial^2 f_z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 f_y}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 f_x}{\partial y^2}\right)$$

Pour f une application de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$, on définit le **laplacien** de f par :

$$\Delta f = \sum_{i=1}^{n} \partial_i^2 f$$

1. Soit f une application de classe $\mathcal{C}^2$ de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$. Montrer que
$$\operatorname{div}(\nabla f) = \Delta f$$
2. Soit f une application de classe $\mathcal{C}^2$ de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}$. Montrer que
$$\operatorname{rot}(\nabla f) = 0$$
3. Soit $f = (f_x, f_y, f_z)$ une application de classe $\mathcal{C}^2$ de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$. Montrer que
$$\operatorname{rot}(\operatorname{rot} f) = \nabla(\operatorname{div} f) - \Delta f_x - \Delta f_y - \Delta f_z$$

XI.8 Laplacien en polaires

[Corrigé]

Soit $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$. On appelle *laplacien* de f l'application $\Delta f = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}$.
Donner une expression du laplacien en coordonnées polaires.

XI.9 Fonction harmonique

[Corrigé]

Soit U un ouvert connexe par arcs de $\mathbb{R}^n$. On dit qu'une fonction f de classe $\mathcal{C}^2$ sur U à valeurs dans $\mathbb{R}$ est harmonique si $\Delta f = 0$ sur U.
Montrer que si f et f^2 sont harmoniques sur U, alors f est constante sur U.

XI.10 Mines ponts MP 2016

[Corrigé]

On se donne $R \in \mathbb{R}_+^*$ et on définit $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 < R^2\}$. Soit f une fonction harmonique sur U. On définit également

$$F : \left\{ \begin{array}{ccc}]-R, R[\times\mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (r, \theta) & \longmapsto & f(r\cos(\theta), r\sin(\theta)) \end{array} \right.$$

1. Trouver une relation entre les dérivées partielles de F et f.
2. Soit $n \in \mathbb{Z}$. On définit
$$\varphi_n : \left\{ \begin{array}{ccc}]-R, R[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ r & \longmapsto & \displaystyle\int_0^{2\pi} F(r, \theta) e^{-in\theta} d\theta \end{array} \right.$$
Trouver une équation différentielle vérifiée par φ_n et la résoudre. En déduire φ_n.

XI.11 Différentielle de l'exponentielle matricielle

[Corrigé]

Soit $M : \mathbb{R} \mapsto \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dérivable telle que pour tout $(s, t) \in \mathbb{R}^2$, $M(s)$ et $M(t)$ commutent.

1. Justifier que $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est différentiable en 0 et calculer sa différentielle en 0.
2. En déduire que $\varphi : t \in \mathbb{R} \mapsto \exp(M(t))$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que :
$$\forall t \in \mathbb{R}, \varphi'(t) = M'(t)\exp(M(t)) = \exp(M(t))M'(t)$$

XI.12 Différentielle de la norme euclidienne

[Corrigé]
Soit $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien. On pose $f : x \in E \mapsto \|x\|^2$ où $\|.\|$ désigne la norme associée à $\langle\ ,\ \rangle$.
Montrer que f est différentiable sur E et calculer la différentielle de f en tout point $a \in E$.

XI.13 Différentielle de l'inversion matricielle

[Corrigé]
On considère $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ muni d'une norme $\|.\|$ sous-multiplicative.

1. Soit $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\|H\| < 1$. Montrer que $I_n - H$ est inversible, d'inverse $\sum_{n=0}^{+\infty} H^n$.
2. Montrer que $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ est ouvert dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
3. Soit $f : M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \mapsto M^{-1}$.
   a. Montrer que f est différentiable en I_n et que $df(I_n) \cdot H = -H$.
   b. Montrer que f est différentiable en tout point de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. On remarquera que $(M+H)^{-1} = (M(I_n + M^{-1}H))^{-1}$.

XI.14 Gradient et différentielle du déterminant

[Corrigé]
On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de son produit scalaire usuel $(A, B) \mapsto \mathrm{Tr}(A^\top B)$. Déterminer le gradient et la différentielle de l'application $\det : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto \det(M)$.

XI.15 Espace tangent aux matrices orthogonales en l'identité

[Corrigé]
Montrer que l'ensemble des vecteurs tangents à l'ensemble des matrices orthogonales en la matrice identité $T_{I_n}(\mathcal{O}_n(\mathbb{R}))$ est l'ensemble des matrices antisymétriques réelles.

XI.16 Vecteur propre d'un endomorphisme auto-adjoint

[Corrigé]
Soit f un endomorphisme auto-adjoint d'un espace euclidien E de dimension finie non nulle.
Pour tout $x \in E \setminus \{0\}$, on pose $\varphi(x) = \dfrac{\langle f(x), x\rangle}{\|x\|^2}$
On n'utilisera pas le théorème spectral dans tout cet exercice.

1. Calculer le gradient de φ en tout point de $E \setminus \{0\}$.
2. Montrer que $x \in E \setminus \{0\}$ est un vecteur de f si et seulement $\nabla\varphi(x) = 0$.
3. Montrer que φ admet un maximum sur $E \setminus \{0\}$.
4. En déduire que f admet un vecteur propre.

XI.17 Quotient de Rayleigh

[Corrigé]
On munit $\mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne canonique.
Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique et $f_A : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ définie par $f_A(x) = x^\top Ax$.

1. Calculer les dérivées partielles de f_A et exprimer $\nabla f_A(x)$ en fonction de Ax pour tout $x \in \mathbb{R}^n$.
2. Pour $x \in \mathbb{R}^n$ non nul, on introduit le *quotient de Rayleigh* : $R(x) = \dfrac{x^\top Ax}{x^\top x}$.
   Montrer que x est vecteur propre de A, si et seulement si $\nabla R(x) = 0$.

XI.18 Différentielle du déterminant

[Corrigé]

1. Montrer que l'application det : $A \mapsto \det(A)$ est différentiable sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. Calculer sa différentielle en commençant par évaluer ses dérivées partielles.
3. On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ du produit scalaire canonique.
   Déterminer le vecteur gradient de det en A

XI.19 Equation de d'Alembert

[Corrigé]
Soit $c \neq 0$. chercher les solutions de classe $\mathcal{C}^2$ de l'équation aux dérivées partielles suivantes :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 f}{\partial t^2}$$

à l'aide d'un changement de variable de la forme $u = x + at, v = x + bt$.

XI.20 Utilisation des extrema liés (1)

[Corrigé]
Soit $f : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto xy$. Déterminer le minimum et le maximum éventuels de f sur $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 = 1\}$.

XI.21 Utilisation des extrema liés (2)

[Corrigé]
Etudier mes extrema globaux de $f : (x, y) \mapsto 2x - y$ sous la contrainte $g(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 1 = 0$.

XI.22 Utilisation des extrema liés (3)

[Corrigé]
Montrer que pour tous les $(x, y, z) \in (\mathbb{R}_+)^3$ tels que $x + y + z = \dfrac{\pi}{2}$,

$$\sin(x)\sin(y)\sin(z) \leq \frac{1}{8}$$

XI.23 Sinus complexe

[Corrigé]
On pose : $\forall z \in \mathbb{C},\ \sin(z) = \dfrac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$.

1. Exprimer $|\sin(z)|^2$ en fonction de $\mathrm{Re}(z)$ et $\mathrm{Im}(z)$.
2. Déterminer $\max\limits_{|z|\leq 1} |\sin(z)|$.

XI.24 Entropie

[Corrigé]
Soit un entier $n \geq 2$. On pose

$$\forall (x_1, \ldots, x_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^n, f(x_1, \ldots, x_n) = -\sum_{i=0}^{n} x_i \ln(x_i)$$

On note

$$C = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^n, \sum_{i=0}^{n} x_i = 1 \right\}$$

1. Justifier que f admet un maximum sur C.
2. Déterminer la valeur de ce maximum et le point où il est atteint.

XI.25 Fonction convexe sur $\mathbb{R}^n$

[Corrigé]
On considère une fonction $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$.

1. Pour tous $x, y \in \mathbb{R}^n$, soit $\varphi_{x,y} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ la fonction définie par

   $$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \varphi_{x,y}(t) = f(x + t(y - x))$$

   Montrer que f est convexe si seulement si pour tous $x, y \in \mathbb{R}^n$, la fonction $\varphi_{x,y}$ est convexe.
2. On suppose que f est différentiable sur $\mathbb{R}^n$. Montrer que pour tout $x, y \in \mathbb{R}^n$, la fonction $\varphi_{x,y}$ est dérivable, et montrer que

   $$\forall t \in \mathbb{R}, \varphi'_{x,y}(t) = \langle \nabla f(x + t(y - x)), y - x \rangle$$

3. En déduire que si f est différentiable sur $\mathbb{R}^n$, alors f est convexe si et seulement si pour tous $x, y \in \mathbb{R}^n$,

   $$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle$$

4. Montrer que si $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ est différentiable sur R^n, alors f est convexe si et seulement pour tous $x, y \in \mathbb{R}^n$,

   $$\langle \nabla f(y) - \nabla f(x), y - x \rangle \geq 0$$

XI.26 Chemin le plus court entre deux points

[Corrigé]
On utilisera les résultats de XI.25.
Soient $a, b, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, avec $a < b$. On pose $F = \{f \in \mathcal{C}^1([a, b]),\ f(a) = \alpha,\ f(b) = \beta\}$.
Montrer que $\min_{f \in F} \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$ est atteint par une unique fonction affine de F.

XI.27 Fonction homogène

[Corrigé]
Soient $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. On dit que f est *homogène de degré* α si

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \forall t > 0, f(tx, ty) = t^\alpha f(x, y)$$

1. Montrer que f est homogène de degré α si et seulement si

   $$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \alpha f(x, y)$$

2. Montrer que si f est de degré α, les dérivées partielles de f sont également homogènes et préciser leurs degré.

XI.28 Problème de Dirichlet et principe faible du maximum

[Corrigé]

Soient U un ouvert borné non vide de $\mathbb{R}^n$. On note $\partial U = \overline{U} \setminus \mathring{U}$ la frontière de U. On se donne une fonction f à valeurs réelles continue sur $\overline{U}$ et de classe $\mathcal{C}^2$ sur U. On pose alors :

$$\forall x \in U, \Delta f(x) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x)$$

1. Montrer que f admet un maximum sur $\overline{U}$. On note alors $\overline{x}$ un point de $\overline{U}$ où ce maximum est atteint.
2. On suppose que $\Delta f > 0$ sur U. Montrer que $\overline{x} \in \partial U$.

A partir de maintenant, on suppose $\Delta f = 0$ sur U.

3. On se donne $\varepsilon > 0$ et on pose :
$$\forall x \in \overline{U}, f_\varepsilon(x) = f(x) + \varepsilon \sum_{i=1}^{n} x_i^2$$
Montrer que f_ε est continue sur $\overline{U}$ de classe $\mathcal{C}^2$ sur U et que $\Delta f_\varepsilon > 0$ sur U.
4. En déduire que le maximum de f sur $\overline{U}$ est atteint sur ∂U.
5. Soient f_1 et f_2 deux fonctions continues sur $\overline{U}$, de classe $\mathcal{C}^2$ sur U et vérifiant $\Delta f_1 = \Delta f_2$ sur U. On supposera en outre que $f_1 = f_2$ sur ∂U. Montrer que $f_1 = f_2$ sur U.

XI.29 La méthode des moindres carrés

[Corrigé]

Etant donné un nuage de points $(x_i, y_i)_{0 \leq i \leq n}$ la droite des moindres carrés (ou droite de régression linéaire) est la droite d'équation $y = mx + p$ qui minimise la quantité :

$$F(m,p) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - mx_i - p)^2$$

1. Démontrer que (m,p) est un couple où ce minimum est atteint, alors (m,p) est solution du système :
$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{n} (y_i - mx_i - p) = 0 \\ \sum_{i=1}^{n} x_i(y_i - mx_i - p) = 0 \end{cases}$$
2. On note $\overline{x}$ et $\overline{y}$ les valeurs moyennes respectives de (x_i) et (y_i). Démontrer que si $\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2 \neq 0$ alors il existe au plus une droite des moindres carrés, avec
$$m = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})}{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2}$$
3. On veut démontrer prouver l'exister d'une droite des moindres carrés, toujours sous la condition $\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2 \neq 0$
   a. Pourquoi suffit-il de prouver que $\lim_{\|(\|m,p) \to +\infty} F(m,p) = +\infty$?
   b. Démontrer que
   $$F(m,p) = \sum_{i=1}^{n} u_i^2(m,p) + v(m,p) + c$$
   où $u_1, \ldots, u_n, v$ sont des formes linéaires sur $\mathbb{R}^2$ et $c \in \mathbb{R}$.

c. Démontrer que le rang de $(u_1, \dots u_n)$ est 2.

d. On suppose que $(u_1, \dots, u_n)$ sont indépendantes. Justifier que l'on peut écrire :

$$F(m,p) = u_1^2(m,p) + au_1(m,p) + u_2^2(m,p) + bu_2(m,p) + c + R(m,p)$$

où $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $R(m,p) \geq 0$.

e. Justifier que $\|(m,p)\| \to +\infty \Longrightarrow |u_1(m,p)| + |u_2(m,p)| \to +\infty$.

f. Conclure.

XII Divers

XII.1 Développement décimal propre d'un réel ★★★

[Corrigé]

Démontrer que tout réel $x \in [0,1[$ s'écrit de manière unique $x = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{10^n}$ avec $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite à valeurs dans $[\![0;9]\!]$ qui ne stationne pas à 9.

XII.1.1 Une caractérisation des rationnels ★★★

[Corrigé]

Soit $x \in [0,1[$. Montrer que $x \in \mathbb{Q}$ si et seulement si son développement décimal propre est périodique à partir d'un certain rang.

XII.2 Distribution du premier chiffre des puissances de 2 ★★★

[Corrigé]

Soit $i \in [\![1;9]\!]$. On note $N_i(n)$ le nombre d'éléments de $\{2, 2^2, \dots, 2^n\}$ dont le premier chiffre dans l'écriture décimale est i. On note pour $x \in \mathbb{R}$, $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ la partie fractionnaire de x.

1. Montrer qu'en notant $\theta = \log_{10}(2)$, $N_i(n)$ est exactement le nombre d'entier $k \in [\![1;n]\!]$ tels que $\{k\theta\}$ est dans $[\log_{10}(i), \log_{10}(i+1)[$.
2. Montrer que la suite $(\{k\theta\})_{k\in\mathbb{N}^*}$ est dense dans $[0,1]$.
3. En déduire qu'il existe une infinité de puissances de 2 dont le premier chiffre est i.

XII.3 Série de Engel

[Corrigé]

Soit $x \in]0,1]$.

1. Montrer qu'il existe une unique suite $(q_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'entiers naturels supérieurs ou égaux à 2 telle que $x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{q_0 q_1 \dots q_n}$.
2. Montrer que x est rationnel si et seulement si la suite $(q_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est stationnaire.
   a. En déduire que $e, \mathrm{ch}(1)$ et $\mathrm{sh}(1)$ sont irrationnels.
   b. En déduire que $e^{\sqrt{2}}$, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^{n^2}}$ et $\sqrt[n]{e}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$ sont irrationnels.

XII.4 Lemme d'Hadamard ★★★★

[Corrigé]

1. Soient $n \geq 1$ et $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Démontrer l'équivalence des propositions suivantes :
   — $f(0) = f'(0) = \cdots = f^{(n-1)}(0) = 0$
   — $\exists g \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}),\ \forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = x^n g(x)$.
2. Soient $n \geq 1$ et $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$. Démontrer l'équivalence des propositions suivantes :
   — $f(0) = 0$ et $df(0) = 0$
   — $\exists (g_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}),\ \forall x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n,\ f(x) = \sum_{1 \leq i,j \leq n} x_i x_j g_{i,j}(x)$.

   On pourra écrire la formule de Taylor reste intégral pour $g : t \mapsto f(tx)$.

XII.5 Intégrale des puissances d'une fonction ★★★

[Corrigé]
Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ continue, positive et non identiquement nulle.
On pose pour $n \in \mathbb{N},\ I_n = \displaystyle\int_0^1 f(t)^n dt$.

1. Rappeler la définition du rayon de convergence d'une série entière.
2. Calculer le rayon de convergence R de la série entière $\displaystyle\sum_{n \in \mathbb{N}} I_n x^n$. On note S sa somme.
3. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ I_n^2 \leq I_{n-1} I_{n+1}$.
4. En déduire que $I_{n+1} \underset{n \to +\infty}{\sim} \|f\|_\infty I_n$.
5. Montrer que $\forall x \in]-R, R[,\ S(x) = \displaystyle\int_0^1 \frac{1}{1 - x f(t)} dt$.
6. En déduire un calcul de $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \int_0^{\pi/2} \sin^n(t) dt$.

XII.6 Lemme de Hochschild ★★★★★

[Corrigé]
On note $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et pour tout $f \in E$, $V_f = \text{Vect}(x \mapsto f(x + a),\ a \in \mathbb{R})$. Déterminer les fonctions $f \in E$ telles que V_f soit de dimension finie.
On pourra commencer par montrer que si V_f est de dimension finie alors il est stable par dérivation.

XII.7 Théorème de Müntz ★★★★★

[Corrigé]
On admettra ou démontrera les résultats sur le déterminant de Gram (cf. IV-7 tome Algèbre) et sur le déterminant de Cauchy (cf. IV-8 tome Algèbre).

Soit $(\mathcal{C}, \|\cdot\|_2)$ l'espace des fonctions continues sur $[0,1]$, muni de sa norme euclidienne usuelle $\|\cdot\|_2 : f \mapsto \sqrt{\displaystyle\int_0^1 f^2}$.

Soit $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite strictement croissante de réels strictement positifs.
Démontrer l'équivalence des deux affirmations suivantes :

— $V := \text{Vect}(x \mapsto x^{\alpha_n},\ n \in \mathbb{N})$ est dense dans $\mathcal{C}$.

— La série $\displaystyle\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{\alpha_n}$ diverge.

XIII

Correction

XIII.1 Correction Suite et série numérique

XIII.1.1 Lemme de Cesàro ★★

[Enoncé]

Si $\ell \in \mathbb{R}$ alors $u_n - \ell \underset{n\to+\infty}{=} o(1)$.

Or $\sum_{n\geq 0} 1$ diverge et $(1)_{n\in\mathbb{N}}$ est de signe constant APCR donc

$$\sum_{k=0}^{n}(u_k-\ell) = \sum_{k=0}^{n} u_k - (n+1)\ell \underset{n\to+\infty}{=} o\left(\sum_{k=0}^{n} 1\right) = o(n+1)$$

Ainsi,

$$\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} u_k \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell$$

Supposons que $\ell = +\infty$.

Fixons $A \in \mathbb{R}_+^*$. $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0,\ u_n \geq A+1$.

Alors pour tout $n > n_0$,

$$\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} u_k = \frac{1}{n+1}\left(\sum_{k=0}^{n_0} u_k + \sum_{k=n_0+1}^{n} u_k\right) \geq \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n_0} u_k + \frac{(n-n_0)(A+1)}{n+1}$$

Or $\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n_0} u_k + \frac{(n-n_0)(A+1)}{n+1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} A+1$.

Donc $\exists n_1 \in \mathbb{N},\ \forall n > n_1,\ \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n_0} u_k + \frac{(n-n_0)(A+1)}{n+1} \geq A$.

Ainsi $\forall n > \max(n_0, n_1),\ \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} u_k \geq A$.

Donc $\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} u_k \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$.

Par le même raisonnement, si $\ell = -\infty$ alors $\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} u_k \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} -\infty$.

Lemme de l'escalier ★

[Enoncé]

On remarque que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}(u_{k+1}-u_k) = \frac{1}{n}(u_n - u_0)$

Et d'après le lemme de Cesàro : $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=0}^{n-1}(u_{k+1}-u_k) = \ell$

Ainsi $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n}(u_n - u_0) = \ell$.
Par conséquent, $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \ell n$.

XIII.1.2 Théorèmes Taubériens d'Hardy ★

[Enoncé]
Posons pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = (-1)^n$.
$\forall n \in \mathbb{N}$, $\begin{cases} \sigma_{2n} = \dfrac{1}{2n+1} \\ \sigma_{2n+1} = 0 \end{cases}$. Donc $\sigma_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ alors que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ diverge.

Hardy Faible ★★

Soit $n \in \mathbb{N}$.
$\sum\limits_{k=0}^{n} k\varepsilon_k = \sum\limits_{k=1}^{n} k(u_{k+1}-u_k) = \sum\limits_{k=1}^{n}(ku_{k+1}-(k-1)u_k) - \sum\limits_{k=1}^{n} u_k = nu_{n+1} - \sum\limits_{k=1}^{n} u_k$.
Donc $(n+1)\sigma_n - u_0 = \sum\limits_{k=1}^{n} u_k = nu_{n+1} - \sum\limits_{k=1}^{n} k\varepsilon_k$
d'où $\forall n \geq 2$, $u_n = \dfrac{n}{n-1}\sigma_{n-1} + \dfrac{1}{n-1}\sum\limits_{k=0}^{n-1} k\varepsilon_k - \dfrac{u_0}{n-1}$.
Or, $n\varepsilon_n \underset{n\to+\infty}{=} o(1)$ et $\sum\limits_{n\in\mathbb{N}} 1$ diverge donc $\sum\limits_{k=0}^{n-1} k\varepsilon_k \underset{n\to+\infty}{=} o\left(\sum\limits_{k=0}^{n-1} 1\right) \underset{n\to+\infty}{=} o(n)$.
Ainsi, $u_n \underset{n\to+\infty}{=} \ell + o(1)$, c'est à dire $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell$.

Hardy Fort ★★★★

1.

$$\begin{aligned}\sum_{k=n}^{m-1}(m-k)\varepsilon_k &= \sum_{k=n}^{m-1}(m-k)(u_{k+1}-u_k) \\ &= \sum_{k=n}^{m-1}[(m-k)u_{k+1} - (m-(k-1))u_k] + \sum_{k=n}^{m-1} u_k \\ &= u_m - (m-n+1)u_n + \sum_{k=n}^{m-1} u_k \\ &= \sum_{k=n+1}^{m} u_k - (m-n)u_n\end{aligned}$$

2. Soit m et n deux entiers supérieurs que 2.
$\left|\dfrac{(m+1)\sigma_m - (n+1)\sigma_n}{m-n} - u_n\right| = \left|\dfrac{1}{m-n}\sum\limits_{k=m+1}^{n} u_k - u_n\right| = \left|\sum\limits_{k=n}^{m-1}\dfrac{m-k}{m-n}\varepsilon_k\right| \leq \sum\limits_{k=n}^{m-1}\dfrac{m-k}{m-n}|\varepsilon_k|$.
Or $\varepsilon_n \underset{n\to+\infty}{=} o\left(\dfrac{1}{n}\right)$ donc $\exists N \in \mathbb{N}$, $\exists C \in \mathbb{R}_+^*$, $\forall n \geq N$, $|n\varepsilon_n| \leq C$.
Donc $\forall n \geq N$

$$\left|\frac{(m+1)\sigma_m - (n+1)\sigma_n}{m-n} - u_n\right| \leq \frac{C}{m-n}\sum_{k=n}^{m-1}\frac{m-k}{k} \leq \frac{C}{m-n}\sum_{k=n}^{m-1}\frac{m-n}{k} = C\sum_{k=n}^{m-1}\frac{1}{k}$$

Or $\forall k \geq 2$

$$\forall t \in [k-1,k],\ \frac{1}{k} \leq \frac{1}{t} \implies \forall k \geq 2,\ \frac{1}{k} = \int_{k-1}^{k}\frac{dt}{k} \leq \int_{k-1}^{k}\frac{dt}{t} = \ln(k) - \ln(k-1)$$

Ainsi $\forall n \geq N, \left|\dfrac{(m+1)\sigma_m - (n+1)\sigma_n}{m-n} - u_n\right| \leq C\sum_{k=n}^{m-1}(\ln(k)-\ln(k-1)) = C\ln\left(\dfrac{m-1}{n-1}\right)$.
Par conséquent si $n \geq N$ et $m < n$ sont deux entiers,

$$\begin{aligned}
|u_n - \ell| &\leq \left|u_n - \frac{(m+1)\sigma_m - (n+1)\sigma_n}{m-n}\right| + \left|\frac{(m+1)\sigma_m - (n+1)\sigma_n}{m-n} - \ell\right| \\
&\leq C\ln\left(\frac{m-1}{n-1}\right) + \frac{m+1}{m-n}\left|\sigma_m - \frac{n+1}{m+1}\sigma_n - \frac{m-n}{m+1}\ell\right| \\
&\leq C\ln\left(\frac{m-1}{n-1}\right) + \frac{m+1}{m-n}\left|\sigma_m - \ell + \frac{n+1}{m+1}(\ell - \sigma_n)\right| \\
&\leq C\ln\left(\frac{m-1}{n-1}\right) + \frac{m+1}{m-n}(|\sigma_m - \ell| + |\sigma_n - \ell|)
\end{aligned}$$

3. Fixons $\varepsilon > 0$. Soit $\alpha > 1$. On prend $m = 1 + \lfloor \alpha n \rfloor > \alpha n > n$ dans l'inéquation précédente :
$\forall n \geq N,\ |u_n - \ell| \leq C\ln\left(\dfrac{\lfloor \alpha n \rfloor}{n-1}\right) + \dfrac{\lfloor \alpha n \rfloor + 2}{1 + \lfloor \alpha n \rfloor - n}(|\sigma_{1+\lfloor \alpha n \rfloor} - \ell| + |\sigma_n - \ell|)$.
Par définition de la partie entière, $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ n\alpha - 1 < \lfloor n\alpha \rfloor \leq n\alpha$ Donc $\lfloor n\alpha \rfloor \underset{n\to+\infty}{\sim} n\alpha$.
Ainsi par composition de limite, $\ln\left(\dfrac{\lfloor n\alpha \rfloor}{n-1}\right) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ln(\alpha)$.
Aussi $1 + \lfloor n\alpha \rfloor \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$ donc $|\sigma_{1+\lfloor n\alpha \rfloor} - \ell| \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.
Puis, $\dfrac{\lfloor n\alpha \rfloor + 2}{1 + \lfloor n\alpha \rfloor - n} \underset{n\to+\infty}{=} \dfrac{\alpha n + o(n) + 2}{1 + \alpha n - n + o(n)} \underset{n\to+\infty}{=} \dfrac{\alpha n + o(n)}{(\alpha-1)n + o(n)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \dfrac{\alpha}{\alpha - 1}$.
Donc par produit $\dfrac{\lfloor \alpha n \rfloor + 2}{1 + \lfloor \alpha n \rfloor - n}(|\sigma_{1+\lfloor \alpha n \rfloor} - \ell| + |\sigma_n - \ell|) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.
On sait alors qu'il existe $M \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \geq M, \ln\left(\frac{\lfloor \alpha n \rfloor}{n-1}\right) \leq \ln(\alpha) + \frac{\varepsilon}{4C} \text{ et } \frac{\lfloor \alpha n \rfloor + 2}{1 + \lfloor \alpha n \rfloor - n}(|\sigma_{1+\lfloor \alpha n \rfloor} - \ell| + |\sigma_n - \ell|) \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

Ainsi, $\forall n \geq \max(M, N),\ |u_n - \ell| \leq C\left(\ln(\alpha) + \dfrac{\varepsilon}{4C}\right) + \dfrac{\varepsilon}{2}$.
Enfin, on prend $\alpha = 1 + \dfrac{\varepsilon}{4C} > 1$ et on utilise $\ln\left(1 + \dfrac{\varepsilon}{4C}\right) \leq \dfrac{\varepsilon}{4C}$. on obtient :

$$\forall n \geq \max(M, N),\ |u_n - \ell| \leq \varepsilon$$

C'est à dire $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell$.

XIII.1.3 Série harmonique ★★★

[Enoncé]

1. <u>Première méthode :</u> Sommation de relations de comparaisons
On remarque que $\ln(n+1) - \ln(n) = \ln\left(1 + \dfrac{1}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \dfrac{1}{n}$.
$(\ln(n+1) - \ln(n))_{n\in\mathbb{N}^*}$ est de signe constant APCR et $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} \ln(n+1) - \ln(n)$ diverge puisque de même nature que la suite $(\ln n)_{n\in\mathbb{N}^*}$.
Donc $H_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \ln n$.

<u>Seconde méthode :</u> Comparaison série-intégrale

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned}
&\forall t \in [n, n+1],\ \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{t} \leq \frac{1}{n} \\
\implies &\int_n^{n+1} \frac{dt}{n+1} = \frac{1}{n+1} \leq \int_n^{n+1} \frac{dt}{t} \leq \frac{1}{n} = \int_n^{n+1} \frac{dt}{n} \\
\implies &\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k+1} \leq \sum_{k=1}^{n-1} \ln(k+1) - \ln(k) \leq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} \\
\implies &H_n - 1 \leq \ln n \leq H_n - \frac{1}{n} \\
\implies &\ln n + \frac{1}{n} \leq H_n \leq \ln n + 1
\end{aligned}$$

Or, $\ln n + \frac{1}{n} \underset{n\to+\infty}{\sim} \ln n \underset{n\to+\infty}{\sim} \ln n + 1$. Donc $H_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \ln n$.

2. Fixons un entier $n \geq 2$.

$$v_n - v_{n-1} = \frac{1}{n} + \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{n} - \frac{1}{n} = 0$$

par l'inégalité de convexité classique du ln.
De plus, la comparaison série intégrale donne $v_n \in [0, 1]$.
$(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est décroissante et minorée, d'après le théorème de la limite monotone, elle converge.
On peut donc écrire $H_n \underset{n\to+\infty}{=} \gamma + \ln n + o(\ln n)$ où γ est appelée constante d'Euler.

3. La suite $(v_n - v_{n-1})_{n\geq 2}$ est convergente et de signe constant. On peut alors penser à chercher un équivalent du reste de la série $\sum_{n\geq 2} v_n - v_{n-1}$.
On a $v_n - v_{n-1} = \frac{1}{n} + \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{=} \frac{1}{n} - \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} -\frac{1}{2n^2}$.
Donc,

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k - v_{k-1} = \gamma - v_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \sum_{k=n+1}^{+\infty} -\frac{1}{2k^2} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{2} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k}\right) = -\frac{1}{2(n+1)} \underset{n\to+\infty}{\sim} -\frac{1}{2n}$$

On en déduit $v_n \underset{n\to+\infty}{=} \gamma + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.
Et finalement,

$$H_n \underset{n\to+\infty}{=} \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

4. Sur le même principe on calcule :

$$\begin{aligned}
w_n - w_{n-1} &= v_n - v_{n-1} + \frac{1}{2n-2} - \frac{1}{2n} \\
&\underset{n\to+\infty}{=} -\frac{1}{2n^2} - \frac{1}{3n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) + \frac{1}{2n(n-1)} \\
&\underset{n\to+\infty}{=} \frac{1}{2n^2(n-1)} - \frac{1}{3n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \\
&\underset{n\to+\infty}{=} \frac{2+n}{6n^3(n-1)} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \\
&\underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{6n^3}
\end{aligned}$$

la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*} = \left(\frac{1}{6n^3}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est positive et $\sum_{n\geq 2} u_n$ converge donc par comparaison de séries convergentes,
$\sum_{k=n+1}^{+\infty} w_k - w_{k-1} = \left(\lim_{k\to+\infty} w_k\right) - w_n = -w_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{6n^3}$.

Or $\frac{1}{n^3} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{n+1/2}{n^2(n+1)^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}\right)$ donc :

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{6k^3} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{12} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+1)^2}\right) = \frac{1}{12(n+1)^2} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{12n^2}$$

Ainsi, $w_n \underset{n\to+\infty}{\sim} -\frac{1}{12n^2}$ puis :

$$H_n \underset{n\to+\infty}{=} \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

5. On écrit $H_n = \ln n + \gamma + \varepsilon_n$ avec $\varepsilon_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.
Par définition de k_n on a :
$$\ln(k_n) + \gamma + \varepsilon_{k_n} \geq n \text{ et } \ln(k_n - 1) + \gamma + \varepsilon_{k_n - 1} < n$$
Donc on a :
$$e^{n-\gamma-\varepsilon_{k_n}} \leq k_n < 1 + e^{n-\gamma-\varepsilon_{k_n-1}}$$
Or $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ H_n \leq n$ donc $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ k_n \geq n$ d'où $k_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$.
Ainsi $k_n \underset{n\to+\infty}{\sim} e^{n-\gamma}$ d'où $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{k_{n+1}}{k_n} = e$.

XIII.1.4 Suite récurrente (1) ★★★

[Enoncé]

1. $u_1 = \sin(u_0) \in [-1,1]$ et $\sin([-1,1]) \subset [-1,1]$ donc $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bien définie et est bornée.
Tout d'abord, si $u_1 = 0$ alors $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = 0$.
De plus $\sin(]0,1]) \subset]0,1]$ et sin est impaire on peut donc supposer, quitte à étudier $(-u_n)$, que $u_1 \in]0,1]$.
$\forall x \in \mathbb{R}_+,\ \sin(x) \leq x \implies \forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_{n+1} = \sin(u_n) \leq u_n$.
(u_n) est décroissante et minorée, d'après le théorème de la limite monotone, (u_n) converge. Notons $L = \lim\limits_{n\to+\infty} u_n$
D'une part, sin est continue en L donc $\sin(u_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \sin(L)$. D'autre part $(\sin(u_n)) = (u_{n+1})$ est une suite extraite de (u_n) donc $\sin(u_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} L$. Par unicité de la limite, $L = \sin(L)$.
Posons $f : x \mapsto x - \sin(x)$. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R},\ f'(x) = 1 - \cos(x) \geq 0$. De plus f' ne s'annule qu'en des points isolés (pour $x \in 2\pi\mathbb{Z}$) donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. f étant continue et strictement monotone sur $\mathbb{R}$, elle est injective sur $\mathbb{R}$. Ainsi comme $f(L) = f(0)$, on a $L = 0$.
Cherchons $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $(u_{n+1}^\alpha - u_n^\alpha)$ converge en utilisant le DL de sin en 0.

$$u_{n+1}^\alpha - u_n^\alpha \underset{n\to+\infty}{=} u_n^\alpha \left[\left(1 - \frac{u_n^2}{6} + \mathcal{O}\left(u_n^2\right)\right)^\alpha - 1\right] \underset{n\to+\infty}{=} u_n^\alpha \left[1 - \alpha\frac{u_n^2}{6} + \mathcal{O}\left(u_n^2\right) - 1\right] \underset{n\to+\infty}{=} -\frac{\alpha}{6} u_n^{\alpha+2} + \mathcal{O}\left(u_n^{\alpha+2}\right).$$

On choisit alors $\alpha = -2$ et on a $u_{n+1}^{-2} - u_n^{-2} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{3}$. $\sum\limits_{n\in\mathbb{N}} \frac{1}{3}$ diverge et $\left(\frac{1}{3}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ est de signe constant APCR donc $\sum\limits_{k=0}^{n-1} \left(u_{k+1}^{-2} - u_k^{-2}\right) = \frac{1}{u_n^2} - \frac{1}{u_0^2} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{n}{3} = \sum\limits_{k=0}^{n-1} \frac{1}{3}$. Or $\frac{1}{u_n^2} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$ donc $\frac{1}{u_n^2} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{u_n^2} - \frac{1}{u_0^2}$.
On en déduit $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{\frac{3}{n}}$. Si $u_1 < 0$ on a alors $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} -\sqrt{\frac{3}{n}}$.

2. On reprend le calcul de $u_{n+1}^{-2} - u_n^{-2}$ en poussant le DL un ordre plus loin : $u_{n+1}^{-2} - u_n^{-2} \underset{n\to+\infty}{=} \frac{1}{3} - \frac{u_n^2}{60} + \mathcal{O}\left(u_n^2\right)$.
Avec $u_n^2 \underset{n\to+\infty}{=} \frac{3}{n} + \mathcal{O}\left(\frac{3}{n}\right)$, $u_{n+1}^{-2} - u_n^{-2} \underset{n\to+\infty}{=} \frac{1}{3} - \frac{1}{20n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right)$.
Donc en sommant : $\frac{1}{u_n^2} \underset{n\to+\infty}{=} \frac{n}{3} - \frac{1}{20} H_{n-1} + \mathcal{O}(H_{n-1})$ où $H_{n-1} = \sum\limits_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}$ est le $n-1$-ième terme de la série harmonique.

On montre classiquement que $H_{n-1} \underset{n\to+\infty}{\sim} \ln(n-1) \underset{n\to+\infty}{\sim} \ln n$ pour en déduire :

$$\begin{aligned} u_n &\underset{n\to+\infty}{=} \left(\frac{n}{3} - \frac{1}{20}\ln n + o(\ln n)\right)^{-1/2} \\ &\underset{n\to+\infty}{=} \sqrt{\frac{3}{n}}\left(1 - \frac{3}{20}\frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)\right)^{-1/2} \\ &\underset{n\to+\infty}{=} \sqrt{\frac{3}{n}}\left(1 + \frac{3}{40}\frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)\right) \\ &\underset{n\to+\infty}{=} \sqrt{\frac{3}{n}} + \frac{3\sqrt{3}}{40}\frac{\ln n}{n\sqrt{n}} + o\left(\frac{\ln n}{n\sqrt{n}}\right) \end{aligned}$$

Si $u_1 < 0$ alors le même raisonnement appliqué à $(-u_n)$ donne $u_n \underset{n\to+\infty}{=} -\sqrt{\frac{3}{n}} - \frac{3\sqrt{3}}{40}\frac{\ln n}{n\sqrt{n}} + o\left(\frac{\ln n}{n\sqrt{n}}\right)$.

XIII.1.5 Suite récurrente (2)

[Enoncé]

XIII.1.6 Suite récurrente (3)

[Enoncé]

XIII.1.7 Suite récurrente (4) ★★★

[Enoncé]
$u_0 > 0$ donc par récurrence immédiate, $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n > 0$.
On en déduit que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} - u_n = \frac{1}{u_n^\alpha} > 0$. Donc $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante et elle admet alors une limite l dans $\mathbb{R} \cup \{+\infty\}$.
Fixons $n \in \mathbb{N}^*$. En sommant l'égalité précédente, $\sum_{k=0}^{n-1} u_{k+1} - u_k = u_n - u_0 = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{u_k^\alpha}$.
Si (u_n) converge alors $u_n - u_0 \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} l - u_0 \in \mathbb{R}$ d'où $\sum_{k\geq 0} \frac{1}{u_k^\alpha}$ converge. Cependant, $\frac{1}{u_k^\alpha} \underset{k\to+\infty}{\longrightarrow} \frac{1}{l^\alpha} \neq 0$ ($+\infty$ si $l = 0$) donc $\sum_{k\geq 0} \frac{1}{u_k^\alpha}$ diverge grossièrement. Ainsi $\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.
Soit $\beta \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} u_{n+1}^\beta - u_n^\beta &= u_n^\beta\left[\left(1 + \frac{1}{u_n^{\alpha+1}}\right)^\beta - 1\right] \\ &\underset{n\to+\infty}{=} u_n^\beta\left[1 + \frac{\beta}{u_n^{\alpha+1}} + o\left(\frac{1}{u_n^{\alpha+1}}\right) - 1\right] \\ &\underset{n\to+\infty}{=} \beta u_n^{\beta-\alpha-1} + o\left(u_n^{\beta-\alpha+-1}\right) \end{aligned}$$

On choisit $\beta = \alpha + 1$ et on a alors $u_{n+1}^{\alpha+1} - u_n^{\alpha+1} \underset{n\to+\infty}{\sim} \alpha + 1$ ($\alpha + 1 \neq 0$ puisque $\alpha > -1$). La série $\sum_{n\geq 0}(\alpha+1)$ diverge et $(\alpha+1)_{n\in\mathbb{N}}$ est de signe constant APCR donc par sommation de relations de comparaisons,
$\sum_{k=0}^{n-1}(u_{k+1}^{\alpha+1} - u_k^{\alpha+1}) = u_n^{\alpha+1} - u_0^{\alpha+1} \underset{n\to+\infty}{\sim} (\alpha+1)n = \sum_{k=0}^{n-1}(\alpha+1)$.
Or $u_n^{\alpha+1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$ donc $u_n^{\alpha+1} - u_0^{\alpha+1} \underset{n\to+\infty}{\sim} u_n^{\alpha+1}$. D'où $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} ((\alpha+1)n)^{1/(\alpha+1)}$.

XIII.1.8 Suite récurrente (5)

[Enoncé]

On sait que la fonction $x \mapsto e^{-\frac{x^2}{2}}$ est continue et positive sur $\mathbb{R}$. Ainsi pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\int_{x_n}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$ est positive, ce qui montre la croissance de la suite (x_n). Montrons, par l'absurde, que (x_n) n'est pas majorée. D'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, la suite (x_n) admet une sous-suite convergente de limite ℓ telle que :

$$\ell = \ell + \int_{\ell}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

Cette égalité n'est vérifié pour aucune valeur $\ell \in \mathbb{R}$ par stricte positivité de l'intégrale.
Donc, on a montré que (x_n) n'est pas majorée et donc qu'elle tend vers $+\infty$.
On sait également que $\int_{x}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{e^{-x^2}}{2x}$ d'après II.4.
Et donc puisque $x_n \to +\infty$, on a :

$$x_{n+1} - x_n \sim \frac{e^{-x_n^2}}{2x_n}$$

De plus, puisque $x_n \to +\infty$ et que $\int_0^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ converge, on en déduit que

$$x_{n+1} \sim x_n$$

On pose la fonction :

$$f : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & e^{x^2} \end{array} \right.$$

. D'après le théorème des accroissements finis, il existe $c_n \in]x_n, x_{n+1}[$ tel que

$$f(x_{n+1}) - f(x_n) = f'(c_n)(x_{n+1} - x_n)$$

Ainsi,

$$f(x_{n+1}) - f(x_n) \underset{n\to+\infty}{\sim} f'(c_n)\frac{e^{-\frac{x_n^2}{2}}}{2x_n} = \frac{c_n}{x_n} e^{\frac{c_n^2 - x_n^2}{2}}$$

et

$$c_n \sim x_n \text{par encadrement}$$

Montrons que $c_n^2 - x_n^2 \to 0$.

$$\begin{aligned} c_n^2 - x_n^2 &= (c_n + x_n)(c_n - x_n) \\ &\sim 2x_n(c_n - x_n) \end{aligned}$$

Or

$$0 \leq 2x_n(c_n - x_n) \leq 2x_n(x_{n+1} - x_n) \sim e^{-\frac{x_n^2}{2}}$$

Donc par encadrement,

$$c_n^2 - x_n^2 \to 0$$

Par conséquent, $f(x_{n+1}) - f(x_n) \to 1$.
D'après le lemme de l'escalier **??**, on a

$$e^{x_n^2} \sim n$$

et donc

$$x_n \sim \sqrt{\ln(n)}$$

XIII.1.9 Suite récurrente (6)

[Enoncé]

XIII.1.10 Suite définie implicitement (1) ★★

[Enoncé]

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Notons $f_n : x \in [0,1] \mapsto nx - \cos(x)$. f_n est dérivable sur $[0,1]$ et pour tout $x \in [0,1]$, $f_n'(x) = n + \sin(x) \geq 0$ avec égalité si et seulement si $n = 1$ et $x \in -\frac{\pi}{2} + 2\pi\mathbb{Z}$. Ainsi f_n est strictement croissante et donc d'après le théorème de la bijection, f_n est bijective de $[0,1]$ dans $[f_n(0), f_n(1)] = [-1, n - \cos(1)] \ni 0$. Donc $\exists!\ x_n \in [0,1],\ \cos(x_n) = nx_n$.
2. $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ |x_n| = \dfrac{|\cos(x_n)|}{n} \leq \dfrac{1}{n}$. Donc $x_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.
3. $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ f_{n+1}(x_n) = (n+1)x_n - \cos(x_n) = f_n(x_n) + x_n = x_n \geq 0 = f_{n+1}(x_{n+1})$. De plus, il n'y a pas égalité par unicité de x_{n+1}. Donc comme f_n est strictement croissante, $x_n > x_{n+1}$.
Ainsi $(x_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est décroissante.
4. En passant à la limite dans l'équation définissant x_n, on obtient $nx_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$ c'est-à-dire $x_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \dfrac{1}{n}$.
5. $x_n - \dfrac{1}{n} = \dfrac{\cos(x_n) - 1}{n} \underset{n\to+\infty}{=} -\dfrac{x_n^2}{2n} + o\left(\dfrac{x_n^2}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} -\dfrac{x_n^2}{2n} \underset{n\to+\infty}{\sim} -\dfrac{1}{2n^2}$.

XIII.1.11 Suite définie implicitement (2)

[Enoncé]

XIII.1.12 Suite définie implicitement (3)

[Enoncé]

XIII.1.13 Suite définie implicitement (4)

[Enoncé]

XIII.1.14 Suite définie implicitement (5) ★★★

[Enoncé]

1. Posons pour $n \in \mathbb{N}^*,\ f_n : x \in \mathbb{R}_+ \mapsto \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{x^k}{k}$ et fixons $n \in \mathbb{N}^*$.
f_n est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$ et $\forall x \in \mathbb{R}_+,\ f_n'(x) = 1 + \displaystyle\sum_{k=2}^{n} x^{k-1} > 0$. De plus $f(0) = 0$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f_n(x) = +\infty$ donc d'après le théorème de la bijection $f_n - 1$ s'annule exactement une fois sur $\mathbb{R}_+$.
2. On remarque que $f_{n+1} \geq f_n$ donc $f_{n+1}(x_n) \geq 0 = f_{n+1}(x_{n+1})$. Par croissance de f_{n+1} on sait alors que $x_{n+1} \leq x_n$. $(x_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est décroissante et minorée (par 0 par exemple), d'après le théorème de la limite monotone elle converge vers une limite ℓ.
3. $x_1 = 1$ donc $\forall n \geq 2,\ 0 < x_n \leq x_2 < 1$.
$\forall n \geq 2,\ 1 = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{x_n^k}{k} = \sum_{k=1}^{n} \int_0^{x_n} t^{k-1}dt = \int_0^{x_n} \sum_{k=1}^{n} t^{k-1}dt = \int_0^{x_n} \frac{1-t^n}{1-t}dt = -\ln(1-x_n) - \int_0^{x_n} \frac{t^n}{1-t}dt$.
Or $\forall n \geq 2,\ \left|\displaystyle\int_0^{x_n} \frac{t^n}{1-t}dt\right| \leq \int_0^1 \frac{x_2^n}{1-x_2}dt = \frac{x_2^n}{1-x_2} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.
Donc $\ln(1-x_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} -1$ i.e $x_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1 - e^{-1}$.

XIII.1.15 Formule d'inversion de Pascal ★★

[Enoncé]

Première méthode matrice de passage ★

1. Les familles $\mathcal{B}_c$ et $\mathcal{B}_t$ sont deux familles à degrés échelonnés de $m+1 = \dim \mathbb{K}_m[X]$ éléments de $\mathbb{K}_m[X]$. Ce sont donc des bases de $\mathbb{K}_m[X]$.

2. Soit $j \in [\![0;m]\!]$.
   $(X-1)^j = \sum_{i=0}^{j} \binom{j}{i} (-1)^{j-i} X^i$ donc $\forall (i,j) \in [\![0;m]\!]^2,\ \left(P_{\mathcal{B}_t}^{\mathcal{B}_c}\right)_{i+1,j+1} = \binom{j}{i}(-1)^{j-i}$
   Et, $X^j = (X-1+1)^j = \sum_{i=0}^{j} \binom{j}{i} (X-1)^i$ donc $\forall (i,j) \in [\![0;m]\!]^2,\ \left(P_{\mathcal{B}_c}^{\mathcal{B}_t}\right)_{i+1,j+1} = \binom{j}{i}$

3. Fixons $n \in \mathbb{N}$ et notons $A_n = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ et $B_n = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned}
& \forall p \in [\![0;n]\!],\ b_p = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} a_k \\
\iff & B_n = P_{\mathcal{B}_t}^{\mathcal{B}_c} A_n \\
\iff & A_n = P_{\mathcal{B}_c}^{\mathcal{B}_t} B_n \\
\iff & \forall p \in [\![0;n]\!],\ a_p = \sum_{k=0}^{p} (-1)^{p-k} \binom{p}{k} b_k
\end{aligned}$$

Deuxième méthode : binôme de Newton ★★

S est un endomorphisme de $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ qui commute trivialement avec $T = \mathrm{Id}_{\mathbb{C}^{\mathbb{N}}}$.
Donc $\forall n \in \mathbb{N},\ ((T+S)^n(a))_0 = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (S^k \circ T^{n-k})(a))_0 = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (S^k(a))_0 = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a_k = b_n$.
Et par conséquent,

$$\begin{aligned}
\forall n \in \mathbb{N},\ a_n &= (S^n(a))_0 \\
&= (T+S-T)^n(a))_0 \\
&= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^{n-k} ((T+S)^k(a))_0 \\
&= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^{n-k} b_k
\end{aligned}$$

Troisième méthode : par le calcul ★★

1. $\sum_{i=0}^{p} (-1)^{p-i} \binom{p}{i} b_i = \sum_{i=0}^{p} (-1)^{p-i} \binom{p}{i} \sum_{j=0}^{i} \binom{i}{j} a_j = \sum_{0 \le j \le i \le p} (-1)^{p-i} \binom{p}{i}\binom{i}{j} a_j = \sum_{j=0}^{p} \sum_{i=j}^{p} (-1)^{p-i} \binom{p}{i}\binom{i}{j} a_j.$

2.

$$\begin{aligned}\sum_{j=0}^{p}\sum_{i=j}^{p}(-1)^{p-i}\binom{p}{i}\binom{i}{j}a_j &= \sum_{j=0}^{p}a_j\sum_{i=j}^{p}\frac{p!}{(p-i)!}\cdot\frac{1}{(i-j)!j!}(-1)^{p-i}\\ &= \sum_{j=0}^{p}a_j\sum_{i=0}^{p-j}\frac{p!}{j!}\cdot\frac{1}{i!(p-j-i)!}(-1)^{p-j-i}\\ &= \sum_{j=0}^{p}a_j\frac{p!}{j!(p-j)!}\sum_{i=0}^{p-j}(-1)^{p-j-i}\frac{(p-j)!}{i!(p-j-i)!}\\ &= \sum_{j=0}^{p}\binom{p}{j}a_j\sum_{i=0}^{p-j}(-1)^{p-j-i}\binom{p-j}{i}\end{aligned}$$

3. Si $p-j\neq 0$, alors $\displaystyle\sum_{i=0}^{p-j}(-1)^{p-j-i}\binom{p-j}{i}=(1-1)^{p-j}=0$. Pour $j=p$, la somme vaut 1.

   Ainsi, on a montré que $\displaystyle\sum_{i=0}^{p}(-1)^{p-i}\binom{p}{i}b_i=\binom{p}{p}a_p=a_p$.

Dérangement ★★★

Notons pour $k\in[\![0;n]\!]$, A_k l'ensemble des permutations de $[\![1;n]\!]$ ayant exactement k points fixes. On a $\mathcal{S}_n=\bigsqcup_{k=0}^{n}A_k$ où $\bigsqcup$ représente une union disjointe.
Or si $k\in[\![0;n]\!]$, pour construire un élément de A_k on choisis k éléments dans $[\![1;n]\!]$ qui reste fixe et on construit un dérangement à partir des $n-k$ éléments restant. Ainsi $\forall k\in[\![0;n]\!]$, $\mathrm{Card}(A_k)=\binom{n}{k}D_{n-k}$.
On obtient alors $n!=\mathrm{Card}(S_n)=\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\mathrm{Card}(A_k)=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}D_{n-k}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{n-k}D_k=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}D_k$.
D'après la formule d'inversion de Pascal on a $D_n=\displaystyle\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}\binom{n}{k}k!=\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}\frac{n!}{(n-k)!}=n!\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}$.
Par conséquent $\dfrac{D_n}{n!}\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}\displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(-1)^k}{k}=\frac{1}{e}$.
Le quotient $\dfrac{D_n}{n!}$ peut s'interpréter comme la probabilité d'obtenir un dérangement quand on tire au hasard une permutation dans un ensemble à n éléments, en considérant qu'il y a équiprobabilité pour de toutes les issus. On a montré que cette probabilité tend vers $\dfrac{1}{e}\approx 0,37$ quand on augmente le nombre d'éléments.

XIII.1.16 Théorème de Pringsheim ★★★

[Enoncé]

On pose pour tout $n\in\mathbb{N}$, $S_n=\displaystyle\sum_{k=0}^{n}a_k$.

On a pour tout $n\in\mathbb{N}$, $S_{2n}-S_n=\displaystyle\sum_{k=n+1}^{2n}a_k\geq na_{2n}\geq 0$ car $(a_n)_{n\geq 0}$ est décroissante.

Or comme $\displaystyle\sum_{k\geq 0}a_k$ converge, on en déduit que $S_{2n}-S_n$ tend vers 0. Donc par encadrement, on en déduit que $(2na_{2n})_{n\geq 0}$ tend vers 0.
De plus, on remarque que pour tout entier naturel n, $0\leq(2n+1)a_{2n+1}\leq(2n+1)a_{2n}$. On sait que $a_{2n}\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}0$ car $\displaystyle\sum_{n\geq 0}a_n$ converge et que $2na_{2n}\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}0$ d'après ce qui précède. On en déduit par encadrement que $(2n+1)a_{2n+1}\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}0$.
Finalement, $na_n\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}0$.

XIII.1.17 Lemme de Fekete ★★★

[Enoncé]

1. Par récurrence immédiate $\forall k \in \mathbb{N}^*,\ u_{kn} \leq k u_n$.
   Donc $u_n \leq u_{qN} + u_r \leq q u_N + u_r \leq q u_N + \max_{0 \leq k < N} u_k$.

2. Supposons $\left(\frac{u_n}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ minorée et fixons $\varepsilon > 0$. Alors $\exists N \in \mathbb{N}^*,\ \frac{u_N}{N} - \ell \leq \frac{\varepsilon}{2}$. On note $U := \max_{0 \leq k < N} u_k$.
   Notons $N' = \max\left(N, \left\lfloor \frac{2U}{\varepsilon} \right\rfloor + 1\right)$. Alors si $n \geq N'$, $\frac{u_n}{n} - \ell \leq \frac{q}{n} u_N - \ell + \frac{U}{n} \leq \frac{qN}{n}\left(\ell + \frac{\varepsilon}{2}\right) - \ell + \frac{\varepsilon}{2}$.
   Or $qN = n - r \leq n$ donc $\frac{qN}{n} \leq 1$ d'où $\frac{u_n}{n} - \ell \leq \varepsilon$.
   Donc $\frac{u_n}{n} \longrightarrow \ell$.
   Supposons maintenant $\left(\frac{u_n}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ non minorée et fixons $\delta < 0$. Alors $\exists N \in \mathbb{N}^*,\ u_n \leq \delta - 1$.
   Alors $\forall n \geq \max(N, \lfloor U \rfloor + 1),\ \frac{u_n}{n} \leq \frac{qN}{n}(\delta - 1 + \ell) - \ell + \frac{U}{n} \leq \delta - 1 + \ell - \ell + 1 = \delta$.
   Donc $\frac{u_n}{n} \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} -\infty$.

Chemins auto-évitant ★★★

[Enoncé]

La suite $(c_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est clairement minorée par 1. On remarque par croissance de ln que $\ln \mu = \inf_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{\ln c_n}{n}$. On va donc montrer que la suite $(\ln c_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est sous-additive. Autrement dit que $(c_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est sous-multiplicative :

$$\forall m, n \in \mathbb{N}^*,\ c_{n+m} \leq c_n c_m$$

Cette inégalité est simple à obtenir car on peut voir un chemin de longueur $n+m$ comme un chemin de longueur n associé à un chemin de longueur m (qui part du point d'arrivée de celui de longueur n).

Remarque : On peut définir les chemins auto-évitant dans n'importe quel réseau. La constante μ s'appelle alors constante de connectivité du réseau. On ne dispose pas de valeur exacte pour cette constante en général, elle n'est en fait connu que pour le réseau hexagonal : $\mu = \sqrt{2+\sqrt{2}}$. Ce résultat est dû à Hugo Duminil-Copin, médaillé Fields français et Stanislav Smirnov, médaillé Fields russe.

XIII.1.18 Théorème de Bolzano-Weierstrass ★★★

[Enoncé]

1. Soit $(v_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. On pose $A = \{n \in \mathbb{N} \mid \forall k > n,\ v_k \geq v_n\}$.
   Si A est infini alors n'importe quelle suite extraite de $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à valeur dans A est croissante.
   Et si A est fini alors il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N,\ n \notin A$. Autrement dit, $\forall n \geq N,\ \exists k_n > n,\ v_{k_n} < v_n$.
   On définit alors $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ par $\varphi(0) = N$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ \varphi(n+1) = k_{\varphi(n)}$.
   Par définition pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\varphi(n+1) = k_{\varphi(n)} > \varphi(n)$ et $v_{\varphi(n+1)} = v_{k_{\varphi(n)}} < v_{\varphi(n)}$. Ainsi, $(v_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite extraite de $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ décroissante.

2. Attention ! On ne peut pas utiliser le fait que $\{z \in \mathbb{C},\ |z| \leq M\}$ est une partie compacte de $\mathbb{C}$ car la démonstration de ce résultat est l'objet de l'exercice ! Posons pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_n = \mathrm{Re}(u_n)$ et $y_n = \mathrm{Im}(u_n)$. Notons $M \in \mathbb{R}_+$ tel que $\forall n \in \mathbb{N},\ |u_n| \leq M$.
   $\forall n \in \mathbb{N},\ |x_n| = \sqrt{x_n^2} \leq \sqrt{x_n^2 + y_n^2} = |u_n| \leq M$. De même, $\forall n \in \mathbb{N},\ |y_n| \leq M$.
   D'après le lemme des pics appliqué à x_n qui est une suite réelle, il existe φ une application strictement croissante de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ telle que $(x_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ monotone. On pose alors $\theta = \varphi \circ \psi$. $(x_{\theta(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est monotone comme suite extraite d'une suite monotone. Ensuite, encore d'après le lemme des pics il existe $\alpha : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $(y_{\theta \circ \alpha(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ soit monotone. Alors en posant $\eta = \theta \circ \alpha$, $(y_{\eta(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est monotone par définition et $(x_{\eta(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est monotone en tant que suite extraite de $(x_{\theta(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ qui est elle-même monotone. Etant bornées en tant que suites extraites de suites bornées, d'après le théorème de la limite monotone elles convergent.

Ainsi, $(u_{\eta(n)})_{n\in\mathbb{N}} = (x_{\eta(n)} + iy_{\eta(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite convergente extraite de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Remarque : Le résultat s'étend de manière similaire à tout $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension p finie (et donc à tout $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension p finie, vu comme un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension $2p$) normé en procédant par récurrence, soit en extrayant de la suite des premières composantes, qui est bornée, une sous-suite convergente, puis une sous-sous-suite de cette sous-suite qui fait converger la suite des secondes composantes et ainsi de suite jusqu'à la suite des p-ième composantes, soit en montrant que le produit cartésien d'un nombre fini de compacts est un compact.

XIII.1.19 Suites de Cauchy ★★

[Enoncé]

1. Soit $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ une suite convergente. On note $l = \lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.
   Soit $\varepsilon > 0$.
   $\exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\ |u_n - l| \leq \dfrac{\varepsilon}{2}$.
   Alors, $\forall (p,q) \in [\![N;+\infty[\![,\ |u_p - u_q| = |u_p - l + l - u_q| \leq |u_p - l| + |l - u_q| \leq \varepsilon$.
   Donc $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy.

   Soit $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ une suite de Cauchy.
   Montrons que (u_n) est bornée, autrement dit que la suite $(|u_n|)$ ne tend pas vers $+\infty$.
   Supposons par l'absurde que $\lim\limits_{n\to+\infty} |u_n| = +\infty$. Fixons $\varepsilon > 0$.
   $\exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall p > q \geq n_0,\ |u_p - u_q| \leq \varepsilon$. Et $\exists n_1 \in \mathbb{N},\ \forall p \geq n_1,\ |u_p| > |u_q| + \varepsilon$.
   Donc $\forall p \geq N = \max(q, n_1),\ \varepsilon < |\ |u_p| - |u_q|\ | \leq |u_p - u_q| \leq \varepsilon$.
   Ceci est absurde donc (u_n) est bornée.

   Alors d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass (u_n) admet une valeur d'adhérence ℓ. On note $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $u_{\varphi(n)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell$.
   $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n \in \mathbb{N},\ \forall k \geq n,\ |u_{\varphi(n)} - u_n| \leq \varepsilon$.
   C'est-à-dire $u_{\varphi(n)} - u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.
   Mais alors par somme, $u_n = u_n - u_{\varphi(n)} + u_{\varphi(n)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell$.

2. Le sens convergente $\implies$ Cauchy est le même que dans la question 1. Soit $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ une suite de Cauchy. On fixe une base $(e_1, \dots, e_p)$ de E.
   $\forall n \in \mathbb{N},\ \exists a_{1,n}, \dots, a_{p,n} \in \mathbb{R},\ u_n = \sum\limits_{i=1}^{p} a_{i,n} e_i$.
   Montrons que les suites de coordonnées $(a_{i,n})_{n\in\mathbb{N}}$ convergent.
   On montre aisément que (u_n) est de Cauchy pour toute norme équivalente à $\|\cdot\|$. Par équivalence des normes sur E, $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est de Cauchy pour $N : u = \sum\limits_{i=1}^{n} a_i e_i \mapsto \max\limits_{1\leq i\leq p} |a_i|$.
   Comme pour tous $1 \leq i \leq p$ $|a_{i,n}| \leq N(u_n)$, les suites $(a_{i,n})_{n\in\mathbb{N}}$ sont de Cauchy. D'après la question 1 elles convergent donc $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge.

Remarque : Un espace dont les suites de Cauchy convergent dans l'espace est dit complet. On a montré que les $\mathbb{R}$-espaces vectoriels de dimension finie sont complets. La complétude est une notion très utile en analyse qui se substitue à la compacité, qui est une propriété bien trop restrictive en général.

XIII.1.20 Récurrence de Cauchy

[Enoncé]

1. $1 \in A$ donc $0 = 1 - 1 \in A$. Fixons $n \in \mathbb{N}^*$.
   Par récurrence immédiate en utilisant le troisième axiome de A, $\forall k \in \mathbb{N},\ 2^k \in A$. Comme $(2^k)_{k\in\mathbb{N}} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$ on sait qu'il existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tel que $2^{k_0} > n$.

Par récurrence immédiate sur le en utilisant le deuxième axiome de A, si $p \in A$ alors $\forall q \in \mathbb{N},\ q \leq p \implies q \in A$. Ainsi $n \in A$.
Par double inclusion, $A = \mathbb{N}$.
Remarque : On vient de définir un raisonnement par récurrence. Il est aussi intéressant de noter que le raisonnement fonctionne encore si on remplace la condition "$\forall n \in A,\ 2n \in A$" par "$\forall n \in A,\ \varphi(n) \in A$" avec φ n'importe quelle fonction de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ strictement croissante.

2. Notons pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{P}(n)$: "$\forall (x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}_+)^n,\ \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k \geq \left(\prod_{k=1}^{n} x_k^n\right)^{1/n}$".
Pour $n = 1$ il n'y a rien à faire. Supposons $\mathcal{P}(n)$ pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$.
Supposons que $n \geq 2$ et montrons $\mathcal{P}(n-1)$. On se donne $(x_1, \dots, x_{n-1}) \in (\mathbb{R}_+)^{n-1}$.
Posons $\forall k \in [\![1; n-1]\!],\ y_k = x_k$ ainsi que $y_n = \frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n-1} x_k$.
On remarque que $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} y_k = \frac{1}{n}\left(\sum_{k=1}^{n-1} x_k + \frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n-1} x_k\right) = \frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n-1} x_k$.
$\forall k \in [\![1; n]\!],\ y_k \geq 0$. Donc par hypothèse de récurrence,
$\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n-1} x_k = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} y_k \geq \left(\prod_{k=1}^{n} y_k\right)^{1/n} = \left(\prod_{k=1}^{n-1} x_k\right)^{1/n} \times \left(\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n-1} x_k\right)^{1/n}$.
On en déduit $\left(\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n-1} x_k\right)^{1-1/n} \geq \left(\prod_{k=1}^{n-1} x_k\right)^{1/n}$ et puis en élevant à la puissance $\frac{n}{n-1}$: $\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n-1} x_k \geq \left(\prod_{k=1}^{n-1} x_k\right)^{1/(n-1)}$.
D'où $\mathcal{P}(n-1)$.
Montrons maintenant $\mathcal{P}(2n)$. On se donne $(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n) \in (\mathbb{R}_+)^{2n}$. En appliquant $\mathcal{P}(2)$ sur $\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k, \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} y_k\right)$ puis deux fois $\mathcal{P}(n)$, une fois sur $(x_1 \dots, x_n)$ et une fois sur $(y_1 \dots, y_n)$ on a :

$$\frac{1}{2n}\left(\sum_{k=1}^{n} x_k + \sum_{k=1}^{n} y_k\right) \geq \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k \cdot \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} y_k} \geq \left(\prod_{k=1}^{n} x_k \prod_{k=1}^{n} y_k\right)^{1/2n}$$

On en déduit par la question 1 que la propriété est vraie pour tout entier naturel non nul n.

XIII.1.21 Sommes de Riemann

[Enoncé]
Fixons $n \in \mathbb{N}^*$. Comme f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur le segment $[0,1]$ on peut considérer $M := \sup_{[0,1]} |f'|$.
Remarquons aussi que $f(1) - f(0) = \int_0^1 f'(t)dt$.
Par la formule de Chasles et l'inégalité triangulaire,

$$\left|\int_0^1 f(t)dt - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) + \frac{1}{2n}(f(1) - f(0))\right| = \left|\sum_{k=1}^{n} \int_{(k-1)/n}^{k/n} \left[f(t) - f\left(\frac{k}{n}\right) + \frac{1}{2}f'(t)\right] dt\right|$$

XIII.1.22 Formule d'Euler-Maclaurin

[Enoncé]

XIII.1.23 Nature d'une suite ★★

[Enoncé]
Supposons que $(\sin(n))_{n\in\mathbb{N}}$ admet une limite $\ell \in [-1, 1]$.

$\forall n \in \mathbb{N},\ \sin(n)^2 + \cos(n)^2 = 1$. Donc $\cos(n)^2 \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1 - \ell^2$.
De plus, $\forall n \in \mathbb{N},\ \sin(2n)^2 = 4\cos(n)^2\sin(n)^2$.
Donc par passage à la limite $\ell^2 = 4\ell^2(1-\ell^2)^2$ i.e $\ell = 0$ ou $4(1-\ell^2)^2 = 1$.
Dans le second cas, comme $1 - \ell^2 \geq 0,\ 1 - \ell^2 = \dfrac{1}{2}$ d'où $\ell^2 = \dfrac{1}{2}$.
Or $\forall n \in \mathbb{N},\ \sin(n+1) = \sin(n)\cos(1) + \cos(n)\sin(1) \iff \cos(n) = \dfrac{\sin(n+1) - \sin(n)\cos(1)}{\sin(1)}$.
Donc $\cos(n)^2 \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \left(\dfrac{\ell(1-\cos(1))}{\sin(1)}\right)^2$.
Par unicité de la limite on a $(1-\ell^2)\sin(1)^2 = \ell^2(\cos(1)-1)^2$. Pourtant $\ell = 0$ et $\ell^2 = \dfrac{1}{2}$ ne satisfont pas cette équation.
Ceci est absurde donc $(\sin(n))_{n\in\mathbb{N}}$ diverge.

XIII.1.24 Etude d'une suite avec une condition de convergence

[Enoncé]

Posons $v_n = nu_n$. $n(u_n + u_{2n}) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1 \iff v_n + \dfrac{1}{2}v_{2n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$.
Montrons que (v_n) n'a qu'une seule valeur d'adhérence. Si ℓ est une valeur d'adhérence de (v_n) alors par unicité de la limite $\ell + \dfrac{\ell}{2} = 1$ i.e $\ell = \dfrac{2}{3}$.
Reste à montrer que (v_n) admet une valeur d'adhérence. Si on montre que (v_n) est bornée alors elle admet une valeur d'adhérence par le théorème de Bolzano-Weierstrass. Supposons par l'absurde que (v_n) n'est pas bornée.
Alors $\forall N \in \mathbb{N},\ \exists n \geq N,\ v_n \geq 2$, et donc puisque $v_n \geq 0$ pour tout n, $|v_n + v_{2n} - 1| = v_n + v_{2n} - 1 \geq 1$. Ceci contredit la définition de la limite d'une suite pour $\varepsilon = 1$ donc on en déduit que (v_n) est bornée.
Finalement $v_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \dfrac{2}{3}$.

XIII.1.25 Valeurs d'adhérences d'une suite ★★★★

[Enoncé]

1. Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites réelles équivalentes avec (v_n) de signe constant APCR. Alors les séries $\displaystyle\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$ et $\displaystyle\sum_{n\in\mathbb{N}} v_n$ sont de même nature.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
   $|z_n|^2 = \displaystyle\prod_{k=1}^{n}\left|1 + \frac{i}{k}\right|^2 = \prod_{k=1}^{n}\left(1 + \frac{1}{k^2}\right) \neq 0$.
   On considère alors la suite de terme général $x_n := \ln|z_n|$.
   $2x_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1 + \frac{1}{k^2}\right)$. Or $\ln\left(1 + \dfrac{1}{k^2}\right) \underset{k\to+\infty}{\sim} \dfrac{1}{k^2}$ et $\displaystyle\sum_{k\in\mathbb{N}^*}\frac{1}{k^2}$ est une série à termes positifs convergente. Donc par théorème de comparaison $(x_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge vers un certain réel x. On en déduit que $(|z_n|)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge vers $r := e^x$.
3. Tout d'abord (z_n) est bornée donc elle admet une valeur d'adhérence (un disque est un compact de $\mathbb{C}$). Soit ℓ une valeur d'adhérence de (z_n). On note (ζ_n) une suite extraite de (z_n) qui converge vers ℓ. Alors par continuité du module $|\zeta_n| \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} |\ell|$. Donc d'après la première question $|\ell| = r$.
   Déterminons un argument $\theta_k \in [-\pi, \pi[$ de $1 + \dfrac{i}{k}$. On a $\begin{cases}\sqrt{1+\dfrac{1}{k^2}}\cos(\theta_k) = 1\\ \sqrt{1+\dfrac{1}{k^2}}\sin(\theta_k) = \dfrac{1}{k}\end{cases}$
   Donc $\tan(\theta_k) = \dfrac{1}{k}$. Or $\cos(\theta_k) > 0$ donc $\theta_k \in \left]-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right[$ d'où $\theta_k = \arctan\left(\dfrac{1}{k}\right)$.
   Ainsi $z_n = \displaystyle\prod_{k=1}^{n}\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}e^{i\theta_k} = |z_n|e^{i\sum_{k=1}^{n}\arctan(1/k)}$.
   On sait que $\arctan\left(\dfrac{1}{k}\right) \underset{k\to+\infty}{\sim} \dfrac{1}{k}$. La série $\displaystyle\sum_{k\in\mathbb{N}^*}\frac{1}{k}$ est à termes positifs et diverge donc par théorème de comparaison

$\sum_{k\in\mathbb{N}^*}\theta_k$ diverge. On note désormais $S_n := \sum_{k=1}^{n}\theta_k$.
Ce que l'on à obtenu nous pousse à montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de (z_n) est exactement l'ensemble des complexes de module r. Fixons $\theta\in\mathbb{R}$ et $\varepsilon>0$.
On va chercher à trouver une infinité d'entiers positifs k tels que $|\theta+2k\pi-S_{n_k}|\leq\varepsilon$.
$\forall A>0,\ \exists N\in\mathbb{N},\ \forall n\geq N,\ S_n\geq A$. Si $A>\theta_1$ l'ensemble $\{n\in\mathbb{N},\ S_n<A\}$ est non vide et majoré. On peut donc considérer son maximum n_A.
Par définition $S_{n_A}<A$ et $S_{n_A+1}\geq A$. On prend $A=\theta+2k\pi$ et on note $n_k := n_A$.
On a alors $0<\theta+2k\pi-S_{n_k}\leq S_{n_k+1}-S_{n_k}=\theta_k$.
Par continuité de $t\mapsto e^{it}$ on se donne $\delta>0$ tel que $\forall x,y\in\mathbb{R},\ |x-y|\leq\delta\implies|e^{ix}-e^{iy}|\leq\varepsilon$. Et comme $\theta_k\underset{k\to+\infty}{\longrightarrow}0$ on peut prendre $K\in\mathbb{N}$ tel que pour $k\geq K,\ \theta_k\leq\delta$.
Ainsi $\forall k\geq K,\ |e^{i\theta}-e^{iS_{n_k}}|=|e^{i(\theta+2k\pi-S_{n_k})}-1|\leq\varepsilon$.
Ainsi $e^{iS_{n_k}}\underset{k\to+\infty}{\longrightarrow}e^{i\theta}$ et par suite $z_{n_k}\underset{k\to+\infty}{\longrightarrow}re^{i\theta}$.

XIII.1.26 Nature d'une série (1) ★

[Enoncé]
On remarque que :

$$\begin{aligned}\sin\left(\pi\sqrt{1+n^2}\right) &= \sin\left(\pi n\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}\right)\\ &\underset{n\to+\infty}{=} \sin\left(\pi n\left[1+\frac{1}{2n^2}+\mathcal{O}\left(\frac{1}{n^3}\right)\right]\right)\\ &\underset{n\to+\infty}{=} (-1)^n\sin\left(\frac{\pi}{2n}+\mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\\ &\underset{n\to+\infty}{=} (-1)^n\frac{\pi}{2n}+\mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)\end{aligned}$$

D'après le critère spécial des séries alternées, $\sum_{n\geq0}(-1)^n\frac{\pi}{2n}$ converge et d'après le critère de Riemann, $\sum_{n\geq1}\frac{1}{n^2}$ converge.
De plus $\forall n\in\mathbb{N}^*,\ \frac{1}{n^2}\geq0$.
Donc $\sum_{n\geq0}\sin(\pi\sqrt{1+n^2})$ converge.

XIII.1.27 Nature d'une série (2) ★★

[Enoncé]
Soit $n\in\mathbb{N}$. En séparant les deux sommes en termes impairs et pairs,

$$(2+\sqrt{3})^n+(2-\sqrt{3})^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\sqrt{3}^k2^{n-k}+\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(-1)^k\sqrt{3}^k2^{n-k}=\sum_{k=0}^{\lfloor n/2\rfloor}\binom{n}{2k}3^k2^{n-2k+1}:=K_n\in\mathbb{Z}.$$

Donc

$$\begin{aligned}\sin(\pi(2+\sqrt{3})^n)&=\sin(K_n\pi-\pi(2-\sqrt{3})^n)\\ &=\sin(K_n\pi)\cos(\pi(2-\sqrt{3})^n)-\cos(K_n\pi)\sin(\pi(2-\sqrt{3})^n)\\ &=(-1)^{K_n+1}\sin(\pi(2-\sqrt{3})^n)\end{aligned}$$

Or $4\leq4+2\sqrt{3}\iff2^2\leq(1+\sqrt{3})^2\implies0\leq2-\sqrt{3}<1\implies\sin(\pi(2-\sqrt{3})^n)\underset{n\to+\infty}{\sim}\pi(2-\sqrt{3})^n$.
La série $\sum_{n\in\mathbb{N}}(2-\sqrt{3})^n$ est à termes positifs et convergente donc par théorème de comparaison $\sum_{n\in\mathbb{N}}\sin((2+\sqrt{3})^n)$ est absolument convergente.

XIII.1.28 Nature d'une série (3) ★★★

[Enoncé]
Soit $\alpha\in\mathbb{R}$. Soit $n\in\mathbb{N}^*$.

Remarquons déjà que $\frac{n^\alpha}{1+n^\alpha} \in [0,1]$ donc $\arccos\left(\frac{n^\alpha}{1+n^\alpha}\right)$ est bien défini.
Si $\alpha < 0$, $\arccos\left(\frac{n^\alpha}{1+n^\alpha}\right) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \arccos(0) = \frac{\pi}{2}$.
Et pour $\alpha = 0$, $\arccos\left(\frac{n^\alpha}{1+n^\alpha}\right) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \arccos\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$.
Par conséquent si $\alpha \leq 0$, $\sum_{n\geq 1} \arccos\left(\frac{n^\alpha}{1+n^\alpha}\right)$ diverge grossièrement.
Supposons $\alpha > 0$. Le terme général étant positif, cherchons-en un équivalent.
$\frac{n^\alpha}{1+n^\alpha} = \frac{1}{1+n^{-\alpha}} \underset{n\to+\infty}{=} 1 - \frac{1}{n^\alpha} + o\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)$. On sait que $\forall x \in]-1,1[,\ \sin(\arccos(x)) = \sqrt{1-x^2}$.
Donc $\sin\left(\arccos\left(\frac{n^\alpha}{1+n^\alpha}\right)\right) \underset{n\to+\infty}{=} \sqrt{1-\left(1-\frac{1}{n^\alpha}+o\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)\right)^2} \underset{n\to+\infty}{=} \sqrt{\frac{2}{n^\alpha}+o\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{\sqrt{2}}{n^{\alpha/2}}$.
Or $\sin(x) \underset{x\to 0}{\sim} x$ donc $\arccos\left(\frac{n^\alpha}{1+n^\alpha}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{\sqrt{2}}{n^{\alpha/2}}$.
On en déduit que $\sum_{n\in\mathbb{N}} \arccos\left(\frac{n^\alpha}{1+n^\alpha}\right)$ converge si et seulement si $\alpha > 2$.

XIII.1.29 Nature d'une série (4) ★★★

[Enoncé]
Soit $n \in \mathbb{N}$. $en! = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{n!}{k!} = a_n + \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{n!}{k!}$ avec $a_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{k!} \in \mathbb{N}$. Donc,
$\sin(\pi en!) = \sin(\pi a_n + \pi(en! - a_n)) = \sin(\pi a_n)\cos(\pi(en!-a_n)) + \cos(\pi a_n)\sin(\pi(en!-a_n)) = (-1)^{a_n}\sin(\pi(en!-a_n))$.
Naturellement en premier lieu on se demande si on peut montrer la convergence absolue. Cependant on se heurte à un problème :
$en! - a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \sum_{k=n+3} \frac{n!}{k!}$.
Donc $\left|en! - a_n - \frac{1}{n+1}\right| \leq \frac{1}{n^2} + \sum_{k=n+3}^{+\infty} \frac{1}{k^3} = o\left(\frac{1}{n}\right)$ donc $en! - a_n = \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n}$.
Ainsi $|\sin(\pi en!)| \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n}$ et la série ne converge pas absolument.
Utilisons le critère spécial des séries alternées.
Tout d'abord déterminons la parité de a_n en fonction de celle de n.
$a_n = \sum_{k=0}^{n-2} \frac{n!}{k!} + n + 1 \equiv n+1[2]$ puisque $2|n(n-1)|\sum_{k=0}^{n-2} \frac{n!}{k!}$. Ainsi $(-1)^{a_n} = (-1)^{n+1}$.
Ensuite, $\sin(\pi(en! - a_n)) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.
Enfin, comme sin est croissante sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ et comme APCR $\pi(en!-a_n) \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, APCR la monotonie de $(\sin(\pi(en! - a_n)))$ est celle de $(en! - a_n) = \left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{n!}{k!}\right)$. On calcule :
$\sum_{k=n+2}^{+\infty} \frac{(n+1)!}{k!} - \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{n!}{k!} = (n+1)\sum_{k=n+2}^{+\infty} \frac{n!}{k!} - \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{n!}{k!} = \sum_{k=n+2}^{+\infty} \frac{nn!}{k!} - \frac{1}{n+1} \geq \frac{n}{(n+1)(n+2)} - \frac{1}{n+1} \geq 0$.
Ainsi $(\sin(\pi(en! - a_n)))$ est croissante APCR d'où la convergence par le critère spécial des séries alternées.

XIII.1.30 Nature d'une série (5) ★★★★

[Enoncé]
Le premier cas qui saute aux yeux est celui pour $\alpha_k = k$ où on retrouve la série harmonique qui diverge. On peut alors penser à montrer la divergence de notre série de la même manière que pour la série harmonique Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Notons $(S_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ la suite des sommes partielles.

$$S_{2n} - S_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\alpha_k}{k^2} \geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\alpha_k}{4n^2} \geq \frac{1}{4n^2}\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n+1}{8n} \geq \frac{1}{8}$$

La deuxième inégalité est vraie car $\alpha_{n+1}, \dots, \alpha_{2n}$ sont n entiers distincts.
Donc $S_{2n} - S_n$ ne converge pas vers 0 d'où $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\alpha_k}{k^2} = +\infty$.

Une autre manière de faire qui exploite encore plus le lien avec la série harmonique se base sur le lemme suivant : (inégalité de réarrangement)
Soient $a_1 > \cdots > a_n, b_1 < \cdots < b_n$ des réels. Alors pour toute permutation $\sigma \in \mathcal{S}_n$,

$$S(\sigma) := \sum_{i=1}^{n} a_i b_{\sigma(i)} \leq \sum_{i=1}^{n} a_i b_i$$

Soient $\sigma \in \mathcal{S}_n$ tel que $S(\sigma)$ soit minimale et $\tau = (ij)$, où $i < j$, une transposition.
On remarque que $S(\sigma \circ \tau) - S(\sigma) = a_i b_{\sigma(j)} - a_i b_{\sigma(i)} + a_j b_{\sigma(i)} - a_j b_{\sigma(j)} = (a_j - a_i)(b_{\sigma(i)} - b_{\sigma(j)})$.
$S(\sigma \circ \tau) - S(\sigma) \geq 0$ par minimalité de $S(\sigma)$ et $a_j - a_i < 0$ car $j > i$. Donc $b_{\sigma(i)} \leq b_{\sigma(j)}$ d'où $\sigma(i) \leq \sigma(j)$.
On a montré que σ est une bijection de $[\![1; n]\!]$ croissante, c'est donc l'identité d'où le résultat.
Remarque : on peut aussi faire une récurrence en isolant les termes faisant apparaître l'indice $n+1$, ce qui revient en fait au même.

On va montrer que la série harmonique est "la plus petite somme" qu'on pourrait obtenir.
Fixons $n \in \mathbb{N}^*$. On peut minorer $\sum_{k=1}^{n} \frac{\alpha_k}{k^2} \geq \sum_{k=1}^{n} \frac{\beta_k}{k^2}$ avec $\{\beta_1, \dots, \beta_n\} = [\![1; n]\!]$. En effet, il suffit de minorer le plus grand des α_i par n, le deuxième plus grand par $n-1$, etc... jusqu'au plus petit par 1. Ceci est possible car $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sont tous distincts. L'application $\sigma : k \in [\![1; n]\!] \mapsto \beta_k$ est alors une bijection de $\mathcal{S}_n$.
D'après le lemme appliqué à $a_i = \frac{1}{i^2}$ et $b_i = i$ on a alors $\sum_{k=1}^{n} \frac{\alpha_k}{k^2} \geq \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{k^2} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} +\infty$.

XIII.1.31 Nature d'une série (6) ★★★★

[Enoncé]
Soit $n \geq 2$ un entier.
$\text{ppcm}(a_1, \dots, a_n) \geq \text{ppcm}(a_{n-1}, a_n) = \frac{a_{n-1} a_n}{\text{pgcd}(a_{n-1} a_n)} > 0$.

Or on remarque que $\text{pgcd}(a_{n-1}, a_n) | a_n - a_{n-1} > 0$. Donc $\text{pgcd}(a_{n-1}, a_n) \leq a_n - a_{n-1}$ d'où $\frac{\text{pgcd}(a_{n-1}, a_n)}{a_{n-1} a_n} \leq \frac{a_n - a_{n-1}}{a_{n-1} a_n} = \frac{1}{a_{n-1}} - \frac{1}{a_n}$.
On montre par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $a_n \geq a_1 + n - 1$ et on en déduit que $a_n \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} +\infty$.
Ainsi $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{\text{ppcm}(a_1, \dots, a_n)}$ est une série à termes positifs majorée $\left(\text{par } \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{a_{n-1}} - \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a_1} \right)$: elle converge.

XIII.1.32 Nature d'une série (7) ★★★

[Enoncé]
On va partitionner P suivant le nombre de chiffres de ces éléments. Notons pour $d \in \mathbb{N}^*$, A_d l'ensemble des nombres palindromes à d chiffres ainsi que $N(d) = |A_d|$. Tous les termes étant positifs d'après le théorème de sommation par paquets :

$$\sum_{n \in P} \frac{1}{n} = \sum_{d=1}^{+\infty} \sum_{n \in A_d} \frac{1}{n}$$

Fixons $d \in \mathbb{N}^*$. $\forall n \in A_d$, $10^{d-1} \leq n < 10^d$ donc $\sum_{n \in A_d} \frac{1}{n} \leq \frac{N(d)}{10^{d-1}}$. Calculons maintenant $N(d)$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $n = \overline{a_d \dots a_1} := \sum_{k=0}^{d} a_k 10^k$ où $a_1, \dots, a_d \in [\![0; 9]\!]$ et $a_d \neq 0$, autrement dit $a_1, \dots, a_d$ sont les chiffres de n.

Alors n est un nombre palindrome si et seulement si $\forall k \in [\![1;d]\!],\ a_{d-k} = a_k$. Pour construire un élément de P_d il suffit donc de choisir

— $a_1, a_2, \dots, a_{(d+1)/2}$ si d est impair ;

— $a_1, a_2, \dots, a_{d/2}$ si d est pair.

Ce qui revient à choisir $a_1, a_2, \dots, a_{\lfloor (d+1)/2 \rfloor}$. De manière plus formelle on dispose d'une bijection

$$f : \left\{ \begin{array}{lll} \{(a_1,\dots,a_d) \in [\![0;9]\!]^{d-1} \times [\![1;9]\!],\ |\ \forall k \in [\![1;d]\!],\ a_{d-k} = a_k\} & \longrightarrow & A_d \\ (a_1,\dots,a_d) & \longmapsto & \overline{a_d \dots a_1} \end{array} \right.$$

et d'une bijection

$$g : \left\{ \begin{array}{lll} \{(a_1,\dots,a_d) \in [\![0;9]\!]^{d-1} \times [\![1;9]\!],\ |\ \forall k \in [\![1;d]\!],\ a_{d-k} = a_k\} & \longrightarrow & [\![1;9]\!] \times [\![0;9]\!]^{\lfloor (d+1)/2 \rfloor - 1} \\ (a_1,\dots,a_d) & \longmapsto & (a_1,\dots,a_{\lfloor (d+1)/2 \rfloor}) \end{array} \right.$$

Donc $N(d) = 9 \times 10^{\lfloor (d+1)/2 \rfloor - 1} = 9 \times 10^{\lfloor (d+1)/2 - 1 \rfloor} = 9 \times 10^{\lfloor (d-1)/2 \rfloor} \leq 9 \times 10^{(d-1)/2}$.

Finalement, $\displaystyle\sum_{n \in P} \frac{1}{n} \leq 9 \sum_{d=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{10}}\right)^d = \frac{9}{1 - \frac{1}{\sqrt{10}}} = \frac{9\sqrt{10}}{\sqrt{10}-1} < +\infty$.

Remarque : La base dans laquelle on travaille n'influe absolument pas le raisonnement. C'est-à-dire que si l'on note P_b l'ensemble des entiers naturels non nuls dont l'écriture en base $b \geq 2$ est un palindrome alors on a

$$\sum_{n \in P_b} \frac{1}{n} \leq (b-1) \sum_{d=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{b}}\right)^d = \frac{(b-1)\sqrt{b}}{\sqrt{b}-1} < +\infty$$

XIII.1.33 Calcul d'un équivalent ★★★★

[Enoncé]

Posons $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ S_n = n \ln(u_n) = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} k \ln k$ ainsi que $f : t \in \mathbb{R}_+^* \mapsto t \ln t$.

On veut une estimation du type $u_n \underset{n\to+\infty}{=} U_n(1+o(1))$ donc $\ln(u_n) \underset{n\to+\infty}{=} \ln(U_n) + \ln(1+o(1)) \underset{n\to+\infty}{=} \ln(U_n) + o(1)$.

Il faut donc estimer S_n à la précision $o(n)$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\forall t > 0,\ f'(t) = \ln t + 1$. Donc f est croissante sur $[e^{-1}, +\infty[\subset [1, +\infty[$.

Ainsi si $k \geq 1$ et $t \in [k, k+1]$ on a

$$k \ln k \leq t \ln t \leq (k+1)\ln(k+1)$$

Puis en intégrant de k à $k+1$ et en sommant de 1 à n,

$$S_n \leq \int_1^{n+1} t \ln t\ dt \leq S_n - 2\ln 2 + (n+1)\ln(n+1)$$

C'est à dire :

$$2\ln 2 - (n+1)\ln(n+1) + \int_1^{n+1} t \ln t\ dt \leq S_n \leq \int_1^{n+1} t \ln t\ dt$$

On va seulement utiliser la majoration et minorer S_n par 0. Calculons l'intégrale par IPP :

$\displaystyle\int_1^{n+1} t \ln t\ dt = \left[\frac{t^2}{2}\ln t\right]_1^{n+1} - \int_1^{n+1} \frac{t}{2}\ dt = \frac{(n+1)^2}{2}\ln(n+1) - \frac{(n+1)^2}{4} + \frac{1}{4}$.

On rappelle que $\ln(n+1) \underset{n\to+\infty}{\sim} \ln n$ car $\ln(n+1) - \ln n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{=} o(1) \underset{n\to+\infty}{=} o(\ln n)$.

Donc $\displaystyle\int_1^{n+1} t \ln t\ dt \underset{n\to+\infty}{=} \frac{n^2}{2}\ln n - \frac{n^2}{4} + o(n)$.

Posons $T_n = S_n - \dfrac{n^2 \ln n}{2} + \dfrac{n^2}{4}$. On souhaite estimer T_n à la précision $o(n)$ et comme sa définition fait intervenir une somme une bonne idée peut être d'essayer d'estimer $T_{n+1} - T_n$ à la précision $o(1)$ puis de sommer l'estimation

obtenue.

$$\begin{aligned}
T_{n+1}-T_n &= (n+1)\ln(n+1)-\frac{(n+1)^2}{2}\ln(n+1)+\frac{(n+1)^2}{4}+\frac{n^2}{2}\ln n-\frac{n^2}{4}\\
&\underset{n\to+\infty}{=} (n+1)\ln n+\frac{2n+1}{4}-\frac{2n+1}{2}\ln n+\left(\frac{(n+1)^2}{2}-n-1\right)\ln\left(1-\frac{1}{n+1}\right)+o(1)\\
&\underset{n\to+\infty}{=} \frac{\ln n}{2}+\frac{2n+1}{4}+\left(n+1-\frac{(n+1)^2}{2}\right)\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{2(n+1)^2}\right)+o(1)\\
&\underset{n\to+\infty}{=} \frac{\ln n}{2}+\frac{2n+1}{4}1-\frac{n+1}{2}-\frac{1}{4}+o(1)\\
&\underset{n\to+\infty}{=} \frac{1}{2}+\frac{\ln n}{2}+o(1)
\end{aligned}$$

Donc en sommant $T_n-T_1=\sum_{k=1}^{n-1}T_{k+1}-T_k \underset{n\to+\infty}{=} \frac{n}{2}+\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n-1}\ln k+o(n)$.

On montre classiquement par comparaison série-intégrale $\sum_{k=1}^{n-1}\ln k \underset{n\to+\infty}{=} n\ln n-n+o(n)$.

Par conséquent $T_n=\frac{n\ln n}{2}+o(n)$.

Par suite, $S_n=T_n+\frac{n^2\ln n}{2}-\frac{n^2}{4}\underset{n\to+\infty}{=}\frac{n\ln n}{2}-\frac{n^2}{4}+\frac{n^2\ln n}{2}+o(n)$.

Finalement,

$$\begin{aligned}
u_n &= \exp\left(\frac{S_n}{n}\right)\\
&\underset{n\to+\infty}{=} \exp\left(-\frac{n}{4}+\frac{(n+1)\ln n}{2}+o(1)\right)\\
&\underset{n\to+\infty}{=} n^{\frac{n+1}{2}}e^{-\frac{n}{4}}e^{o(1)}\\
&\underset{n\to+\infty}{\sim} n^{\frac{n+1}{2}}e^{-\frac{n}{4}}
\end{aligned}$$

Remarque : on peut vouloir faire apparaître une somme de Riemann pour f mais on obtient seulement $\ln(u_n)\underset{n\to+\infty}{\sim}-\frac{n}{4}+\frac{(n+1)\ln n}{2}$ *ce qui ne suffit pas pour conclure. Malheureusement f n'est que $\mathcal{C}^1$ sur $]0,1]$ donc l'exercice I.21 ne s'applique pas. Il faut donc tout de même montrer par le calcul que* $T_n\underset{n\to+\infty}{=}o(1)$.

XIII.1.34 Sommation de relations de comparaison ★

[Enoncé]

Non ! Le théorème du cours nous dit qu'on a la conclusion lorsque l'une des suites est de signe constant APCR (elles sont de toute façon de même signe APCR). Trouvons un contre exemple.

Les suites de terme général $u_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ et $v_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}+\frac{1}{n}$ sont équivalentes. Or $\sum_{n\in\mathbb{N}^*}u_n$ converge par critère spécial et $\sum_{n\in\mathbb{N}^*}v_n$ diverge comme somme d'une série convergente et d'une série divergente.

XIII.1.35 Equivalent de séries de Riemann ★

[Enoncé]

1re méthode : Sommation de relations de comparaison

On remarque que $\frac{1}{n^\alpha}-\frac{1}{(n+1)^\alpha}=\frac{(n+1)^\alpha-n^\alpha}{n^\alpha(n+1)^\alpha}=\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^\alpha-1}{(n+1)^\alpha}\underset{n\to+\infty}{\sim}\frac{\alpha}{n^{\alpha+1}}$.

La suite $\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)$ est positive donc

— si $\alpha<1$, $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^\alpha}\underset{n\to+\infty}{\sim}\frac{1}{\alpha-1}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k^{\alpha-1}}-\frac{1}{(k+1)^{\alpha-1}}\right)\underset{n\to+\infty}{\sim}\frac{n^{1-\alpha}}{1-\alpha}$;

— si $\alpha > 1$, $\displaystyle\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{\alpha-1} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k^{\alpha-1}} - \frac{1}{(k+1)^{\alpha-1}}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$.

2nd méthode : Comparaison série-intégrale

On pose $f_\alpha : t \mapsto \dfrac{1}{t^\alpha}$. f_α est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\forall t > 0,\ f'_\alpha(t) = -\dfrac{\alpha}{t^{\alpha+1}}$ est du signe de $-\alpha$.

Fixons $k \in \mathbb{N}^*$. Soit $t \in [k, k+1]$.

Si $\alpha < 0$ alors $f_\alpha(k) \leq f_\alpha(t) \leq f_\alpha(k+1)$. D'où en intégrant sur $[k, k+1]$:

$$f_\alpha(k) \leq \int_k^{k+1} f_\alpha(t)dt \leq f_\alpha(k+1)$$

Puis en sommant de 1 à $n-1$:

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_1^n \frac{dt}{t^\alpha} \leq \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^\alpha}$$

Càd

$$1 + \frac{n^{1-\alpha}-1}{1-\alpha} = 1 + \int_1^n \frac{dt}{t^\alpha} \leq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{1}{n^\alpha} + \int_1^n \frac{dt}{t^\alpha} = \frac{1}{n^\alpha} + \frac{n^{1-\alpha}-1}{1-\alpha}$$

Si $0 \leq \alpha < 1$ on obtient les même inégalités dans l'autre sens, donc dans ces deux cas $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^\alpha} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{n^{1-\alpha}}{1-\alpha}$ par encadrement.

Si $\alpha > 1$ on somme plutôt de n à $+\infty$:

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_n^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} \leq \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}$$

Càd

$$\frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}} - \frac{1}{n^\alpha} = \int_n^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} - \frac{1}{n^\alpha} \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_n^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} = \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$$

Donc $\displaystyle\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$ par encadrement.

XIII.1.36 Séries de Bertrand ★★

[Enoncé]

Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

— Si $\alpha > 1$: on se donne $\gamma \in]1, \alpha[$.
$\dfrac{1}{n^\alpha \ln(n)^\beta} = o\left(\dfrac{1}{n^\gamma}\right)$ car $\gamma < \alpha$ et $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^\gamma}$ converge car $\gamma > 1$. En outre la suite $\left(\dfrac{1}{n^\gamma}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est positive.
On en déduit que $\displaystyle\sum_{n\geq 2} \frac{1}{n^\alpha \ln(n)^\beta}$ converge ;

— Si $\alpha < 1$: on se donne $\gamma \in]\alpha, 1[$.
$\dfrac{1}{n^\gamma} = o\left(\dfrac{1}{n^\alpha \ln(n)^\beta}\right)$ car $\gamma > \alpha$ et $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^\gamma}$ diverge car $\gamma < 1$. En outre la suite $\left(\dfrac{1}{n^\gamma}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est positive.
On en déduit que $\displaystyle\sum_{n\geq 2} \frac{1}{n^\alpha \ln(n)^\beta}$ diverge ;

— Si $\alpha = 1$: on pose $f_\beta : t \mapsto \dfrac{1}{t\ln(t)^\beta}$.

- Si $\beta < 0$: $\forall x, y \in [2, +\infty[,\ x \leq y \implies x\ln(x)^\beta \geq y\ln(y)^\beta \implies f_\beta(x) \leq f_\beta(y)$.
Fixons $k \in \mathbb{N}^*$. Soit $t \in [k, k+1]$.
Alors $f_\beta(k) \leq f_\beta(t) \leq f_\beta(k+1)$. D'où en intégrant sur $[k, k+1]$:

$$f_\beta(k) \leq \int_k^{k+1} f_\beta(t)dt \leq f_\beta(k+1)$$

Puis en sommant de 2 à $n-1$:

$$\sum_{k=2}^{n-1}\frac{1}{k^\beta}\leq\int_2^n\frac{dt}{t^\beta}\leq\sum_{k=3}^{n}\frac{1}{k^\beta}$$

Càd

$$\frac{1}{2\ln(2)^\beta}+\int_2^n\frac{dt}{t\ln(t)^\beta}\leq\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k\ln(k)^\beta}\leq\frac{1}{n\ln(n)^\beta}+\int_2^n\frac{dt}{t\ln(t)^\beta}$$

On calcule avec $\beta\neq1$, $\displaystyle\int_2^n\frac{dt}{t\ln(t)^\beta}=\left[\frac{\ln(t)^{1-\beta}}{1-\beta}\right]_2^n=\frac{1}{1-\beta}\left(\ln(n)^{1-\beta}-\ln(2)^{1-\beta}\right)$.

Donc comme $\dfrac{\ln(n)^{1-\beta}}{1-\beta}\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}+\infty$, $\displaystyle\sum_{n\geq2}\frac{1}{n\ln(n)^\beta}$ diverge ;

- Si $\beta>0$: f_β est décroissante donc on a les mêmes inégalités dans l'autre sens.

  Si $\beta<1$, $\dfrac{1}{n\ln(n)^\beta}+\dfrac{\ln(n)^{1-\beta}}{1-\beta}\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}+\infty$ donc $\displaystyle\sum_{n\geq2}\frac{1}{n\ln(n)^\beta}$ diverge.

  Si $\beta>1$, $\dfrac{\ln(n)^{1-\beta}}{1-\beta}\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}0$ donc la série $\displaystyle\sum_{n\geq2}\frac{1}{n\ln(n)^\beta}$ est majorée. Etant à termes positifs elle converge.

  Enfin si $\beta=1$ alors $\displaystyle\int_2^n\frac{dt}{t\ln(t)}=\ln(\ln(n))-\ln(\ln(2))\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}+\infty$ donc $\displaystyle\sum_{n\geq2}\frac{1}{n\ln(n)^\beta}$ diverge.

XIII.1.37 Critère de Raabe-Duhamel ★★

[Enoncé]

1. APCR, on a $\dfrac{v_n}{u_n}\leq\dfrac{v_{n+1}}{u_{n+1}}$ c'est-à-dire $\left(\dfrac{v_n}{u_n}\right)$ est croissante APCR. Donc, pour un certain $N\in\mathbb{N}$, on a pour tout $n\geq N$, $\dfrac{v_N}{u_N}\leq\dfrac{v_n}{u_n}$, c'est-à-dire $0\leq u_n\leq\dfrac{u_N}{v_N}v_n$
   Et donc $u_n\underset{n\to+\infty}{=}\mathcal{O}(v_n)$

2. — Soit $\gamma\in]1,\alpha[$. On remarque que $\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^\gamma=\left(1-\dfrac{1}{n+1}\right)^\gamma\underset{n\to+\infty}{=}1-\dfrac{\gamma}{n}+\mathcal{o}\left(\dfrac{1}{n}\right)$.
   Ainsi $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}-\dfrac{n^\gamma}{(n+1)^\gamma}\underset{n\to+\infty}{=}\dfrac{\gamma-\alpha}{n}+\mathcal{o}\left(\dfrac{1}{n}\right)$.
   Donc $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\leq\dfrac{n^\gamma}{(n+1)^\gamma}$. Et d'après la question 1, on a : $u_n\underset{n\to+\infty}{=}\mathcal{O}\left(\dfrac{1}{n^\gamma}\right)$.
   Et donc $\displaystyle\sum_{n\geq0}u_n$ converge.

   — On prend cette fois $\gamma\in]\alpha,1[$. On a : $\dfrac{1}{n^\gamma}\mathcal{o}(u_n)$, et donc $\displaystyle\sum_{n\geq0}u_n$ diverge.

   — On peut prendre $u_n=\dfrac{1}{n}$ et $v_n=\dfrac{1}{n\ln(n)^2}$ pour montrer que l'on ne peut conclure quand $\alpha=1$.

XIII.1.38 Règle de d'Alembert ★★

[Enoncé]

— Supposons $\ell<1$. Soit $\varepsilon>0$. Par hypothèse $\exists n_0\in\mathbb{N},\ \forall n\geq n_0,\ \left|\dfrac{u_{n+1}}{u_n}-\ell\right|\leq\varepsilon$.
D'où comme $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est positive, $\forall n\geq n_0,\ u_{n+1}\leq u_n(\ell+\varepsilon)$.
Par récurrence immédiate $\forall n\geq n_0,\ u_n\leq u_{n_0}(\ell+\varepsilon)^{n-n_0}$. Alors en prenant $\varepsilon\in]0,1-\ell[$, $0\leq\ell+\varepsilon<1$ donc la série $\displaystyle\sum_{n\in\mathbb{N}}(\ell+\varepsilon)^n$ converge et par suite $\displaystyle\sum_{n\in\mathbb{N}}u_n$ converge.

— Si $\ell > 1$ alors $\exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geq n_0,\ \dfrac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$. Donc $\forall n \geq n_0,\ u_{n+1} \geq u_n \geq u_{n_0} > 0$. Ainsi $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$ diverge grossièrement.

Montrons que dans le cas $\ell = 1$ la série peut diverger ou converger.
Pour $u_n = \dfrac{1}{n}$, $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{n+1}{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$ et la série $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} \dfrac{1}{n}$ diverge.
Pour $u_n = \dfrac{1}{n^2}$, $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{(n+1)^2}{n^2} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$ et la série $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} \dfrac{1}{n^2}$ converge.

XIII.1.39 Règle de Cauchy ★★

[Enoncé]

— Supposons $\ell < 1$. Soit $\varepsilon > 0$. Par hypothèse $\exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geq n_0,\ \left|\sqrt[n]{u_n} - \ell\right| \leq \varepsilon$.
D'où $\forall n \geq n_0,\ u_n \leq (\ell+\varepsilon)^n$. Alors en prenant $\varepsilon \in]0, 1-\ell[$, $0 \leq \ell+\varepsilon < 1$ donc la série $\sum_{n\in\mathbb{N}} (\ell+\varepsilon)^n$ converge et par suite $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$ converge.

— Si $\ell > 1$ alors $\exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geq n_0,\ \sqrt[n]{u_n} \geq 1$. Donc $\forall n \geq n_0,\ u_n \geq 1$. Ainsi $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$ diverge grossièrement.

Montrons que dans le cas $\ell = 1$ la série peut diverger ou converger.
Pour $u_n = \left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$, $\sqrt[n]{u_n} = 1 + \dfrac{1}{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$ et la série $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} \left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$ diverge grossièrement.
($u_n = \dfrac{1}{n}$ fonctionne aussi.)
Pour $u_n = \dfrac{1}{n^2}$, $\sqrt[n]{u_n} = n^{-2/n} = \exp\left(-\dfrac{2\ln n}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$ et la série $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} \dfrac{1}{n^2}$ converge.

XIII.1.40 d'Alembert ⇒ Cauchy ★★★

[Enoncé]

1. — Supposons $\ell \in \mathbb{R}_+$. Soit $\varepsilon > 0$. Par hypothèse $\exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geq n_0,\ (1-\varepsilon)\ell \leq \dfrac{u_{n+1}}{u_n} \leq (1+\varepsilon)\ell$.
Càd comme $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est positive, $\forall n \geq n_0,\ u_n(1-\varepsilon)\ell \leq u_{n+1} \leq u_n(1+\varepsilon)\ell$.
Par récurrence immédiate $\forall n \geq n_0,\ \dfrac{u_{n_0}}{(1-\varepsilon)^{n_0}\ell^{n_0}}(1-\varepsilon)^n\ell^n \leq u_n \leq \dfrac{u_{n_0}}{(1+\varepsilon)^{n_0}\ell^{n_0}}(1+\varepsilon)^n\ell^n$.
D'où $\forall n \geq n_0,\ \dfrac{u_{n_0}}{\ell^{n_0}}(1-\varepsilon)^n\ell^n \leq u_n \leq \dfrac{u_{n_0}}{\ell^{n_0}}(1+\varepsilon)^n\ell^n$.
D'où $\forall n \geq n_0,\ \sqrt[n]{\dfrac{u_{n_0}}{\ell^{n_0}}}(1-\varepsilon)\ell \leq \sqrt[n]{u_n} \leq \sqrt[n]{\dfrac{u_{n_0}}{\ell^{n_0}}}(1+\varepsilon)\ell$.
Or $\sqrt[n]{\dfrac{u_{n_0}}{\ell^{n_0}}} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$ donc on peut trouver $n_1 \in \mathbb{N}$ pour lequel $\forall n \geq n_1,\ \left|\sqrt[n]{\dfrac{u_{n_0}}{\ell^{n_0}}} - 1\right| \leq \varepsilon$.
Alors pour tout $n \geq \max(n_0, n_1)$, $(1-\varepsilon)^2\ell \leq \sqrt[n]{u_n} \leq (1+\varepsilon)^2\ell$.
Finalement $\sqrt[n]{u_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell$.

— Supposons $\ell = +\infty$. Soit $A > 0$. Par hypothèse $\exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geq n_0,\ \dfrac{u_{n+1}}{u_n} \geq A$.
Càd comme $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est positive, $\forall n \geq n_0,\ u_{n+1} \geq u_n A$.
Par récurrence immédiate $\forall n \geq n_0,\ u_n \geq u_{n_0}A^{n-n_0}$.
D'où $\forall n \geq n_0,\ \sqrt[n]{u_n} \geq \sqrt[n]{\dfrac{u_{n_0}}{A^{n_0}}}A$.
Or $\sqrt[n]{\dfrac{u_{n_0}}{A^{n_0}}} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$ donc on peut trouver $n_1 \in \mathbb{N}$ pour lequel $\forall n \geq n_1,\ \sqrt[n]{\dfrac{u_{n_0}}{A^{n_0}}} \geq \dfrac{1}{2}$.
Alors pour tout $n \geq \max(n_0, n_1)$, $\sqrt[n]{u_n} \geq \dfrac{A}{2}$.
Finalement $\sqrt[n]{u_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$.

2. Soit $\varepsilon > 0$. On pose $v_n = \dfrac{u_n}{(\ell+\varepsilon)^n}$ et $w_n = \dfrac{(\ell-\varepsilon)^n}{u_n}$. Les suites $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont à termes strictement positifs.
De plus $\dfrac{v_{n+1}}{v_n} = \dfrac{u_{n+1}}{u_n}(\ell+\varepsilon)^{-1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \dfrac{\ell}{\ell+\varepsilon} < 1$ et $\dfrac{w_{n+1}}{w_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \dfrac{\ell-\varepsilon}{\ell} < 1$.
Donc par le critère de d'Alembert les séries $\sum_{n\in\mathbb{N}} v_n$ et $\sum_{n\in\mathbb{N}} w_n$ converge. Leur terme général est donc de limite nulle d'où APCR $\ell-\varepsilon \leq \sqrt[n]{u_n} \leq \ell+\varepsilon$.
3. On considère $x_n = \ln\left(\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\right)$. Par continuité de ln, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers $\ln(\ell)$ (avec les conventions $\ln(0) = -\infty$, $\ln(+\infty) = +\infty$). Donc d'après le lemme de Césaro

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \ln(u_{k+1}) - \ln(u_k) = \frac{\ln(u_n) - \ln(u_0)}{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ln(\ell)$$

Donc $\dfrac{\ln(u_n)}{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ln(\ell)$ puis par continuité de exp, $\sqrt[n]{u_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell$.
4. La réciproque est fausse. Pour $u_n = 2 + (-1)^n$:
   — $\sqrt[2n]{u_{2n}} = e^{\ln(3)/n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$ et $\sqrt[2n+1]{u_{2n+1}} = 1 \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$ donc $\sqrt[n]{u_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$;
   — $\dfrac{u_{2n+2}}{u_{2n+1}} = 3 \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 3$ et $\dfrac{u_{2n+1}}{u_{2n}} = \dfrac{1}{3} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \dfrac{1}{3}$ donc $\left(\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ n'admet pas de limite.

XIII.1.41 Transformation d'Abel et règle d'Abel ★★

[Enoncé]

Une série de Dirichlet

XIII.1.42 Equation différentielle discrète ★★★

[Enoncé]

1. La série $\sum a_n^2$ est à termes positifs donc la suite (S_n) converge ou diverge vers $+\infty$.
Supposons qu'elle converge vers un certain $l \in \mathbb{R}$. Puisque pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n \geq a_1^2 > 0$, l est strictement positif. Donc (a_n) converge vers $\dfrac{1}{l}$. Or ceci est absurde car $\sum a_n^2$ divergerait grossièrement. Par conséquent, la série $\sum a_n^2$ diverge vers $+\infty$ et a_n tend vers 0.
2. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $y \in [S_{n-1}, S_n]$
Par croissance de $t \to t^2$ sur $\mathbb{R}^+$,

$$(S_n - S_{n-1})S_{n-1}^2 \leq \int_{S_{n-1}}^{S_n} t^2 dt \leq (S_n - S_{n-1})S_n^2$$

On remarque que $(S_n - S_{n-1})S_{n-1}^2 = a_n^2 S_{n-1}^2 = a_n^2(S_n - a_n)^2 = a_n^2 S_n^2 - 2S_n a_n^3 + a_n^4$
Puisque $\lim_{n\to+\infty} a_n S_n = 1$ et $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$, on en déduit que $\int_{S_{n-1}}^{S_n} t^2 dt \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$ d'après le théorème des gendarmes.
3. On remarque que $\sum_{k=1}^{n} \int_{S_{k-1}}^{S_k} t^2 dt = \int_0^{S_n} t^2 dt = \dfrac{S_n^3}{3}$.
Or $\int_{S_{n-1}}^{S_n} t^2 \underset{n\to+\infty}{\sim} 1$ donc par sommation de relation de comparaison pour les séries divergentes à termes positifs, $\sum_{k=1}^{n} \int_{S_{k-1}}^{S_k} t^2 dt \underset{n\to+\infty}{\sim} n$. Par conséquent, on a $S_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt[3]{3n}$.
Et finalement $a_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \dfrac{1}{\sqrt[3]{3n}}$.

XIII.1.43 Critère spécial des séries alternées

[Enoncé]

XIII.1.44 Calcul d'une somme de série (1) ★★★

[Enoncé]

$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. $\dfrac{1}{u_n} \underset{n\to+\infty}{=} \mathcal{O}\left(\dfrac{1}{n^3}\right)$ donc $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{1}{u_n}$ converge par comparaison à une série de Riemann.

On décompose en éléments simples $F(X) = \dfrac{6}{X(X+1)(2X+1)} = \dfrac{a}{X} + \dfrac{b}{X+1} + \dfrac{c}{2X+1}$.

$$\begin{cases} a = \lim\limits_{x\to 0} xF(x) = 6 \\ b = \lim\limits_{x\to -1} (x+1)F(x) = 6 \\ c = \lim\limits_{x\to -\frac{1}{2}} (2x+1)F(x) = -24 \end{cases} \qquad \text{Donc } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{u_n} = 6\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} - \frac{4}{2n+1}$$

Posons pour $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{u_k}$ ainsi que $H_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

On montre classiquement que $H_n \underset{n\to+\infty}{=} \ln(n) + \gamma + o(1)$ où γ est une constante.

Ainsi,

$$\begin{aligned} \frac{1}{6}S_n &= H_n + H_{n+1} - 1 - 4\left(\sum_{k=2}^{2n+1} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2k}\right) \\ &= H_n + H_{n+1} - 1 - 4\left(H_{2n+1} - 1\right) + 2H_n \\ &\underset{n\to+\infty}{=} 3\ln(n) + \gamma + \ln(n+1) + 3\gamma + 3 - 4\ln(2n+1) - 4\gamma + o(1) \\ &\underset{n\to+\infty}{=} \ln\left(\frac{n^3(n+1)}{(2n+1)^4}\right) + 3 + o(1) \\ &\underset{n\to+\infty}{=} 3 - \ln(16) + o(1) \end{aligned}$$

Finalement, $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{u_n} = 18 - 24\ln(2)$.

XIII.1.45 Calcul d'une somme de série (2) ★

[Enoncé]

1re méthode :

$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{1+\frac{k}{n}}$. La fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x}$ est continue sur $[0,1]$ donc $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge et,

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{1-0}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)dx = \ln 2.$$

2me méthode :

$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = \displaystyle\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} = H_{2n} - H_n$, avec $H_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$. En utilisant le développement asymptotique classique de la série harmonique, $u_n \underset{n\to+\infty}{=} \ln(2n) + \gamma - \ln(n) - \gamma + o(1) \underset{n\to+\infty}{=} \ln(2) + o(1) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ln(2)$.

XIII.1.46 Calcul d'une somme de série (3) ★★★

[Enoncé]

XIII.1.47 Calcul d'une somme de série (4) ★★

[Enoncé]
arctan est positive sur $\mathbb{R}_+$ donc le calcul justifiera la convergence.
On rappelle la formule $\tan(a-b) = \dfrac{\tan(a)-\tan(b)}{1+\tan(a)\tan(b)}$ qui est vraie dès lors que $\tan(a), \tan(b)$ sont bien définis et que le dénominateur ne s'annule pas.
Donc si $xy \neq -1$, en prenant $a = \arctan(x)$ et $b = \arctan(y)$ et en composant l'égalité par arctan on obtient :

$$\arctan(x) - \arctan(y) = \arctan\left(\frac{x-y}{1+xy}\right)$$

Pour $x = n+1$ et $y = n$ cela donne $\arctan(n+1) - \arctan(n) = \arctan\left(\dfrac{n+1-n}{1+(n+1)n}\right) = \arctan\left(\dfrac{1}{n^2+n+1}\right)$.
Ainsi $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \arctan\left(\frac{1}{n^2+n+1}\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \arctan(n+1) - \arctan(n) = \lim_{n\to+\infty} \arctan(n) - \arctan(0) = \frac{\pi}{2}$.

XIII.1.48 Calcul d'une somme de série (5)

[Enoncé]

XIII.1.49 Calcul d'une somme de série (6)

[Enoncé]

XIII.1.50 Calcul d'une somme de série (7) ★★

[Enoncé]
Comme tous les termes sont positifs on peut calculer dans $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$.
Par le théorème de Fubini, $\displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\zeta(n)-1}{n} = \sum_{n=2}^{+\infty}\sum_{k=2}^{+\infty} \frac{1}{nk^n} = \sum_{k=2}^{+\infty}\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{nk^n}$.
Comme $\forall k \geq 2,\ \dfrac{1}{k} \in]-1,1[$ on reconnaît le développement en série entière de $x \mapsto -\ln(1-x)$ en $\dfrac{1}{k}$:
$\displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\zeta(n)-1}{n} = \sum_{k=2}^{+\infty} -\ln\left(1-\frac{1}{k}\right) - \frac{1}{k} = \sum_{k=2}^{+\infty} \ln(k) - \ln(k-1) - \frac{1}{k}$.
Pour finir passons par les sommes partielles :
$\forall n \geq 2,\ \displaystyle\sum_{k=2}^{n} \ln(k) - \ln(k-1) - \frac{1}{k} = \ln(n) + 1 - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$. Or on montre classiquement que $\left(\ln(n) - \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}\right)$ converge (cf. I.3) et on note la limite $-\gamma$.
Ainsi $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\zeta(n)-1}{n} = 1-\gamma$.

XIII.1.51 Calcul d'une somme de série (8) ★★★★

[Enoncé]
Tous les termes de la somme sont positifs donc on peut calculer dans $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ sans se soucier de questions de

convergence.

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\varphi(n)}{a^n-1} &= \sum_{n=1}^{+\infty} a^{-n}\frac{\varphi(n)}{1-a^{-n}}\\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} a^{-n}\varphi(n)\sum_{k=0}^{+\infty} a^{-kn} && (a^{-n}<1)\\ &= \sum_{n=1}^{+\infty}\sum_{k=1}^{+\infty}\varphi(n)a^{-kn}\\ &= \sum_{(n,k)\in(\mathbb{N}^*)^2}\varphi(n)a^{-kn}\end{aligned}$$

Or $\{(n,nk),\ (n,k)\in(\mathbb{N}^*)^2\} = \bigsqcup_{m=1}^{+\infty}\{(n,nk)\mid (n,k)\in(\mathbb{N}^*)^2,\ nk=m\} = \bigsqcup_{m=1}^{+\infty}\left\{\left(\frac{m}{k},m\right)\mid (k,m)\in(\mathbb{N}^*)^2,\ k|m\right\}$.
Donc par le théorème de sommation par paquets,

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\varphi(n)}{a^n-1} &= \sum_{(k,m)\in(\mathbb{N}^*)^2}\varphi(n)a^{-kn}\\ &= \sum_{m=1}^{+\infty}\sum_{k|m}\varphi\left(\frac{m}{k}\right)a^{-m}\\ &= \sum_{m=1}^{+\infty}a^{-m}\sum_{k|m}\varphi(k)\end{aligned}$$

La dernière égalité étant vrai car $k\mapsto\frac{m}{k}$ est une bijection de l'ensemble des diviseurs positifs de m dans lui-même.
Enfin on montre classiquement que $\sum_{k|m}\varphi(k)=m$ (cf.[Indicatrice d'Euler], tome Algèbre).

Donc $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\varphi(n)}{a^n-1}=\sum_{m=1}^{+\infty}ma^{-m}$.
Enfin $\sum_{m=1}^{+\infty}ma^{-m}=a^{-1}f'(a^{-1})$ avec $f:x\in[0,1[\mapsto\sum_{m=1}^{+\infty}x^m=\frac{1}{1-x}$.
Ainsi $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\varphi(n)}{a^n-1}=\frac{a^{-1}}{(1-a^{-1})^2}=\frac{a}{(a-1)^2}$.

XIII.1.52 Calcul d'une somme de série (9)

[Enoncé]

XIII.1.53 Décomposition en éléments simples infinie

[Enoncé]

XIII.1.54 Problème de Bâle

[Enoncé]

Lemme de Riemann-Lebesgue

1. cf. II.36. Il suffira ensuite de prendre la partie réelle et la partie imaginaire pour obtenir le résultat.

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
Par intégration par parties, on a
$$\int_0^\pi x\cos(nx)dx = \frac{-1+(-1)^n}{n^2}$$
et
$$\int_0^\pi x^2\cos(nx)dx = \frac{2(-1)^n\pi}{n^2}$$
Il suffit donc de prendre $u=-1$ et $v=\frac{1}{2\pi}$ pour avoir
$$\int_0^{pi} (ax+bx^2)\cos(nx)dx = \frac{1}{n^2}$$

3. Soit $x \in]0,\pi]$. Puisque $e^{ix} \neq 1$,
$$\sum_{k=1}^n e^{ikx} = e^{ix}\frac{e^{inx}-1}{e^{ix}-1} = e^{i\frac{(n+1)x}{2}}\frac{e^{i\frac{nx}{2}}-e^{-i\frac{nx}{2}}}{e^{i\frac{x}{2}}-e^{-i\frac{x}{2}}} = e^{i\frac{(n+1)x}{2}}\frac{\sin\left(\frac{nx}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$$
Ainsi, en passant à la partie réelle,
$$\sum_{k=1}^n \cos(kx) = \frac{\sin\left(\frac{nx}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$$

4. φ est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0,\pi]$.
De plus, $\lim\limits_{x\to 0}\varphi(x) = 2$ car $\sin\left(\frac{x}{2}\right) \underset{x\to 0}{\sim} \frac{x}{2}$.
Pour tout $x \in]0,1]$,
$$\varphi'(x) = \frac{\sin\left(\frac{x}{2}\right)-\frac{x}{2}\cos\left(\frac{x}{2}\right)}{\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}$$
On sait que $\sin\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{x}{2} + {}_{x\to 0}(x^2)$ et $\cos\left(\frac{x}{2}\right) = 1 + {}_{x\to 0}(x)$ donc
$$\varphi'(x) = {}_{x\to 0}(1)$$
et donc
$$\lim_{x\to 0}\varphi'(x) = 0$$
Donc φ est prolongeable par continuité en une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,\pi]$.

5. Soit $p \in \mathbb{N}^*$
$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^p \frac{1}{n^2} &= \sum_{n=1}^p \int_0^\pi (ux+vx^2)\cos(nx)dx \\
&= \int_0^\pi (ux+vx^2)\sum_{n=1}^p \cos(nx)dx \\
&= \int_0^\pi (u+vx)\left(\frac{1}{2}\varphi(x)\sin\left(\left(p+\frac{1}{2}\right)x\right) - \frac{x}{2}\right)dx \\
&= \frac{1}{2}\int_0^\pi (u+vx)\varphi(x)\sin\left(\left(p+\frac{1}{2}\right)x\right)dx - \frac{1}{2}\int_0^\pi (ux+vx^2)dx
\end{aligned}$$
La fonction $x \mapsto (u+vx)\varphi(x)$ étant de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,\pi]$, on peut appliquer la question 1 :
$$\lim_{p\to+\infty}\int_0^\pi (u+vx)\varphi(x)\sin\left(\left(p+\frac{1}{2}\right)x\right)dx = 0$$
Par conséquent, on a :
$$\lim_{p\to+\infty}\sum_{n=1}^p \frac{1}{n^2} = -\frac{1}{2}\int_0^\pi (ux+vx^2)dx = -\frac{u\pi^2}{4} - \frac{v\pi^3}{6} = \frac{\pi^2}{6}$$
d'où :
$$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$$

6. On remarque qu'il s'agit de la somme des $\frac{1}{n^2}$ mais seulement en gardant les termes pour n impairs. Cette somme est plus petite que $\zeta(2)$ à termes positifs donc elle converge.
   Ainsi
   $$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \zeta(2) - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n)^2}$$
   Donc :
   $$\sum_{n=1}^{+\infty} = \left(1 - \frac{1}{4}\right)\zeta(2) = \frac{3}{4}\zeta(2) = \frac{\pi^2}{8}$$
7. On peut appliquer le CSSA sinon on peut simplement dire que la série converge absolument donc elle converge.
   On réapplique la même méthode. On cherche des constantes u et v tels que
   $$\forall n \in \mathbb{N}^*, \int_0^\pi (ux + vx^2)\cos(nx)dx = \frac{(-1)^n}{n^2}$$
   On constate que pour $u = 0$ et $v = -\frac{1}{2\pi}$, on obtient bien le résultat pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
   On a encore :
   $$\lim_{p\to+\infty} \sum_{n=1}^{p} \frac{(-1)^n}{n^2} = -\frac{u\pi^2}{4} - \frac{v\pi^3}{6} = \frac{\pi^2}{12}$$

Série de fonctions

Série entière

XIII.1.55 Nombre moyen de diviseurs d'un entier ★★★★

[Enoncé]

1. Soit $x \in [1, +\infty[$.
   $$\begin{aligned} F(x) &= \sum_{n=1}^{\lfloor x\rfloor} \sum_{d|n} 1 \\ &= \sum_{n=1}^{\lfloor x\rfloor} \sum_{\substack{(d,d')\in[\![1;x]\!]^2 \\ dd'=n}} 1 \\ &= \sum_{\substack{(d,d')\in[\![1;x]\!]^2 \\ dd'\in[\![1;x]\!]}} 1 \\ &= \sum_{d\le x} \sum_{d'\le \frac{x}{d}} 1 \\ &= \sum_{d=1}^{\lfloor x\rfloor} \lfloor \frac{x}{d} \rfloor \end{aligned}$$
   Or, $\forall d \in [\![1; x]\!]$, $\frac{x}{d} - 1 < \lfloor \frac{x}{d} \rfloor \le \frac{x}{d}$.
   On en déduit l'encadrement :
   $$\sum_{d=1}^{\lfloor x\rfloor} \left(\frac{x}{d} - 1\right) < F(x) \le \sum_{d=1}^{\lfloor x\rfloor} \frac{x}{d}$$
   Ou encore,
   $$x\sum_{d=1}^{\lfloor x\rfloor} \frac{1}{d} - \lfloor x\rfloor < F(x) \le x\sum_{d=1}^{\lfloor x\rfloor} \frac{1}{d}$$
   Or on sait que $\sum_{d=1}^{\lfloor x\rfloor} \frac{1}{d} \underset{x\to+\infty}{\sim} \ln\lfloor x\rfloor \underset{x\to+\infty}{\sim} \ln x$.
   Donc par encadrement, $F(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} x\ln x$.

2. Il ne sert à rien de pousser le développement de $\sum_{d=1}^{\lfloor x\rfloor}\frac{1}{d}$ un cran plus loin car dans l'encadrement de $F(x)$ ci-dessus, l'écart entre le majorant et le minorant est en $\mathcal{O}(x)$. Pour avoir un développement asymptotique à l'ordre 2 on va utiliser une autre expression de $F(x)$. L'idée est de couper la somme $F(x)=\sum_{\substack{(d,d')\in[\![1;x]\!]^2\\ dd'\in[\![1;x]\!]}}1$ selon la position de d et d' par rapport à $\sqrt{x}$. Si $dd'\leq x$, on a toujours $d\leq\sqrt{x}$ ou $d'\leq\sqrt{x}$. Par conséquent, on a

$$F(x)=2\sum_{\substack{d\in[\![1;\sqrt{x}]\!]\\ dd'\in[\![1;x]\!]}}1-\sum_{(d,d')\in[\![1;\sqrt{x}]\!]^2}1$$

ce qui donne

$$F(x)=2\sum_{d\leq\sqrt{x}}\lfloor\frac{x}{d}\rfloor-\lfloor\sqrt{x}\rfloor^2$$

et alors,

$$\forall u\in\mathbb{R},\ u-1<\lfloor u\rfloor\leq u\implies 2\sum_{d=1}^{\lfloor\sqrt{x}\rfloor}\left(\frac{x}{d}-1\right)-x\leq F(x)\leq 2\sum_{d=1}^{\lfloor\sqrt{x}\rfloor}\frac{x}{d}-(\sqrt{x}-1)^2$$

$$\implies F(x)\underset{x\to+\infty}{=}2x\sum_{d=1}^{\lfloor\sqrt{x}\rfloor}\frac{1}{d}+\mathcal{O}\big(\sqrt{x}\big)-x+\mathcal{O}\big(\sqrt{x}\big)$$

Avec

$$\begin{aligned}\sum_{d=1}^{\lfloor\sqrt{x}\rfloor}\frac{1}{d}&\underset{x\to+\infty}{=}\ln\lfloor\sqrt{x}\rfloor+\gamma+\mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\\&\underset{x\to+\infty}{=}\ln(\sqrt{x}+\mathcal{O}(1))+\gamma+\mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\\&\underset{x\to+\infty}{=}\ln(\sqrt{x})+\ln\left(1+\mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\right)+\gamma+\mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\\&\underset{x\to+\infty}{=}\frac{1}{2}\ln x+\gamma+\mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\end{aligned}$$

On obtient enfin,

$$F(x)\underset{x\to+\infty}{=}x\ln x+(2\gamma-1)x+\mathcal{O}\big(\sqrt{x}\big)$$

XIII.1.56 Théorème de réarrangement de Riemann ★★★★★

[Enoncé]

Montrons dans un premier temps que la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ prend une infinité de valeurs positives et négatives. On note $P=\{n\in\mathbb{N},\ a_n\geq 0\}$ et $N=\mathbb{N}\setminus P=\{n\in\mathbb{N},\ a_n<0\}$

Supposons par l'absurde que $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ prenne un nombre fini de valeurs négatives.

Alors on peut noter $n_0=\max N$ et dans ce cas la série $\sum_{n\in\mathbb{N}}a_n$ est de même nature que $\sum_{n>n_0}a_n=\sum_{n>n_0}|a_n|$. Donc $\sum_{n\in\mathbb{N}}a_n$ diverge ce qui est absurde.

De même, $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ne peut pas prendre un nombre fini de valeurs positives.

P admet alors un minimum en tant que partie non vide de $\mathbb{N}$.

On va construire σ par récurrence :

on pose $\sigma(0)=0$, $S_n=\sum_{k=0}^{n}a_{\sigma(k)}$ et pour tout $n\in\mathbb{N}$, $\sigma(n+1)=\begin{cases}\min(P\setminus\{\sigma(k),\ k\in[\![0;n]\!]\}) & \text{si } S_n<\alpha\\ \min(N\setminus\{\sigma(k),\ k\in[\![0;n]\!]\}) & \text{si } S_n\geq\alpha\end{cases}$

σ est injective par définition. Montrons qu'elle est surjective.

Supposons par l'absurde qu'il existe $k\in\mathbb{N}^*$ qui ne soit pas dans l'image de σ (0 l'est par définition). Deux cas se posent :

— Si $k \in P$, alors σ ne prend qu'un nombre fini de valeurs dans P (incluses dans $[\![0; k-1]\!]$), donc à partir du rang $k+1$, σ est à valeurs dans N et donc $\forall n \geq k+1,\ S_n \geq \alpha$. La suite $(S_n)_{n>k}$ est décroissante en tant que suite des sommes partielles d'une série à termes négatifs, étant minorée elle converge et donc $\sum_{n>k} a_{\sigma(n)}$ converge absolument. Ceci contredit ce qui a été démontré en préambule donc $k \in \sigma(\mathbb{N})$.

— Si $k \in N$ alors de même, $\sum_{n>k} a_\sigma(n)$ ne peut pas converger absolument.

Ainsi σ est bien bijective de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$.

Montrons maintenant que $\sum_{n=0}^{+\infty} a_{\sigma(n)} = \alpha$. Fixons $\varepsilon > 0$.

Comme la série $\sum_{n\in\mathbb{N}} a_n$ converge, on a $a_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. On a aussi $a_{\sigma(n)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. En effet, $\exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geq n_0,\ |a_n| < \varepsilon$.
Puis par injectivité de σ, $E = \{n \in \mathbb{N},\ \sigma(n) < n_0\}$ est fini. On en déduit que $\forall n \geq n_1 = \max(n_0, \max(E)),\ |a_{\sigma(n)}| < \varepsilon$.
D'après ce qui a été fait en préambule, $\exists p > n_1,\ \sigma(p) \in P \wedge \sigma(p+1) \in N$. Montrons que $\forall n \geq p,\ |S_n - \alpha| \leq \varepsilon$.
$\sigma(p) \in P \implies S_{p-1} < \alpha$ et $\sigma(p+1) \in N \implies S_p \geq \alpha$. Or $|S_p - S_{p-1}| = |a_{\sigma(p+1)}| < \varepsilon$.
Ainsi $S_p \in [\alpha - \varepsilon, \alpha + \varepsilon]$. Fixons $n > p$.
Supposons par l'absurde que $S_n > \alpha + \varepsilon$. Comme on passe de S_{n-1} à S_n par un saut de longueur $a_{\sigma(n)} < \varepsilon$, on ne peut avoir $S_{n-1} < \alpha$. Cela entraîne $a_{\sigma(n)} < 0$ et donc $S_{n-1} > S_n$. Mais alors de proche en proche, on obtient $\alpha + \varepsilon < S_n < \cdots < S_p$ ce qui est absurde. Donc $S_n \leq \alpha + \varepsilon$.
Supposons par l'absurde que $S_n < \alpha - \varepsilon$. Comme on passe de S_{n-1} à S_n par un saut de longueur $a_{\sigma(n)} < \varepsilon$, on ne peut avoir $S_{n-1} \geq \alpha$. Cela entraîne $a_{\sigma(n)} \geq 0$ et donc $S_{n-1} \leq S_n$. Mais alors de proche en proche, on obtient $\alpha - \varepsilon > S_n \geq S_{n-1} \geq \cdots \geq S_p$ ce qui est absurde. Donc $S_n \geq \alpha - \varepsilon$.
Finalement, $|S_n - \alpha| \leq \varepsilon$.

On a donc construit une bijection σ de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ telle que $\sum_{n=0}^{+\infty} a_{\sigma(n)} = \alpha$.

XIII.1.57 Moyennes arithmétique, géométrique et harmonique ★

[Enoncé]

On rappelle que ln est concave sur $\mathbb{R}_+^*$.
$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n} = 1$ et $\frac{1}{n} \geq 0$ donc d'après l'inégalité de Jensen :

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \ln(a_k) \leq \ln\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k\right)$$

C'est à dire par passage à l'exponentielle,

$$G_n = \sqrt[n]{\prod_{k=1}^{n} a_k} \leq \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k = A_n$$

$-\ln$ est convexe sur $\mathbb{R}_+^*$.
$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n} = 1$ et $\frac{1}{n} \geq 0$ donc d'après l'inégalité de Jensen :

$$-\ln(G_n) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \ln\left(\frac{1}{a_k}\right) \leq \ln\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{a_k}\right) = -\ln(H_n)$$

D'où,

$$G_n \geq H_n$$

XIII.1.58 Inégalité de Carleman

[Enoncé]

XIII.2 Correction Intégrale

XIII.2.1 Règle de Bioche

[Enoncé]

XIII.2.2 Intégrale de Wallis ★★

[Enoncé]
Cet exercice n'est pas guidé car il s'agit d'un classique à connaître vraiment par cœur.

1. Trouvons une relation de récurrence.
   Soit $n \in \mathbb{N}$. Les fonctions sin et $t \mapsto \sin(t)^{n+1}$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ donc par IPP, on a :

$$\begin{aligned} W_{n+2} =& \left[-\cos(t)\sin(t)^{n+1}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} + (n+1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t)^2 \sin(t)^n dt \\ =&(n+1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1-\sin(t)^2)\sin(t)^n dt \\ =&(n+1)W_n - (n+1)W_{n+2} \end{aligned}$$

   C'est-à-dire : $(n+2)W_{n+2} = (n+1)W_n$.
   Maintenant, montrons par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, (n+1)W_nW_{n+1} = \dfrac{\pi}{2}$
   Pour $n = 0$, on a $W_0 = \dfrac{\pi}{2}$ et $W_1 = 1$, donc la relation est bien vérifiée.
   Supposons que pour un certain $n \in \mathbb{N}$, on a $(n+1)W_nW_{n+1} = \dfrac{\pi}{2}$

$$\begin{aligned} (n+2)W_{n+2}W_{n+1} =&(n+2)\frac{n+1}{n+2}W_nW_{n+1} && \text{d'après ce qui précède} \\ =&(n+1)W_nW_{n+1} \\ =&\frac{\pi}{2} && \text{d'après HR} \end{aligned}$$

   Donc, on a montré par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(n+1)W_nW_{n+1} = \dfrac{\pi}{2}$
   Il ne nous reste plus qu'à montrer que $W_n \sim W_{n+1}$.
   Pour cela, montrons que (W_n) est décroissante.
   On sait que pour tout $t \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$, $0 \leq \sin(t) \leq 1$. Ainsi pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $t \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$, on a $0 \leq \sin(t)^{n+1} \leq \sin(t)^n$.
   Et donc par croissance de l'intégrale, on a, $0 \leq W_{n+1} \leq W_n$.
   Ainsi, on en déduit que (W_n) est décroissante et donc : $\forall n \in \mathbb{N}$, $\quad W_{n+2} \leq W_{n+1} \leq W_n$ cad $\dfrac{n+1}{n+2}W_n \leq W_{n+1} \leq W_n$.
   Par conséquent, on a $W_{n+1} \sim W_n$.
   Finalement, puisque :$(n+1)W_nW_{n+1} = \dfrac{\pi}{2}$, on a $nW_n^2 \sim \dfrac{\pi}{2}$.
   Et donc ainsi $W_n \sim \sqrt{\dfrac{\pi}{2n}}$.
2. On a démontré que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(n+2)W_{n+2} = (n+1)W_n$.
   Ainsi, on a $\forall n \in \mathbb{N}$, $\dfrac{W_{2n+2}}{W_{2n}} = \dfrac{2n+1}{2n+2}$, donc

$$\begin{aligned} \prod_{k=0}^{n-1} \frac{W_{2k+2}}{W_{2k}} =& \prod_{k=0}^{n-1} \frac{2k+1}{2k+2} \\ \implies \frac{W_{2n}}{W_0} =& \frac{1}{2^{n-1}n!}\prod_{k=0}^{n-1} 2k+1 \\ \implies W_{2n} =& \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}\frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

De la même manière, on obtient : $\forall n \in \mathbb{N},\ W_{2n+1} = \dfrac{2^{2p}(p!)^2}{(2p+1)!}$

On peut également montrer ces résultats par récurrence.

XIII.2.3 Formule de Stirling

[Enoncé]

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = e^{-1}\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+\frac{1}{2}}$$

Ainsi pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$v_n = \left(n+\frac{1}{2}\right)\ln\left(\frac{n+1}{n}\right) - 1$$

On rappelle que :

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \mathcal{O}\left(x^3\right) \text{ quand } x \to 0$$

Ainsi

$$v_n = 1 - \frac{1}{2n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right) + \frac{1}{2n} - 1 = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

2. Puisque $v_n = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$, on a que $\sum v_n$ converge i.e. $(\ln(u_n))$ converge puisque qu'il s'agit d'une série télescopique.
Donc $(\ln(u_n))$ converge vers un certain $a \in \mathbb{R}$.
Par continuité de l'exponentielle,

$$u_n \to e^a > 0$$

Donc (u_n) converge vers un certain $\ell \in \mathbb{R}_+^*$.

3. D'après II.2,

$$W_{2n} = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}\frac{\pi}{2} \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$$

Ainsi,

$$\frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \sim \sqrt{\frac{1}{\pi n}}$$

Or d'après la question 2, on a :

$$n! \sim \frac{1}{\ell^2} n^n e^{-n}\sqrt{n}$$

Ainsi, on en déduit que :

$$\ell \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \text{ ie } \ell = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

Par conséquent,

$$n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$$

XIII.2.4 Intégrale de Gauss

[Enoncé]

Wallis

Intégrales auxiliaires

Equivalent du reste

XIII.2.5 Intégrale de Fresnel ★★★

[Enoncé]

1. Notons $f : \begin{cases} (\mathbb{R}_+)^2 & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ (x,t) & \longmapsto & \dfrac{e^{-(t^2+i)x^2}}{t^2+i} \end{cases}$.

   — Pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $t \mapsto f(x,t) \in \mathrm{CM}(\mathbb{R}_+, \mathbb{C})$ et $|f(x,t)| = \dfrac{e^{-(xt)^2}}{\sqrt{t^4+1}} \leq \dfrac{1}{\sqrt{t^4+1}} \underset{t\to+\infty}{\sim} \dfrac{1}{t^2}$ donc $t \mapsto f(x,t) \in L^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{C})$;

   — Pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, $x \mapsto f(x,t) \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{C})$ et $\forall (x,t) \in (\mathbb{R}_+)^2$, $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t) = -2xe^{-(t^2+i)x^2}$;

   — $\forall x \in \mathbb{R}_+$, $t \mapsto \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t) \in \mathrm{CM}(\mathbb{R}_+, \mathbb{C})$;

   — Soient a, b deux réels tels que $0 < a \leq b$.
   $\forall x \in [a,b]$, $\forall t \in \mathbb{R}_+$, $\left|\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| = 2xe^{-(tx)^2} \leq 2be^{-(ta)^2}$.
   Et la fonction $\varphi : t \mapsto 2be^{-(ta)^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ puisqu'elle est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+$ et que $\varphi(t) \underset{t\to+\infty}{=} o\left(\dfrac{1}{t^2}\right)$ (car $a > 0$).

   Ainsi d'après le théorème de transfert $\mathcal{C}^1$, I est $\mathcal{C}^1$ sur $\bigcup_{0<a\leq b} [a,b] = \mathbb{R}_+^*$ et, $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $I'(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} -2xe^{-(t^2+i)x^2} dt$.

2. Fixons $x \in \mathbb{R}_+^*$. Posons $u = tx$:
   $I'(x) = -2xe^{-ix^2} \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-(tx)^2} dt = -2e^{-ix^2} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = -\sqrt{\pi} e^{-ix^2}$.
   De plus, pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$, $f(x,t) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ et pour tout $(x,t) \in (\mathbb{R}_+)^2$, $|f(x,t)| \leq \dfrac{1}{\sqrt{t^4+1}}$. Donc d'après le théorème de convergence dominée, $\lim\limits_{x\to+\infty} I(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} 0 \, dt = 0$.
   Donc en intégrant l'expression de 0 à $+\infty$, $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-it^2} dt = \frac{I(0)}{\sqrt{\pi}}$.
   Enfin, $I(0) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{1}{t^2+i} dt = \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{t^4+1} dt - i \int_0^{+\infty} \frac{1}{t^4+1} dt$. On pose $u = \dfrac{1}{t}$ dans la première intégrale pour avoir :
   $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{t^2}{t^4+1} dt = \int_{+\infty}^0 \frac{\frac{1}{u^2}}{\frac{1}{u^4}+1} \left(-\frac{du}{u^2}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{u^4+1} du.$
   On peut alors écrire

$$\begin{aligned} 4\int_0^{+\infty} \frac{1}{u^4+1} du &= \int_0^{+\infty} \frac{2(u^2+1)}{u^4+1} du \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{2(u^2+1)}{(u^2+1)^2 - (u\sqrt{2})^2} du \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{u^2 - u\sqrt{2} + 1 + u^2 + u\sqrt{2} + 1}{(u^2 - u\sqrt{2}+1)(u^2+u\sqrt{2}+1)} \\ &= \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{u^2 - u\sqrt{2}+1} + \frac{1}{u^2+u\sqrt{2}+1}\right) du \end{aligned}$$

   Et donc $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{1}{u^4+1} du = \sqrt{2}\left[\arctan(u\sqrt{2}-1) + \arctan(u\sqrt{2}+1)\right]_0^{+\infty} = \pi\sqrt{2}$ d'où $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{1}{u^4+1} du = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$.
   Finalement, $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-it^2} dt = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \times \frac{\pi}{2\sqrt{2}}(1-i) = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{1-i}{2}$.

XIII.2.6 Intégrale de Dirichlet

[Enoncé]

Semi-convergence ★★

La fonction $f : t \mapsto \dfrac{\sin t}{t}$ est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$ et est prolongeable par continuité en 0 en posant $f(0) = 1$.

Convergence :

Les fonctions $t \mapsto -\cos t$ et $t \mapsto \dfrac{1}{t}$ sont $\mathcal{C}^1$ sur $[1, +\infty[$ (le crochet ne converge pas si on intègre en 0) et $\lim\limits_{t\to+\infty} -\dfrac{\cos t}{t} = 0$ donc par IPP,

$$\int_1^{+\infty} f(t)dt = \left[-\frac{\cos(t)}{t}\right]_1^{+\infty} - \int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2}dt = \cos(1) - \int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2}dt.$$

La dernière intégrale converge puisque $\dfrac{\cos t}{t^2} \underset{t\to+\infty}{=} \mathcal{O}\left(\dfrac{1}{t^2}\right)$.

Ainsi $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}dt = \int_0^1 \frac{\sin t}{t} + \cos(1) - \int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2}dt$ converge.

Non convergence absolue :

première méthode :

Dans $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$, $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{|\sin t|}{t}dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t}dt$.

$\forall n \in \mathbb{N}$, $\displaystyle\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t}dt = \int_0^{\pi} \frac{|\sin(t+n\pi)|}{t+n\pi}dt = \int_0^{\pi} \frac{|\sin t|}{t+n\pi}dt = \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{t+n\pi}dt \geq \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{(n+1)\pi} = \frac{2}{(n+1)\pi}$.

Ainsi $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{|\sin t|}{t}dt$ diverge par comparaison à une série de Riemann.

deuxième méthode :

On remarque que comme pour tout réel positif t, $|\sin t| \leq 1$, On a l'inégalité $|\sin t| \geq \sin^2(t) = \dfrac{1-\cos(2t)}{2}$.

D'une part, par une IPP similaire à celle que l'on a utilisé pour montrer la convergence de l'intégrale de Dirichlet on montre que $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\cos(2t)}{2t}dt$ converge. D'autre part $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{1}{2t}dt = +\infty$ et enfin $\displaystyle\int_0^1 \frac{|\sin t|}{t}dt$ converge.

Finalement, $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{|\sin t|}{t}dt \geq \int_0^1 \frac{|\sin t|}{t}dt + \int_1^{+\infty} \frac{1}{2t}dt + \int_1^{+\infty} \frac{\cos(2t)}{2t}dt$ diverge vers $+\infty$.

Une autre expression ★★

On remarque que $t \mapsto 1 - \cos(t)$ est une primitive de sin sur $\mathbb{R}_+^*$ et que $\lim\limits_{t\to0} \dfrac{1-\cos(t)}{t} = -\cos'(0) = \sin(0) = 0$ donc par IPP :

$$I = \left[\frac{1-\cos(t)}{t}\right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(t)}{t^2}dt = \int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(2t)}{(2t)^2}\frac{dt}{2} = \int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(2t)}{2t^2}dt = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(t)}{t^2}dt.$$

Premier calcul ★★

1. Montrons d'abord que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bien définie. Fixons $n \in \mathbb{N}$.
   $f_n : t \mapsto \dfrac{\sin((2n+1)t)}{\sin(t)}$ est continue par morceaux sur $]0, \pi/2]$ et $f_n(t) \underset{t\to0}{\sim} \dfrac{(2n+1)t}{t} = 2n+1$ donc l'intégrale est faussement impropre en 0.
   Ensuite, $\sin((2n+3)t) - \sin((2n+1)t) = \sin((2n+2)t+t) - \sin((2n+2)t-t) = 2\sin(t)\cos((2n+2)t)$.
   Ainsi $u_{n+1} - u_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{1}{\sin(t)}(\sin((2n+3)t) - \sin((2n+1)t))dt = \int_0^{\pi/2} 2\cos((2n+2)t)dt = \left[\frac{\sin((2n+2)t)}{n+1}\right]_0^{\pi/2} = 0.$
   On en déduit que u_n est constamment égal à $u_0 = \displaystyle\int_0^{\pi/2} dt = \frac{\pi}{2}$.

2. Tout d'abord, v_n est bien défini pour tout $n \in \mathbb{N}$ pour les mêmes raisons que u_n. Notons $\varphi : t \mapsto \dfrac{1}{\sin(t)} - \dfrac{1}{t}$.
   φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, \pi/2]$ et,
   $\varphi(t) = \dfrac{t - \sin(t)}{t\sin(t)} \underset{t\to0}{=} \dfrac{\frac{t^3}{6} + o(t^3)}{t\sin(t)} \underset{t\to0}{\sim} \dfrac{\frac{t^3}{6}}{t^2} = \dfrac{t}{6} \underset{t\to0}{\longrightarrow} 0$ puis,

$\varphi'(t) = -\dfrac{\cos(t)}{\sin^2(t)} + \dfrac{1}{t^2} = \dfrac{\sin^2(t) - t^2\cos(t)}{t^2\sin^2(t)} \underset{t\to 0}{=} \dfrac{t^2\left(1-\frac{t^2}{6}+o\left(t^2\right)\right)^2 - t^2\left(1-\frac{t^2}{2}+o\left(t^2\right)\right)}{t^2\sin^2(t)} \underset{t\to 0}{=} \dfrac{\frac{t^2}{3}+o\left(t^2\right)}{\sin^2(t)} \underset{t\to 0}{\sim} \dfrac{1}{3} \underset{t\to 0}{\longrightarrow} \dfrac{1}{3}$.

Ainsi φ est prolongeable en une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,\pi/2]$ en posant $\varphi(0) = \dfrac{1}{6}$ et $\varphi'(0) = \dfrac{1}{3}$.

On peut donc faire une IPP :

$\forall n \in \mathbb{N},\ v_n - u_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin((2n+1)t)\varphi(t)dt = \left[-\frac{\cos((2n+1)t)}{2n+1}\varphi(t)\right]_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \frac{\cos((2n+1)t)}{2n+1}\varphi'(t)dt.$

Or d'après le théorème des bornes atteintes, φ et φ' sont bornées sur $[0,\pi/2]$. Ainsi en notant M un majorant de φ et M' un majorant de φ' sur $[0,\pi/2]$,

$\forall n \in \mathbb{N},\ |v_n - u_n| \leq \dfrac{2M}{2n+1} + \dfrac{\pi M'}{2(2n+1)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$

Par conséquent $v_n - u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

3. D'après ce qui a été fait précédemment on sait que $v_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \dfrac{\pi}{2}$.

Or $\forall n \in \mathbb{N},\ v_n = \displaystyle\int_0^{(2n+1)\pi} \frac{\frac{\sin(t)}{t}}{2n+1} \cdot \frac{dt}{2n+1} = \int_0^{(2n+1)\pi} \frac{\sin(t)}{t}dt.$

Il reste à montrer que l'intégrale de Dirichlet converge (cf. II.6) pour avoir $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = I$ et donc $I = \dfrac{\pi}{2}$.

Second calcul ★★★

1. Notons $f : \begin{cases} (\mathbb{R}_+^*)^2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (x,t) & \longmapsto & \dfrac{\sin(t)}{t}e^{-xt} \end{cases}$.

— Si $x \in \mathbb{R}_+^*,\ f(x,t) \underset{t\to 0}{\longrightarrow} 1$ et $f(x,t) \underset{t\to+\infty}{=} o\left(\dfrac{1}{t^2}\right)$. Donc $\forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ t \mapsto f(x,t) \in \mathrm{CM}(\mathbb{R}_+^*,\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R}_+^*,\mathbb{R})$;

— $\forall t \in \mathbb{R}_+^*,\ x \mapsto f(x,t) \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+,\mathbb{R})$. $\forall (x,t) \in (\mathbb{R}_+^*)^2,\ \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t) = -\sin(t)e^{-xt}$;

— $\forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ t \mapsto \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t) \in \mathrm{CM}(\mathbb{R}_+^*,\mathbb{R})$;

— Soit $a > 0$. $\forall x \in [a,+\infty[,\ \forall t \in \mathbb{R}_+^*,\ \left|\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \leq e^{-at}$.

$\varphi : t \mapsto \dfrac{|\sin(t)|}{t}e^{-at} \in L^1(\mathbb{R}_+^*,\mathbb{R})$.

Ainsi d'après le théorème de transfert $\mathcal{C}^1$, $F \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+^*,\mathbb{R})$ et $\forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ F'(x) = -\displaystyle\int_0^{+\infty} \sin(t)e^{-xt}dt$.

Pour calculer cette intégrale on passe passe en complexe : $\forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ F'(x) = -\operatorname{Im}\left(\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{(i-x)t}dt\right)$ (qui converge absolument).

$\forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{(i-x)t}dt = \left[\frac{e^{(i-x)t}}{i-x}\right]_{t=0}^{t\to+\infty} = \frac{1}{x-i} = \frac{x+i}{|x-i|^2} = \frac{x}{1+x^2} + \frac{1}{1+x^2}i.$

On en déduit que $\forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ F'(x) = -\dfrac{1}{1+x^2}$.

2. Donc $\exists C \in \mathbb{R},\ \forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ F(x) = -\arctan(x) + C$.

Montrons que F tend vers 0 en $+\infty$ à l'aide du théorème de convergence dominée. On a déjà fait la domination dans la question 1.

De plus, pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*,\ f(x,t) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ et la fonction nulle est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$.

Ainsi $F(x) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} \displaystyle\int_0^{+\infty} 0\ dt = 0$ et $C = \dfrac{\pi}{2}$.

Enfin arctan étant continue en 0, F l'est aussi et en faisant tendre x vers 0 on obtient :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t}dt = F(0) = -\arctan(0) + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$$

Intégrale du reste de l'intégrale de Dirichlet ★★★

[Enoncé]

On sait (cf. II.6) que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$ l'intégrale $\displaystyle\int_x^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ converge.

Alors d'après le théorème fondamental de l'analyse $F : x \mapsto \displaystyle\int_x^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$ de dérivée $F' = x \mapsto -\dfrac{\sin x}{x}$.

Fixons $A > 0$.

Par IPP, $\displaystyle\int_0^A 1 \cdot F(x)dx = [xF(x)]_0^A - \int_0^A xF'(x)dx = AF(A) + \int_0^A \sin x \, dx = AF(A) + 1 - \cos A.$

Ensuite encore par IPP, $\displaystyle F(A) = \int_A^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \left[-\frac{\cos t}{t}\right]_A^{+\infty} - \int_A^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt = \frac{\cos A}{A} - \int_A^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt.$

Donc $\displaystyle\int_0^A F(x)dx = 1 - A\int_A^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt$. Posons maintenant $u = \dfrac{t}{A}$ dans la dernière intégrale :

$\displaystyle A\int_A^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt = A\int_1^{+\infty} \frac{\cos(Au)}{A^2u^2} Adu = \int_1^{+\infty} \frac{\cos(Au)}{u^2} du.$

Enfin, une dernière IPP permet d'obtenir :

$\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\cos(Au)}{u^2} du = \left[-\frac{\sin(Au)}{Au^2}\right]_1^{+\infty} - \int_1^{+\infty} \frac{2\sin(Au)}{Au^3} du = \frac{\sin A}{A} - \frac{2}{A}\int_1^{+\infty} \frac{\sin(Au)}{u^3} du.$

On remarque que le premier terme de cette somme tend vers 0 lorsque A tend vers $+\infty$. Pour ce qui est du deuxième, on a par inégalité triangulaire $\displaystyle\left|\int_1^{+\infty} \frac{2\sin(Au)}{u^3} du\right| \leq \int_1^{+\infty} \frac{2}{u^3} du = \left[-\frac{1}{u^2}\right]_1^{+\infty} = 1$. Donc $\displaystyle\left|\frac{2}{A}\int_1^{+\infty} \frac{\sin(Au)}{u^3} du\right| \leq \frac{1}{A}$

d'où $\displaystyle\lim_{A\to+\infty} \frac{2}{A}\int_1^{+\infty} \frac{\sin(Au)}{u^3} du = 0.$

Finalement, $\displaystyle\lim_{A\to+\infty} A\int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt = 0$ et $\displaystyle\int_0^{+\infty} \left(\int_x^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt\right) dx = 1.$

XIII.2.7 Intégrale d'Euler

[Enoncé]

Démontrons avant de commencer que I est bien défini.

La fonction $t \mapsto (\ln\sin(t))$ est continue par morceau sur $\left]0, \dfrac{\pi}{2}\right]$.

On sait que :

$$\sin(t) \underset{t\to0}{\sim} t$$

Ainsi :

$$\ln(\sin(t)) = \ln(t + \underset{t\to0}{o}(t)) = \ln(t) + \ln(1 + \underset{t\to0}{o}(1))$$

Par conséquent,

$$\ln(\sin(t)) \underset{t\to0}{\sim} \ln(t) = \underset{t\to0}{o}\left(\frac{1}{\sqrt{(t)}}\right)$$

Donc $t \mapsto \ln(\sin(t))$ est intégrale en 0.

Donc l'intégrale est bien définie.

1. On pose $t = \dfrac{\pi}{2} - u$

$$\int_0^{\pi/2} \ln(\sin(t))dt = \int_{\pi/2}^0 \ln\left(\sin\left(\frac{\pi}{2} - u\right)\right)(-du) = \int_0^{\pi/2} \ln(\cos(u))du$$

D'où :

$$I = J$$

2. On a :

$$I + J = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin(t)\cos(t))dt = \int_0^{\pi/2} [\ln(\sin(2t) - \ln(2)]\, dt$$

car $\sin(2t) = 2\cos(t)\sin(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$. Ainsi, on a :

$$I + J = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin(2t))dt - \frac{\pi \ln(2)}{2} = \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \ln(\sin(u))du - \frac{\pi \ln(2)}{2}$$

Montrons que $2I = \int_0^{\pi} \ln(\sin(t))dt$.
On effectue le changement de variable $u = \pi - t$,

$$I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin(t))dt = \int_{\pi}^{\pi/2} \ln(\sin(\pi - u))(-du) = \int_{\pi/2}^{\pi} \ln(\sin(u))du$$

Ainsi d'après la relation de Chasles,

$$2I = \int_0^{\pi} \ln(\sin(t))dt$$

Donc :

$$I + J = I - \frac{\pi \ln(2)}{2}$$

3. On a donc aisément que :

$$I = -\frac{\pi \ln(2)}{2}$$

XIII.2.8 Fonction intégrale ★★★

[Enoncé]
Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$.
$t \mapsto \dfrac{\ln(t)}{x^2 + t^2}$ est continue par morceau sur $]0, +\infty[$. On remarque que

$$\frac{\ln(t)}{x^2 + t^2} \underset{t\to 0}{=} O(\ln(t)) \underset{t\to 0}{=} o\left(\frac{1}{\sqrt{t}}\right)$$

et

$$\frac{\ln(t)}{x^2 + t^2} \underset{t\to 0}{=} o\left(\frac{1}{t^{\frac{3}{2}}}\right)$$

Ainsi $t \mapsto \dfrac{\ln(t)}{x^2 + t^2}$ est intégrale sur $\mathbb{R}_+^*$.
Maintenant, donnons une expression de I à l'aide de fonctions usuelles.
Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$.

$$I(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{x^2 + t^2}dt = \frac{1}{x^2}\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{1 + \left(\frac{t}{x}\right)^2}dt$$

On pose $t = ux$:

$$I(x) = \frac{1}{x^2}\int_0^{+\infty} \frac{\ln(ux)}{1 + u^2}xdu = \frac{1}{x}\int_0^{+\infty} \frac{\ln(u)}{1 + u^2}du + \frac{\ln(x)}{x}\int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + u^2}du$$

Ainsi, on obtient l'expression suivante :

$$I(x) = \frac{I(1)}{x} + \frac{\pi \ln(x)}{2x}$$

Calculons maintenant que $I(1)$. On pose $u = \frac{1}{t}$.

$$I(0) = \int_{+\infty}^0 \frac{\ln\left(\frac{1}{u}\right)}{1 + \left(\frac{1}{u}\right)^2}\left(-\frac{1}{u^2}\right)du = -\int_0^{+\infty} \frac{\ln(u)}{1 + u^2}du = -I(0)$$

Donc $I(0) = 0$. Par conséquent, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$I(x) = \frac{\pi \ln(x)}{2x}$$

Reste plus qu'à prouver que I admet un maximum et le déterminer.
Il est clair que I est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, I'(x) = \frac{\pi}{2}\frac{1 - \ln(x)}{x^2}$$

x	0	e	$+\infty$
$I'(x)$	‖	$+$ 0 $+$	
$I(x)$		$\frac{\pi}{2e}$	
	$-\infty$		$+\infty$

Donc I admet un maximum sur $\mathbb{R}_+^*$ qui est :

$$\max_{x\in\mathbb{R}_+^*} I = I(e) = \frac{\pi}{2e}$$

XIII.2.9 Intégrales de Bertrand

[Enoncé]

XIII.2.10 Intégrales de Hardy (1)

[Enoncé]

XIII.2.11 Intégrabilité des cosinus de polynômes

[Enoncé]

XIII.2.12 Nature d'une intégrale (1) ★★

[Enoncé]

arccos est une fonction continue par morceaux et strictement positive sur $[0,1[$. Cherchons un équivalent de arccos en 1^-.

On sait que $\cos(t) \underset{t\to 0}{=} 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$ et $\arccos(t) \underset{t\to 1^-}{\longrightarrow} 0$.

Donc $2(1-t) \underset{t\to 1^-}{=} \arccos(t)^2 + o(\arccos(t)^2) \underset{t\to 1^-}{\sim} \arccos(t)^2$.

Ainsi $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, $\frac{1}{\arccos(t)^\alpha} \underset{t\to 1^-}{\sim} \frac{1}{2^{\alpha/2}(1-t)^{\alpha/2}}$.

On en déduit que $\int_0^1 \frac{dt}{\arccos(t)^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 2$.

XIII.2.13 Nature d'une intégrale (2) ★★

[Enoncé]

1. Soient $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites de réels divergeant vers $+\infty$. Par hypothèse la fonction $F : x \mapsto \int_0^x f(t)dt$ admet une limite finie en $+\infty$. D'après le TFA elle est aussi continue donc par caractérisation séquentielle :

$$\int_{x_n}^{y_n} f(t)dt = \int_0^{y_n} f(t)dt - \int_0^{x_n} f(t)dt = F(y_n) - F(x_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$$

2. La fonction $f : t \mapsto e^{-t\sin t}$ est continue sur $[0,+\infty[$. Or pour les suites de terme général $x_n = (2n+1)\pi$ et $y_n = (2n+2)\pi$, on a $\lim_{n\to+\infty} x_n = \lim_{n\to+\infty} y_n = +\infty$ et $\forall t \in [x_n, y_n]$, $-t\sin t \geq 0$ d'où $\int_{x_n}^{y_n} f(t)dt \geq \int_{x_n}^{y_n} dt =$

$y_n - x_n = n\pi \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$. Donc $\int_{x_n}^{y_n} e^{-t\sin t}dt \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty \neq 0$.

Ainsi par la contraposée de la question 1, $\int_0^{+\infty} e^{-t\sin t}dt$ diverge.

XIII.2.14 Nature d'une intégrale (3) ★★★

[Enoncé]

Posons $f_\alpha : t \mapsto \dfrac{\sin t}{t^\alpha}$. f_α est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$. De plus $f_\alpha(t) \underset{t\to 0}{\sim} \dfrac{1}{t^{\alpha-1}}$ donc l'intégrale $\int_0^{+\infty} f_\alpha(t)dt$ converge en 0 si et seulement si $\alpha < 2$.
Et en $+\infty$:

— Si $\alpha > 0$ alors par IPP les intégrales $\int_1^{+\infty} f_\alpha(t)dt$ et $\int_1^{+\infty} \dfrac{\cos t}{t^{\alpha+1}}dt$ ont même nature.
Or $\dfrac{\cos t}{t^\alpha+1} \underset{t\to+\infty}{=} \mathcal{O}\left(\dfrac{1}{t^\alpha+1}\right)$. Comme $\alpha+1>1$, on en déduit que $\int_1^{+\infty} f_\alpha(t)dt$ converge ;

— Si $\alpha \leq 0$ alors posons $F_\alpha : x \mapsto \int_1^x f_\alpha(t)dt$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
Comme sin est positif sur $[2n\pi, (2n+1)\pi]$,
$F_\alpha((2n+1)\pi) - F_\alpha(2n\pi) = \int_{2n\pi}^{(2n+1)\pi} t^{-\alpha}\sin t dt \geq (2n\pi)^{-\alpha}\int_{2n\pi}^{(2n+1)\pi} \sin t = 2(2n\pi)^{-\alpha}$.
Donc la suite $(F_\alpha((2n+1)\pi) - F_\alpha(2n\pi))_{n\in\mathbb{N}}$ n'admet pas de limite finie. Donc l'intégrale $\int_1^{+\infty} f_\alpha(t)dt$ diverge.

Ainsi l'intégrale $\int_0^{+\infty} \dfrac{\sin t}{t^\alpha}dt$ converge si et seulement si $0 < \alpha < 2$.

XIII.2.15 Nature d'une intégrale (4) ★★★★

[Enoncé]

Posons $I_a = \int_0^{+\infty} \sin(t^a)dt$. Si $a = 0$, $I_a = \int_0^{+\infty} dt = +\infty$. Supposons maintenant $a \neq 0$.
Alors $f_a : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+^* & \longrightarrow & \mathbb{R}_+^* \\ t & \longmapsto & t^a \end{array} \right.$ de classe $\mathcal{C}^1$ et bijective de réciproque $g_a : t \mapsto t^{1/a}$, on peut donc effectuer le changement de variable $t = g_a(u)$.
$dt = g_a'(u)du = \dfrac{u^{1/a-1}}{a}du$.
Si $a > 0$, $f_a(0) = 0$, $\lim\limits_{t\to+\infty} f_a(t) = +\infty$ et L'intégrale I_a est de même nature que $\int_0^{+\infty} \dfrac{\sin(u)}{u^{\frac{a-1}{a}}}\dfrac{du}{a}$.
Si $a < 0$, $\lim\limits_{t\to 0^+} f_a(t) = +\infty$, $\lim\limits_{t\to+\infty} f_a(t) = 0$ et L'intégrale I_a est de même nature que $\int_0^{+\infty} \dfrac{\sin(u)}{u^{\frac{a-1}{a}}}\dfrac{du}{-a}$.
On en déduit (cf.II.15) que I_a converge si et seulement si $0 < \dfrac{a-1}{a} < 2$ i.e $0 < a-1 < 2a$ ou $0 > a-1 > 2a$ i.e $|a| > 1$.

XIII.2.16 Pondération par la fonction inverse

[Enoncé]

XIII.2.17 Pondération par $\dfrac{1}{1+t^a}$

[Enoncé]

XIII.2.18 Pondération par le sinus

[Enoncé]

XIII.2.19 Intégrale sur une période

[Enoncé]

XIII.2.20 Changement de variable

[Enoncé]

XIII.2.21 Divergence grossière

[Enoncé]

XIII.2.22 Norme L^2 ★★

[Enoncé]

1. Notons $g : t \mapsto \dfrac{f(t)}{t}$. f est continue sur $\mathbb{R}_+^*$ donc g aussi. De plus, f est dérivable en 0 donc $g(t) = \dfrac{f(t)-f(0)}{t-0} \underset{t\to 0}{\longrightarrow} f'(0)$.
   Ainsi g est prolongeable par continuité en 0 en posant $g(0) = f'(0)$.
2. Soit $x > 0$. Les fonctions $t \mapsto f(t)^2$ et $t \mapsto \dfrac{1}{t^2}$ sont de classes $\mathcal{C}^1$ sur $]0, x]$ donc, sous réserve de convergence, par IPP :
$$\int_0^x g(t)^2 dt = \left[-\frac{f(t)^2}{t}\right]_0^x + \int_0^x \frac{2f'(t)f(t)}{t} dt$$
   D'après la question 1 le crochet vaut 0 en 0. On en déduit
$$\int_0^x g(t)^2 dt = -\frac{f(x)^2}{x} + 2\int_0^x \frac{f'(t)f(t)}{t} dt \leq \int_0^x \frac{f'(t)f(t)}{t} dt$$
3. On montre que $\langle \cdot, \cdot \rangle : (g, h) \mapsto \displaystyle\int_0^x g(t)h(t)dt$ est un produit scalaire sur $\mathcal{C}([0, x], \mathbb{R})$. Alors d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz :
$$\|g\|^2 = \int_0^x g(t)^2 \leq 2\langle f', g\rangle \leq 2\|f'\|\|g\|$$
   Ainsi $\|g\| \leq 2\|f'\|$ d'où $\displaystyle\int_0^x g(t)^2 dt = \|g\|^2 \leq 4\|f'\|^2 = 4\int_0^x f'(t)^2 dt$.
   On conclut en faisant tendre x vers $+\infty$.

XIII.2.23 Inégalité de Kolmogorov

[Enoncé]

XIII.2.24 ENS PC 2025 ★★★

[Enoncé] 1ère méthode : Cauchy-Schwarz
Notons $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}_+^*)$.
On rappelle que $\langle \cdot, \cdot \rangle : (g, h) \mapsto \displaystyle\int_0^1 gh$ est un produit scalaire sur E.

Prenons $g=\sqrt{f}$ et $h=\dfrac{1}{\sqrt{f}}$.
On a $\displaystyle\int_0^1 gh=\int_0^1 1=1=\sqrt{\int_0^1 g^2}\sqrt{\int_0^1 h^2}$.
g et h vérifient donc le cas d'égalité de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. On en déduit qu'il existe $\lambda\in\mathbb{R}_+$ tel que $g=\lambda h$.
Ainsi $f^2=\lambda$ d'où comme $f>0$, $f=\sqrt{\lambda}$. Puis comme $\displaystyle\int_0^1 f=1$, $f=1$.
2nd méthode : Signe d'un trinôme
Posons $g=f+\dfrac{1}{f}-2$. Par hypothèse g est continue sur $[0,1]$ et $\displaystyle\int_0^1 g=0$.
Or $\forall x\in\mathbb{R}_+^*,\ x+\dfrac{1}{x}-2\geq 0 \iff x^2-2x+1\geq 0 \iff (x-1)^2\geq 0$. Donc g est positive et par stricte positivité de l'intégrale $g=0$.
Autrement dit $(f-1)^2=0$ i.e $f=1$.

XIII.2.25 Intégrales de Frullani (1) ★★★

[Enoncé]

1. Fixons $\eta>\varepsilon>0$. Posons $F(\varepsilon,\eta)=\displaystyle\int_\varepsilon^\eta \frac{f(at)-f(bt)}{t}dt$.
   En posant $u=at$ on a, $\displaystyle\int_\varepsilon^\eta \frac{f(at)}{t}dt=\int_{a\varepsilon}^{a\eta}\frac{f(u)}{u/a}\frac{du}{a}=\int_{a\varepsilon}^{a\eta}\frac{f(u)}{u}dt$. De même $\displaystyle\int_\varepsilon^\eta \frac{f(bt)}{t}dt=\int_{b\varepsilon}^{b\eta}\frac{f(u)}{u}dt$.
   Donc $\displaystyle F(\varepsilon,\eta)=\int_{a\varepsilon}^{a\eta}\frac{f(t)}{t}dt-\int_{b\varepsilon}^{b\eta}\frac{f(t)}{t}dt=\int_{a\varepsilon}^{b\varepsilon}\frac{f(t)}{t}dt-\int_{b\varepsilon}^{b\eta}\frac{f(t)}{t}dt$.
   Soit $\alpha>0$. Par hypothèse, il existe $\varepsilon_0>0$ tel que $\forall t\in[0,b\varepsilon_0],\ |f(t)-\ell|<\dfrac{\alpha}{2\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$. De même il existe $\eta_0>0$ tel que $\forall t\in[a\eta_0,+\infty],\ |f(t)-L|\leq\dfrac{\alpha}{2\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$.
   Alors $\forall\varepsilon<\varepsilon_0,\ \forall\eta>\eta_0$,

$$\left|F(\varepsilon,\eta)-(\ell-L)\ln\left(\frac{b}{a}\right)\right|\leq\int_{a\varepsilon}^{b\varepsilon}\frac{|f(t)-\ell|}{t}dt+\int_{a\eta}^{b\eta}\frac{|f(t)-L|}{t}dt\leq\alpha$$

   Ainsi $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{f(at)-f(bt)}{t}dt=\lim_{\eta\to+\infty}\lim_{\varepsilon\to0^+}F(\varepsilon,\eta)=(\ell-L)\ln\left(\frac{b}{a}\right)$.
2. Posons $u=-\ln t$. $du=-\dfrac{dt}{t}$ i.e $dt=e^{-u}du$
   $\displaystyle\int_0^1\frac{t-1}{\ln t}dt=\int_{+\infty}^0\frac{e^{-u}-1}{-u}(-e^{-u}du)=\int_0^{+\infty}\frac{e^{-u}-e^{-2u}}{u}du$.
   La fonction exp est continue sur $]0,+\infty[$ et $\lim\limits_{t\to0}e^{-t}=1$ et $\lim\limits_{t\to+\infty}e^{-t}=0$.
   Donc d'après la question 1 $\displaystyle\int_0^1\frac{t-1}{\ln t}dt=(1-0)\ln\left(\frac{2}{1}\right)=\ln 2$.

XIII.2.26 Intégrales de Frullani (2) ★★★

[Enoncé]

Fixons $\varepsilon>0$. Posons $F(\varepsilon)=\displaystyle\int_\varepsilon^{+\infty}\frac{f(at)-f(bt)}{t}dt$.
Comme la dernière intégrale converge, $\displaystyle\int_\varepsilon^{+\infty}\frac{f(at)}{t}dt=\int_{a\varepsilon}^{+\infty}\frac{f(u)}{u/a}\frac{du}{a}=\int_{a\varepsilon}^{+\infty}\frac{f(u)}{u}dt$. De même $\displaystyle\int_\varepsilon^{+\infty}\frac{f(bt)}{t}dt=\int_{b\varepsilon}^{+\infty}\frac{f(u)}{u}dt$.
Donc $\displaystyle F(\varepsilon)=\int_\varepsilon^{+\infty}\frac{f(at)}{t}dt-\int_\varepsilon^{+\infty}\frac{f(bt)}{t}dt=\int_{a\varepsilon}^{b\varepsilon}\frac{f(t)}{t}dt=\int_a^b\frac{f(\varepsilon t)}{t}dt$.
Soit $\eta>0$. Par continuité de f en 0^+, il existe $\varepsilon_0>0$ tel que $\forall t\in[0,b\varepsilon_0],\ |f(t)-f(0)|<\eta$.

Alors $\forall \varepsilon < \varepsilon_0$, $\left|F(\varepsilon) - f(0)\ln\left(\frac{b}{a}\right)\right| \leq \int_a^b \frac{|f(\varepsilon t) - f(0)|}{t} dt \leq \eta(\ln(b) - \ln(a))$.
Ainsi $F(\varepsilon) \underset{\varepsilon \to 0^+}{\longrightarrow} f(0)\ln\left(\frac{b}{a}\right)$ ce qui conclut la question.

Combinaisons linéaires de cosinus ★★★★

[Enoncé]

1. Posons $f : t \mapsto \sum_{k=1}^{n} \lambda_k \cos(a_k t)$ et $g : t \mapsto \frac{f(t)}{t}$.
   g est continue sur $\mathbb{R}_+^*$ et de plus par IPP, $\forall \alpha > 0$:
   $$\int_1^{+\infty} \frac{\cos(\alpha t)}{t} dt = \left[\frac{\sin(\alpha t)}{\alpha t}\right]_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{\sin(\alpha t)}{\alpha t^2} dt$$
   où le crochet et l'intégrale converge, l'un par croissances comparées et l'autre car $\frac{\sin(\alpha t)}{\alpha t^2} \underset{t \to +\infty}{=} \mathcal{O}\left(\frac{1}{t^2}\right)$.
   Enfin, il reste la convergence en 0^+.
   $f(t) \underset{t \to 0}{=} \sum_{k=1}^{n} \lambda_k \left(1 + a_k^2 \frac{t^2}{2} + o(t^2)\right)$ donc si $S := \sum_{k=1}^{n} \lambda_k \neq 0$, $g(t) \underset{t \to 0}{\sim} \frac{S}{t}$ et l'intégrale ne converge pas en 0^+ Et si $S = 0$ alors $g(t) \underset{t \to 0}{=} \mathcal{O}(t)$ et l'intégrale converge.
   Ainsi I converge si et seulement si $\sum_{k=1}^{n} \lambda_k \neq 0$.
2. Sans perte de généralité on suppose les a_k rangés par ordre croissant. On souhaite appliquer l'exercice précédent à $f = \cos$. Pour cela il suffit trouver des réels $\mu_1, \dots, \mu_{n-1}$ vérifiant $\sum_{k=1}^{n} \lambda_k \cos(a_k t) = \sum_{k=1}^{n-1} \mu_k(\cos(a_{k+1}t) - \cos(a_k t))$.
   On a $\sum_{k=1}^{n-1} \mu_k(\cos(a_{k+1}t) - \cos(a_k t)) = -\mu_1 \cos(a_1 t) + \sum_{k=2}^{n-1}(\mu_{k-1} - \mu_k)\cos(a_k t) + \mu_{n-1}\cos(a_n t)$.
   Posons alors pour $k \in [\![1; n-1]\!]$, $\mu_k = -\sum_{i=1}^{k} \lambda_i$ de sorte que $\mu_{k-1} - \mu_k = \lambda_k$, $-\mu_1 = \lambda_1$ et $\mu_{n-1} = \lambda_n - \sum_{i=1}^{n} \lambda_i = \lambda_n$.
   Alors d'après l'exercice précédent,
   $$I = \sum_{k=1}^{n-1} \mu_k(\ln(a_{k+1}) - \ln(a_k)) = -\mu_1 \ln(a_1) + \sum_{k=2}^{n-1}(\mu_{k-1} - \mu_k)\ln(a_k) + \mu_{n-1}\ln(a_n) = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k \ln(a_k)$$

XIII.2.27 Calcul d'une intégrale (1) ★★★

[Enoncé]
Soit n un entier supérieur ou égal à 2.
Tout d'abord, $f_n : t \mapsto \prod_{k=1}^{n} \frac{1}{t+k}$ est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$ et $f_n(t) \underset{t \to +\infty}{\sim} \frac{1}{t^n}$. Donc $I_n = \int_0^{+\infty} f_n(t) dt$ converge par comparaison à une intégrale de Riemann ($n > 1$).
Notons $F(X) = \prod_{k=1}^{n} \frac{1}{X+k} = \sum_{k=1}^{n} \frac{\lambda_k}{X+k}$ la décomposition en éléments simples de F.
$\forall k \in [\![1; n]\!]$, $\lambda_k = \lim_{t \to -k}(t+k)F(t) = \prod_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq k}} \frac{1}{i-k} = (-1)^{k-1} \prod_{i=1}^{k-1} \frac{1}{k-i} \prod_{i=k+1}^{n} \frac{1}{i-k} = \frac{(-1)^{k-1}}{(k-1)!(n-k)!} = \frac{(-1)^{k-1} k}{n!}\binom{n}{k} = \frac{(-1)^{k-1}}{(n-1)!}\binom{n-1}{k-1}$.
Soit $A \in \mathbb{R}_+$.
$\int_0^A f_n(t) dt = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{(n-1)!}\binom{n-1}{k-1} \int_0^A \frac{dt}{t+k} = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{(n-1)!}\binom{n-1}{k-1}(\ln(A+k) - \ln(k))$

Or, $\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{(n-1)!}\binom{n-1}{k-1}\left(\ln(A)+\ln\left(1+\frac{k}{A}\right)-\ln(k)\right) \underset{A\to+\infty}{=} \ln(A)\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{(n-1)!}\binom{n-1}{k-1}+o(1)+\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k}}{(n-1)!}\binom{n-1}{k-1}\ln(k)$

Et, $\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{(n-1)!}\binom{n-1}{k-1} = \frac{1}{(n-1)!}\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\binom{n-1}{k-1} = \frac{1}{(n-1)!}(1-1)^{n-1} = 0.$

Donc $I_n = \frac{1}{(n-1)!}\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k}\binom{n-1}{k-1}\ln(k).$

XIII.2.28 Calcul d'une intégrale (2) ★★

[Enoncé]

$\forall x \in]0,1],\ \left\lfloor \frac{1}{x}\right\rfloor \geq 1$ et $\forall n\in\mathbb{N}^*,\ \left\lfloor \frac{1}{x}\right\rfloor = n \iff n\leq \frac{1}{x} < n+1 \iff \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}.$

La fonction $x\mapsto x\left\lfloor \frac{1}{x}\right\rfloor$ est continue par morceaux et positive sur $]0,1]$. On peut donc calculer dans $\mathbb{R}_+\cup\{+\infty\}$:

$$I = \sum_{n=1}^{+\infty}\int_{1/(n+1)}^{1/n} xn\,dx = \sum_{n=1}^{+\infty} n\left[\frac{x^2}{2}\right]_{1/(n+1)}^{1/n} = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n}{2}\left(\frac{1}{n^2}-\frac{1}{(n+1)^2}\right)$$

Or, $\forall n\in\mathbb{N}^*,\ n\left(\frac{1}{n^2}-\frac{1}{(n+1)^2}\right) = \frac{1}{n}-\frac{n}{(n+1)^2} = \frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}+\frac{1}{(n+1)^2}.$

Donc $I = \frac{1}{2}\left[\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{(n+1)^2}\right] = \frac{1}{2}\left[1+\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{1}{n^2}\right] = \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}.$

XIII.2.29 Calcul d'une intégrale (3)

[Enoncé]

XIII.2.30 Calcul d'une intégrale (4)

[Enoncé]

XIII.2.31 Permutation Série-intégrale (1)

[Enoncé]

XIII.2.32 Permutation Série-intégrale (2)

[Enoncé]

XIII.2.33 Fonction d'écart Logarithmique intégral ★★

[Enoncé]

Montrons par récurrence $\mathcal{P}(n)$: "$\exists C_n\in\mathbb{R},\ \forall x\geq 2,\ \mathrm{Li}(x) = \frac{x}{\ln x}\sum_{k=0}^{n}\frac{k!}{(\ln x)^k}+\int_2^x \frac{(n+1)!}{(\ln t)^{n+2}}dt + C_n$ " pour tout $n\in\mathbb{N}$.

Fixons $x\geq 2$.

Tout d'abord, $\forall n\in\mathbb{N},\ t\mapsto \frac{1}{(\ln t)^{n+2}}\in\mathcal{C}^1([2,x],\mathbb{R})$. Donc par IPP :

$$\mathrm{Li}(x) = \int_2^x 1\cdot\frac{1}{\ln t}dt = \left[\frac{t}{\ln t}\right]_2^x + \int_2^x t\cdot\frac{1}{t(\ln t)^2}dt = \frac{x}{\ln x}-\frac{2}{\ln 2}+\int_2^x\frac{dt}{(\ln t)^2}.$$

D'où $\mathcal{P}(0)$ en posant $C_0 = -\frac{2}{\ln 2}$.

Supposons $\mathcal{P}(n)$ pour un certain $n\in\mathbb{N}$. Similairement par IPP :

$$\int_2^x\frac{(n+1)!}{(\ln t)^{n+2}}dt = \left[\frac{t}{\ln t}\cdot\frac{(n+1)!}{(\ln t)^{n+1}}\right]+\int_2^x\frac{(n+2)!}{(\ln t)^{n+3}}dt = \frac{x}{\ln x}\cdot\frac{(n+1)!}{(\ln x)^{n+1}}-\frac{2(n+1)!}{(\ln 2)^{n+2}}+\int_2^x\frac{(n+2)!}{(\ln t)^{n+3}}dt.$$

On en déduit $\mathcal{P}(n+1)$ en posant $C_{n+1} = C_n - \dfrac{2(n+1)!}{(\ln 2)^{n+2}}$.
Ainsi $\forall n \in \mathbb{N},\ \mathcal{P}(n)$.

Montrons que $\forall n \in \mathbb{N},\ \mathrm{Li}(x) \underset{x\to+\infty}{=} \dfrac{x}{\ln x}\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\frac{k!}{(\ln x)^k} + \mathcal{O}\left(\frac{x}{(\ln x)^{n+1}}\right)$. Fixons $n \in \mathbb{N}$

$\dfrac{x}{(\ln x)^{n+1}} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$ donc $C_n \underset{x\to+\infty}{=} \mathcal{O}\left(\dfrac{x}{(\ln x)^{n+1}}\right)$.

Ensuite, $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{x}{(\ln x)^{n+1}}\right) = \dfrac{1}{(\ln x)^{n+1}} - \dfrac{n+1}{(\ln x)^{n+2}} \underset{x\to+\infty}{\sim} \dfrac{1}{(\ln x)^{n+1}}$ et $\dfrac{(n+1)!}{(\ln x)^{n+2}} \underset{x\to+\infty}{=} \mathcal{O}\left(\dfrac{1}{(\ln x)^{n+1}}\right)$.

Donc comme $x \mapsto \dfrac{1}{(\ln x)^{n+1}}$ est positive au voisinage de $+\infty$, d'après les théorèmes d'intégrations de relations de comparaisons,

— $\displaystyle\int_2^x \frac{(n+1)!}{(\ln t)^{n+2}}dt \underset{x\to+\infty}{=} \mathcal{O}\left(\int_2^x \frac{1}{(\ln t)^{n+1}}dt\right)$

— $\displaystyle\int_2^x \frac{1}{(\ln t)^{n+1}}dt \underset{x\to+\infty}{\sim} \int_2^x \left(\frac{1}{(\ln t)^{n+1}} - \frac{n+2}{(\ln t)^{n+2}}\right)dt = \frac{x}{(\ln x)^{n+1}} - \frac{2}{(\ln 2)^{n+1}} \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{x}{(\ln x)^{n+1}}$.

Ainsi $\displaystyle\int_2^x \frac{(n+1)!}{(\ln t)^{n+2}}dt \underset{x\to+\infty}{=} \mathcal{O}\left(\frac{x}{(\ln x)^{n+1}}\right)$ d'où $\mathrm{Li}(x) \underset{x\to+\infty}{=} \dfrac{x}{\ln x}\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\frac{k!}{(\ln x)^k} + \mathcal{O}\left(\frac{x}{(\ln x)^{n+1}}\right)$.

XIII.2.34 Intégrale de Bernoulli

[Enoncé]

XIII.2.35 Lemme de Riemann-Lebesgue : cas des fonctions $\mathcal{C}^1$ ★

[Enoncé]
Soit $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$. $t \mapsto e^{i\lambda t}$ et ϕ sont de classes $\mathcal{C}^1$ sur $[a,b]$ donc par IPP :
$\left|\displaystyle\int_a^b \phi(t)e^{i\lambda t}dt\right| = \left|\left[\frac{\phi(t)e^{i\lambda t}}{i\lambda}\right]_a^b - \int_a^b \frac{\phi'(t)e^{i\lambda t}}{i\lambda}dt\right| \leq \frac{2||\phi||_{\infty,[a,b]}}{\lambda} + \frac{(b-a)||\phi'||_{\infty,[a,b]}}{\lambda}$ (Le théorème des bornes atteintes justifie que ϕ et ϕ' sont bornées sur $[a,b]$).

Donc $\lim\limits_{\lambda\to+\infty}\displaystyle\int_a^b \phi(t)e^{i\lambda t}dt = 0$.

XIII.2.36 Intégrale de Poisson (1) ★★

[Enoncé]

Soit $\rho \in \mathbb{R}\setminus\{-1,1\}$. On pose pour $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = \dfrac{\pi}{n}\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1}\ln\left(1 - 2\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)\rho + \rho^2\right)$. Fixons $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned}
S_n &= \frac{\pi}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\ln\left[(\rho-e^{ik\pi/n})(\rho-e^{-ik\pi/n})\right]\\
&= \frac{\pi}{n}\ln\left(\prod_{k=0}^{n-1}(\rho-e^{ik\pi/n})(\rho-e^{-ik\pi/n})\right)\\
&= \frac{\pi}{n}\ln\left(\frac{\rho-1}{\rho+1}\prod_{k=1}^{n}(\rho-e^{-ik\pi/n})\prod_{k=0}^{n-1}(\rho-e^{ik\pi/n})\right)\\
&= \frac{\pi}{n}\ln\left(\frac{\rho-1}{\rho+1}\prod_{k=1}^{n}(\rho-e^{-i(k-2n)\pi/n})\prod_{k=0}^{n-1}(\rho-e^{ik\pi/n})\right)\\
&= \frac{\pi}{n}\ln\left(\frac{\rho-1}{\rho+1}\prod_{k=1}^{n}(\rho-e^{i(2n-k)\pi/n})\prod_{k=0}^{n-1}(\rho-e^{ik\pi/n})\right)\\
&= \frac{\pi}{n}\ln\left(\frac{\rho-1}{\rho+1}\prod_{k=n}^{2n-1}(\rho-e^{ik\pi/n})\prod_{k=0}^{n-1}(\rho-e^{ik\pi/n})\right)\\
&= \frac{\pi}{n}\ln\left(\frac{\rho-1}{\rho+1}\prod_{k=0}^{2n-1}(\rho-e^{ik\pi/n})\right)\\
&= \frac{\pi}{n}\ln\left(\frac{(\rho^{2n}-1)(\rho-1)}{\rho+1}\right)
\end{aligned}$$

$\theta\mapsto\ln(1-2\cos(\theta)\rho+\rho^2)$ est continue sur $[0,\pi]$ donc $S_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} I(\rho)$.
Si $\rho\in]-1,1[$, $I(\rho)=\lim\limits_{n\to+\infty}S_n=0$,
et si $\rho\in\mathbb{R}\setminus\{-1,1\}$, alors $S_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{\pi}{n}\ln(\rho^{2n}) \underset{n\to+\infty}{\sim} 2\pi\ln(|\rho|)$ d'où $I(\rho)=2\pi\ln(|\rho|)$.

XIII.2.37 Intégrale de Poisson (2) ★★★

[Enoncé]

1. Soit $\rho\in\mathbb{R}^*\setminus\{-1,1\}$.
$I\left(\frac{1}{\rho}\right)=\int_0^\pi\ln\left(1-2\cos(\theta)\frac{1}{\rho}+\frac{1}{\rho^2}\right)d\theta=\int_0^\pi\left(\ln(1-2\cos(\theta)\rho+\rho^2)-\ln(\rho^2)\right)d\theta=I(\rho)-2\pi\ln(|\rho|)$.

2. Remarquons d'abord que I est paire. En effet en posant $\varphi=\pi-\theta$ on a,

$$I(-\rho)=\int_0^\pi \ln(1+2\cos(\theta)\rho+\rho^2)d\theta=\int_0^\pi \ln(1-2\cos(\varphi)\rho+\rho^2)d\varphi=I(\rho).$$

$$\begin{aligned}
2I(\rho)&=I(\rho)+I(-\rho)\\
&=\int_0^\pi \ln\left[(1+2\cos(\theta)\rho+\rho^2)(1-2\cos(\theta)\rho+\rho^2)\right]d\theta\\
&=\int_0^\pi \ln\left[(1+\rho^2)^2-4\cos^2(\theta)\rho^2\right]d\theta\\
&=\int_0^\pi \ln\left[1+2(1-2\cos^2(\theta))\rho^2+\rho^4\right]d\theta\\
&=\int_0^\pi \ln(1-2\cos(2\theta)\rho^2+\rho^4)d\theta\\
(\alpha=2\theta)\ &=\int_0^{2\pi} \ln(1-2\cos(\alpha)\rho^2+\rho^4)\frac{d\alpha}{2}\\
(\beta=\alpha-\pi)\ &=\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2}\ln(1+2\cos(\beta)\rho^2+\rho^4)d\beta\\
(\text{Par parité})\ &=\int_{-\pi}^{0} \ln(1+2\cos(\beta)\rho^2+\rho^4)d\beta\\
(\gamma=\pi-\beta)\ &=\int_0^{\pi} \ln(1-2\cos(\gamma)\rho^2+\rho^4)d\gamma\\
&=I(\rho^2)
\end{aligned}$$

Par récurrence immédiate, $\forall n\in\mathbb{N}^*,\ I\left(\rho^{2^n}\right)=2^nI(\rho)$.

3. Montrons que I est continue sur $]-1,1[$. Notons $\Phi:\left\{\begin{array}{ccc}]-1,1[\times]0,\pi[&\longrightarrow&\mathbb{R}\\(\rho,\theta)&\longmapsto&\ln(1-2\cos(\theta)\rho+\rho^2)\end{array}\right.$.

$\forall\rho\in]-1,1[,\ \theta\mapsto\Phi(\rho,\theta)\in \mathrm{CM}(]0,\pi[,\mathbb{R})\times L^1(]0,\pi[,\mathbb{R})$;
$\forall\theta\in[0,\pi],\ \rho\mapsto\Phi(\rho,\theta)\in\mathcal{C}^0(]-1,1[,\mathbb{R})$;

$$\begin{aligned}
\forall(\rho,\theta)\in]-1,1[\times]0,\pi[,\ |\Phi(\rho,\theta)|&=\left|\ln((\rho-\cos(\theta))^2+\sin^2(\theta))\right|\\
&\leq\max\{|\Phi(\cos(\theta),\theta)|,|\Phi(-1,\theta)|,|\Phi(1,\cos(\theta))|\}\\
&=\max\{\left|\ln(\sin^2(\theta))\right|,|\ln(2+2\cos(\theta))|,|\ln(2-2\cos(\theta))|\}
\end{aligned}$$

Or $f:\left\{\begin{array}{ccc}]0,\pi[&\longrightarrow&\mathbb{R}\\\theta&\longmapsto&\ln(\sin^2(\theta))=2\ln(\sin(\theta))\end{array}\right.\in L^1(]0,\pi[,\mathbb{R})$, en effet f est continue par morceaux sur $]0,\pi[$ et

$$\begin{cases}f(\theta)\underset{\theta\to0^+}{=}2\ln(\theta+\mathcal{o}(\theta))\underset{\theta\to0^+}{=}2\ln(\theta)+\mathcal{o}(1)\underset{\theta\to0^+}{=}\mathcal{o}\left(\dfrac{1}{\sqrt{\theta}}\right)\\ f(\theta)\underset{\theta\to\pi^-}{=}2\ln(\pi-\theta+\mathcal{o}(\pi-\theta))\underset{\theta\to\pi^-}{=}\mathcal{o}\left(\dfrac{1}{\sqrt{\pi-\theta}}\right)\end{cases}$$

$g:\left\{\begin{array}{ccc}]0,\pi]&\longrightarrow&\mathbb{R}\\\theta&\longmapsto&\ln(2-2\cos(\theta))\end{array}\right.\in L^1(]0,\pi[,\mathbb{R})$, en effet g est continue par morceaux sur $]0,\pi]$ et

$g(\theta)\underset{\theta\to0^+}{=}\ln(\theta^2+\mathcal{o}(\theta^2))\underset{\theta\to0^+}{=}2\ln(\theta)+\ln(1+\mathcal{o}(1))\underset{\theta\to0^+}{=}\mathcal{o}\left(\dfrac{1}{\sqrt{\theta}}\right)$.

Et de même, $h:\left\{\begin{array}{ccc}[0,\pi[&\longrightarrow&\mathbb{R}\\\theta&\longmapsto&\ln(2+2\cos(\theta))\end{array}\right.\in L^1([0,\pi[,\mathbb{R})$.

Donc finalement, $\Psi:\left\{\begin{array}{ccc}]0,\pi[&\longrightarrow&\mathbb{R}\\\theta&\longmapsto&\max\{f(\theta),g(\theta),h(\theta)\}\end{array}\right.\in L^1(]0,\pi[,\mathbb{R})$ puisque

$$\Psi=\frac{1}{2}(f+\max(g,h)+|f-\max(g,h)|)=\frac{1}{2}\left(f+\frac{1}{2}(g+h+|g-h|)+\left|f-\frac{1}{2}(g+h+|g-h|)\right|\right).$$

Ainsi I est continue sur $]-1,1[$ par transfert de continuité.
En particulier, I est continue en 0 donc,
$\rho\in]-1,1[\implies\rho^{2^n}\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}0\implies 2^nI(\rho)=I\left(\rho^{2^n}\right)\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}I(0)=0\implies I(\rho)=0$
Maintenant, si $\rho\in\mathbb{R}\setminus[-1,1]$, alors $\dfrac{1}{\rho}\in]-1,1[$ et donc d'après la question 1, $I(\rho)=2\pi\ln(|\rho|)+I\left(\dfrac{1}{\rho}\right)=2\pi\ln(|\rho|)$.

XIII.2.38 Mines-Ponts MP 2024

[Enoncé]

XIII.2.39 Une suite d'intégrales (1)

[Enoncé]

XIII.2.40 Une suite d'intégrales (2)

[Enoncé]

XIII.2.41 Une suite d'intégrales (3)

[Enoncé]

XIII.2.42 Constante d'Apéry

[Enoncé]

XIII.2.43 Comportement asymptotique (1)

[Enoncé]
On pose pour tout $x \in \mathbb{R}_+$,

$$g(x) = xf(x)$$

La fonction g est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$.
$\forall x \in \mathbb{R}_+$, $g'(x) = xf'(x) + f(x) = 3f(x) + o(f(x))$.
Montrons que

$$\int_0^x g'(x)dx = xf(x) \text{ diverge quand } x \to \infty$$

On sait que :

$$\frac{f'(x)}{f(x)} \sim \frac{2}{x}$$

Donc il existe $A \in \mathbb{R}_+^*$ tel que pour tout $x \geq A$:

$$\frac{f'(x)}{f(x)} \geq \frac{1}{x}$$

Par conséquent, en intégrant entre A et $x \geq A$, on a :

$$\ln(\frac{f(x)}{f(A)}) \geq \ln(\frac{x}{A})$$

Ainsi, on en déduit que :

$$f(x) \geq f(A)\frac{x}{A}$$

Puisque $f(A) > 0$, on a $f(x) \underset{x\to+\infty}{\to} +\infty$.
Ainsi, $\int_0^x g'(x)dx = xf(x)$ diverge quand $x \to \infty$.
Finalement, on a :

$$\int_0^x 3f(x)dx \sim \int_0^x g'(t)dt$$

càd :

$$\int_0^x f(x)dt \sim \frac{xf(x)}{3}$$

XIII.2.44 Comportement asymptotique (2)

[Enoncé]

Puisque f est intégrable sur $\mathbb{R}_+$,

$$\int_{x/2}^{x} f(t)dt = 0$$

De plus, puisque f est décroissante sur $\mathbb{R}_+$,

$$\forall t \in [\frac{x}{2}, x], f(t) \geq f(x)$$

Donc,

$$\int_{x/2}^{x} f(t)dt \geq \frac{x}{2} f(x)$$

Donc $\lim\limits_{x \to =\infty} xf(x) = 0$.

La réciproque est fausse. Observons la fonction $f : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ x & \longmapsto & \frac{1}{(x+2)\ln(x+2)} \end{array} \right.$. On a

$$xf(x) \sim \frac{1}{\ln(x)} \longrightarrow 0$$

Cependant, une primitive de f est : $x \mapsto \ln(\ln(x+2))$.
Cette fonction diverge quand $x \to \infty$ donc l'intégrale également, ce qui implique que f n'est pas intégrable.

XIII.2.45 Comportement asymptotique (3)

[Enoncé]

XIII.2.46 Comportement asymptotique (4)

[Enoncé]

XIII.2.47 Théorème de d'Alembert-Gauss (1) ★★

[Enoncé]

1. Notons $f : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ \times [0, 2\pi] & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ (r, \theta) & \longmapsto & \frac{1}{P(re^{i\theta})} \end{array} \right.$.

   Puisque P ne s'annule pas sur $\mathbb{C}$,

   — $\forall r \in \mathbb{R}_+,\ \theta \mapsto f(r, \theta) \in \mathrm{CM}([0, 2\pi], \mathbb{C})$;

   — $\forall \theta \in [0, 2\pi],\ r \mapsto f(r, \theta) \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{C})$;

   — $\forall (r, \theta) \in \mathbb{R}_+ \times [0, 2\pi],\ \left|\frac{\partial f}{\partial r}(r\theta)\right| = \left|\frac{-e^{i\theta}P'(re^{i\theta})}{P(re^{i\theta})^2}\right| = \left|\frac{P'(re^{i\theta})}{P(re^{i\theta})^2}\right|$.

   Fixons $a \in \mathbb{R}_+$ et notons $D_a = \{z \in \mathbb{C},\ |z| \leq a\}$.

   Les fonctions $z \mapsto P(z)^2$ et $z \mapsto P'(z)$ sont continues sur D_a et de plus P ne s'annule pas sur $\mathbb{C}$ donc la fonction $z \mapsto \frac{P'(re^{i\theta})}{P(re^{i\theta})^2}$ est continue sur D_a qui est un compact. Elle est donc bornée par un certain $M \in \mathbb{R}_+$ sur D_a.

   Ainsi $\forall (r, \theta) \in [0, a] \times [0, 2\pi],\ re^{i\theta} \in D_a \implies \left|\frac{P'(re^{i\theta})}{P(re^{i\theta})^2}\right| \leq M$.

   Enfin la fonction $\theta \mapsto M$ est intégrable sur $[0, 2\pi]$.

   On en déduit d'après le théorème de transfert $\mathcal{C}^1$ que F est $\mathcal{C}^1$ sur $\bigcup\limits_{a \in \mathbb{R}_+} D_a = \mathbb{R}_+$ et que $\forall r \in \mathbb{R}_+^*,\ F'(r) = \int_0^{2\pi} -\frac{e^{i\theta}P'(re^{i\theta})}{P(re^{i\theta})^2} d\theta$.

2. On calcule $\forall r \in \mathbb{R}_+^*,\ F'(r) = \displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{1}{ir} \cdot \frac{-ire^{i\theta}P'(re^{i\theta})}{P(re^{i\theta})^2} d\theta = \left[\frac{1}{irP(re^{i\theta})}\right]_0^{2\pi} = 0.$
   Donc F est constante sur $\mathbb{R}_+^*$. Etant continue en 0 elle est constante sur $\mathbb{R}_+$.
3. Appliquons le théorème de convergence dominée pour déterminer la limite de F en $+\infty$.
   Par inégalité triangulaire, $\forall r \in \mathbb{R}_+,\ |F(r)| \leq \displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{|P(re^{i\theta})|}$. Or comme P n'est pas constant, $|P(z)| \underset{|z|\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$.
   Alors, $\forall \theta \in [0, 2\pi],\ |f(r,\theta)| \underset{r\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. Les autres hypothèses ont été vérifiées dans la question 1.
   Par conséquent $\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{|P(re^{i\theta})|} \underset{r\to+\infty}{\longrightarrow} \int_0^{2\pi} 0\ d\theta = 0.$
   Ainsi F est constamment nulle.
   Ceci est absurde car $F(0) = \displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{P(0)} = \frac{2\pi}{P(0)} \neq 0.$
   On en déduit le théorème de d'Alembert-Gauss.

XIII.2.48 Fonction Gamma d'Euler

[Enoncé]

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ la fonction $f_x : t \mapsto t^{x-1}e^{-t}$ est continue par morceaux sur $]0, +infty[$.
   — $t^{x-1}e^{-t} \sim_{x\to+\infty} e^{-t}$ donc f_x est intégrale en $+\infty$.
   — $t^{x-1}e^{-t} \underset{x\to0}{\sim} t^{x-1}$.
   Ainsi, f_x est intégrale en 0 si et seulement si $1 - x < 1$ i.e. $0 < x$.
   Donc Γ est défini sur $\mathbb{R}_+^*$.
2. Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$.
   Les fonctions $t \mapsto t^x$ et $t \mapsto e^{-t}$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Donc par intégration par parties :
   $$\Gamma(x+1) = \int_0^{+\infty} t^x e^{-t} = [-t^x e^{-t}]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t} = x\Gamma(x)$$
   Montrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}, \Gamma(n+1) = n!$ Pour $n = 0$,
   $$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-t}dt = [-e^{-t}]_0^{+\infty} = 1 = 0!$$
   Supposons que pour un certain $n \in \mathbb{N}$, $\Gamma(n+1) = n!$.
   $$\begin{aligned} \Gamma(n+2) &= (n+1)\Gamma(n+1) && \text{d'après la question 2} \\ &= (n+1)n! && \text{d'après l'hypothèse de récurrence} = (n+1)! \end{aligned}$$
   On a donc montré par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}, \Gamma(n+1) = n!$
3. D'après la question 2, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$,
   $$\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+1)}{x}$$
   On en déduit donc que
   $$\Gamma(x) \underset{x\to0^+}{\sim} \frac{\Gamma(1)}{x} = \frac{1}{x}$$
4. On pose la fonction :
   $$f : (x,t) \mapsto t^x e^{-t}$$
   — Pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$, $x \mapsto f(x,t)$ est de classe $\mathcal{C}^{+\infty}$ sur $\mathbb{R}_+^*$,
   — Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $t \mapsto \dfrac{\partial^k f}{\partial x^k} = \ln(t)^k t^{x-1}e^{-t}$ est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$.
   — Soit $a, b \in \mathbb{R}_+^*$..
   On définit $\varphi : t \mapsto \begin{cases} t^{a-1} & \text{quand } t \in]0,1] \\ t^{b-1}e^{-t} & \text{quand } t \in]1,+\infty[\end{cases}$ On obtient la majoration suivante :
   $$\forall x \in [a,b], \forall t \in \mathbb{R}_+^*, \quad \left|\frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x,t)\right| \leq |\ln(t)|^k \varphi(t)$$

Puisque $t \mapsto |\ln(t)|^k \varphi(t)$ est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$,

$$|\ln(t)|^k \varphi(t) = \underset{x\to 0^+}{o}\left(\frac{1}{t^{1-\frac{a}{2}}}\right)$$

et

$$|\ln(t)|^k \varphi(t) = \underset{x\to +\infty}{o}\left(\frac{1}{t^2}\right)$$

on en déduit que $t \mapsto |\ln(t)|^k \varphi(t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$.

Donc par transfert de classe, Γ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

5. $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$\Gamma''(x) = \int_0^{+\infty} \ln(t)^2 t^{x-1} e^{-t} dt$$

. Donc Γ'' est (stricte)-positive sur $\mathbb{R}_+^*$. Ainsi Γ est convexe (strictement) sur $\mathbb{R}_+^*$.

6. On pose $f : x \mapsto \ln(\Gamma(x))$.
f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f'(x) = \frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)}$$

et

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f''(x) = \frac{\Gamma''(x)\Gamma(x) - \Gamma'(x)^2}{\Gamma(x)^2}$$

Pour montrer que f est convexe, il suffit de montrer que $\Gamma''(x)\Gamma(x) \geq \Gamma'(x)^2$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$
Pour cela, on se place dans $\mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$ muni du produit scalaire canonique. Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$.
Les fonctions $t \mapsto \ln(t) t^{\frac{x-1}{2}} e^{-t/2}$ et $t \mapsto t^{\frac{x-1}{2}} e^{-t/2}$ sont continues sur $\mathbb{R}_+^*$.
D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$\left(\int_0^{+\infty} \ln(t) t^{\frac{x-1}{2}} e^{-t/2} t^{\frac{x-1}{2}} e^{-t/2} dt\right)^2 \leq \left(\int_0^{+\infty} \left(t^{\frac{x-1}{2}} e^{-t/2}\right)^2 dt\right)\left(\int_0^{+\infty} \left(\ln(t) t^{\frac{x-1}{2}} e^{-t/2}\right)^2 dt\right)$$

c'est-à-dire :

$$\Gamma'(x)^2 \leq \Gamma(x)\Gamma''(x)$$

Donc Γ est log-convexe.
Remarque : Une autre méthode consiste à utiliser l'inégalité de Hölder V.10. Cette démonstration est laissé au lecteur curieux.

Point critique et limite en $+\infty$

Valeur en les demi-entiers

Théorème de Bohr-Mollerup ★★★★

On montre (cf. II.49) que Γ vérifie les conditions de l'énoncé. Donnons nous f qui vérifie les trois conditions de l'énoncé.
On va montrer que la fonction $W : x \mapsto \ln \circ f(x) - \ln \circ \Gamma(x)$ est constante. On remarque déjà que W est 1-périodique sur $\mathbb{R}_+^*$, en effet $\forall x > 0$, $W(x+1) = \ln(f(x+1)) - \ln(\Gamma(x+1)) = \ln(xf(x)) - \ln(x\Gamma(x)) = \ln(x) + \ln \circ f(x) - \ln(x) - \ln \circ \Gamma(x) = W(x)$. Fixons $n \in \mathbb{N}$ et $x \in]0, 1]$.
On va utiliser la croissance des pentes sur $\ln \circ f$, qui est convexe, au points n, $n+1$, $n+x+1$, $n+2$:

$$\begin{aligned} &\ln \circ f(n+1) - \ln \circ f(n) \leq \frac{\ln \circ f(n+x+1) - \ln \circ f(n+1)}{x} \leq \ln \circ f(n+2) - \ln \circ f(n+1) \\ \iff &\ln(n) \leq \frac{\ln \circ f(n+x+1) - \ln \circ f(n+1)}{x} \leq \ln(n+1) \end{aligned}$$

Puis sur $\ln\circ\Gamma$:

$$\begin{aligned}
&\ln\circ\Gamma(n+1)-\ln\circ\Gamma(n)\leq\frac{\ln\circ\Gamma(n+x+1)-\ln\circ\Gamma(n+1)}{x}\leq\ln\circ\Gamma(n+2)-\ln\circ\Gamma(n+1)\\
\iff&\ln\circ\Gamma(n+1)-\ln\circ\Gamma(n+2)\leq\frac{\ln\circ\Gamma(n+1)-\ln\circ\Gamma(n+x+1)}{x}\leq\ln\circ\Gamma(n)-\ln\circ\Gamma(n+1)\\
\iff&-\ln(n+1)\leq\frac{\ln\circ\Gamma(n+1)-\ln\circ\Gamma(n+x+1)}{x}\leq-\ln(n)
\end{aligned}$$

D'où en sommant :

$$\begin{aligned}
&\ln(n)-\ln(n+1)\leq\frac{W(n+x+1)-W(n+1)}{x}\leq\ln(n+1)-\ln(n)\\
\text{Par 1-périodicité}\iff&-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\leq\frac{W(x)-W(1)}{x}\leq\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\\
\iff&-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\leq\frac{W(x)}{x}\leq\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)
\end{aligned}$$

Et donc en faisant tendre n vers $+\infty$, $\dfrac{W(x)}{x}=0$ c'est à dire $W(x)=0$.
Ceci étant vrai pour tout $x\in]0,1]$, par 1-périodicité W est nulle sur $\mathbb{R}_+^*$ c'est à dire $f=\Gamma$.

Formules de Gauss et Weierstrass

Lien entre les gamma d'Euler

Formule de duplication de Legendre

Intégrale de Raabe

Généralisation de la formule de Stirling

XIII.2.49 Fonction Beta d'Euler

[Enoncé]

Lien avec une intégrale d'Euler

Lien entre Γ et B

XIII.2.50 Inégalité intégrale-dérivée ★

[Enoncé]
D'après l'inégalité de Taylor-Lagrange, $\forall c\in[a,b]$

$$\left|\int_a^b f(t)dt\right|\leq\int_a^c|f(t)-f(a)|dt\leq\int_a^c(t-a)\|f'\|_\infty dt=\frac{(c-a)^2}{2}\|f'\|_\infty$$


.
En utilisant deux fois cela pour $c=\dfrac{a+b}{2}$,

$$\left|\int_a^b f(t)dt\right|\leq\left|\int_a^c f(t)dt\right|+\left|-\int_b^c f(t)dt\right|\leq\frac{(c-a)^2}{2}M+\frac{(b-c)^2}{2}M=\frac{(b-a)^2}{4}\|f'\|_\infty$$

.

XIII.2.51 Majoration de l'erreur dans la méthode des trapèzes

[Enoncé]
Déja pour mettre les idées en place, représentons-nous à quoi correspond la méthode des trapèzes.



On définit la subdivision régulière $(x_1, \dots, x_n)$ du segment $[a, b]$.
On pose f_i l'unique fonction affine tel que $f_i(x_i) = f(x_i)$ et $f_i(x_{i+1}) = f(x_{i+1})$.
Montrons que pour tout $x \in [x_i, x_{i+1}]$, il existe $c_x \in]x_i, x_{i+1}[$ tel que :

$$f(x) - f_i(x_i) = (x - x_i)(x_{i+1} - x)\frac{f''(c_x)}{2}$$

Si $x = x_i$ ou $x = x_{i+1}$, le résultat est immédiatement vrai.
Soit $x \in]x_i, x_{i+1}[$. On pose

$$g : t \mapsto f(t) - f_i(t) - \frac{(t - x_i)(t - x_{i+1})}{(x - x_i)(x - x_{i+1})}[f(x) - f_i(x)]$$

On vérifie aisément que cette fonction est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[x_i, x_{i+1}]$. On remarque que cette fonction s'annule en x_i, en x et en x_{i+1}.
Ainsi, d'après le théorème de Rolle, on en déduit :

— $\exists c_1 \in]x_i, x[$ tel que $g'(c_1) = 0$,
— $\exists c_2 \in]x, x_{i+1}[$ tel que $g'(c_2) = 0$.

De nouveau, d'après le théorème de Rolle, il existe $c_x \in]c_1, c_2[\subset]x_i, x_{i+1}[$ tel que $g''(c_x) = 0$.
Maintenant, calculons la dérivée seconde de g. Après calculs, on obtient :

$$\forall t \in [x_i, x_{i+1}], \quad g''(t) = f''(t) - 2\frac{[f(x) - f_i(x)]}{(x - x_i)(x - x_{i+1})}$$

Par conséquent, en évaluant en c_x, on en déduit que :

$$f(x) - f_i(x) = (x - x_i)(x_{i+1} - x)\frac{f''(c_x)}{2}$$

Ainsi, en notant $M = \|f''\|_\infty$, on a :

$$|f(x) - f_i(x)| \leq (x - x_i)(x_{i+1})\frac{M}{2}$$

Donc :

$$\left|\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) - f_i(x)dx\right| \leq \frac{M}{2}\int_{x_i}^{x_{i+1}} (x - x_i)(x_{i+1} - x)dx$$

Or :

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} (x - x_i)(x_{i+1} - x)dx = \frac{(x_{i+1} - x_i)^3}{6}$$

Donc, on en déduit l'inégalité suivante,

$$\left|\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) - f_i(x)dx\right| \leq \frac{M(x_{i+1} - x_i)^3}{12}$$

Et puisque les (x_i) forment une subdivision régulière de $[a,b]$, on a $x_{i+1}-x_i=\frac{b-a}{n}$, donc :

$$\left|\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)-f_i(x)dx\right| \leq \frac{M(b-a)^3}{12n^3}$$

Donc en notant T_n la somme des aires de trapèzes, on a finalement :

$$\begin{aligned}\left|\int_a^b f(x)dx - T_n\right| &\leq \sum_{i=0}^{n-1}\left|\int_{x_i}^{x_{i+1}} (f(x)-f_i(x))\,dx\right| \\ &\leq \sum_{i=0}^{n-1}\frac{M(b-a)^3}{12n^3} \\ &\leq \frac{M(b-a)^3}{12n^2}\end{aligned}$$

Ce résultat est vrai pour tout $n\in\mathbb{N}^*$, en particulier il est vrai pour $n=1$. Donc

$$\left|\int_a^b f(t)dt - \frac{(b-a)}{2}(f(a)+f(b))\right| \leq \frac{(b-a)^3}{12}\|f''\|_\infty$$

XIII.2.52 Inégalité de Young ★★

[Enoncé]

Soit $(a,b)\in[0,c]\times[0,f(c)]$. Tout d'abord d'après le théorème de la bijection, f est bijective de $[0,c]$ dans $[0,f(c)]$ et f^{-1} est continue sur $[0,f(c)]$.

De plus f est $\mathcal{C}^1$ et strictement croissante sur $[0,f^{-1}(b)]$, on peut donc effectuer le changement de variable $t=f(u)$ dans la seconde intégrale : $\int_0^b f^{-1}(t)dt = \int_0^{f^{-1}(b)} uf'(u)du$.

Puis par IPP, $\int_0^{f^{-1}(b)} uf'(u)du = [uf(u)]_0^{f^{-1}(b)} - \int_0^{f^{-1}(b)} f(u)du = bf^{-1}(b) - \int_0^{f^{-1}(b)} f(t)dt$.

Donc $\int_0^a f(t)dt + \int_0^b f^{-1}(t)dt = \int_{f^{-1}(b)}^a f(t)dt + bf^{-1}(b)$.

Enfin par croissance de l'intégrale,

- Si $a\geq f^{-1}(b)$, $\int_{f^{-1}(b)}^a f(t)dt \geq (a-f^{-1}(b))b$ d'où $\int_0^a f(t)dt + \int_0^b f^{-1}(t)dt \geq ab$;
- Si $a\leq f^{-1}(b)$, $\int_a^{f^{-1}(b)} f(t)dt \leq (f^{-1}(b)-a)b$ c'est à dire $\int_{f^{-1}(b)}^a f(t)dt \geq (a-f^{-1}(b))b$ d'où $\int_0^a f(t)dt + \int_0^b f^{-1}(t)dt \geq ab$.

Dans tous les cas, $\int_0^a f(t)dt + \int_0^b f^{-1}(t)dt \geq ab$.

On remarque que si $a=f^{-1}(b)$ c'est à dire si $b=f(a)$, alors il y a égalité.

Réciproquement, s'il y a égalité alors l'inégalité $\int_{f^{-1}(b)}^a f(t)dt \geq (a-f^{-1}(b))b$ est une égalité.

Autrement dit $\int_{f^{-1}(b)}^a (f(t)-b)dt = 0$. Cependant par stricte croissance de f, la fonction $t\mapsto f(t)-b$ est de signe constant sur $I=[f^{-1}(b),a]\cup[a,f^{-1}(b)]$ qui est un intervalle. Cette fonction est continue donc d'après la stricte positivité de l'intégrale, $\forall t\in I,\ f(t)=b$. En particulier, $f(a)=b$.

XIII.2.53 Transformée de Laplace

[Enoncé]

XIII.2.54 Théorème des résidus (version faible)

[Enoncé]

XIII.3 Correction Fonction réelle

XIII.3.1 Formule de Leibniz ★

[Enoncé]

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ et f, g deux fonctions de classe $\mathcal{C}^n$ sur I à valeurs dans $\mathbb{R}$. $f \times g$ est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I et :

$$(f \times g)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$$

Démonstration :

$n = 0$:

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f, g deux fonctions continues sur I à valeurs dans $\mathbb{R}$. $f \times g$ est continue sur I et $(f \times g)^{(0)} = f \times g = \sum_{k=0}^{0} \binom{0}{k} f^{(k)} g^{(0-k)}$.

Supposons le résultat vrai pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f, g deux fonctions de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur I à valeurs dans $\mathbb{R}$. A fortiori f et g sont de classe $\mathcal{C}^n$ sur I donc par hypothèse de récurrence, $f \times g$ est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I et $(f \times g)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$.

Pour tout $k \in [\![0; n]\!]$, $f^{(k)}$ et $g^{(n-k)}$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur I donc $(f \times g)^{(n)}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I c'est à dire $f \times g$ est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur I.

De plus,

$$\begin{aligned}
(f \times g)^{(n+1)} &= \left(\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)} \right)' \\
&= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left(f^{(k+1)} g^{(n-k)} + f^{(k)} g^{(n+1-k)} \right) \\
&= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k+1)} g^{(n-k)} + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)} \\
&= \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} f^{(k)} g^{(n+1-k)} + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)} \\
&= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n}{k-1} f^{(k)} g^{(n+1-k)} + \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)} \\
&= \sum_{k=0}^{n+1} \left(\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right) f^{(k)} g^{(n+1-k)} \\
&= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)}
\end{aligned}$$

Ainsi par récurrence simple, la propriété est vraie quel que soit $n \in \mathbb{N}$.

XIII.3.2 Fonction discontinue en tout point ★

[Enoncé]

L'exemple classique est la fonction indicatrice de $\mathbb{Q}$, $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}} : x \in \mathbb{R} \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$. Fixons $a \in \mathbb{R}$ et supposons pas l'absurde que $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$ est continue en a.

Supposons que $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Comme $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$, $\exists (x_n) \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$, $\lim\limits_{n \to +\infty} x_n = a$.

$\forall n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}}(x_n) = 1 \implies \lim\limits_{n \to +\infty} \mathbb{1}_{\mathbb{Q}}(x_n) = 1$. Or par continuité de $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$ en a, $\lim\limits_{n \to +\infty} \mathbb{1}_{\mathbb{Q}}(x_n) = \mathbb{1}_{\mathbb{Q}}(a) = 0$ ce qui est absurde.

Donc $a \in \mathbb{Q}$. Cependant pas densité de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, $\exists (y_n) \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})^{\mathbb{N}}$, $\lim\limits_{n \to +\infty} y_n = a$.

De même, $\forall n \in \mathbb{N},\ \mathbb{1}_{\mathbb{Q}}(y_n) = 0 \implies \lim\limits_{n\to+\infty} \mathbb{1}_{\mathbb{Q}}(y_n) = 0$. Or par continuité de $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$ en a, $\lim\limits_{n\to+\infty} \mathbb{1}_{\mathbb{Q}}(y_n) = \mathbb{1}_{\mathbb{Q}}(a) = 1$.
Ceci est absurde donc $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$ n'est pas continue en a.
Finalement $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$ n'est continue en aucun point de $\mathbb{R}$.

XIII.3.3 Fonction nulle part dérivable

[Enoncé]

XIII.3.4 Theorème de Rolle

[Enoncé]

XIII.3.5 Inégalité intégrale de Jensen ★

[Enoncé]
Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Notons pour $k \in [\![0; n-1]\!],\ x_k = a + k \times \dfrac{b-a}{n} \in [a,b]$.
$\dfrac{1}{n} \geq 0$ et $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} = 1$ donc d'après l'inégalité de Jensen appliquée à φ qui est convexe :
$\varphi\left(\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} f(x_k)\right) \leq \displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} \varphi \circ f(x_k)$.

Or comme $\varphi \circ f$ est continue par morceaux sur $[a,b]$, d'après le cours $\dfrac{b-a}{n} \displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \varphi \circ f(x_k) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \int_a^b \varphi \circ f(t)dt$.

De même, $\dfrac{b-a}{n} \displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \int_a^b f(t)dt$.
Ainsi par continuité de φ, le passage à la limite donne :

$$\varphi\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)dt\right) \leq \frac{1}{b-a}\int_a^b \varphi \circ f(t)dt$$

XIII.3.6 Lemme de Croft ★★

[Enoncé]
Soit $\varepsilon > 0$. Par uniforme continuité de f, $\exists \eta > 0,\ \forall (x,y) \in \mathbb{R}_+^2,\ |x-y| \leq \eta \implies |f(x) - f(y)| \leq \dfrac{\varepsilon}{2}$.
Par hypothèse la suite $(f(n\eta))_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers 0. Donc $\exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\ |f(n\eta)| \leq \dfrac{\varepsilon}{2}$.
Soit $x \geq N\eta$. $\exists n = \lfloor x \rfloor \geq N,\ n\eta \leq x\eta < (n+1)\eta$.
D'une part, $|x - n\eta| \leq \eta$ donc $|f(x) - f(n\eta)| \leq \dfrac{\varepsilon}{2}$ et d'autre part, $n \geq N$ donc $|f(n\eta)| \leq \dfrac{\varepsilon}{2}$.
Ainsi par inégalité triangulaire, $|f(x)| \leq |f(x) - f(n\eta)| + |f(n\eta)| \leq \varepsilon$.
Par conséquent $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

XIII.3.7 Dérivée symétrique ★

[Enoncé]

1. Supposons que f soit dérivable en un point $a \in \mathbb{R}$.
   $\dfrac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} = \dfrac{f(a+h) - f(a)}{2h} + \dfrac{f(a) - f(a-h)}{2h} \underset{h\to0}{\longrightarrow} \dfrac{f'(a)}{2} + \dfrac{f'(a)}{2} = f'(a)$ qui est finie par hypothèse.
2. Ce n'est pas une condition nécessaire. Considérons la fonction $f : x \mapsto |x|$.
   f n'est pas dérivable en 0 pourtant, $\dfrac{f(h) - f(-h)}{2h} = 0 \underset{h\to0}{\longrightarrow} 0$.

XIII.3.8 Continuité au sens de Cesàro ★★★

[Enoncé]

1. Supposons que f est continue au sens de Cesàro.

   Soit $(x,y)\in\mathbb{R}^2$. On définie une suite $(z_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ par $\forall n\in\mathbb{N}^*,\ z_{2n}=x,\ z_{2n-1}=y$. On note $\forall n\in\mathbb{N}^*,\ c_n=\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n}z_k$.

   Alors

   — $c_{2n}=\dfrac{1}{2n}\displaystyle\sum_{k=1}^{2n}z_k=\dfrac{1}{2n}\left(\sum_{k=1}^{n}z_{2k}+\sum_{k=1}^{n}z_{2k-1}\right)=\dfrac{nx+ny}{2n}=\dfrac{x+y}{2}\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}\dfrac{x+y}{2}$;

   — $c_{2n+1}=\dfrac{1}{2n+1}\displaystyle\sum_{k=1}^{2n+1}z_k=\dfrac{1}{2n+1}\left(\sum_{k=1}^{n}z_{2k}+\sum_{k=1}^{n+1}z_{2k-1}\right)=\dfrac{nx+(n+1)y}{2n+1}\longrightarrow\dfrac{x+y}{2}$.

   Ainsi $c_n\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}\dfrac{x+y}{2}$. Donc par continuité de Cesàro $f(c_n)\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}f\left(\dfrac{x+y}{2}\right)$.

   Or on montre de même que pour (c_n) que $f(c_n)\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}\dfrac{f(x)+f(y)}{2}$.

   Donc par unicité de la limite, $f\left(\dfrac{x+y}{2}\right)=\dfrac{f(x)+f(y)}{2}$.

2. Soit $(x,y)\in\mathbb{R}^2$. Posons $g=f-f(0)$. g vérifie la même équation que f et est continue au sens de Cesàro.

   En évaluant l'égalité en $(2x,0)$ on obtient $g(x)=\dfrac{g(2x)}{2}$.

   Puis en évaluant l'égalité en $(2x,2y)$ on obtient $g(x+y)=\dfrac{g(2x)+g(2y)}{2}=g(x)+g(y)$.

   On montre alors classiquement (cf. V.18 tome Algèbre) que $g_{|\mathbb{Q}}=g(1)\,\mathrm{Id}_{\mathbb{Q}}$.

   On a envie de conclure par densité de $\mathbb{Q}$ en invoquant la continuité de g. Malheureusement la continuité au sens de Cesàro n'implique par la continuité usuelle (car la réciproque du lemme de Cesàro est fausse). Il faut donc réussir à écrire un réel x quelconque comme limite d'une suite $(c_n)=\left(\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n}x_k\right)$ où $(x_n)\in\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$.

   On sait que $x=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\lfloor nx\rfloor}{n}$. Donc par le lemme de Cesàro (cf.I.1) $x=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\dfrac{\lfloor kx\rfloor}{k}$.

   On en déduit par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$ que $g=g(1)\,\mathrm{Id}_{\mathbb{R}}$.

   Par suite $\exists(m,p)=(g(1),f(0))\in\mathbb{R}^2,\ \forall x\in\mathbb{R},\ f(x)=mx+p$.

   Réciproquement, toutes les fonctions affines sont continues au sens de Cesàro.

XIII.3.9 Une équation fonctionnelle (1) ★★★

[Enoncé]

1. En prenant $x=y=0$ on obtient $f(0)=2f(0)$ d'où $f(0)=0$. Etant donnée l'hypothèse que l'on a, faisons apparaître le taux d'accroissement de f en 0 :

   $\forall x\in\mathbb{R},\ \forall h\in\mathbb{R},\ \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}=\dfrac{e^h-1}{h}f(x)+e^x\dfrac{f(h)}{h}$.

   Par hypothèse $\dfrac{f(h)}{h}=\dfrac{f(h)-f(0)}{h-0}\underset{h\to0}{\longrightarrow}f'(0)$ donc $\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}\underset{h\to0}{\longrightarrow}f(x)+f'(0)e^x$.

   Ainsi f est solution sur $\mathbb{R}$ du problème de Cauchy

   $$\begin{cases}f'(x)=f(x)+f'(0)e^x\\ f(0)=0\end{cases}$$

   On en déduit $\forall x\in\mathbb{R},\ f(x)=f'(0)xe^x$. Réciproquement, $\forall\lambda\in\mathbb{R},\ x\mapsto\lambda xe^x$ est solution.

2. <u>1ère méthode :</u>

   Posons $F:x\mapsto\displaystyle\int_0^x f(t)dt$. Fixons $y\in\mathbb{R}$ et $z>0$. En intégrant l'équation par rapport à x de 0 à z on obtient :

   $F(y+z)-F(y)=\displaystyle\int_y^{y+z}f(t)dt=\int_0^z f(t+y)dt=e^yF(z)+(e^z-1)f(y)$.

Donc $f(y) = \dfrac{F(y+z) - F(y) - e^y F(z)}{e^z - 1}$. Par le TFA cette expression est $\mathcal{C}^1$ en y donc on est ramené au cas de la question 1.

2nd méthode :

On remarque que $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ \dfrac{f(x+y)}{e^{x+y}} = \dfrac{f(x)}{e^x} + \dfrac{f(y)}{e^y}$.

La fonction $g : t \mapsto \dfrac{f(t)}{e^t}$ vérifie donc :

$$\begin{cases} \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ g(x+y) = g(x) + g(y) \\ g \text{ est continue sur } \mathbb{R} \end{cases}$$

On montre alors classiquement (cf. V.18 tome Algèbre) que $g = g(1)\,\mathrm{Id}_{\mathbb{R}}$ et par suite $\forall t \in \mathbb{R},\ f(t) = g(1)te^t$.
Réciproquement, $\forall \lambda \in \mathbb{R},\ t \mapsto \lambda t e^t$ est solution.

Remarque : La continuité de f en 0 donne sa continuité sur $\mathbb{R}$, en effet si $x \in \mathbb{R}$ alors $f(x+h) = e^h f(x) + e^x f(h) \underset{h\to 0}{\longrightarrow} f(x) + e^x f(0) = f(x)$ donc f est continue en x.

XIII.3.10 Une équation fonctionnelle (2)

[Enoncé]

1. Pour $(x,y) = (0,y)$ on obtient $f(0) = f(0)f(y)$ donc f est constante égale à 1 ou bien $f(0) = 0$. Supposons f non constamment égale à 1.
On remarque aussi que pour $x \in \mathbb{R},\ f(x^2) = f(x)^2 \geq 0$. Donc $f(\mathbb{R}_+) \subset \mathbb{R}_+$ si bien que f est croissante ou nulle sur $\mathbb{R}_+$.
Or on a aussi $f(1) = f(1)^2$ donc $f(1) \in \{-1, 1\}$ d'où $f(1) = 1$. Ainsi f est croissante.
Ensuite $f(-1)^2 = f(1) = 1$ donc $f(-1) \in \{-1,1\}$ d'où $f(-1) = -1$. Mais alors $\forall x \in \mathbb{R},\ f(-x) = f(-1)f(x) = -f(x)$: f est impaire.
Remarquons enfin que $\forall x > 0,\ f(x)f(x^{-1}) = f(1) = 1$, et donc $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$. Tout cela montre qu'il suffit d'étudier f sur $[1, +\infty[$ (et au passage on a obtenu $f(\mathbb{R}_+^*) \subset \mathbb{R}_+^*$). On fixe $x > 1$.
Par récurrence immédiate $\forall n \in \mathbb{N},\ f(x^n) = f(x)^n$. Puis en appliquant ces égalités à x^{-1} on a même $\forall n \in \mathbb{Z},\ f(x^n) = f(x)^n$.
Ensuite si $a, b \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*,\ f(x^{a/b})^b = f(x^a) = f(x)^a$ d'où $f(x^{a/b}) = f(x)^{a/b}$. Autrement dit, $\forall q \in \mathbb{Q},\ f(x^q) = f(x)^q$.
Montrons que $\forall \alpha \in \mathbb{R},\ f(x^\alpha) = f(x)^\alpha$. On suppose par l'absurde $f(x^\alpha) \neq f(x)^\alpha$.
On pose pour $n \in \mathbb{N}^*,\ \alpha_n = \lfloor n\alpha \rfloor$. $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \dfrac{\alpha_n}{n} \leq \alpha < \dfrac{\alpha_n + 1}{n}$.
Si $f(x^\alpha) < f(x)^\alpha$, par croissance de f avec $x > 1$ on a $f(x)^{\frac{\alpha_n}{n}} = f(x^{\frac{\alpha_n}{n}}) \leq f(x^\alpha) < f(x)^\alpha$.
Ainsi par le théorème des gendarmes $f(x^\alpha) = f(x)^\alpha$.
De même, si $f(x^\alpha) > f(x)^\alpha$ on a $f(x)^\alpha < f(x^\alpha) \leq f(x^{\frac{\alpha_n+1}{n}}) = f(x)^{\frac{\alpha_n+1}{n}}$ ce qui donne $f(x^\alpha) = f(x)^\alpha$.
Dans tous les cas $f(x^\alpha) = f(x)^\alpha$.
Ainsi $\forall x > 0,\ f(x) = f(e^{\ln x}) = f(e)^{\ln x} = x^{\ln(f(e))}$.
En particulier, $\exists \lambda \geq 0,\ \forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = x^\lambda$. Finalement, comme f est définie sur $\mathbb{R}$, λ est un entier naturel impair.
On conclut que les fonctions monotones vérifiant $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ f(xy) = f(x)f(y)$ sont, la fonction nulle et les fonctions $x \mapsto x^n$ avec n un entier naturel nul ou impair.

2.

XIII.3.11 Fonction de Pringsheim ★★

[Enoncé]

On reconnaît bien évidemment la fonction indicatrice de $\mathbb{Q}$!
Soit $x \in \mathbb{Q}$. On note $x = \dfrac{a}{b}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$.

A partir du rang $n = b$, $n!x$ est un entier.
Ainsi, $\forall n \geq b,\ |\cos(n!\pi x)| = 1$. D'où $\forall n \geq b,\ \lim\limits_{m\to+\infty} |\cos(n!\pi x)|^m = 1$.
Enfin $f(x) = \lim\limits_{n\to+\infty} \lim\limits_{m\to+\infty} |\cos(n!\pi x)|^m = 1$.

Supposons maintenant que $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Alors, $\forall n \in \mathbb{N},\ n!x \notin \mathbb{N}$.
En effet si il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $a = n!x \in \mathbb{N}$ alors $x = \dfrac{a}{n!} \in \mathbb{Q}$ ce qui est absurde.
Ainsi, $\forall n \in \mathbb{N},\ |\cos(n!\pi x)| < 1$. D'où $\forall n \in \mathbb{N},\ \lim\limits_{m\to+\infty} |\cos(n!\pi x)|^m = 0$.
On en déduit que $f(x) = \lim\limits_{n\to+\infty} \lim\limits_{m\to+\infty} |\cos(n!\pi x)|^m = 0$.
On a montré que $f = \mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$.

XIII.3.12 $f \circ f = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}_+}$ ★★

[Enoncé]
f est bijective donc en particulier injective. Etant continue, elle est strictement monotone sur $\mathbb{R}_+$.
Supposons que f est décroissante.
$\forall x \in \mathbb{R}_+,\ f(x) \leq f(0)$. Donc $f(0) + 1 \notin f(\mathbb{R}_+)$ ce qui est absurde car f est surjective.
Ainsi f est strictement croissante. Supposons par l'absurde que $f \neq \mathrm{Id}_{\mathbb{R}_+}$. Il existe alors $x \in \mathbb{R}_+$ tel que $f(x) \neq x$.
Mais alors $f(x) > x \iff f \circ f(x) > f(x) \iff x > f(x)$ ce qui est absurde.
Par conséquent $f = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}_+}$.

XIII.3.13 Point fixe d'une fonction continue et décroissante sur $\mathbb{R}$ ★

[Enoncé]
$-f$ est croissante donc elle admet une limite $l_+ \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ en $+\infty$ et une limite $l_- \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ en $-\infty$.
Alors la fonction $g = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}} - f$ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, $\lim\limits_{-\infty} g = -\infty$ et $\lim\limits_{+\infty} g = +\infty$. Ainsi d'après le théorème de la bijection, g est bijective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
Par conséquent, $\exists!\ x \in \mathbb{R},\ f(x) = x$.

XIII.3.14 Un théorème du point fixe (1) ★

[Enoncé]
Posons $g = f - \mathrm{Id}_{[0,1]}$.
g est continue sur $[0,1]$, $g(0) = f(0) \geq 0$ et $g(1) = f(1) - 1 \leq 0$.
Alors d'après le TVI, $\exists x \in [0,1],\ g(x) = 0$. c'est à dire $\exists x \in [0,1],\ f(x) = x$.

XIII.3.15 Un théorème du point fixe (2) ★★

[Enoncé]
Par hypothèse $(a,b) \in f(I)^2$ donc $\exists (\alpha,\beta) \in I^2,\ f(\alpha) = a,\ f(\beta) = b$.
Posons $g = f - \mathrm{Id}_I$. g est continue sur I.
$(\alpha,\beta) \in I^2$ donc $a \leq \alpha$ et $\beta \leq b$.
Par conséquent, $g(\alpha) = f(\alpha) - \alpha = a - \alpha \leq 0$ et $g(\beta) = f(\beta) - \beta = b - \beta \geq 0$.
Alors d'après le TVI, $\exists x \in [a,b],\ g(x) = 0$. C'est à dire $\exists x \in [a,b],\ f(x) = x$.

XIII.3.16 Point fixe de $f \circ f$ ★★

[Enoncé]
Supposons que f n'ait pas de point fixe. Alors étant continue, $f < \mathrm{Id}_{\mathbb{R}}$ ou $f > \mathrm{Id}_{\mathbb{R}}$.
Si $f < \mathrm{Id}_{\mathbb{R}}$ alors $\forall x \in \mathbb{R},\ f(f(x)) < f(x) < x$ Or $f \circ f$ admet un point fixe et est continue donc ceci est absurde.
De même si $f > \mathrm{Id}_{\mathbb{R}}$ alors $\forall x \in \mathbb{R},\ f(f(x)) > f(x) > x$ ce qui est absurde.
Finalement f admet un point fixe.

XIII.3.17 Point fixe de $f \circ g$ et $g \circ f$ ★★

[Enoncé]

1. La fonction $f \circ g - \mathrm{Id}_{\mathbb{R}}$ est continue et strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ elle est donc injective.
   Ensuite, par décroissance de $f \circ g$, $\forall x \in \mathbb{R}_+,\ f \circ g(x) - x \leq f \circ g(0) - x$ et $\forall x \in \mathbb{R}_-,\ f \circ g(x) - x \geq f \circ g(0) - x$.
   Par conséquent $\lim\limits_{x\to+\infty} f \circ g(x) - x = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} f \circ g(x) - x = +\infty$.

D'après le théorème des valeurs intermédiaire $f \circ g - \mathrm{Id}$ s'annule sur $\mathbb{R}$ c'est à dire $f \circ g$ admet un point fixe. De plus puisque qu'elle est injective sur $\mathbb{R}$ ce point est unique.

2. Notons L le point fixe de $f \circ g$.
$f \circ g(L) = L \implies g \circ f(g(L)) = g(L)$ et donc $g \circ f$ admet $g(L)$ comme point fixe.
Soit L' un point fixe de $g \circ f$.
$g \circ f(L') = L' \implies f \circ g(f(L')) = f(L')$.
Alors d'après la question 1, $f(L') = L$ puis $g \circ f(L') = L' = g(L)$.
Ainsi $g(L)$ est l'unique point fixe de $g \circ f$.

XIII.3.18 Racine carrée de cos ★★★

[Enoncé]

1. Posons $g = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}} - \cos$. g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R},\ g'(x) = 1 + \sin(x) \geq 0$. De plus il n'y a égalité qu'en un nombre dénombrable de point donc g est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
Comme $g(0) = -1 < 0$, $g\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} \geq 0$ et comme g est continue sur $\mathbb{R}$, $\exists! x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right],\ \cos(x) = x$.
2. Supposons qu'une telle fonction existe.
Alors $f(x) = f(\cos(x)) = f \circ f(f(x)) = \cos(f(x))$.
Autrement dit $f(x)$ est un point fixe de cos. Par unicité de ce point fixe, $f(x) = x$. Ensuite en dérivant $f \circ f = \cos$: $f' \times f' \circ f = -\sin$.
Puis en évaluant en x :
$f'(x)f'(f(x)) = f'(x)^2 = -\sin(x) < 0$.
Ceci est absurde donc il n'existe pas de fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f \circ f = \cos$.
3. Supposons encore qu'une telle fonction existe.
Soient $x, y \in [0, \pi]$ tels que $f(x) = f(y)$.
Alors $f \circ f(x) = f \circ f(y)$ c'est à dire $\cos(x) = \cos(y)$ c'est à dire $x = y$ par injectivité de cos sur $[0, \pi]$. Ainsi f est injective sur $[0, \pi]$. Etant continue elle est strictement monotone sur $[0, \pi]$.
Mais alors $f \circ f$ est strictement croissante sur $[0, \pi]$. En effet,
   — f strictement croissante $\implies f(x) > f(y) \implies f(f(x)) > f(f(y))$;
   — f strictement décroissante $\implies f(x) < f(y) \implies f(f(x)) > f(f(y))$.
Or ceci est absurde car cos n'est pas strictement croissante sur $[0, \pi]$.
Finalement il n'existe pas de fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue sur $\mathbb{R}$ telle que $f \circ f = \cos$.

XIII.3.19 Trigonométrie ★

[Enoncé]

1. Soit $x \in [-1, 1]$. Posons $\alpha = \arcsin(x)$ et $\beta = \arccos(x)$. $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ et $\beta \in [0, \pi]$.
$\sqrt{1 - x^2} = \sqrt{1 - \sin^2(\alpha)} = |\cos(\alpha)| = \cos(\arcsin(x))$.
$\sqrt{1 - x^2} = \sqrt{1 - \cos^2(\beta)} = |\sin(\beta)| = \sin(\arccos(\alpha))$.
2. Posons $\theta = \arcsin(x) \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.
$$\arctan\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right) = \arctan\left(\frac{\sin(\theta)}{\sqrt{1-\sin^2(\theta)}}\right) = \arctan\left(\frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}\right) = \arctan(\tan(\theta)) = \theta = \arcsin(x).$$
Attention ! L'avant dernière égalité est vraie car arctan est la fonction réciproque de tan : $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \to \mathbb{R}$.
3. Posons $f : x \mapsto \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$.
f est impaire : $\forall x \neq 0,\ f(-x) = \arctan(-x) + \arctan\left(-\frac{1}{x}\right) = -\arctan(x) - \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = -f(x)$.
f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.
$$\forall x > 0,\ f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2} \times \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} = 0.$$

$\mathbb{R}_+^*$ est un intervalle donc $\exists C \in \mathbb{R},\ \forall x > 0,\ f(x) = C$.
De plus $C = \lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \dfrac{\pi}{2}$.
Donc $\begin{cases} \forall x > 0,\ \arctan(x) + \arctan\left(\dfrac{1}{x}\right) = \dfrac{\pi}{2} \\ \forall x < 0,\ \arctan(x) + \arctan\left(\dfrac{1}{x}\right) = -\dfrac{\pi}{2} \end{cases}$.

4. Posons $g : x \mapsto \arcsin(x) + \arccos(x)$. g est impaire sur $[-1,1]$ et dérivable sur $]-1,1[$ et,
$\forall x \in]-1,1[,\ g'(x) = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 0$.
Donc $\exists C' \in \mathbb{R},\ \forall x \in]-1,1[,\ g(x) = C'$.
On calcule $C' = \lim\limits_{x\to 1} g(x) = g(1) = \dfrac{\pi}{2} - 0 = \dfrac{\pi}{2}$.
Ainsi $\forall x \in [-1,1],\ \arcsin(x) + \arccos(x) = \dfrac{\pi}{2}$.

5. On déduit de la formule d'addition de tan : $\forall (a,b) \in \left]-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right[^2,\ \tan(a)\tan(b) \neq 1 \implies \tan(a+b) = \dfrac{\tan(a)+\tan(b)}{1-\tan(a)\tan(b)}$,
l'identité $\tan(4x) = \dfrac{2\tan(2x)}{1-\tan(2x)^2} = \dfrac{2\dfrac{2\tan(x)}{1-\tan(x)^2}}{1-\left(\dfrac{2\tan(x)}{1-\tan(x)^2}\right)^2} = \dfrac{4\tan(x)(1-\tan^2(x))}{(1-\tan^2(x))^2 - 4\tan^2(x)}$.
$\tan\left(4\arctan\left(\dfrac{1}{5}\right) - \arctan\left(\dfrac{1}{239}\right)\right) = \dfrac{\tan\left(4\arctan\left(\frac{1}{5}\right)\right) - \tan\left(\arctan\left(\frac{1}{239}\right)\right)}{1+\tan\left(4\arctan\left(\frac{1}{5}\right)\right)\tan\left(\arctan\left(\frac{1}{239}\right)\right)}$.
On calcule $\tan\left(4\arctan\left(\dfrac{1}{5}\right)\right) = \dfrac{\dfrac{4}{5}\left(1-\left(\dfrac{1}{5}\right)^2\right)}{\left(1-\left(\dfrac{1}{5}\right)^2\right)^2 - 4\left(\dfrac{1}{5}\right)^2} = \dfrac{\dfrac{96}{125}}{\dfrac{576}{625} - \dfrac{4}{25}} = \dfrac{96}{125} \times \dfrac{625}{476} = \dfrac{120}{119}$.
Puis $\tan\left(4\arctan\left(\dfrac{1}{5}\right) - \arctan\left(\dfrac{1}{239}\right)\right) = \dfrac{\dfrac{120}{119} - \dfrac{1}{239}}{1 + \dfrac{120}{119}\times\dfrac{1}{239}} = 1$.
Or $\dfrac{1}{5} \leq \dfrac{\sqrt{8}-2}{2}$ donc par croissance de arctan,
$\arctan\left(\dfrac{1}{239}\right) \leq \arctan\left(\dfrac{1}{5}\right) \leq 4\arctan\left(\dfrac{1}{5}\right) \leq 4\arctan\left(\dfrac{\sqrt{8}-2}{2}\right)$ et $\arctan\left(\dfrac{1}{239}\right) \geq 0$.
Posons $x = \tan\left(\dfrac{\pi}{8}\right)$.
On sait que $x \geq \arctan(0) = 0$ et que $1 = \tan\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = \dfrac{2x}{1-x^2}$ donc que $1 - 2x - x^2 = 0$ d'où $x = \dfrac{\sqrt{8}-2}{2}$.
Ainsi, $0 \leq 4\arctan\left(\dfrac{1}{5}\right) - \arctan\left(\dfrac{1}{239}\right) \leq \dfrac{\pi}{2}$.
On en déduit par bijectivité de tan : $\left]-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right[$:

$$4\arctan\left(\frac{1}{5}\right) - \arctan\left(\frac{1}{239}\right) = \frac{\pi}{4}$$

XIII.3.20 Règle de l'Hôpital

[Enoncé]

XIII.3.21 Dérivabilité de la racine ★★★

[Enoncé]
La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ donc par composition si $f(x) \neq 0$ alors $\sqrt{f}$ est dérivable en x. On peut donc se contenter de montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, si $f(x) = 0$ alors f est dérivable en x si et seulement si $f''(x) = 0$.
$\sqrt{f}$ est dérivable en $x \in \mathbb{R}$ si et seulement s'il existe un réel a tel que $\sqrt{f(x+h)} \underset{h\to 0}{=} \sqrt{f(x)} + ah + o(h)$.

Fixons $x \in \mathbb{R}$ tel que $f(x) = 0$.
Si $\sqrt{f}$ est dérivable en x alors $\exists a \in \mathbb{R},\ \sqrt{f(x+h)} \underset{h\to 0}{=} ah + o(h)$. Or si $a \neq 0$ alors $\sqrt{f(x+h)} \underset{h\to 0}{\sim} ah$ et comme le membre de gauche est positif au voisinage de 0, celui de droite aussi ce qui est absurde.
Par conséquent $\sqrt{f}$ est dérivable en x si et seulement si $\sqrt{f(x+h)} \underset{h\to 0}{=} o(h)$.
Comme f est à valeurs positives, si f s'annule en x alors elle atteint un minimum local en x et donc $f'(x) = 0$ et $f''(x) \geq 0$.
On sait que $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x+h) \underset{h\to 0}{=} f(x) + f'(x)h + \frac{f''(x)}{2}h^2 + o\left(h^2\right) \underset{h\to 0}{=} \frac{f''(x)}{2}h^2 + o\left(h^2\right)$.
Ainsi $\sqrt{f(x+h)} \underset{h\to 0}{=} \sqrt{\frac{f''(x)}{2}}|h|\sqrt{1+o(1)} \underset{h\to 0}{=} \sqrt{\frac{f''(x)}{2}}|h|(1+o(1)) \underset{h\to 0}{=} \sqrt{\frac{f''(x)}{2}}|h| + o(h)$.
Si $f''(x) = 0$ c'est bon, sinon $\frac{\sqrt{f(x+h)}}{h}$ n'admet pas de limite lorsque h tend vers 0.

XIII.3.22 Dérivée et inverse confondus

[Enoncé]

XIII.3.23 Fonction croissante et convexe sur $\mathbb{R}$ ★

[Enoncé]

1. On sait que $\forall x \in \mathbb{R},\ f'(x) \geq 0$. De plus f n'est pas constante donc il existe $y \in \mathbb{R},\ f'(y) > 0$.
   Alors comme f est convexe, elle est au dessus de sa tangente en y :
   $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) \geq f'(y)(x-y) + f(y)$.
   Or comme $f'(y) > 0,\ f'(y)(x-y) + f(y) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$. Ainsi $\lim\limits_{+\infty} f = +\infty$.
2. Comme f n'est pas constante on sait qu'il existe deux réels x, y tels que $f(x) \neq f(y)$. Quitte à échanger x et y supposons que $x < y$. Par croissance, $f(x) < f(y)$
   Comme f est convexe, on sait que l'application $p : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R}\setminus\{x\} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ u & \longmapsto & \dfrac{f(u)-f(x)}{u-x} \end{array} \right.$ est croissante.
   Donc $\forall u \geq y,\ p(u) \geq p(y)$.
   Or, $\forall u \geq y,\ p(u) \geq p(y) \iff f(u) \geq \frac{u-x}{y-x}(f(y)-f(x)) + f(x)$.
   $y - x > 0$ et $f(y) - f(x) > 0$ donc $\lim\limits_{u\to+\infty} \frac{u-x}{y-x}(f(y)-f(x)) + f(x) = +\infty$.
   Ainsi $\lim\limits_{+\infty} f = +\infty$.

XIII.3.24 Convexité des fonctions continues ★★★★

[Enoncé]
Si f est convexe sur I alors pour $\lambda = \frac{1}{2}$,

$$\forall (x,y) \in I^2,\ f\left(\frac{x+y}{2}\right) = f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y) = \frac{f(x)+f(y)}{2}$$

Réciproquement, supposons que $\forall (x,y) \in I^2,\ f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}$.
Montrons par récurrence la propriété $\mathcal{P}(n)$: "$\forall (x_1,\dots,x_n) \in I^n,\ f\left(\frac{x_1+\cdots+x_n}{n}\right) \leq \frac{f(x_1)+\cdots+f(x_n)}{n}$" pour $n \geq 2$.
$\mathcal{P}(1)$ est vraie par hypothèse. Supposons $\mathcal{P}(n)$ pour un certain $n \geq 2$ puis montrons $\mathcal{P}(2n)$ et $\mathcal{P}(n-1)$ si $n \neq 2$. Fixons $(x_1,\dots,x_{2n}) \in I^{2n}$.
En posant $x = \frac{x_1+\cdots+x_n}{n}$ et $y = \frac{x_{n+1}+\cdots+x_{2n}}{n}$ on a $(x,y) \in I^2$ d'où :
$f\left(\frac{x_1+\cdots+x_{2n}}{2n}\right) = f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}$.

Puis par hypothèse de récurrence, $f(x) \leq \dfrac{f(x_1)+\cdots+f(x_n)}{n}$ et $f(y) \leq \dfrac{f(x_{n+1})+\cdots+f(x_{2n})}{n}$ d'où $\mathcal{P}(n+1)$.

Ensuite, supposons que $n \neq 2$ et donnons nous $(x_1, \ldots, x_{n-1}) \in I^{n-1}$.
Posons $x_n = \dfrac{x_1+\cdots+x_{n-1}}{n-1}$. On a :
$f(x_n) = f\left(\dfrac{x_1+\cdots+x_n}{n}\right) \leq \dfrac{f(x_1)+\cdots+f(x_n)}{n}$.
C'est à dire $f(x_n) \leq \dfrac{f(x_1)+\cdots+f(x_{n-1})}{n-1}$ d'où $\mathcal{P}(n-1)$.
Ainsi par récurrence de Cauchy, pour tout entier $n \geq 2$, $\mathcal{P}(n)$.

On peut alors en déduire que si $\lambda = \dfrac{a}{b} \in]0,1[$ avec $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N} \setminus \{0,1\}$ alors, en posant $x_1 = \cdots = x_a = x$ et $x_{a+1} = \cdots = x_b = y$ on a par $\mathcal{P}(b)$:
$\forall (x,y) \in I^2,\ f(\lambda x+(1-\lambda)y) = f\left(\dfrac{ax+(b-a)y}{b}\right) = f\left(\dfrac{x_1+\cdots+x_b}{b}\right) \leq \dfrac{f(x_1)+\cdots+f(x_b)}{b} = \dfrac{af(x)+(b-a)f(y)}{b} = \lambda f(x)+(1-\lambda)f(y)$.
On conclut par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$ et continuité de f.

XIII.3.25 Continuité des fonctions convexes ★★

[Enoncé]

1. Soit $x \in I$.
   La fonction $p_x : y \mapsto \dfrac{f(x)-f(y)}{x-y}$ est croissante sur $I \setminus \{x\}$ donc elle admet une limite en x par valeurs supérieures et par valeurs inférieures. Ces deux limites sont finies car x est un point intérieur à I donc f est dérivable, à gauche et à droite, en x. On note $f'_g(x)$ et $f'_d(x)$ ces deux limites.
   On a $\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h} \underset{h\to 0^-}{=} f'_g(x)+o(1)$ donc $f(x+h)-f(x) \underset{h\to 0^-}{=} hf'_g(x)+o(h) \underset{h\to 0^-}{=} o(1)$.
   Autrement dit $f(x+h) \underset{h\to 0^-}{\longrightarrow} f(x)$.
   De même, $\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h} \underset{h\to 0^+}{=} f'_d(x)+o(1)$ donc $f(x+h) \underset{h\to 0^+}{\longrightarrow} f(x)$.
   Ainsi $f(x+h) \underset{h\to 0}{\longrightarrow} f(x)$ c'est à dire f est continue en x.
2. L'hypothèse I ouvert est essentielle. Considérons $f : x \mapsto \begin{cases} e^x & \text{si } x > 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$.
   f est deux fois dérivables sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\forall x > 0,\ f''(x) = e^x \geq 0$. Donc f est convexe sur $\mathbb{R}_+^*$.
   De plus, si $\lambda \in [0,1]$ et $x > 0$, $f(\lambda x + (1-\lambda)\times 0) = e^{\lambda x} \leq \lambda e^x$ par convexité de la fonction exponentielle sur $\mathbb{R}_+$.
   Ainsi $f(\lambda x + (1-\lambda)\times 0) \leq \lambda e^x + (1-\lambda) = \lambda f(x) + (1-\lambda)f(0)$ d'où f est convexe sur $\mathbb{R}_+$.
   Pourtant f n'est pas continue en 0.

XIII.3.26 Théorème de Darboux ★★★★

[Enoncé]

1.
2. f est convexe donc f' est croissante sur I. Fixons $c \in \mathring{I}$.
   D'après le théorème de la limite monotone, f' admet des limites en c^+ et en c^- et $\lim\limits_{c^-} f' \leq \lim\limits_{c^+} f'$.
   Or d'après le théorème de Darboux $f'(I)$ est un intervalle.
   Alors $z < f'(c) \implies z \leq \lim\limits_{c^-} f'$ et $f'(c) < z \implies \lim\limits_{c^+} f' < z$.
   Ainsi si $z \in \mathbb{R}$, $\lim\limits_{c^-} f' = f'(c) = \lim\limits_{c^-} f'$ et f' est continue en c.
   Si I admet un maximum b alors en considérant $\lim\limits_{b^-} f'$ et en utilisant le théorème de Darboux on obtient $\lim\limits_{b^-} f' = f'(b)$.
   De même si I admet un minimum a alors $\lim\limits_{a^+} f' = f'(a)$.
   Finalement f' est continue sur I c'est à dire f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I.

Réciproque du TVI ☆

[Enoncé]
La réciproque est fausse, il suffit de prendre une fonction dérivable dont la dérivée n'est pas continue.
L'exemple classique est $f : x \mapsto \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$.
D'après le théorème de Darboux, pour tout intervalle I de $\mathbb{R}$ $f'(I)$ est un intervalle. Pourtant f' n'est pas continue sur $\mathbb{R}$.

Fonction non primitivable ☆

[Enoncé]
On considère a fonction partie entière $E : x \in \mathbb{R} \mapsto \lfloor x \rfloor$.
Supposons que E admette une primitive F sur un intervalle I d'intérieur non vide de $\mathbb{R}$.
Par définition, $\forall x \in I,\ F'(x) = E(x)$. Donc $F'(I)$ n'est pas un singleton et $F'(I) \subset E(\mathbb{R}) = \mathbb{Z}$. On en déduit que $F'(I)$ n'est pas un intervalle.
Ceci contredit le théorème de Darboux ainsi E n'admet pas de primitive.

XIII.3.27 Fonctions logarithmiquement convexes ☆☆☆

[Enoncé]

1. Supposons que f est log-convexe. Fixons $(x, y) \in I^2$ et $\lambda \in]0, 1[$. Par hypothèse, $\ln(f(\lambda x + (1-\lambda)y)) \leq \lambda \ln(f(x)) + (1-\lambda)\ln(f(y))$ puis par concavité du logarithme, $\lambda \ln(f(x)) + (1-\lambda)\ln(f(y)) \leq \ln(\lambda f(x) + (1-\lambda)f(y))$.
   Donc par passage à l'exponentielle, $f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)$ d'où f est convexe.

   La réciproque est fausse, la fonction $x \mapsto x^2$ est convexe sur $\mathbb{R}_+^*$ mais pas log-convexe.
2. Supposons que f est log-convexe. Fixons $\alpha > 0$.
   $\forall (x, y) \in I^2,\ \forall \lambda \in [0, 1],\ \ln\left(f(\lambda x + (1-\lambda)y)^\alpha\right) = \alpha \ln(f(\lambda x + (1-\lambda)y)) \leq \alpha[\lambda \ln(f(x)) + (1-\lambda)\ln(f(y))] = \lambda \ln\left(f(x)^\alpha\right) + (1-\lambda)\ln\left(f(y)^\alpha\right)$.
   Donc f^α est log-convexe et donc f^α est convexe d'après la question précédente.

   Réciproquement, supposons que pour tout $\alpha > 0$, f^α est convexe. Fixons $(x, y) \in I^2$ et $\lambda \in [0, 1]$.
   $\forall \alpha > 0,\ f(\lambda x + (1-\lambda)y)^\alpha \leq \lambda f(x)^\alpha + (1-\lambda)f(y)^\alpha \iff \ln(f(\lambda x + (1-\lambda)y)) \leq \dfrac{\ln\left(\lambda f(x)^\alpha + (1-\lambda)f(y)^\alpha\right)}{\alpha}$.
   Or

$$\begin{aligned} \lambda f(x)^\alpha + (1-\lambda)f(y)^\alpha &= \lambda e^{\alpha \ln(f(x))} + (1-\lambda)e^{\alpha \ln(f(y))} \\ &\underset{\alpha \to 0^+}{=} \lambda(1 + \alpha \ln(f(x)) + o(\alpha)) + (1-\lambda)(1 + \alpha \ln(f(y)) + o(\alpha)) \\ &\underset{\alpha \to 0^+}{=} 1 + \alpha(\lambda \ln(f(x)) + (1-\lambda)\ln(f(y))) \end{aligned}$$

   Par conséquent $\ln(f(\lambda x + (1-\lambda)y)) \leq \lim\limits_{\alpha \to 0} \dfrac{\ln\left(\lambda f(x)^\alpha + (1-\lambda)f(y)^\alpha\right)}{\alpha} = \lambda \ln(f(x)) + (1-\lambda)\ln(f(y))$ et f est log-convexe.
3. Si f est log convexe alors pour tout $c > 0$ la fonction $\ln \circ \varphi_c = \ln \circ f + \ln(c)\,\mathrm{Id}_I$ est convexe comme somme de fonctions convexes.
   Réciproquement, supposons que φ_c soit convexe quel que soit $c > 0$.
   $\forall c > 0,\ f(\lambda x + (1-\lambda)y)c^{\lambda x + (1-\lambda)y} \leq \lambda f(x)c^x + (1-\lambda)f(y)c^y$.
   Posons $\Phi : c \mapsto \dfrac{\lambda f(x)c^x + (1-\lambda)f(y)c^y}{c^{\lambda x + (1-\lambda)y}} = \lambda f(x)c^{(1-\lambda)(x-y)} + (1-\lambda)f(y)c^{\lambda(y-x)}$.
   Φ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\forall c > 0,\ \Phi'(c) = \lambda(1-\lambda)(x-y)\left(f(x)c^{(1-\lambda)(x-y)-1} - f(y)c^{\lambda(y-x)-1}\right)$.
   Fixons $c > 0$. L'inégalité à vérifier est trivialement réalisée si $x = y$. On suppose donc $x \neq y$.
   Supposons $x > y$:
   $\Phi'(c) \geq 0 \iff f(x)c^{(1-\lambda)(x-y)-1} - f(y)c^{\lambda(y-x)-1} \geq 0 \iff \dfrac{f(x)}{f(y)} \geq c^{y-x} \iff \ln(c) \geq \dfrac{\ln(f(x)) - \ln(f(y))}{y-x} =$

$\ln(c_0)$.
On obtient les mêmes variations pour $x < y$.

c	0		c_0		$+\infty$
$\Phi'(c)$		$-$	0	$+$	
Variations de Φ		↘	$\Phi(c_0)$	↗	

La meilleure inégalité possible est celle pour $c = c_0$, il y a des chances que ce soit celle que l'on recherche.
$\Phi(c_0) = \lambda f(x)c_0^{(1-\lambda)(x-y)} + (1-\lambda)f(y)c_0^{\lambda(y-x)} = \lambda f(x)e^{(\lambda-1)\ln(f(x)/f(y))} + (1-\lambda)f(y)e^{\lambda\ln(f(x)/f(y))} = \lambda f(x)^\lambda f(y)^{1-\lambda} + (1-\lambda)f(x)^\lambda f(y)^{1-\lambda} = f(x)^\lambda f(y)^{1-\lambda}$.
Ainsi, $f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq f(x)^\lambda f(y)^{1-\lambda}$ c'est à dire f est log-convexe.

4. $\ln\circ(f \times g) = \ln\circ f + \ln\circ g$ est convexe comme somme de fonctions convexes donc $f \times g$ est log-convexe.
Soit $c > 0$. Notons $\varphi_c : x \mapsto f(x)c^x$ et $\psi_c : x \mapsto g(x)c^x$.
$x \mapsto (f+g)(x)c^x = \varphi_c + \psi_c$ est convexe comme somme de fonctions convexe.
Ainsi d'après la question précédente $f + g$ est log-convexe.

XIII.3.28 Etude d'une fonction définie implicitement ★★

[Enoncé]

1. On remarque que $g \circ (-g + 2\,\mathrm{Id}_\mathbb{R}) = \mathrm{Id}_\mathbb{R} = (-g + 2\,\mathrm{Id}_\mathbb{R}) \circ g$ donc g est bijective.
Puisque g est bijective, elle est a fortiori injective, et puisqu'elle est continue, elle est strictement monotone.
Supposons que g est strictement décroissante.
Alors g^2 est strictement croissante, ce qui est absurde car une somme de deux fonctions décroissante est décroissante.
Donc g est strictement croissante.

2. On pose $h = g - \mathrm{Id}_\mathbb{R}$.
On remarque que, $h \circ g = h$. Montrons que h est une fonction constante.
Je n'ai pas trouvé de méthode qui utilise la question 1 ?
Fixons $x \in \mathbb{R}$. On pose $x_n = g^n(x)$. Par récurrence immédiate $\forall n \in \mathbb{N},\ h(g^n(x)) = h(x)$ i.e $x_{n+1} - x_n = h(x)$ donc $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite arithmétique de raison $h(x)$.
Si $h(x) > 0$ alors $x_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$. Donc par continuité de h, $h(x) = \lim\limits_{+\infty} h := b$.
De même si $h(x) < 0$ alors $h(x) = \lim\limits_{-\infty} h := a$.
On a montré que $h(\mathbb{R}) \subset \{0, a, b\}$. Or d'après le TVI $h(\mathbb{R})$ est un intervalle. On en déduit que $h(\mathbb{R})$ est un singleton, i.e que h est constante.
Donc

$$\exists c \in \mathbb{R},\ \forall x \in \mathbb{R},\ g(x) - x = c \text{ i.e. } g(x) = x + c$$

On vérifie que $\forall c \in \mathbb{R}$ la fonction $x \mapsto x + c$ vérifie la propriété.

La preuve qu'il y avait avant est fausse je crois :
Puisque g est bijective, pour tout $y \in \mathbb{R}$, il existe un unique $x \in \mathbb{R}$ tel que $g(x) = y$.
Ainsi $h(y) = h(g(x)) = h(x)$.
Par conséquent, en faisant parcourir y sur $\mathbb{R}$, x parcourt $\mathbb{R}$ également
ce qui impose que h est constante.
Le x dépend de y, on a $\forall x \in \mathbb{R},\ \exists y \in \mathbb{R},\ h(x) = h(y)$ et non $\exists x \in \mathbb{R},\ \forall y \in \mathbb{R},\ h(x) = h(y)$.

XIII.3.29 Minoration de arctan ★

[Enoncé]
Soit $t > 0$. Comme arctan est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,t]$:

$$\arctan(t) = \arctan(0) + \int_0^t \arctan'(u)du = \int_0^t \frac{1}{1+u^2}du > \int_0^t \frac{1}{1+t^2}du = \frac{t}{1+t^2}$$

XIII.3.30 Majoration par un polynôme ★★

[Enoncé]
P étant de degré impair il admet une racine réelle x_0. Alors d'après l'hypothèse $\forall n \in \mathbb{N},\ f^{(n)}(x_0) = 0$. Fixons $x \in \mathbb{R}$. Si $x > x_0$, d'après l'inégalité de Taylor-Lagrange :

$$|f(x)| = \left|f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k\right| \leq \frac{|x-x_0|^n}{n!} \sup_{[x_0,x]} |f^{(n)}| \leq \frac{|x-x_0|^n}{n!} \sup_{[x_0,x]} |P| \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$$

Donc $f(x) = 0$. On peut faire le même raisonnement si $x < x_0$ en remplaçant $[x_0, x]$ par $[x, x_0]$ et par conséquent f est identiquement nulle.
Le résultat n'est plus vrai si P est de degré pair. Par exemple pour $P = 1$ et $f = \cos$.

XIII.3.31 Inégalités de Kolmogorov ★★★★

[Enoncé]

1. Si $M_k = 0$ alors $f^{(k)} = 0$ donc f est une fonction polynomiale. Or f est bornée car $M_0 < +\infty$ donc f est constante. Par conséquent $\forall k \in [\![1;n]\!],\ M_k = 0$. Les inégalités sont alors trivialement vérifiées.
2. a. Soit $i \in [\![1; n-1]\!]$. f est $\mathcal{C}^n$ sur $[x, x+h_i]$ donc d'après l'inégalité de Taylor-Lagrange,

   $$\left|f(x+h_i) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h_i^k}{k!} f^{(k)}(x)\right| \leq \frac{M_n}{n!} h_i^n.$$

   Donc par inégalité triangulaire,

   $$\left|\sum_{k=1}^{n-1} \frac{h_i^k}{k!} f^{(k)}(x)\right| = \left|\sum_{k=0}^{n-1} \frac{h_i^k}{k!} f^{(k)}(x) - f(x+h_i) - f(x) + f(x+h_i)\right| \leq |f(x+h_i) - f(x)| + \frac{M_n}{n!} h_i^n \leq 2M_0 + \frac{M_n}{n!} h_i^n.$$

   Pour conclure il suffit de poser $H = \max_{1\leq i\leq n} h_i$.

   b. On note $X(x)$ le vecteur de $\mathbb{C}^{n-1}$ dont les composantes sont les $\frac{f^{(k)}(x)}{k!}$ pour $1 \leq k \leq n-1$, $K = 2M_0 + \frac{M_n}{n!} H^n$ et $A = \left(h_i^j\right)_{1\leq i,j\leq n-1}$. On vient de montrer que $\|AX(x)\|_\infty \leq K$. Or ceci étant vrai pour tout $h_1, \ldots, h_{n-1}$ strictement, ça l'est en particulier pour $(h_i)_{1\leq i\leq n-1} = (i)_{1\leq i\leq n-1}$.
   On reconnaît alors que la matrice A est de Vandermonde :

   $$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2^2 & \cdots & 2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ n-1 & (n-1)^2 & \cdots & (n-1)^{n-1} \end{pmatrix}$$

   Son déterminant est $(n-1)! \prod_{1\leq i<j\leq n-1} (j-i) \neq 0$ donc elle est inversible.
   Ainsi, on a $\|X(x)\|_\infty = \left\|A^{-1}AX(x)\right\|_\infty \leq |||A^{-1}|||_\infty \|AX(x)\|_\infty \leq K|||A^{-1}|||_\infty$.
   Ceci étant vrai pour tout $x \in \mathbb{R}$, on obtient par passage au sup que $\forall k \in [\![1;n]\!],\ M_k \leq K|||A^{-1}|||_\infty < +\infty$.
3. a. Soit $x \in \mathbb{R}$.
   D'après l'inégalité de Taylor-Lagrange, $|f(x+h) - f(x) - f'(x)h| \leq \frac{M_2}{2}h^2$ et $|f(x-h) - f(x) + f'(x)h| \leq \frac{M_2}{2}h^2$.

Donc

$$\begin{aligned}|f'(x)| &= \frac{1}{2h}|f'(x)h + f(x) - f(x+h) + f(x+h) - f(x) + f'(x)h + f(x) - f(x-h) + f(x-h) - f(x)| \\ &\leq \frac{1}{2h}(|f'(x)h + f(x) - f(x+h)| + |f(x+h) - f(x-h)| + |f'(x)h - f(x) + f(x-h)|) \\ &\leq \frac{M_2 h}{2} + \frac{M_0}{h}.\end{aligned}$$

Puis par passage au sup, $M_1 \leq \dfrac{M_2 h}{2} + \dfrac{M_0}{h}$.

b. On pose $G : h \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \dfrac{M_2 h}{2} + \dfrac{M_0}{h}$. G est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et, $\forall h > 0,\ G'(h) = \dfrac{M_2}{2} - \dfrac{M_0}{h^2}$.

Donc $\forall h > 0,\ G'(h) \geq 0 \iff h \geq \sqrt{\dfrac{2M_0}{M_2}}$.

Donc G admet un minimum en $\sqrt{\dfrac{2M_0}{M_2}}$ et $M_1 \leq G\left(\sqrt{\dfrac{2M_0}{M_2}}\right) = \sqrt{2M_0M_2}$.

4. a. Par croissance de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$,
$\dfrac{1}{k}\displaystyle\sum_{i=1}^{k} u_i \leq \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} u_k = u_k \leq u_{k+1} = \frac{1}{n-k}\sum_{i=k+1}^{n} u_{k-1} \leq \frac{1}{n-k}\sum_{i=k+1}^{n} u_i$.

b. Soit $k \in [\![1; n-1]\!]$.

$$\begin{aligned}&2x_k \leq x_{k-1} + x_{k+1} \\ \iff &\ln(M_k^2) - k(n-k)\ln 2 \leq \ln(M_{k-1}M_{k+1}) - \frac{\ln 2}{2}((k-1)(n-k+1) + (k+1)(n-k-1)) \\ \iff &\ln(M_k^2) - k(n-k)\ln 2 \leq \ln(M_{k-1}M_{k+1}) - k(n-k)\ln 2 - \frac{\ln 2}{2}(k - n + k - 1 - k + n - k - 1) \\ \iff &\ln(M_k^2) \leq \ln(M_{k-1}M_{k+1}) + \ln 2\end{aligned}$$

Or en appliquant la question 3.*b* à $f^{(k-1)}$ on a $M_k \leq \sqrt{2M_{k-1}M_{k+1}}$ d'où $\ln(M_k^2) \leq \ln 2 + \ln(M_{k-1}M_{k+1})$ d'où le résultat.

c. D'après la question précédente $\forall k \in [\![1; n-1]\!],\ x_k - x_{k-1} \leq x_{k+1} - x_k$.

Donc d'après la question 4.*a*, si $k \in [\![1; n]\!]$ alors $\dfrac{1}{k}\displaystyle\sum_{i=1}^{k}(x_i - x_{i-1}) \leq \frac{1}{n-k}\sum_{i=k+1}^{n}(x_i - x_{i-1})$.

C'est à dire $\dfrac{x_k - x_0}{k} \leq \dfrac{x_n - x_k}{n-k}$ ou encore $n\left(\ln(M_k) - \dfrac{\ln 2}{2}k(n-k)\right) \leq k\ln(M_n) + (n-k)\ln(M_0)$.

Enfin, par passage à l'exponentielle on obtient $M_k \leq 2^{\frac{k(n-k)}{2}} M_0^{1-\frac{n}{k}} M_n^{\frac{k}{n}}$.

XIII.3.32 Vers le principe des zéros isolés ★★★

[Enoncé]

1. Notons p le plus petit entier naturel non nul tel que $f^{(p)}(a) \neq 0$. f est de classe $\mathcal{C}^{p-1}$ sur un voisinage de a donc d'après la formule de Taylor-Young :

$$f(x) \underset{x\to a}{=} \sum_{k=0}^{p} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + o((x-a)^p) \underset{x\to a}{=} \frac{f^{(p)}(a)}{p!}(x-a)^p + o((x-a)^p) \underset{x\to a}{\sim} \frac{f^{(p)}(a)}{p!}(x-a)^p$$

$\dfrac{f^{(p)}(a)}{p!}(x-a)^p$ ne s'annule pas sur un voisinage épointé de a donc f non plus.

2. Supposons que f s'annule une infinité de fois sur S. On dispose alors d'une suite $(a_n) \in S^{\mathbb{N}}$ d'éléments distincts de S tels que $\forall n \in \mathbb{N},\ f(a_n) = 0$. S est compact donc quitte à extraire on peut supposer que (a_n) converge vers $a \in S$. Alors par continuité de f, $f(a) = 0$.
D'après la première question il existe $h > 0$ tel que $\forall x \in]a-h, a+h[,\ f(x) = 0 \implies x = a$.
Or APCR $a_n \in]a-h, a+h[$ donc la suite (a_n) stationne à a. Ceci est absurde car on a supposé les a_n distincts.
Par conséquent f ne s'annule qu'un nombre fini de fois sur S.

XIII.3.33 Fonction test

[Enoncé]

XIII.3.34 Fonction plateau

[Enoncé]

XIII.3.35 Théorème de réalisation de Borel ★★★★

[Enoncé]
Comme $\lambda_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$, $\forall x \in \mathbb{R}^*$, $\exists n_x \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq n_x$, $|\lambda_n x| > 2$. Donc en tout $x \in \mathbb{R}^*$, f est bien définie : $f(x) = \sum_{n=0}^{n_x} a_n \frac{x^n}{n!}\varphi(\lambda_n x)$.
De plus $f(0) = a_0$ donc f est bien définie sur $\mathbb{R}$.
Pour montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ on va appliquer un théorème de dérivation sous le signe somme.
Soit $x \in \mathbb{R}$. Si $|x| > 2$ alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $|\lambda_n x| > 2$ d'où $f(x) = 0$. On suppose maintenant que $|x| \leq 2$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$ la fonction $f_n : x \mapsto a_n \frac{x^n}{n!}\varphi(\lambda_n x) = \frac{a_n}{\lambda_n^n n!}\varphi_n(\lambda_n x)$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et $\forall p < n$,

$$|f_n^{(p)}(x)| = \frac{|a_n|}{\lambda_n^{n-p}}|\varphi_n^{(p)}(\lambda_n x)| \leq \frac{|a_n|M_n}{\lambda_n}$$

Ainsi pour tout entier naturel p, $\left\|f_n^{(p)}\right\|_\infty \leq \frac{|a_n|M_n}{\lambda_n}$ APCR. Donc comme $\sum_{n\in\mathbb{N}} \frac{|a_n|M_n}{\lambda_n}$ converge, la série de fonctions $\sum_{n\in\mathbb{N}} f_n^{(p)}$ converge normalement sur $\mathbb{R}$.

Par conséquent f est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et $\forall p \in \mathbb{N}$, $\forall x \in \mathbb{R}$, $f^{(p)}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n^{(p)}(x)$.

Pour conclure, remarquons que $\forall x \in [-1,1]$, $f_n(x) = a_n \frac{x^n}{n!}$.

Donc $\forall x \in [-1,1]$, $\forall p \in \mathbb{N}$, $f^{(p)}(x) = \sum_{k=p}^{+\infty} a_n \frac{x^{n-p}}{(n-p)!}$. En particulier, $f^{(p)}(0) = a_p$.

Pour conclure, justifions l'existence des objets de l'énoncé.
Comme φ_n est nulle en dehors de $[-2,2]$ alors toutes ses dérivées successives le sont aussi, et donc M_n est bien défini pour tout $n \in \mathbb{N}$ par le théorème des bornes atteintes.
Pour $(\lambda_n)_{n\in\mathbb{N}}$ on peut prendre $\lambda_n = 1 + n + n^2|a_n|M_n$.

Prolongement de classe $\mathcal{C}^\infty$ ★

[Enoncé]
Soit $f :]a,b[\to \mathbb{C}$ une telle fonction.
D'après le théorème de réalisation de Borel, il existe des fonctions $u, v \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{C})$ telles que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u^{(n)}(0) = f^{(n)}(a^+)$ et $v^{(n)}(0) = f^{(n)}(b^-)$.
D'après le cours la fonction

$$\tilde{f} : x \mapsto \begin{cases} u(x-a) & \text{si } x \leq a \\ f(x) & \text{si } a < x < b \\ v(x-b) & \text{si } b \leq x \end{cases}$$

est un prolongement $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ de f.

Fonction paire de classe $\mathcal{C}^\infty$

[Enoncé]

XIII.4 Correction Polynôme

XIII.4.1 Théorème de d'Alembert-Gauss (2) ★★★

[Enoncé]

1. $\mathcal{P}$ est une partie non vide et minorée (par 0) de $\mathbb{R}$. Elle admet donc une borne inférieure.
2. Soit $z \in \mathbb{C}$ de module r. Par la seconde inégalité triangulaire puis la première :
$$|P(z)| = \left|a_n z^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k z^k\right| \geq \left||a_n z^n| - \left|-\sum_{k=0}^{n-1} a_k z^k\right|\right| \geq |a_n| r^n - \left|\sum_{k=0}^{n-1} a_k z^k\right| \geq |a_n| r^n - \sum_{k=0}^{n-1} |a_k| r^k.$$
3. Le membre de droite est équivalent à $|a_n| r^n$ pour $r \to \infty$ donc $\lim\limits_{|z|\to+\infty} |P(z)| = +\infty$.
4. a. Par caractérisation séquentielle de la borne inférieure $\exists (u_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}},\ |P(u_n)| \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \alpha$. D'après la question précédente si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ n'est pas bornée alors $|P(u_n)| \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$ donc $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée.
   b. Par le théorème de Bolzano-Weierstrass on peut extraire de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ qui converge. On note z_0 sa limite.
   Par continuité de $|P|$, $|P(v_n)| \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} |P(z_0)|$ et d'autre part $|P(v_n)| \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \alpha$ comme suite extraite. Donc par unicité de la limite $|P(z_0)| = \alpha$.
5. a. $\inf\limits_{z\in\mathbb{C}} |Q(z)| = \dfrac{1}{|P(z_0)|} \inf\limits_{z\in\mathbb{C}} |P(z)| = 1 = |Q(0)|$.
   b. Notons $Q = \sum\limits_{k=0}^{n} b_k X^k$ ainsi que p la plus petite puissance des monômes non constants non nuls de Q (il y en a une car P n'est pas constant donc Q n'est pas constant).
   $$Q(X) = Q(0) + b_p X^p + \sum_{k=p+1} b_k X^k = 1 + b_p X^p + \sum_{k=p+1}^{n} b_p X^p.$$
   c. On a
$$\begin{aligned} |Q(re^{i\theta/p})| - 1 &= \left|1 + r^p \left(b_p e^{-i\theta} + r \sum_{k=p+1}^{n} b_k e^{-ik\theta/p} r^{k-p-1}\right)\right| - 1 \\ &\underset{r\to0^+}{=} |1 + \rho r^p + o(r^p)| - 1 \\ &\underset{r\to0^+}{=} \rho r^p + o(r^p) \\ &\underset{r\to0^+}{\sim} \rho r^p \end{aligned}$$
   ρr^p est strictement négatif au voisinage de 0^+ donc $|Q(re^{i\theta/p})| - 1$ aussi.
6. Ce dernier résultat contredit la minimalité de α donc $\alpha = 0$. Autrement dit $P(z_0) = 0$ et le théorème est démontré.

XIII.4.2 Bernoulli ★★

[Enoncé]

1. a. On pose $Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\forall x \in \mathbb{R},\ \tilde{Q}(x) = \int_0^x P(t)dt$ et $a = \int_0^1 \tilde{Q}(x)dx$.
   Alors $Q(X) = \tilde{Q}(X) - a$ vérifie $\int_0^1 Q(x)dx = \int_0^1 \tilde{Q}(x)dx - a = 0$. $x \mapsto \tilde{Q}(x)$ est continue sur $\mathbb{R}$ donc d'après le TFA $x \mapsto Q(x)$ est une primitive de P sur $\mathbb{R}$. Enfin si on note $P = \sum\limits_{k=0}^{n} a_k X^k$ alors $\forall x \in \mathbb{R},\ \tilde{Q}(x) = \sum\limits_{k=0}^{n} a_k \dfrac{x^{k+1}}{k+1}$.
   $\mathbb{R}$ étant infini $\tilde{Q}(X)$ est bien un polynôme à coefficients réels. Par suite $Q \in \mathbb{R}[X]$.
   Enfin si $Q_1, Q_2 \in \mathbb{R}[X]$ vérifient $Q_1' = P = Q_2'$ et $\int_0^1 Q_1(x)dx = 0 = \int_0^1 Q_2(x)dx$ alors $\exists c \in \mathbb{R},\ Q_1 = Q_2 + c$

et $c = \int_0^1 (Q_1(x) - Q_2(x))dx = \int_0^1 Q_1(x)dx - \int_0^1 Q_2(x)dx = 0$.
Ainsi $Q_1 = Q_2$.

b. Construisons B_n par récurrence. On pose $B_0 = 1$. Supposons avoir construit, pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$, $B_0, \dots, B_{n-1}$ comme dans l'énoncé. $nB_{n-1} \in \mathbb{R}[X]$ donc d'après la question précédente $\exists! B_n \in \mathbb{R}[X],\ B'n = nB_{n-1}$ et $\int_0^1 B_n(x)dx = 0$.
On conclut qu'il existe une unique suite de polynôme réels qui vérifie la condition de l'énoncé.

c. $B_1' = B_0 = 1$ donc $\exists b_1 \in \mathbb{R},\ B_1 = X + b_1$. De plus $\int_0^1 B_1(x)dx = \frac{1}{2} + b_1 = 0$ donc $B_1 = X - \frac{1}{2}$.
$B_2' = 2B_1 = 2X - 1$ donc $\exists b_2 \in \mathbb{R},\ B_1 = X^2 - X + b_2$. De plus $\int_0^1 B_2(x)dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + b_2 = 0$ donc $B_2 = X^2 - X + \frac{1}{6}$.

d. Le calcul de B_0, B_1, B_2 nous pousse à conjecturer $\mathcal{P}(n)$"$\forall n \in \mathbb{N},\ \deg B_n = n$". Montrons cette proposition par récurrence.
On a $\mathcal{P}(0)$. Supposons $\mathcal{P}(n-1)$ pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $\deg B_n' = \deg nB_{n-1} = n - 1$. Donc $\mathcal{P}(n)$.
Par récurrence, $\forall n \in \mathbb{N},\ \deg B_n = n$.

2. a. $\forall n \geq 2,\ B_n(1) - B_n(0) = \int_0^1 B_n'(x)dx = n\int_0^1 B_{n-1}(x)dx = 0$.

b. Montrons que la suite de terme général $A_n(X) = (-1)^n B_n(1-X)$ vérifie la relation de récurrence qui définie $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$. L'unicité de la solution donnera le résultat obtenu question 1.b.
$A_0(X) = B_0(1-X) = 1 = B_0(X)$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ A_n'(X) = (-1)^{n+1}B_n'(1-X) = nA_{n-1}(X)$ et $\int_0^1 A_n(x)dx = \int_0^1 A_n(1-x)dx = (-1)^n \int_0^1 B_n(x)dx = 0$.
On en déduit que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ B_{2n+1}(0) = -B_{2n+1}(1) = -B_{2n+1}(0)$ d'où $B_{2n+1}(0) = B_{2n+1}(1) = 0$.

c. On rappelle que B_n est de degré n donc la formule de Taylor en 0 s'écrit :

$$B_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{B_n^{(k)}(0)}{k!} X^k = \sum_{k=0}^{n} \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)B_{n-k}(0)}{k!} X^k = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} b_{n-k} X^k$$

d. Soit $n \in \mathbb{N}$. Avec les questions 2.*b* et 2.*c* on a :

$$\begin{aligned} b_{2n+2} &= B_{2n+2}(1) \\ &= \sum_{k=0}^{2n+2} \binom{2n+2}{k} b_{2n+2-k} \\ &= \sum_{k=0}^{2n+2} \binom{2n+2}{2n+2-k} b_k \\ &= \sum_{k=0}^{2n+2} \binom{2n+2}{k} b_k \end{aligned}$$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $2n+1 > 2n-1 \geq 1$ donc $b_{2n+1} = b_{2n-1} = 0$.
Ainsi $b_{2n+2} = b_{2n+2} + \binom{2n+2}{2n} b_{2n} + \sum_{k=0}^{2n-2} \binom{2n+2}{k} b_k$.
i.e $b_{2n} = -\frac{1}{(n+1)(2n+2)} \sum_{k=0}^{2n-2} \binom{2n+2}{k} b_k$.

XIII.4.3 Lagrange ★

[Enoncé]

1. On sait que : $\dim(\mathbb{K}_{n-1}[X]) = n = \dim(\mathbb{K}^n)$, ainsi il suffit de montrer que Ψ est injective.
   Soit $P \in \mathrm{Ker}(\Psi)$
   On a alors $(P(x_1), \dots, P(x_n)) = (0, \dots, 0)$. Donc P est un polynôme de degré au plus $n-1$ qui admet n racines. Donc P est nul.
   Ainsi Ψ est bijective.
2. On note $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$. On pose pour tout $k \in [\![1; n]\!]$,$L_k = \Psi^{-1}(e_k)$ Ainsi pour tout $(i, j) \in [\![1; n]\!]^2$,$L_i(x_j) = \delta_{i,j}$. Et on remarque que P et $\sum_{k=1}^{n} P(x_k)L_k$ coïncident sur n points et sont tous deux de degré au plus $n-1$.
   Donc $P = \sum_{k=1}^{n} P(x_k)L_k$

XIII.4.4 Tchebychev ★★

[Enoncé]

1. a. On développe

$$\begin{aligned}
\cos(n\theta) &= \mathrm{Re}\left[\cos(\theta) + i\sin(\theta))^n\right] \\
&= \mathrm{Re}\left[\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cos^{n-k}(\theta) i^k \sin^k(\theta)\right] \\
&= \mathrm{Re}\left[\sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (-1)^k \binom{n}{2k} \cos^{n-2k}(\theta)\sin^{2k}(\theta) + i \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} (-1)^k \binom{n}{2k+1} \cos^{n-2k-1}(\theta)\sin^{2k+1}(\theta)\right] \\
&= \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (-1)^k \binom{n}{2k} \cos^{n-2k}(\theta)(1-\cos^{2k}(\theta))
\end{aligned}$$

   Le polynôme $T_n(X) = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (-1)^k \binom{n}{2k} X^{n-2k}(1-X^{2k})$ est à coefficients réels, de degré inférieur à n et vérifie $\forall \theta \in \mathbb{R},\ T_n(\cos(\theta)) = \cos(n\theta)$.
   b. Soit $S_n \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $\forall \theta \in \mathbb{R},\ S_n(\cos(\theta)) = \cos(n\theta)$.
   Alors S_n et T_n coïncident sur $\cos(\mathbb{R}) = [-1, 1]$ qui est infini. Donc $S_n = T_n$.
2. Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Par les formules de Simpson :

$$2\cos(\theta)\cos((n+1)\theta) = \cos((n+2)\theta) + \cos(n\theta)$$

   i.e $T_{n+2}(\cos(\theta)) = 2\cos(\theta)T_{n+1}(\cos(\theta)) - T_n(\cos(\theta))$.
   i.e $\forall x \in [-1, 1],\ T_{n+2}(x) = 2xT_{n+1}(x) - T_n(x)$.
3. On calcule aisément $T_0 = 1,\ T_1 = X,\ T_2 = 2X^2 - 1$. Montrons par récurrence double sur $n \in \mathbb{N}^*$ la proposition $H(n)$: "T_n est de degré n et son coefficient dominant est $d_n := 2^{n-1}$".
   on a clairement $H(1)$ et $H(2)$. Supposons $H(n)$ et $H(n+1)$ pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$.
   On sait que $T_{n+2} = 2XT_{n+1} - T_n$. Par hypothèse de récurrence $\deg(T_n) = n < n+2 = \deg(2XT_{n+1}$ Donc $\deg(T_{n+2}) = \deg(2XT_{n+1}) = n+2$. De plus, $d_{n+2} = 2d_{n+1} = 2^{n+1}$.
   Ainsi par récurrence double, $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \deg(T_n) = n$ et $d_n = 2^{n-1}$.
4. L'expression trouvée question 1.a donne les deux résultats.
   Sinon, la même récurrence double montre que T_n est à coefficients entiers. Et si $n = 2k+1$ est impair, $T_n(0) = T_n\left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = 0$.
5. a. Pour tout $k \in [\![0; n-1]\!], \theta_k = \frac{\pi}{2n} + \frac{k\pi}{n}$.
   On a $\frac{\pi}{2n} = 0 < \theta_0 < \theta_1 < \cdots < \theta_{n-1} = \frac{2n-1}{2n}\pi < \pi$. Or cos est strictement décroissante et continue sur $[0, \pi]$, en particulier elle est injective sur $[0, \pi]$.

En outre, $\forall k \in [\![0; n-1]\!],\ T_n(\cos(\theta_k)) = \cos(n\theta_k) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = 0$.

T_n étant de degré n et de coefficient dominant 2^{n-1}, $T_n(X) = 2^{n-1}\prod_{k=0}^{n-1}(X - \cos(\theta_k))$.

b. Soit $x \in [-1,1]$. $\exists \theta \in \mathbb{R},\ x = \cos(\theta)$. Donc $|T_n(x)| = |T_n(\cos(\theta)| = |\cos(n\theta)| \leq 1$. De plus $T_n(1) = T_n(\cos(0)) = \cos(0) = 1$.
On en déduit que $\|T_n\|_\infty = 1$.
Ensuite, $\forall k \in [\![0; n-1]\!],\ |T_n(c_k)| = |\cos(k\pi)| = |(-1)^k| = 1 = \|T_n\|_\infty$.

6. a. Soit $h \in E$. La fonction $H : t \mapsto \dfrac{h(t)}{\sqrt{1-t^2}}$ est continue par morceaux sur $]-1,1[$.
D'après le théorème des bornes atteintes h est bornée sur $[-1,1]$ donc $H(t) = \dfrac{h(t)}{\sqrt{1-t}\sqrt{1+t}} \underset{t\to 1^-}{=} \mathcal{O}\left(\dfrac{1}{(1-t)^{1/2}}\right)$.
Or $t \mapsto \dfrac{1}{(1-t)^{1/2}}$ est positive et intégrable au voisinage de 1^-. Donc H est intégrable en 1^-.
De même, $H(t) \underset{t\to -1^+}{=} \mathcal{O}\left(\dfrac{1}{(1+t)^{1/2}}\right)$ donc H est intégrable en -1^+.
Finalement H est intégrable sur $]-1,1[$.
Pour tout $f, g \in E$, $fg \in E$ donc $t \mapsto \dfrac{f(t)g(t)}{\sqrt{1-t^2}}$ est intégrable sur $]-1,1[$.

b. On a montré que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est bien définie sur E^2.
c'est clairement une application symétrique et la bilinéarité est conséquence directe de la linéarité de l'intégrale.
Enfin, si $f \in E$ alors $t \mapsto \dfrac{f(t)^2}{\sqrt{1-t^2}}$ est continue et positive sur $]-1,1[$ donc $\langle f, f\rangle = \displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{f(t)^2}{\sqrt{1-t^2}}dt \geq 0$, avec égalité ssi $\forall t \in]-1,1[,\ \dfrac{f(t)^2}{\sqrt{1-t^2}} = 0$.
Ceci revient à $\forall t \in]-1,1[,\ f(t) = 0$. On en déduit par continuité de f en -1 et 1 que f est nulle sur $[-1,1]$, càd $f = 0$.

c. Soient $n, m \in \mathbb{N}$. $\langle T_n, T_m\rangle = \displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{T_n(t)T_m(t)}{\sqrt{1-t^2}}dt$.
Effectuons le changement de variables $\theta = \arccos(t)$. C'est possible car $\arccos :]-1,1[\to]0,\pi[$ est une bijection décroissante de classe $\mathcal{C}^1$. $d\theta = -\dfrac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$.
$\langle T_n, T_m\rangle = \displaystyle\int_{\pi}^{0} T_n(\cos(\theta))T_m(\cos(\theta))(-d\theta) = \int_0^\pi \cos(n\theta)\cos(m\theta)d\theta$.
Or $\cos(n\theta)\cos(m\theta) = \dfrac{\cos((n+m)\theta) + \cos((n-m)\theta)}{2}$.
Si $k \in \mathbb{Z}\backslash\{0\}$, $\displaystyle\int_0^\pi \cos(k\theta)d\theta = \left[\frac{\sin(k\theta)}{k}\right]_0^\pi = 0$.
Et $\displaystyle\int_0^\pi \cos(0\times\theta)d\theta = \int_0^\pi d\theta = \pi$.
Donc $\langle T_n, T_m\rangle = \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq m \\ \dfrac{\pi}{2} & \text{sinon} \end{cases}$

Angles rationnels dont le cosinus est rationnel ★★★

1. $\exists k \in \mathbb{Z},\ \alpha = \dfrac{k\pi}{2}$. Notons $k = 4q + r$ la division euclidienne de k par 4.
$\cos(\alpha) = \cos\left(2q\pi + r\dfrac{\pi}{2}\right) = \cos\left(r\dfrac{\pi}{2}\right)$.
— Si $r = 0,\ \cos(\alpha) = 1$;
— Si $r = 1,\ \cos(\alpha) = 0$;
— Si $r = 2,\ \cos(\alpha) = -1$;
— Si $r = 3,\ \cos(\alpha) = 0$.

2. a. On rappelle que $T_q \in \mathbb{Z}[X]$ et $T_q(0) = 0$.
On a $T_q(\cos(\alpha)) = \cos(q\alpha) = \cos(p\pi) = (-1)^p$.

Donc en appliquant le théorème de la racine rationnelle à $T_n + (-1)^{p+1}$ (cf.IV.19) on obtient $a|(-1)^{p+1}$ et $b|2^{q-1}$ d'où $a \in \{-1,1\}$ et l'existence de $r \in \mathbb{N}$ tel que $b = 2^r$.

b. Si $r = 0$ on retrouve $\cos(\alpha) = \pm 1$ ce qui est exclus ici.
Si $r = 1$ alors $\cos(\alpha) = \pm\frac{1}{2}$ d'où $\alpha \in \left\{\pm\frac{2\pi}{3}, \pm\frac{\pi}{3}\right\}$.

Supposons $r \geq 2$. Comme $\cos(2\alpha) = 2\cos(\alpha)^2 - 1 \in \mathbb{Q}$ on a $\cos(2\alpha) = \frac{\varepsilon'}{2^{r'}}$ pour un certain $\varepsilon' \in \{-1,1\}$ et $r' \in \mathbb{N}$.
Donc $\frac{\varepsilon'}{2^{r'}} = \frac{1}{2^{2r-1}} - 1 < 0$. On en déduit $\varepsilon' = -1$ et $2^{2r-1} = 2^{r'}(2^{2r-1} - 1)$.
Comme $2^{2r-1} - 1$ est impair et est un diviseur positif de 2^{2r-1}, il vaut 1. Càd $2r - 1 = 1$ ou encore $r = 1$ ce qui est absurde.

3. Supposons que q s'écrit $q = 4m$ avec $m \in \mathbb{N}$. comme $\cos(\alpha) \in \mathbb{Q}$, $\cos(m\alpha)$ aussi. Pourtant $\cos(m\alpha) = \cos\left(\frac{p\pi}{4}\right) = \pm\frac{\sqrt{2}}{2} \notin \mathbb{Q}$.
Supposons que q s'écrive $q = 2m$ avec m impair. Alors $2\alpha = \frac{p}{m}$ satisfait les hypothèse du cas de la question 2.
Donc avec $\cos(2\alpha) = \cos(\alpha)^2 - 1$ on en déduit que les valeurs possibles pour $\cos(\alpha)$ sont $-1, 1, 0, \pm\frac{1}{2}$ et $\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$. La seule compatible avec la forme de α est 0 ce qui impose $q = 2$, ici exclus.

4. On a montré que les seuls couples $(\alpha, \cos(\alpha))$ avec $\alpha \in]-\pi, \pi]$ possibles sont

$$(0,1), (\pi,-1), \left(\pm\frac{\pi}{2}, 0\right), \left(\pm\frac{\pi}{3}, \frac{1}{2}\right), \left(\pm\frac{2\pi}{3}, -\frac{1}{2}\right)$$

5. $\alpha \in \pi\mathbb{Q} \iff \frac{\pi}{2} - \alpha \in \pi\mathbb{Q}$. Donc avec $\sin(\alpha) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$, Les couples possibles sont :

$$(0,0), \left(\pm\frac{\pi}{2}, \pm 1\right), \left(\pm\frac{\pi}{6}, \pm\frac{1}{2}\right), \left(\pm\frac{5\pi}{6}, \pm\frac{1}{2}\right)$$

6. Supposons $\tan(\alpha) \in \mathbb{Q}$ avec $\alpha \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$. Comme $\cos(2\alpha) = \frac{1-\tan^2(\alpha)}{1+\tan^2(\alpha)}$, $\cos(2\alpha) \in \mathbb{Q}$.
$\cos(2\alpha) \neq -1$ donc on a $\tan^2(\alpha) = \frac{1-\cos(2\alpha)}{1+\cos(2\alpha)}$ d'où $\tan(\alpha) \in \left\{0, \pm 1, \pm\sqrt{3}, \pm\frac{\sqrt{3}}{3}\right\}$. En enlevant les valeurs irrationnelles on obtient $\tan(\alpha) \in \{-1, 0, 1\}$. Cela donne $\alpha \in \left\{-\frac{\pi}{4}, 0, \frac{\pi}{4}\right\}$.

Triangle à angles rationnels sont tous les côtés ont un longueur rationnelle ★★

Un angle exprimé en degré est rationnel ssi l'angle exprimé en radian est dans $\pi\mathbb{Q}$. Notons A, B, C les sommet d'un tel triangle. D'après le théorème d'Al-Kashi, $AC^2 = AB^2 + BC^2 + \cos(\widehat{ABC})$ où $\widehat{ABC}$ est exprimé en radian. Donc $\cos(\widehat{ABC}) \in \mathbb{Q}$. On en déduit que $\widehat{ABC} \in \left\{\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right\}$. De même pour les autres angles. Comme leur somme doit faire π la seule possibilité est qu'ils soient tous égaux à $\frac{\pi}{3}$. On a donc un triangle équilatéral.

Triangles dont les sommets sont à coordonnées rationnelles ★★

Soit A, B, C des points à coordonnées entières formant un triangle non plat. Un des angles au moins n'est pas égal à $\frac{\pi}{2}$. Supposons que c'est $\widehat{ABC}$. Notons $\vec{AB} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{BC} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$

Alors $|\tan(\widehat{ABC})| = \frac{|\sin(\widehat{ABC})|}{|\cos(\widehat{ABC})|} = \frac{\left\|\vec{AB}\right\| \left\|\vec{BC}\right\| |\sin(\widehat{ABC})|}{\left\|\vec{AB}\right\| \left\|\vec{BC}\right\| |\cos(\widehat{ABC})|} = \frac{\left\|\vec{AB} \wedge \vec{BC}\right\|}{|\vec{AB} \cdot \vec{BC}|} = \left|\frac{xy' - yx'}{xx' + yy'}\right| \in \mathbb{Q}$.

Donc $\widehat{ABC} = \frac{\pi}{4}$.
Ainsi la seule possibilité est d'avoir un triangle rectangle isocèle.

XIII.4.5 Hilbert ★★

[Enoncé]

1. $(H_k)_{0\leq k\leq n}$ est une famille de $n+1$ polynômes a degrés échelonnés de $\mathbb{C}_n[X]$ qui est de dimension $n+1$. C'est donc une base de $\mathbb{C}_n[X]$.
2. $\Delta(H_0) = 1 - 1 = 0$.
   $\forall k \in [\![1;n]\!],\ k!\Delta(H_k) = \prod_{j=-1}^{k-2}(X-j) - \prod_{j=0}^{k-1}(X-j) = (X+1-(X-k+1))\prod_{j=0}^{k-2}(X-j) = k!H_{k-1}$.
   Ainsi $\Delta(H_k) = H_{k-1}$.
3. Soient $k,l \in [\![0;n]\!]$. D'après la question précédente $\Delta^l(H_k) = \begin{cases} 0 & \text{si } l > k \\ H_{k-l} & \text{sinon} \end{cases}$
   Or $H_p(0) = \begin{cases} 1 & \text{si } p = 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$
   Donc $\Delta^l(H_k)(0) = \begin{cases} 1 & \text{si } k = l \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$
4. Soit $P \in \mathbb{C}_n[X]$. D'après la question 1 il existe des réels $\lambda_0,\dots,\lambda_n$ tels que $P = \sum_{k=0}^{n}\lambda_k H_k$. On remarque que $\Delta \in \mathcal{L}(\mathbb{C}_n[X])$.
   Donc $\forall l \in [\![0;n]\!],\ \Delta^l(P)(0) = \sum_{k=0}^{n}\lambda_k\Delta^l(H_k)(0) = \lambda_l$.
5. Soit $k \in \mathbb{Z}$.
   — Si $0 \leq k \leq n-1$ alors $H_n(k) = 0$;
   — Si $k \geq n$ alors $H_n(k) = \frac{1}{n!}\prod_{j=0}^{n-1}(k-j) = \frac{1}{n!}\prod_{j=k-n-1}^{k} j = \binom{k}{n}$;
   — Si $k < 0$ alors $H_n(k) = \frac{(-1)^n}{n!}\prod_{j=0}^{n-1}(j-k) = \frac{(-1)^n}{n!}\prod_{j=-k}^{n-k-1} j = (-1)^n\binom{n-k-1}{n}$.
6. On sait que les coefficients binomiaux sont des entiers donc $H_n(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$.
7. Soit $P \in \mathbb{C}_n[X]$. Les deux implications découlent de la structure d'anneau de $\mathbb{Z}$.
   Si $P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$ alors par récurrence immédiate $\forall k \in [\![0;n]\!],\ \Delta^k(P)(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$. Réciproquement, si $\forall k \in [\![0;n]\!],\ \Delta^k(P)(0) \in \mathbb{Z}$ alors $\forall j \in \mathbb{Z},\ P(j) = \sum_{k=0}^{n-1}\Delta^k(P)(0)H_k(j) \in \mathbb{Z}$.

XIII.4.6 Laguerre ★★★

[Enoncé]

1. D'après la formule de Leibniz $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in \mathbb{R}$,
$$h_n^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{d^k}{dx^k}(e^{-x})\frac{d^{n-k}}{dx^{n-k}}(x^n) = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(-1)^k\frac{n!}{k!}x^k e^{-x}$$
   Donc $L_n(X)$ est un polynôme de degré n et de coefficient dominant $\frac{(-1)^n}{n!}$.
2. Soient $P,Q \in \mathbb{R}[X]$. La fonction $f : x \mapsto P(x)Q(x)e^{-x}$ est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+$ et $f(x) \underset{x\to+\infty}{=} \mathcal{O}\left(x^{\deg(PQ)}e^{-x}\right) \underset{x\to+\infty}{=} o\left(\frac{1}{x^2}\right)$. Donc f est intégrale sur $\mathbb{R}_+$, en particulier l'intégrale $\int_0^{+\infty}P(x)Q(x)e^{-x}dx$ converge.
   Ensuite, il est évident que $\langle\cdot,\cdot\rangle$ est symétrique et bilinéaire. Fixons $P \in \mathbb{R}[X]$.
   La fonction $x \mapsto P(x)^2e^{-x}$ est continue et positive sur $\mathbb{R}_+$. Ainsi par stricte positivité de l'intégrale $\langle P,P\rangle \geq 0$ avec

égalité ssi $\forall x \in \mathbb{R},\ P(x)^2 e^{-x} = 0$. Dans ce cas P est nul sur $\mathbb{R}$ qui est infini donc P est le polynôme nul.
On conclut que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.

3. $L_0 = 1$.
$\forall n \in \mathbb{N},\ \langle L_0, X^n \rangle = \displaystyle\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = \Gamma(n+1) = n!$.

4. Soit $k \in [\![0; n]\!]$. D'après la formule de Leibniz $\forall x \in \mathbb{R}$,
$$h_n^{(k)}(x) = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} \frac{d^{k-j}}{dx^{k-j}}(e^{-x}) \frac{d^j}{dx^j}(x^n) = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} (-1)^{k-j} \frac{n!}{(n-j)!} x^{n-j} e^{-x}$$
On pose $Q_k = \displaystyle\sum_{j=0}^{k} (-1)^{k-j} \binom{k}{j} \frac{n!}{(n-j)!} X^{k-j} = \sum_{j=0}^{k} (-1)^k \binom{k}{j} \frac{n!}{(n-k+j)!} X^j$.

5. Soient $n \in \mathbb{N}$, $p \in [\![0; n]\!]$ et $P \in \mathbb{R}[X]$. Les fonctions en jeux sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+$ donc par IPP successives :
$$n! \langle L_n, P \rangle = \int_0^{+\infty} h_n^{(n)} P(x) dx = \sum_{j=0}^{p-1} \left[(-1)^j h_n^{(n-j-1)}(x) P^{(j)}(x) \right]_0^{+\infty} + (-1)^p \int_0^{+\infty} h_n^{(n-p)}(x) P^{(p)}(x) dx.$$
Or pour $j \in [\![0; p-1]\!]$, la question précédente montre que $h_n^{(n-j-1)}(0) = 0$
et $h_n^{(n-j-1)}(x) P^{(j)}(x) \underset{x \to +\infty}{\longrightarrow} 0$.
On en déduit $\langle L_n, P \rangle = \dfrac{(-1)^p}{n!} \displaystyle\int_0^{+\infty} h_n^{(n-p)}(x) P^{(p)}(x) dx$.

6. Soient $n \geq m \in \mathbb{N}$. D'après la question précédente :
$$\langle L_n, L_m \rangle = \frac{(-1)^n}{n!} \int_0^{+\infty} h_n(x) L_m^{(n)}(x) dx = \frac{(-1)^n}{n!} \int_0^{+\infty} x^n L_m^{(n)}(x) e^{-x} = \frac{(-1)^n}{n!} \langle X^n, L_m^{(n)} \rangle$$
On rappelle qu'on a montré question 1 que L_m est de degré m et de coefficient dominant $\dfrac{(-1)^m}{m!}$.
Si $n > m$ alors $L_m^{(n)} = 0$ d'où $\langle L_n, L_m \rangle = 0$.
Et si $m = n$ alors $L_m^{(n)} = (-1)^n L_0$ d'où $\langle L_n, L_m \rangle = \dfrac{1}{n!} \langle X^n, L_0 \rangle = 1$.

XIII.4.7 Legendre ★★

[Enoncé]

1. $Q_0 = 1,\ Q_1' = 2X,\ Q_2'' = (X^4 - 2X^2 + 1)'' = 12X^2 - 4,\ Q_3''' = (X^6 - 3X^4 + 3X^2 - 1)''' = 120X^3 - 72X$.
$P_0 = 1,\ P_1 = X,\ P_2 = \dfrac{3}{2}X^2 - \dfrac{1}{2},\ P_3 = \dfrac{5}{2}X^3 - \dfrac{3}{2}X$.

2. $\deg(Q_n) = 2n$ donc $\deg(P_n) = \deg(Q_n^{(n)}) = n$.

3. On remarque que la dérivé d'un polynôme pair est impaire et que la dérivée d'un polynôme impair est paire : $P(-X) = P(X) \implies -P'(-X) = P'(X)$ et $P(-X) = -P(X) \implies -P'(-X) = -P'(X) \implies P'(-X) = P'(X)$.
Q_n est pair donc sa dérivée n-ième a la parité de n. On en déduit que $P_n(0) = 0$ si n est impair et $P_n'(0) = 0$ si n est pair (P_n' est impair).

4. Soient $m \in \mathbb{N}$ et $n = 2m$. $Q_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^{n-k} X^{2k}$ donc $Q_n^{(n)} = \displaystyle\sum_{k=m}^{2m} \binom{2m}{k} (-1)^k \frac{(2k)!}{(2k-2m)!} X^{2(k-m)}$.
Ainsi $P_n(0) = \dfrac{(-1)^m}{2^{2m}} \binom{2m}{m} = (-1)^m \dfrac{(2m)!}{2^{2m}(m!)^2}$.
De même, $Q_{n+1}^{(n+2)} = \displaystyle\sum_{k=m+1}^{2m+1} \binom{2m+1}{k} (-1)^k \frac{(2k)!}{(2k-2m-2)!} X^{2k-2m-2}$.
Donc $P_n'(0) = \dfrac{(-1)^{m+1}(2m+2)}{2^{2m+1}} \binom{2m+1}{m+1} = (-1)^{m+1} \dfrac{(2m+1)!}{2^{2m}(m!)^2}$.

5. $Q_n' = 2nX(X^2-1)^{n-1}$ donc $(X^2-1)Q_n' = 2nXQ_n$. On dérive $(n+1)$-fois cette expression :
$$(X^2-1)Q_n^{(n+2)} + 2(n+1)XQ_n^{(n+1)} = 2nXQ_n^{(n+1)} + 2n(n+1)Q_n^{(n)}$$
D'où en simplifiant et en divisant par $2^n n!$, $(X^2-1)P_n'' + 2XP_n' = n(n+1)P_n$.

6. $Q_n = (X-1)^n(X+1)^n$ donc $-1, 1$ sont racines de Q_n de multiplicités n. Ainsi $\forall k \in [\![0; n-1]\!]$, $Q_n^{(k)}(-1) = Q_n^{(k)}(1) = 0$.

7. Remarquons que P_n admet au plus n racines distinctes car il est de degré n.
Montrons par récurrence sur $k \in [\![0; n]\!]$ la propriété $H(k)$: "$Q_n^{(k)}$ admet au moins k racines distinctes dans $]-1, 1[$".
$H(0)$ est évidemment vraie.
Supposons $H(k)$ pour un certain $k \in [\![0; n-1]\!]$. On note $-1 < x_1 < \cdots < x_n < 1$ les racines en questions. On note aussi $x_0 = -1$ et $x_{n+1} = 1$, dont on sait qu'ils sont racines de $Q_n^{(k)}$.
Pour tout $i \in [\![0; k]\!]$, $Q_n^{(k)}$ est continu sur $[x_i, x_{i+1}]$, dérivable sur $]x_i, x_{i+1}[$ et $Q_n^{(k)}(x_i) = Q_n^{(k)}(x_{i+1}) = 0$. Donc d'après le théorème de Rolle, il existe $y_1, \dots y_{k+1}$ des racines de $Q_n^{(k+1)}$ telles que

$$-1 < y_1 < x_1 < y_2 < x_2 < \cdots < y_{k+1} < 1$$

D'où $H(k+1)$.
Par récurrence $\forall k \in [\![0; n]\!]$, $H(k)$. En particulier $H(n)$ donne le résultat voulu.

XIII.4.8 Hermite ★★★

[Enoncé]

1. Soient $P, Q \in \mathbb{R}[X]$. Alors $P(t)Q(t) \underset{|t|\to+\infty}{=} \mathcal{O}\left(x^{\deg(P)+\deg(Q)}\right)$ donc $P(t)Q(t)e^{-t^2/2} \underset{|t|\to+\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$.
L'intégrale est donc bien définie.
Il est évident que $\langle P, Q\rangle = \langle Q, P\rangle$. La bilinéarité est conséquence directe de la linéarité de l'intégrale.
Ensuite $\langle P, P\rangle = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} P(t)^2 e^{-t^2/2} dt$. La fonction $t \mapsto P(t)^2 e^{-t^2/2}$ est continue et positive sur $\mathbb{R}$. Donc par (stricte) positivité de l'intégrale, $\langle P, P\rangle \geq 0$, avec égalité ssi $\forall t \in \mathbb{R},\ P(t)^2 e^{-t^2/2} = 0$ ssi $\forall t \in \mathbb{R},\ P(t) = 0$ ssi $P = 0$.

2. Il faut d'abord s'assurer que H_n est un polynôme. Montrons par récurrence que $\forall x \in \mathbb{R}$, $\dfrac{d^n}{dx^n}\left(e^{-\frac{x^2}{2}}\right) = P_n(x)e^{-x^2/2}$.
On aura alors $P_n = (-1)^n H_n$.
C'est vrai pour $n = 0$ avec $P_0 = 1$. Supposons que ce soit vrai pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Fixons $x \in \mathbb{R}$.
Alors $\dfrac{d^{n+1}}{dx^{n+1}}\left(e^{-\frac{x^2}{2}}\right) = \dfrac{d}{dx}\left(P_n(x)e^{-x^2/2}\right) = (P_n'(x) - xP_n(x))e^{-x^2/2}$.
La propriété est donc vrai au rang $n+1$ pour $P_{n+1} = P_n' - XP_n$.
La même récurrence montre aussi que P_n est de degré n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
Ensuite on suppose sans perte de généralité $n > m$. On calcule alors par IPP successives :

$$\begin{aligned}\langle H_n, H_m\rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} (-1)^n \frac{d^n}{dx^n}\left(e^{-\frac{x^2}{2}}\right) H_m(x)dx \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \left[(-1)^{n+k} \frac{d^{n-k-1}}{dx^{n-k-1}}\left(e^{-x^2/2}\right) H_m^{(k)}(x)\right]_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/2} H_m^{(n)}(x)dx\end{aligned}$$

Les termes de la somme sont tous nul car on a vu que $P(x)e^{-x^2/2} \underset{|x|\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$.
Le terme intégral est nul car $H_m^{(n)} = 0$ (dérivée $n > m$-ième d'un polynôme de degré m).
Ainsi $\langle H_n, H_m\rangle = 0$.

3. Le calcul précédent est toujours valable. Il donne :

$$\langle H_n, H_n\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} H_n^{(n)}(x)e^{-x^2/2}dx$$

Or $H_n^{(n)}$ est un polynôme constant égal à $n!d$ où d est le coefficient dominant de H_n. Dans la récurrence faîte à la question précédente, on obtient $P_{n+1} = P_n' - XP_n$ i.e $H_{n+1} = XH_n - H_n'$. Cette relation donne par récurrence que le coefficient dominant de H_{n+1} est égal à celui de H_n. Comme $H_0 = 1$, $H_n^{(n)} = n!$.
Ainsi $\langle H_n, H_n\rangle = n! \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/2}dx = n!\sqrt{2\pi}$.

4. D'après la formule de Leibniz

$$\frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}}\left(e^{-x^2/2}\right) = -\frac{d^n}{dx^n}\left(xe^{-x^2/2}\right) = -\left(x\frac{d^n}{dx^n}\left(e^{-x^2/2}\right) + n\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}}\left(e^{-x^2/2}\right)\right)$$

D'où :

$$H_{n+1} = XH_n - nH_{n-1}$$

5. On rappelle qu'on a $H_{n+1} = XH_n - H_n'$. On identifie donc $H_n' = nH_{n-1}$ et l'injectant l'équation précédente, écrite à l'ordre $n+1$, on obtient :

$$H_n'' - XH_n' + nH_n = 0$$

XIII.4.9 Bernstein ★★★

[Enoncé]

XIII.4.10 Polynômes cyclotomiques ★★★

[Enoncé]

1. On remarque que pour tout $z \in \mathbb{U}_n$, z est une racine primitive d-ième de l'unité ssi elle est d'ordre d dans le groupe $\mathbb{U}_n$. Alors d'après le théorème de Lagrange $\mathbb{U}_n = \bigsqcup_{d|n} \mathbb{P}_d$.

   Donc $X^n - 1 = \prod_{z\in\mathbb{U}_n}(X-z) = \prod_{d|n}\prod_{z\in\mathbb{P}_d}(X-z) = \prod_{d|n}\Phi_d$.

2. D'après la question précédente $\sum_{i=0}^{p-1} X^{jp^{k-1}} = \frac{X^{p^k}-1}{X^{p^{k-1}}-1} = \frac{\prod_{j=0}^{k}\Phi_{p^j}}{\prod_{j=0}^{k-1}\Phi_{p^j}} = \Phi_{p^k}$.

3. — $\Phi_1 = X - 1$;
   — $\Phi_2 = X + 1$;
   — $\Phi_3 = (X-j)(X-\bar{j}) = X^2 + X + 1$;
   — $\Phi_4 = (X-i)(X+i) = X^2 + 1$;
   — $\Phi_5 = X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$;
   — $X^6 - 1 = \Phi_1\Phi_2\Phi_3\Phi_6$. Donc $\Phi_6(X+1)(X^2+X+1) = X^5 + X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$.
   On effectue la division euclidienne de $X^5+X^4+X^3+X^2+X+1$ par $(X+1)(X^2+X+1) = X^3+2X^2+2X+1$:

$$\begin{aligned} X^5 + X^4 + X^3 + X^2 + X + 1 &= X^2(X^3 + 2X^2 + 2X + 1) - X^4 - X^3 + X + 1 \\ &= (X^2 - X)(X^3 + 2X^2 + 2X + 1) + X^3 + 2X^2 + 2X + 1 \\ &= (X^2 - X + 1)(X^3 + 2X^2 + 2X + 1) \end{aligned}$$

   Donc $\Phi_6 = X^2 - X + 1 = (X - e^{i\pi/3})(X - e^{-i\pi/3})$.

4. a. On conjecture avec les exemples précédents $\Phi_n(0) = 1$. Par récurrence forte :
   Si $\Phi_m(0) = 1$ pour tout $m \in [\![2; n-1]\!]$, pour un certain entier $n \geq 3$, alors en évaluant en 0 l'égalité $X^n - 1 = \prod_{d|n}\Phi_d$ on obtient :
   $-1 = \Phi_1(0)\Phi_n(0)$ i.e $\Phi_n(0) = 1$.

   b. On sait que pour tout p premier et pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\Phi_{p^k}(1) = p$. On sait de plus que $\Phi_6(1) = 1$.
   Par récurrence forte sur n :
   Supposons que pour un certain entier $n \geq 3$, $\forall d \in [\![2; n-1]\!]$ on ait

$$\Phi_d(1) = \begin{cases} p & \text{si } d \text{ est une puissance du nombre premier } p \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$X^n-1=\prod_{d|n}\Phi_d \iff \Phi_n=\frac{X^n-1}{\prod\limits_{\substack{d|n\\ d<n}}\Phi_d}=\frac{\sum\limits_{k=0}^{n-1}X^k}{\prod\limits_{\substack{d|n\\ 2\leq d<n}}\Phi_d}.$$

Or par hypothèse de récurrence

$$\prod_{\substack{d|n\\ 2\leq d<n}}\Phi_d(1)=\begin{cases}\prod\limits_{i=1}^{r}\Phi_{p_i}(1)^{m_i}=n & \text{si } n \text{ n'est pas une puissance de nombre premier}\\ \prod\limits_{i=1}^{k-1}\Phi_{p^i}(1)=p^{k-1} & \text{si } n=p^k \text{ pour un certain nombre premier } p\end{cases}$$

Donc $\Phi_n(1)=\dfrac{n}{\prod\limits_{\substack{d|n\\ 2\leq d<n}}\Phi_d(1)}=\begin{cases}p & \text{si } n \text{ est une puissance du nombre premier } p\\ 1 & \text{sinon}\end{cases}$

Ainsi $\Phi_n(1)$ vaut 1 si n est composé et est égal à son unique diviseur premier sinon.

5. a. C est le quotient dans la division euclidienne de A par B.

   b. Φ_n est le quotient de X^n-1 par $\prod\limits_{\substack{d|n\\ d<n}}\Phi_d$. Par récurrence immédiate en utilisant la question précédente $\Phi_n\in\mathbb{Z}[X]$.

XIII.4.11 Suite de polynômes définis par récurrence

[Enoncé]

XIII.4.12 Equation polynomiale (1)

[Enoncé]

XIII.4.13 Equation polynomiale (2)

[Enoncé]

XIII.4.14 Equation polynomiale (3)

[Enoncé]

XIII.4.15 Equation polynomiale (4)

[Enoncé]

XIII.4.16 Equation polynomiale (5)

[Enoncé]

XIII.4.17 Equation de Shapiro

[Enoncé]

XIII.4.18 Degré d'une différence ★

[Enoncé] On sait que $X^3-1=(X-1)(X-j)(X-\overline{j})$ avec $j=e^{2i\pi/3}$. Donc $P^3-Q^3=(P-Q)(P-jQ)(P-\overline{j}Q)$.
Comme $P-Q\neq 0$, $\deg(P^3-Q^3)=\deg(P-Q)+\deg(P-jQ)+\deg(P-\overline{j}Q)\geq \deg(P-jQ)+\deg(P-\overline{j}Q)$.
Or pour tout $z\in\mathbb{C}$, $\deg(P-zQ)\neq n$ ssi le coefficient dominant de P est égal à celui de zQ. Comme $j\notin\mathbb{R}$, le coefficient dominant de jQ n'est pas réel. De même pour celui de $\overline{j}Q$.
Ainsi comme celui de P est réel, $\deg(P-jQ)=\deg(P-\overline{j}Q)=n$ d'où $\deg(P^3-Q^3)\geq 2n$.

XIII.4.19 Théorème de la racine rationnelle ★★

[Enoncé]
$\frac{p}{q}$ irréductible équivaut à $p\wedge q=1$.
On sait que $0=P\left(\frac{p}{q}\right)=\sum_{k=0}^{n}a_k\frac{p^k}{q^k}=q^{-n}\sum_{k=0}^{n}a_kp^kq^{n-k}$.
Donc $-a_0q^n=p\sum_{k=1}^{n}a_kp^{k-1}q^{n-k}$.
Or $\sum_{k=1}^{n}a_kp^{k-1}q^{n-k}\in\mathbb{Z}$ donc $p|a_0q^n$ d'où par le lemme de Gauss $p|a_0$.
De même $-a_np^n=q\sum_{k=0}^{n-1}a_kp^kq^{n-1-k}$ donc $q|a_np^n$ d'où $q|a_n$.

XIII.4.20 Critère d'Eisenstein ★★★

[Enoncé]

1. a. Notons $P=\sum_{k=0}^{n}a_kX^k$ et $Q=\sum_{k=0}^{m}b_kX^k$.
On considère $\tilde{P}=\frac{P}{c(P)}$ et $\tilde{Q}=\frac{Q}{c(Q)}$. $\tilde{P}$ et $\tilde{Q}$ sont à coefficients entiers et on montre aisément qu'ils sont de contenu 1 (on dit qu'ils sont *primitifs*). Il suffit donc de montrer le résultat pour P et Q de contenus égaux à 1. Dans ce cas il faut montrer que $c(PQ)=1$.
Soit p un nombre premier. On sait, comme P et Q sont primitifs, qu'il existe des coefficients de P et Q qui ne sont pas divisibles par p. On note $i=\min\{k\in[\![0;n]\!],\ p\nmid a_k\}$ et $j=\min\{k\in[\![0;m]\!],\ p\nmid b_k\}$.
D'après la formule du produit de Cauchy le coefficient de X^{i+j} dans PQ est congrus à a_ib_j modulo p. Il n'est donc pas divisible par p d'où $p\nmid c(PQ)$. On en déduit que $c(PQ)=1$.

Preuve plus rapide qui sort un peu du programme :
Supposons que p est un diviseur premier de $c(PQ)$. Alors p divise tous les coefficients de PQ. On note $\overline{P}$ le polynôme de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ dont les coefficients sont les classes des coefficients de P. On note de même $\overline{Q}$ et $\overline{PQ}=\overline{P}\cdot\overline{Q}$.
On a $\overline{PQ}=0$ donc comme $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$ est intègre (on l'a en fait remontré dans la première preuve) on en déduit que $\overline{P}=0$ ou $\overline{Q}=0$. Ceci est absurde car p ne divise ni $c(P)$ ni $c(Q)$. Ainsi $c(PQ)=1$.

b. Soient $P,Q\in\mathbb{Q}[X]$ unitaires. Il est évident que si $P,Q\in\mathbb{Z}[X]$ alors $S=PQ\in\mathbb{Z}[X]$. Supposons réciproquement que $PQ\in\mathbb{Z}[X]$. On note a le pgcd des dénominateurs des coefficients de P et b celui des dénominateurs des coefficients de Q, de sorte que $aP,bQ\in\mathbb{Z}[X]$. On considère $\tilde{P}=\frac{aP}{c(aP)}$ et $\tilde{Q}=\frac{bQ}{c(bQ)}$ de sorte que $c(\tilde{P})=c(\tilde{Q})=1$.
On sait que $\tilde{P}\tilde{Q}=\frac{a}{c(aP)}\cdot\frac{b}{c(bQ)}S$. On remarque que le contenu de S vaut 1 car il est unitaire. Donc en passant au contenu, $1=c(\tilde{P})c(\tilde{Q})=\frac{a}{c(aP)}\cdot\frac{b}{c(bQ)}$. De plus $\frac{a}{c(aP)}$ et $\frac{b}{c(bQ)}$ sont des entiers. Ils valent donc tous les deux ±1. Ainsi $P=\pm\tilde{P}\in\mathbb{Z}[X]$ et $Q=\pm\tilde{Q}\in\mathbb{Z}[X]$.

2. Supposons pas l'absurde qu'il existe deux polynômes à coefficients rationnels $B=\sum_{k=0}^{d}b_kX^k$ et $C=\sum_{k=0}^{n-d}c_kX^k$ tels

que $A = BC$ et $0 < d = \deg(B) < n$. Quitte à les diviser par leur coefficient dominant on peut supposer que B et C sont unitaires.
Alors d'après la question 1, B et C sont à coefficients entiers. On sait que $p|a_0 = b_0c_0$ et comme $p^2 \nmid a_0$, p divise un et un seul des deux entiers b_0, c_0. On suppose sans perte de généralité que c'est b_0.
Montrons par récurrence forte que $\forall k \in [\![0; d]\!],\ p|b_k$.
On vient de faire l'initialisation. Supposons que pour un certain entier $k \in [\![0; d-1]\!],\ \forall i \in [\![0; k]\!],\ p|b_i$.
D'après l'hypothèse de l'énoncé $p|a_{k+1} = \sum_{i=\max(0,k+1+d-n)}^{k+1} b_i c_{k+1-i}$. Donc par hypothèse de récurrence $p|b_{k+1}c_0$.
Or $p \nmid c_0$ donc d'après le lemme d'Euclide $p|b_{k+1}$.
Mais alors en particulier $p|b_d = 1$ ce qui est absurde. On en déduit que B ou C est constant et donc que A est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Preuve plus rapide qui sort un peu du programme :
On reprend à $A = BC$ avec $B, C \in \mathbb{Z}[X]$ unitaires. On note $\overline{A}$ le polynôme de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ dont les coefficients sont les classes des coefficients de A. On note de même $\overline{B}$ et $\overline{C}$ et $\overline{BC} = \overline{B} \cdot \overline{C}$.
L'hypothèse de l'énoncé se traduit par $\overline{A} = X^n$. Donc $X^n = \overline{B} \cdot \overline{C}$ d'où comme $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$ est intègre (on l'a en fait montré dans la réponse à la question 1). $\overline{B} = X^k$ et $\overline{C} = X^{n-k}$. On repasse dans $\mathbb{Z}[X]$: on a obtenu que $\forall i \in [\![0; k-1]\!],\ p|b_i$ et $\forall j \in [\![0; n-k-1]\!],\ p|c_i$.
En particulier $p|b_0$ et $p|c_0$ d'où $p^2|b_0c_0 = a_0$ ce qui est absurde.

Irréductibilité des polynômes cyclotomiques d'indices premiers ★★

$\Phi_p(X) = \dfrac{X^p - 1}{X - 1}$ donc $\Psi_p(X) = \dfrac{(X+1)^p - 1}{X} = \displaystyle\sum_{k=1}^{p} \binom{p}{k} X^{k-1} = X^{p-1} + \sum_{k=0}^{p-2} \binom{p}{k+1} X^k$.
Or si $k \in [\![0; p-2]\!]$ alors $p|\displaystyle\prod_{i=p-k}^{p} i = \binom{p}{k+1}(k+1)!$. Et comme p est premier et $0 < k+1 < p$, $\gcd(p, (k+1)!) = 1$.
Donc d'après le lemme de Gauss $p|\binom{p}{k+1}$.
De plus $p^2 \nmid \binom{p}{1} = p$.
Par conséquent d'après le critère d'Eisenstein Ψ_p est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.
Pour conclure il suffit d'évaluer, pour $B, C \in \mathbb{Q}[X]$, l'égalité $\Phi_p = BC$ en $X + 1$. On obtient $B(X+1)$ ou $C(X+1)$ est constant d'où B ou C est constant et Φ_p est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Dimension de $\mathbb{R}$ en tant que $\mathbb{Q}$-espace vectoriel ★★★

1. f_α est un morphisme d'algèbre donc son noyau est un idéal de $\mathbb{Q}[X]$.

   Montrons que tous les idéaux de $\mathbb{Q}[X]$ sont principaux (i.e engendré par un seul élément). Soit I un idéal non nul de $\mathbb{Q}[X]$. L'ensemble des degrés des éléments de $I \setminus \{0\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$, elle admet donc un minimum. On considère un polynôme Π qui réalise ce minimum. Quitte à le multiplier par l'inverse de son coefficient dominant (qui est dans $\mathbb{Q}$ car $\mathbb{Q}$ est un corps) on peut aussi supposer Π unitaire. Montrons que $I = \Pi\mathbb{Q}[X]$.
   Par absorbance $\Pi\mathbb{Q}[X] \subset I$. Réciproquement si $P \in I$ alors on pose $P = Q\Pi + R$ la division euclidienne de P par Π. Comme $\mathbb{Q}$ est un corps et comme $\Pi, P \in \mathbb{Q}[X]$, l'algorithme de division euclidienne assure que $Q, R \in \mathbb{Q}[X]$.
   Alors $R = P - Q\pi \in I$. par conséquent R ne peut pas être non nul car sinon la condition $\deg(R) < \deg(\Pi)$ contredirait la minimalité de π en degré. Ainsi $R = 0$ et $P \in \Pi\mathbb{Q}[X]$.

   On peut alors se donner un polynôme unitaire Π_α tel que $\mathrm{Ker}(f_\alpha) = \Pi_\alpha\mathbb{Q}[X]$. Comme $P \in \mathrm{Ker}(f_\alpha)$ on a $\Pi_\alpha|P$. Or d'après le critère d'Eisenstein P est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$. On en déduit que P et Π_α sont associés, et donc qu'ils sont égaux étant tous deux unitaires.

2. Soit $(q_0, \dots, q_n) \in \mathbb{Q}^{n+1}$ tel que $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} q_k \alpha^k = 0$.

On a donc $Q(\alpha)=0$ avec $Q=\sum_{k=0}^{n} q_k X^k \in \mathbb{Q}[X]$ i.e $Q\in \mathrm{Ker}(f_\alpha)$ d'où $P|Q$.
Enfin, $\deg(Q)\leq n<n+1=\deg(P)$ donc $Q=0$. C'est à dire $\forall k\in[\![0;n]\!],\ q_k=0$.
En outre la famille $(1,\alpha,\dots,\alpha^n)$ est $\mathbb{Q}$-libre.

3. Pour $n\in\mathbb{N}^*$ on considère la polynôme $P_n=X^n-2$.
P_n vérifie le critère d'Eisenstein ($p=2$). Donc la famille $(1,\sqrt{2},\dots,\sqrt{2}^n)$ est libre dans $\mathbb{Q}$.
Ainsi $\mathbb{R}$ n'admet pas de famille $\mathbb{Q}$-libre maximale : $\mathbb{R}$ est un $\mathbb{Q}$-espace vectoriel de dimension infinie.

XIII.4.21 Points critiques des polynômes de Hilbert ★★★

[Enoncé]

1. Notons $f_n : x\mapsto F_n(x)$. f_n est $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0,1[$ car F_n n'admet pas de pôle dans cet intervalle.
Ensuite d'après le cours $F_n(X)=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{X-k}$. Donc $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=+\infty$ et $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=-\infty$.
De plus $\forall x\in]0,[1,\ f_n'(x)=-\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{(X-k)^2}<0$. Donc f_n est strictement décroissante sur $]0,1[$.
D'après le théorème de la bijection f_n s'annule exactement une fois sur $]0,1[$.

2. Fixons $n\geq 2$. $f_n(x_n)=0$ donc $\frac{1}{x_n}=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k-x_n}\geq\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}:=H_n$.
On sait que $H_n\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}+\infty$ donc $x_n\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}0$.

3. Fixons $n\geq 2$.
On réécrit de même $H_n\leq\frac{1}{x_n}=\frac{1}{1-x_n}+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k-x_n}\leq\frac{1}{1-x_n}+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k-1}=\frac{1}{1-x_n}+H_{n-1}=\frac{1}{1-x_n}-\frac{1}{n}+H_n$.
Or on montre classiquement (cf. I.3) que $H_n\underset{n\to+\infty}{\sim}\ln n$ d'où $\frac{1}{1-x_n}-\frac{1}{n}+H_n\underset{n\to+\infty}{\sim}\ln n$ puis $x_n\underset{n\to+\infty}{\sim}\frac{1}{\ln n}$.

XIII.4.22 Zéros du sinus tronqué

[Enoncé]

XIII.4.23 Exponentielle tronquée ★

[Enoncé]
Soit $z\in\mathbb{C}$ une racine de P. Supposons par l'absurde que $P'(z)=0$.
On a $0=P'(z)=\sum_{k=0}^{n-1}\frac{z^k}{k!}=P(z)-z^n=-z^n$ donc $z=0$. Ceci est absurde puisque $P(0)=1\neq 0$. On en déduit que P est scindé à racines simples.

XIII.4.24 Les fonctions localement polynomiales sont polynomiales ★★

[Enoncé]
On sait déjà que f est égal à un certain polynôme P sur un intervalle $[0,\varepsilon]$. L'idée va être de trouver le plus grand intervalle sur lequel f est égale à P.
On introduit donc $s:=\sup\{t>0,\ \forall x\in[0,t],\ f(x)=P(x)\}\in\mathbb{R}_+\cup\{+\infty\}$. Le but est de montrer que $s=+\infty$.
Supposons par l'absurde $s\in\mathbb{R}$. Alors $\exists 0<\alpha<s,\ \exists Q\in\mathbb{R}[X],\ \forall x\in]s-\alpha,s+\alpha[,\ f(x)=Q(x)$. En particulier $\forall x\in[s-\alpha,s[,\ P(x)=f(x)=Q(x)$. P et Q coïncident en une infinité de points, ils sont donc égaux. Ceci contredit la maximalité de s et on en déduit que $s=+\infty$.
On peut faire de même pour montrer que f est polynomiale sur $]-\infty,1]$. Ce polynôme coïncide avec P sur $[0,1]$, ils sont donc égaux et par suite $\forall x\in\mathbb{R},\ f(x)=P(x)$.

XIII.4.25 Intégrales de polynômes ★

[Enoncé]

Notons $(L_0, \dots, L_n)$ la base de Lagrange aux points $x_0, \dots, x_n$. Fixons $P \in \mathbb{K}_n[X]$.

On sait que $P = \sum_{i=0}^{n} P(x_i)L_i$.

Donc $\int_a^b P(x)dx = \sum_{i=0}^{n} \int_a^b P(x_i)L_i(x)dx = \sum_{i=0}^{n} P(x_i) \int_a^b L_i(x)dx = \sum_{i=0}^{n} \lambda_i P(x_i)$ avec $\lambda_i = \int_a^b L_i(x)dx$.

XIII.4.26 Théorème de Gauss-Lucas ★★

[Enoncé]

1. Soit α une racine de P'. Si α est racine de P, il n'y a rien à faire. Sinon, On sait que $\frac{P'}{P} = \sum_{k=1}^{r} \frac{n_k}{X - z_k}$. Alors,

$$0 = \frac{P'(\alpha)}{P(\alpha)} = \sum_{k=1}^{r} \frac{n_k}{\alpha - z_k} = \sum_{k=1}^{r} \frac{n_k \cdot \overline{\alpha - z_k}}{|\alpha - z_k|^2}$$

et en passant au conjugué :

$$\sum_{k=1}^{r} \frac{n_k(\alpha - z_k)}{|\alpha - z_k|^2} = 0$$
$$\iff \alpha \sum_{k=1}^{r} \frac{n_k}{|\alpha - z_k|^2} = \sum_{k=1}^{r} \frac{n_k}{|\alpha - z_k|^2} z_k$$

Notons $\lambda = \sum_{k=1}^{r} \frac{n_k}{|\alpha - z_k|^2}$. En posant pour $k \in [\![1; n]\!]$, $\lambda_k = \frac{n_k}{\lambda |\alpha - z_k|^2} \geq 0$ on a

$$\alpha = \sum_{k=1}^{r} \lambda_k z_k \text{ et } \sum_{k=1}^{r} \lambda_k = 1$$

2. si les z_k sont tous réels alors α l'est aussi : P' est à racines réelles.

Une application ★★★

1. Notons $\mathcal{C} = \{C \subset R_P,\ \text{Conv}(C) = \text{Conv}(R_P)\}$ et $\mathcal{D} = \{|C|,\ C \in \mathcal{C}\}$.
$\mathcal{D}$ est une partie non vide ($R_P \in \mathcal{C}$) de $\mathbb{N}^*$ ($\text{Conv}(\emptyset) = \emptyset \neq \text{Conv}(R_P)$ puisque P a une racine par le théorème de d'Alembert-Gauss), elle admet donc un minimum. Notons C_0 tel que $|C_0| = \min \mathcal{D}$.
Fixons $C \in \mathcal{C}$ telle que $C \subset C_0$. Alors $|C| \leq |C_0|$ et par définition de C_0, $|C_0| \leq |C|$. Donc $|C| = |C_0|$ d'où $C = C_0$.

Fixons $a, b \in \text{Conv}(R_P) \backslash R_{P,\min}$ ainsi que $t \in]0, 1[$. $\text{Conv}(R_P)$ est convexe par définition donc $\gamma(t) = ta + (1-t)b \in \text{Conv}(R_P)$. Supposons que $\gamma(t) \in R_{P,\min}$.
Quitte à réindicer, on peut supposer que $R_{P,\min} = \{z_k,\ k \in [\![1; m]\!]\}$ pour un certain $m \in [\![1; r]\!]$. $a, b \in \text{Conv}(R_P) = \text{Conv}(R_{P,\min})$ donc il existe $(\lambda_1, \dots, \lambda_m), (\mu_1, \dots, \mu_m) \in (\mathbb{R}_+)^m$ tels que $\sum_{k=1}^{m} \lambda_k = 1 = \sum_{k=1}^{m} \mu_k$, $a = \sum_{k=1}^{m} \lambda_k z_k$ et $b = \sum_{k=1}^{m} \mu_k z_k$.

Notons $p \in [\![1; m]\!]$ tel que $\sum_{k=1}^{m} (t\lambda_k + (1-t)\mu_k) z_k = z_p$, c'est à dire tel que $\sum_{\substack{1 \leq k \leq m \\ k \neq p}} \nu_k z_k = (1 - \nu_p) z_p$. avec $\nu_k = t\lambda_k + (1-t)\mu_k$.

On remarque que $\sum_{k=1}^{m} \nu_k = 1$ et que $\forall k \in [\![1; m]\!],\ \nu_k \geq 0$.

Si $\nu_p < 1$ alors on a $z_p = \sum_{\substack{1\leq k\leq m\\ k\neq p}} \frac{\nu_k}{1-\nu_p} z_k$ avec $\sum_{\substack{1\leq k\leq m\\ k\neq p}} \frac{\nu_k}{1-\nu_p} = 1$ et $\forall k \in [\![1;m]\!] \setminus \{p\}$, $\frac{\nu_k}{1-\nu_p} \geq 0$. Donc $z_p \in \text{Conv}(z_k,\ k \in [\![1;m]\!] \setminus \{p\})$ ce qui contredit la minimalité de $R_{P,\min}$.
Et si $\nu_p = 1$ alors $\forall k \in [\![1;m]\!] \setminus \{p\}$, $\nu_k = 0$. D'où, comme $0 < t < 1$, $\forall k \in [\![1;m]\!] \setminus \{p\}$, $\lambda_k = \mu_k = 0$ d'où $a = b = z_p$. Ceci est absurde car $a \notin R_{P,\min}$ par exemple.

Ainsi, $\gamma(t) \notin R_{P,\min}$ et donc $\text{Conv}(R_P) \setminus R_{P,\min}$ est convexe.

2. Tout d'abord, si P n'a qu'une seule racine alors il n'y a rien à montrer. Supposons que P a au moins deux racines distinctes. $\exists Q \in \mathbb{C}[X],\ n(n-1)P = QP''$ avec $n = \deg(P)$ (de manière à ce que Q soit unitaire). De plus, $(P \neq 0 \wedge P''|P) \implies P'' \neq 0$. Donc $n \geq 2$ et $\deg(Q) = 2$.
On dérive $\frac{P'}{P}$ sur $\mathbb{R}$:
$$\forall x \in \mathbb{R},\ \frac{P''(x)P(x) - P'(x)^2}{P(x)^2} = \frac{\frac{n(n-1)P(x)^2}{Q(x)} - P'(x)^2}{P(x)^2} = \frac{n(n-1)}{Q(x)} - \left(\frac{P'(x)}{P(x)}\right)^2 = -\sum_{k=1}^{r} \frac{n_k}{(x-z_k)^2}.$$
$$\iff \forall x \in \mathbb{R},\ \sum_{k=1}^{r} \frac{n_k}{(x-z_k)^2} = \left(\sum_{k=1}^{r} \frac{n_k}{x-z_k}\right)^2 - \frac{n(n-1)}{Q(x)}.$$
Soit $p \in [\![1;r]\!]$. On multiplie dans la relation par $(x-z_p)^2$ puis on l'évalue en $x = z_p$:

Si z_p n'est pas racine double de Q alors, $n_p = n_p^2$ d'où $n_p = 1$ car $n_p > 0$.
Et si z_p est racine double de Q alors $Q = (X-z_p)^2$ et, $n_p(n_p-1) = n(n-1)$ d'où $n_p = n$ ce qui est absurde car dans ce cas z_p est la seule racine de P.
On en déduit que P est scindé à racines simples.
D'après la question 1, $R_{P'} \subset \text{Conv}(R_{P,\min})$. De plus, comme P est à racines simples, aucune racine de P' n'est racine de P. On a donc $R_{P'} \subset B = \text{Conv}(R_{P,\min}) \setminus R_{P,\min}$ puis $R_{P''} \subset \text{Conv}(R_{P'}) \subset \text{Conv}(B) = B$ puisque B est convexe.
D'autre part, $|R_{P''}| = |R_P| - 2$ et $P''|P \implies R_{P''} \subset R_P$.
Ainsi, il y a au moins $n-2$ éléments de R_P qui ne sont pas dans $R_{P,\min}$, c'est à dire qu'il y a au plus deux racines de P qui sont dans $R_{P,\min}$, c'est à dire qu'il y a exactement deux racines de P qui permettent d'exprimer chaque racine de P comme barycentre à coefficients positifs d'elles mêmes (il ne peut pas en avoir une seule car on a vu que $|R_{P,\min}| > 1$).
Ceci montre que les racines de P sont alignées.

3. La réciproque est fausse en général. Tous les polynômes à racines réelles ont leur racines alignées (sur la droite des réels), il suffit donc de trouver un contre exemple parmi ces polynômes.
On prend $P = X^2(X-1) = X^3 - X^2$. $P'' = 6X - 2$ ne divise pas P.

XIII.4.27 Graphe d'un polynôme ★★

[Enoncé]
Notons $G = \{(x, P(x)),\ x \in \mathbb{R}\}$ le graphe de P. Soient $((x_i, y_i))_{0\leq i\leq n} \in G^{n+1}$ distincts et alignés. Par hypothèse il existe une droite passant par tous ces points. Notons $y = ax + b$ l'équation de cette droite.
$\forall i \in [\![0;n]\!]$, $P(x_i) = y_i = ax_i + b$. Donc le polynôme $P - aX - b$ a $n+1$ racines distinctes. Ceci est absurde car $\deg(P - aX - b) = n$.

XIII.4.28 Polynômes qui commutent avec cosinus ★★★

[Enoncé]
On note $(*) : \forall x \in \mathbb{R},\ P(\cos(x)) = \cos(P(x))$

1. Notons $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $P(X) = \lambda$.
En évaluant $(*)$ en n'importe quel point on obtient $\lambda = \cos(\lambda)$. Posons $f : x \mapsto x - \cos(x)$. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et,
$$\forall x \in \mathbb{R},\ f'(x) = 1 - \sin(x) \geq 0$$

De plus, il n'y a égalité que sur un nombre dénombrable de points donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
$\lim\limits_{-\infty} f = -\infty < 0 < +\infty = \lim\limits_{+\infty} f$ donc d'après le théorème de la bijection, $\exists!\ \lambda \in \mathbb{R},\ f(\lambda) = 0$ i.e $\cos(\lambda) = \lambda$.

2. Notons $P(X) = aX + b$ avec $a \neq 0$.
On dérive deux fois la relation $(*), \forall x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} & -a\sin(x) = -a\sin(ax+b) \\ \iff & \sin(x) = \sin(ax+b) \qquad (\text{car } a \neq 0) \end{aligned}$$

puis :

$$\cos(x) = a\cos(ax+b) \overset{(*)}{=} a^2\cos(x) + ab$$

Donc $(**) : \forall x \in \mathbb{R},\ (a^2-1)\cos(x) = ab$ D'où $a^2 - 1 = 0$ c'est à dire $a = 1$ ou $a = -1$.
En reportant dans $(**)$ on a $ab = 0$. Or $a \neq 0$ donc on en déduit que $b = 0$.
On vérifie alors que $a = 1$, qui donne $P = X$, fonctionne et $a = -1$, qui donne $P = -X$, ne fonctionne pas.

3. Supposons que $\deg(P) \geq 2$.
En dérivant $(*)$:

$$(*') : \forall x \in \mathbb{R},\ -\sin(x)P'(\cos(x)) = -P'(x)\sin(P(x))$$

$\cos(\mathbb{R}) = [-1,1]$ et $x \mapsto P'(x)$ est continue sur $[-1,1]$ donc d'après le théorème des bornes atteintes, $x \mapsto P'(\cos(x))$ est bornée sur $\mathbb{R}$. Ainsi le membre de gauche de $(*')$ est borné sur $\mathbb{R}$. Notons $M \in \mathbb{R}^+$ tel que $\forall x \in \mathbb{R},\ |\sin(x)P'(\cos(x))| \leq M$. $\deg(P) \geq 2$ assure que $|P'(x)| \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$, on peut alors se donner $A > 0$ tel que $\forall x > A, |P'(x)| > M$.
Enfin $x \mapsto P(x)$ est continue sur $\mathbb{R}$ et $P(x) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} \pm\infty$ donc $P(]A,+\infty[) \bigcap \dfrac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z} \neq \emptyset$ ce qui permet d'assurer l'existence de $x_0 > A$ tel que $|\sin(P(x_0))| = 1$ de sorte que $M < |P'(x_0)\sin(P(x_0))| = |\sin(x_0)P'(\cos(x_0))| \leq M$.
Ceci est absurde donc les seuls polynômes solutions sont $P = X$ et $P = \lambda$.

XIII.4.29 Relation trigonométrique polynomiale ★★★

[Enoncé]
soit $P \in \mathbb{R}[X]$ vérifiant $(0) : \forall t \in \mathbb{R}, P(\cos t) + P(\sin t) = 1$. Fixons $t \in \mathbb{R}$
$(1) : P(\cos(-t)) + P(\sin(-t)) = P(\cos t) + P(-\sin t) = 1$
Donc $(1) - (0) : P(-\sin t) = P(\sin t)$
Ainsi, $\forall x \in [-1,1],\ P(-x) = P(x)$. Comme $[-1,1]$ est infini, $P(-X) = P(X)$. Donc P est pair c'est à dire $P \in \mathbb{R}[X^2]$ c'est à dire $\exists Q \in \mathbb{R}[X],\ P(X) = Q(X^2)$.
Alors $P(\cos t) + P(\sin t) = 1 \iff Q(\cos^2 t) + Q(\sin^2 t) = 1 \iff Q(\cos^2 t) + Q(1 - \cos^2 t) = 1$.
Ainsi, $\forall x \in [0,1],\ Q(x) + Q(1-x) = 1$. Donc $(2) : Q(X) + Q(1-X) = 1$.
Posons $R(X) = Q(X + 1/2) - 1/2$.
$(2) \iff R(X) + R(-X) = Q(1/2+X) + Q(1/2-X) - 1 = Q(1/2+X) + Q(1-(1/2+X)) - 1 = 1 - 1 = 0$. donc R est impair c'est à dire $R \in X\mathbb{R}[X^2]$ c'est à dire $\exists S \in \mathbb{R}[X],\ R(X) = XS(X^2)$. En reportant jusqu'à revenir à P on a obtenu qu'il existe $S \in \mathbb{R}[X]$ tel que :

$$P(X) = \left(X^2 - \frac{1}{2}\right) S\left[\left(X^2 - \frac{1}{2}\right)^2\right] + \frac{1}{2}$$

Réciproquement, fixons $S \in \mathbb{R}[X]$ et posons $P(X) = \left(X^2 - \frac{1}{2}\right) S\left[\left(X^2 - \frac{1}{2}\right)^2\right] + \frac{1}{2}$.

$$\forall t \in \mathbb{R},\ P(\cos t) + P(\sin t) = 1 + \left(\cos^2 t - \frac{1}{2}\right) S\left[\left(\cos^2 t - \frac{1}{2}\right)^2\right] + \left(\sin^2 t - \frac{1}{2}\right) S\left[\left(\sin^2 t - \frac{1}{2}\right)^2\right]$$

Or on remarque que $\left(\cos^2 t - \frac{1}{2}\right)^2 - \left(\sin^2 t - \frac{1}{2}\right)^2 = (\cos^2 t + \sin^2 t - 1)(\cos^2 t - \sin^2 t) = 0$.

Donc $\forall t \in \mathbb{R},\ P(\cos t) + P(\sin t) = 1 + (\cos^2 t + \sin^2 t - 1) S\left[\left(\sin^2 t - \frac{1}{2}\right)^2\right] = 1$.

Ainsi l'ensemble des solutions de (0) est $\mathcal{E} = \left\{\left(X^2 - \frac{1}{2}\right) S\left[\left(X^2 - \frac{1}{2}\right)^2\right] + \frac{1}{2},\ S \in \mathbb{R}[X]\right\}$.

XIII.4.30 Division euclidienne (1) ★

[Enoncé]
Notons $P = X^{42} + X^{1729} + X^{11\,111}$ et $A = X^2 + X + 1$. On écrit $P = AQ + R$ la division euclidienne de P par A. On montre classiquement que $A = (X - j)(X - \bar{j})$ avec $j = e^{2i\pi/3}$, vérifiant $j^3 = 1$.
En évaluant en j on obtient $aj + b = R(j) = j^{3\times 14} + j^{1728+1} + j^{11\,112-1} = 1 + j + j^{-1} = 1 + j + j^2 = 0$.
On en déduit $R(\bar{j}) = P(\bar{j}) = \overline{P(j)} = 0$. R est de degré au plus 1 et a deux racines, c'est donc le polynôme nul.
Autrement dit $X^2 + X + 1 | X^{42} + X^{1729} + X^{11\,111}$.

XIII.4.31 Division euclidienne (2) ★

[Enoncé]
Notons $P = (\cos\theta + X\sin(\theta))^n$ et $A = X^2 + 1$. On écrit $P = AQ + R$ la division euclidienne de P par A avec $R = aX + b \in \mathbb{R}[X]$. En évaluant en i on obtient $ai + b = e^{in\theta}$ d'où $a = \cos(n\theta)$ et $b = \sin(n\theta)$.

XIII.4.32 Fonctions trigonométriques polynomiale ? ★

[Enoncé]

1. 1ère méthode : Sur $\mathbb{R}$
   cos est bornée donc si c'était une fonction polynomiale, elle serait constante ce qui n'est pas le cas.
   2nd méthode : Sur $\mathbb{R}$
   cos n'est pas identiquement nulle et s'annule une infinité de fois sur $\mathbb{R}$.
   3ème méthode : Sur un intervalle d'intérieur non vide quelconque
   $\cos'' = -\cos$ donc si c'était une fonction polynomiale, elle serait identiquement nulle (pour des raisons de degrés) ce qui n'est pas le cas.
2. Soit P un éventuel polynôme égal à tan sur un intervalle d'intérieur non vide I. P n'est pas constant car tan est injective sur I.
   En dérivant $P' = 1 + P^2$. Pourtant $\deg(P') < \deg(P) \leq \deg(P^2) = \deg(1 + P^2)$.

XIII.4.33 Logarithme rationnel ? ★★

[Enoncé]
1ère solution : par le degré
Supposons qu'une telle fraction rationnelle $R = \dfrac{P}{Q}$ existe.

$$R'(X) = \frac{1}{X} \iff \frac{P'(X)Q(X) - P(X)Q'(X)}{Q(X)^2} = \frac{1}{X} \iff X(P'(X)Q(X) - P(X)Q'(X)) = Q(X)^2.$$

Donc

$$\begin{aligned} 2\deg(Q) &= \deg(Q^2) \\ &= \deg(X(P'(X)Q(X) - P(X)Q'(X))) \\ &= 1 + \deg(P'(X)Q(X) - P(X)Q'(X)) \\ &\leq 1 + \max(\deg(P'Q), \deg(QP')) \\ (P, Q \text{ ne peuvent pas être tous les deux constants}) &= 1 + \deg(P) + \deg(Q) - 1 = \deg(P) + \deg(Q). \end{aligned}$$

On en déduit que $\deg(Q) \leq \deg(P)$ et donc que $R \in \mathbb{K}[X]$.
Mais alors $R' \in \mathbb{K}[X]$ ce qui est absurde donc il n'existe pas de fraction rationnelle dont la dérivée vaut $\dfrac{1}{X}$.
Cette solution a pour avantage d'être assez élémentaire, toutefois elle ne s'adapte pas vraiment à des fractions rationnelles plus sophistiqués que $\dfrac{1}{X}$.

2nd solution : par l'étude de fonction
Supposons qu'une telle fraction rationnelle R existe.
Notons z un pôle de R de module maximal. $\forall x > |z|,\ R'(x) = \dfrac{1}{x}$.
Donc, $\exists C \in \mathbb{C}, \forall x > |z|,\ R(x) = \ln(x) + C$.

Alors $\lim_{x\to+\infty} R(x) = +\infty$ ce qui implique $\deg(R) > 0$ et $\lim_{x\to+\infty} \frac{R(x)}{x} = 0$ ce qui implique $\deg\left(\frac{R(X)}{X}\right) < 0$ c'est à dire $\deg(R) < 1$.

Ceci est absurde donc il n'existe pas de fraction rationnelle dont la dérivée vaut $\frac{1}{X}$.

Cette solution, bien que très différente de la précédente, possède le même défaut que celle-ci pour ce qui est d'essayer de généraliser l'exercice...

3ème solution : par l'étude de la multiplicité de 0

Supposons qu'une telle fraction rationnelle $R = \frac{P}{Q}$ avec $P \wedge Q = 1$ existe.

$R'(X) = \frac{1}{X} \iff \frac{P'(X)Q(X) - P(X)Q'(X)}{Q(X)^2} = \frac{1}{X} \iff X(P'(X)Q(X) - P(X)Q'(X)) = Q(X)^2 : (*)$

Donc $X|Q^2$ et d'après le lemme d'Euclide, $X|Q$. Notons m la multiplicité de 0 en tant que racine de Q. On a montré que $m \geq 1$.

Ensuite, intéressons nous à la multiplicité de 0 dans $P'Q - PQ'$. D'une part, puisque $P \wedge Q = 1$, $P(0) \neq 0$ et donc la multiplicité de 0 dans PQ' est $m - 1$. D'autre part la multiplicité de 0 dans $P'Q$ est supérieure à m. Donc la multiplicité de 0 dans $P'Q - PQ'$ est $m - 1$.

Finalement d'après la relation $(*)$, $1 + m - 1 = 2m$ c'est à dire $m = 0$.

Ceci est absurde donc il n'existe pas de fraction rationnelle dont la dérivée vaut $\frac{1}{X}$.

Cette solution a pour mérite de s'adapter à toutes les fractions rationnelles qui possèdent un pôle simple ! Il suffit d'étudier la multiplicité de ce pôle (au lieu de 0 ici).

XIII.4.34 Une fraction rationnelle

[Enoncé]

XIII.4.35 Dérivé d'un polynôme scindé sur $\mathbb{R}$ ★★★

[Enoncé]

1. Notons $x_1 < \cdots < x_r$ les racines distinctes de P. Soit $i \in [\![1; r-1]\!]$. On sait que x_i est racine de P' de multiplicité $m_i - 1$ (en considérant que x_i n'est pas racine de P' si $m_i - 1 = 0$).
   De plus $x_i < x_{i+1}$, $P(x_i) = 0 = P(x_{i+1})$ et $x \mapsto P(x)$ est continue sur $[x_i, x_{i+1}]$ et dérivable sur $]x_i, x_{i+1}[$. Donc d'après le théorème de Rolle, $\exists y_i \in]x_i, x_{i+1}[$, $P'(y_i) = 0$. De par la définition des y_i on a $y_1 < \cdots < y_{r-1}$.
   On a donc trouvé $r - 1 + \sum_{i=1}^{r} (m_i - 1) = \deg(P) - 1$ racines de P', comptées avec multiplicité.
   Comme $1 \leq \deg(P') = \deg(P) - 1$, P' n'a pas d'autre racine. Elles sont donc bien toutes réelles.
2. On pose $f : t \mapsto P(t)e^{\alpha t}$.
   $\forall t \in \mathbb{R}$, $f'(t) = 0 \iff (P'(t) + \alpha P(t))e^{\alpha t} = 0 \iff P'(t) + \alpha P(t) = 0$.
   On fait la même preuve que pour la question 1 en appliquant Rolle à f entre deux racines consécutives de P.

XIII.4.36 Une condition nécessaire pour qu'un polynôme soit scindé sur $\mathbb{R}$ ★★★

[Enoncé]

1. On écrit $P = \Lambda \prod_{i=1}^{r} (X - x_i)^{m_i}$, où $S = \{x_i, i \in [\![1; r]\!]\}$ est l'ensemble des racines de P.
   On sait alors que $\frac{P'}{P} = \sum_{i=1}^{r} \frac{m_i}{X - x_i}$ et par dérivation, $\forall x \in \mathbb{R} \setminus S$, $\frac{P''(x)P(x) - (P'(x))^2}{(P(x))^2} = \sum_{i=1}^{r} -\frac{m_i}{(x - x_i)^2} \leq 0$.
   c'est à dire $\forall x \in \mathbb{R} \setminus S$, $P''(x)P(x) - (P'(x))^2 \leq 0$.
   L'inégalité est trivialement vérifiée sur S.
2. **Première méthode : théorème de Rolle**
   Initialisation :

Quitte à réindicer on peut supposer $x_1 < \cdots < x_r$. Soit $i \in [\![1; r-1]\!]$. On sait que x_i est racine de P' de multiplicité $m_i - 1$ (en considérant que x_i n'est pas racine de P' si $m_i - 1 = 0$).
De plus $x_i < x_{i+1}, P(x_i) = 0 = P(x_{i+1})$ et $x \mapsto P(x)$ est continue sur $[x_i, x_{i+1}]$ et dérivable sur $]x_i, x_{i+1}[$ donc d'après le théorème de Rolle, $\exists y_i \in]x_i, x_{i+1}[,\ P'(y_i) = 0$. De par la définition des y_i on a $y_1 < \cdots < y_{r-1}$.
On a donc trouvé $r - 1 + \sum_{i=1}^{r} (m_i - 1) = \deg(P) - 1$ racines de P', comptées avec multiplicité.
Comme $\deg(P') \leq \deg(P) - 1$, P' n'a pas d'autre racine. Elles sont donc bien toutes réelles.
Hérédité :
Soit $k \in [\![1; n-2]\!]$ tel que $P^{(k)}$ n'ai que des racines réelles. En appliquant le résultat précédant à $P^{(k)}$ on obtient directement le résultat voulu.
Conclusion : Pour tout $k \in [\![1; n-1]\!]$, $P^{(k)}$ est à racines réelles.

Deuxième méthode : théorème de Gauss-Lucas
l'exercice XIII.4.26 montre que si P est à racines réelles alors P' l'est aussi. Une récurrence similaire à celle de l'autre méthode permet de conclure.

3. On applique le résultat de la question 1 à $P, P', \ldots, P^{(n-1)}$:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall k \in [\![1; n-1]\!],\ P^{(k+1)}(x)P^{(k-1)}(x) - (P^{(k)}(x))^2 \leq 0$$

En particulier d'après la formule de Taylor, pour $x = 0$:

$$\forall k \in [\![1; n-1]\!],\ (k+1)!\, a_{k+1} \cdot (k-1)!\, a_{k-1} \leq (k!)^2 a_k^2$$
$$\iff a_{k+1}a_{k-1}\frac{k+1}{k} \leq a_k^2$$

Enfin si $a_{k+1}a_{k-1} \leq 0$, l'inégalité est trivialement vérifiée,
et si $a_{k+1}a_{k-1} > 0$ alors $\frac{k+1}{k} \geq 1 \implies a_{k+1}a_{k-1} \leq a_{k+1}a_{k-1}\frac{k+1}{k} \leq a_k^2$.

XIII.4.37 Une condition nécessaire pour qu'un polynôme soit dissocié sur $\mathbb{R}$ ★★

[Enoncé]

1. Notons $x_1 < \cdots < x_r$ les racines distinctes de P. Soit $i \in [\![1; r-1]\!]$. On sait que x_i est racine de P' de multiplicité $m_i - 1$ (en considérant que x_i n'est pas racine de P' si $m_i - 1 = 0$).
De plus $x_i < x_{i+1},\ P(x_i) = 0 = P(x_{i+1})$ et $x \mapsto P(x)$ est continue sur $[x_i, x_{i+1}]$ et dérivable sur $]x_i, x_{i+1}[$. Donc d'après le théorème de Rolle, $\exists y_i \in]x_i, x_{i+1}[,\ P'(y_i) = 0$. De par la définition des y_i on a $y_1 < \cdots < y_{r-1}$.
On a donc trouvé $r - 1 + \sum_{i=1}^{r} (m_i - 1) = \deg(P) - 1$ racines de P', comptées avec multiplicité.
Comme $1 \leq \deg(P') = \deg(P) - 1$, P' n'a pas d'autre racine. Elles sont donc bien toutes réelles.
2. On remarque que $\forall k \in [\![0; n-1]\!],\ a_k^2 + a_{k+1}^2 > 0 \iff (a_k \neq 0 \text{ ou } a_{k+1} \neq 0)$.
Par la formule de Taylor $\forall k \in [\![0; n]\!],\ a_k = \frac{P^{(k)}(0)}{k!}$. Donc si il existe $k \in [\![0; n-1]\!]$ tel que $a_k = a_{k+1}$, alors $P^{(k)}(0) = P^{(k+1)}(0) = 0$. Autrement dit 0 est racine double de $P^{(k)}$.
Pourtant par une récurrence immédiate sur la question 1, P scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$ donne $P^{(k)}$ scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$ pour tout $k < \deg(P)$.

XIII.4.38 Suite de polynômes scindés sur $\mathbb{R}$ ★★★

[Enoncé]

Notons pour $n \in \mathbb{N},\ P_n = \prod_{k=1}^{d_n} (X - x_{n,k})$.

Alors $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall z \in \mathbb{C},\ |P_n(z)| = \prod_{k=1}^{d_n} |z - x_k| \geq \prod_{k=1}^{d_n} |\mathrm{Im}(z - x_k)| = \prod_{k=1}^{d_n} |\mathrm{Im}(z)| \geq \min(|\mathrm{Im}(z)|^n, |\mathrm{Im}(z)|)$.
Donc en passant à la limite, $\forall z \in \mathbb{C},\ |P(z)| \geq \min(|\mathrm{Im}(z)|^n, |\mathrm{Im}(z)|)$.
En particulier $\forall z \in \mathbb{C},\ P(z) = 0 \implies \mathrm{Im}(z) = 0$. Donc P est constant ou scindé sur $\mathbb{R}$. Or si $P = C$ est constant alors $z = i(1 + |C|)$ contredit l'inégalité.

XIII.4.39 Nombre de racines d'un polynôme réel ★★

[Enoncé]
Procédons par récurrence sur k.
Si P a exactement 1 coefficient non nul alors $P = aX^m$ pour un certain $a \in \mathbb{R}^*$ et un certain $m \in \mathbb{N}$. Il a au plus $1 = 2 \times 1 - 1$ racine.
Supposons maintenant le résultat vrai pour tous les polynômes ayant exactement $k-1$ coefficients non nuls.
Notons $P = X^m Q$ avec $Q(0) \neq 0$ et $m \in \mathbb{N}$. Il suffit de montrer que Q a au plus $2k-2$ racines réelles distinctes.
Q a exactement k coefficients non nuls. De plus son coefficient constant n'est pas nul donc Q' a exactement $k-1$ coefficients non nuls. Par l'hypothèse de récurrence Q' a donc au plus $2k-3$ racines réelles distinctes. En particulier Q' change au plus $2k-3$ fois de signe.
Or entre chaque racine réelle de Q, Q' change au moins une fois de signe. Donc Q a au plus autant de racines réelles distinctes que 1 + le nombre de changement de signe de Q', et donc au plus $2k-2$ racines réelles distinctes.
Cette majoration est optimale car le polynôme $P = X$ a une unique racine réelle et a un unique coefficient non nul.
Je ne sais pas si la majoration est optimale à k fixé.

XIII.4.40 Borne de Cauchy ★★

[Enoncé]
Soit z une racine de P. Si $|z| \leq 1$ il n'y a rien à faire, on suppose donc $|z| > 1$. Notons $M = \max_{0 \leq k \leq n-1} |a_k|$.
On a avec $|z| \neq 1$, $|z^n| = \left| -\sum_{k=0}^{n-1} a_k z^k \right| \leq \sum_{k=0}^{n-1} |a_k| z^k \leq M \sum_{k=0}^{n-1} |z|^k = M \frac{|z|^n - 1}{|z| - 1}$.
Or comme $|z| > 1$, $\frac{|z|^n - 1}{|z| - 1} \leq \frac{|z|^n}{|z| - 1}$ donc $1 \leq \frac{M}{|z| - 1}$ càd $|z| \leq 1 + \max_{0 \leq k \leq n-1} |a_k|$.

XIII.4.41 Théorème d'Eneström-Kakeya ★★★

[Enoncé]

1. Soit $z \in \mathbb{C}$ une racine de P. $P(0) = a_0 \neq 0$ donc $z \neq 0$. On pose en suivant l'indication $Q(X) = (X-1)P(X)$.
   $Q(z) = 0 \implies 0 = a_n z^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} (a_{k-1} - a_k) z^k - a_0 \implies a_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{a_{k-1} - a_k}{z^{n+1-k}} + \frac{a_0}{z^{n+1}}$.
   D'où $a_n \leq \sum_{k=1}^{n} \frac{a_k - a_{k-1}}{|z|^{n+1-k}} + \frac{a_0}{|z^{n+1}|}$. Si $|z| > 1$ alors $a_n < \sum_{k=1}^{n} (a_k - a_{k-1}) + a_0 = a_n$.
   Ceci est absurde donc $|z| \leq 1$.

2. On définit r et R comme dans l'énoncé. Montrons que $\tilde{P} = P(RX) = \sum_{k=0}^{n} a_k R^k X^k$ vérifie les hypothèses de la question 1. Notons pour $k \in [\![0; n]\!]$, $b_k = a_k R^k$ et fixons $k \in [\![0; n-1]\!]$.
   $b_{k+1} - b_k = R^k (a_{k+1} R - a_k) \geq R^k \left(a_{k+1} \frac{a_k}{a_{k+1}} - a_k \right) = 0$.
   Soit z une racine de P. Alors $\tilde{P}\left(\frac{z}{R}\right) = P(z) = 0$.
   Donc d'après la question 1, $\left|\frac{z}{R}\right| \leq 1$ càd $|z| \leq R$.
   Pour avoir la minoration on considère le polynôme réciproque de P, $Q = X^n P\left(\frac{1}{X}\right)$ (cf. **??**). On montre alors que $Q = \sum_{k=0}^{n} a_{n-k} X^k$ et que ses racines sont exactement les inverses des racines de P. Similairement à ce qu'on vient de faire que le polynôme $\tilde{Q} = Q\left(\frac{X}{r}\right)$ les hypothèses de la question 1 et donc ses racines sont de module au plus $\frac{1}{r}$. Ainsi les racines de P sont de module au moins r.

XIII.4.42 Perturbations de polynômes

[Enoncé]

XIII.4.43 Polynômes à coefficients dans $\{-1,0,1\}$

Polynômes scindés

[Enoncé]

Ensemble des racines (1)

[Enoncé]

Ensemble des racines (2)

[Enoncé]

XIII.4.44 Théorème de Bernstein ★★★★

[Enoncé]

1. Remarquons que 1 est racine de $P(\lambda X)-P(\lambda)$ donc Q_λ est un polynôme et de plus
$$Q_\lambda(1)=\lim_{z\to 1}\frac{P(\lambda z)-P(\lambda)}{z-1}=P(\lambda X)'(1)=\lambda P'(\lambda)$$
Les racines de X^n+1 sont les racines n-ième de -1, X^n+1 est donc scindé à racines simples. Par conséquent il existe des complexes $\alpha_{\lambda,1},\dots,\alpha_{\lambda,n}$ tels que $\dfrac{Q_\lambda(X)}{X^n+1}=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{\alpha_{\lambda,k}}{X-\zeta_k}$. On a $\alpha_{\lambda,k}=\lim\limits_{\zeta\to\zeta_k}\dfrac{(\zeta-\zeta_k)Q_\lambda(\zeta_k)}{\zeta^n+1}=\dfrac{Q_\lambda(\zeta_k)}{(X^n+1)'(\zeta_k)}=\dfrac{Q_\lambda(\zeta_k)}{n\zeta^{n-1}}=-\dfrac{\zeta_k(P(\lambda\zeta_k)-P(\lambda))}{n(\zeta_k-1)}$.
Ainsi $\dfrac{Q_\lambda(X)}{X^n+1}=\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{\zeta_k(P(\zeta_k\lambda)-P(\lambda))}{(\zeta_k-1)(\zeta_k-X)}$.
En particulier $\lambda P'(\lambda)=Q_\lambda(1)=\dfrac{2}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{\zeta_k P(\zeta_k\lambda)}{(\zeta_k-1)^2}-\frac{2}{n}P(\lambda)\sum_{k=1}^{n}\frac{\zeta_k}{(\zeta_k-1)^2}$.
2. On applique la question 2 à $P=X^n$:
$$n\lambda^n=\frac{2}{n}\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{\zeta_k(\zeta_k^n\lambda^n-\lambda^n)}{(\zeta_k-1)^2}\right)=-\frac{4}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{\zeta_k\lambda^n}{(\zeta_k-1)^2}$$
D'où en évaluant en $\lambda=1$:
$$\sum_{k=1}^{n}\frac{\zeta_k}{(\zeta_k-1)^2}=-\frac{n^2}{4}$$
En remplaçant dans le résultat de la question 2, comme $\mathbb{C}$ est infini on obtient l'égalité des polynômes :
$$XP'(X)=\frac{n}{2}P(X)+\frac{2}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{\zeta_k P(\zeta_k X)}{(\zeta_k-1)^2}$$
3. Soit $z\in\mathbb{U}$.
$|P'(z)|=|zP'(z)|\leq\dfrac{n}{2}|P(z)|+\dfrac{2}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{|P(\zeta_k z)|}{|\zeta_k-1|^2}\leq\left(\frac{n}{2}+\frac{2}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{|\zeta_k-1|^2}\right)\sup_{z\in\mathbb{U}}|P(z)|$.

Or $\forall k \in [\![1;n]\!],\ \zeta_k \in \mathbb{U} \implies \dfrac{\zeta_k}{(\zeta_k-1)^2} = \dfrac{1}{(1-\zeta_k^{-1})(\zeta_k-1)} = -\dfrac{1}{(\overline{\zeta_k}-1)(\zeta_k-1)} = -\dfrac{1}{|\zeta_k-1|^2}$.

Et finalement $\sup_{z\in\mathbb{U}}|P'(z)| \leq \left(\dfrac{n}{2}+\dfrac{2}{n}\cdot\dfrac{n^2}{4}\right)\sup_{z\in\mathbb{U}}|P(z)| = n\sup_{z\in\mathbb{U}}|P(z)|$.

XIII.4.45 Etude d'un polynôme défini implicitement

[Enoncé]

XIII.4.46 P'|P ★

[Enoncé]

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P'|P$. Tout d'abord si $P'=0$ alors $P'|P$ si et seulement si $P=0$. On suppose maintenant que ce n'est pas le cas. Notons $P = \prod_{i=1}^{n}(X-z_i)^{m_i}$ où m_i est la multiplicité de z_i en tant que racines de P. Alors pour tout $i \in [\![1;n]\!]$, la multiplicité de z_i en tant que racine de P' est m_i-1 (en considérant que z_i n'est pas racine si sa multiplicité est nulle).

On sait que P' n'a pas d'autre racine que celles de P donc $\deg(P') = \deg(P)-1 = \sum_{i=1}^{n}(m_i-1) = \sum_{i=1}^{n}m_i - n = \deg(P)-n$.

On en déduit que $n=1$: P n'a qu'une racine.

Réciproquement si il existe $\lambda \in \mathbb{C}$, $a \in \mathbb{C}^*$ et $n \in \mathbb{N}^*$ tels que $P = a(X-\lambda)^n$ alors $P' = an(X-\lambda)^{n-1}$ divise P.

Finalement, $P'|P \iff \exists (a,\lambda)\in\mathbb{C}^2,\ \exists n\in\mathbb{N}^*,\ P = a(X-\lambda)^n$.

XIII.4.47 Polynôme positif (1) ★★★

[Enoncé]

1. Il est clair que P et Q ont même degré et même coefficient dominant $\lambda \neq 0$. On a $P(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \lambda x^n$ donc comme P est positif, λx^n est positif au voisinage de $+\infty$ d'où $\lambda > 0$. De plus, si P était de degré impair alors $P(x) \underset{x\to-\infty}{\sim} \lambda x^n \implies \lim_{x\to-\infty} P(x) = -\infty$ ce qui est absurde. Donc P, et a fortiori Q, sont de degré pair. L'équivalent $Q(x) \underset{|x|\to+\infty}{\sim} \lambda x^n$ donne alors $\lim_{|x|\to+\infty} Q(x) = +\infty$.
2. D'après la question 1 il existe $R>0$ tel que $\forall x\in\mathbb{R},\ |x|>R \implies Q(x) \geq Q(0)$. Or Q est continue donc d'après le théorème des bornes atteintes Q admet un minimum m sur $[-R,R]$. Par définition $\forall x \in \mathbb{R}\backslash[-R,R],\ Q(x) \geq Q(0) \geq m$. Ainsi m est un minimum global de Q.
3. Il suffit de montrer $m \geq 0$. Notons x_0 tel que $Q(x_0) = m$. Alors $Q'(x_0) = 0$.
   Or $Q' = Q - P$ donc $Q(x_0) = Q'(x_0) + P(x_0) = P(x_0) \geq 0$.

XIII.4.48 Théorème de Pythagore polynomial ★★★

[Enoncé]

1. Notons $P = \Lambda\prod_{i=1}^{p}(X^2+a_iX+b_i)^{n_i}\prod_{j=1}^{q}(X-x_j)^{m_j}$ la décomposition de P en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.
   Tout d'abord, $P(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \Lambda x^{\deg(P)}$. Donc $\Lambda x^{\deg(P)}$ est du signe de $P(x)$ au voisinage de $+\infty$ c'est à dire $\Lambda \geq 0$.
   Ensuite, supposons qu'il existe $k \in [\![1;q]\!]$ tel que m_k est impair.
   En notant $Q = \dfrac{P}{(X-x_k)^{m_k}}$ on a $P(x) \underset{x\to x_k}{\sim} Q(x_k)(x-x_k)^{m_k}$. Or $x \mapsto Q(x_k)(x-x_k)^{m_k}$ change de signe en x_k. Ceci est absurde car $x \mapsto P(x)$ elle, ne change pas de signe. On en déduit que les racines réelles de P sont de multiplicités paires.
2. Chacun des polynômes $R_i = X^2+a_iX+b_i$ peut s'écrire $R_i = (X-\omega_i)(X-\overline{\omega_i})$ pour un certain $\omega_i \in \mathbb{C}$.
   Donc en posant $C = \sqrt{\Lambda}\prod_{j=1}^{q}(X-x_j)^{m_j/2}\prod_{i=1}^{p}(X-\omega_i)$ on a bien $P = C\overline{C}$ et $C \in \mathbb{C}[X]$.

3. $A = \mathrm{Re}(C)$ et $B = \mathrm{Im}(C)$ fonctionnent.

XIII.4.49 Polynômes à valeurs carrées

[Enoncé]

1. Soit $x > a$. Par récurrence :
   $n = 1$: $\Delta(f)(x) = f(x+1) - f(x)$. f est continue sur $[x, x+1]$, dérivable sur $]x, x+1[$ donc d'après le théorème de Rolle, $\exists y \in]x, x+1[,\ \Delta(f)(x) = f'(y)$. i.e $\exists \theta \in]0,1[,\ \Delta(f)(x) = f'(x+\theta)$.
   Supposons le résultat vrai pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$.
   $\Delta^{n+1}(f)(x) = \Delta(\Delta^n(f))(x) = f^{(n)}(x+\theta+1) - f^{(n)}(x+\theta)$.
   $f^{(n)}$ est continue sur $[x+\theta, x+\theta+1]$, dérivable sur $]x+\theta, x+\theta+1[$ donc d'après le théorème de Rolle, $\exists z \in]x+\theta, x+\theta+1[,\ \Delta^{n+1}(f)(x) = f^{(n+1)}(z)$. i.e $\exists \varphi \in]\theta, \theta+1[\subset [0, n+1],\ \Delta^{n+1}(f)(x) = f^{(n+1)}(x+\varphi)$.
2. Justifions déjà que P est strictement positif sur $]a, +\infty[$ pour a assez grand. Pour cela déterminons la limite de P en $+\infty$. Si la suite $(P(n))_{n\in\mathbb{N}}$ prend une infinité de fois la même valeur alors P est constant, et est égal à $P(0)$ par exemple qui est le carré d'un entier, et donc le carré du polynôme constant égal à cet entier. Sinon, comme la suite $(P(n))_{n\in\mathbb{N}}$ est à valeurs dans $\mathbb{N}$, elle ne peut pas être bornée (par principe des tiroirs) et tend donc vers $+\infty$. Ainsi $\lim\limits_{x\to+\infty} P(x) = +\infty$ et par suite $\exists a > 0,\ \forall x > a,\ P(x) > 0$.
   Alors par composition $f : x \mapsto \sqrt{P(x)} \in \mathcal{C}^\infty(]a, +\infty[)$. Donc d'après la question 1,

$$\forall x > a,\ \forall n \in \mathbb{N}^*,\ \exists \theta \in [0, n],\ \Delta^n(f)(x) = f^{(n)}(x+\theta)$$

   Pour l'instant j'ai tenté pas mal de trucs mais ça marche pas :[, affaire à suivre.

XIII.4.50 Polynômes réciproques ★★

[Enoncé]

1. $X^n P\left(\frac{1}{X}\right) = X^n \sum\limits_{k=0}^{n} a_k X^- k = \sum\limits_{k=0}^{n} a_k X^{n-k} = \sum\limits_{k=0}^{n} a_{n-k} X^k$. Donc P est un polynôme réciproque si et seulement si $\forall k \in [\![0; n]\!],\ a_k = a_{n-k}$.
2. Soient P, Q deux polynôme réciproques de degrés respectifs p et q. $R = PQ$ est de degré $r = p+q$ et $R(X) = P(X)Q(X) = X^p P\left(\frac{1}{X}\right) X^q Q\left(\frac{1}{X}\right) = X^r R\left(\frac{1}{X}\right)$. Donc $R = PQ$ est réciproque.
3. On note encore $p = \deg(P)$ et $q = \deg(Q)$. $F = \dfrac{P}{Q}$ est un polynôme de degré $f = p - q$ et $F(X) = \dfrac{P(X)}{Q(X)} = \dfrac{X^p P\left(\frac{1}{X}\right)}{X^q Q\left(\frac{1}{X}\right)} = X^f F\left(\frac{1}{X}\right)$. Donc $F = \dfrac{P}{Q}$ est réciproque.
4. (a) On sait que $P(0) = a_0 = a_n \neq 0$ en tant que coefficient dominant. De plus $P\left(\frac{1}{\alpha}\right) = \frac{1}{\alpha^n} P(\alpha) = 0$.
   (b) On dérive la relation :

$$P'(X) = nX^{n-1} P\left(\frac{1}{X}\right) - X^{n-2} P'\left(\frac{1}{X}\right)$$

   Donc en évaluant en 1 on obtient $P'(1) = -P'(1)$ d'où $P'(1) = 0$. Donc 1 est une racine de P de multiplicité supérieure ou égale à 2.
   (c) $P(-1) = (-1)^n P(-1) = -P(-1)$ donc $P(-1) = 0$.
   (d) On évalue la relation dérivée en -1 :

$$P'(-1) = n(-1)^{n-1} P(-1) + (-1)^{n-1} P'(-1) = -P'(-1)$$

   Donc $P'(-1) = 0$.

5. Soit $P = \sum_{k=0}^{2n} a_k X^k$ un polynôme réciproque de degré $2n$. D'après la question 1, si α est racine de P alors α^{-1} l'est aussi. Donc si $\alpha \neq \alpha^{-1}$, c'est à dire si $\alpha \notin \{-1,1\}$, $(X-\alpha)(X-\alpha^{-1}) = X^2 - (\alpha+\alpha^{-1})X + 1 | P$. Et si $\varepsilon \in \{-1,1\}$ est racine de P alors d'après les questions 4.b et 4.d, $(X-\varepsilon)^2 = X^2 - 2\varepsilon + 1 | P$. Dans tous les cas, $\exists b_1 \in \mathbb{C},\ X^2 + b_1 X + 1 | P$

   Supposons qu'il existe $p \in [\![1; n-1]\!]$ et $b_1, \dots, b_p \in \mathbb{C}$ tels que $Q = \prod_{r=1}^{p} (X^2 + b_r X + 1) | P$.

   On remarque que pour tout $r \in [\![1;p]\!]$, $X^2 + b_r X + 1$ est réciproque. Donc d'après la question 2, Q est réciproque. Puis d'après la question 3, $R = \dfrac{P}{Q}$ est réciproque, de degré pair (car P et Q le sont) et non constant ($\deg(Q) = 2p < 2n = \deg(P)$). Donc $\exists b_{p+1} \in \mathbb{C},\ X^2 + b_{p+1} X + 1 | R$. Ainsi, $\prod_{r=1}^{p+1} (X^2 + b_r X + 1) | P$.

   Par récurrence, $\exists b_1, \dots, b_n \in \mathbb{C},\ (X^2+b_1X+1)\dots(X^2+b_nX+1) | P$. Comme ces deux polynômes ont même degré, $P = a_{2n}(X^2 + b_1 X + 1)\dots(X^2 + b_n X + 1)$.

   Si $\deg(P) = 2n+1$ est impair alors d'après la question 4.c, $X+1 | P$. Mais alors $Q = \dfrac{P}{X+1}$ est réciproque d'après la question 3.

   Et donc on déduit de ce qui a été fait précédemment que P se factorise en $P = a_{2n}(X+1)(X^2+b_1X+1)\dots(X^2+b_nX+1)$.

XIII.4.51 Polynômes surjectifs ★★★★★

[Enoncé]

1. On a déjà $P(\mathbb{C}) \subset \mathbb{C}$. Fixons $a \in \mathbb{C}$.
   Si P n'est pas constant alors $Q = P - a$ n'est pas constant et d'après le théorème de d'Alembert-Gauss, Q s'annule sur $\mathbb{C}$. Il existe donc $z \in \mathbb{C}$ tel que $P(z) = a$ i.e $a \in P(\mathbb{C})$. Donc $P(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$. De plus si P est constant alors $P(\mathbb{C}) \neq \mathbb{C}$. Les polynômes recherchés sont les polynômes non constants.

2. Posons pour $Q = \sum_{k=0}^{+\infty} q_k X^k \in \mathbb{C}[X]$, $\overline{Q} = \sum_{k=0}^{+\infty} \overline{q_k} X^k$.
   Supposons que $P(\mathbb{U}) = \mathbb{U}$. Tout d'abord, P n'est pas constant.
   Notons $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ avec $n = \deg(P)$.
   $\forall z \in \mathbb{U},\ \dfrac{1}{P(z)} = \overline{P(z)} = \overline{P}(\overline{z}) = \overline{P}\left(\dfrac{1}{z}\right)$.
   Donc $\forall z \in \mathbb{U},\ P(z)\overline{P}\left(\dfrac{1}{z}\right) = 1$.
   Donc $\forall z \in \mathbb{U},\ P(z) \cdot z^n \overline{P}\left(\dfrac{1}{z}\right) = z^n$.
   Or $X^n\overline{P}\left(\dfrac{1}{X}\right) = \overline{X^n P\left(\dfrac{1}{X}\right)} = \sum_{k=0}^{n} \overline{a_{n-k}} X^k$ est un polynôme. Donc comme $\mathbb{U}$ est infini on a l'égalité entre polynômes :
   $$P(X) \cdot X^n \overline{P}\left(\frac{1}{X}\right) = X^n$$
   Ainsi $P | X^n$. De plus $\deg(P) = n = \deg(X^n)$ donc $P(X) = a_n X^n$. Enfin, $1 = |P(1)| = |a_n|$ c'est à dire $a_n \in \mathbb{U}$.
   Réciproquement, si il existe $\alpha \in \mathbb{U}$ et $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $P(X) = \alpha X^n$ alors :
   $$\begin{cases} (\forall z \in \mathbb{U},\ |P(z)| = |\alpha||z|^n = 1) \implies P(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U} \\ \left(\forall z \in \mathbb{U},\ P\left(e^{i\frac{\arg(z) - \arg(\alpha)}{n}}\right) = z\right) \implies \mathbb{U} \subset P(\mathbb{U}) \end{cases}$$

3. Tout d'abord, si P est à coefficients réels alors $P(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}$. Si de plus P est de degré impair alors $\lim_{x\to+\infty} P(x) = \pm\infty = -\lim_{x\to-\infty} P(x)$. Donc comme $x \mapsto P(x)$ est continue sur $\mathbb{R}$, d'après le TVI $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

Réciproquement, supposons que $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$ vérifie $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. On note $\overline{P} = \sum_{k=0}^{+\infty} \overline{a_k} X^k$. $\forall x \in \mathbb{R},\ P(x) = \overline{P(x)} = \overline{P}(x)$. P et $\overline{P}$ coïncident sur une infinité de points, ils sont donc égaux.
Donc $\forall k \in \mathbb{N},\ \overline{a_k} = a_k$ i.e $\forall k \in \mathbb{N},\ a_k \in \mathbb{R}$ i.e $P \in \mathbb{R}[X]$.
De plus si P est de degré pair alors $\lim_{|x|\to+\infty} P(x) = \pm\infty$. Supposons que $\lim_{|x|\to+\infty} P(x) = +\infty$. Alors $\exists r \in \mathbb{R}^+,\ |x| > r \implies P(x) > P(0)$. De plus, $f_P : x \mapsto P(x)$ est continue sur $[-r, r]$ donc d'après le théorème des bornes atteintes f_P admet un minimum m sur $[-r, r]$. Par définition, $m \leq P(0)$. Ainsi, m est un minimum global de f_P et donc $m - 1$ par exemple n'est pas dans $P(\mathbb{R})$.
Similairement, si $\lim_{|x|\to+\infty} P(x) = -\infty$ alors f_P admet un maximum M sur $\mathbb{R}$ et donc $M + 1$ par exemple n'est pas dans $P(\mathbb{R})$. Ainsi P est de degré impair.
On conclut que $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ si et seulement si $P \in \mathbb{R}[X]$ et est de degré impair.

4. Supposons que $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$. Notons $d = \deg(P)$ et $(L_0, \dots, L_d)$ la base de Lagrange aux points $0, \dots, d$.
On sait que $P = \sum_{k=0}^{d} P(k) L_k$. Or pour tout $k \in [\![0; d]\!],\ P(k) \in \mathbb{Q}$ et $L_k = \prod_{\substack{0 \leq i \leq d \\ i \neq k}} \frac{X - i}{k - i} \in \mathbb{Q}[X]$. Donc $P \in \mathbb{Q}[X]$.

Si P est constant alors $P(\mathbb{Q}) \neq \mathbb{Q}$.
Si $d = 1$ alors on peut écrire $P(X) = aX + b$ avec $(a, b) \in \mathbb{Q}^* \times \mathbb{Q}$. Dans ce cas pour tout $c \in \mathbb{Q}$, l'équation $P(x) = c$ admet une (unique) solution $x = \frac{c - b}{a} \in \mathbb{Q}$.

Enfin si $d \geq 2$ on écrit $P = \sum_{k=0}^{d} \frac{a_k}{b_k} X^k$ avec $(a_k, b_k) \in \mathbb{Z}^2$ pour tout $k \in [\![0; d]\!]$. Posons $Q = \text{ppcm}(b_0, \dots, b_d) P$ et pour tout $k \in [\![0; d]\!],\ c_k = \text{ppcm}(b_0, \dots, b_d) \frac{a_k}{b_k}$ de sorte que $Q = \sum_{k=0}^{d} c_k X^k \in \mathbb{Z}[X]$ et $Q(\mathbb{Q}) = P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$. Soit p un nombre premier strictement supérieur à $|c_d|$. $\frac{1}{p} \in Q(\mathbb{Q})$ donc il existe a et b deux entiers premiers entre eux tels que $x = \frac{a}{b}$ vérifie $Q(x) = \frac{1}{p}$. On a alors

$$Q(x) = \frac{1}{p} = \sum_{k=0}^{d} c_k b^{-k} a^k$$

c'est à dire

$$b^d = p \sum_{k=0}^{d} c_k b^{d-k} a^k$$

Donc $p | b^d$, puis par le lemme d'Euclide, $p | b$. Ecrivons $b = p^\nu b'$ avec ν la valuation p-adique de b. On reprend :

$$\begin{aligned} & b^d = p \sum_{k=0}^{d} c_k b^{d-k} a^k \\ \iff & p^{\nu d - 1} (b')^d = \sum_{k=0}^{d} c_k (b')^{d-k} p^{\nu(d-k)} a^k \\ \implies & 0 \equiv c_d a^d [p] \qquad\qquad (\nu \geq 1, d \geq 2) \end{aligned}$$

Or a et b sont premiers entre eux donc $p | b \implies p \nmid a$ et donc d'après le lemme d'Euclide, $p | c_d$. Ceci est absurde car $p > |c_d|$.

Finalement on conclut que $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q} \iff \exists a, b \in \mathbb{Q}^* \times \mathbb{Q},\ P(X) = aX + b$.

5. Soit P un tel polynôme. Le raisonnement que l'on va utiliser fonctionne avec les seules hypothèses $P(\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}) \subset \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$ et P non constant (ce qui est évident avec l'inclusion réciproque).
Tout d'abord P est à valeurs réelles car $\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$ est infini (question 3).
Ensuite, montrons que P est à coefficients rationnels. On a vu dans la question précédente qu'il suffit que P soit à valeur rationnelle sur une partie infini de $\mathbb{Q}$. Supposons que ce n'est pas le cas. Alors il existe une partie finie

A de $\mathbb{Q}$ telle que $P(\mathbb{Q}\backslash A) \subset \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$. Par conséquent $P(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q} \cup P(A)$ d'où $\overset{\circ}{\overbrace{P(\mathbb{R})}} = \emptyset$ ce qui contredit le fait que P n'est pas constant.
Ainsi P est à coefficients rationnels. On en déduit alors $P(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}\backslash P(\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q})$ et par conséquent l'égalité :

$$P(\mathbb{Q}) \sqcup P(\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}) = P(\mathbb{R}) = (P(\mathbb{R}) \cap \mathbb{Q}) \sqcup (P(\mathbb{R}) \cap \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q})$$

Cela impose que les inclusions $P(\mathbb{Q}) \subset P(\mathbb{R}) \cap \mathbb{Q}$ et $P(\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}) \subset P(\mathbb{R}) \cap \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$ sont en fait des égalités.
Or $P(\mathbb{R})$ est un intervalle non borné (TVI + P non constant). Quitte à prendre $-P$ il n'est pas majoré et quitte à prendre $P - q$ pour $q \in \mathbb{Q}$ supérieur à l'inf de P sur $\mathbb{R}_+$, il contient $\mathbb{R}_+$ (ces opérations conserve l'hypothèse $P(\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}) = \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$. Enfin, quitte à multiplier P par le ppcm des dénominateurs de ses coefficients, $P \in \mathbb{Z}[X]$. Ainsi si p est un nombre premier, $\frac{1}{p} \in P(\mathbb{Q})$ et on en déduit comme dans la question précédente que si P est de degré au moins 2 alors $p|\lambda$ avec λ le coefficient dominant de P. Pour $p > |\lambda|$ ceci est absurde donc $\exists a, b \in \mathbb{Q},\ P(X) = aX + b$.
Ces polynômes sont bien solutions puisque pour $\alpha \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q},\ P(\alpha) \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$ et $P\left(\frac{\alpha - b}{a}\right) = \alpha$ avec $\frac{\alpha - b}{a} \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$.

6.

XIII.4.52 Résultant et discriminant ★★

[Enoncé]

1. On sait que $(1, X, \dots, X^{m-1})$ et $(1, X, \dots, X^{n-1})$ sont des bases de $\mathbb{K}_{m-1}[X]$ et $\mathbb{K}_{n-1}[X]$ respectivement. Ainsi d'après le cours, la famille $\mathcal{B} = ((1,0),(X,0),\dots,(X^{m-1},0),(0,1),(0,X),\dots,(0,X^{n-1}))$ est une base de l'espace vectoriel produit $\mathbb{K}_{m-1}[X] \times \mathbb{K}_{n-1}[X]$.
2. Soit $((U_1,V_1),(U_2,V_2),\lambda) \in (\mathbb{K}_{m-1}[X] \times \mathbb{K}_{n-1}[X])^2 \times \mathbb{K}$.
$\deg(\varphi(U_1,V_1)) \leq \max(\deg(PU_1),\deg(QV_1)) = n = m-1$ donc φ est bien une application.
$\varphi((U_1,V_1)+\lambda(U_2,V_2)) = P(U_1+\lambda U_2)+Q(V_1+\lambda V_2) = PU_1+QV_1+\lambda(PU_2+QV_2) = \varphi(U_1,V_1)+\lambda\varphi(U_2+V_2)$ donc φ est linéaire.
3. Soit $p \in [\![0; m-1]\!]$. Soit $l \in [\![0; n-1]\!]$.
$$\begin{cases} \varphi(X^p,0) = PX^p = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} a_k X^{k+p} \\ \varphi(0,X^l) = QX^l = \displaystyle\sum_{k=0}^{m} b_k X^{k+l} \end{cases}$$
Donc $\mathrm{Mat}_{B,B_c}(\varphi) = \mathrm{Syl}(P,Q)$.
4. Supposons d'abord que $P \wedge Q \neq 1$.Alors d'après l'identité de Bézout, $1 \notin \mathrm{Im}(\varphi)$ donc φ n'est pas surjective et donc n'est pas bijective. Supposons maintenant que $P \wedge Q = 1$. On remarque que $\dim(\mathbb{K}_{m-1}[X] \times \mathbb{K}_{n-1}[X]) = n+m = \dim(\mathbb{K}_{n+m-1})[X]$, il suffit donc de montrer au choix l'injectivité ou la surjectivité de φ. Soit $(U,V) \in \ker\varphi$.
On a $PU = -QV$ donc $Q|PU$. Or $P \wedge Q = 1$ donc d'après le lemme de Bézout, $Q|U$ et donc $n = \deg(Q) \leq \deg(U) \leq m-1$. De même, $P|V$ et donc $m \leq n-1$. Ainsi on a par exemple $n+1 \leq m \leq n-1$ ce qui impose $n = m = -\infty$. Ainsi $(U,V) = (0,0)$ et φ est injective, donc bijective.
Ainsi, $P \wedge Q = 1 \iff \det\varphi \neq 0 \iff \det \mathrm{Mat}_{B,B_c}(\varphi) = \mathrm{Res}(P,Q) \neq 0$.
5. $P = aX^2+bX+c,\ P' = 2aX+b$.
$$\mathrm{Res}(P,P') = \begin{vmatrix} c & b & 0 \\ b & 2a & b \\ a & 0 & 2a \end{vmatrix} = 4a^2c + ab^2 - 2ab^2 = 4ac^2 - ab^2$$
Donc $\Delta(P) = \frac{(-1)^{\frac{2(2-1)}{2}}}{a}\mathrm{Res}(P,Q) = -\frac{1}{a}\mathrm{Res}(P,Q) = b^2 - 4ac$. On retrouve le résultat bien connu.
6. P est scindé à racines simples si et seulement si toute racine de P n'est pas racine de P'. Or dans $\mathbb{C}$, les racines de $P \wedge P'$ sont les racines communes à P et P'. Ainsi P est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$ si et seulement si $P \wedge P'$ n'a pas de racine complexe. D'après le théorème de d'Alembert-Gauss cela équivaut à ce que $P \wedge P'$ soit constant puis, étant donné que $P \wedge P'$ est unitaire, à $P \wedge P' = 1$.
D'après ce qui a été fait précédemment on peut donc affirmer que P est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$ si et seulement si $\mathrm{Res}(P,P') \neq 0$.

Le résultant est un outil intéressant sur certains problèmes car il permet de mettre en évidence une sorte de "continuité" des racines d'un polynôme via le déterminant, qui est lui continu.

XIII.4.53 Théorème de Liouville : Fermat pour les polynômes ★★★★

[Enoncé]

1. Notons $D = P \wedge Q \wedge R$.
   $P^n + Q^n = R^n \implies \left(\frac{P}{D}\right)^n + \left(\frac{Q}{D}\right)^n = \left(\frac{R}{D}\right)^n$. Posons $(\tilde{P}, \tilde{Q}, \tilde{R}) = \left(\left(\frac{P}{D}\right)^n, \left(\frac{Q}{D}\right)^n, \left(\frac{R}{D}\right)^n\right)$ de sorte que $\tilde{P}, \tilde{Q}, \tilde{R}$ sont premiers entre eux dans leur ensemble. Soit S un facteur irréductible commun à $\tilde{P}$ et $\tilde{Q}$.
   $S|\tilde{P}^n + \tilde{Q}^n = \tilde{R}^n$ et comme S est irréductible, $S|\tilde{R}$. Donc S est constant d'où $\tilde{P} \wedge \tilde{Q} = 1$. De même, $\tilde{P} \wedge \tilde{R} = 1$ et $\tilde{Q} \wedge \tilde{R} = 1$.
2. On calcule :

$$\begin{aligned} & P^n + Q^n = R^n \\ \iff & \left(\frac{P}{Q}\right)^n + 1 = \left(\frac{R}{Q}\right)^n \\ \iff & \prod_{i=1}^{n} \left(\frac{P}{Q} - \zeta_i\right) = \left(\frac{R}{Q}\right)^n \\ \iff & \prod_{i=1}^{n} (P - \zeta_i Q) = R^n \end{aligned}$$

   Ainsi $\forall i \in [\![1; n]\!],\ T_i = P - \zeta_i Q | R^n$.
   Montrons que les T_i sont deux à deux premiers entre eux. On fixe $i, j \in [\![1; n]\!]$ avec $i \neq j$. Soit S un diviseur commun à T_i et T_j.
   $S|T_i - T_j = (\zeta_j - \zeta_i)Q$. Or les racines de $X^n + 1$ sont toutes distinctes donc $\zeta_j - \zeta_i \neq 0$ et on en déduit que $S|Q$.
   Mais alors $S|T_i + \zeta_i Q = P$. Donc S est constant c'est à dire $T_i \wedge T_j = 1$.
   Soit maintenant x une racine de T_i. En notant pour $\alpha \in \mathbb{C}$ et $A \in \mathbb{C}[X]$, $v_A(\alpha)$ la multiplicité de α en tant que racine de A ($v_A(\alpha) = 0$ si α n'est pas racine de A) on calcule :

$$n v_R(x) = v_{R^n}(x) = v_{\prod_{k=1}^{n} T_k}(x) = \sum_{k=1}^{n} v_{T_k}(x) = v_{T_i}(x)$$

   La dernière égalité étant vraie car $v_{T_j}(x) = 0$ car $T_i \wedge T_j = 1$.
   Ainsi la multiplicité de chaque racine de T_i est un multiple de n : $\exists H_i \in \mathbb{C}[X], T_i = H_i^n$.
3. Supposons que P, Q ou R n'est pas constant. Si R n'est pas constant alors P et Q ne peuvent pas l'être tous les deux à cause de la relation qui les définit. On a donc $\max(\deg(P)\deg(Q)) \geq 1$.
   On sait que $n \geq 3$ donc on peut au moins considérer T_1, T_2, T_3. Or par définition, ces polynômes sont dans $\mathrm{Vect}(P, Q)$ qui est de dimension inférieure strictement à 3. Donc la famille (T_1, T_2, T_3) est liée :

$$\exists (a, b, c) \in \mathbb{C}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\},\ aT_1 + bT_2 + cT_3 = 0$$

   posons α, β, γ des racines n-ième de $a, b, -c$ respectivement. Le triplet $(U, V, W) = (\alpha H_1, \beta H_2, \gamma H_3)$ vérifie :

$$\begin{cases} U^n + V^n = W^n \\ U \wedge V = U \wedge W = V \wedge W = 1 \\ \deg(U) \leq \deg(H_1) = \dfrac{\deg(T_1)}{n} < \deg(T_1) \leq \max(\deg(P), \deg(Q)) \\ \deg(V) < \max(\deg(P), \deg(Q)) \end{cases}$$

   L'ensemble $\{\max(\deg(P), \deg(Q)) \mid (P, Q, R) \in \mathbb{C}[X]^3, P \wedge Q = P \wedge R = Q \wedge R = 1, P^n + Q^n = R^n\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}^*$, elle admet donc un minimum. Considérons $(P_0, Q_0, R_0) \in \mathbb{C}[X]^3$ qui réalise ce minimum. D'après le raisonnement précédent on peut construire (U_0, V_0, W_0) qui contredit la minimalité de (P_0, Q_0, R_0). Ceci est absurde donc P, Q, R sont constants.

Finalement, si $(A,B,C) \in \mathbb{C}[X]^3$ tel que $A^n + B^n = C^n$ alors avec $D = A \wedge B \wedge C$: $\tilde{A} = \dfrac{A}{D}, \tilde{B} = \dfrac{B}{D}$ et $\tilde{C} = \dfrac{C}{D}$ sont constants d'où $A = \tilde{A}D, B = \tilde{B}D$ et $C = \tilde{C}D$ sont égaux à une constante multiplicative près.

XIII.5 Correction Espace vectoriel normé

XIII.5.1 Suite de Cauchy ★★

[Enoncé]
Soit $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ une suite convergente. On note $l = \lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.
Soit $\varepsilon > 0$.
$\exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\ ||u_n - l|| \leq \dfrac{\varepsilon}{2}$.
Alors, $\forall (p,q) \in [\![N; +\infty[\![,\ ||u_p - u_q|| = ||u_p - l + l - u_q|| \leq ||u_p - l|| + ||l - u_q|| \leq \varepsilon$.
Donc $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy.

Montrons que (u_n) est bornée, autrement dit que la suite $(||u_n||)_{n\in\mathbb{N}}$ ne tend pas vers $+\infty$.
Supposons par l'absurde que $\lim\limits_{n\to+\infty} ||u_n|| = +\infty$. Fixons $\varepsilon > 0$.
$\exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall p > q \geq n_0,\ ||u_p - u_q|| \leq \varepsilon$. Et $\exists n_1 \in \mathbb{N},\ \forall p \geq n_1,\ ||u_p|| > ||u_q|| + \varepsilon$.
Donc d'après la seconde inégalité triangulaire, $\forall p \geq N = \max(q, n_1),\ \varepsilon < |\ ||u_p|| - ||u_q||\ | \leq ||u_p - u_q|| \leq \varepsilon$.
Ceci est absurde donc (u_n) est bornée, disons par M.

$(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est alors à valeurs dans le compact $B_f(0, M)$ (fermé borné dans E qui est de dimension finie).
$(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admet donc une valeur d'adhérence l. On note $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $u_{\varphi(n)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} l$.
$\forall \varepsilon > 0,\ \exists n \in \mathbb{N},\ \forall k \geq n,\ ||u_{\varphi(n)} - u_n|| \leq \varepsilon$.
C'est-à-dire $u_{\varphi(n)} - u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.
Mais alors par somme, $u_n = u_n - u_{\varphi(n)} + u_{\varphi(n)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} l$.

XIII.5.2 Théorème de Fréchet-Von Neumann

[Enoncé]
D'après le cours, on sait que si $\|.\|$ est euclidienne alors elle vérifie l'identité du parallélogramme.
Supposons que $\|.\|$ vérifie l'identité du parallélogramme.
Montrons que

$$\varphi : \left\{ \begin{array}{ccc} E \times E & \longrightarrow & R \\ (x,y) & \longmapsto & \dfrac{1}{4}\left(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2\right) \end{array} \right.$$

est un produit scalaire. Il est clair que φ est symétrique et définie positive.
Montrons que φ est bilinéaire.
Soient $(x, y, z) \in E^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.
D'après l'identité du parallélogramme, on a : Soient $x, z, y \in V$. On calcule :

$$4\varphi(x+z, y) = \|x+z+y\|^2 - \|x+z-y\|^2.$$

D'après l'identité du parallélogramme appliquée à $(x+z, y)$, (x, y) et (z, y), on obtient après simplification

$$\|x+z+y\|^2 - \|x+z-y\|^2 = \left(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2\right) + \left(\|z+y\|^2 - \|z-y\|^2\right).$$

Ainsi,

$$\varphi(x+z, y) = \varphi(x, y) + \varphi(z, y).$$

Pour $n \in \mathbb{Z}$, l'additivité donne $\langle nx, y\rangle = n\langle x, y\rangle$. Si $m \in \mathbb{N}^*$, alors

$$\varphi(x, y) = \varphi(m \cdot \tfrac{1}{m}x, y) = m\varphi(\tfrac{1}{m}x, y) \quad \Rightarrow \quad \varphi(\tfrac{1}{m}x, y) = \tfrac{1}{m}\varphi(x, y).$$

On en déduit que l'homogénéité vaut pour tous les rationnels, puis, par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$ et par continuité de la norme, pour tout réel $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\varphi(\lambda x, y) = \lambda\varphi(x, y).$$

On a donc montré que φ est linéaire par rapport à sa première variable.
Donc φ est un produit scalaire de norme associée $\|.\|$. Donc $\|.\|$ est une norme euclidienne.

XIII.5.3 Une norme non euclidienne

[Enoncé]
Montrons dans un premier temps que N est une norme.

— Séparation
Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $N(P) = 0$.
Ainsi pour tout $k \in [\![0; n]\!]$, $|P(\alpha_k)| = 0$ donc $P(\alpha_k) = 0$.
Donc $P \in \mathbb{R}_n[X]$ admet au moins $n+1$ racines, ce qui implique que $P = 0$.

— Homogénéité
Soient $P \in \mathbb{R}_n[X]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$N(\lambda P) = \sum_{k=0}^{n} |\lambda P(\alpha_k)| = |\lambda| \sum_{k=0}^{n} |P(\alpha_k)| = |\lambda| N(P)$$

— Inégalité triangulaire
Elle découle directement de l'inégalité triangulaire de la valeur absolue sur R.

Montrons maintenant qu'elle n'est pas euclidienne. Alors N vérifie l'identité du parallélogramme V.2. Donc pour tout $P, Q \in \mathbb{R}_n[X]$, on a :

$$N(P+Q) + N(P-Q) = 2(N(P) + N(Q))$$

Par interpolation de Lagrange, il existe $P, Q \in \mathbb{R}_n[X]$ $P(\alpha k) = \delta_{k,0}$ et $Q(\alpha k) = \delta_{k,n}$ pour tout $k \in [\![0; n]\!]$. Ainsi, on a $N(P+Q) = N(P-Q) = 2$ et $N(P) = N(Q) = 1$. ce qui contredit l'identité du parallélogramme.

XIII.5.4 Norme invariante par similitude

[Enoncé]

1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $P \in \mathrm{Gl}_n(\mathbb{K})$.

$$\|AP\| = \left\|P^{-1}PAP\right\| = \|PA\|$$

Soit $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
Soit $(B_p)_{p\in\mathbb{N}}$ une suite de matrice inversible qui tend vers B.
On pose $\varphi_1 : M \mapsto \|AM\|$ et $\varphi_2 M \mapsto \|MA\|$.
Les deux fonctions sont continues et égale sur $\mathrm{Gl}_n(\mathbb{K})$ qui est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, par conséquent $\varphi_1 = \varphi_2$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. C'est-à-dire :

$$\|AB\| = \|BA\|$$

2. On pose $A = E_{1,1}$ et $B = E_{1,2}$.

$$AB = B \quad \text{et} \quad BA = 0$$

Ainsi, d'après ce qui précède, $\|B\| = 0$ ce qui absurde. Par conséquent, aucune norme matricielle est invariante par similitude.

XIII.5.5 Equivalence des normes dans un espace vectoriel normé de dimension finie

[Enoncé]

1. Séparation : Soit $x \in E$

$$N_0(x) = 0 \Leftrightarrow \forall i \in [\![1; n]\!], x_i = 0$$
$$\Leftrightarrow x = 0$$

Homogénéïté : Soient $x \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

$$N_0(\lambda x) = \sup_{i\in[\![1;n]\!]} |\lambda x_i| = |\lambda| \sup_{i\in[\![1;n]\!]} |x_i| = |\lambda| N_0(x)$$

Inégalité triangulaire : Soient $x, y \in E$.

$$\forall i \in [\![1; n]\!], |x_i + y_i| \leq |x_i| + |y_i| \leq N_0(x) + N_0(y)$$

Ainsi, on en déduit que :

$$N_0(x + y) \leq N_0(x) + N_0(y)$$

Ainsi, N_0 est une norme sur E.

2. Soit $x \in E$.

$$N(x) = N\left(\sum_{i=1}^{n} x_i e_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} |x_i| N(e_i) \leq \beta N_0(x)$$

où $\beta = \sum_{i=1}^{n} N(e_i)$

3. a. T est linéaire donc T est continue sur E car E est de dimension finie.

   b. On pose $S_\infty = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n, \|(x_1, \dots, x_n)\|_\infty = 1\}$.
   On remarque que $T(S_\infty) = S_{N_0}$.
   On sait que S_∞ est un compacte de $\mathbb{K}^n$ par conséquent, on en déduit que S_{N_0} est un compact de (E, N_0).

   c. Soit $x, y \in E$.

$$|N(x) - N(y)| \leq N(x - y) \leq \beta N_0(x - y)$$

   Ainsi N est β-lipschitzienne sur (E, N_0), par conséquent N est continue sur (E, N_0). Puisque S_{N_0} est un compacte de (E, N_0), on en déduit que N est admet un minimum sur S_{N_0} d'après le théorème des bornes atteintes.
   On pose $\alpha = \min_{x \in S_{N_0}} N(x)$. Soit $x \in E$. On a :

$$N\left(\frac{x}{N_0(x)}\right) \geq \alpha$$

   Par conséquent,

$$N(x) \geq \alpha N_0(x)$$

4. On a montré que toute norme sur E est équivalente à la norme N_0.
   Ainsi, par transitivité de l'équivalence, on en déduit que toutes les normes de E sont équivalentes.

XIII.5.6 Normes non équivalentes

[Enoncé]

On pose $E = \mathcal{C}^1([0, 1])$ et les deux normes sur E :

$$N_1(f) = \|f\|_\infty \quad \text{et} \quad N_2(f) = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$$

On pose la suite de fonctions

$$f_n : x \mapsto e^{nx}$$

On a

$$N_1(f_n) = 1 \quad \text{et} \quad N_2(f_n) = 1 + n$$

Par conséquent $\dfrac{N_1(f_n)}{N_2(f_n)} \to 0$. Ainsi, N_1 et N_2 ne sont par équivalentes.

XIII.5.7 Normes semblables à la norme uniforme sur $\mathbb{K}[X]$

[Enoncé]

Il est clair que N_A vérifie l'homogénéité et l'inégalité triangulaire, en revanche elle ne vérifie pas forcément la séparation.
Si A est un ensemble fini, il existe un polynôme qui s'annule en tous les points de A, mais pour autant qui ne soit pas nul (on pense à l'interpolation de Lagrange).
Alors, que si A est infini, cela signifie que pour un polynôme P tel que $N_A(P) = 0$, P s'annule une infinité de fois donc P est le polynôme nul.
Ainsi N_A est une norme si et seulement si A est infini.

XIII.5.8 Comparaisons de deux normes sur $\mathbb{K}_n[X]$

[Enoncé]

1. D'après le cours, $\|.\|_1$ est une norme sur $K_n[X]$.
   Montrons que $\|.\|$ est une norme.
   •Séparation :
   Soit $P \in \mathbb{K}_n[X]$ tel que $\|P\| = 0$.
   On a alors $\forall k \in [\![0;n]\!], |P(k)| = 0$ c'est-à-dire : $P(k) = 0$.
   Donc P est un polynôme qui admet au moins $n+1$ racines alors qu'il est de degré au plus n. Donc P est le polynôme nul.
   •Homogénéité :
   Soient $P \in \mathbb{K}_n[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

$$\|P\| = \sum_{i=0}^{n} |\lambda P(k)| = |\lambda| \sum_{i=0} |P(k)| = |\lambda| \, \|P\|$$

   •Inégalité triangulaire :
   Soient P et Q deux polynômes de $\mathbb{K}_n[X]$.

$$\|P+Q\| = \sum_{i=0}^{n} |p(k)+Q(k)| \leq \sum_{i=0}^{n} |P(k)| + \sum_{i=0}^{n} |Q(k)| = \|P\| + \|Q\|$$

   Donc $\|.\|$ est une norme.
2. Soit $P \in \mathbb{K}_n[X]$.

$$\begin{aligned}
\|P\|_1 &\leq \int_0^1 |P(t)|dt \\
&\leq \int_0^n |P(t)|dt && \text{car } |P| \text{ est positif} \\
&\leq \sum_{i=0}^{n} \lambda_i |P(k)| && \text{avec } \lambda_i = \int_a^b |L_i|(x)dx \quad \text{cf. IV.25} \\
&\leq C_n \|P\| && \text{où } C_n = \max \lambda_i, i \in [\![0;n]\!]
\end{aligned}$$

3. Puisque $\mathbb{R}_n[X]$ est de dimension finie, ces normes sont équivalentes.

XIII.5.9 Comparaisons de normes usuelles sur $\mathcal{C}^0([a,b], \mathbb{K})$

[Enoncé]

1. D'après le cours, $\|.\|_1$, $\|.\|_2$ et $\|.\|_\infty$ sont des normes.
   Il est toujours bon de le redémontrer pour bien maîtriser la définition de la norme.
2. $$\|f\|_1 \leq \int_a^b \|f\|_\infty dt = (b-a)\|f\|_\infty$$

$$\|f\|_2 \leq \sqrt{\int_a^b \|f\|_\infty^2} = \sqrt{b-a}\|f\|_\infty$$

   D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\|f\|_1 \leq \sqrt{\int_a^b dt}\|f\|_2 = \sqrt{b-a}\|f\|_2$$

3. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$ $f_n : x \mapsto (x-a)^n$.

$$\|f\|_\infty = (b-a)^n \quad \|f\|_1 = \frac{(b-a)^{n+1}}{n+1} \quad \text{et} \quad \|f\|_2 = \frac{\sqrt{b-a}(b-a)^n}{\sqrt{2n+1}}$$

On a :

$$\frac{\|f\|_1}{\|f\|_2} \to 0 \quad \frac{\|f\|_1}{\|f\|_\infty} \to 0 \quad \frac{\|f\|_2}{\|f\|_\infty} \to 0$$

Ainsi, on en déduit que aucune de ces normes n'est équivalentes à une norme.

XIII.5.10 Normes p

[Enoncé]

Inégalité de Hölder et Minkowski

1. Soit $u, v \in \mathbb{R}_+^*$.
On sait que ln est concave sur $]0, +\infty[$. Donc on en déduit que

$$\ln(uv) = \frac{1}{p}\ln(u^p) + \frac{1}{q}\ln(v^q) \leq \ln\left(\frac{u^p}{p} + \frac{v^q}{q}\right)$$

Ainsi par croissance de la fonction exponentielle, on en déduit que :

$$uv \leq \frac{u^p}{p} + \frac{v^q}{q}$$

2. On pose pour tout $k \in [\![1; n]\!]$, $x'_k = \frac{x_k}{\|x\|_p}$ et $y'_k = \frac{y_k}{\|y\|_q}$ D'après l'inégalité de Young, on a :

$$x'_k y'_k \leq \frac{x'^p_k}{p} + \frac{y'^q_k}{q}$$

Donc en sommant, on a :

$$\sum_{k=1}^n x'_k y'_k \leq \sum_{k=1}^n \frac{x'^p_k}{p} + \frac{y'^q_k}{q} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

On en déduit donc l'inégalité de Hölder :

$$\sum_{k=1}^n x_k y_k \leq \|x\|_p \|y\|_q$$

3.

$$\forall k \in [\![1; n]\!], (x_k + y_k)^p = x_k(x_k + y_k)^{p-1} + y_k(x_k + y_k)^{p-1}$$

Par sommation et d'après l'inégalité de Hölder :

$$\sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^p \leq \|x\|_p \left\|(x_k + y_k)^{p-1}\right\|_q + \|y\|_p \left\|(x_k + y_k)^{p-1}\right\|_q = (\|x\|_p + \|y\|_p)\left\|(x_k + y_k)^{p-1}\right\|_q$$

Or en remarquant que $q = \frac{p}{p-1}$:

$$\left\|(x_k + y_k)^{p-1}\right\|_q = \left(\sum_{i=1}^n (x_k + y_k)^p\right)^{\frac{p-1}{p}} = \|x + y\|_p^{p-1}$$

Ainsi, on en déduit que :

$$\|x + y\|_p^p \leq (\|x\|_p + \|y\|_p) \leq \|x + y\|_p^{p-1}$$

Finalement, puisque les x_k et y_k sont strictement positifs, on a $\|x + y\|_p \neq 0$ donc :

$$\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p$$

4. — Séparation : Soit $x \in \mathbb{K}^n$ tel que $\|x\|_p = 0$.
On a donc pour tout $\sum_{i=1}^n |x_i|^p = 0$ donc $\forall k \in [\![1;n]\!], x_k = 0$.
Donc $x = 0$.
— Homogénéïté : Soient $x \in \mathbb{K}^n$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

$$\|\lambda x\|_p^p = \sum_{k=1}^n |\lambda x_k|^p = |\lambda \sum_{k=1}^n |x_k|^p| = |\lambda| \|x\|_p$$

— Inégalité triangulaire : Il s'agit de l'inégalité de Minkowski démontré à la question 3.
Ainsi, $\|.\|_p$ est une norme sur K^n.

Equivalence des normes p et q

1. Première méthode :

$$\forall x \in \mathbb{K}^n, \|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}} \geq (\|x\|_\infty^p)^{\frac{1}{p}} = \|x\|_\infty$$

car $\|x\|_\infty$ est l'un des termes de cette somme à termes positifs. et

$$\|x\|_p \leq \left(\sum_{i=1}^n \|x\|_\infty^p\right)^{\frac{1}{p}} = n^{\frac{1}{p}} \|x\|_\infty$$

Donc $\|.\|_p$ et $\|.\|_\infty$ sont équivalentes sur $\mathbb{K}^n$.
Deuxième méthode :
$\mathbb{K}^n$ est un espace vectoriel vectoriel de dimension finie donc toutes les normes sur $\mathbb{K}^n$ sont équivalentes. En particulier, $\|.\|_p$ et $\|.\|_\infty$ sont équivalentes sur $\mathbb{K}^n$.

2. Il est clair que quand $x = 0$, l'inégalité est vérifiée. Soit $x \in \mathbb{K}^n$ non nul. On applique l'inégalité de Hölder aux n-uplets $(|x_1|^p, \dots, |x_n|^p)$ et $(1, \dots, 1)$ pour $r = \frac{q}{p} \geq 1$ et $s \in [1, \infty[$ tel que $\frac{1}{r} + \frac{1}{s} = 1$.

$$\sum_{i=1}^n |x_i|^p \leq \left(\sum_{i=1}^n (|x_i|^p)^r\right)^{\frac{1}{r}} \left(\sum_{i=1}^n 1^s\right)^{\frac{1}{s}}$$

c'est-à-dire :

$$\|x\|_p^p \leq n^{\frac{1}{s}} \|x\|_q^p$$

Or $s = \frac{q}{q-p}$:

$$\|x\|_q^p \leq n^{\frac{q-p}{q}} \|x\|_q^p$$

D'où :

$$\|x\|_p \leq n^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}} \|x\|_q$$

Par homothétie, on se ramène au cas $\|x\|_p = 1$.
On a donc pour tout $i \in [\![1;n]\!]$ $|x_i| \geq 1$
Donc $|x_i|^q \leq |x_i|^p$ pour tout $i \in [\![1;n]\!]$.
Par conséquent,

$$\|x\|_q \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^q\right)^{\frac{1}{q}} = \|x\|_p^{\frac{q}{p}} = 1$$

Ainsi, on en déduit le résultat pour tout $x \in \mathbb{K}^n$,

$$\|x\|_q \leq \|x\|_p$$

Norme infinie

On a montré précédemment dans la sous-section précédente que :

$$\forall p \geq 1, \forall x \in \mathbb{K}^n, \quad \|x\|_\infty \leq \|x\|_p \leq n^{\frac{1}{p}} \|x\|_\infty$$

On en déduit que $p \mapsto \|x\|_p$ admet pour limite $\|x\|_\infty$ quand $p \to +\infty$.

XIII.5.11 Normes de Sobolev

[Enoncé]

XIII.5.12 Norme duale

[Enoncé]

1. Soit $y \in E$.
   D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz,
   $$|\langle x, y\rangle| \leq \|x\| \, \|y\|$$
   Puisque E est de dimension finie, on en déduit que :
   $$\exists C \in \mathbb{R}_+^*, \|y\| \leq C N(y)$$
   donc
   $$|\langle x, y\rangle| \leq C \, \|x\| \, N(y) = C \, \|x\|$$
   Par conséquent, l'ensemble $\{|\langle x, y\rangle|, y \in S\}$ est majoré et non vide, ce qui implique que $N*(x)$ est bien définie.
2. Séparation : Soit $x \in E$ tel que $N^*(x) = 0$.
   $$N^*(x) = 0 \Leftrightarrow \forall y \in S, \langle x, y\rangle = 0 \Leftrightarrow x \in S^\perp \Leftrightarrow x = 0$$
   Homogénéïté : Soit $x \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.
   $$N^*(\lambda x) = \sup_{y \in S} |\langle \lambda x, y\rangle| = \sup_{y \in S} |\lambda| |\langle x, y\rangle| = |\lambda| N^*(x)$$
   Inégalité triangulaire : Soient $x_1, x_2, y \in E$.
   $$|\langle x_1 + x_2, y\rangle| \leq |\langle x_1, y\rangle| + |\langle x_2, y\rangle| \leq N^*(x_1) + N^*(x_2)$$
   On en déduit que :
   $$N^*(x_1 + x_2) \leq N^*(x_1) + N^*(x_2)$$
3. Soit $x \in E$.
   Supposons que $N = \|.\|_2$. Alors pour tout $y \in S$, d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz,
   $$|\langle x, y\rangle| \leq \|x\|_2 \|y\|_2 = \|x\|_2$$
   Par conséquent, $N^*(x) \leq \|x\|_2$. De plus,pour x non nul et $y = \frac{x}{\|x\|_2}$, on a :
   $$|\langle x, y\rangle| = \|x\|_2 \quad \text{donc} \quad N^*(x) \geq \|x\|_2$$
   Finalement, $N^* = \|.\|_2$.
   Maintenant prenons $N = \|.\|_1$. Pour tout $y \in S$,
   $$|\langle x, y\rangle| = \left|\sum_{k=1}^n x_k y_k\right| \leq \sum_{k=1}^n |x_k||y_k| \leq \|x\|_\infty \sum_{k=1}^n |y_k| = \|x\|_\infty \|y\|_1 = \|x\|_\infty$$
   Ainsi, $N^*(x) \leq \|x\|_\infty$.
   Il existe $j \in [\![1; n]\!]$ tel que $|x_j| = \|x\|_\infty$. On pose $y = (\delta_{k,j})$. On a alors
   $$|\langle x, y\rangle| = \|x\|_\infty$$
   On en déduit que $N^*(x) \geq \|x\|_\infty$. Et donc, $N^* = \|.\|_\infty$. Et enfin pour $N = \|.\|_\infty$.
   Pour tout $y \in S$,
   $$|\langle x, y\rangle| \leq \|x\|_1 \|y\|_\infty = \|x\|_1$$
   On a alors $N^*(x) \leq \|x\|_1$. On pose $y \in \mathbb{R}^n$ tel que $y_k = 1$ si $x_k \leq 0$ et $y_k = -1$ sinon. Il est évident que $y \in S$ et
   $$|\langle x, y\rangle| = \|x\|_1$$
   On en déduit que $N^*(x) \geq \|x\|_1$. Finalement $N^* = \|.\|_\infty$

XIII.5.13 Norme à partir d'une famille libre

[Enoncé]

On montre aisément que N vérifie l'homogénéité et l'inégalité triangulaire.
Montrons que N vérifie la séparation si et seulement si $(x_1, \dots, x_n)$ est libre.
Supposons que $(x_1, \dots, x_n) \in E$ est libre.
Ainsi, pour $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ tel que $N(\lambda) = 0$.
On a alors :

$$\sum_{k=1}^{n} \lambda_k x_k = 0$$

Donc $\lambda = 0$ car $(x_1, \dots, x_n) \in E$ est libre.
Réciproquement, supposons que N vérifie la séparation. Alors $\forall (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$,

$$\sum_{k=1}^{n} \lambda_k x_k = 0 \implies N(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \left\| \sum_{k=1}^{n} \lambda_k x_k \right\| = 0 \implies \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$$

Donc $(x_1, \dots, x_n)$ est libre.

XIII.5.14 Quelques normes matricielles

[Enoncé]

XIII.5.15 Norme d'algèbre ★★

[Enoncé]

1. L'application $b : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2 & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ (A, B) & \longmapsto & AB \end{cases}$ est bilinéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui est de dimension finie.
   Elle est donc continue i.e $\exists k > 0,\ \forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2,\ ||b(A, B)|| = ||AB|| \leq k||A|| \cdot ||B||$.
2. On vérifie aisément que $N := k|| \cdot ||$ est une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Et d'après la première question c'est une norme d'algèbre :
$$\forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2,\ N(AB) = k||AB|| \leq k^2||A|| \cdot ||B|| = N(A)N(B)$$

XIII.5.16 Caractérisation des sous-espaces de dimension finie de $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ ★★★

[Enoncé]

1. Soit $f \in E$.
$$\|f\|_2^2 = \int_0^1 f(t)^2 dt \leq \int_0^1 \|f\|_\infty^2 dt = \|f\|_\infty^2$$
   Ainsi pour $b = 1$, $\|f\|_2 \leq b\|f\|_\infty$ pour tout $f \in E$.
2. Puisque V est de dimension finie, les normes $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_2$ sont équivalentes sur V d'où l'inégalité voulue.
3. On munit V du produit scalaire $(f, g) \mapsto \displaystyle\int_0^1 f(t)g(t)dt$.
   Il suffit de montrer que montrer que toute famille libre de V a moins de n^2 éléments.
   On fixe une famille libre de V à p éléments. On lui applique le procédé de Gram-Schmidt pour obtenir une famille orthonormale $(f_i)_{i \in [\![1;p]\!]}$.
   Soit $x \in [0, 1]$. Pour tout $(a_i) \in \mathbb{R}^n$,
$$\left(\sum_{i=1}^{p} a_i f_i(x) \right)^2 \leq \left\| \sum_{i=1}^{p} a_i f_i \right\|_\infty^2 \leq n^2 \left\| \sum_{i=1}^{p} a_i f_i \right\|_2^2$$
   Or d'après le théorème de Pythagore,
$$\left\| \sum_{i=1}^{p} a_i f_i \right\|_2^2 = \sum_{i=1}^{p} a_i^2$$

Ainsi, en prenant $a_i = f_i(x)$ pour tout $i \in [\![1;p]\!]$, on a :

$$\left(\sum_{i=1}^{p} f_i(x)^2\right)^2 \leq n^2 \sum_{i=1}^{p} f_i(x)^2$$

et donc

$$\sum_{i=1}^{p} f_i(x)^2 \leq n^2$$

Par conséquent, en intégrant de 0 à 1, on obtient :

$$p = \sum_{i=1}^{p} \|f_i\|_2^2 \leq n^2$$

Ainsi V est de dimension finie et sa dimension est majorée par n^2.

XIII.5.17 Distance ★

[Enoncé]

1. — $\forall x, y \in E, \|x-y\| = |-1|\,\|y-x\| = \|y-x\|$
   — $\forall x, y \in E, \|x-y\| = 0 \iff x-y=0 \iff x=y$
   — $\forall x, y, z \in E, \|x-y\| = \|x-z+z-y\| \leq \|x-z\| + \|z-y\|$
   Donc d est une distance sur E.
2. D'après la première question $\varphi : (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto |x-y|$ est une distance sur $\mathbb{R}$.
   — La symétrie vient de la symétrie de la valeur absolue
   — La séparation vient du fait que $\arctan(x) = 0$ admet une unique solution qui est 0 et donc puisque φ est une distance, on a $x = y \iff \arctan|x-y| = 0$
   — Soient $x, y, z \in \mathbb{R}$.
   D'après l'inégalité triangulaire sur la valeur absolue, on a

   $$|x-y| \leq |x-z| + |z-y|$$

   Comme la fonction arctan est croissante sur $\mathbb{R}$, on a :

   $$\arctan|x-y| \leq \arctan\left(|x-z| + |z-y|\right)$$

   Montrons que pour tout $a, b \in \mathbb{R}_+$:

   $$\arctan(a+b) \leq \arctan(a) + \arctan(b)$$

   On fixe $a \in \mathbb{R}_+$.
   On pose $f : \begin{cases} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ b & \longmapsto & \arctan(a+b) - \arctan(a) - \arctan(b) \end{cases}$
   Cette fonction est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$ et :

   $$\forall b \in \mathbb{R}_+,\ f'(b) = \frac{1}{1+(a+b)^2} - \frac{1}{1+b^2} \leq 0$$

   Donc f est décroissante sur $\mathbb{R}_+$.
   En particulier, on a :

   $$\forall b \in \mathbb{R}_+, f(b) \leq f(0)$$

   i.e.

   $$\arctan(a+b) - \arctan(b) - \arctan(a) \leq 0$$

   D'où le résultat. Par conséquent, on a pour $a = |x-z|$ et $b = |z-y|$, on a :

   $$\arctan|x-y| \leq \arctan|x-z| + \arctan|z-y|$$

Donc d est bien une distance.
Supposons maintenant que d est induite d'une norme. On a alors pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ et pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y)$$

Or puisque $\mathrm{Im}(\arctan) = [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, le résultat ne peut être vérifié pour un λ grand (exemple : $\lambda = 100$). Donc cette distance n'est pas induite d'une norme.

XIII.5.18 Distance à une partie

[Enoncé]

XIII.5.19 Distance d'un élément à une partie (1)

[Enoncé]

XIII.5.20 Distance d'un élément à une partie (2)

[Enoncé]

1. On remarque que
$$M = \frac{M + M^\top}{2} + \frac{M - M^\top}{2}$$
et que $\dfrac{M + M^\top}{2} \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\dfrac{M - M^\top}{2} \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.
Donc $\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) + \mathcal{A}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
Et soit $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.
On a alors :
$$\begin{aligned} M^\top &= M \\ M^\top &= -M \end{aligned}$$
Donc $M{=}0$
Par conséquent, on a $\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. Soient $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.
$$\langle A, S \rangle = \mathrm{Tr}(A^\top S) = -\mathrm{Tr}(AS)$$
et
$$\langle S, A \rangle = \mathrm{Tr}(S^\top A) = \mathrm{Tr}(SA)$$
Donc $\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) = (\mathcal{A}_n(\mathbb{R}))^\perp$.
3. Puisque $\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) = (\mathcal{A}_n(\mathbb{R}))^\perp$, on a :
$$d(M, \mathcal{S}_n(\mathbb{R})) = \left\| M - \pi_{\mathcal{S}_n(\mathbb{R})(M)} \right\|$$
D'après la question 1, on a :
$\pi_{\mathcal{S}_n(\mathbb{R})(M)} = \frac{M+M^\top}{2}$ et $M - \pi_{\mathcal{S}_n(\mathbb{R})(M)} = \frac{1}{2}(M - M^T) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Ainsi :
$$d(M, \mathcal{S}_n(\mathbb{R}))^2 = \left\| \frac{M - M^\top}{2} \right\| = \mathrm{Tr} \begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix} = 12$$
Finalement, on a :
$$d(M, \mathcal{S}_n(\mathbb{R})) = 2\sqrt{3}$$

XIII.5.21 Passage par les matrices orthogonales

[Enoncé]

1. •Séparation :
Soit $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tel que $N(X) = 0$.
Donc $\forall A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}), \|AX\|_\infty = 0$.
En particulier, $\|I_n X\|_\infty = \|X\|_\infty = 0$.
Donc $X = 0$ car $\|.\|_\infty$ est une norme.
•Homogénéité :
Soient $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$N(\lambda X) = \max_{A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})} \|\lambda AX\|_\infty = \max_{A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})} |\lambda| \|AX\|_\infty = |\lambda| N(X)$$

•Inégalité triangulaire :
$\forall A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}), \forall X, Y \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$,

$$\|A(X+Y)\|_\infty \leq \|AX\|_\infty + \|AY\|_\infty \leq N(X) + N(Y)$$

D'où :

$$N(X+Y) \leq N(X) + N(Y)$$

2. Pour tous $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ et $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

$$N(AX) = \max_{B \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})} \|BAX\|_\infty = \max_{B \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})} \|BX\|_\infty = N(X)$$

car l'application $B \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \mapsto BA$ est bijective.

3. Soit $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. Si $X = 0$, il est clair que $N(X) = \|X\|_2$.
Sinon, pour $A \in \mathcal{O}(\mathbb{R})$,

$$\|AX\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \left| \sum_{j=1}^{n} a_{i,j} x_j \right|$$

Soit $i \in [\![1; n]\!]$. D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$\left| \sum_{j=1}^{n} a_{i,j} x_j \right| \leq \left(\sum_{j=1}^{n} a_{i,j}^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{j=1}^{n} x_j^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \|X\|_2$$

On en déduit que :

$$\|AX\|_\infty \leq \|X\|_2$$

. Puisque cela vaut pour tout les $A \in \mathcal{O}(\mathbb{R})$, on obtient, $N(X) \leq \|X\|_2$. Réciproquement, considérons la ligne $L = \dfrac{X^\top}{\|X\|_2}$ On peut compléter cette ligne unitaire en une base orthonormée de $\mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{R})$.
On pose $A \in \mathcal{O}(\mathbb{R})$ la matrice formée par cette base.
On a :

$$|(AX)_1| = \|X\|_2$$

et donc :

$$\|X\|_2 \leq \|AX\|_\infty \leq N(X)$$

Par double inégalité :

$$N(X) = \|X\|_2$$

XIII.5.22 Diamètre d'une partie bornée

[Enoncé]

1. Puisque A est bornée, il existe $M \in \mathbb{R}_+$ tel que pour tout $x \in A$, $N(x) \leq M$. D'après l'inégalité triangulaire pour tout $(x, y) \in A^2$
$$N(x-y) \leq N(x) + N(y) \leq 2M$$
Ainsi, l'ensemble $\{N(x-y), (x,y) \in A^2\}$ est majoré. Et puisque A est non vide, il l'est également, ce qui justifie l'existence de la borne supérieure.

2. Supposons que $A \subset B$.
Pour tout $x, y \in A$,
$$N(x-y) \leq \delta(B)$$
car x, y sont aussi des éléments de B.
Puisque $\delta(A)$ est le plus petit majorant, on en déduit bien que $\delta(A) \leq \delta(B)$.

3. Soient $x, y \in A \cup B$.
Si $x \in A$ et $y \in A$, $N(x-y) \leq \delta(A) \leq \delta(A) + \delta(B)$ car N est une fonction positive.
Idem, si $x \in B$ et $y \in B$.
Dernière possibilité, si x et y sont dans des ensembles différents, par symétrie des rôles de x et y on peut supposer que $x \in A$ et $y \in B$ puisque $A \cap B \neq \emptyset$, il existe $z \in A \cap B$.
$$N(x-y) \leq N(x-z) + N(z-y) \leq \delta(A) + \delta(B)$$
On a donc montrer que pour tout $x, y \in A \cup B$
$$N(x-y) \leq \delta(A) + \delta(B)$$
ainsi puisque $\delta(A \cup B)$ est le plus petit majorant de $\{N(x-y), x, y \in A \cup B\}$, on en déduit que
$$\delta(A \cup B) \leq \delta(A) + \delta(B)$$

4. D'après ce qui précède, si x et y sont dans le même ensemble, le résultat est vrai.
Supposons comme précédemment que $x \in A$ et $y \in B$.
Par caractérisation séquentielle de la borne inférieur, il existe $(a_n) \in A^{\mathbb{N}}$ et $(b_n) \in B^{\mathbb{N}}$ telles que
$$N(a_n - b_n) \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} d(A, B)$$
Soit $(x, y) \in A \cup B$ et soit $n \in \mathbb{N}$.
$$N(x-y) \leq N(x-a_n) + N(a_n - b_n) + N(b_n + y)$$
Puisque $x, a_n \in A$ et $y, b_n \in B$, on a :
$$N(x-y) \leq \delta(A) + N(a_n - b_n) + \delta(B)$$
Ainsi, par passage à la limite, on en déduit que :
$$N(x-y) \leq \delta(A) + \delta(B) + d(A, B)$$
Puisque $\delta(A \cup B)$ est le plus petit majorant de $\{N(x-y), x, y \in A \cup B\}$, on a montré que pour tous
$$\delta(A \cup B) \leq \delta(A) + \delta(B) + d(A, B)$$

XIII.5.23 Détermination d'une borne inférieure

[Enoncé]
Soit $f \in E$.
On pose $g = f' - f$.

On cherche à résoudre l'équation différentielle $y' - y = g$ sur $[0,1]$.
Après résolution, on a pour tout $x \in [0,1]$

$$f(x) = Ce^x + e^x \int_0^x g(t)e^{-t}dt$$

Or $f(0) = 0$ donc $C = 0$.
Par conséquent,

$$f(x) = e^x \int_0^x g(t)e^{-t}dt$$

De plus, puisque $f(1) = 1$, on a

$$\int_0^1 g(t)e^{-t}dt = e^{-1}$$

. Ainsi,

$$\int_0^1 |g(t)|dt \geq \int_0^1 g(t)e^{-t}dt = e^{-1}$$

Donc

$$\inf_{f\in E} \int_0^1 |f'(x) - f(x)|dx \geq e^{-1}$$

Montrons maintenant qu'il s'agit bien de l'infimum.
On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n : x \mapsto \frac{1}{e}\left(e^x - (1-x)^n\right)$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,1]$, $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout $x \in [0,1]$:

$$f_n'(x) = \frac{1}{e}\left(e^x - n(1-x)^{n-1}\right)$$

Et

$$\int_0^1 |f'(t) - f(t)|dt = \frac{1}{e}\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \longrightarrow \frac{1}{e}$$

Par conséquent, on a :

$$\inf_{f\in E} \int_0^1 |f'(x) - f(x)|dx = \frac{1}{e}$$

Remarque : on peut montrer que cette borne n'est pas atteinte.

XIII.5.24 Normes usuelles sur $\mathcal{C}^1([0,1],\mathbb{K})$

[Enoncé]

1. — Montrons que N_1 est une norme.
   •On a déjà que $0 \in E$ et $N_1(0) = 0$.
   Soit $f \in E$ tel que $N_1(f) = 0$.
   On a alors $\|f\|_1 = 0$ et $\|f\|_1 = 0$ car $N_1(f)$ est la somme de deux termes positifs.
   On a alors $f = 0$ car $\|f\|_1 = 0$.
   •L'homogénéité est plutôt clair.
   •L'inégalité triangulaire est clair aussi car $\|.\|_1$ est une norme.
   — Montrons que $\mathbb{N}_2$ est une norme.
   •Idem on a encore $N_2(0) = 0$. Soit $f \in E$ tel que $N_2(f) = 0$.
   On a $f(0) = 0$ et $\|f'\|_1 = 0$. Donc f' est nulle et $f(0) = 0$.
   Par conséquent f est constante (car f' est nulle) égale à 0 car $f(0) = 0$.
   •L'homogénéité et l'inégalité triangulaire est immédiate car $|.|$ et $\|.\|_1$ sont des normes.
   Ainsi, N_1 et N_2 sont des normes.
2. On sait que pour tout $x \in [0,1]$ on a :

$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t)dt$$

Ainsi, on a

$$|f(x)| \leq |f(0)| + \int_0^x |f'(t)|dt$$

Puisque $|f'(t)| \geq$ pour tout $t \in [0,1]$, on a

$$|f(x)| \leq |f(0)| + \int_0^1 |f'(t)|dt$$

Il suffit d'intégrer pour avoir

$$N_1(f) \leq N_2(f)$$

Comme précédemment, on a

$$f(0) = f(x) - \int_0^x f'(t)dt$$

Donc l'inégalité triangulaire de la valeur absolue donne

$$|f(0)| \leq |f(x)| + \int_0^x |f'(t)|dt \leq |f(x)| + \int_0^1 |f'(t)|dt$$

Donc en intégrant de 0 à 1, on a

$$|f(0)| \leq N_1(f)$$

Puisque $\|f\|_1 \geq 0$, on a $\|f'\|_1 \leq N_1(f)$.
Par conséquent,

$$N_2(f) \leq 2N_1(f)$$

Donc N_1 et N_2 sont équivalentes.

XIII.5.25 Intersection des boules unités subordonnées d'un espace vectoriel normé de dimension finie

[Enoncé]
On va montrer que $B = \{\lambda M, |\lambda| \leq 1\}$.
Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que $|\lambda| \leq 1$.
Par définition, pour tout $N \in \mathcal{N}, N(I_n) = 1$.
Ainsi,

$$N(\lambda I_n) = |\lambda|$$

Et puisque $|\lambda| \leq 1$, il s'ensuit que $N(\lambda I_n) \leq 1$ pour tout $N \in \mathcal{N}$.
Ceci prouve que $\{\lambda I_n, |\lambda| \leq 1\} \subset B$.
Réciproquement, soit $M \in B$. Montrons que M est une homothétie.
Raisonnons par l'absurde, supposons que M n'est pas une homothétie.
Alors, il existe $x \in \mathbb{C}^n$ non nul tel que la famille (x, Mx) est libre.
On complète cette famille en une base$\mathcal{B}$ de $\mathbb{C}^n$. On note $(e_i)_{i\in[\![1;n]\!]}$ les vecteurs de cette base de sorte que $e_1 = x$ et $e_2 = Mx$.
Pour tout $u = \sum_{i=1}^n a_i e_i \in \mathbb{C}^n$, on pose :

$$\|u\|_\alpha = |a_1| + \alpha|a_2| + \sum_{i=3}^n |a_i|$$

où $\alpha > 0$.
On vérifie que N_α est une norme sur $\mathbb{C}^n$.
On note N_α la norme subordonnée à $\|.\|_\alpha$. Par définition de la norme subordonnée :

$$N_\alpha(M) \geq \frac{\|Mx\|_\alpha}{\|x\|_\alpha}$$

Par définition de $\|.\|_\alpha$, on a $\|x\|_\alpha = 1$ et $\|Mx\|_\alpha = \alpha$. Ainsi,

$$N_\alpha(M) \geq \alpha$$

Ainsi, on choisissant $\alpha = 2$,

$$N_2(M) \geq 2 > 1$$

Ceci contredit que $N(M) \leq 1$ pour toute norme subordonnée de C^n.
Par conséquent, pour tout $x \in \mathbb{C}^n$, (x, Mx) sont liées et d'après (à chercher) dans le tome d'Algèbre, on en déduit que M est une homothétie. Son rapport vérifie a fortiori $|\lambda| < 1$. Ainsi, on a montré que :

$$B = \{\lambda I_n, |\lambda| < 1\}$$

XIII.5.26 Modes de convergence

[Enoncé]

1. a. Soit $(x_n) \in E^{\mathbb{N}}$ convergeant faiblement vers ℓ_1 et vers ℓ_2.
   C'est-à-dire pour tout $y \in E$:

   $$\lim_{n\to+\infty} \langle x_n - \ell_1, y\rangle = 0$$
   $$\lim_{n\to+\infty} \langle x_n - \ell_2, y\rangle = 0$$

   Par conséquent,

   $$\langle \ell_1 - \ell_2, y\rangle = 0$$

   On en déduit que $\ell_1 - \ell_2 \in E^\perp = \{0\}$, ie $\ell_1 = \ell_2$.

   b. Soit $(x_n) \in E^{\mathbb{N}}$ convergeant fortement vers un $x \in E$.
   Soit $y \in E$. D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

   $$|\langle x_n - x, y| \leq \|x_n - x\| \, \|y\|$$

   Ainsi puisque $\lim_{n\to+\infty} \|x_n - x\| = 0$, on en déduit que pour tout $y \in E$,

   $$\lim_{n\to+\infty} \langle x_n - x, y\rangle$$

   Par conséquent, la convergence forte implique la convergence faible.
2. Supposons que (x_n) converge fortement vers x. Alors d'après 1b., (x_n) converge faiblement vers x.
   D'après la seconde inégalité triangulaire :

   $$|\, \|x_n\| - \|x\| \,| \leq \|x_n - x\|$$

   on en déduit que

   $$\lim_{n\to+\infty} \|x_n\| = \|x\|$$

   Réciproquement, supposons que (x_n) converge faiblement vers x et que $\lim_{n\to+\infty} \|x_n\| = \|x\|$.

   $$\|x_n\|^2 = \|x_n - x + x\|^2 = \|x_n - x\|^2 + \|x\|^2 + 2\langle x_n - x, x\rangle$$

   ie

   $$\|x_n - x\|^2 = \|x_n\|^2 - \|x\|^2 - 2\langle x_n - x, x\rangle$$

   Ainsi d'après les hypothèses, on en déduit que

   $$\lim_{n\to+\infty} \|x_n - x\|^2 = 0$$

   d'où le résultat.
3. Supposons que E est de dimension finie d.
   On prend $(e_i)_{i\in[\![1;d]\!]}$ une base orthonormale de E.
   Soit $(x_n) \in E^{\mathbb{N}}$ convergent faiblement vers $x \in E$. Ainsi

   $$\|x_n - x\|^2 = \sum_{i=1}^{n} \langle x_n - x, e_i\rangle^2$$

   On en déduit donc que

   $$\lim_{n\to+\infty} \|x_n - x\|^2 = 0$$

   d'où le résultat.

4. Considérons $E = \ell^2(\mathbb{N})$. On munit cette espace de son produit scalaire canonique :

$$\langle u, v\rangle = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k v_k$$

On définit $(x_n) = (\delta_{n,k})_{k\in\mathbb{N}}$ Montrons que (x_n) convergence faiblement vers 0.
Soit $(y_n) \in E$.

$$\langle x_n, y\rangle = \sum_{k=0}^{+\infty} \delta_{n,k} y_k = y_n$$

Puisque $(y_n) \in E$, on sait que $\lim\limits_{n\to+\infty} y_n = 0$, ce qui prouve la convergence faible de la suite (x_n) vers 0. De plus,

$$\|x_n\|^2 = \sum_{k=0}^{+\infty} \delta_{n,k}^2 = 1 \neq 0$$

Ainsi, on n'a pas la convergence forte de la suite (x_n).

XIII.5.27 Moyenne des itérés et projection sur l'espace des invariants d'une application linéaire contractante

[Enoncé]

XIII.5.28 Matrice de projecteur

[Enoncé]
Puisque (A^n) est une suite converge vers L, (A^{2n}) converge également vers L.
De plus, par continuité de la fonction $M \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}) \mapsto M^2$, on en déduit que (A^{2n}) converge vers L^2.
Ainsi par unicité de la limite, $L^2 = L$, c'est-à-dire L est une matrice de projecteur.

XIII.5.29 Matrice de rotation

[Enoncé]
On commence par étudier la fonction

$$\varphi : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \longrightarrow & \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \\ z = x + iy & \longmapsto & \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix} \end{array} \right.$$

Montrons que φ est un morphisme de $\mathbb{R}$-algèbre.
On remarque que

$$\varphi(1 + 0i) = \begin{pmatrix} 1 & -0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

Soit $x_1, x_2, y_1, y_2, \lambda \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \varphi(x_1 + ix_2 + \lambda(x_2 + iy_2)) &= \varphi(x_1 + \lambda x_2 + i(y_1 + \lambda y_2)) \\ &= \begin{pmatrix} x_1 + \lambda x_2 & -(y_1 + \lambda y_2) \\ y_1 + \lambda y_2 & x_1 + \lambda x_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x_1 & -y_1 \\ y_1 & x_1 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} x_2 & -y_2 \\ y_2 & x_2 \end{pmatrix} \\ &= \varphi(x_1 + iy_1) + \lambda\varphi(x_2 + iy_2) \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}\varphi(x_1+ix_2)\varphi(x_2+iy_2) &= \begin{pmatrix} x_1 & -y_1 \\ x_1 & y_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_2 & -y_2 \\ y_2 & x_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x_1x_2-y_1y_2 & -y_2x_1-y_1x_2 \\ y_2x_1+y_1x_2 & x_1x_2-y_1y_2 \end{pmatrix} \\ &= \varphi(x_1x_2-y_1y_2+i(x_1y_2+x_2y_1)) \\ &= \varphi((x_1+iy_1)(x_2+iy_2))\end{aligned}$$

Par conséquent, φ est bien un morphisme d'algèbre. Ainsi, en posant $z_n = 1+\dfrac{a}{n}$, on a :

$$A_n^n = \varphi(z_n)^n = \varphi(z_n^n)$$

Et puisque φ est linéaire sur un espace de dimension finie, il s'en suit que φ est continue et que

$$\lim_{n\to+\infty} A_n^n = \varphi\left(\lim_{n\to+\infty} z_n^n\right)$$

Il nous reste donc à calculer $\lim\limits_{n\to+\infty} z_n^n$.

$$|z_n| = \sqrt{1+\frac{a^2}{n^2}} \quad \text{donc } |z_n|^n = \left(1+\frac{a^2}{n^2}\right)^{\frac{n}{2}} = \exp(\frac{n}{2}\ln\left(1+\frac{a^2}{n^2}\right)) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$$

et un argument de z_n est $\theta_n = \arctan\left(\frac{a}{n}\right)$, par conséquent un argument de z_n^n est $n\theta_n = n\arctan\left(\frac{a}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} a$.
Ainsi, $\lim\limits_{n\to\infty} z_n^n = 1e^{ia}$.
Par conséquent, on en déduit que :

$$\lim_{A_n^n} = \varphi\left(\lim_{n\to+\infty} z_n^n\right) = \varphi(e^{ia}) = \begin{pmatrix} \cos(a) & -\sin(a) \\ \sin(a) & \cos(a) \end{pmatrix}$$

XIII.5.30 Applications contractantes

[Enoncé]
Puisque f est k-lipschitzienne, on sait que pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$\|u_{n+1}-u_n\|\,\|f(u_n)-f(u_{n-1})\| \leq k\,\|u_n-u_{n-1}\|$$

On montre alors par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\|u_{n+1}-u_n\| \leq k^n\,\|u_1-u_0\|$$

Puisque $k \in]0,1[$, la série $\displaystyle\sum_{n\in\mathbb{N}} k^n\,\|u_1-u_0\|$ et donc $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_{n+1}-u_n$ converge. Puisque $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_{n+1}-u_n$ converge, on a que (u_n) converge.

XIII.5.31 Une série vectorielle

[Enoncé]

XIII.5.32 Polytopes réguliers d'un espace vectoriel euclidien

[Enoncé]

1. Soit H un hyperplan de E. Puisque $H \neq E$, il existe $b \in E$. Il suffit de faire le procédé de Gram-Schmidt pour obtenir le a tel que $H = (\text{Vect}(a))^\perp$.
2. Soit f_1, f_2, g_1, g_2 tels que $\|f_1\| = \|f_2\| = \|g_1\| = \|g_2\| = 1$ et que f_1, g_1, e et f_2, g_2, e sont des triangles équilatéraux.

XIII.6 Correction Suite et série de fonctions

XIII.6.1 Etude d'une suite de fonctions (1)

[Enoncé]

1. Soit $x \in [0,1]$.
   Pour $n = 0$, le résultat est immédiat.
   Supposons que pour un certain $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq P_n(x) \leq \sqrt{x}$.
   Alors $x - P_n(x)^2 \geq 0$ donc $P_{n+1} \geq P_n(x) \geq 0$ et
   $$\sqrt{x} - P_{n+1}(x) = (\sqrt{x} - P_n(x)) \left(1_{\frac{1}{2}}(\sqrt{x} + P_n(x))\right) \geq 0$$
   donc $P_{n+1} \leq \sqrt{x}$. Ainsi, on a montré par récurrence le résultat.
2. On reprend l'inégalité précédente, pour tout $n \in \mathbb{N}$:
   $$\sqrt{x} - P_{n+1}(x) = (\sqrt{x} - P_n(x)) \left(1_{\frac{1}{2}}(\sqrt{x} + P_n(x))\right) \leq (\sqrt{x} - P_n(x)) \left(1 - \frac{\sqrt{x}}{2}\right)$$
   On montre cette fois par récurrence que :
   $$0 \leq \sqrt{x} - P_n(x) \leq (\sqrt{x} - P_0(x)) \left(1 - \frac{\sqrt{x}}{2}\right)^n$$
3. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $g_n : t \mapsto t\left(1 - \frac{t}{2}\right)^n$. L'étude de fonction montre que g_n atteint son maximum en $\frac{2}{n+1}$.
   Ainsi :
   $$\forall x \in [0,1], \forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq \sqrt{x} - P_n(x) \leq g_n(x) \leq g\left(\frac{2}{n+1}\right) = \frac{2}{n+1}\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^n \leq \frac{2}{n+1}$$
   On en déduit que (P_n) converge uniformément sur $[0,1]$ vers la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$.

XIII.6.2 Etude d'une suite de fonctions (2)

[Enoncé]

1. On va montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$,
   $$g_n \text{ est bornée}$$
   Il est clair que g_0 est bornée. Supposons que pour un certain $n \in \mathbb{N}$, g_n est bornée.
   $$\forall x \in [0,1], |g_{n+1}(x)| \leq \int_0^x |g_n(1-t)|dt \leq \int_0^x \|g_n\|_\infty dt = x\|g_n\|_\infty \leq \|g_n\|_\infty$$
   Donc g_n est bornée pour tout $n \in \mathbb{N}$.
   Affinons le résultat, on a montré que pour tout $x \in [0,1]$ et $n \in \mathbb{N}, |g_{n+1}(x)| \leq x\|g_n\|_\infty$.
   Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$
   $$|g_{n+1}(x)| \leq \int_0^x |g_n(1-t)|dt \leq \int_0^x (1-t)\|g_{n-1}\|_\infty \int_0^1 (1-t)\|g_{n-1}\|_\infty dt = \frac{1}{2}\|g_{n-1}\|_\infty$$
   Ainsi,
   $$\|g_{n+1}\| \leq \frac{1}{2}\|g_{n-1}\|_\infty$$
2. A l'aide de la question précédente, on a $\begin{cases} \|g_{2n}\|_\infty \leq \frac{1}{2^n}\|g_0\|_\infty, \\ \|g_{2n+1}\|_\infty \leq \frac{1}{2^n}\|g_1\|_\infty \end{cases}$
   On pose $K = \max(\|g_0\|_\infty, \|g_1\|_\infty)$, pour avoir
   $$\forall n \in \mathbb{N}, \|g_n\|_\infty \leq \frac{K}{\sqrt{2^n}}$$

Comme la série $\sum \frac{1}{\sqrt{2}^n}$ est une série convergente, ainsi on en déduit que $\sum g_n$ converge normalement donc simplement sur $[0,1]$. La fonction G est bien définie sur $[0,1]$.
D'après le théorème fondamental de l'analyse , g_n est dérivable sur $[0,1]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $g_n'(x) = g_{n-1}(1-x)$.
Donc la série $\sum g_n'$ converge normalement donc uniformément sur $[0,1]$. On en déduit que G est dérivable et que

$$\forall x \in [0,1], G'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} g_n'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} g_{n-1}(1-x) = \sum_{n=0}^{\infty} g_n(1-x) = G(1-x)$$

Par conséquent, G' est dérivable sur $[0,1]$ et que

$$\forall x \in [0,1], G''(x) = -G'(1-x) = -G(x)$$

3. G est donc solution de l'équation différentielle, $y'' + y = 0$.
Donc il existe $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tel que $G = \alpha \cos + \beta \sin$.
Et de plus pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $g_n(0) = 0$ donc $G(0) = 1$, et $G'(1) = G(0) = 1$. On en déduit que $\alpha = 1$ et $\beta = \frac{1+\sin(1)}{\cos(1)}$.

XIII.6.3 Etude d'une suite de fonctions (3)

[Enoncé]
Soit $x \in \mathbb{R}$
Si $x \in \pi\mathbb{Z}$ alors $f_n(x) = 0$.
Si $x \notin \mathbb{Z}$ alors $|\cos(x)| < 1$ d'où par croissance comparées, on a $\lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x) = 0$.
Donc (f_n) converge simplement vers la fonction nulle.
Montrons que (f_n) ne converge pas uniformément sur $\mathbb{R}$ vers la fonction nulle.
Soit $n \in \mathbb{N}^*$

$$f_n\left(\frac{1}{n}\right) = n\cos\left(\frac{1}{n}\right)^n \sin\left(\frac{1}{n}\right)$$

On sait que :

$$\cos\left(\frac{1}{n}\right) = 1 - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{n^2}$$

Ainsi,

$$n\ln\left(\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{2n}$$

puis par continuité de l'exponentielle [2]

$$\exp\left(n\ln\left(\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right)\right) = 1$$

On sait également que

$$\sin\left(\frac{1}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n}$$

par conséquent, on a :

$$\lim_{n\to+\infty} f_n\left(\frac{1}{n}\right) = 1$$

Donc (f_n) ne converge pas absolument vers la fonction nulle.

XIII.6.4 Etude d'une suite de fonctions (4)

[Enoncé]

XIII.6.5 Etude d'une suite de fonctions 5

[Enoncé]

XIII.6.6 Etude d'une suite de fonctions 6

[Enoncé]

XIII.6.7 Etude d'une suite de fonctions 7

[Enoncé]

XIII.6.8 Développement de la cotangente (1)

[Enoncé]

1. Fixons $x \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Z}$.
   $f_n(x) = \frac{1}{x} + \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{x-k} + \frac{1}{x+k}\right) = \frac{1}{x} + \sum_{k=1}^{n}\frac{2x}{x^2-k^2}$.
   Or $\frac{2x}{x^2-k^2} \underset{k\to+\infty}{=} \mathcal{O}\left(\frac{1}{k^2}\right)$ donc $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ converge par comparaison à une série de Riemann.
   Ainsi $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement sur $\mathbb{R}\backslash\mathbb{Z}$ vers $f : x \mapsto \frac{1}{x} + \sum_{k=1}^{+\infty}\frac{2x}{x^2-k^2}$.

2. $\operatorname{cotan}(\pi x) = \frac{\cos(\pi x)}{\sin(\pi x)}$ est définie et continue sur $\mathbb{R}\backslash\mathbb{Z}$.
   En outre $\forall x \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Z},\ \operatorname{cotan}(\pi(x+1)) = \frac{\cos(\pi x+\pi)}{\sin(\pi x+\pi)} = \frac{-\cos(\pi x)}{-\sin(\pi x)} = \operatorname{cotan}(\pi x)$.
   On remarque ensuite que f est 1-périodique (c'est un changement d'indice). On peut donc se contenter de montrer que f est continue sur $]0,1[$ et que g est prolongeable par continuité en 0. Les f_n sont continues sur $]0,1[$, montrons qu'elles convergent uniformément vers f sur tout segment de $]0,1[$.
   Soit $x \in]0,1[$. On note $R_n(x) := f(x) - f_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty}\frac{2x}{x^2-k^2}$.
   $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ |R_n(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty}\frac{2}{k^2-x^2} \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty}\frac{2}{k(k-1)} = 2\sum_{k=n+1}^{+\infty}\left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}\right) = \frac{2}{n}$.
   Ainsi $\sup_{x\in]0,1[}|R_n(x)| \leq \frac{2}{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.
   Càd $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers f sur $]0,1[$. On en déduit que f est continue sur $]0,1[$.
   Enfin,

$$\begin{aligned}
\pi\operatorname{cotan}(\pi x) &= \frac{\pi\cos(\pi x)}{\sin(\pi x)} \\
&\underset{x\to0}{=} \frac{1}{x - \frac{\pi^2x^3}{6} + o(x^3)} \\
&\underset{x\to0}{=} \frac{1}{x}\cdot\frac{1}{1 - \frac{\pi^2x^2}{6} + o(x^2)} \\
&\underset{x\to0}{=} \frac{1}{x}\left(1 - \frac{\pi^2x^2}{6} + o\left(x^2\right)\right) \\
&\underset{x\to0}{=} \frac{1}{x} - \frac{\pi^2x}{6} + o(x)
\end{aligned}$$

   Donc $g(x) \underset{x\to0}{=} -\frac{\pi^2x}{6} + \sum_{k=1}^{+\infty}\frac{2x}{k^2-x^2} + o(x) \underset{x\to0}{=} o(1)$.
   Càd g est prolongeable par continuité en 0 en posant $g(0) = 0$. Par 1-périodicité, g est prolongeable par continuité sur $\mathbb{R}$ en posant $g(k) = 0$ pour tout entier k.

3. Soit $x \in]0,1[$.
$f_n\left(\frac{x}{2}\right) + f_n\left(\frac{x+1}{2}\right) = \sum_{k=-n}^{n} \frac{2}{x-2k} + \sum_{k=-n}^{n} \frac{2}{x+1-2k} = 2f_{2n}(x) + \frac{2}{x+1-2n}$.
Donc par passage à la limite :
$$f(x) = \frac{f\left(\frac{x}{2}\right) + f\left(\frac{x+1}{2}\right)}{2}$$
Ensuite,
$$\begin{aligned}
\operatorname{cotan}\left(\frac{\pi x}{2}\right) + \operatorname{cotan}\left(\frac{\pi(x+1)}{2}\right) &= \frac{\cos(\frac{\pi x}{2})\sin(\frac{\pi(x+1)}{2}) + \cos(\frac{\pi(x+1)}{2})\sin(\frac{\pi x}{2})}{\sin(\frac{\pi x}{2})\sin(\frac{\pi(x+1)}{2})} \\
&= \frac{\sin(\pi x + \frac{\pi}{2})}{\sin(\frac{\pi x}{2})\sin(\frac{\pi x}{2} + \frac{\pi}{2})} \\
&= \frac{\cos(\pi x)}{\sin(\frac{\pi x}{2})\cos(\frac{\pi x}{2})} \\
&= \frac{2\cos(\pi x)}{\sin(\pi x)} \\
&= 2\operatorname{cotan}(\pi x)
\end{aligned}$$
Donc $g(x) = \frac{g\left(\frac{x}{2}\right) + g\left(\frac{x+1}{2}\right)}{2}$.
Cette égalité reste vraie en 0 par continuité. Elle est donc vraie sur $\mathbb{R}$ par 1-périodicité.

4. g étant continue sur $[0,1]$, elle y est bornée et atteints ses bornes. Il existe donc $a \in [0,1]$ tel que $g(a) = \max_{x\in[0,1]} g(x)$.
On remarque alors que comme $\frac{a+1}{2} \in [0,1]$, $2g(a) = g\left(\frac{a}{2}\right) + g\left(\frac{a+1}{2}\right) \leq g\left(\frac{a}{2}\right) + g(a)$ i.e $g\left(\frac{a}{2}\right) \geq g(a)$. Comme $\frac{a}{2} \in [0,1]$, $g(a) = g\left(\frac{a}{2}\right)$. Par récurrence immédiate $\forall n \in \mathbb{N}$, $g(a) = g\left(\frac{a}{2^n}\right)$. Donc par continuité de g en 0, $g(a) = g(0) = 0$. D'où $g = 0$ sur $[0,1]$, puis sur $\mathbb{R}$ par 1-périodicité.

XIII.6.9 Etude d'une fonction définie par une série alternée (1)

[Enoncé]

XIII.6.10 Etude d'une fonction définie par une série alternée (2)

[Enoncé]

XIII.6.11 Convergence vers une dérivée

[Enoncé]
On sait que :
$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \underset{h\to 0}{\to} f'(x)$$
donc
$$\frac{f\left(x+\frac{1}{n}\right) - f(x)}{\frac{1}{n}} \underset{n\to+\infty}{\to} f'(x)$$
Donc (g_n) converge simplement vers f' sur $\mathbb{R}$.
D'après l'inégalité de Taylor Lagrange, on a :
$$\left|f\left(x+\frac{1}{n}\right) - f(x) - \frac{1}{n}f'(x)\right| \leq \frac{\|f''\|_\infty}{2n^2}$$
donc
$$|g_n(x) - f'(x)| \leq \frac{\|f''\|_\infty}{2n}$$

d'où

$$\|g_n - f'\|_\infty \leq \frac{\|f''\|_\infty}{2n} \to 0$$

Ainsi (g_n) converge uniformément vers f' sur $\mathbb{R}$.

XIII.6.12 Limite ponctuelle et uniforme d'une suite de fonctions

[Enoncé]

XIII.6.13 Limite d'une suite implicite ★★

[Enoncé]

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. P_n est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ en tant que somme de fonctions continues et strictement croissantes sur $\mathbb{R}$. De plus $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \lim P_n(x) = \pm\infty$. Donc par le théorème de la bijection $\exists!\, x_n \in \mathbb{R},\ P_n(x_n) = \alpha$.
2. Remarquons que comme P_n est impaire pour tout n, $P_n(-x_n) = -P_n(x_n) = -\alpha$. On peut donc supposer $\alpha \geq 0$ et donc $x_n \geq 0$:

$$-x_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ln\left(-\alpha + \sqrt{\alpha^2+1}\right) \implies x_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ln\left(\frac{1}{\sqrt{\alpha^2+1}-\alpha}\right) = \ln\left(\alpha + \sqrt{\alpha^2+1}\right)$$

Alors on a $P_{n+1}(x_{n+1}) = \alpha = P_n(x_n) \leq P_{n+1}(x_n)$ d'où par croissance de P_{n+1}, $x_{n+1} \leq x_n$.
$(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante et minorée (par 0) donc elle converge vers un réel x.
On sait par le cours sur les séries entières (ou l'inégalité de Taylor-Lagrange) que $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers sh sur $[-x_0, x_0]$. La suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est à valeurs dans ce segment et sh est une fonction continue sur ce segment. Alors d'après l'exercice VI.12 $P_n(x_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \text{sh}(x)$.

Remarque : on peut aussi appliquer les théorèmes de Dini mais ces résultats sont bien plus compliqués à démontrer.

On en déduit que $\text{sh}(x) = \alpha$, i.e $e^{2x} - 2\alpha e^x - 1 = 0$.
En posant $y = e^x$ il faut résoudre $y^2 - 2\alpha y - 1 = 0$.
Le discriminant de cette équation est $4\alpha^2 + 4 = 4(\alpha^2+1) > 0$, il y a donc deux solutions réelles qui sont $y = \dfrac{2\alpha \pm 2\sqrt{\alpha^2+1}}{2} = \alpha \pm \sqrt{\alpha^2+1}$.
Or $\sqrt{\alpha^2+1} > \alpha$ donc $\alpha - \sqrt{\alpha^2+1} < 0$.
Donc comme $y = e^x > 0$, $y = \alpha + \sqrt{\alpha^2+1}$ i.e $x = \ln\left(\alpha + \sqrt{\alpha^2+1}\right)$.

XIII.6.14 Convergence des suites de polynômes ★★★

[Enoncé]
On procède par implications circulaires, montrons que $(i) \implies (iii) \implies (ii) \implies (i)$.
$(i) \implies (iii)$:
Supposons que (P_n) converge dans $\mathbb{R}_d[X]$. $\mathbb{R}_d[X]$ étant de dimension finie, (P_n) converge au sens de n'importe quelle norme sur $\mathbb{R}_d[X]$. En particulier elle converge pour la norme $\|P\|_\infty = \sup\limits_{x\in[0,1]} |P(x)|$ (qui est bien une norme car $[0,1]$ est infini). Càd (P_n) converge uniformément sur $[0,1]$.

$(iii) \implies (ii)$:
C'est du cours.

$(ii) \implies (i)$:
Supposons que (P_n) converge simplement sur $[0,1]$ vers une fonction f (qui n'est a priori pas polynomiale).
On se donne $x_0, \dots, x_d$ $d+1$ points distincts de $[0,1]$ et on note $L_0, \dots, L_d$ la base de $\mathbb{R}_d[X]$ des polynômes de Lagrange associés. (P_n) converge dans $\mathbb{R}_d[X]$ ssi il y a convergence coordonnée par coordonnée dans cette base.
On conclut car $P_n = \sum\limits_{i=0}^{d} P_n(x_i)L_i \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \sum\limits_{i=0}^{d} f(x_i)L_i \in \mathbb{R}_d[X]$.

XIII.6.15 Un théorème de Weierstrass sur $\mathbb{R}$? ★★★

[Enoncé]
Soit (P_n) une suite de fonctions polynomiales qui converge uniformément vers f sur $\mathbb{R}$. Ecrivons la définition de cette convergence pour une distance $\varepsilon = 1$.
Il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$|P_n(x) - f(x)| \leq 1$$

Soit $n \geq N$ quelconque. Pour tout $x \in \mathbb{R}$

$$|P_n(x) - P_N(x)| = |P_n(x) - f(x) + f(x) - P_N(x)|$$

donc

$$|P_n(x) - P_N(x)| \leq |P_n(x) - f(x)| + |f(x) - P_N(x)| \leq 2$$

On pose $Q_n = P_n - P_N$.
Ce polynôme est constant car il est borné. En effet, si Q_n n'est pas constant, on aurait

$$\lim_{|x|\to+\infty} |Q_n(x)| = +\infty$$

Ainsi il existe $c_n \in \mathbb{R}$ tel que $\forall x \in \mathbb{R},\ P_n(x) = P_N(x) + c_n$.
Puisque P_n converge simplement vers f, on a que c_n converge vers un certain $\lambda \in \mathbb{R}$.
Par conséquent $f = P_N + \lambda$.
Donc f est une fonction polynomiale à coefficients dans $\mathbb{R}$.

XIII.6.16 Approximation paire

[Enoncé]

XIII.6.17 Approximation croissante

[Enoncé]

XIII.6.18 Interversion Série-Intégrale

[Enoncé]

XIII.6.19 Série de fonction matricielle

[Enoncé]

XIII.6.20 Fonction ζ de Riemann

[Enoncé]

XIII.6.21 Expression de suites sous forme de séries

[Enoncé]

XIII.6.22 Etude d'une série de fonctions

[Enoncé]

XIII.6.23 Théorème de Dini ★★★★

[Enoncé]

1. Soit $\varepsilon > 0$.
Tout d'abord, quel que soit $x \in [a,b]$, la suite $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante et converge vers $f(x)$ donc $\forall n \in \mathbb{N},\ f_n(x) \leq f(x)$.
Donc $\forall n \in \mathbb{N},\ f_n \leq f_{n+1} \leq f$.
1re méthode :
Fixons $x \in [a,b]$.
On pose $N \in \mathbb{N}^*$ tel que $\dfrac{b-a}{N} \leq \dfrac{\varepsilon}{3}$ et pour $k \in [\![0;N]\!]$, $x_k = a + \dfrac{k(b-a)}{N}$. $x_0, \dots, x_N$ forme une subdivision régulière de $[a,b]$ donc $\exists k \in [\![0;N]\!],\ |x_k - x| \leq |x_1 - x_0| = \dfrac{b-a}{N}$.
Ensuite, par convergence simple de la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$, on peut se donner $M \in \mathbb{N}$ tel que $|f(x_k) - f_M(x_k)| \leq \dfrac{\varepsilon}{3}$.
Enfin f et f_M sont continues sur un segment, d'après le théorème de Heine elles sont uniformément continues sur ce segment. On sait donc que $\exists \eta > 0,\ \forall (x,y) \in [a,b]^2,\ |x-y| \leq \eta \implies |f(x) - f(y)| \leq \dfrac{\varepsilon}{3}$ et $|f_M(x) - f_M(y)| \leq \dfrac{\varepsilon}{3}$.
Finalement par inégalité triangulaire,
$\forall n \geq M,\ 0 \leq f(x) - f_n(x) \leq f(x) - f_M(x) \leq |f(x) - f(x_k)| + |f(x_k) - f_M(x_k)| + |f_M(x_k) - f_M(x)| \leq \varepsilon$.
Ainsi par passage au sup, $\forall n \geq M,\ \|f - f_n\|_{\infty,[a,b]} \leq \varepsilon$ i.e $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers f sur $[a,b]$.

2nd méthode :
Posons pour tout $n \in \mathbb{N},\ F_n = \{x \in [a,b],\ f(x) - f_n(x) \geq \varepsilon\}$.
$\forall n \in \mathbb{N},\ F_{n+1} \subset F_n$. De plus les F_n sont des compacts de $\mathbb{R}$: en effet si $n \in \mathbb{N}$ et $(x_k) \in F_n^{\mathbb{N}}$ converge vers x alors $x \in [a,b]$ et $\forall k \in \mathbb{N},\ f(x_k) - f_n(x_k) \geq \varepsilon$. Donc par continuité de f et f_n, en passant à la limite $f(x) - f_n(x) \geq \varepsilon$ et $x \in F_n$. Par caractérisation séquentielle F_n est un fermé inclus dans le compact $[a,b]$, c'est donc un compact de $\mathbb{R}$.
On sait en vertu de la convergence simple de $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ que $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} F_n = \emptyset$. Donc par la contraposé du lemme des compacts emboîtés (cf. **??**), $\exists N \in \mathbb{N},\ F_N = \emptyset$.
Autrement dit, $\forall n \geq N,\ \forall x \in [a,b],\ 0 \leq f(x) - f_n(x) \leq f(x) - f_N(x) < \varepsilon$ ou encore, $\forall n \geq N,\ \|f - f_n\|_\infty < \varepsilon$.
Donc $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers f sur $[a,b]$.

2. Soit $\varepsilon > 0$.
Tout d'abord on peut remarquer que f est croissante comme limite simple de fonctions croissantes.
Fixons $x \in [a,b]$. Fixons $N \in \mathbb{N}^*$ tel que $\dfrac{f(b) - f(a)}{N} \leq \dfrac{\varepsilon}{4}$.
Comme f est continue d'après le TVI, $\forall k \in [\![0;N]\!],\ \exists x_k \in [a,b],\ f(x_k) = f(a) + k\dfrac{f(b) - f(a)}{N}$. De plus par croissance de f on a $x_0 \leq x_1 \leq \cdots \leq x_N$.
$f(x_0), \dots, f(x_N)$ forme une subdivision régulière de $[f(a), f(b)]$ donc il existe $k \in [\![0; N-1]\!]$ tel que $f(x) \in [f(x_k), f(x_{k+1})]$.
Alors $|f(x) - f(x_k)| \leq |f(x_{k+1}) - f(x_k)| = \dfrac{f(b) - f(a)}{N} \leq \dfrac{\varepsilon}{4}$.
Par convergence simple on sait qu'il existe $M \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq M$,
$|f(x_k) - f_n(x_k)| \leq \dfrac{\varepsilon}{4}$ et $|f_n(x_{k+1}) - f_n(x_k) - f(x_{k+1}) + f(x_k)| \leq \dfrac{\varepsilon}{4}$.
Donc par croissance des f_n et inégalité triangulaire, $\forall n \geq M$:

$$\begin{aligned}
|f(x) - f_n(x)| &\leq |f(x) - f(x_k)| + |f(x_k) - f_n(x_k)| + |f_n(x_k) - f_n(x)| \\
&\leq |f(x) - f(x_k)| + |f(x_k) - f_n(x_k)| + |f_n(x_{k+1}) - f_n(x_k)| \\
&\leq |f(x) - f(x_k)| + |f(x_k) - f_n(x_k)| + |f_n(x_{k+1}) - f_n(x_k) - f(x_{k+1}) + f(x_k)| + |f(x_{k+1}) - f(x_k)| \\
&\leq \varepsilon
\end{aligned}$$

Finalement, $\|f - f_n\|_\infty \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ et $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers f.

XIII.6.24 Suite de fonctions lipschitziennes ★★★

[Enoncé]

1. Soit $(x,y) \in [a,b]^2$.
   $\forall n \in \mathbb{N},\ |f_n(x) - f_n(y)| \leq L|x-y|$.
   Donc par passage à la limite à l'aide de la convergence simple $|f(x) - f(y)| \leq L|x-y|$.
   Ainsi f est L-lipschitzienne.

2. Soit $x \in [a,b]$. Fixons $\varepsilon > 0$ et $N \in \mathbb{N}^*$ tel que $\dfrac{b-a}{N} \leq \dfrac{\varepsilon}{4L}$. On pose pour $k \in [\![0;N]\!],\ x_k = a + \dfrac{k(b-a)}{N}$. $x_0, \dots, x_N$ forme une subdivision régulière de $[a,b]$ donc $\exists k \in [\![0;N]\!],\ |x_k - x| \leq |x_1 - x_0| = \dfrac{b-a}{N}$.
   On a alors par inégalité triangulaire $\forall n \in \mathbb{N}$,
   $|f(x) - f_n(x)| \leq |f(x) - f(x_k)| + |f(x_k) - f_n(x_k)| + |f_n(x_k) - f_n(x)| \leq L|x - x_k| + |f(x_k) - f_n(x_k)| + L|x_k - x| \leq |f(x_k) - f_n(x_k)| + \dfrac{\varepsilon}{2}$.
   De plus par convergence simple, $\exists M \in \mathbb{N},\ \forall n \geq M,\ |f(x_k) - f_n(x_k)| \leq \dfrac{\varepsilon}{2}$.
   Donc, $\forall n \geq M,\ |f(x) - f_n(x)| \leq \varepsilon$. Par passage à la borne sup, $\forall n \geq M,\ \|f - f_n\|_\infty \leq \varepsilon$.
   $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge donc uniformément vers f sur $[0,1]$.

XIII.6.25 Phénomène de Runge

[Enoncé]

XIII.6.26 Théorème de Weierstrass

[Enoncé]

1. a. Soit $f, g \in E$.
   $\forall x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}(f*g)(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t)g(t)dt \\ &= \int_{+\infty}^{-\infty} f(t)g(x-u)(-du) && \text{on pose } u = x-t \\ &= (g*f)(x)\end{aligned}$$

   Soient $f, g, h \in E$.
   $\forall x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}((f+g)*h)(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} (f+g)(x-t)h(t)dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[f(x-t)h(t) + g(x-t)h(t)\right] dt \\ &= (f*h)(x) + (g*h)(x)\end{aligned}$$

   b. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall \alpha > 0$

$$\begin{aligned}|f*\chi_n(x) - f(x)| &= \left|\int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t)\chi_n(t)dt - f(x)\right| \\ &= \left|\int_{-\infty}^{+\infty} \left(f(x-t) - f(x)\right)\chi_n(t)dt\right| \\ &\leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x-t) - f(x)|\,\chi_n(t)dt \\ &= \int_{|t|<\alpha} |f(x-t) - f(x)|\,\chi_n(t)dt + \int_{|t|\geq\alpha} |f(x-t) - f(x)|\,\chi_n(t)dt\end{aligned}$$

   D'après l'énoncé, f est continue sur un compact donc elle est uniformément continue d'après le théorème de Heine.

Ainsi $\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x, y \in \mathbb{R}, |x-y| < \alpha \implies |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2}$.
Par conséquent,

$$\int_{|t|<\alpha} |f(x-t) - f(x)| \chi_n(t) dt < \frac{\varepsilon}{2} \int_{|t|<\alpha} \chi_n(t) dt$$

d'où

$$\int_{|t|<\alpha} |f(x-t) - f(x)| \chi_n(t) dt < \frac{\varepsilon}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \chi_n(t) dt = \frac{\varepsilon}{2}$$

De plus, puisque f est continue à valeurs dans un compact, elle est bornée d'après le théorème des bornes atteintes, ainsi il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\int_{|t|\geq\alpha} |f(x-t) - f(x)| \chi_n(t) dt \leq 2M \int_{|t|\geq\alpha} \chi_n(t) dt$$

Puisque (χ_n) est une séquence de Dirac, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N$,

$$\int_{|t|\geq\alpha} \chi_n(t) dt \leq \frac{\varepsilon}{4M}$$

Par conséquent, pour tout $n \geq N$, on a :

$$|(f * \chi_n)(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} + 2M \frac{\varepsilon}{4M} = \varepsilon$$

Donc :

$$\|(f * \chi_n) - f\|_\infty \leq \varepsilon$$

Finalement, $(f * \chi_n)$ converge uniformément vers f sur $\mathbb{R}$.

2. (a) Il est clair que (p_n) est une suite de fonctions positives.
Par définition, on a

$$\int_{-\infty}^{+\infty} p_n(t) dt = 1$$

Soit $\alpha > 0$.
Si $\alpha \geq 1$, on a

$$\int_{|t|\geq\alpha} p_n(t) dt = 0$$

Si $\alpha < 1$, on a

$$a_n = 2\int_0^1 (1-t^2)^n dt \geq 2\int_0^1 t(1-t^2)^n dt = \frac{1}{n+1}$$

Ainsi,

$$\int_{|t|\geq\alpha} p_n(t) dt = \frac{2}{a_n} \int_\alpha 1(1-t^2)^n dt \leq \frac{(1-\alpha^2)^n}{a_n} \leq 2(n+1)(1-\alpha^2)^n$$

Par croissances comparées,

$$\lim_{n\to+\infty} \int_{|t|\geq\alpha} p_n(t) dt = 0$$

Donc, (p_n) est une séquence de Dirac.

(b) Soit $n \in \mathbb{N}$ et soit $x \in \mathbb{R}$.

$$(f * p_n)(x) = (p_n * f)(x) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} p_n(x-t) f(t) dt$$

Puisque p_n est polynomiale, on peut réécrire $p_n(x-t)$ comme étant de la forme $\sum_{i=0}^{+\infty} q_i(t) x^i$ avec $q_i(t)$ nulle pour i grand.
Ainsi,

$$(f * p_n)(x) = \sum_{i=0}^{+\infty} \left(\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} q_i(t) f(t) dt \right) x^i$$

(on peut bien intervertir somme et intégrale car la somme est finie.)
Par conséquent, $(f * p_n)$ est polynomiale.
On vient de montrer que $(f * p_n)$ est une suite de fonctions polynomiales qui converge uniformément vers f sur $\mathbb{R}$.

(c) Soit f une fonction continue sur un segment $I = [a, b]$ de $\mathbb{R}$.
On prolonge f sur $\mathbb{R}$ de telle sorte que en considérant $[c, d]$ tels que $[a, b] \subset [c, d]$ on puisse prolonger continûment f sur $[c, a]$ par une fonction affine telle que $f(c) = 0$ et idem sur $[b, d]$ telle que $f(d) = 0$ et que $f(x) = 0$ en dehors du segment $[c, d]$.
Ce prolongement de f appartient à E.
En procédant à un changement de variable affine, on se ramène à une fonction nulle en dehors de $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, donc la fonction f est alors limite uniforme de fonctions polynomiales sur $[c, d]$ d'après la question précédente, et en particulier sur $[a, b]$.

3. (a) Par linéarité, on a pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$

$$\int_0^1 f(t)P(t)dt = 0$$

D'après le théorème de Weierstrass, il existe (P_n) une suite de fonctions polynômiales telle que (P_n) converge uniformément vers f sur $[0, 1]$.
Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\int_0^1 f(t)P_n(t)dt = 0$$

Puisque la convergence est uniforme, on peut intervertir limite et intégrale donc

$$\int_0^1 f^2(t)dt = 0$$

Puisque f^2 est continue et positive sur $[0, 1]$, $f^2 \equiv 0$ et donc $f \equiv 0$.

(b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. La fonction $f_n : t \mapsto f(t)e^{-nt}$ est continue sur $\mathbb{R}_+$.

XIII.6.27 Théorème de Chudnovsky ★★★★

[Enoncé]

1. Soit $x \in \mathbb{R}$. Posons pour $n \in \mathbb{N}^*$, $x_n = \dfrac{\lfloor 2^n x \rfloor}{2^n}$. $(x_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est une suite à valeur dans $\mathcal{D}$.
De plus $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ x_n \leq x \leq x + \dfrac{1}{2^n}$. Donc $x_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} x$.
Ainsi $\mathcal{D}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

2. a. Soit $x \in]0, 1[$. La suite de terme général $\varphi_n(x)$ est une suite numérique qui vérifie, $\forall n \in \mathbb{N},\ \varphi_{n+1}(x) = \varphi(\varphi_n(x))$.
φ est continue sur $]0, 1[$ et une étude de φ montre que $\varphi(]0, 1[) =]0, 1[$ et que φ admet un unique point fixe sur $]0, 1[$ qui est $\dfrac{1}{2}$.
De plus, $\forall x \in]0, 1[,\ \varphi(x) - x = x(1 - 2x) \leq 0$.
Ainsi $(\varphi_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante. Elle est minorée donc d'après le théorème de la limite monotone elle converge vers une limite $\ell \in]0, 1[$.
De plus sa limite doit être un point fixe de φ donc $\ell = \dfrac{1}{2}$.
Ainsi $(\varphi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ CVS vers la fonction constante égale à $\dfrac{1}{2}$ sur $]0, 1[$ et donc sur $[a, b]$.

b. D'après l'étude de φ, $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \varphi_n([a, b]) \subset \left[\varphi_{n-1}(c), \dfrac{1}{2}\right]$ avec $c = \min(\varphi(a), \varphi(b))$.
Ainsi $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \forall x \in [a, b],\ \left|\varphi_n(x) - \dfrac{1}{2}\right| \leq \dfrac{1}{2} - \varphi_{n-1}(c)$.
Par conséquent $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \left\|\varphi_n - \dfrac{1}{2}\right\|_\infty \leq \dfrac{1}{2} - \varphi_{n-1}(c) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.
On conclut que $(\varphi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ CVU vers la fonction constante égale à $\dfrac{1}{2}$ sur $[a, b]$.

3. Soient $f, g \in \mathcal{Z}$. Notons $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(Q_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites de fonctions polynomiales qui convergent uniformément vers f et g respectivement.
D'une part, $\forall n \in \mathbb{N},\ \|f+g-(P_n+Q_n)\|_\infty \leq \|f-P_n\|_\infty + \|g-Q_n\|_\infty \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.
Donc $(P_n+Q_n)_{n\in\mathbb{N}}$, qui est une suite de fonctions polynomiales à coefficients entiers, converge uniformément vers $f+g$ d'où $f+g \in \mathcal{Z}$.
D'autre part, $\forall n \in \mathbb{N},\ \|fg-P_nQ_n\|_\infty \leq \|fg-P_ng\|_\infty + \|P_ng-P_nQ_n\|_\infty \leq \|g\|_\infty\|f-P_n\|_\infty + \|P_n\|_\infty\|g-Q_n\|_\infty$.
La suite $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge pour la norme uniforme, elle est donc bornée pour cette norme d'où $\|fg-P_nQ_n\|_\infty \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.
Ainsi $(P_nQ_n)_{n\in\mathbb{N}}$, qui est une suite de fonctions polynomiales à coefficients entiers, converge uniformément vers fg d'où $fg \in \mathcal{Z}$.

4. D'après la question 2, $x \mapsto \dfrac{1}{2} \in \mathcal{Z}$. De plus on remarque que toutes les fonctions f constantes égales à un entier sont dans $\mathcal{Z}$ (comme limite de la suite constante égale à f) Donc d'après la question 3, quel que soit $d \in \mathcal{D},\ x \mapsto d \in \mathcal{Z}$. De plus n'importe quelle fonction polynomiale g associée à un monôme est aussi dans $\mathcal{Z}$ (comme limite de la suite constante égale à g)
Ainsi pour $P : x \mapsto \sum_{k=0}^{p} a_k x^k$ une fonction polynomiale à coefficients réels on peut trouver d'après la question 1 des suites $(d_n^0), \dots, (d_n^p) \in \mathcal{D}^{\mathbb{N}}$ telles que $\forall k \in [\![0;p]\!],\ a_k = \lim\limits_{n\to+\infty} d_n^k$.
En posant pour $n \in \mathbb{N}$, $P_n : x \mapsto \sum_{k=0}^{p} d_n^k x^k$ on a alors $(P_n) \in \mathcal{Z}^{\mathbb{N}}$ et $\|P-P_n\|_\infty \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. On en déduit que $\mathcal{Z}$ contient l'ensemble des fonctions polynomiales à coefficients réels.
Fixons maintenant $f \in \mathcal{C}([a,b],\mathbb{R})$. D'après le théorème d'approximation de Weierstrass, il existe une suite $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de fonctions polynomiales à coefficients réels convergeant uniformément vers f. Finalement, $f \in \mathcal{Z}$.
Remarque : on aurait pu formuler la réponse à l'aide du théorème de la double limite.

5. Le choix de a et b est important ! En effet si le segment $[a,b]$ contient un entier alors on ne peut pas atteindre toutes les fonctions continues sur $[a,b]$:
si $k \in \mathbb{Z} \cap [a,b]$ et si $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite de fonctions polynomiales à coefficients entiers convergeant uniformément vers une fonction P alors $(P_n(k))_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite d'entier qui converge vers $P(k)$. $P(k)$ est donc un entier (cf. XIII.8.2).

   Le résultat actuel ne permet pas d'obtenir une fonction qui prendrait une valeur complexe car un polynôme à coefficients entiers est à valeurs réelles sur $[a,b]$.
   On peut cependant avoir un résultat analogue en considérant des polynômes à coefficients dans l'anneau des entiers de Gauss $\mathbb{Z}[i] = \{a+ib,\ (a,b) \in \mathbb{Z}^2\}$:
   Soit $h : [a,b] \to \mathbb{C}$. On note $h = f + ig$ avec f et g des fonctions réelles. On dispose de $(P_n), (Q_n) \in \mathbb{Z}[X]^{\mathbb{N}}$ qui convergent uniformément sur $[a,b]$ vers f et g respectivement. Alors $\|h-(P_n+iQ_n)\|_\infty \leq \|f-P_n\|_\infty + \|g-Q_n\|_\infty \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ avec $(P_n+iQ_n) \in (\mathbb{Z}[i])[X]^{\mathbb{N}}$.

XIII.6.28 Théorème de Korovkin ★★★★

[Enoncé]

1. On remarque que $\forall f, g \in E,\ f \leq g \implies u(f) \leq u(g)$.
   En effet, $g - f \geq 0 \implies u(g) - u(f) = u(g-f) \geq 0$.
   Ainsi $u(f) \leq u(|f|)$. Mais aussi $-u(f) = u(-f) \leq u(|f|)$.
   Ainsi $|u(f)| \leq u(|f|)$. On en déduit ensuite en notant $e_0 : x \in [0,1] \mapsto 1$ que $|u(f)| \leq u(e_0)\|f\|_\infty$, puis par suite $\|u(f)\|_\infty \leq \|u(e_0)\|_\infty \|f\|_\infty$.
   Ceci montre que u est continue et que sa norme est inférieure à $\|u(e_0)\|_\infty$.
   (De plus il y a égalité pour $f = e_0$ donc la norme de u est exactement $\|u(e_0)\|_\infty$.)

2. f est continue sur un compact donc d'après le théorème de Heine elle y est uniformément continue :

$$\exists \delta > 0,\ \forall (x,y) \in [0,1]^2,\ |x-y| \leq \delta \implies |f(x)-f(y)| \leq \varepsilon$$

De plus, si $|x-y|>\delta$ alors pour $c>\max\left(0,\dfrac{2\|f\|_\infty-\varepsilon}{\delta^2}\right)$ on a :

$$c>0 \text{ et } \varepsilon+c\delta^2>2\|f\|_\infty\geq|f(x)-f(y)|$$

Ainsi $\forall(x,y)\in[0,1]^2,\ |f(x)-f(y)|\leq\varepsilon+c(x-y)^2$.

3. Soit $f\in E$. Soient $\varepsilon>0$ et $x\in[0,1]$.
D'après la question précédente $\exists c>0,\ \forall y\in[0,1],\ |f(x)-f(y)|\leq\varepsilon+c(x^2-2xy+y^2)$.
Donc $|f(x)e_0-f|\leq\varepsilon e_0+cx^2e_0-2cxe_1+ce_2$.
Or $u_n(f)-f=u_n(f-f(x)e_0)+f(x)u_n(e_0)-f$.
Donc

$$\begin{aligned}|(u_n(f)-f)(x)|&\leq|u_n(f-f(x)e_0)(x)|+|f(x)(u_n(e_0)(x)-e_0(x))|\\&\leq u_n(|f-f(x)e_0|)(x)+\|f\|_\infty\|u_n(e_0)-e_0\|_\infty\\&\leq\varepsilon\|u_n(e_0)\|_\infty+c(x^2u_n(e_0)(x)-2xu_n(e_1)(x)+u_n(e_2)(x))+\|f\|_\infty\|u_n(e_0)-e_0\|_\infty\end{aligned}$$

Ceci étant vrai pour tout $x\in[0,1]$, $|u_n(f)-f|\leq\varepsilon\|u_n(e_0)\|_\infty+c(e_2u_n(e_0)-2e_1u_n(e_1)+u_n(e_2))+\|f\|_\infty\|u_n(e_0)-e_0\|_\infty$.
D'où $\|u_n(f)-f\|_\infty\leq\varepsilon\|u_n(e_0)\|_\infty+c\|e_2u_n(e_0)-2e_1u_n(e_1)+u_n(e_2)\|_\infty+\|f\|_\infty\|u_n(e_0)-e_0\|_\infty$.
Or $\lim\limits_{n\to+\infty}\|u_n(e_0)\|_\infty=\|e_0\|_\infty=1$, $\lim\limits_{n\to+\infty}\|e_2u_n(e_0)-2e_1u_n(e_1)+u_n(e_2)\|_\infty=\|e_2-2e_1^2+e_2\|_\infty=0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty}\|u_n(e_0)-e_0\|_\infty=0$.
Donc pour N assez grand, $\forall n\geq N,\ \|u_n(f)-f\|_\infty\leq\varepsilon(1-\varepsilon)+c\varepsilon+\|f\|_\infty\varepsilon\underset{\varepsilon\to0}{\longrightarrow}0$.
i.e $\|u_n(f)-f\|_\infty\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}0$.

4. Soit $f\in E$. On pose pour $n\in\mathbb{N}$, $B_n(f)=\sum\limits_{k=0}^{n}f\left(\dfrac{k}{n}\right)b_k^n$ avec $b_k^n:x\mapsto\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}$.
On va montrer que la suite de fonctions polynomiales $(B_n(f))_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers f sur $[0,1]$.
$(B_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est une suite d'opérateurs positifs.
Une approche qui facilite grandement les calculs est la modélisation probabiliste.
A x et n fixés, $(b_k^n(x))_{0\leq k\leq n}$ est la loi de probabilité d'une variable aléatoire $X_n(x)\sim\mathcal{B}(n,x)$.
Et alors on reconnaît par la formule de transfert l'identité $\mathbb{E}\left(f\left(\dfrac{X_n(x)}{n}\right)\right)=B_n(f)(x)$.
Ainsi $B_n(e_0)(x)=\mathbb{E}(1)=1=e_0(x)$, $B_n(e_1)(x)=\mathbb{E}\left(\dfrac{X_n(x)}{n}\right)=\dfrac{1}{n}\mathbb{E}(X_n(x))=x=e_1(x)$.
Et $B_n(e_2)(x)=\mathbb{E}\left(\dfrac{X_n(x)^2}{n^2}\right)=\dfrac{1}{n^2}\left(\mathbb{V}(X_n(x))+\mathbb{E}(X_n(x))^2\right)=\dfrac{1}{n^2}\left(nx(1-x)+(nx)^2\right)=x^2+\dfrac{x-x^2}{n}=e_2(x)+\dfrac{e_1(x)-e_2(x)}{n}$.
On en déduit que $B_n(e_0)=e_0$ et $B_n(e_1)=e_1$ converge uniformément vers e_0 et e_1 respectivement. Puis $\|B_n(e_2)-e_2\|_\infty=\left\|\dfrac{e_1-e_2}{n}\right\|_\infty\leq\dfrac{2}{n}\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}0$.
Ainsi d'après le théorème de Korovkin, $\forall f\in E,\ \|B_n(f)-f\|_\infty\longrightarrow0$.


XIII.6.29 Théorème de Fejér ★★★★★

[Enoncé]

1. On remarque que $\forall f,g\in E,\ f\leq g\implies u(f)\leq u(g)$.
En effet, $g-f\geq0\implies u(g)-u(f)=u(g-f)\geq0$.
Ainsi $u(f)\leq u(|f|)$. Mais aussi $-u(f)=u(-f)\leq u(|f|)$.
Ainsi $|u(f)|\leq u(|f|)$. On en déduit ensuite en notant $f_0:x\in\mathbb{R}\mapsto1$ que $|u(f)|\leq u(f_0)\|f\|_\infty$, puis par suite $\|u(f)\|_\infty\leq\|u(f_0)\|_\infty\|f\|_\infty$.
Ceci montre que u est continue et que sa norme est inférieure à $\|u(f_0)\|_\infty$.
(De plus il y a égalité pour $f=f_0$ donc la norme de u est exactement $\|u(f_0)\|_\infty$.)
2. f est continue sur le compact $[0,4\pi]$ donc d'après le théorème de Heine :

$$\exists\delta>0,\ \forall(x,y)\in[0,4\pi]^2,\ |x-y|\leq\delta\implies|f(x)-f(y)|\leq\varepsilon$$

Par 2π-périodicité il suffit de vérifier le résultat pour $x, y \in [0, 2\pi]$. Sans perte de généralité on suppose $x \leq y$.
Si $y - x < \delta$ alors la condition est automatiquement vérifiée.
Mais de plus si $x + 2\pi - y < \delta$ alors par 2π-périodicité on se ramène au cas précédent en remplaçant x par $x + 2\pi$.
Finalement si $y - x \geq \delta$ et $x + 2\pi - y \geq \delta$ i.e $\delta \leq y - x \leq 2\pi - \delta$ alors $\cos(x - y) \leq \cos(\delta) = \cos(2\pi - \delta)$.



càd $1-\cos(x-y) \geq 1-\cos(\delta)$. Donc $|f(x)-f(y)| \leq 2\|f\|_\infty \leq \varepsilon + c(1-\cos(x-y))$ pour $c > \max\left(0, \dfrac{2\|f\|_\infty - \varepsilon}{1-\cos(\delta)}\right) > 0$.

3. Soit $f \in \mathcal{C}_{2\pi}(\mathbb{R})$. Soient $\varepsilon > 0$ et $x \in \mathbb{R}$. D'après la question précédente,
$\exists c > 0,\ \forall y \in \mathbb{R},\ |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon + c(1 - \cos(x)\cos(y) - \sin(x)\sin(y))$.
Donc $|f(x)f_0 - f| \leq \varepsilon f_0 + c(f_0 - \cos(x)\cos - \sin(x)\sin)$.
Or $u_n(f) - f = u_n(f - f(x)f_0) + f(x)u_n(f_0) - f$.
Donc

$$\begin{aligned}|(u_n(f) - f)(x)| &\leq |u_n(f - f(x)f_0)(x)| + |f(x)(u_n(f_0)(x) - f_0(x))| \\ &\leq u_n(|f - f(x)f_0|)(x) + \|f\|_\infty \|u_n(f_0) - f_0\|_\infty \\ &\leq \varepsilon u_n(f_0)(x) + c(u_n(f_0) - \cos(x)u_n(\cos) - \sin(x)u_n(\sin)) + |f(x)||(u_n(f_0) - f_0)(x)|\end{aligned}$$

Ceci étant vrai pour tout réel x, $|u_n(f) - f| \leq \varepsilon u_n(f_0) + c(u_n(f_0) + \cos u_n(\cos) - \sin u_n(\sin)) + |f||u_n(f_0) - f_0|$.
D'où $\|u_n(f) - f\|_\infty \leq \varepsilon \|u_n(f_0)\|_\infty + c\|u_n(f_0) + \cos u_n(\cos) - \sin u_n(\sin)\|_\infty + \|f\|_\infty \|u_n(f_0) - f_0\|_\infty$.
Or $\lim\limits_{n\to+\infty} \|u_n(f_0)\|_\infty = \|f_0\|_\infty = 1$, $\lim\limits_{n\to+\infty} \|u_n(f_0) + \cos u_n(\sin) - \sin u_n(\cos)\|_\infty = \left\|1 - \cos^2 - \sin^2\right\|_\infty = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \|u_n(f_0) - f_0\|_\infty = 0$.
Donc pour N assez grand, $\forall n \geq N,\ \|u_n(f) - f\|_\infty \leq \varepsilon(1 - \varepsilon) + c\varepsilon + \|f\|_\infty \varepsilon \underset{\varepsilon\to 0}{\longrightarrow} 0$.
i.e $\|u_n(f) - f\|_\infty \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

4. Soient $k, l \in \mathbb{Z}$.
Si $k \neq l$, $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} e^{i(l-k)t} dt = \left[\frac{e^{i(l-k)t}}{i(l-k)}\right]_{-\pi}^{\pi} = 0$.
Et si $k = l$, $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} e^{i(l-k)t} dt = \int_{-\pi}^{\pi} dt = 2\pi$.
Donc par linéarité, $\forall k \in \mathbb{Z},\ c_k(P) = c_k$.

5. On raisonne par implication circulaire.
Si $P \in \mathrm{Vect}_{\mathbb{R}}(x \mapsto \cos(kx), x \mapsto \sin(kx),\ k \in \mathbb{N})$ alors P est à valeurs réelles.
Si P est à valeurs réelles alors :

$$\forall k \in \mathbb{Z},\ c_{-k}(P) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} P(t)e^{ikt} dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \overline{P(t)e^{-ikt}} dt = \overline{\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} P(t)e^{-ikt} dt} = \overline{c_k(P)}$$

Enfin supposons que $\forall k \in \mathbb{Z},\ c_{-k} = c_{-k}(P) = \overline{c_k(P)} = \overline{c_k}$. On note $c_k = a_k + ib_k$ avec $a_k, b_k \in \mathbb{R}$. Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}P(x) &= \sum_{k=-n}^{n} c_k e^{ikx} \\ &= c_0 + \sum_{k=1}^{n} c_k e^{ikx} + c_{-k} e^{-ikx} \\ &= c_0 + \sum_{k=1}^{n} c_k e^{ikx} + \overline{c_k e^{ikx}} \\ &= c_0 + \sum_{k=1}^{n} 2\,\mathrm{Re}(c_k e^{ikx}) \\ &= c_0 + 2\sum_{k=1}^{n} a_k \cos(kx) - b_k \sin(kx)\end{aligned}$$

Comme $c_0 = \overline{c_0}$, $c_0 \in \mathbb{R}$ et $c_0 = c_0 \cos(0x)$, cela conclut.

6. Soient $f, g \in \mathcal{C}_{2\pi}(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.
$\forall k \in \mathbb{Z},\ c_k(f + \lambda g) = c_k(f) + \lambda c_k(g)$.
Donc $\forall n \in \mathbb{N},\ S_n(f + \lambda g) = S_n(f) + \lambda S_n(g)$. D'où $\forall n \in \mathbb{N},\ \sigma_n(f + \lambda g) = \sigma_n(f) + \lambda \sigma_n(g)$.
Fixons $N \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$.
$\sigma_N(f)(x) = \dfrac{1}{N+1} \displaystyle\sum_{n=0}^{N} \sum_{k=-n}^{n} c_k(f) e^{ikx} = \dfrac{1}{2\pi(N+1)} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sum_{n=0}^{N} \sum_{k=-n}^{n} e^{ik(x-t)} dt.$

Pour montrer que σ_N est un opérateur (positif) de $\mathcal{C}_{2\pi}(\mathbb{R})$ il suffit de montrer que $K_N(u) := \displaystyle\sum_{n=0}^{N} \sum_{k=-n}^{n} e^{iku}$ est un réel (positif) pour tout $u \notin 2\pi\mathbb{Z}$.
Soit $u \notin 2\pi\mathbb{Z}$.
Comme $e^{iu} \neq 1$, $\displaystyle\sum_{n=-n}^{n} e^{iku} = e^{-inu} \sum_{k=0}^{2n} e^{iku} = e^{-inu} \frac{e^{i(2n+1)u} - 1}{e^{iu} - 1} = \frac{\sin\left((2n+1)\frac{u}{2}\right)}{\sin\left(\frac{u}{2}\right)}$.
On pose $v = \dfrac{u}{2}$.

$$\begin{aligned}K_n(u) &= \frac{1}{\sin(v)} \sum_{n=0}^{N} \sin((2n+1)v) \\ &= \frac{1}{\sin(v)} \mathrm{Im}\left(\sum_{n=0}^{N} e^{i(2n+1)v}\right) \\ &= \frac{1}{\sin(v)} \mathrm{Im}\left(e^{iv} \frac{e^{i(2N+1)v-1}}{e^{2iv} - 1}\right) \\ &= \frac{1}{\sin(v)} \mathrm{Im}\left(e^{i(N+1)v} \frac{\sin((N+1)v)}{\sin(v)}\right) \\ &= \frac{\sin^2((N+1)v)}{\sin^2(v)} \geq 0\end{aligned}$$

Montrons ensuite que $(\sigma_n(f_0))$, $(\sigma_n(\cos))$ et $(\sigma_n(\cos))$ converge uniformément vers $f_0, \cos$ et $\sin$ respectivement.
On calcule $c_0(f_0) = 1$ et $c_k(f_0) = 0$ pour $k \neq 0$. Donc $\forall n \in \mathbb{N},\ S_n(f_0) = f_0$ puis $\sigma_n(f_0) = f_0$ converge uniformément vers f_0.
Ensuite on sait que $\forall x \in \mathbb{R},\ \cos(x) = \dfrac{1}{2}e^{ix} + \dfrac{1}{2}e^{-ix}$. Alors d'après la question 4, $c_1(\cos) = c_{-1}(\cos) = \dfrac{1}{2}$ et $c_k(\cos) = 0$ pour $k \notin \{-1, 1\}$. Donc $S_0(\cos) = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ S_n(\cos) = \cos$. Donc $\forall n \in \mathbb{N},\ \sigma_n(\cos) = \dfrac{n}{n+1}\cos$ converge uniformément vers $\cos$.
De même l'identité $\forall x \in \mathbb{R},\ \sin(x) = \dfrac{1}{2i}e^{ix} - \dfrac{1}{2i}e^{-ix}$ donne $\sigma_n(\sin) = \dfrac{n}{n+1}\sin$ converge uniformément vers $\sin$.
Ainsi d'après la question 3, pour toute fonction $f \in \mathcal{C}_{2\pi}(\mathbb{R})$, $(\sigma_n(f))$ converge uniformément vers f sur $\mathbb{R}$.
Enfin, σ_n est clairement à valeurs dans les polynômes trigonométriques complexes. En outre, si f est à valeur réelle

$\forall k \in \mathbb{Z},\ c_{-k}(f) = \overline{c_k(f)}$ et donc par la question 5 $S_n(f)$ est un polynôme trigonométrique réel quel que soit $n \in \mathbb{N}$, puis $\sigma_n(f)$ aussi.
Ceci démontre que l'ensemble des polynômes trigonométriques réels est dense dans $\mathcal{C}_{2\pi}(\mathbb{R})$ pour la norme uniforme.

7. Appuyons nous sur le cas réel.
Soit $f \in \mathcal{C}_{2\pi}(\mathbb{C})$. On écrit $f = g + ih$ avec g et h des fonctions réelles.
Alors $g, h \in \mathcal{C}_{2\pi}(\mathbb{R})$. En effet elles sont continues par définition et $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x+2\pi) = f(x) \implies \begin{cases} g(x+2\pi) = g(x) \\ h(x+2\pi) = h(x) \end{cases}$.
Donc $(\sigma_n(g))$ et $(\sigma_n(h))$ convergent uniformément vers g et h respectivement. Par conséquent, σ_n étant un endomorphisme de $\mathcal{C}_{2\pi}(\mathbb{C})$, $(\sigma_n(g+ih)) = (\sigma_n(g) + i\sigma_n(h))$ est une suite de polynômes trigonométriques complexes convergeant uniformément vers $g + ih = f$.

XIII.6.30 Théorème de sélection de Helly ★★★★

[Enoncé]

1. Notons D l'ensemble des points de discontinuité de f. Comme f est croissante sur un intervalle ouvert I elle admet en tout point $x \in I$ une limite à gauche ℓ_x^- et à droite ℓ_x^+. D est alors exactement l'ensemble des points où $\ell_x^- < \ell_x^+$.
Pour tout $x \in D$ on se donne par densité de $\mathbb{Q}$ $q_x \in]\ell_x^-, \ell_x^+[\cap \mathbb{Q}$.
Montrons que $\omega : \left\{ \begin{array}{ccc} D & \longrightarrow & \mathbb{Q} \\ x & \longmapsto & q_x \end{array} \right.$ est strictement croissante, et donc injective.
Soient $x < y \in D$. Par croissance de f on a $q_x \leq \ell_x^+ < \ell_y^- \leq q_y$.
D s'injecte dans $\mathbb{Q}$ qui est dénombrable, il est donc au plus dénombrable.

2. On se donne $(q_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une énumération de l'ensemble dénombrable $I \cap \mathbb{Q}$.
On va appliquer ce qu'on appelle un *procédé d'extraction diagonal*.
La suite $(f_n(q_0))$ est bornée donc par le théorème de Bolzano-Weierstrass on peut en extraire une sous-suite $(f_{\varphi_0(n)}(q_0))$ qui converge.
Puis la suite $(f_{\varphi_0(n)}(q_1))$ est bornée donc on peut en extraire une sous-suite $(f_{\varphi_0\circ\varphi_1(n)}(q_1))$ qui converge. Par ailleurs la suite $(f_{\varphi_0\circ\varphi_1(n)}(q_0))$ converge en tant que suite extraite d'une suite convergente.
Par récurrence on construit pour tout $k \in \mathbb{N}$ une extractrice $\psi_k = \varphi_0 \circ \cdots \circ \varphi_k$ telle que $\forall i \leq k,\ (f_{\psi_k(n)}(q_i))_{n\in\mathbb{N}}$ converge.
On définit $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ par $\varphi(n) = \psi_n(n)$ (d'où le terme extraction diagonal). φ est strictement croissante car $\varphi(n+1) = \psi_{n+1}(n+1) = \psi_n(\varphi_{n+1}(n+1)) \geq \psi_n(n+1) > \psi_n(n) = \varphi(n)$.
Montrons que la suite $(f_{\varphi(n)})$ converge simplement sur $I \cap \mathbb{Q}$.
Soit $q_i \in I \cap \mathbb{Q}$. Fixons $\varepsilon > 0$.
On sait que $\forall k \geq i,\ \exists \ell_k \in \mathbb{R},\ \exists N_k \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N_k,\ |f_{\psi_k(n)}(q_i) - \ell_k| < \varepsilon$.
Alors $\forall n \geq \max(i, N_i),\ |f_{\varphi(n)}(q_i) - \ell_i| = |f_{\psi_n(n)}(q_i) - \ell_i| < \varepsilon$.
Ainsi $(f_{\varphi(n)})$ converge simplement vers la fonction $f : q_i \mapsto \ell_i$ sur $I \cap \mathbb{Q}$.
Enfin f est croissante comme limite simple de fonctions croissantes.

3. D'après la question 2, quitte à extraire on peut supposer que (f_n) converge simplement vers une fonction croissante f sur $I \cap \mathbb{Q}$.
On peut prolonger f en une fonction croissante de I dans $\mathbb{R}$:
Pour $x \in \mathbb{R}$ on se donne une suite croissante $(x_n) \in (I \cap \mathbb{Q})^{\mathbb{N}}$ qui converge vers x. La suite $(f(x_n))$ est croissante et majorée (par $f(q_x)$ avec $q_x \in I \cap \mathbb{Q}$ tel que $x < q_x$ par exemple) donc converge par le théorème de la limite monotone. On note $f(x)$ cette limite.
Si $x < y \in I$, pour $(y_n) \in (I \cap \mathbb{Q})^{\mathbb{N}}$ croissante telle que $\lim\limits_{n\to+\infty} y_n = y$, APCR $y_n > x$ d'où $f(y) = \lim\limits_{n\to+\infty} f(y_n) \geq f(x)$.
Ainsi d'après la question 1, l'ensemble D des points de discontinuité de f est au plus dénombrable.
Si D est fini on peut par extractions successives trouver une sous-suite $(f_{\varphi(n)})$ qui converge simplement sur D et si D est dénombrable on peut utiliser un procédé d'extraction diagonal comme dans la question 2 pour obtenir le même résultat.
Il reste alors à montrer que $(f_{\varphi(n)})$ converge simplement sur $I \setminus D$. On fixe $x \in I \setminus D$. Il suffit de montrer que $(f_n(x))$ converge.
Soit $\varepsilon > 0$. f est continue en x donc il existe $\eta > 0$ tel que $\forall y \in [x-\eta, x+\eta] \cap \mathbb{Q},\ |f(x) - f(y)| < \varepsilon$.
Par conséquent, en se donnant $\alpha \in [x-\eta, x] \cap \mathbb{Q}$ et $\beta \in [x, x+\eta] \cap \mathbb{Q}$ on a $\forall n \in \mathbb{N},\ f_n(\alpha) \leq f_n(x) \leq f_n(\beta)$ et $f(x) - f(\alpha) < \varepsilon,\ f(\beta) - f(x) < \varepsilon$.

Or $f_n(\alpha) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} f(\alpha)$ et $f_n(\beta) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} f(\beta)$. Donc on en déduit que APCR :

$$f(x) - 2\varepsilon \leq f(\alpha) - \varepsilon \leq f_n(\alpha) \leq f_n(x) \leq f_n(\beta) \leq f(\beta) + \varepsilon \leq f(x) + 2\varepsilon$$

i.e $|f_n(x) - f(x)| \leq 2\varepsilon$ d'où $f_n(x) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} f(x)$.
Finalement la sous-suite $(f_{\varphi(n)})$ converge simplement sur $I = D \cup (I \setminus D)$. Enfin la fonction limite est croissante comme limite simple de fonctions croissantes.

XIII.7 Correction Série entière

XIII.7.1 Lemme d'Abel

[Enoncé]
On rappelle le lemme d'Abel :
Soient (a_n) une suite de complexes et r un nombre réel strictement positif. Si la suite $(a_n r^n)$ est bornée, alors pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < r$, la série est absolument convergente.
Passons à la démonstration :
Soient $(a_n)\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ et $r \in \mathbb{R}_+^*$ telle que $(a_n r^n)$ est bornée. Fixons $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < r$.

$$|a_n z^n| = |a_n r^n| \left|\frac{z^n}{r^n}\right| = \mathcal{O}(\left|\frac{z^n}{r^n}\right|)$$

Puisque $|z| < r$, la série $\sum \frac{z}{r}^n$ converge absolument.
Par conséquent, $\sum a_n z^n$ converge absolument également.

XIII.7.2 Fonction non développable en série entière

[Enoncé]

1. On remarque que :

$$\lim_{x\to 0} -\frac{1}{x^2} = -\infty$$

   Ainsi,

$$\lim_{x\to 0} \exp\left(-\frac{1}{x^2}\right) = 0$$

   Donc f est continue sur $\mathbb{R}$.

2. Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\exists P_n \in \mathbb{R}[X], \forall x \in \mathbb{R}^* f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right) f(x)$$

   Le résultat est clair pour $n = 0$.
   Pour $n = 1$, pour tout $x \in \mathbb{R}$

$$f'(x) = \frac{2}{x^3} f(x)$$

   Ainsi, en posant $P_1 = 2X^3$, le résultat est vérifié. Supposons que pour un certain $n \in \mathbb{N}$, il existe $P_n \in \mathbb{R}[X]$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$ $f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right) f(x)$ Alors ,

$$f^{(n+1)}(x) = -\frac{1}{x^2} P_n'\left(\frac{1}{x}\right) f(x) + P_n(x) f'(x) = \left[\frac{2}{x^3} P_n\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x^2} P_n'\left(\frac{1}{x}\right)\right] f(x)$$

   De plus, par croissance comparées, on a

$$\lim_{x\to 0} f^{(n)}(x) = 0$$

   Donc f est de classe $\mathcal{C}\infty$ sur $\mathbb{R}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)} = 0$.

3. Supposons que f est développable en série entière. Alors d'après la formule de Taylor,

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

   Or d'après la question précédente, cela nous donnerait que f est la fonction nulle, ce qui est absurde.
   Donc f n'est pas développable en série entière.

XIII.7.3 CCINP MP 2019

[Enoncé]

1. $$\frac{\binom{2n+2}{n+1}}{\binom{2n}{n}} = \frac{(2n+2)!}{(n+1)!^2}\frac{n!^2}{(2n)!} = \frac{(2n+1)(2n+2)}{(n+1)^2} \sim 4$$

   On en déduit que le rayon de convergence R de cette série entière est : $\frac{1}{4}$.

2. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = \binom{2n}{n}$.
   Pour tout $x \in]-R, R[$, la fonction S est une série entière de rayon $R = \frac{1}{4}$. Elle est donc dérivable terme à terme sur cet intervalle :
   $$S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \quad \text{et} \quad S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}$$

   Calculons l'expression $(1-4x)S'(x) - 2S(x)$:

   $$\begin{aligned}(1-4x)S'(x) - 2S(x) &= S'(x) - 4xS'(x) - 2S(x) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} - 4x\sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} - 2\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)a_{n+1}x^n - \sum_{n=1}^{+\infty} 4n a_n x^n - \sum_{n=0}^{+\infty} 2a_n x^n\end{aligned}$$

   En isolant le terme pour $n = 0$ et en regroupant le reste sous une seule somme :

   $$= (1 \cdot a_1 - 2a_0) + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[(n+1)a_{n+1} - 4n a_n - 2a_n\right] x^n$$

   $$= (a_1 - 2a_0) + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[(n+1)a_{n+1} - (4n+2)a_n\right] x^n$$

   Or, nous savons que :
   - $a_1 = \binom{2}{1} = 2$ et $a_0 = \binom{0}{0} = 1$, donc $a_1 - 2a_0 = 2 - 2 = 0$.
   - D'après la relation de récurrence établie à la question 1 : $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{4n+2}{n+1}$, ce qui implique $(n+1)a_{n+1} = (4n+2)a_n$.

   Tous les coefficients sont donc nuls, ce qui prouve la relation :

   $$\forall x \in]-R, R[, \quad (1-4x)S'(x) - 2S(x) = 0$$

3. On pose $(E) : y' - \dfrac{2}{(1-4x)}y = 0$.
   Une primitive de $x \mapsto \frac{2}{1-4x}$ sur $]-R, R[$ est

   $$x \mapsto -\frac{1}{2}\ln(1-4x)$$

   Ainsi, il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que :
   $$S(x) = Ce^{-\frac{1}{2}\ln(1-4x)}$$

   Pour $x = 0$, on a $S(0) = \binom{0}{0} = 1$ et $Ce^{-\frac{1}{2}\ln(1)} = 1$.
   Finalement, on a :
   $$\forall x \in]-R, R[, \quad S(x) = e^{-\frac{1}{2}\ln(1-4x)} = \frac{1}{\sqrt{1-4x}}$$

XIII.7.4 Série entière de terme général binomial

[Enoncé]

1. $$\frac{\binom{n+1+p}{p}}{\binom{n+p}{p}} = \frac{n+1+p}{n+1} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 1$$

   On en déduit donc que le rayon de convergence de cette série est 1.

2. Puisque f est développable en série entière sur $]-1,1[$, elle est dérivable sur $]-1,1[$.

   $$\forall x \in]-1,1[, f'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} n\binom{n+p}{p} x^n$$

   Or, on remarque que

   $$\begin{aligned} n\binom{n+p}{p} &= n\frac{(n+p)!}{n!p!} \\ &= (p+1)\frac{(n-1+(p+1))!}{(p+1)!(n-1)!} \\ &= (p+1)\binom{n+p}{p+1} \end{aligned}$$

   Ainsi

   $$\forall x \in]-1,1[, f'(x) = (p+1)\sum_{n=0}^{+\infty} \binom{n+p+1}{p+1} x^n$$

   Donc$\forall x \in]-1,1[$,

   $$(1-x)f'(x) = (p+1)\sum_{n=0}^{+\infty}\binom{n+p+1}{p+1}x^n - (p+1)\sum_{n=0}^{+\infty}\binom{n+p}{p+1}x^n = (p+1)+(p+1)\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\binom{n+p+1}{p+1} - \binom{n+p}{p}\right)x^n$$

   Or d'après le triangle de Pascal, $\binom{n+p+1}{p+1} - \binom{n+p}{p+1} = \binom{n+p}{p}$, ainsi

   $$(1-x)f'(x) = (p+1)(1+f(x))$$

   On cherche donc à résoudre sur $]-1,1[$ l'équation différentielle

   $$(E) : y' - \frac{p+1}{1-x}y = \frac{p+1}{1-x}$$

   L'ensemble des solutions de l'équation homogène est :

   $$\left\{y : x \in]-1,1[\mapsto Ce^{-(p+1)\ln(1-x)} = \frac{C}{(1-x)^{p+1}}, C \in \mathbb{R}\right\}$$

   On remarque que $y : x \in]-1,1[\mapsto -1$ est une solution particulière de E. Ainsi, l'ensemble des solutions de (E) est

   $$\left\{y : x \in]-1,1[\mapsto \frac{C}{(1-x)^{p+1}} - 1, C \in \mathbb{R}\right\}$$

   Ainsi, il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in]-1,1[$

   $$f(x) = \frac{C}{(1-x)^{p+1}} - 1$$

   Or $f(0) = 1$ donc

   $$f(x) = \frac{2}{(1-x)^{p+1}} - 1$$

XIII.7.5 Formule de Cauchy

[Enoncé]
Soit $r \in [0, R[$, pour tout $\theta \in [0, 2\pi[$, $|re^{i\theta}| = r \leq R$.
Puisque que $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k x^k$ est une série entière, on peut utiliser la théorème d'interversion série-intégrale :

$$\int_0^{2\pi} f(re^{i\theta})e^{-in\theta}d\theta = \int_0^{2\pi} \sum_{k=0}^{+\infty} a_k r^k e^{i(k-n)\theta} d\theta = \sum_{k=0}^{+\infty} \int_0^{2\pi} a_n r^n e^{i(k-n)\theta} d\theta$$

D'après calculs, on obtient :

$$\int_0^{2\pi} e^{i(k-n)}d\theta = \begin{cases} 0 & \text{si } k \neq n \\ 2\pi & \text{sinon} \end{cases}$$

Ainsi, on en déduit que la formule de Cauchy :

$$\int_0^{2\pi} f(re^{i\theta})e^{-in\theta}d\theta = 2\pi a_n r^n$$

XIII.7.6 Principe des zéros isolés

[Enoncé]
Supposons par l'absurde qu'il existe au moins au moins un coefficient a_n non nul.
L'ensemble $\{n \in \mathbb{N}, a_n \neq 0\}$ est alors une partie non vide de $\mathbb{N}$. Elle admet donc un plus petit élément que nous noterons k.

$$f(z) = z^k \sum_{n=k}^{+\infty} a_n z^{n-k} = z^k \sum_{n=0}^{+\infty} a_{n+k} z^n$$

On pose $g(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_{n+k} z^n$. Ainsi, pour tout $p \in \mathbb{N}$,

$$f(z_p) = z_p^k g(z_p)$$

Puisque les termes de la suite (z_p) sont tous non nuls, on en déduit que $z_p^k \neq 0$. Ainsi, on en déduit que

$$\forall p \in \mathbb{N}, g(z_p) = 0$$

Sachant que $z_p \to 0$, on en déduit que :

$$a_k = g(0) = \lim_{p \to +\infty} g(z_p) = 0$$

Ce qui est absurde donc on a montré par l'absurde que tous les a_n sont nuls.

XIII.7.7 Produit de Hadamard

[Enoncé]

XIII.7.8 Théorème de Liouville

[Enoncé]

1. Supposons que f est bornée par un certain $M \in \mathbb{R}_+$ sur $\mathbb{C}$.
   D'après VII.5, on sait que :

   $$\forall n \in \mathbb{N}, \forall r \in \mathbb{R}_+, a_n r^n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(re^{i\theta})e^{-in\theta}d\theta$$

   Ainsi, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $r \in \mathbb{R}_+$,

   $$|a_n r^n| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} M d\theta = M$$

Par conséquent,

$$|a_n| \leq \frac{M}{r^n}$$

Ainsi pour $r \to +\infty$, on en déduit que :

$$a_n = 0$$

Ainsi, f est constante égale à a_0.

2. Supposons qu'il existe P à coefficients positifs tel que $\forall z \in \mathbb{C}, |f(z)| \leq P(|z|)$.
On note $d = \deg(P)$.
En procédant de même, on obtient :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall r \in \mathbb{R}_+, |a_n| \leq \frac{P(r)}{r^n}$$

Puisque $P(r) = \underset{r\to+\infty}{\mathcal{O}}\left(r^d\right)$, on en déduit que :

$$|a_n| = \underset{r\to+\infty}{\mathcal{O}}\left(\frac{1}{r^{n-d}}\right)$$

c'est-à-dire que pour tout $n > d$, $a_n = 0$. Par conséquent, f est un polynôme.

XIII.7.9 Inverse d'une série entière

[Enoncé]

XIII.7.10 Equivalent de séries entières

[Enoncé]

XIII.7.11 Théorème de d'Alembert-Gauss

[Enoncé]

XIII.7.12 Développement de fraction rationnelle autour de 0

[Enoncé]

XIII.7.13 Fonction quasi-polynomiale

[Enoncé]

Série génératrice d'une fonction quasi-polynomiale

Partition d'un entier

XIII.7.14 Série de Lambert

[Enoncé]

XIII.7.15 Somme de Goldbach

[Enoncé]

XIII.7.16 Une somme avec l'indicatrice d'Euler

[Enoncé]

XIII.7.17 Coefficients définies par des intégrales

[Enoncé]

XIII.7.18 Détermination des coefficients d'un développement en série entière

[Enoncé]

XIII.7.19 Série génératrice du nombre de points à coordonnées entières dans un quart de disque

[Enoncé]

Nombre de points à coordonnées entières dans un disque

Prolongement du problème

XIII.7.20 Nombre d'involution

[Enoncé]

XIII.7.21 Théorème d'André

[Enoncé]

XIII.7.22 Théorème d'Abel

[Enoncé]

XIII.7.23 Théorèmes taubériens d'Abel

[Enoncé]

Cas des séries à coefficients positifs

Théorème taubérien faible

Théorème taubérien fort

XIII.8 Correction Topologie

XIII.8.1 Normes d'opérateur ★

[Enoncé]
Dans tout l'exercice on ne se souciera pas de noter différemment les normes $\|\cdot\|_\infty, \|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ de $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$ et $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. Il doit être clair aux yeux du lecteur dans quels espaces vivent chaque objets.

1. Soit $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$. Soit $i \in [\![1;n]\!]$.
   $|(AX)_i| = \left|\sum_{j=1}^{p} A_{ij}x_j\right| \leq \sum_{j=1}^{p} |A_{ij}||x_j| \leq \|X\|_\infty \sum_{j=1}^{p} |A_{ij}| \leq \left(\max_{1\leq i\leq n} \sum_{j=1}^{p} |A_{ij}|\right) \|X\|_\infty$.
   Donc $\|AX\|_\infty \leq \left(\max_{1\leq i\leq n} \sum_{j=1}^{p} |A_{ij}|\right) \|X\|_\infty$ i.e $|||\ A\ |||_\infty \leq \max_{1\leq i\leq n} \sum_{j=1}^{p} |A_{ij}|$.
   Pour qu'un vecteur X_0 satisfasse l'égalité, il est nécessaire et suffisant que toutes les inégalités soient des égalités. Pour la première inégalité il faut que les $A_{ij}x_j$ soient tous de même signe et pour la deuxième il faut que tous les x_j valent $\|X_0\|_\infty$. On peut par exemple prendre $x_j = \begin{cases} 1 & \text{si } A_{ij} > 0 \\ -1 & \text{si } A_{ij} < 0 \\ 0 & \text{si } A_{ij} = 0 \end{cases}$.
   Pour la dernière inégalité on se donne $i_0 \in [\![1;n]\!]$ tel que $\sum_{j=1}^{p} |A_{i_0 j}| = \max_{1\leq i\leq n} \sum_{j=1}^{p} |A_{ij}|$.
   Par construction $|(AX_0)_{i_0}| = \max_{1\leq i\leq n} \sum_{j=1}^{p} |A_{ij}| \|X_0\|_\infty$ d'où $\|AX\|_\infty \geq \max_{1\leq i\leq n} \sum_{j=1}^{p} |A_{ij}| \|X_0\|_\infty$.
   On en déduit que $|||\ A\ |||_\infty \geq \max_{1\leq i\leq n} \sum_{j=1}^{p} |A_{ij}|$ puis que $|||\ A\ |||_\infty = \max_{1\leq i\leq n} \sum_{j=1}^{p} |A_{ij}|$.

2. Soit $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$.
   $\sum_{i=1}^{n} |(AX)_i| = \sum_{i=1}^{n} \left|\sum_{j=1}^{p} A_{ij}x_j\right| \leq \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{p} |A_{ij}||x_j| = \sum_{j=1}^{p} |x_j| \sum_{i=1}^{n} |A_{ij}| \leq \|X\|_1 \left(\max_{1\leq j\leq p} \sum_{i=1}^{n} |A_{ij}|\right)$.
   Donc $\|AX\|_1 \leq \left(\max_{1\leq j\leq n} \sum_{i=1}^{n} |A_{ij}|\right) \|X\|_1$ i.e $|||\ A\ |||_1 \leq \max_{1\leq j\leq p} \sum_{i=1}^{n} |A_{ij}|$.
   Pour qu'un vecteur X_0 satisfasse l'égalité, il est nécessaire et suffisant que toutes les inégalités soient des égalités. Pour la première inégalité il faut que les $A_{ij}x_j$ soient tous de même signe et pour la deuxième il suffit que pour j_0 qui maximise la somme $\sum_{i=1}^{n} |A_{ij}|$ $x_{j_0} = 1$ et que $x_j = 0$ pour $j \neq j_0$. On peut par exemple prendre $X_0 = e_{j_0}$ où $(e_1, \ldots, e_p)$ est la base canonique de $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$.
   Pour la deuxième inégalité on se donne $j_0 \in [\![1;p]\!]$ tel que $\sum_{i=1}^{n} |A_{ij_0}| = \max_{1\leq j\leq p} \sum_{i=1}^{n} |A_{ij}|$.
   Par construction $\sum_{i=1}^{n} |(AX_0)_i| = \sum_{i=1}^{n} |A_{ij_0}| = \max_{1\leq j\leq p} \sum_{i=1}^{n} |A_{ij}| \|X_0\|_1$ d'où $\|AX\|_1 \geq \max_{1\leq j\leq p} \sum_{i=1}^{n} |A_{ij}| \|X_0\|_1$.
   On en déduit que $|||\ A\ |||_1 \geq \max_{1\leq j\leq p} \sum_{i=1}^{n} |A_{ij}|$ puis que $|||\ A\ |||_1 = \max_{1\leq j\leq p} \sum_{i=1}^{n} |A_{ij}|$.

3. Notons $\langle \cdot, \cdot \rangle$ le produit scalaire associé à $\|\cdot\|_2$. Encore une fois, on ne différencie par les notations dans $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$ et $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. Soit $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$.
   $\|AX\|_2^2 = \langle AX, AX \rangle = X^\top A^\top AX = \langle X, A^\top AX \rangle$.
   La matrice $A^\top A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ est symétrique réelle positive donc diagonalisable avec $\mathrm{Sp}(A^\top A) \subset \mathbb{R}_+$. Il existe donc

une base $(X_1, \dots, X_p)$ orthonormée de $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$ formée de vecteurs propres de $A^\top A$. On note λ_k la valeur propre associée à X_k pour $k \in [\![1;p]\!]$. On note aussi $X = \sum_{k=1}^{p} t_k X_k$.

Alors $A^\top AX = \sum_{k=1}^{p} t_k A^\top A X_k = \sum_{k=1}^{p} t_k \lambda_k X_k$. Donc

$$\|AX\|_2^2 = \sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p} t_i t_j \lambda_j \langle X_i, X_j\rangle = \sum_{k=1}^{n} t_k^2 \lambda_k \leq \max\left(\mathrm{Sp}(A^\top A)\right) \sum_{k=1}^{p} t_k^2 = \max\left(\mathrm{Sp}(A^\top A)\right) \|X\|_2^2$$

Ainsi $|||\ A\ |||_2 \leq \sqrt{\max \mathrm{Sp}(A^\top A)}$.
De plus, pour k tel que $\lambda_k = \max \mathrm{Sp}(A^\top A)$, $\|AX_k\|_2^2 = \lambda_k^2 \|X_k\|_2^2 = \lambda_k^2$.
Ainsi $|||\ A\ |||_2 = \sqrt{\max \mathrm{Sp}(A^\top A)}$.

XIII.8.2 $\mathbb{Z}$ est fermé ★

[Enoncé]
Soit $(u_n) \in \mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$ de limite $\ell \in \mathbb{C}$.
$\exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\ |u_n - \ell| < \dfrac{1}{2}$.
Alors si $n \geq N$, $|u_n - u_{n+1}| \leq |u_n - \ell| + |\ell - u_{n+1}| < 1$.
Comme $(u_n, u_{n+1}) \in \mathbb{Z}$, $|u_n - u_{n+1}| \in \mathbb{N}$.
Donc $\forall n \geq N,\ u_n = u_{n+1}$. Ainsi $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} u_N$.
Par unicité de la limite, $\ell = u_N \in \mathbb{Z}$.

XIII.8.3 Orthogonalité et topologie ★★

[Enoncé]

1. Soit $y \in E$. On sait que $\varphi_y \in \mathcal{L}(E)$.
   De plus d'après l'inégalité de Cauchy-Schwartz, $\forall x \in E,\ |\varphi_y(x)| \leq \|y\|\,\|x\|$.
   Donc φ_y est continue.
2. Pour $y \in E$ on note $\tilde{\varphi}_y = \varphi_{y|F}$ la restriction de φ_y à F.
   Posons $\varphi : y \in E \mapsto \tilde{\varphi}_y$. On sait que $\varphi \in \mathcal{L}(E, F^*)$ où F^* est le dual de F, l'ensemble des formes linéaires sur F (continues). Montrons qu'elle est continue pour la norme $\|\cdot\|_{E^*}$ subordonnée à la norme $\|\cdot\|$ de E. Soient $x, y \in E$.
   $|\varphi(y)(x)| = |\tilde{\varphi}_y(x)| \leq \|y\|\,\|x\|$ donc $\|\varphi(y)\|_{E^*} \leq \|y\|$ d'où $|||\ \varphi\ |||\leq 1$.
   Ainsi φ est continue et donc $F^\perp = \{y \in E,\ \forall x \in F,\ \langle x, y\rangle = 0\} = \{y \in E,\ \tilde{\varphi}_y = 0_{F^*}\} = \varphi^{-1}(0_{F^*})$ est un fermé de E.
3. D'après la question précédente $(F^\perp)^\perp$ est fermé, il suffit donc de montrer que $F \subset (F^\perp)^\perp$. Fixons $x \in F$.
   Soit $y \in F^\perp$. Par définition de $F^\perp$, $\langle x, y\rangle = 0$. Donc $x \in (F^\perp)^\perp$.
   Ainsi $(F^\perp)^\perp$ est un fermé qui contient F et par suite $\overline{F} \subset (F^\perp)^\perp$.

XIII.8.4 Ensemble des valeurs d'adhérence d'une suite ★★★

[Enoncé]
On raisonne par double inclusion.
Soit ℓ une valeur d'adhérence de $u := (u_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Fixons $n \in \mathbb{N}$.
Notons $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $\lim\limits_{p\to+\infty} u_{\varphi(p)} = \ell$. $\varphi(n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \infty$ donc $\exists N \in \mathbb{N},\ \forall p \geq N,\ \varphi(p) \geq n$.
Ainsi $(u_{\varphi(p)})_{p\geq N}$ est une suite à valeurs dans $\{u_k,\ k \geq n\}$ de limite ℓ : $\ell \in \overline{\{u_k,\ k \geq n\}}$.
On en déduit que $V \subset \bigcap\limits_{n\in\mathbb{N}} \overline{\{u_k,\ k \geq n\}}$.
Réciproquement soit $\ell \in \bigcap\limits_{n\in\mathbb{N}} \overline{\{u_k,\ k \geq n\}}$.
On va construire par récurrence une extractrice ψ telle que $(u_{\psi(p)})_{p\in\mathbb{N}}$ tend vers ℓ.
$\ell \in \overline{\{u_k,\ k \geq 0\}} \implies \exists k_0 \in \mathbb{N},\ \|\ell - u_{k_0}\| < 1 = \dfrac{1}{2^0}$.

Supposons que l'on dispose pour un certain $p \in \mathbb{N}$ d'entiers $k_0 < \cdots < k_p$ tels que $\forall j \in [\![0;p]\!],\ \left\|\ell - u_{k_j}\right\| < \dfrac{1}{2^j}$.
Alors $\ell \in \overline{\{u_k,\ k \geq k_p\}} \implies \exists k_{p+1} \in \mathbb{N},\ \left\|\ell - u_{k_{p+1}}\right\| < \dfrac{1}{2^{p+1}}$.
On définit alors $\psi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ par $\forall p \in \mathbb{N},\ \psi(p) = k_p$. Par construction ψ est strictement croissante et de plus, $\forall p \in \mathbb{N},\ \left\|\ell - u_{\psi(p)}\right\| < \dfrac{1}{2^p}$. Donc $u_{\psi(p)} \underset{p\to+\infty}{\longrightarrow} \ell$ d'où $\ell \in V$.
On en déduit que $V = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \overline{\{u_k,\ k \geq n\}}$. V est un fermé en tant qu'intersection de fermés.

Remarque : une manière plus simple/naturelle de traiter l'exercice est de caractériser le fait que ℓ soit une valeur d'adhérence de u par le fait qu'il existe une infinité de terme de la suite u à une distance inférieure à ε de ℓ. Cette caractérisation peut se voir comme définition d'une valeur d'adhérence et est parfois plus utile que le point de vue suite extraite.

Une application ★★★★

[Enoncé]

1. Soit $z \in \mathbb{C}$. Si z est une racine de l'unité alors la suite $(z^n)_{n\in\mathbb{N}}$ stationne à 1 qui est donc sa seule valeur d'adhérence.
   Supposons maintenant que z n'est pas une racine de l'unité. Cela revient à supposer, si l'on écrit $z = e^{2i\pi\theta}$ avec $\theta \in \mathbb{R}$, que θ est irrationnel.
   On va alors montrer que $\mathbb{Z} + \theta\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$. Pour cela on utilise l'exercice classique qui montre que les sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$ sont monogènes ou dense dans $\mathbb{R}$.
   On montre aisément que $\mathbb{Z}+\theta\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$. Montrons qu'il n'est pas monogène. Par l'absurde on suppose qu'il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $\mathbb{Z} + \theta\mathbb{Z} = a\mathbb{Z}$.
   Alors on sait qu'il existe un entier k tel que $1 = ak$. On en déduit que $a = \dfrac{1}{k} \in \mathbb{Q}$. Nonobstant on sait aussi qu'il existe un entier m tel que $\theta = am$. Donc $\theta \in \mathbb{Q}$ ce qui est absurde.
   Ainsi $\mathbb{Z} + \theta\mathbb{Z}$ n'est pas monogène, il est donc dense dans $\mathbb{R}$.
   On en déduit par continuité et 1-périodicité de la fonction $f : x \in \mathbb{R} \mapsto e^{2i\pi x}$ que $f(\mathbb{Z}+\theta\mathbb{Z}) = \{e^{2ki\pi\theta},\ k \in \mathbb{Z}\} = \{e^{2in\pi\theta},\ n \in \mathbb{N}\} = \{z^n,\ n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $f(\mathbb{R}) = \mathbb{U}$.
   En particulier 1 est une valeur d'adhérence de la suite $(z^n)_{n\in\mathbb{N}}$.
2. Construisons une extractrice par extractions successives :
   D'après la question précédente on dispose de $\varphi_1 : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $z_1^{\varphi_1(n)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$.
   Supposons que pour un certain $k \in [\![1;m]\!]$ on dispose de ψ_{k-1} telle que
   $$\begin{pmatrix} z_1^{\psi_{k-1}(n)} \\ \vdots \\ z_{k-1}^{\psi_{k-1}(n)} \end{pmatrix} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$
   $\left(z_k^{\psi_{k-1}(n)}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ est à valeur dans le compact $\mathbb{U}$ donc quitte à extraire on peut supposer qu'elle converge vers un certain $\lambda \in \mathbb{U}$.
   Ainsi $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \\ \lambda \end{pmatrix}$ est une valeur d'adhérence de $\begin{pmatrix} z_1^n \\ \vdots \\ z_k^n \end{pmatrix}$. Mais quel que soit $p \in \mathbb{N}$, $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \\ \lambda^p \end{pmatrix}$ est une valeur d'adhérence de $\begin{pmatrix} z_1^n \\ \vdots \\ z_k^n \end{pmatrix}$. En effet en notant η une extractrice qui fait converger la suite vers $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \\ \lambda \end{pmatrix}$, il suffit de considérer $\xi(n) = p\eta(n)$.
   On considère désormais la suite $(\lambda^n)_{n\in\mathbb{N}}$. D'après la question précédente, cette suite admet 1 pour valeur d'adhérence.

Par conséquent, comme l'ensemble des valeurs d'adhérence de $\begin{pmatrix} z_1^n \\ \vdots \\ z_k^n \end{pmatrix}_{n\in\mathbb{N}}$ est fermé, $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ est une valeur d'adhérence de $\begin{pmatrix} z_1^n \\ \vdots \\ z_k^n \end{pmatrix}_{n\in\mathbb{N}}$.

Par récurrence, pour tout $k \in [\![1;m]\!]$ $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ est une valeur d'adhérence de $\begin{pmatrix} z_1^n \\ \vdots \\ z_k^n \end{pmatrix}_{n\in\mathbb{N}}$. En particulier $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ est une valeur d'adhérence de $\begin{pmatrix} z_1^n \\ \vdots \\ z_m^n \end{pmatrix}_{n\in\mathbb{N}}$.

3. Notons $M = \max_{1\leq k\leq n} |a_k|$. Il est clair que si $M < 1$ alors $\left|\sum_{k=1}^n a_k^m\right| \leq nM^m \underset{m\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ d'où $\sum_{k=1}^n a_k^m \underset{m\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.
Supposons maintenant $M > 1$. On note $K = \{k \in [\![1;n]\!],\ |a_k| = M\}$.
$\forall k \in K,\ \frac{a_k}{M} \in \mathbb{U}$. Donc d'après la question précédente on peut trouver une extractrice φ telle que $\forall k \in K,\ \left(\frac{a_k}{M}\right)^{\varphi(m)} \underset{m\to\infty}{\longrightarrow} 1$.
Donc $\sum_{k=1}^n a_k^{\varphi(m)} = M^{\varphi(m)}\left(\sum_{k\in K}\left(\frac{a_k}{M}\right)^{\varphi(m)} + \sum_{k\notin K}\left(\frac{a_k}{M}\right)^{\varphi(m)}\right) \underset{m\to+\infty}{\sim} |K|M^{\varphi(m)} \underset{m\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$ ce qui est absurde.
Enfin, si $M = 1$ le même calcul donne $\lim_{m\to+\infty} \sum_{k=1}^n a_k^m = |K|$.
Au final, si $\left(\sum_{k=1}^n a_k^m\right)_{m\in\mathbb{N}}$ converge alors $\forall k \in [\![1;n]\!],\ |a_k| \leq 1$ et la limite est un entier entre 1 et k, égal au nombre des a_k de module 1.

XIII.8.5 Ensemble des suites convergente vers 0 ★★★

[Enoncé]
On note V l'ensemble des suites de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ convergeant vers 0.
Tout d'abord c'est bien une partie de ℓ^∞ puisqu'une suite convergente est bornée. Ensuite, donnons nous $((u_n^k)_{k\in\mathbb{N}})_{n\in\mathbb{N}} \in V^{\mathbb{N}}$ une suite de suites convergeant vers 0 qui converge vers une suite U dans $(\ell^\infty, \|\cdot\|_\infty)$.
La suite des limites $\lim_{k\to+\infty} u_n^k$ converge vers 0 puisqu'elle est constante égale à 0. De plus $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers U. Alors d'après le théorème de la double limite U converge vers $\lim_{n\to+\infty}\lim_{k\to+\infty} u_n^k = 0$.
Ainsi V est fermé.

Ensemble des suites convergentes ★★★ (HP)

[Enoncé]
On note C l'ensemble des suites convergentes de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$. C'est bien une partie de ℓ^∞ puisqu'une suite convergente est bornée.
Soit $(u_n^k)_{n\in\mathbb{N}} \in C^{\mathbb{N}}$ une suite de suites convergentes qui converge vers une suite $U = (U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dans $(\ell^\infty, \|\cdot\|_\infty)$. On note pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\ell_n = \lim_{k\to+\infty} u_n^k$.
Montrons que la suite des limites $(\ell_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge. On va montrer qu'elle est de Cauchy ce qui justifiera qu'elle converge (cf. V.1).
Soit $\varepsilon > 0$.
$\|u_n - U\|_\infty \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ donc $\exists N \in \mathbb{N},\ \forall p,q \geq N,\ \|u_p - u_q\|_\infty < \frac{\varepsilon}{3}$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n^k \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell_n$ donc $\exists K_n \in \mathbb{N},\ \forall k \geq K_n,\ |u_n^k - \ell_n| < \frac{\varepsilon}{3}$.

Soient $p \geq N$ et $k \geq \max(K_p, K_N)$.

$$|\ell_p - \ell_N| \leq |\ell_p - u_p^k| + |u_p^k - u_N^k| + |u_N^k - \ell_N| \leq |u_p^k - \ell_p| + \|u_p - u_N\|_\infty + |u_N^k - \ell_N| < \varepsilon$$

On conclut comme la question précédente avec le théorème de la double limite.

XIII.8.6 Calcul d'adhérence ★★★

[Enoncé] Soit $r_n \in E^{\mathbb{N}}$ convergente. On note r sa limite. $\forall n \in \mathbb{N},\ \exists (p_n, q_n) \in (\mathbb{N}^*)^2,\ r_n = \dfrac{1}{p_n} + \dfrac{1}{q_n}$.
On rappelle qu'une suite d'entier qui converge stationne et que donc la limite d'une suite d'entiers naturels non nuls est un entier naturel non nul (cf.$\mathbb{Z}$ est fermé).
On distingue des cas suivant si (p_n), (q_n) sont bornées ou non.
Si (p_n) et (q_n) sont bornées alors quitte à extraire, on peut supposer que (p_n) converge vers une limite $p \in \mathbb{N}^*$. Alors $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{q_n} = \lim\limits_{n\to+\infty} r_n - \dfrac{1}{p_n} = r - \dfrac{1}{p}$. (q_n) est bornée donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{q_n} \neq 0$ et donc (q_n) converge vers $q := \dfrac{1}{r - \frac{1}{p}} \in \mathbb{N}^*$.
Ainsi $r = \dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{n}$ avec $p, q \in \mathbb{N}^*$.
Supposons qu'une des suites $(p_n), (q_n)$ est bornée et que l'autre ne l'est pas. On suppose sans perte de généralité que (p_n) n'est pas bornée et que (q_n) l'est. On montre (cf. lemme des pics dans l'exo de Bolzano Weierstrass) que de toute suite réelle on peut extraire une suite monotone. Donc quitte à extraire on peut supposer (p_n) monotone. (p_n) n'est pas décroissante puisque étant minorée elle serait bornée. (p_n) est donc une suite croissante non bornée : elle diverge vers $+\infty$.
Ainsi $\dfrac{1}{q_n} = r_n - \dfrac{1}{p_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} r$. Comme (q_n) est bornée, $r \neq 0$ et donc (q_n) converge vers une limite $q \in \mathbb{N}^*$ puis $r = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{p_n} + \dfrac{1}{q_n} = \dfrac{1}{q}$.
Enfin supposons (p_n) et (q_n) non bornées. Quitte à extraire on peut supposer (p_n) croissante, et donc de limite $+\infty$. Alors $\dfrac{1}{q_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} r$. Si $r \neq 0$, (q_n) converge vers $\dfrac{1}{r}$ et est donc bornée. On en déduit que $r = 0$.
Ainsi $\overline{E} = \{0\} \cup \left\{\dfrac{1}{n},\ n \in \mathbb{N}^*\right\} \cup E$.

Remarque : On aurait aussi pu extraire de manière à ce que (p_n) et (q_n) soient bornée(s)/monotone(s), ce qui revient à dire qu'un produit cartésien de compacts est compact. Cela nous évite d'avoir à montrer que $\left(\dfrac{1}{q_n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ converge à chaque fois.

XIII.8.7 Partie ouverte et fermée simultanément ★★★

[Enoncé]
Je rajouterai un joli dessin
$E \subset \overline{E} \implies E = \overline{E}$ et $\overline{\emptyset} = \bigcap\limits_{F \text{ fermé dans } E} F \subset \bigcap\limits_{r>0} B_f(0,r) = \emptyset \implies \overline{\emptyset} = \emptyset$. Donc E et $\emptyset$ sont fermés. Leurs complémentaires sont donc ouverts i.e E et $\emptyset$ sont ouverts et fermés dans E.
Fixons maintenant une partie $A \subset E$ ouverte et fermée dans E. Supposons qu'elle est non vide et donnons nous $a \in A$. On fixe $b \in E \backslash \{a\}$.
Posons $\varphi : \begin{cases} [0,1] & \longrightarrow & [a,b] \\ t & \longmapsto & (1-t)a + tb \end{cases}$. On note $s = \sup\{t \in [0,1],\ \varphi(t) \in A\}$ qui est bien définie puisque $\varphi(0) = a \in A$. On remarque d'ailleurs que le caractère ouvert de A assure que $s > 0$. On va montrer que $s = 1$.
Montrons d'abord que le sup est atteint. On sait qu'il existe une suite $s_n \in [0,1]^{\mathbb{N}}$ telle que $s_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} s$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ \varphi(s_n) \in A$.
φ est continue car affine donc $\varphi(s_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \varphi(s)$.
De plus A est fermée donc $(\forall n \in \mathbb{N},\ \varphi(s_n) \in A) \implies \varphi(s) \in A$. Ainsi $s \in \{t \in [0,1],\ \varphi(t) \in A\}$.
Supposons maintenant par l'absurde $s < 1$. Comme A est ouverte, $\varphi(s) \in A \implies \exists r > 0,\ B(\varphi(s), r) \subset A$. On peut toujours supposer $r \leq 1$. Mais alors pour $s' = \dfrac{s+r}{2} \in [0,1]$,

$$\|\varphi(s') - \varphi(s)\| = \|(s'-s)(b-a)\| = (s'-s)\|b-a\| = \frac{r-s}{2}\|b-a\|$$

$\frac{r-s}{2}\|b-a\| < r \iff r-s < \frac{2r}{\|b-a\|} \iff r < \frac{\|b-a\|\,s}{\|b-a\|-2}$ donc quitte à prendre r plus petit on peut considérer que l'inégalité est vérifiée. (elle l'est automatiquement si $\|b-a\| = 2$).
Ainsi $s' > s$ et $s' \in \{t \in [0,1],\ \varphi(t) \in A\}$. Ceci est absurde donc $s = 1$ et par suite $b \in A$.
Finalement $A = E$.

XIII.8.8 Opérations sur les adhérences/intérieurs

[Corrigé]

XIII.8.9 Les sept espaces de Kuratowski ★★★

[Enoncé]
Il n'y a pas vraiment de méthode pour trouver un tel ensemble. On peut essayer de le construire par étape. Il faut jouer avec des parties de $\mathbb{R}$ dont on connaît l'adhérence/l'intérieur comme par exemple les intervalles.
On veut $A \neq \mathring{A}$ et $A \neq \overline{A}$ il faut donc déjà une partie ni ouverte ni fermée. Prenons par exemple $I = [0,1[$.
Cela ne suffit pas puisque $\overline{I} = [0,1] = \overline{\mathring{I}}$ par exemple. Un intervalle ne suffit donc pas, essayons avec plusieurs. Prenons $J = [0,1[\cup]1,2[$. Pour faciliter les calculs on a les relations de l'exercice précédant (cf.[l'exo que j'ai rajouté avant]).
On a

$$\mathring{J} =]0,1[\cup]1,2[,\ \overline{J} = [0,2],\ \mathring{\overline{J}} =]0,2[,\ \overline{\mathring{J}} = [0,2]$$

On peut éviter la dernière égalité en prenant $J' = J \cup \{3\}$: $\overline{J'} = [0,2] \cup \{3\}$ et $\overline{\mathring{J'}} = [0,2]$.
On sait aussi que $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ et $\mathring{\mathbb{Q}} = \emptyset$ (car $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$).
Finalement $A = [0,1[\cup]1,2[\cup\{3\} \cup (]4,5[\cap\mathbb{Q})$ fonctionne :

$$\mathring{A} =]0,1[\cup]1,2[,\ \overline{A} = [0,2] \cup \{3\} \cup [4,5],\ \mathring{\overline{A}} =]0,2[\cup]4,5[,\ \overline{\mathring{A}} = [0,2],\ \mathring{\overline{A}} =]0,2[,\ \overline{\mathring{\overline{A}}} = [0,2] \cup [4,5]$$

XIII.8.10 Intérieur d'un sous-espace ★★

[Enoncé]

1. Supposons que F est ouvert. Soit $x \in E\backslash\{0\}$.
   $0 \in F$ donc comme F est ouvert, $\exists r > 0,\ B(0,r) \subset F$. $y = \frac{r}{2\|x\|}x \in B(0,r)$ donc $y \in F$. Puis comme F est un espace vectoriel, $x = \frac{2\|x\|}{r}y \in F$.
   Ainsi $F = E$.
2. Supposons que $\mathring{F} \neq \emptyset$. Il existe donc $x_0 \in F$ et $r > 0$ tel que $B(x_0,r) \subset F$. Soit $x \in E\backslash\{0\}$.
   $y = x_0 + \frac{r}{2\|x\|}x \in B(x_0,r)$ donc comme F est un espace vectoriel et comme $x_0 \in F$,
   $x = \frac{2\|x\|}{r}(y - x_0) \in F$.
   Ainsi $F = E$.

XIII.8.11 Adhérence d'un sous-espace ★★★

[Enoncé]

1. $F \subset \overline{F}$ donc $0 \in \overline{F}$. Fixons $x, y \in \overline{F}$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.
   Il existe des suites $(x_n), (y_n) \in F^{\mathbb{N}}$ qui convergent respectivement vers x et y.
   Alors comme F est un espace vectoriel $(x_n + \lambda y_n) \in F^{\mathbb{N}}$. De plus, $x_n + \lambda y_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} x + \lambda y$. Donc $x + \lambda y \in \overline{F}$.
   On en déduit que $\overline{F}$ est un sous-espace vectoriel de E.
2. 1ère méthode :
   Soit $(x_n) \in F^{\mathbb{N}}$ une suite qui converge vers $x \in E$. Puisque (x_n) converge, elle est bornée. Il existe donc $M > 0$ telle que $\forall n \in \mathbb{N},\ x_n \in B_f(0,M)$. Alors (x_n) est une suite de $K := F \cap B_f(0,M)$ qui est un fermé relatif à F borné. Comme F est de dimension finie, K est compact et donc (x_n) admet une valeur d'adhérence dans K, a fortiori

dans F.
x étant la seule valeur d'adhérence de (x_n), on en déduit que $x \in F$ puis que F est fermé.

2nd méthode :
Soit $(x_n) \in F^{\mathbb{N}}$ une suite qui converge vers $x \in E$. Fixons une base $(e_1, \dots, e_d)$ de F. On la complète en une base $(e_i)_{i\in I}$ de E.
$\forall n \in \mathbb{N},\ \exists a_1^n, \dots, a_d^n \in \mathbb{K},\ x_n = \sum_{k=1}^{d} a_k^n e_k$. On note aussi $x = \sum_{j\in J} a_j e_j$ où J est une sous-famille finie de I.
Comme (x_n) converge vers x dans E, il y a convergence coordonnées par coordonnées.
Alors $\forall j \in J\backslash[\![1;d]\!],\ a_j = \lim_{n\to+\infty} 0 = 0$. Par conséquent $x = \sum_{j=1}^{d} a_j e_j \in F$.
Remarque : Cette preuve repose sur l'existence d'une base dans un espace vectoriel quelconque, ce qui se déduit du théorème de la base incomplète qui est équivalent à l'axiome du choix (ou plutôt au lemme de Zorn). La première preuve permet d'éviter de telles considérations.

3ème méthode : (hors-programme)
On montre qu'un sous-espace vectoriel de dimension finie d'un espace vectoriel normé est complet et donc a fortiori fermé (cf. l'exo qui montre que $\mathbb{R}$ est complet **??** : je vais rajouter des questions pour arriver à ce résultat).

3. Soit $a \in E$ tel que $E = H \oplus \text{Vect}(a)$. Supposons que H n'est pas fermé dans E. Alors il existe une suite $(h_n) \in H^{\mathbb{N}}$ qui converge vers un élément $x \in E\backslash H$.
On sait alors qu'il existe un couple $(h, \lambda) \in H \times \mathbb{K}^*$ tel que $x = h + \lambda a$. Fixons $y = h' + \lambda' a \in E$.
$y - \frac{\lambda'}{\lambda} x = h' - \frac{\lambda'}{\lambda} h \in H$.
Ainsi $\lambda y = \lambda y - \lambda' x + \lambda' x = \lim_{n\to+\infty} \lambda h' - \lambda' h + \lambda' h_n$ avec $\forall n \in \mathbb{N},\ \lambda h' - \lambda' h + \lambda' h_n \in H$. Ainsi $\lambda y \in \overline{H}$ et comme $\overline{H}$ est un espace vectoriel et $\lambda \neq 0$, $y \in \overline{H}$.
Par conséquent $\overline{H} = E$ c'est-à-dire H est dense dans E.

XIII.8.12 Graphe fermé ★★★

[Enoncé]

1. Supposons f continue. Soit $(x_n, y_n) \in G^{\mathbb{N}}$ convergeant vers $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ i.e $x = \lim_{n\to+\infty} x_n$ et $y = \lim_{n\to+\infty} y_n$.
$\forall n \in \mathbb{N},\ y_n = f(x_n)$. Donc comme f est continue, $f(x_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} f(x)$. Par unicité de la limite $y = f(x)$ i.e $(x, y) \in G$.

2. Supposons f bornée et G fermé. Soient $x \in \mathbb{R}$ et $(x_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ convergeant vers x.
$(f(x_n))$ est une suite bornée de $\mathbb{R}$, d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass elle admet une sous-suite $f(x_{\varphi(n)})$ convergente. On note ℓ sa limite.
$((x_{\varphi(n)}, f(x_{\varphi(n)}))$ est une suite convergente de G, sa limite est donc dans G. Par conséquent $(x, \ell) \in G$, c'est-à-dire $\lim_{n\to+\infty} f(x_{\varphi(n)}) = \ell = f(x)$.
Ainsi f est continue.

3. La fonction $f : x \mapsto \begin{cases} \frac{1}{|x|} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ fournit un contre-exemple.
En effet, si $\left(x_n, \frac{1}{|x_n|}\right) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} (x, y) \in \mathbb{R}^2$ alors :
   - Si $x \neq 0$ on se retrouve dans le cas de la question 1 et $y = \frac{1}{|x|}$;
   - Si $x = 0$ alors $y = +\infty$ ce qui est absurde.

   Par conséquent le graphe de f est fermé, pourtant f n'est pas continue en 0.

XIII.8.13 Application linéaire continue ★★

[Enoncé]

1. On pose $\varphi : f \in \mathcal{C}([0,1],\mathbb{R}) \mapsto f(1)$.
   $\forall f \in \mathcal{C}([0,1],\mathbb{R}),\ |\varphi(f)| \leq \|f\|_\infty$ donc $\varphi \in E^*$.
   Pourtant, pour $f_n : x \mapsto x^n$, $\dfrac{\|f_n\|_1}{|\varphi(f_n)|} = \dfrac{1}{n+1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. Donc $\varphi \notin F^*$.
2. On montre aisément que :
   $$\|f\|_1 \leq \|f\|_\infty$$
   Ainsi pour une application φ continue sur F, on a :
   $$\exists C \in \mathbb{R}_+, \forall f \in \mathcal{C}^0([0,1],\mathbb{R}),\ |\varphi(f)| \leq C\|f\|_1 \leq C\|f\|_\infty$$
   Et donc φ est continue sur E.

XIII.8.14 Application linéaire non continue ★★

[Enoncé]
Oui : On considère l'opérateur de dérivation $D : f \in E \mapsto f'$ et la suite des fonctions $f_n : x \mapsto e^{nx}$. On remarque alors que $D(f_n) = nf_n$
Si N est une norme sur E alors $\dfrac{N(D(f_n))}{N(f_n)} = n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$. Donc D n'est pas continue sur (E,N).

XIII.8.15 Polynômes réels de degré n scindés à racines simples sur $\mathbb{R}$ ★★★★

[Enoncé]

1. Soit $P = \Lambda\prod_{i=1}^{n}(X - x_i) \in A$ avec $x_1 < \cdots < x_n$. On fixe $(a_0,\dots,a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ telle que,
   $$a_0 < x_1 < a_1 < x_2 < \cdots < a_{n-1} < x_n < a_n$$
   On pose l'application $\psi : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_n[X] & \longrightarrow & \mathbb{R}^{n+1} \\ P & \longmapsto & (P(a_0),\dots,P(a_n)) \end{array} \right.$.
   D'après le TVI, $\forall i \in [\![0;n-1]\!],\ P(a_i)P(a_{i+1}) < 0$.
   Ainsi, $P \in U = \psi^{-1}\left(\prod_{i=0}^{n}(-1)^i\mathbb{R}_+^*\right) \cup \psi^{-1}\left(\prod_{i=0}^{n}(-1)^{i+1}\mathbb{R}_+^*\right)$.
   $\prod_{i=0}^{n}(-1)^i\mathbb{R}_+^*$ et $\prod_{i=0}^{n}(-1)^{i+1}\mathbb{R}_+^*$ sont des ouverts de $\mathbb{R}^{n+1}$ et ψ est continue car linéaire sur $\mathbb{R}_n[X]$ qui est de dimension finie, donc U est un ouvert de $\mathbb{R}_n[X]$.
   Enfin, un polynôme de U est dans A car il est de degré inférieur à n et change $n+1$ fois de signe.
   On a donc montré que de tout polynôme de A on peut construire un ouvert inclus dans A et contenant ce polynôme : A est ouvert.
2. On va montrer que l'adhérence de A est l'ensemble S des polynômes de degré n scindés sur $\mathbb{R}$.
   Fixons $P = \Lambda\prod_{i=1}^{n}(X - x_k) \in S$. (Les x_i sont donc potentiellement égaux).
   Posons pour tout $k \in \mathbb{N}$, $P_k = \Lambda\prod_{i=1}^{n}(X - y_{k,i})$ avec $\forall i \in [\![1;n]\!],\ y_{k,i} = x_i - \dfrac{1}{k+i}$.
   Soient $k \in \mathbb{N}$ et $i,j \in [\![1;n]\!]$ distincts.
   Si $x_i = x_j$ alors $y_{k,i} \neq y_{k,j}$.
   Sinon, $|y_{k,i} - y_{k,j}| = \left|x_i - x_j - \left(\dfrac{1}{k+j} - \dfrac{1}{k+i}\right)\right| \geq \left||x_i - x_j| - \left|\dfrac{1}{k+j} - \dfrac{1}{k+i}\right|\right| = \left||x_i - x_j| - \dfrac{|i-j|}{(k+j)(k+i)}\right|$.
   Or APCR $\left(k \geq \sqrt{\dfrac{|i-j|}{|x_i - x_j|}} - \min(i,j)\right)$, $|x_i - x_j| > \dfrac{|i-j|}{(k+j)(k+i)}$ d'où $\left||x_i - x_j| - \dfrac{|i-j|}{(k+j)(k+i)}\right| > 0$.
   Ainsi, $P_k \in A$.
   Comme $P_k \underset{k\to+\infty}{\longrightarrow} P$, on a $P \in \overline{A}$ puis $S \subset \overline{A}$.

   Il reste à montrer que S est fermé.

On rappelle que $\mathbb{R}_n[X]$ est fermé en tant que sous-espace vectoriel de dimension finie.
On se donne une suite $(Q_k) = \left(\Lambda_k \prod_{i=1}^{n}(X - z_{k,i})\right) \in S^{\mathbb{N}}$ qui converge vers un polynôme $Q = \Lambda \prod_{i=1}^{n}(X - z_i) \in \mathbb{R}_n[X]$ avec $z_1, \dots, z_n$ des complexes. On travaillera ici avec la norme uniforme afin que la suite de fonction polynomiale associée à (Q_k) converge uniformément, et a fortiori simplement, vers la fonction polynomiale associée à Q.
Tout d'abord, chacun des coefficients de Q est limite des coefficients de (Q_k) donc $\Lambda_k \underset{k\to+\infty}{\longrightarrow} \Lambda$.
Montrons ensuite que si P est dans S de coefficient dominant μ, alors $\forall \omega \in \mathbb{C},\ |P(\omega)| \geq |\mu||\mathrm{Im}(\omega)|^n$.
Soient $P = \mu \prod_{i=1}^{n}(X - \omega_i) \in S$ et $\omega \in \mathbb{C}$.
$|P(\omega)| = |\mu| \prod_{i=1}^{n} |\omega - \omega_i| \geq |\mu| \prod_{i=1}^{n} \mathrm{Im}(\omega - \omega_i)$.
Or $\forall i \in [\![1; n]\!],\ \omega_i \in \mathbb{R} \implies \mathrm{Im}(\omega - \omega_i) = \mathrm{Im}(\omega)$.
Ainsi, $|P(\omega)| \geq |\mu| \prod_{i=1}^{n} \mathrm{Im}(\omega) = |\mu||\mathrm{Im}(\omega)|^n$.
On peut alors écrire, $\forall i \in [\![1; n]\!],\ \forall k \in \mathbb{N},\ |Q_k(z_i)| \geq |\Lambda_k||\mathrm{Im}(z_i)|^n$.
d'où en passant à la limite, $\forall i \in [\![1; n]\!],\ 0 = |Q(z_i)| \geq |\Lambda||\mathrm{Im}(z_i)|^n$.
Λ étant non nul en tant que coefficient dominant, on sait alors que $\forall i \in [\![1; n]\!],\ \mathrm{Im}(z_i) = 0$ ou encore que $\forall i \in [\![1; n]\!],\ z_i \in \mathbb{R}$ ou encore que $Q \in S$.

Finalement $\overline{A} = S$.

XIII.8.16 Lemme de Riemann-Lebesgue ★★★

[Enoncé]

— Posons $(x_0, \dots, x_n)$ une subdivision de $[a, b]$ adaptée à ϕ, c'est à dire telle que $x_0 = a < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$ et que ϕ soit constante sur les intervalles $]x_k, x_{k+1}[$ pour $k \in [\![0; n-1]\!]$. On note $\alpha_k = \phi(x_k)$.
$$\left|\int_a^b e^{i\lambda t}\phi(t)dt\right| = \left|\sum_{k=0}^{n-1}\int_{x_k}^{x_{k+1}} e^{i\lambda t}\phi(t)dt\right| = \left|\sum_{k=0}^{n-1}\int_{x_k}^{x_{k+1}} e^{i\lambda t}\alpha_k dt\right| = \left|\sum_{k=0}^{n-1}\frac{\alpha_k(e^{i\lambda x_{k+1}} - e^{i\lambda x_k})}{i\lambda}\right| \leq \sum_{k=0}^{n-1}\frac{2|\alpha_k|}{\lambda} \underset{\lambda\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$$

— ϕ est limite uniforme d'une suite de fonctions en escaliers $(\phi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sur $[a, b]$:
Posons $I_n : \lambda \mapsto \int_a^b \phi_n(t)e^{i\lambda t}dt$ et $I : \lambda \mapsto \int_a^b \phi(t)e^{i\lambda t}dt$.
$\forall n \in \mathbb{N},\ \forall \lambda \in \mathbb{R},\ |I(\lambda) - I_n(\lambda)| \leq \int_a^b |\phi(t) - \phi_n(t)| \cdot e^{i\lambda t}|dt \leq (b-a)||\phi - \phi_n||_{\infty,[a,b]}$.
Donc $\forall n \in \mathbb{N},\ ||I - I_n||_{\infty,\mathbb{R}} \leq (b-a)||\phi - \phi_n||_{\infty,[a,b]}$. D'où $||I - I_n||_{\infty,\mathbb{R}} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ et $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers I sur $\mathbb{R}$.
Ainsi d'après le théorème de la double limite :

$$\lim_{\lambda\to+\infty} I(\lambda) = \lim_{\lambda\to+\infty}\lim_{n\to+\infty} I_n(\lambda) = \lim_{n\to+\infty}\lim_{\lambda\to+\infty} I_n(\lambda) = \lim_{n\to+\infty} 0 = 0$$

— Soit $\varepsilon > 0$. Puisque ϕ est intégrable sur $\mathbb{R}$, les intégrales $\int_0^{+\infty} ||\phi(t)||dt$ et $\int_{-\infty}^{0} ||\phi(t)||dt$ convergent.
Donc $\lim_{b\to+\infty}\int_b^{+\infty} ||\phi(t)||dt = 0$ et $\lim_{a\to-\infty}\int_{-\infty}^{a} ||\phi(t)||dt = 0$.
Ainsi, $\exists (a, b) \in \mathbb{R}^2,\ a < b \wedge \int_b^{+\infty} ||\phi(t)||dt < \frac{\varepsilon}{3} \wedge \int_{-\infty}^{a} ||\phi(t)||dt < \frac{\varepsilon}{3}$.
Aussi, d'après la question précédente, $\lim_{\lambda\to+\infty}\left|\int_a^b \phi(t)e^{i\lambda t}dt\right| = 0$.
Donc $\exists \lambda_0 \in \mathbb{R},\ \forall \lambda > \lambda_0,\ \left|\int_a^b \phi(t)e^{i\lambda t}dt\right| < \frac{\varepsilon}{3}$.

Finalement,

$$\begin{aligned}\forall \lambda > \lambda_0,\ \left|\int_{-\infty}^{+\infty} \phi(t)e^{i\lambda t}dt\right| &\leq \left|\int_{-\infty}^{a} \phi(t)e^{i\lambda t}dt\right| + \left|\int_{a}^{b} \phi(t)e^{i\lambda t}dt\right| + \left|\int_{b}^{+\infty} \phi(t)e^{i\lambda t}dt\right| \\ &< \int_{b}^{+\infty} ||\phi(t)||dt + \frac{\varepsilon}{3} + \int_{-\infty}^{a} ||\phi(t)||dt \\ &< \varepsilon\end{aligned}$$

C'est à dire $\lim\limits_{\lambda\to+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(t)e^{i\lambda t}dt = 0$.

XIII.8.17 Borel-Lebesgue (HP)

[Enoncé]
Par souci de facilité, on raccourcira Borel-Lebesgue par BL et Bolzano-Weierstrass par BW.
Montrons que BL-compact implique BW-compact.
Supposons que E est BL-compact.
Soit (x_n) une suite de E.
Supposons que (x_n) n'a pas de valeur d'adhérence.
Alors pour tout $y \in E$, il existe un ouvert de E, U_y qui contient y tel que

$$\{k, x_k \in U_y\} \text{ est fini}$$

La famille (U_y) est un recouvrement de E donc il existe une famille finie $(y_1, \dots, y_p)$ telle que :

$$\bigcup_{i=1}^{p} U_{y_i} = E$$

donc

$$\{k, x_k \in E\} \text{ est fini}$$

ce qui est absurde.
Réciproquement montrons que BW-compact implique BL-compact.
Supposons que E est BW-compact.
On pose $d(x, y) = \|x - y\|$ pour tout $(x, y) \in E^2$. Soit $(U_i)_{i\in I}$ un recouvrement de E par des ouverts.
On a la proposition suivante :

$$\exists r > 0 \text{ tel que } \forall x \in E, \exists i_x \text{ tel que } B(x, r) \subset U_{i_x}$$

En effet, si ce n'est pas le cas, il existe $(x_n) \in E^{\mathbb{N}}$ tel que pour tout $i \in I$, $B\left(x, \frac{1}{n}\right) \not\subset U_i$.
Passant à une sous-suite $x_{\varphi(n)}$, on a que :

$$x_{\varphi(n)} \to x$$

Or il existe $i \in I$ tel que $x \in U_i$ donc il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B(x, \varepsilon) \subset U_i$ car U_i est un ouvert. Soit $n \in \mathbb{N}$,

$$d(x, x_{\varphi(n)}) + \frac{1}{\varphi(n)} < \varepsilon$$

de sorte que

$$B\left(x_{\varphi(n)}, \frac{1}{\varphi(n)}\right) \subset B(x, \varepsilon) \subset U_i$$

ce qui est absurde. Il suffit de montrer que le recouvrement $E = \bigcup_{x\in E} B(x, r)$ admet un sous-recouvrement fini.
En effet, s'il existe $x_1, \dots, x_n \in E$ tels que $E = \bigcup_{i=1}^{n} B(x_i, r)$ alors pour tout $i \in [\![1; n]\!]$, $\exists j_i \in I$, $B(x_i, r) \supset U_{j_i}$ donc $\bigcup_{i=1}^{n} U_{j_i} = E$.
S'il n'existe pas de sous-recouvrement fini de $E \bigcup_{i=1}^{n} B(x_i, r)$, on peut construire récursivement une suite (x_n) comme suit :

i. x_0 un point quelconque de E
ii. $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \notin \bigcap_{i=1}^{n-1} B(x_i, r)$

l'existence de x_n est garantie si E ne peut pas être recouvert par des boules de rayon r.
Ainsi :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall m < n, d(x_m, x_n) > r$$

Donc la suite (x_n) n'a pas de sous-suite de Cauchy, ce qui est impossible car E est BW-compact.

XIII.8.18 Parties compactes d'un espace vectoriel normé de dimension finie ★★

[Enoncé]

1. Soit $K \subset E$ une partie compacte. Soit $(x_n) \in K^{\mathbb{N}}$ qui converge vers $x \in E$.
   Comme K est compacte, la suite (x_n) admet une valeur d'adhérence dans K. Par ailleurs (x_n) converge vers x donc sa seule valeur d'adhérence est x. On en déduit que $x \in K$ et donc que K est fermée.
2. Soient $F \subset K \subset E$ avec F fermée et K compacte. Soit $(x_n) \in F^{\mathbb{N}}$.
   $(x_n) \in K^{\mathbb{N}}$ donc comme K est compacte, il existe une sous-suite (y_n) de (x_n) qui converge dans K. Or $(y_n) \in F^{\mathbb{N}}$ donc comme F est fermée, (y_n) converge dans F.
   Ainsi F est compacte.
3. Montrons que le produit cartésien de deux compacts de E est compact. On procédera ensuite par récurrence sur le nombre de compacts dans le produit.
   Soit K_1, K_2 deux compacts de E. Soit (u_n, v_n) une suite de vecteurs de $K_1 \times K_2$.
   Comme K_1 est compact, il existe une extractrice φ telle que $(u_{\varphi(n)})$ converge dans K_1. Alors $(v_{\varphi(n)}) \in K_2^{\mathbb{N}}$ donc comme K_2 est compact, il existe une extractrice ψ telle que $(v_{\varphi\circ\psi(n)})$ converge dans K_2. Alors $(u_{\varphi\circ\psi(n)})$ converge en tant que sous-suite d'une suite convergente. De plus sa limite est dans K_1. On conclut que $(u_{\varphi\circ\psi(n)}, v_{\varphi\circ\psi(n)})$ converge dans $K_1 \times K_2$.
   Ainsi $K_1 \times K_2$ est compact.
   Supposons que tout produit cartésiens de p compacts de E est un compact de E. Fixons $K_1, \dots, K_{p+1}$ des compacts de E. Alors par hypothèse de récurrence $\prod_{i=1}^{p} K_i$ est compact. Puis par ce que l'on vient de démontrer, $\left(\prod_{i=1}^{p} K_i\right) \times K_{p+1} = \prod_{i=1}^{p+1} K_i$ est compact.
4. C'est le théorème de Bolzano-Weierstrass.
5. On fixe une base $(e_1, \dots, e_d)$ de E.
   On dispose d'un isomorphisme $f : E \to \mathbb{R}^d$. Comme E et $\mathbb{R}^d$ sont de dimensions finies, f et f^{-1} sont continues. On sait de plus que l'image directe d'une partie compacte/bornée par une application continue est une partie compacte/bornée et que l'image réciproque d'une partie fermée par une application continue est fermée. Ainsi une partie A de E est compacte/fermée/bornée ssi $f(A)$ est compacte/fermée/bornée dans $\mathbb{R}^d$. Il suffit donc de montrer le résultat dans $\mathbb{R}^d$.
   Soit K un compact de $\mathbb{R}^d$. D'après la question 1, K est fermé dans $\mathbb{R}^d$. Supposons par l'absurde que K n'est pas bornée.
   Alors il existe une suite $(x_n) \in K^{\mathbb{N}}$ telle que $\|x_n\| \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$. K est compact donc il existe une sous-suite (y_n) de (x_n) qui converge. Mais alors par continuité de $\|\cdot\|$ qui est 1-lipschitzienne, $(\|y_n\|)$ converge. Par ailleurs $\|y_n\| \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$ comme suite extraite de $(\|x_n\|)$. Ceci est absurde d'où K est borné.
   Réciproquement, soit K une partie fermée bornée de $\mathbb{R}^d$. On rappelle que toutes les normes de $\mathbb{R}^n$ sont équivalentes, donc K est bornée pour la norme uniforme ; càd qu'il existe $M \geq 0$ tel que $K \subset \{x \in \mathbb{R}^d,\ \|x\|_\infty \leq M\} = [-M, M]^d$. Or d'après les questions 3 et 4 $[-M, M]^d$ est un compact de $\mathbb{R}^d$. Enfin K est fermée donc d'après la question 2, K est compacte.

XIII.8.19 Somme de sous-espaces ★★★

[Enoncé]

1. Soient A, B des compacts de E. On munit E^2 de la norme $\|\cdot\|_1 : (a,b) \mapsto \|a\| + \|b\|$. L'application
$$s : \left\{ \begin{array}{ccc} E^2 & \longrightarrow & E \\ (a,b) & \longmapsto & a+b \end{array} \right.$$
   est linéaire et de plus, $\forall (a,b) \in E^2,\ \|s(a,b)\| \leq \|(a,b)\|_1$. Donc s est continue. On sait que $A \times B$ est compact dans E^2 comme produit de compacts donc $s(A \times B) = A + B$ est compact dans E.
2. Soient K un compact et F un fermé de E. Fixons $(z_n) \in (K+F)^{\mathbb{N}}$ une suite convergente de limite $z \in E$.
   $\forall n \in \mathbb{N},\ \exists (k_n, f_n) \in K \times F,\ z_n = k_n + f_n$. Comme K est compact, on peut extraire de k_n une suite $(k_{\varphi(n)})$

convergente. On note k sa limite.
Alors par différence $f_{\varphi(n)} = z_{\varphi(n)} - k_{\varphi(n)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} z - k := f$. De surcroît F est fermé donc $f \in F$. Ainsi $z = k + f$ avec $(k, f) \in K \times F$.
On conclut que $K + F$ est fermé dans E.

3. On ne peut pas assurer que la somme de deux fermés est fermée :
   — Dans $E = \mathbb{R}^2$ pour $F_1 = \mathbb{R} \times \{0\}$ et $F_2 = f^{-1}([1, +\infty[)$ avec $f : (x, y) \mapsto xy$, $F_1 + F_2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ n'est pas fermé.
   — Dans $E = \mathbb{R}$ on peut prendre $F_1 = \mathbb{Z}$ et $F_2 = \pi\mathbb{Z}$. On montre classiquement (cf. sous-groupes de $\mathbb{R}$) que $\overline{F_1 + F_2} = \mathbb{R}$.

XIII.8.20 Un théorème du point fixe ★★★

[Enoncé]

1. On considère $g : x \mapsto \|f(x) - x\|$. On remarque que f est continue (cela découle directement de la propriété que vérifie f) donc g est continue par composition de fonctions continues. K est compact donc g atteint son minimum sur K. Notons a qui réalise ce minimum. Supposons $f(a) \neq a$.
Alors $g(f(a)) \left\|f^2(a) - f(a)\right\| < \|f(a) - a\| = g(a)$ ce qui est absurde. Ainsi $f(a) = a$.
Montrons l'unicité. Soit $b \neq a$ tel que $f(b) = b$.
Alors $\|b - a\| = \|f(b) - f(a)\| < \|b - a\|$ ce qui est absurde. Donc $b = a$.

2. On note pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_n = f^n(x_0)$.
$\forall n \in \mathbb{N}$, $\|x_{n+1} - a\| = \|f(x_n) - f(a)\| \leq \|x_n - a\|$
La suite $(\|x_n - a\|)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante et minorée (par 0), d'après le théorème de la limite monotone elle converge vers un réel ℓ. Or la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est à valeurs dans K qui est compact, on peut donc en extraire une suite $(x_{\varphi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ qui converge vers une vecteur $x \in K$. Par continuité de f, $x_{\varphi(n)+1} = f(x_{\varphi(n)}) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} f(x)$.
On sait que $\lim\limits_{n\to+\infty} \left\|x_{\varphi(n)} - a\right\| = \lim\limits_{n\to+\infty} \left\|x_{\varphi(n)+1}\right\| = \|\ell - a\|$. Par ailleurs, $\lim\limits_{n\to+\infty} \left\|x_{\varphi(n)} - a\right\| = \|x - a\|$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \left\|x_{\varphi(n)+1} - a\right\| = \|f(x) - a\|$. Par unicité de la limite, $\|x - a\| = \|f(x) - a\| = \|f(x) - f(a)\|$. Donc $x = a$.
On a montré que la seule valeur d'adhérence de $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est a, càd $\lim\limits_{n\to+\infty} f^n(x_0) = a$.

XIII.8.21 Espace des endomorphismes préservant un compact ★★★★

[Enoncé]
E et $\mathcal{L}(E)$ étant de dimensions finies, la notion de compacité ne dépend pas de la norme choisie. On fait le choix de considérer une norme $\|\cdot\|$ sur E et de travailler avec sa norme subordonnée $|||\cdot|||$ sur $\mathcal{L}(E)$.

Commençons par montrer que $\mathcal{L}_K$ est toujours fermé.
Soit $(f_n) \in \mathcal{L}_K^{\mathbb{N}}$ qui converge dans $\mathcal{L}(E)$ vers une fonction f. On fixe $x \in K$.
D'une part, la suite $(f_n(x))$ est à valeurs dans le compact K donc on peut en extraire une sous-suite qui converge vers un vecteur $\ell \in K$.
D'autre part, $\|f_n(x) - f(x)\| \leq |||f_n - f||| \, \|x\| \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. Donc $f_n(x) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} f(x)$.
Ainsi par unicité de la limite $f(x) = \ell \in K$ d'où $f \in \mathcal{L}_K$.
L'énoncé est donc réduit à montrer que $\mathcal{L}_K$ est borné si et seulement si $\text{Vect}(K) = E$.

Pour le sens direct on raisonne par contraposée : supposons que $\text{Vect}(K) \neq E$ et montrons que $\mathcal{L}_K$ n'est pas borné.
On considère un supplémentaire F de $\text{Vect}(K)$ dans E, qui est non nul par hypothèse. On peut construire des fonctions de $\mathcal{L}_K$ qui prennent des valeurs arbitraires sur F : par exemple la suite d'endomorphismes (f_n) définie par $\forall x \in K$, $f_n(x) = x$ et $\forall x \in F$, $f_n(x) = nx$ est à valeurs dans $\mathcal{L}_K$.
Or puisque F n'est pas réduit au sous-espace nul, pour $x \in F\backslash\{0\}$ on a $\dfrac{\|f_n(x)\|}{\|x\|} = n$ d'où $|||f_n||| \geq n$ puis $|||f_n||| \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$.
Donc $\mathcal{L}_K$ n'est pas borné.

Pour le sens réciproque, supposons que $\text{Vect}(K) = E$. On peut alors trouver une base $(e_1, \ldots, e_n)$ de E formée d'éléments de K.

Fixons $f \in \mathcal{L}_K$. On rappelle que $|||f||| = \sup_{\substack{x\in E\\ \|x\|=1}} \|f(x)\|$.

Fixons $x \in E$ unitaire. On sait que $x = \sum_{i=1}^{n} e_i^*(x)e_i$ avec e_i^* la i-ème forme linéaire coordonnée.

Par inégalité triangulaire, $\|x\| \leq \sum_{i=1}^{n} |e_i^*(x)| \, \|e_i\|$.

Or K est borné donc $\exists M \geq 0,\ \forall z \in K,\ \|z\| \leq M$. En outre, pour tout $i \in [\![1;n]\!]$, e_i^* est continue car linéaire sur E qui est de dimension finie et la sphère unité de E est compacte, toujours car E est de dimension finie. Donc e_i^* admet un maximum A_i sur la sphère unité de E.

On en déduit que $\|f(x)\| \leq M \sum_{i=1}^{n} A_i$ d'où $|||f||| \leq M \sum_{i=1}^{n} A_i$. Ceci montre que $\mathcal{L}_K$ est borné et cela conclut l'exercice.

XIII.8.22 Théorème de Heine ★★

[Enoncé]

Soient $(E, \|\cdot\|_E), (F, \|\cdot\|_F)$ deux espaces vectoriels normés, K un compact de E et $f : K \to F$ continue. Fixons $\varepsilon > 0$.

1ère méthode :

On note $d_E : (x,y) \in E^2 \mapsto \|x-y\|_E$ et $d_F : (x,y) \in F^2 \mapsto \|x-y\|_F$ ainsi que $X = \{(x,y) \in K^2,\ d_F(f(x),f(y)) \geq \varepsilon\}$.

On vérifie que d_E et d_F sont 1-lipschitziennes et donc continues. On en déduit que $g : (x,y) \in E^2 \mapsto d_F(f(x),f(y))$ est continue.

$X = g^{-1}([\varepsilon, +\infty[)$ est fermé dans K^2 qui est compact, c'est donc un compact. Ainsi d_E est minorée sur X et atteint sa borne inférieure sur X. On note η cette borne inférieure. Fixons $(x,y) \in K^2$ tels que $\|x-y\|_E < \eta$.

Par définition de η, $(x,y) \notin X$ alors $\|f(x)-f(y)\|_F = d_F(f(x),f(y)) < \varepsilon$.

Ainsi f est uniformément continue.

2ème méthode :

On raisonne par contraposée. Supposons que f n'est pas uniformément continue. Alors :

$$\exists \varepsilon > 0,\ \forall n \in \mathbb{N}^*,\ \exists (x_n,y_n) \in K^2,\ \left(\|x_n - y_n\|_E \leq \frac{1}{n} \wedge \|f(x_n)-f(y_n)\|_F \geq \varepsilon\right)$$

Comme K est compact on peut extraire une suite $(x_{\varphi(n)})$ qui converge vers un vecteur $x \in K$. Mais alors $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\|x - y_{\varphi(n)}\|_E \leq \|x - x_{\varphi(n)}\|_E + \|x_{\varphi(n)} - y_{\varphi(n)}\|_E \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. Autrement dit $\lim_{n\to+\infty} y_{\varphi(n)} = x$. Pourtant $(f(y_{\varphi(n)}))_{n\in\mathbb{N}^*}$ ne converge par vers $f(x)$ puisque APCR,

$$\|f(x) - f(y_{\varphi(n)})\|_F \geq \|f(x_{\varphi(n)}) - f(y_{\varphi(n)})\|_F - \|f(x) - f(x_{\varphi(n)})\|_F \geq \frac{\varepsilon}{2}$$

XIII.8.23 Lemme des compacts emboîtés ★

[Enoncé]

$\forall n \in \mathbb{N},\ \exists x_n \in K_n$. De plus, $\forall n \in \mathbb{N},\ K_{n+1} \subset K_n \subset K_0$.

Donc $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est à valeurs dans K_0 qui est compact.

Ainsi il existe $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $(x_{\varphi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ converge. On note x sa limite.

On va montrer que $x \in K$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. $\exists n_0 \in \mathbb{N},\ \varphi(n_0) \geq n$.

La suite $(x_{\varphi(k)})_{k\geq n_0}$ est à valeur dans $K_n \supset K_{\varphi(n_0)}$ qui est un fermé. Ainsi sa limite $x \in K_n$ puis, $x \in K = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} K_n$.

XIII.8.24 Théorème de Baire ★★★★★ (HP)

[Enoncé]

1. Soit $(\Omega_n) \in E^{\mathbb{N}^*}$ une suite d'ouverts denses dans E.
   Soit V un ouvert non vide de E. On va montrer que $V \cap \bigcap_{n\in\mathbb{N}^*} \Omega_n \neq \emptyset$.

Ω_1 et V sont ouvert donc $V \cap \Omega_1$ est ouvert comme intersection finie d'ouvert. De plus Ω_1 est dense dans E donc $V \cap \Omega_1 \neq \emptyset$.
Alors, $\exists x_1 \in V \cap \Omega_1$ et $\exists \varepsilon_1 \in \mathbb{R}_+^*,\ B(x_1, \varepsilon_1) \subset V \cap \Omega_1$.
Et alors, $\exists r_1 = \dfrac{\varepsilon_1}{2} \in \mathbb{R}_+^*,\ B_f(x_1, r_1) \subset V \cap \Omega_1$. Quitte à prendre plus petit on peut supposer $r_1 \leq 1$.
On va alors construire par récurrence des suites $(x_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ et $(r_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ telles que :

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}^*,\ r_n \leq \dfrac{1}{n} \\ \forall n \in [\![2; +\infty[\![,\ B_f(x_n, r_n) \subset U_n = \Omega_n \cap B(x_{n-1}, r_{n-1}) \\ B_f(x_1, r_1) \subset \Omega_1 \cap V \end{cases}$$

Supposons que r_{n-1} est bien définit pour un certain entier $n \geq 2$.
$U_n = \Omega_n \cap B(x_{n-1}, r_{n-1})$ est ouvert comme intersection finie d'ouvert. De plus, Ω_n est dense dans E donc $U_n \neq \emptyset$.
Alors, $\exists x_n \in U_n$ et $\exists \varepsilon_n \in \mathbb{R}_+^*,\ B(x_n, \varepsilon_n) \subset U_n$.
Et alors, $\exists r_n = \dfrac{\varepsilon_n}{2} \in \mathbb{R}_+^*,\ B_f(x_n, r_n) \subset U_n$. Quitte à prendre plus petit on peut supposer $r_n \leq \dfrac{1}{n}$.

Montrons que la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est de Cauchy.
Soit $k > n$ deux entiers non nuls.
Par définition, $x_k \in B(x_n, r_n)$ donc $||x_n - x_k|| < r_n \leq \dfrac{1}{n}$. Ainsi, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est de Cauchy.

Or E est complet donc $(x_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge. On note x sa limite.
Toujours par définition, $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \forall k \geq n,\ x_k \in B_f(x_n, r_n)$. Toutes ces boules sont des fermés donc par caractérisation séquentielle, $x \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}^*} B_f(x_n, r_n)$.
Et donc, $x \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}^*} \Omega_n$. et $x \in V$ car $x \in B_f(x_1, r_1)$.
Ainsi, $x \in V \cap \bigcap_{n\in\mathbb{N}^*} \Omega_n$.

2. Soit $(\Omega_n) \in E^{\mathbb{N}}$ une suite d'ouverts denses dans E.
Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, Ω_n^c le complémentaire dans E de Ω_n est fermé et $\overline{\Omega_n} = E$ d'où $(\mathring{\Omega_n^c}) = (\overline{\Omega_n})^c = \emptyset$. Ainsi par passage au complémentaire,

$$\overline{\bigcap_{n\in\mathbb{N}} \Omega_n} = E \iff \mathring{\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \Omega_n^c} = \emptyset$$

XIII.8.25 Volume d'une (hyper)boule ★★★★ (HP)

[Enoncé]

1. $n \in \mathbb{N}^*$.
Tout d'abord, en posant le changement de variable $y_i = \dfrac{x_i}{R}$ pour tout $i \in [\![1; n]\!]$,
$V_n(R) = \int \cdots \int_{(y_1,\dots,y_n)\in\mathcal{B}_n(1)} (R dy_1) \dots (R dy_n) = R^n V_n(1)$. Il suffit donc de déterminer $V_n(1) := V_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
$\forall (x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathcal{B}_{n+1}(1) \iff \left(-1 \leq x_{n+1} \leq 1 \wedge (x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{B}_n\left(\sqrt{1 - x_{n+1}^2}\right)\right)$
Donc $V_{n+1} = \displaystyle\int_{-1}^{1} \left(\int \cdots \int_{(x_1,\dots,x_n)\in\mathcal{B}_n\left(\sqrt{1-x_{n+1}^2}\right)} dx_1 \dots dx_n \right) dx_{n+1} = \int_{-1}^{1} V_n\left(\sqrt{1 - x_{n+1}^2}\right) dx_{n+1}$.
Et donc $V_{n+1} = \displaystyle\int_{-1}^{1} \left(\sqrt{1-x^2}\right)^n V_n dx = 2V_n \int_0^1 \left(\sqrt{1-x^2}\right)^n dx$.
Posons $x = \cos(\theta)$: $(*)$.
$\displaystyle\int_0^1 \left(\sqrt{1-x^2}\right)^n dx = \int_0^{\pi/2} \left(\sqrt{1-\cos^2(\theta)}\right)^n \sin(\theta) d\theta = \int_0^{\pi/2} \sin^{n+1}(\theta) d\theta$.
On reconnaît l'intégrale de Wallis et on montre alors classiquement que :

— $\displaystyle\int_0^1 \left(\sqrt{1-x^2}\right)^{2m} dx = \frac{2^{2m}(m!)^2}{(2m+1)!}$

— $\displaystyle\int_0^1 \left(\sqrt{1-x^2}\right)^{2m-1} dx = \frac{(2m)!}{2^{2m}(m!)^2}\cdot\frac{\pi}{2}$

Montrons par récurrence que pour tout entier naturel non nul n,

$$V_n = \begin{cases} \dfrac{\pi^m}{m!} & \text{si } n = 2m \\ \dfrac{2^{2m+1}m!}{(2m+1)!}\pi^m & \text{si } n = 2m+1 \end{cases}$$

Pour $n = 1$:

$V_1 = \displaystyle\int_{-1}^1 dx = 2 = \frac{2^1\pi^0}{1!}$.

Supposons le résultat vrai pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$.

Si n est pair alors on écrit $n = 2m$.

D'après $(*)$ on sait que $V_{n+1} = 2V_{2m}\dfrac{2^{2m}(m!)^2}{(2m+1)!}$.

Par hypothèse de récurrence on a $V_{2m+1} = \dfrac{2^{2m+1}m!}{(2m+1)!}\pi^m$.

Et si n est impair alors on écrit $n = 2m-1$.

D'après $(*)$ on sait que $V_{n+1} = 2V_{2m-1}\dfrac{(2m)!}{2^{2m}(m!)^2}\cdot\dfrac{\pi}{2}$.

Par hypothèse de récurrence on a $V_{2m} = \dfrac{\pi^m}{m!}$ ce qui conclut la récurrence.

Finalement, $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ V_n(R) = \begin{cases} \dfrac{\pi^m}{m!}R^{2m} & \text{si } n = 2m \\ \dfrac{2^{2m+1}m!}{(2m+1)!}\pi^m R^{2m+1} & \text{si } n = 2m+1 \end{cases}$

Remarque : On retrouve les formules bien connus $V_1(R) = 2R,\ V_2(R) = \pi R^2$ *et* $V_3(R) = \dfrac{4}{3}\pi R^3$.

2. La formule de Stirling $n! \underset{n\to+\infty}{\sim} \left(\dfrac{n}{e}\right)^n\sqrt{2\pi n}$ donne $\lim\limits_{m\to+\infty} V_{2m}(R) = 0 = \lim\limits_{m\to+\infty} V_{2m+1}(R)$. Donc $V_n(R) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.
Ce résultat montre que quand on augmente la dimension de l'espace, les boules ont tendances à se "contracter" en leur centre. Cela peut paraître surprenant car on pourrait penser que le volume ne fait qu'augmenter avec la dimension, comme il le fait pour des petites dimensions i.e celles auxquelles nous sommes habitués $n = 1, 2, 3$.
En fait le calcul donne pour la boule unité :
$V_1 = 2,\ V_2 = \pi \approx 3,14,\ V_3 = \dfrac{4\pi}{3} \approx 4,19,\ V_4 = \dfrac{\pi^2}{2} \approx 4,93,\ V_5 = \dfrac{8\pi^2}{15} \approx 5,26,\ V_6 = \dfrac{\pi^3}{6} \approx 5,16.$
A partir de $n = 6$ le volume ne cesse de décroître.

XIII.8.26 Partie fermée bornée non compacte ★★★

[Enoncé]

On se place dans l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}[X]$ que l'on muni de la norme uniforme $\left\|\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} a_n X^n\right\|_\infty = \sup\{|a_n|,\ n \in \mathbb{N}\}$ et on va montrer que la boule unité fermé $B = B_f(0,1)$ est fermée et bornée mais pas compacte dans E. (C'est un cas particulier du théorème de compacité de Riesz VIII.27)
Tout d'abord, B est évidemment fermée et bornée. Supposons par l'absurde que B est compacte.
$\forall n \in \mathbb{N},\ \|X^n\|_\infty = 1$ donc $(X^n) \in B^{\mathbb{N}}$. Par conséquent il existe une suite extraite $(X^{\varphi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ qui converge.
Or, si $n \in \mathbb{N}$ alors $\varphi(n+1) > \varphi(n)$ d'où $\left\|X^{\varphi(n+1)} - X^{\varphi(n)}\right\|_\infty = 2$.
Pourtant, $X^{\varphi(n+1)} - X^{\varphi(n)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.
Ceci est absurde donc B n'est pas compacte.
(On a d'ailleurs montré que la sphère unité n'est pas compacte ce qui est plus fort).

XIII.8.27 Théorème de compacité de Riesz ★★★★

[Enoncé]

1. a. $\mathrm{d}(x,F) = \inf_{y\in F} ||x-y||$.
   $\forall y \in F,\ ||x-y|| \geq 0$. Alors par caractérisation séquentielle de la borne inférieure puis de l'adhérence,
   $\mathrm{d}(x,F) = 0 \iff \exists (y_n) \in F^{\mathbb{N}},\ ||x-y_n|| \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0 \iff \exists (y_n) \in F^{\mathbb{N}},\ y_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} x \iff x \in \overline{F} = F$.
   Donc $\mathrm{d}(x,F) > 0$.
   b. $2\delta > \delta = \mathrm{d}(x,F)$ donc par définition de la borne inférieure $\exists v \in F,\ ||x-v|| \leq 2\delta$.
   De plus comme $v \in F,\ ||x-v|| \geq \mathrm{d}(x,F) > 0$.
   c. Soit $y \in F$.
   $||u-y|| = \dfrac{||\ x-v-||x-v||y\ ||}{||x-v||}$.
   Or $v + ||x-v||y \in F$ donc $||\ x-v-||x-v||y\ || \geq \delta$.
   Ainsi d'après la question précédente $\dfrac{1}{2}$ est un minorant de $\{||x-y||,\ y \in F\}$. On en déduit que $\mathrm{d}(u,F) \geq \dfrac{1}{2}$.
2. On suppose que E n'est pas de dimension finie. On peut alors se donner une suite $(e_n) \in E^{\mathbb{N}}$ libre.
   Posons pour tout $n \in \mathbb{N},\ F_n = \mathrm{Vect}(e_0,\dots,e_n)$.
   Soit $n \in \mathbb{N}$. F_n est un sous-espace vectoriel de E de dimension finie donc d'après le cours c'est un fermé de E. De plus, $F_n \neq E$ car $e_{n+1} \notin F_n$ par liberté.
   On peut donc à l'aide de la question 1 construire un vecteur $u_n \in B \cap F_{n+1}$ tel que $\mathrm{d}(u_n,F_n) \geq \dfrac{1}{2}$. (On prend $u_n = \dfrac{e_{n+1}-v_n}{||e_{n+1}-v_n||}$ pour un certain $v_n \in F_n$)
   Supposons par l'absurde que B est compacte. On peut alors extraire une suite $(u_{\varphi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ qui converge.
   Mais alors $u_{\varphi(n+1)} - u_{\varphi(n)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. Et de plus, $\forall n \in \mathbb{N},\ \varphi(n+1) \geq \varphi(n)+1$. Donc $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{\varphi(n)} \in F_{\varphi(n)+1} \subset F_{\varphi(n+1)}$.
   On en déduit que $\forall n \in \mathbb{N},\ ||u_{\varphi(n+1)} - u_{\varphi(n)}|| \geq \mathrm{d}(u_{\varphi(n+1)}, F_{\varphi(n+1)}) \geq \dfrac{1}{2}$.
   Ceci est absurde donc B n'est pas compacte.

XIII.8.28 Sphère et boule unité ★★★

textcolorblue[Enoncé]
S est un fermé inclus dans B donc si B est fermée alors S l'est aussi.
Supposons que S soit compacte.
Donnons nous une suite $(x_n) \in B^{\mathbb{N}}$.
Si $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est nulle APCR alors elle converge. Supposons maintenant que ce n'est pas le cas.
On peut donc extraire une suite $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dont tous les termes sont non nuls.
Considérons la suite $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $\forall n \in \mathbb{N},\ z_n = \dfrac{y_n}{||y_n||}$.
La suite $(||y_n||)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite réelle bornée (par 1) donc d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe une suite extraite $(||y_{\varphi(n)}||)_{n\in\mathbb{N}}$ qui converge.
Comme $z_{\varphi(n)} \in S^{\mathbb{N}}$, on peut extraire une suite $(z_{\varphi\circ\psi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ qui converge. Mais alors on sait que $(||y_{\varphi\circ\psi(n)}||)_{n\in\mathbb{N}}$ converge comme suite extraite de $(||y_{\varphi(n)}||)_{n\in\mathbb{N}}$. Ainsi par produit, la suite $(y_{\varphi\circ\psi(n)})_{n\in\mathbb{N}} = (||y_{\varphi\circ\psi(n)}||z_{\varphi\circ\psi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ converge.
Ainsi, B est compacte par caractérisation séquentielle.

XIII.8.29 Principe du maximum pour les polynômes ★★★

[Enoncé]

XIII.8.30 Applications 1-lipschitzienne surjective sur un compact ★★★★

[Enoncé]

XIII.8.31 Une isométrie conserve les milieux ★★★★

[Enoncé]

XIII.8.32 Fonctions coercives ★★★

[Enoncé]

XIII.8.33 Homéomorphisme de compacts ★★★

[Enoncé]

XIII.8.34 Distance à un fermé

[Enoncé]

XIII.8.35 Diamètre et frontière

[Enoncé]

XIII.8.36 Frontière ★★

[Enoncé]
On sait que $\mathrm{Fr}(F)$ est un fermé donc $\mathrm{Fr}(F) = \overline{\mathrm{Fr}(F)}$. Montrons que $\mathrm{Fr}(F)$ est d'intérieur vide.
Soit $x \in \mathrm{Fr}(F)$.
Alors pour tout $r > 0$, la boule $B(x, r)$ contient des points de $\mathring{F}$ qui ne sont par conséquent pas dans $\mathrm{Fr}(F)$.
Ainsi aucune boule n'est contenue dans $\mathrm{Fr}(F)$, ce qui donne que :

$$\mathrm{Fr}(\mathring{F}) = \emptyset$$

Ainsi, on a :

$$\mathrm{Fr}(\mathrm{Fr}(F)) = \overline{\mathrm{Fr}(F)} \setminus \mathrm{Fr}(\mathring{F}) = \mathrm{Fr}(F)$$

XIII.8.37 Projeté sur un convexe compact ★★★

[Enoncé]

1. La fonction $h \in H \mapsto \|x - h\|$ est continue sur H qui est un compact donc elle admet un minimum. Il existe donc $h_0 \in H$ tel que
$$d(x, H) = \|x - h_0\|$$
Supposons qu'il existe $h_1 \in H$ tel que $\|x - h_1\| = \|x - h_0\| = d(x, H)$ et $h_1 \neq h_0$.
D'après l'identité du parallélogramme :
$$\left\|\frac{h_0 + h_1}{2}\right\|^2 + \left\|\frac{h_0 + h_1}{2} - x\right\|^2 = \frac{1}{2}\left(\|h_1 - x\|^2 + \|h_0 - x\|^2\right) = \frac{1}{2}d(x, H)^2$$
Puisque H est convexe, $\frac{h_0+h_1}{2} \in H$, d'où $\left\|\frac{h_0+h_1}{2} - x\right\| \geq d(x, H)$.
Ainsi, on a déduit que : $\left\|\frac{h_0 + h_1}{2}\right\| \leq 0$, ce qui impose que $\left\|\frac{h_0 + h_1}{2}\right\| = 0$. Ainsi,
$$\left\|\frac{h_0 + h_1}{2} - x\right\|^2 = \frac{1}{2}d(x, h^2) \leq d(x, H)^2$$
ce qui est absurde par définition de $d(x, H)$.
Donc il existe un unique point $h_0 \in H$ tel que $d(x, H) = \|x - h_0\|$.

2. Soit $y \in H$.
On pose $q : t \in [0,1] \mapsto \|x - th_0 - (1-t)(y-h_0)\|$.
On remarque que pour tout $t \in [0,1]$

$$q(t)^2 = \|x - h_0 - (1-t)(h_0 - y)\|^2 = d(x,H)^2 + (1-t)^2 \|y - h_0\| - 2(1-t)\langle x - h_0, y - h_0\rangle$$

Puisque H est convexe, on en déduit que pour tout $t \in [0,1]$ $th_0 + (1-t)y \in H$.
Ainsi pour tout $t \in [0,1]$, $q(t)^2 \geq d(x,H)^2$, par conséquent :

$$\forall t \in [0,1],\ 2(1-t)\langle x - h_0, y - h_0\rangle \leq (1-t)^2 \|y - h_0\|$$

Donc,

$$\forall t \in [0,1[,\ 2\langle x - h_0, y - h_0\rangle \leq (1-t)\|y - h_0\|$$

Et donc en faisant tendre t vers 1^- :

$$\langle x - h_0, y - h_0\rangle \leq 0$$

Ce résultat étant vrai pour tout $y \in H$, on a

$$\forall y \in H,\ \langle x - h_0, y - h_0\rangle \leq 0$$

Réciproquement, supposons que :

$$\forall y \in H,\ \langle x - h_0, y - h_0\rangle \leq 0$$

On continue d'étudier la fonction q. On a toujours pour tout $t \in [0,1]$:

$$q(t)^2 = \|x - h_0 - (1-t)(h_0 - y)\|^2 = \|x - h_0\|^2 + (1-t)^2\|y - h_0\| - 2(1-t)\langle x - h_0, y - h_0\rangle$$

Donc

$$q(t) = \|x - h_0 - (1-t)(h_0 - y)\|^2 \geq \|x - h_0\|^2$$

En particulier pour $t = 0$, on a :

$$q(0) = \|x - y\| \geq \|x - h_0\|$$

Et donc, on a $d(x,H) = \|x - h_0\|$

XIII.8.38 Convexité de l'adhérence et de l'intérieur ★★★

[Enoncé]
Montrons que $\overline{A}$ est convexe.
Soient $x, y \in \overline{A}$.
Il existe $(x_n) \in A^{\mathbb{N}}$ (resp. $(y_n) \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$) tel que $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = x$ (resp. $\lim\limits_{n\to+\infty} y_n = y$) On a :

$$\forall \lambda \in [0,1], \forall n \in \mathbb{N}, \lambda x_n + (1-\lambda)y_n \in A \quad (\text{car } A \text{ est convexe})$$

et

$$\forall \lambda \in [0,1], \lambda x_n + (1-\lambda)y_n \underset{n\to+\infty}{\to} \lambda x + (1-\lambda)y$$

donc :

$$\lambda x + (1-\lambda)y \in \overline{A}$$

Montrons que $\mathring{A}$ est convexe.
Ce serait bien de faire un joli dessin
Soient $x, y \in \mathring{A}$.
Il existe $\varepsilon_1 > 0$ et $\varepsilon_2 > 0$ tels que $B(x,\varepsilon_1) \subset A$ et $B(y,\varepsilon_2) \subset A$.
Posons $\varepsilon = \min(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$.
Soit $\lambda \in [0,1]$. Posons $z = \lambda x + (1-\lambda)y$.
Soit $v \in B(z,\varepsilon)$.
On pose $x' = x + (v - z)$ et $y' = y + (v - z)$.

$$x' + \lambda(y' - x') = z$$

On a choisi x' et y' de sorte que $x' \in B(x,\varepsilon_1)$ donc $x' \in A$ et $y' \in B(y,\varepsilon_2)$ donc $y' \in A$.
Donc par convexité $v \in A$ et donc $B(z,\varepsilon) \subset A$.
Par conséquent $z \in \mathring{A}$ d'où $\mathring{A}$ est convexe.

XIII.8.39 Fonctions positivement homogènes

[Enoncé]

XIII.8.40 Enveloppe convexe

[Enoncé]

XIII.8.41 Théorème de Carathéodory ★★★

[Enoncé]

Enveloppe convexe d'une partie compacte ★★

[Enoncé]

XIII.8.42 Théorème de Krein-Milman


[Enoncé]

XIII.8.43 Epigraphe ★

[Enoncé]

XIII.8.44 Partie convexe dense de $\mathbb{R}^n$ ★★★★

[Enoncé]
On fixe $n \in \mathbb{N}^*$.
1ère méthode : Par récurrence
Montrons par récurrence sur $m \in \mathbb{N}^*$ la propriété $\mathcal{P}(m)$: "Si E est un espace euclidien de dimension m alors la seule partie de E convexe et dense dans E est E."
Soit E un espace vectoriel normé de dimension 1. Soit A une partie convexe et dense dans E. On dispose d'un isomorphisme $f : E \to \mathbb{R}$. Celui-ci est continu car E est de dimension finie, il envoie donc une partie convexe et dense dans E sur une partie convexe (par linéarité) et dense dans $\mathbb{R}$ (par continuité). Il suffit de montrer que $f(A) = \mathbb{R}$ puisque par bijectivité de f cela donne $A = f^{-1}(\mathbb{R}) = E$.
Soit $a \in \mathbb{R}$. Par densité de $f(A)$, $\exists \alpha, \beta \in f(A)$, $|a - 1 - \alpha| < 1$ et $|a + 1 - \beta| < 1$.
Par construction $a \in [\alpha, \beta]$ donc par convexité $a \in f(A)$.
Ainsi $f(A) = \mathbb{R}$ et par suite $A = E$.
Supposons $\mathcal{P}(m-1)$ pour un certain entier $m \geq 2$. On se donne un produit salaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ sur E.
Comme notre hypothèse porte sur des espaces de dimension $m-1$ il serait agréable de travailler avec des hyperplans. On remarque qu'en notant $\mathcal{H}$ l'ensemble des hyperplans de E on a $E = \bigcup_{H \in \mathcal{H}} H$ et $A = E \cap A = \bigcup_{H \in \mathcal{H}} H \cap A$. L'idée va être de montrer que $A \cap H$ est une partie convexe et dense dans H. En premier lieu, elle est convexe comme intersection de deux parties convexes (un sev est convexe). Montrons que $A \cap H$ est dense dans H.
Soit H un hyperplan de E et $a \in E$ unitaire tel que $H = \text{Vect}(a)^\perp$. Fixons $\varepsilon > 0$. On cherche un vecteur $h_A \in A \cap H$ tel que $\|h - h_A\| < \varepsilon$. Faisons un dessin dans $\mathbb{R}^2$:




On aimerait trouver des vecteurs $h^-, h^+ \in A$ qui forment respectivement un angle obtus et aigu avec le vecteur a. De sorte que le segment $[h^-, h^+] \subset A$ coupe H (ensemble des vecteurs normaux à a). Le point d'intersection h_A sera dans $H \cap A$. Pour qu'il respecte la condition de densité il suffit de travailler "pas trop loin" de h.
Par densité de A, $\exists h^-, h^+ \in A,\ \|h^- - (h-\varepsilon a)\| < \varepsilon, \|h^+ - (h+\varepsilon a)\| < \varepsilon$.
Par construction :

$$\langle h^-, a\rangle = \langle h^- - h + \varepsilon a, a\rangle + \langle h - \varepsilon a, a\rangle = \langle h^- - h + \varepsilon a, a\rangle - \varepsilon \text{ et } |\langle h^- - h + \varepsilon a, a\rangle| \leq \left\|h^- - h + \varepsilon a\right\| \|a\| < \varepsilon$$

Donc $\langle h^-, a\rangle < 0$. On montre de même $\langle h^+, a\rangle > 0$.
D'après le TVI l'application $t \in [0,1] \mapsto \langle th^+ + (1-t)h^-, a\rangle$ s'annule en un certain t_0. On note $h_A = t_0 h^+ + (1-t_0)h^-$.
$h_A \in A$ par convexité et $h_A \in H$ car $\langle h_A, a\rangle = 0$.
En outre, $\|h - h_A\| = \|t_0(h-h^+) + (1-t_0)(h-h^-)\| \leq t_0 \|h-h^+\| + (1-t_0)\|h-h^-\|$.
Or $\|h-h^-\| \leq \|h - h^- - \varepsilon a\| + \|\varepsilon a\| < 2\varepsilon$. De même $\|h-h^+\| < 2\varepsilon$.
Donc $\|h-h_A\| < 2\varepsilon$. Il suffit de refaire le même raisonnement en remplaçant ε par $\dfrac{\varepsilon}{2}$ pour obtenir le résultat voulu.
Ainsi par hypothèse de récurrence $H \cap A = A$ et par suite $E = A$.
Finalement, $\forall m \in \mathbb{N}^*,\ \mathcal{P}(m)$. En particulier $\mathcal{P}(n)$ donne le résultat.

2nd méthode : A l'intérieur d'un hypercube
Pour tout $x \in \mathbb{R}^n$ l'ensemble $A - x = \{a - x,\ a \in A\}$ est convexe et dense dans $\mathbb{R}^n$. Comme $x \in A \iff 0 \in A - x$ quitte à translater on peut se contenter de montrer $0 \in A$.
L'idée est de voir 0 comme élément de l'hypercube de côté 1 centré en 0.




Les sommets de l'hypercube sont les points P_ε de coordonnées $\varepsilon = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{-1,1\}^n$. Par densité on peut trouver des points $Q_\varepsilon \in A$ dont on note $(\eta_1, \dots, \eta_n)$ les coordonnées tels que $\|P_\varepsilon - Q_\varepsilon\|_\infty \leq \frac{1}{2}$. Alors 0 est dans le polytope de sommets $(Q_\varepsilon)_{\varepsilon\in\{-1,1\}^n}$. En effet la condition $\|P_\varepsilon - Q_\varepsilon\|_\infty \leq \frac{1}{2} < 1$ assure que la i-ème coordonnée η_i de Q_ε est de même signe que la i-ème coordonnée ε_i de P_ε. Autrement dit il y a un Q_ε dans chaque "cadran" de $\mathbb{R}^n$, et donc l'enveloppe convexe de ces points contient 0. Pour le montrer de manière plus rigoureuse on peut montrer par récurrence sur le nombre de coordonnées nulles que les points Q_ε de coordonnées $(\eta_1, \dots, \eta_{n-r}, 0 \dots, 0)$ avec $\varepsilon = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-r}) \in \{-1,1\}^{n-r}$ sont dans l'enveloppe convexe des $(Q_\varepsilon)_{\varepsilon\in\{-1,1\}^n}$ et donc dans A :
C'est évidemment vrai pour $r = 0$. Supposons que ce soit vrai pour un certain $r \in [\![0; n-1]\!]$. Fixons $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-r-1}) \in \{-1,1\}^{n-r-1}$.
On note $(\eta_1, \dots, \eta_{n-r-1}, \alpha, 0, \dots, 0)$ les coordonnées de $Q_{(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_{n-r-1},-1)}$ et $(\eta_1, \dots, \eta_{n-r-1}, \beta, 0, \dots, 0)$ celles de de $Q_{(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_{n-r-1},1)}$. Par le TVI l'application $t \in [0,1] \mapsto (\eta_1, \dots, \eta_{n-r-1}, t\alpha + (1-t)\beta, 0, \dots, 0)$ s'annule. Autrement dit $(\eta_1, \dots, \eta_{n-r-1}, 0, \dots, 0) \in [Q_{(\eta_1,\dots,\eta_{r-n-1},\alpha)}, Q_{(\eta_1,\dots,\eta_{n-r-1},\beta)}]$.
Donc par hypothèse de récurrence le point de coordonnées $(\eta_1, \dots, \eta_{n-r-1}, 0, \dots, 0)$ est combinaison convexe des $(Q_\varepsilon)_{\varepsilon\in\{-1,1\}^n}$.
Ainsi par récurrence la propriété est vrai pour tout $r \in [\![0; n]\!]$, en particulier pour $n = r$ on obtient $0 \in A$.

3ème méthode :

XIII.8.45 Complémentaire d'une partie convexe ouverte de $\mathbb{R}^n$ ★★★★

[Enoncé]
Si A est vide l'énoncé est évidemment vrai, on suppose donc que ce n'est pas le cas.

1. Quitte à passer par un isomorphisme (qui transforme une partie convexe en une partie convexe par linéarité et une partie ouverte en une partie ouverte par continuité de l'isomorphisme réciproque) on peux travailler dans $\mathbb{C}$ vu comme un $\mathbb{R}$-espace vectoriel. En outre quitte à appliquer une rotation (isométrie vectorielle) on peut supposer que A contient un réel positif. L'idée va être de projeter A sur le cercle unité, càd de considérer $B := \left\{\frac{z}{|z|},\ z \in A\right\} = \{e^{i\arg(z)},\ z \in A\}$:



Remarquons que la convexité de A impose que si $a \in A$ alors $-a \notin A$ (sinon $0 \in A$). Donc B n'a pas de points antipodaux.
Par hypothèse $1 \in B$. L'ensemble $\{\alpha \in [0,\pi],\ e^{i\alpha} \in B\}$ est non vide (il contient 1) et majoré, on note alors α_0 sa borne supérieure. On note de même β_0 la borne inférieure de $\{\beta \in]-\pi, 0],\ e^{i\beta} \in B\}$. On note enfin $\delta = \max(\alpha_0, \pi + \beta_0)$. On va vérifier que $\mathrm{Vect}_{\mathbb{R}}(e^{i\delta}) \subset \mathbb{C}\backslash A$.
Si $\alpha_0 = \pi$ ou $\beta_0 = -\pi$ alors $\mathrm{Vect}_{\mathbb{R}}(e^{i\delta}) = \mathbb{R}$ ne fonctionne pas. Commençons donc par montrer que ces cas sont

exclus.
Pour cela on va montrer que B est ouvert dans S. Soit $a \in A$ et $b = \dfrac{a}{|a|}$. Il s'agit de montrer :

$$\exists \varepsilon > 0,\ \forall b' \in S,\ |b' - b| < \varepsilon \implies b' \in B$$

ou encore qu'il existe un arc de cercle contenu dans B et contenant b en son intérieur.
On peut déjà remarquer que si $a, a' \in A$ alors par convexité l'arc de cercle formé par $\dfrac{a}{|a|}$ et $\dfrac{a'}{|a'|}$ est $\{e^{i((1-t)\arg(a)+t\arg(a'))},\ t \in [0,1]\} = \left\{\dfrac{(1-t)a+ta'}{|(1-t)a+ta'|},\ t \in [0,1]\right\} \subset B$. Ceci justifie que l'ensemble des arguments des éléments de B est une partie connexe par arcs de $\mathbb{R}$, c'est donc un intervalle. Il suffit donc de trouver des éléments de B ayant un argument strictement supérieur/inférieur à celui de b.
Par caractère ouvert de A, $\exists \xi > 0,\ \forall z \in \mathbb{C},\ |z-a| < \xi \implies z \in A$. Notons $a = |a|e^{i\theta}$ et posons $z_1 := |a|e^{i(\theta+\eta)}$, $z_2 := |a|e^{i(\theta-\eta)}$ avec $\eta > 0$ tel que $|e^{i\eta} - 1| < \dfrac{\xi}{|a|}$ (continuité de $t \mapsto e^{it}$ en 0). Alors $|z_1 - a| = |a||e^{i\eta} - 1| < \xi$ et $|z_2 - a| = |a||e^{-i\eta} - 1| = |a|\left|\overline{e^{-i\eta} - 1}\right| = |a||e^{i\eta} - 1| < \xi$. Donc $z_1, z_2 \in A$. Ainsi $e^{i(\theta-\eta)}, e^{i(\theta+\eta)} \in B$ avec $b = e^{i\theta}$ ce qui permet de conclure que B est ouvert dans S.
Ainsi comme $1 \in B$ par hypothèse et comme B est ouvert dans S on dispose de $e^{i\varphi}, e^{-i\varphi} \in B$ avec et $0 < \varphi < \pi$. Ceci justifie $\alpha_0 < \pi$ car sinon $-e^{-i\varphi} = e^{\pi - i\varphi} \in B$ car il est dans l'arc de cercle formé par $e^{i(\pi-\varphi/2)} \in B$ et 1. De même $\beta_0 > -\pi$. Cela justifie $\delta > 0$ et $\pi - \delta > 0$.
Supposons par l'absurde qu'il existe $z \in \mathrm{Vect}_{\mathbb{R}}(e^{i\delta}) \cap A$. Alors $\dfrac{z}{|z|} = \pm e^{i\delta} \in B$. Si $\dfrac{z}{|z|} = e^{i\delta}$ alors comme B est ouvert dans S il existe $0 < \eta \leq \pi - \delta$ tel que $e^{i(\delta+\eta)} \in B$ ce qui contredit la maximalité de δ.
De même si $\dfrac{z}{|z|} = -e^{i\delta} = e^{i(\delta-\pi)} \in B$ alors il existe $0 < \eta < \delta$ tel que $e^{i(\delta-\pi-\eta)} \in B$. Or $-\pi < \delta - \pi - \eta < \delta - \pi \leq \beta_0$ ce qui est absurde.
Finalement $\mathrm{Vect}_{\mathbb{R}}(e^{i\delta}) \subset \mathbb{C}\backslash A$.

2. C'est le même principe. On munit $\mathbb{R}^n$ de sa norme euclidienne usuelle $\|\cdot\|$ et on considère $B := \left\{\dfrac{a}{\|a\|},\ a \in A\right\}$.
C'est pas simple à écrire faut que je réfléchisse encore...

XIII.8.46 Partie convexe fermée non bornée de $\mathbb{R}^n$ ★★★★

[Enoncé]
Quitte à translater, on peut supposer $0 \in A$.
Fixons $(a_n) \in A^{\mathbb{N}}$ telle que $\|a_n\| \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$. L'idée va être de projeter A sur la sphère unité par $f : a \in A \mapsto \dfrac{a}{\|a\|}$.
La suite $(f(a_n))_{n\in\mathbb{N}}$ est à valeurs dans la sphère unité qui est compacte car fermée bornée dans $\mathbb{R}^n$ qui est de dimension finie. Donc quitte à extraire on peut supposer que $(f(a_n))_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers un certain a. Montrons que la demi-droite $D = \{ta,\ t \geq 0\}$ est incluse dans A. On fixe $t \geq 0$.
Comme $\|a_n\| \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$, $\exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\ \|a_n\| \geq t$.
Donc $\forall n \geq N,\ tf(a_n) = \dfrac{t}{\|a_n\|}a_n + \left(1 - \dfrac{t}{\|a_n\|}\right)0_{\mathbb{R}^n} \in A$. On en déduit comme A est fermée que $ta \in A$.

XIII.8.47 Partie convexe ouverte non bornée de $\mathbb{R}^n$ ★★★★

[Enoncé]
Quitte à translater, on peut supposer $0 \in A$.
Fixons $(a_n) \in A^{\mathbb{N}}$ telle que $\|a_n\| \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$. L'idée va être de projeter A sur la sphère unité par $f : a \in A \mapsto \dfrac{a}{\|a\|}$.
La suite $(f(a_n))_{n\in\mathbb{N}}$ est à valeurs dans la sphère unité qui est compacte car fermée bornée dans $\mathbb{R}^n$ qui est de dimension finie. Donc quitte à extraire on peut supposer que $(f(a_n))_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers un certain a. Montrons que la demi-droite $D = \{ta,\ t \geq 0\}$ est incluse dans A. On fixe $t \geq 0$.
Comme $\|a_n\| \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$, $\exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\ \|a_n\| \geq t$.
Donc $\forall n \geq N,\ tf(a_n) = \dfrac{t}{\|a_n\|}a_n + \left(1 - \dfrac{t}{\|a_n\|}\right)0_{\mathbb{R}^n} \in A$. De plus on sait que $ta - tf(a_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ donc comme 0 est intérieur à A, $\exists M \in \mathbb{N},\ \forall n \geq M,\ ta - tf(a_n) \in A$.

En particulier $\forall n \geq \max(M,N)$, $\dfrac{tf(a_n)}{2} + \dfrac{1}{2}(ta - tf(a_n)) = \dfrac{ta}{2} \in A$.
En reprenant le raisonnement avec $2t$ on obtient $ta \in A$ ce qui conclut la preuve.

Partie convexe non bornée de $\mathbb{R}^n$ (HP) ★★★★★

[Enoncé]
On a montré dans l'exercice précédent qu'on pouvait construire une demi-droite dans A à partir de n'importe quel point de A, et ce parce que ce sont des points intérieurs à A. Malheureusement A n'a pas forcément de point intérieur : dans $\mathbb{R}^n$ pour $n \geq 2$ une droite est convexe et non bornée mais d'intérieur vide. Cependant, il est très classique dans l'étude des espaces affines de montrer que l'intérieur relatif d'un convexe (intérieur relatif à l'espace affine qu'il engendre) est non vide. Le programme de prépa actuel ayant totalement délaissé la théorie des espaces affines et la convexité, cet exercice devient très largement plus dur que le précédent.
Quitte à translater on peut supposer $0 \in A$. Montrons le lemme suivant : A a un point intérieur dans $V := \text{Vect}(A)$.
On note $(x_1, \dots, x_p)$ une base de E ainsi que $x = \dfrac{1}{2p}\sum_{k=1}^{p} x_k$. $x \in A$ par convexité (barycentre de $(x_1, \dots, x_p, 0_{\mathbb{R}^n})$). On complète $(x_1, \dots, x_p)$ en une base $(x_1, \dots, x_n)$ de $\mathbb{R}^n$. Pour $\|\cdot\| : \sum_{k=1}^{n} \lambda_k x_k \mapsto \max_{1\leq k\leq n} |\lambda_k|$ par exemple, si $V = \sum_{k=1}^{p} \lambda_k x_k \in E$ tel que $\|y - x\| < \dfrac{1}{2p}$ alors $\forall k \in [\![1;p]\!]$, $\left|\lambda_k - \dfrac{1}{2p}\right| < \dfrac{1}{2p}$ d'où $0 < \lambda_k < \dfrac{1}{p}$.
On pose $\Lambda = \sum_{k=1}^{p} \lambda_k$. On a $0 < \Lambda < 1$.
Ainsi par convexité $\tilde{y} = \dfrac{y}{\Lambda} \in A$ puis $y = \Lambda\tilde{y} + (1-\Lambda)0_{\mathbb{R}^n} \in A$.
Ceci montre que x est un point intérieur à A dans V.
On dispose d'une isométrie $\Phi : \left\{ \begin{array}{ccc} V & \longrightarrow & \mathbb{R}^d \\ \sum_{k=1}^{p} \lambda_k x_k & \longmapsto & (\lambda_1, \dots, \lambda_k) \end{array} \right.$. Φ et Φ^{-1} sont continus car V et $\mathbb{R}^d$ sont de dimension finie. Ainsi $\Phi(B) = (\Phi^{-1})^{-1}(B)$ est non bornée comme image d'une partie non bornée par une application continue, convexe comme image directe d'une partie convexe par une application linéaire (donc affine), et ouverte dans $\mathbb{R}^d$ comme image réciproque d'une partie ouverte par une application continue. L'exercice précédent assure alors que $\Phi(B)$ contient une demi-droite D. $\Phi^{-1}(D)$ est une demi-droite contenue dans B.


XIII.8.48 Connexité de l'espace (1) ★★


[Enoncé]
En général en oral un bon dessin peut convaincre l'examinateur.

1. Soient $a < 0 < b$. D'après le TVI, dans $\mathbb{R}$ tout chemin continu de a à b s'annule. Donc $\mathbb{R}^*$ n'est pas connexe par arcs. Ensuite $\mathbb{R}^* = \mathbb{R}_+^* \bigsqcup \mathbb{R}_-^*$. Ces deux ensembles sont des intervalles donc sont convexes et a fortiori connexes par arcs. Ce sont donc les composantes connexes par arcs de $\mathbb{R}^*$.
2. Soit $\theta \in]-\pi, \pi]$. Montrons que $\mathbb{U}\backslash\{e^{i\theta}\}$ est connexe par arcs. Soit $z_1 \neq z_2 \in \mathbb{U}\backslash\{e^{i\theta}\}$. Sans perte de généralité $\exists \theta_1 < \theta_2 \in]\theta, \theta + 2\pi[$, $z_1 = e^{i\theta_1}, z_2 = e^{i\theta_2}$.
$[\theta_1, \theta_2] \cap (\theta + 2\pi\mathbb{Z}) = \emptyset$ donc le chemin $\gamma(t) = e^{i((1-t)\theta_1 + t\theta_2)}$ est continu à valeur dans $\mathbb{U}\backslash\{e^{i\theta}\}$ et relie z_1 à z_2.
Soit maintenant $\alpha < \beta \in]-\pi, \pi]$. Montrons que $\mathbb{U}\backslash\{e^{i\alpha}, e^{i\beta}\}$ n'est pas connexe par arcs. Soient $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$ tels que $-\pi < \theta < \alpha < \theta' < \beta$. Soit $\gamma : [0,1] \to \mathbb{U}\backslash\{e^{i\alpha}, e^{i\beta}\}$ un chemin continu de $e^{i\theta}$ à $e^{i\theta'}$. $\forall t \in [0,1]$, $\exists! f(t) \in]-\pi, \pi]$, $\gamma(t) = e^{if(t)}$. En outre f est continue. En effet si $t \in [0,1]$ et si $(t_n) \in [0,1]^{\mathbb{N}}$ converge vers t alors f étant bornée, quitte à extraire on peut supposer que $f(t_n)$ converge vers un certain $L \in]-\pi, \pi]$. On en déduit par continuité de γ, $\gamma(t_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} e^{if(t)}$ et par continuité de exp, $\gamma(t_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} e^{iL}$. Ainsi comme $L, f(t) \in]-\pi, \pi]$, $f(t) = L$.
En particulier on a choisi θ, θ' tels que $\alpha \in [\theta, \theta']$ et $f(0) = \theta$ et $f(1) = \theta'$. Donc d'après le TVI $\exists t \in [0,1]$, $f(t) = \beta$. Mais alors $\gamma(t) = e^{i\beta}$ ce qui est absurde.

Remarque : avec le résultat de l'exercice suivant on peut donner une autre preuve. Pour $\mathbb{U}\backslash\{z\}$ on considère la tangente au cercle unité passant par z. $\mathbb{U}\backslash\{z\}$ est alors inclus dans l'un des demi-plans (Un demi-plan est connexe par arcs) définis par la tangente.

Pour $\mathbb{U}\backslash\{z,z'\}$ on considère la droite formée par z et z'. Le cercle unité n'est contenu dans aucun des demi-plans définis par la droite.





Soit $\mathcal{C}\subset\mathbb{U}$ connexe par arcs. $\forall z\in\overline{\mathcal{C}},\ \exists!\theta(z)\in]-\pi,\pi],\ z=e^{i\theta(z)}$. On montre comme on l'a fait pour f avant que θ est continue. Donc $\theta(\mathcal{C})$ est un connexe par arcs de $\mathbb{R}$: c'est un intervalle.
On a montré qu'il existe un intervalle I tel que $\mathcal{C}=\{e^{it},\ t\in I\}$, c'est-à-dire que $\mathcal{C}$ est un arc de cercle (en considérant $\mathbb{U}$ comme un arc de cercle).

3. Soient $z_1,\dots,z_N\in\mathbb{C}$. Notons $\tilde{\mathbb{C}}:=\mathbb{C}\backslash\{z_1,\dots,z_N\}$, $z\neq z'\in\tilde{\mathbb{C}}$, $u=z'-z$ et $\delta:=\dfrac{1}{3|u|}\min\limits_{1\leq i\neq j\leq N}|z_i-z_j|$. Quitte à réindicer on peut noter $\{z_1,\dots,z_n\}=\{z_1,\dots,z_N\}\cap[z,z']$ où $\forall i\in[\![1;n-1]\!],\ [z,z_i]\subset[z,z_{i+1}]$ (les z_i sont rangés par ordre d'apparition dans le segment $[z,z']$). On note alors pour $i\in[\![0;n]\!]$, $x_{i+1}=\begin{cases}z_{i+1}-\delta u & \text{si } i\leq n-1\\ z' & \text{si } i=n\end{cases}$ et $y_i=\begin{cases}z & \text{si } i=0\\ z_i+\delta u & \text{si } i\geq 1\end{cases}$. On relie z à z' par γ le chemin composé de :
   — $\tau_i(t)=(1-t)y_i+tx_{i+1}$ (translation de y_i à x_{i+1}) ;
   — $r_i(t)=z_i-\delta e^{i\pi t}u$ (rotation de centre z_i et de rayon δ de x_i à y_i) ;
   Soit $i\in[\![1;n]\!]$. Par définition $\tau_{i-1}([0,1])=[z_{i-1}+\delta u,z_i-\delta u]\subset]z_{i-1},z_i[\subset\tilde{\mathbb{C}}$. δ est aussi choisi pour que $x_i-y_{i-1}=\lambda u$ avec $\lambda>0$.
   Et $\forall t\in[0,1],\ \forall j\in[\![1;N]\!],\ |r_i(t)-z_j|\geq||z_i-z_j|-\delta|u||\geq|z_i-z_j|-\delta|u|\geq 3|u|\delta-\delta|u|=2\delta|u|>0$. Donc $r([0,1])\subset\tilde{\mathbb{C}}$.
   Ainsi on a construit des chemins continus à valeurs dans $\tilde{\mathbb{C}}$ reliant y_i à x_{i+1} puis x_{i+1} à y_{i+1}. Finalement $z=y_0$ est relié à $z'=x_n$ par un chemin continu à valeurs dans $\tilde{\mathbb{C}}$.

4. Soient $D_1,\dots,D_N$ des droites de $\mathbb{R}^3$. Soient $x\neq y\in\mathbb{R}^3\backslash\bigcup\limits_{n=1}^{N}D_n$. On peut trouver un plan P de $\mathbb{R}^3$ qui contient x,y et qui ne contient aucune des droites D_n, $1\leq n\leq N$. Alors l'intersection de P et d'une droite D_n est vide ou réduite à un point. Ainsi par la question 2 on peut trouver un chemin continu reliant x et y dans $\left(\mathbb{R}^3\backslash\bigcup\limits_{n=1}^{N}D_n\right)\cap P=P\backslash\bigcup\limits_{n=1}^{N}(P\cap D_n)$.

XIII.8.49 Connexité de l'espace (2)

[Enoncé]

XIII.8.50 Complémentaire d'un hyperplan ★★★


[Enoncé]


1. Soit $\varphi \in E^*$ telle que $H = \ker \varphi$. On note $H^+ = \{x \in E,\ \varphi(x) > 0\}$ et $H^- = \{x \in E,\ \varphi(x) < 0\} = -H^+$. On a $H = H^+ \cup H^-$.
   Si $t \in [0,1]$ et si $x_1, x_2 \in H^+$ alors $\varphi(tx_1 + (1-t)x_2) = t\varphi(x_1) + (1-t)\varphi(x_2) > 0$. Donc H^+ et convexe et a fortiori connexe par arcs. De même H^- est connexe par arcs.
   Enfin, si $E\backslash H$ est connexe par arcs alors comme φ est continue (linéaire sur E de dimension finie) $\varphi(E\backslash H)$ est connexe par arcs. Or on sait que $E\backslash H \neq \emptyset$ donc pour $a \in E\backslash H$, $\forall \lambda \in \mathbb{R}^*,\ \lambda = \varphi\left(\dfrac{\lambda}{\varphi(a)}\lambda\right)$. Donc $\varphi(E\backslash H) = \mathbb{R}^*$ ce qui est absurde.
2. Notons $(e_1, \dots, e_d)$ une base de F que l'on complète en une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E. Soit $x \in E\backslash F$. Il s'écrit $x = \sum_{k=1}^{n} a_k e_k$ avec $(a_{d+1}, \dots, a_n) \neq (0, \dots, 0)$. On note $i \in [\![d+1; n]\!]$ tel que $a_i \neq 0$. Si $a_i > 0$ alors on peut relier x à e_i par $x(t) = (1-t)x + te_i \in E\backslash F$. Et si $a_i < 0$ alors on peut relier x à $-e_i$ par le même chemin.
   Ensuite, pour tout $i \neq j \in [\![d+1; n]\!]$, $[e_i, e_j] \subset \mathrm{Vect}(e_{d+1}, \dots, e_n)\backslash\{0\} \subset E\backslash F$ et $[-e_i, e_j] \subset \mathrm{Vect}(e_{d+1}, \dots, e_n)\backslash\{0\} \subset E\backslash F$. Comme $d \leq n-2$, on peut toujours trouver $j \neq i \in [\![d+1; n]\!]$ donc e_i et $-e_i$ sont reliés par un chemin continu dans $E\backslash F$ d'où F est connexe par arcs.
3. En voyant E comme un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension $2n$, H est un sous-espace de E de dimension $2n-2$. D'après la question 2, $E\backslash H$ est connexe par arcs.

XIII.8.51 Composantes connexes par arcs du complémentaire de la réunion de plusieurs hyperplans ★★★★★

[Enoncé]

1. a. On note pour tout $i \in [\![1; r]\!]$, $H_i = \ker f_i$ ainsi que $U = \mathbb{R}^n \backslash \bigcup_{i=1}^{r} H_i$. Puisque la famille des formes linéaires est libre dans $(\mathbb{R}^n)^*$ qui est de dimension $\dim(\mathbb{R}^n) = n$, $r \leq n$.
   Faisons un dessin dans $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$ pour comprendre ce qu'il se passe. Dans $\mathbb{R}^2$ un hyperplan est une droite vectorielle.





   Chaque région colorée est une partie non vide de $\mathbb{R}^2\backslash(H_1 \cup H_2)$ connexe par arcs et elles recouvrent $\mathbb{R}^2\backslash(H_1 \cup H_2)$. Ce sont donc les composantes connexes par arcs de $\mathbb{R}^2\backslash(H_1 \cup H_2)$. On voit que chaque H_1 sépare $\mathbb{R}^2$ en deux demi-plans puis que H_2 sépare ces deux demi-plans en deux.
   Et dans $\mathbb{R}^3$ en prenant H_1, H_2, H_3 les 3 plans définies par les axes :
   Apprendre à faire des dessins en 3D requis
   H_1 sépare l'espace en deux, H_2 sépare les demi-espaces créés en deux, H_3 sépare les quarts d'espaces restant...
   Sur ces exemples le nombre de composantes connexes par arcs de U (le nombre de "régions") semble être 2^r. C'est ce que l'on va montrer.
   Remarquons que pour une forme linéaire non nulle $f \in (\mathbb{R}^n)^*$, $\mathbb{R}^n \backslash \ker f$ a exactement deux composantes connexes par arcs qui sont $\{x \in \mathbb{R}^n,\ f(x) > 0\}$ et $\{x \in \mathbb{R}^n,\ f(x) < 0\}$ (cf. l'exo précédent). Ainsi si g est une

forme linéaire non colinéaire à f, les "régions" de $\mathbb{R}^n \backslash (\ker f \cup \ker g)$ sont données par les combinaisons de signe possible pour $f(x), g(x)$: $f(x) > 0, g(x) > 0$ ou $f(x) > 0, g(x) < 0$ ou $f(x) < 0, g(x) > 0$ ou $f(x) < 0, g(x) < 0$.
Concrètement on note $U = \mathbb{R}^n \backslash \bigcup_{i=1}^{r} \ker f_i$ ainsi que $S = \{-1, 1\}^r$ et on pose pour $\varepsilon = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r) \in S$

$$C_\varepsilon = \{x \in U,\ \forall i \in [\![1; r]\!],\ \varepsilon_i f_i(x) > 0\}$$

On va montrer que les composantes connexes par arcs de U sont exactement les C_ε pour $\varepsilon \in S$. Fixons $\varepsilon \in S$.
Comme les f_i forment une famille libre l'application

$$\Phi : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R}^r \\ x & \longmapsto & (f_1(x), \dots, f_r(x)) \end{array} \right.$$

est surjective. En effet sa matrice dans les bases canoniques $(u_1, \dots, u_n)$ de $\mathbb{R}^n$ et $(v_1, \dots, v_r)$ de $\mathbb{R}^r$ est $(f_i(u_j))_{\substack{1 \leq i \leq r \\ 1 \leq j \leq n}}$ qui est de noyau nul donc de rang r par le théorème du rang. En particulier, $\exists x \in \mathbb{R}^n,\ \Phi(x) = \varepsilon$.
Alors $x \in C_\varepsilon$ et par suite $C_\varepsilon \neq \emptyset$.
Ensuite, si $x, y \in C_\varepsilon$ alors $[x, y] \in C_\varepsilon$ donc C_ε est connexe par arcs.
Enfin on a clairement $U = \bigsqcup_{\varepsilon \in S} C_\varepsilon$.
Ainsi $\mathbb{R}^n \backslash \bigcup_{i=1}^{r} \ker f_i$ a $|S| = 2^r$ composantes connexes par arcs.

b. Montrons que U est connexe par arcs. Soient $x \neq y \in U$. L'application

$$P : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ z & \longmapsto & \displaystyle\prod_{i=1}^{r} f_i((1-z)x + zy) \end{array} \right.$$

est polynomiale donc s'annule un nombre fini de fois et de plus, $P(0) \neq 0$ et $P(1) \neq 0$. Or on sait que $\mathbb{C}$ privé d'un nombre fini de points est connexe par arcs (cf.**??**). Donc il existe un chemin continu γ de 0 à 1 tel que $P \circ \gamma$ ne s'annule pas. $\tilde{\gamma} : t \mapsto (1 - \gamma(t))x + \gamma(t)y$ est donc un chemin continue de x à y à valeurs dans U.

2.

XIII.8.52 Sphères d'un $\mathbb{R}$-espace vectoriel ★★★

[Enoncé]

1. Soient $x, y \in S$.
Supposons que $x \neq -y$. On pose :

$$\gamma : \left\{ \begin{array}{ccc} [0,1] & \longrightarrow & S \\ t & \longmapsto & \dfrac{(1-t)x + ty}{\|(1-t)x + ty\|} \end{array} \right. .$$

Cette application est continue sur $[0, 1]$. On vérifie aisément que $\gamma(0) = x$ et $\gamma(1) = y$.
Donc γ est un chemin continue de x vers y. Supposons que $x = -y$. On choisit un point $z \in S$ tels que $z \neq x$ et $z \neq y$.
Ainsi d'après ce qui précède, il existe un chemin continu entre x et z et un autre chemin continu entre y et z. Donc par transitivité, il existe un chemin continu entre x et y. Donc S est connexe par arcs.

2. Soit S' une sphère de rayon $r > 0$ et de centre a. L'application

$$f : \left\{ \begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & S' \\ x & \longmapsto & r(x + a) \end{array} \right.$$

est une application continue de S dans S' car affine.
Puisque l'on a montré que S est connexe par arcs, l'image de S par f est connexe par arcs.
Or cette image est S' donc S' est connexe par arcs

XIII.8.53 Théorème du passage à la douane ★★★

[Enoncé]
Soit $C \subset E$ connexe par arcs telle que $C \cap A \neq \emptyset$ et $C \cap (E \backslash A) \neq \emptyset$. On fixe $a \in C \cap A$ et $b \in C \cap (E \backslash A)$. C est connexe par arcs donc $\exists \gamma \in \mathcal{C}^0([0,1], E),\ \gamma(0) = a, \gamma(1) = b$. Si $b \in \mathrm{Fr}(A)$ on a fini. Supposons que ce n'est pas le cas, càd comme $b \notin \mathring{A}$ que $b \notin \overline{A}$.
Notons $s = \sup\{t \in [0,1],\ \gamma(t) \in \overline{A}\}$ qui est bien définie puisque $\gamma(0) = a \in A$. On va montrer que $\gamma(s) \in \mathrm{Fr}(A)$.
Par caractérisation séquentielle de la borne supérieure on se donne une suite $t_n \in [0,1]^{\mathbb{N}}$ qui converge vers s et telle que $\forall n \in \mathbb{N},\ \gamma(t_n) \in \overline{A}$. Par continuité de γ, $\gamma(t_n) \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} \gamma(s)$ puis par caractérisation séquentielle de l'adhérence, $\gamma(s) \in \overline{A}$.
On en déduit comme $\gamma(1) = b \notin \overline{A}$ que $s < 1$. Supposons par l'absurde que $\gamma(s) \in \mathring{A}$. Alors $\exists \varepsilon > 0,\ B(\gamma(s), \varepsilon) \subset A$. Quitte à prendre plus petit on peut supposer $\varepsilon < 1$.
Par continuité de γ on se donne $1 - s \geq \delta > 0$ tel que $\forall s' \in [0,1],\ |s' - s| \leq \delta \implies |\gamma(s') - \gamma(s)| < \varepsilon$. On a vu que $s < 1$ donc $s < s + \delta := s' \in [0,1]$. De plus, $|s' - s| = \delta$ donc $|\gamma(s') - \gamma(s)| < \varepsilon$ i.e $\gamma(s') \in B(\gamma(s), \varepsilon)$ d'où $\gamma(s') \in A \subset \overline{A}$.
Ceci est absurde donc $\gamma(s) \in \mathrm{Fr}(A)$.

XIII.8.54 Condition nécessaire de la connexité par arc ★

[Enoncé]
On sait que l'image d'un connexe par arcs par une application continue est connexe par arcs.
Par conséquent, $f(C)$ est connexe par arcs.
Puisque $f(C) \subset \{0,1\}$, on en déduit que :

$$f(C) = \{0\}, f(C) = \{1\} \text{ ou } f(C) = \{0,1\}$$

Or $\{0,1\}$ n'est pas connexe par arcs, donc $f(C) \neq \{0,1\}$.
Dans les deux cas restant $f(C)$ est un singleton (qui est bien connexe par arcs), donc f est constante sur C.

XIII.8.55 Entre un ensemble et son adhérence

[Enoncé]

XIII.8.56 Continuité d'applications matricielles

[Enoncé]

XIII.8.57 Points de continuité du polynôme minimal

[Enoncé]

XIII.8.58 Exponentielle matricielle et topologie

[Enoncé]

XIII.8.59 Lemme du déterminant

[Enoncé]

1. Soit $(U,V) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})^2$. On remarque que $\det(I_n + UV^\top) = (-1)^n \chi_{UV^\top}(-1)$.
   O d'après **??**, $\mathrm{rg}(UV^\top) = 1$ et $\mathrm{Sp}(UV^\top) = \{0, \mathrm{Tr}(UV^\top)\}$.
   Donc $\det(I_n + UV^\top) = (-1)^n(-1)^{n-1}(-1 - \mathrm{Tr}(UV^\top)) = 1 + \mathrm{Tr}(V^\top U) = 1 + V^\top U$.
2. L'idée ici est d'utiliser la densité de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$
   Soient $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ et $(U,V) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2$. $\det(M^{-1}) \det(M + UV^\top) = \det(I_n + M^{-1}UV^\top)$.
   la multiplication par une matrice inversible conserve le rang donc on a encore $\mathrm{rg}(M^{-1}UV^\top) = 1$.

Donc $\det(I_n + M^{-1}UV^\top) = 1 + \mathrm{Tr}(M^{-1}UV^\top) = 1 + \mathrm{Tr}(V^\top M^{-1}U) = 1 + V^\top M^{-1}U$.
Par conséquent, $\det(M + UV^\top) = \det(M) + V^\top \det(M)M^{-1}U = \det(M) + V^\top \mathrm{Com}(M)^\top U$ car $\det(M)I_n = M\,\mathrm{Com}(M)^\top$.
Finalement, puisque $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et que det est continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ car $\det(M)$ est polynomiale en les coefficients de M ; la relation est vérifiée pour toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

XIII.8.60 Matrice de déterminant 1 ★★★

[Enoncé]

1. On considère le morphisme de groupe $\det : \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}^*$.
$\mathrm{SL}_n(\mathbb{K}) = \ker(\det)$ donc $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$ est un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$.
2. L'application déterminant étant continue car polynomiale en les coefficients de la matrice $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K}) = \ker(\det) = \det^{-1}(\{1\})$ donne aussi que $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$ est fermé.
3. Pour $\varepsilon \in \mathbb{R}^*$ on pose $M_\varepsilon = \mathrm{diag}\left(\varepsilon, \frac{1}{\varepsilon}, 1, \dots, 1\right) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}^*,\ M_\varepsilon \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$.
Et, $||M_\varepsilon|| = \sqrt{\mathrm{Tr}(M_\varepsilon^\top M_\varepsilon)} = \sqrt{\varepsilon^2 + \frac{1}{\varepsilon^2} + n - 2} \underset{\varepsilon \to +\infty}{\longrightarrow} +\infty$.
Donc $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ n'est pas borné. $\mathrm{SL}_n(\mathbb{C})$ ne l'est pas car il contient $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ (Il peut prendre la norme définie par $\|M\| = \mathrm{Tr}(\overline{M}^\top M)$ qui se trouve coïncider avec celle que l'on a utilisé sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$).
4. On va montrer que le complémentaire de $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Si $M \notin \mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$ la suite constante égale à M est une suite à valeurs dans le complémentaire de $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$ qui converge vers M.
Supposons que $M \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$.
Posons pour tout $k \in \mathbb{N}^*,\ M_k = M - \frac{1}{k} I_n$. $(M_k)_{k\in\mathbb{N}^*}$ converge vers M.
La suite $(\det(M_k))_{k\in\mathbb{N}^*} = \left((-1)^n \chi_M\left(\frac{1}{k}\right)\right)_{k\in\mathbb{N}^*}$ ne prend qu'un nombre fini de fois la valeur 1 car sinon χ_M serait constant égal à 1 (alors qu'il est de degré n). Ainsi APCR $\det(M_k) \neq 1$ i.e $M_k \notin \mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$.
On en déduit que $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$ est d'intérieur vide.
5. On rappelle qu'une matrice de transvection est une matrice de la forme
$T_{ij}(\lambda) = I_n + \lambda E_{ij}$ avec $\lambda \in \mathbb{K}^*$ et $(i,j) \in [\![1;n]\!]^2,\ i \neq j$.
Soit $M \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$. Il existe $i_1, \dots, i_r, j_1, \dots, j_r \in [\![1;n]\!]$ avec $i_k \neq j_k$ pour tout $k \in [\![1;r]\!]$ ainsi que $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{K}^*$ tels que :

$$M = T_{i_1 j_1}(\lambda_1) \dots T_{i_r j_r}(\lambda_r)$$

On pose $\gamma : t \in [0,1] \mapsto T_{i_1 j_1}(t\lambda_1) \dots T_{i_r j_r}(t\lambda_r)$.
La fonction $f : (A_1, \dots, A_r) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^r \mapsto A_1 \dots A_r$ est continue car r-linéaire avec $\dim(\mathcal{M}_n(\mathbb{K})) < +\infty$.
Pour toute matrice de transvection $T_{ij}(\lambda)$ la fonction $\varphi_{ij}(\lambda) : t \in [0,1] \mapsto T_{ij}(t\lambda) = I_n + t\lambda E_{ij}$ est continue car affine. Par conséquent la fonction $h : t \in [0,1] \mapsto (T_{i_1 j_1}(t\lambda_1), \dots, T_{i_r j_r}(t\lambda_r))$ est continue car toutes ses composantes le sont.
Enfin $\gamma = f \circ h$ est continue.
$\gamma(0) = I_n$ et $\gamma(1) = M$.
On en déduit que $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$ est connexe par arcs.

XIII.8.61 Ensembles de matrices de rang fixé

[Enoncé]

XIII.8.62 Densité des matrices inversibles ★★★

[Enoncé]

1. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On pose pour $k \in \mathbb{N}^*$, $M_k = M - \frac{1}{k} I_n$. Il est clair que $M_k \underset{k\to+\infty}{\longrightarrow} M$.
   On remarque que $\forall k \in \mathbb{N}^*,\ M_k \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \iff \det(M_k) \neq 0 \iff \frac{1}{k} \notin \mathrm{Sp}(M)$. Or on sait que le spectre d'une matrice est un ensemble fini, c'est l'ensemble des racines d'un polynôme. Ainsi pour $k > \frac{1}{\min\limits_{\lambda \in \mathrm{Sp}(M)\setminus\{0\}} |\lambda|}$, on sait que $\frac{1}{k} \notin \mathrm{Sp}(M)$.
   La suite $(M_k)_{k\in\mathbb{N}^*}$ est donc à valeurs dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ APCR ce qui justifie que $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ par caractérisation séquentielle.
2. Soit $(A, B) \in M_n(\mathbb{K})$. D'après la question 1 il existe une suite $(B_k) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})^{\mathbb{N}}$ de limite B.
   Or $\forall k \in \mathbb{N},\ AB_k = B_k^{-1}(B_kA)B_k$. Donc pour tout $k \in \mathbb{N}$, AB_k et B_kA sont semblables. Elles ont donc même polynôme caractéristique.
   Ensuite, les applications de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $L : M \mapsto MA$, $R : M \mapsto AM$ et $\chi : M \mapsto \chi_M$ sont continues. En effet les deux premières sont linéaires sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui est de dimension finie et pour la dernière, les coefficients de χ_M sont polynomiaux en les coefficients de M : ils sont issus d'un déterminant d'un polynôme en M. On en déduit par composition des limites que $\chi_{AB} = \lim\limits_{k\to+\infty} \chi_{AB_k}$ et $\chi_{BA} = \lim\limits_{k\to+\infty} \chi_{B_kA}$.
   Ainsi par unicité de la limite, $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.
3. Soit $(A, B) \in M_n(\mathbb{K})$. D'après la question 1 il existe une suite $(B_k) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})^{\mathbb{N}}$ de limite B.
   Or $\forall k \in \mathbb{N},\ AB_k = B_k^{-1}(B_kA)B_k$. Donc pour tout $k \in \mathbb{N}$, AB_k et B_kA sont semblables.
   Montrons si $M, N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont semblables alors $\exp(M)$ et $\exp(N)$ le sont aussi. On note $M = PNP^{-1}$ avec $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$.
   On montre classiquement par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N},\ M^n = PN^nP^{-1}$. De plus l'application $\varphi : L \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mapsto PLP^{-1}$ est linéaire. Donc $\forall R \in \mathbb{K}[X],\ R(M) = PR(N)P^{-1}$. En particulier, $\forall n \in \mathbb{N},\ \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{M^k}{k!} = P\left(\sum\limits_{k=0}^{n} \frac{N^k}{k!}\right)P^{-1}$.
   Les deux sommes ont pour limite respective $\exp(M)$ et $\exp(N)$ et φ est continue car linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui est de dimension finie ; par passage à la limite $\exp(M) = P\exp(N)P^{-1}$.
   Remarque on a obtenu un résultat plus fort puisqu'on connaît la matrice de passage
   On en déduit que $\forall k \in \mathbb{N},\ \chi_{\exp(AB_k)} = \chi_{\exp(B_kA)}$. Comme vu précédemment les applications de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $L : M \mapsto MA$, $R : M \mapsto AM$ et $\chi : M \mapsto \chi_M$ sont continues.
   Montrons que l'application $\exp : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mapsto \exp(M)$ est continue. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On se donne une norme d'algèbre $\|.\|$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (on sait qu'il en existe d'après le cours sur les normes d'opérateur).
   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'application $f_n : M \mapsto \frac{M^n}{n!}$ est continue pour la norme $\|.\|$ car les coefficients de $f(M)$ sont polynomiaux en ceux de M. Par définition $\sum\limits_{n\in\mathbb{N}} f_n$ converge simplement vers exp.
   De plus, dans $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$, $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} \left\|\frac{M^n}{n!}\right\| \leq \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{\|M\|^n}{n!} = \exp(M) < +\infty$.
   Ainsi la série $\sum\limits_{n\in\mathbb{N}} f_n$ converge normalement (a fortiori uniformément) vers exp sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. D'après le théorème de transfert de continuité exp est continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
   Finalement, par composition des limites, $\chi_{\exp(AB)} = \lim\limits_{k\to+\infty} \chi_{\exp(AB_k)}$ et $\chi_{\exp(BA)} = \lim\limits_{k\to+\infty} \chi_{\exp(B_kA)}$.
   Ainsi par unicité de la limite, $\chi_{\exp(AB)} = \chi_{\exp(BA)}$.

XIII.8.63 Comatrice et topologie

[Enoncé]

XIII.8.64 Groupe orthogonal ★

[Enoncé]
Soient $U, V \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.
Vérifions que $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$:

— V est inversible d'inverse $V^\top$ donc $\mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \subset \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$;

— $(UV^{-1})^\top UV^{-1} = (V^{-1})^\top U^\top UV^{-1} = (V^\top)^{-1}V^{-1} = VV^{-1} = I_n$ donc $UV^{-1} \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

Ensuite, $\mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \subset \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ qui est de dimension finie donc il suffit de montrer que $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est fermé et borné.
Pour la norme $||.||_2 : M \mapsto \sqrt{\text{Tr}(M^\top M)}$, $||V||_2 = \sqrt{\text{Tr}(I_n)} = \sqrt{n}$ d'où $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est borné.
On aurait aussi pu prendre la norme $||.||_\infty : M \mapsto \max_{1\leq i,j\leq n} |M_{ij}|$: On sait que la famille des colonnes de V forme une base orthonormée de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ pour son produit scalaire canonique. Alors en notant $C_1, \dots, C_n$ les colonnes de V, $\forall j \in [\![1;n]\!]$, $||C_j||^2 = \sum_{i=1}^{n} V_{ij}^2 = 1$. Donc $\forall i,j \in [\![1;n]\!]$, $|V_{ij}| \leq 1$. D'où $||V||_\infty \leq 1$.
Enfin, $\mathcal{O}_n(\mathbb{R}) = f^{-1}(\{I_n\})$ avec $f : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto M^\top M$.
Or les coefficients de $M^\top M$ sont polynomiaux en ceux de M donc f est continue.
On en déduit, comme $\{I_n\}$ est fermé, que $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est fermé.

On remarque que $\det(\mathcal{O}_n(\mathbb{R})) = \{-1, 1\}$ n'est pas connexe par arcs.
L'application $\det : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ est continue car polynomiale en les coefficients de la matrice donc $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ ne peut pas être connexe par arcs.

XIII.8.65 Groupe (spécial) unitaire ★★★

[Enoncé]

1. On vérifie que $\varphi : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \\ M & \longmapsto & \overline{M} \end{cases}$ est un morphisme d'algèbre.

   Soient $A, B \in U_n(\mathbb{C})$.
   Vérifions que $U_n(\mathbb{C})$ est un sous-groupe de $\text{GL}_n(\mathbb{C})$:
   — $I_n \in U_n(\mathbb{C})$
   — A est inversible d'inverse $\overline{A}^\top$ donc $U_n(\mathbb{R}) \subset \text{GL}_n(\mathbb{C})$;
   — $\overline{(AB^{-1})}^\top AB^{-1} = (\overline{A} \cdot \overline{B^{-1}})^\top = \left(\overline{B^{-1}}\right)^\top \left(\overline{A}\right)^\top AB^{-1} = \left(\overline{B}^\top\right)^{-1} B^{-1} = BB^{-1} = I_n$ donc $AB^{-1} \in U_n(\mathbb{C})$.

   Montrons ensuite que $U_n(\mathbb{C})$ est compact.
   $U_n(\mathbb{C}) \subset \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui est de dimension finie il suffit donc $U_n(\mathbb{C})$ montrer que $U_n(\mathbb{C})$ est fermé et borné.
   On commence par vérifier que l'application $||.|| : M \mapsto \sqrt{\text{Tr}\left(\overline{M}^\top M\right)} = \sqrt{\sum_{1\leq i,j\leq n} |M_{ij}|^2}$ définie une norme (qu'on dit hermitienne) sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
   $||A|| = \sqrt{\text{Tr}(I_n)} = \sqrt{n}$ d'où $U_n(\mathbb{C})$ est borné.
   Enfin, $U_n(\mathbb{C}) = g^{-1}(\{I_n\})$ avec $g : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mapsto \overline{M}^\top M$.
   Or les parties réelles et imaginaires des coefficients de $\overline{M}^\top M$ sont polynomiales en celles de M donc g est continue.
   On en déduit, comme $\{I_n\}$ est fermé, que $U_n(\mathbb{C})$ est fermé.

   Montrons maintenant que $\widehat{U_n(\mathbb{C})^\circ} = \emptyset$.
   $U_n(\mathbb{C})$ est inclus dans l'ensemble $\mathcal{Z} = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ |\det(M)| = 1\}$.
   Or si $M \in \mathcal{Z}$ alors en posant pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $M_k = M - \frac{1}{k} I_n$ on a :
   — $(M_k)_{k\in\mathbb{N}^*}$ converge vers M
   — APCR $M_k \notin \mathcal{Z}$ puisque sinon il existerait une infinité de $k \in \mathbb{N}^*$ pour lequel $\det(M_k) \neq 0$. Pour chacun de ces k on aurait $\frac{1}{k} \in \text{Sp}(M)$ et donc M aurait une infinité de valeurs propres.

   Ainsi, aucune matrice de $\mathcal{Z}$ n'est intérieure à $\mathcal{Z}$.
   Finalement, $\widehat{U_n(\mathbb{C})^\circ} \subset \mathring{\mathcal{Z}} = \emptyset$ est vide.

   Pour $SU_n(\mathbb{C})$ on remarque que $SU_n(\mathbb{C}) = U_n(\mathbb{C}) \cap \text{SL}_n(\mathbb{C})$ où $\text{SL}_n(\mathbb{C})$ désigne l'ensemble des matrices complexes dont le déterminant vaut 1.
   $\text{SL}_n(\mathbb{C}) = \ker(\det)$ c'est donc un sous-groupe de $\text{GL}_n(\mathbb{C})$ et donc $SU_n(\mathbb{C})$ est un sous-groupe de $\text{GL}_n(\mathbb{C})$.
   De plus comme l'application det est continue on obtient aussi que $\text{SL}_n(\mathbb{C})$ est fermé et donc que $SU_n(\mathbb{C})$ est compact

en tant que fermé inclus dans un compact ($U_n(\mathbb{C})$).

Enfin $SU_n(\mathbb{C}) \subset U_n(\mathbb{C}) \implies \overset{\circ}{SU_n(\mathbb{C})} = \emptyset$.

2. a. On résonne par récurrence sur la taille n de la matrice.

En préambule on montre que l'application $\langle\ ,\ \rangle : \begin{cases} \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ (X,Y) & \longmapsto & \overline{X}^\top Y \end{cases}$ définie un produit hermitien (équivalent des produits scalaires sur un espace pré-hilbertien) sur $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$. On note N la norme associée.

$n = 1$:

$U_1(\mathbb{C})$ est isomorphe à $\mathbb{U}$ donc le résultat est vrai.

Soit $n \geq 2$ On suppose le résultat vrai pour $U_{n-1}(\mathbb{C})$. Fixons $M \in U_n(\mathbb{C})$.

χ_M est scindé sur $\mathbb{C}$ dont M admet une valeur propre λ. Notons X un vecteur propre associé.

$MX = \lambda X \implies \overline{M}\,\overline{X} = \overline{\lambda}\,\overline{X} \implies \overline{X}^\top \overline{M}^\top = \overline{\lambda}\,\overline{X}^\top$.

Par conséquent, $\overline{X}^\top \overline{M}^\top MX = (\overline{\lambda}\,\overline{X}^\top)(\lambda\,X) = |\lambda|^2 \overline{X}^\top X$ et $\overline{X}^\top \overline{M}^\top MX = \overline{X}^\top I_n X = \overline{X}^\top X$.

Or, $\overline{X}^\top X = N(X) \neq 0$ puisque $X \neq 0$.

Ainsi $|\lambda|^2 = 1$ c'est à dire $|\lambda| = 1$ c'est à dire $\exists \theta_1 \in \mathbb{R},\ \lambda = e^{i\theta_1}$.

De plus, puisque X est non nul on peut poser $e_1 = \dfrac{X}{N(X)}$ et compléter (e_1) en une base $(e_1, \dots, e_n)$ de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ orthonormée pour le produit hermitien dont N est issue.

On sait alors que pour Q la matrice dont les colonnes sont $e_1, \dots, e_n$ on a $Q \in U_n(\mathbb{C})$ et,

$$QMQ^{-1} = \left(\begin{array}{c|ccc} e^{i\theta_1} & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & M' & \\ 0 & & & \end{array}\right)$$

Vérifions que $M' \in U_{n-1}(\mathbb{C})$:

D'une part, on sait que $QMQ^1 \in U_n(\mathbb{C})$ car $(U_n(\mathbb{C}), \times)$ est un groupe. C'est à dire que $\overline{QMQ^{-1}}^\top QMQ^{-1} = I_n$.

D'autre part, $\overline{QMQ^{-1}}^\top QMQ^{-1} = \left(\begin{array}{c|ccc} e^{-i\theta_1} & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & \overline{M'}^\top & \\ 0 & & & \end{array}\right) \left(\begin{array}{c|ccc} e^{i\theta_1} & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & M' & \\ 0 & & & \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & \overline{M'}^\top M' & \\ 0 & & & \end{array}\right)$

Donc $\overline{M'}^\top M' = I_{n-1}$ i.e $M' \in U_{n-1}(\mathbb{C})$.

On peut alors appliquer l'hypothèse de récurrence à M' :

$\exists P' \in U_{n-1}(\mathbb{C}),\ \exists (\theta_2, \dots, \theta_n) \in \mathbb{R}^{n-1},\ M' = P' \mathrm{diag}(e^{i\theta_2}, \dots, e^{i\theta_n})(P')^{-1}$.

On pose alors enfin $P = \left(\begin{array}{c|ccc} e_1 & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & P' & \\ 0 & & & \end{array}\right)$ et on vérifie que $M = P\mathrm{diag}(e^{i\theta_1}, \dots, e^{i\theta_n})P^{-1}$.

b. Soit $M \in U_n(\mathbb{C})$. $\exists P \in U_n(\mathbb{C}),\ \exists (\theta_1, \dots, \theta_n) \in \mathbb{R}^n,\ M = P\mathrm{diag}(e^{i\theta_1}, \dots, e^{i\theta_n})P^{-1}$.

On pose $\gamma : \begin{cases} [0,1] & \longrightarrow & U_n(\mathbb{C}) \\ t & \longmapsto & P\mathrm{diag}(e^{ti\theta_1}, \dots, e^{ti\theta_n})P^{-1} \end{cases}$. Il est clair que $\forall t \in [0,1],\ \mathrm{diag}(e^{ti\theta_1}, \dots, e^{ti\theta_n}) \in U_n(\mathbb{C})$. Donc comme $(U_n(\mathbb{C}), \times)$ est un groupe, $\forall t \in [0,1],\ \gamma(t) \in U_n(\mathbb{C})$: γ est bien une application.

De plus, la fonction $\alpha : M \in U_n(\mathbb{C}) \mapsto PMP^{-1}$ est continue car linéaire sur $U_n(\mathbb{C}) \subset \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ avec $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de dimension finie et la fonction $\beta : t \in [0,1] \mapsto \mathrm{diag}(e^{ti\theta_1}, \dots, e^{ti\theta_n})$ est continue car chacune de ses composantes l'est. Par conséquent $\gamma = \alpha \circ \beta$ est continue.

Enfin, $\gamma(0) = I_n$ et $\gamma(1) = M$.

Chaque matrice de $U_n(\mathbb{C})$ est reliable par un chemin continue dans $U_n(\mathbb{C})$ à la matrice identité donc $U_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs.

Pour $SU_n(\mathbb{C})$ il suffit de remarquer que $M = P\mathrm{diag}(e^{i\theta_1}, \dots, e^{i\theta_n})P^{-1} \in SU_n(\mathbb{C}) \iff \prod_{k=1}^{n} e^{i\theta_k} = 1 \iff \sum_{k=1}^{n} \theta_k \equiv 0[2\pi]$.

La même application fait alors l'affaire.

XIII.8.66 Partie compacte et stable par produit de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ ★★★

[Enoncé]

On se donne G une telle partie. Comme elle est non vide on se donne un élément $A \in G$. La stabilité par produit donne par récurrence immédiate $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ A^n \in G$.
Ensuite comme G est compacte on sait qu'il existe une application $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}^*$ strictement croissante telle que $(A^{\varphi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers une matrice $B \in G$.
On sait que l'inversion matricielle est continue (cf. VIII.56) donc $A^{-\varphi(n)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} B^{-1}$.
Par stricte croissance de φ, $\varphi(n+2) - \varphi(n) - 1 > 0$ d'où $(A^{\varphi(n+2)-\varphi(n)-1}) \in G^{\mathbb{N}}$.
De plus $(M, N, P) \mapsto MNP$ est trilinéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui est de dimension finie.
Elle est donc continue et, $A^{\varphi(n+2)}A^{-\varphi(n)}A^{-1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} BB^{-1}A^{-1} = A^{-1}$. Donc $A^{-1} \in G$ par caractérisation séquentielle d'une partie fermée.
G est une partie non vide de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$, stable par produit et passage à l'inverse : c'est un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$.

XIII.8.67 Intérieur des matrices diagonalisable ★★★★★

[Enoncé]

1. Tout d'abord, $\mathcal{B}_n(\mathbb{R}) \subset \mathcal{D}_n(\mathbb{R})$. Montrons que $\mathcal{B}_n(\mathbb{R})$ est ouvert dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
On note A l'ensemble des polynôme unitaire de degré n scindé à racines simples sur $\mathbb{R}[X]$ et $\Phi : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{R}[X] \\ M & \longmapsto & \chi_M \end{array} \right.$.
$\mathcal{B}_n(\mathbb{R}) = \Phi^{-1}(A)$ et Φ est continue car les coefficients de χ_M sont polynomiaux en ceux de M. On va alors montrer que A est ouvert dans $\mathbb{R}_n[X]$.
Soit $P = \prod_{i=1}^{n}(X - x_i) \in A$ avec $x_1 < \cdots < x_n$. On fixe $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ telle que,

$$a_0 < x_1 < a_1 < x_2 < \cdots < a_{n-1} < x_n < a_n$$

On pose l'application $\psi : \left\{ \begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & \mathbb{R}^{n+1} \\ P & \longmapsto & (P(a_0), \dots, P(a_n)) \end{array} \right.$ où B désigne l'ensemble des polynômes unitaires de degré n de $\mathbb{R}[X]$.
D'après le TVI, $\forall i \in [\![0; n-1]\!],\ P(a_i)P(a_{i+1}) < 0$.
Ainsi, $P \in U = \psi^{-1}\left(\prod_{i=0}^{n}(-1)^i\mathbb{R}_+^*\right) \cup \psi^{-1}\left(\prod_{i=0}^{n}(-1)^{i+1}\mathbb{R}_+^*\right)$.
$\prod_{i=0}^{n}(-1)^i\mathbb{R}_+^*$ et $\prod_{i=0}^{n}(-1)^{i+1}\mathbb{R}_+^*$ sont des ouverts de $\mathbb{R}^{n+1}$ et ψ est continue car linéaire sur $\mathbb{R}_n[X]$ qui est de dimension finie, donc U est un ouvert de $\mathbb{R}_n[X]$.
Enfin, un polynôme de U est dans A car il est unitaire de degré n et change $n+1$ fois de signe.
On a donc montré que de tout polynôme de A on peut construire un ouvert inclus dans A et contenant ce polynôme : A est ouvert.
Ainsi $\mathcal{B}_n(\mathbb{R})$ est ouvert.

Donnons nous ensuite une matrice $M \in \mathcal{D}_n(\mathbb{R}) \setminus \mathcal{B}_n(\mathbb{R})$. Il existe $\lambda \in \mathbb{C}$, une matrice diagonale $D \in \mathcal{M}_{n-2}(\mathbb{C})$ et une matrice $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ tels que $M = \left(\begin{array}{cc|ccc} \lambda & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & 0 & & & \\ \vdots & \vdots & & D & \\ 0 & 0 & & & \end{array}\right) P^{-1}$.
On pose, pour $k \in \mathbb{N}^*,\ M_k = P\left(\begin{array}{cc|ccc} \lambda & 1/k & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & 0 & & & \\ \vdots & \vdots & & D & \\ 0 & 0 & & & \end{array}\right) P^{-1}$.
$(M_k)_{k\in\mathbb{N}^*}$ converge vers M et $\forall k \in \mathbb{N}^*,\ M_k \notin \mathcal{D}_n(\mathbb{R})$.

Ceci montre que M n'est pas dans l'intérieur de $\mathcal{D}_n(\mathbb{R})$.

Finalement, $\overset{\circ}{\overbrace{\mathcal{D}_n(\mathbb{R})}} = \mathcal{B}_n(\mathbb{R})$.

2. Pour montrer que $\mathcal{B}_n(\mathbb{C})$ est ouvert on utilise le résultant (cf. IV.52).
$\mathcal{B}_n(\mathbb{C}) = \varphi^{-1}(\mathbb{C}^*)$ pour $\varphi : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ M & \longmapsto & \mathrm{Res}(\chi_M, \chi_M') \end{array} \right.$. Les coefficients de χ_M sont polynomiaux en ceux de M et les coefficients de χ_M' sont polynomiaux en ceux de χ_M donc φ est polynomiale en les coefficients de M (c'est un calcul de déterminant) et donc continue.

La suite du raisonnement est identique au cas $\mathbb{K} = \mathbb{R}$:
Donnons nous une matrice $M \in \mathcal{D}_n(\mathbb{C}) \setminus \mathcal{B}_n(\mathbb{C})$. Il existe $\lambda \in \mathbb{C}$, une matrice diagonale $D \in \mathcal{M}_{n-2}(\mathbb{C})$ et une matrice $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ tels que $M = \left(\begin{array}{cc|ccc} \lambda & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & 0 & & & \\ \vdots & \vdots & & D & \\ 0 & 0 & & & \end{array}\right) P^{-1}$.
On pose, pour $k \in \mathbb{N}^*$, $M_k = P \left(\begin{array}{cc|ccc} \lambda & 1/k & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & 0 & & & \\ \vdots & \vdots & & D & \\ 0 & 0 & & & \end{array}\right) P^{-1}$.
$(M_k)_{k\in\mathbb{N}^*}$ converge vers M et $\forall k \in \mathbb{N}^*,\ M_k \notin \mathcal{D}_n(\mathbb{C})$.
Ceci montre que M n'est pas dans l'intérieur de $\mathcal{D}_n(\mathbb{C})$.

Finalement, $\overset{\circ}{\overbrace{\mathcal{D}_n(\mathbb{C})}} = \mathcal{B}_n(\mathbb{C})$.

XIII.8.68 Adhérence des matrices diagonalisables ★★★

[Enoncé]

1. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) = \mathcal{T}_n(\mathbb{C})$. On note $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les valeurs propres de M, potentiellement égales. Il existe P une matrice inversible et T une matrice triangulaire supérieure telles que $M = PTP^{-1}$.
Posons, pour $k \in \mathbb{N}$, $M_k = P\left(T + \mathrm{diag}\left(\frac{1}{k+1}, \dots, \frac{1}{k+n}\right)\right)P^{-1}$.

La suite $(M_k)_{k\in\mathbb{N}}$ converge vers M. De plus si $k \in \mathbb{N}$, les valeurs propres de M_k sont les $\mu_{k,i} = \lambda_i + \dfrac{1}{k+i}$ pour $1 \leq i \leq n$ soient distincts.
Soit $i, j \in [\![1; n]\!]$ distincts.
Si $\lambda_i = \lambda_j$ alors $\mu_{k,i} \neq \mu_{k,j}$.
Et si $\lambda_i \neq \lambda_j$ alors $|\mu_{k,i} - \mu_{k,j}| = \left|\lambda_i - \lambda_j - \left(\dfrac{1}{k+j} - \dfrac{1}{k+i}\right)\right| \geq \left|\ |\lambda_i - \lambda_j| - \left|\dfrac{1}{k+j} - \dfrac{1}{k+j}\right|\ \right|$.
APCR, $\left|\ |\lambda_i - \lambda_j| - \left|\dfrac{1}{k+j} - \dfrac{1}{k+j}\right|\ \right| = |\lambda_i - \lambda_j| - \left|\dfrac{1}{k+j} - \dfrac{1}{k+j}\right| > 0$ car $|\lambda_i - \lambda_j| > 0$.
Ainsi APCR M_k est diagonalisable car elle a n valeurs propres distinctes.

2. a. Supposons P est scindé sur $\mathbb{R}[X]$. On écrit $P = \prod_{k=1}^{d}(X - x_k)$. On sait alors que $\forall k \in [\![1; d]\!],\ x_k \in \mathbb{R}$.
Fixons $z \in \mathbb{C}$.
Pour tout $k \in [\![1; d]\!]$, $|z - x_k| = \sqrt{\mathrm{Re}(z - x_k)^2 + \mathrm{Im}(z - x_k)^2} \geq |\mathrm{Im}(z - x_k)| = |\mathrm{Im}(z)|$ car x_k est réel.
Donc, $|P(z)| = \prod_{k=1}^{d} |z - x_k| \geq \prod_{k=1}^{d} |\mathrm{Im}(z)| = |\mathrm{Im}(z)|^d$
Réciproquement si $\forall z \in \mathbb{C},\ |P(z)| \geq |\mathrm{Im}(z)|^d$ alors pour toute racine z de P on a $|\mathrm{Im}(z)|^d \leq 0$ d'où $\mathrm{Im}(z) = 0$ c'est à dire $z \in \mathbb{R}$.
On sait que P est scindé sur $\mathbb{C}$ et donc P est scindé sur $\mathbb{R}$.

b. Comme $\mathcal{D}_n(R) \subset \mathcal{T}_n(\mathbb{R})$ on a $\overline{\mathcal{D}_n(R)} \subset \overline{\mathcal{T}_n(\mathbb{R})}$.
Par le même raisonnement qu'en question 1 on montre que $\mathcal{T}_n(\mathbb{R}) \subset \overline{\mathcal{D}_n(\mathbb{R})}$.
Il reste donc à montrer que $\mathcal{T}_n(\mathbb{R})$ est fermé dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
Soit $(M_k) \in \mathcal{T}_n(\mathbb{R})^{\mathbb{N}}$ convergente.
L'application $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto \chi_M$ est continue car les coefficients de χ_M sont polynomiaux en ceux de M d'où $\chi_{M_k} \underset{k\to+\infty}{\longrightarrow} \chi_M$.
Soit z une racine de χ_M.
D'après la question précédente, $\forall k \in \mathbb{N},\ |\chi_{M_k}(z)| \geq |\mathrm{Im}(z)|^n$.
Donc par passage à la limite, $|\mathrm{Im}(z)|^n \leq |\chi_M(z)| = 0$ c'est à dire $z \in \mathbb{R}$.
Ainsi χ_M est scindé sur $\mathbb{R}$ i.e $M \in \mathcal{T}_n(\mathbb{R})$.

Finalement $\overline{\mathcal{D}_n(\mathbb{R})} = \mathcal{T}_n(\mathbb{R})$.

XIII.8.69 Une preuve de Cayley-Hamilton (1) ★★

[Enoncé]

1. Notons $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les valeurs propres de A, potentiellement égale. Il existe une matrice inversible P telle que $A = P\mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)P^{-1}$. Notons $\chi_A = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$.
On calcule :
$$\begin{aligned}
\chi_A(A) &= \sum_{k=0}^{n} a_k \left(P\mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)P^{-1}\right)^k \\
&= \sum_{k=0}^{n} P\mathrm{diag}\left(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k\right) P^{-1} \\
&= P\mathrm{diag}\left(\sum_{k=0}^{n} a_k\lambda_1^k, \dots, \sum_{k=0}^{n} a_k\lambda_n^k\right) P^{-1} \\
&= P\mathrm{diag}(\chi_A(\lambda_1), \dots, \chi_A(\lambda_n))P^{-1} \\
&= P\mathrm{diag}(0, \dots, 0)P^{-1} \\
&= 0
\end{aligned}$$

2. On montre que l'ensemble des matrices à coefficients complexes diagonalisables est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ (cf. VIII.68).
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On se donne une suite $(A_k)_{k\in\mathbb{N}}$ de matrices diagonalisables qui converge vers A.
D'après la question 1, $\forall k \in \mathbb{N},\ \chi_{A_k}(A_k) = 0$.
Or l'application $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mapsto \chi_M(M)$ est continue car les coefficients de $\chi_M(M)$ sont polynomiaux en ceux de M.
Ainsi par passage à la limite, $\chi_A(A) = 0$.

XIII.8.70 Dimension du commutant d'une matrice

[Enoncé]

XIII.8.71 Topologie et réduction

[Enoncé]

XIII.8.72 Groupe spécial orthogonal et connexité

[Enoncé]

XIII.8.73 Matrices inversibles et connexité

[Enoncé]

XIII.8.74 Matrices nilpotentes et connexité

[Enoncé]

XIII.8.75 Raffinement sur les disques de Gershgorin

[Enoncé]

XIII.8.76 Matrices stochastiques et bistochastiques

[Enoncé]

XIII.8.77 Théorème de Birkhoff-Von Neumann ★★★★

[Enoncé]

1. Soit $P \in \mathrm{Conv}(\mathcal{P}_n)$. $\exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in (\mathbb{R}_+)^n$, $\exists (\sigma_1, \dots, \sigma_n) \in \mathcal{S}_n^n$, $\begin{cases} \sum_{k=1}^n \lambda_k = 1 \\ \sum_{k=1}^n \lambda_k P_{\sigma_k} = P \end{cases}$.

   Alors $P \in \mathcal{M}n\mathbb{R}_+$ et $\forall i \in [\![1;n]\!]$,

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n P_{ij} &= \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \lambda_k (P_{\sigma_k})_{ij} \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \lambda_k \delta_{i\sigma_k(j)} \\ \text{(par bijectivité de } \sigma_k) \quad &= \sum_{k=1}^n \lambda_k \sum_{j=1}^n \delta_{ij} \\ &= \sum_{k=1}^n \lambda_k \\ &= 1 \end{aligned}$$

   De même, $\sum_{j=1}^n P_{ji} = 1$.

   Ainsi $P \in \mathcal{B}_n$.

2. a. B ne peut pas avoir de colonne/ligne nulle. Il y a donc exactement un coefficient non nul par ligne et par colonne. Mais alors la condition "$\forall i \in [\![1;n]\!]$, $\sum_{j=1}^n B_{ij} = \sum_{j=1}^n B_{ji} = 1$" impose qu'ils valent tous 1 : B est une matrice de permutation.

   b. Montrons que $(A_i)_{1 \le i \le n}$ vérifie la condition (ii) du théorème de Hall. Fixons $I \subset [\![1;n]\!]$ et notons $A_I = \bigcup_{i \in I} A_i$.

$$\begin{aligned}
\mathrm{Card}(A_I) &= \sum_{j\in A_I} 1 \\
&= \sum_{j\in A_I}\sum_{i=1}^{n} B_{ij} \\
\text{(Les sommes sont finies)} \quad &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j\in A_I} B_{ij} \\
&\geq \sum_{i\in I}\sum_{j\in A_I} B_{ij} \\
\text{(par définition de } A_I) \quad &= \sum_{i\in I}\sum_{j=1}^{n} B_{ij} \\
&= \sum_{i\in I} 1 \\
&= \mathrm{Card}(I)
\end{aligned}$$

Alors d'après le théorème de Hall (cf.**??**), $\exists (j_1,\dots,j_n)\in \prod_{i=1}^{n} A_i,\ \forall (k,l)\in [\![1;n]\!]^2,\ (k\neq l \implies j_k\neq j_l)$.

Posons $\sigma : \left\{ \begin{array}{ccc} [\![1;n]\!] & \longrightarrow & [\![1;n]\!] \\ k & \longmapsto & j_k \end{array} \right.$. $\sigma\in S_n$ puisqu'elle est injective par construction.

On pose aussi $\lambda = \min\left\{ B_{ij},\ j\in \bigcup_{i=1}^{n} A_i \right\}$. $\lambda<1$ car sinon on aurait $m=n$.

Enfin, posons $B_0 = \dfrac{1}{\lambda}(B-P_\sigma)$.

Le choix de λ garantit que $B_0\in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}_+)$ et $\forall i\in [\![1;n]\!]$,

$\sum_{j=1}^{n}(B_0)_{ij} = \dfrac{1}{1-\lambda}\left(\sum_{j=1}^{n} B_{ij} - \lambda\sum_{j=1}^{n}(P_\sigma)_{ij}\right) = \dfrac{1}{1-\lambda}(1-\lambda) = 1$. Ainsi $B_0\in\mathcal{B}_n$.

De plus, en notant j_0 un indice tel que $B_{ij_0}=\lambda$, on remarque que $(B_0)_{ij_0}=0$ alors que $B_{ij_0}\neq 0$ par définition des A_i.

B_0 est donc bien une matrice bistochastique ayant au moins un coefficient nul de plus que B.

3. Par hypothèse de récurrence, $B_0\in \mathrm{Conv}(\mathcal{P}_n)$. Donc $\exists(\lambda_1,\dots,\lambda_n)\in(\mathbb{R}_+)^n$, $\exists (P_1,\dots,P_n)\in\mathcal{P}_n^n$, $\begin{cases} \sum_{k=1}^{n}\lambda_k = 1 \\ \sum_{k=1}^{n}\lambda_k P_k = B_0 \end{cases}$.

Posons pour tout $k\in[\![1;n]\!]$, $\mu_k=(1-\lambda)\lambda_k$, $P'_k=P_k$ ainsi que $\mu_{n+1}=\lambda$ et $P'_{n+1}=P_\sigma$. On a :

- $\forall k\in[\![1;n+1]\!],\ \mu_k\geq 0,\ P_k\in\mathcal{P}_n$
- $\sum_{k=1}^{n+1}\mu_k = \lambda + (1-\lambda)\sum_{k=1}^{n}\lambda_k = \lambda+(1-\lambda)=1$;
- $\sum_{k=1}^{n+1}\mu_k P'_k = \lambda P_\sigma + (1-\lambda)\sum_{k=1}^{n}\lambda_k P_k = \lambda P_\sigma + (1-\lambda)B_0 = B$.

Ainsi par récurrence, pour tout $m\in[\![n;n^2]\!]$, toute matrice bistochastique ayant exactement m coefficients non nuls appartient à l'enveloppe convexe de $\mathcal{P}_n$. Ceci rassemble toutes les matrices bistochastiques d'où $\mathcal{B}_n\subset\mathrm{Conv}(\mathcal{P}_n)$ puis $\mathcal{B}_n=\mathrm{Conv}(\mathcal{P}_n)$.

Points extrémaux des matrices bistochastiques

XIII.9 Correction Fonction à valeurs vectorielles

XIII.9.1 Point fixe de l'exponentielle complexe

[Enoncé]

XIII.9.2 Théorème du relèvement

[Enoncé]

1. Unicité : Soient θ_1 et θ_2 deux fonctions de classe $\mathbb{C}^n$ vérifiant la condition. Pour tout $t \in I$, on a :

$$|f(t)|e^{2i\pi\theta_1(t)} = |f(t)|e^{2i\pi\theta_2(t)}$$

Puisque f est à valeurs dans $\mathbb{C}^*$, on a $|f(t)| \neq 0$ et donc :

$$e^{2i\pi(\theta_1(t)-\theta_2(t))} = 1$$

Cela implique que pour tout $t \in I$, la différence $\theta_1 - \theta_2$ est à valeurs dans $\mathbb{Z}$. Puisque θ_1 et θ_2 sont continue sur I, on en déduit que l'image de I par la fonction $\theta_1 - \theta_2$ doit être un intervalle de $\mathbb{Z}$ c'est-à-dire un singleton.
Par conséquent, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $\theta_1 = \theta_2 + k$.
Existence : **A faire plus tard**

2. On a montré que tous arguments de f diffère d'une constante. Par conséquent, il est immédiat que $N_\theta(f)$ ne dépend pas de θ.

3. Supposons qu'il existe une fonction continue $L : \mathbb{C}^* \to \mathbb{C}$ telle que $\exp \circ L = Id_{\mathbb{C}^*}$.
On pose $f : t \in [0,1] \mapsto e^{2i\pi t}$. On remarque que $f(0) = f(1) = 1$.
On pose également $\theta(t) = \frac{1}{2i\pi}L(f(t))$.
f est continue et L est supposée continue, donc par composition θ est continue sur I.
Pour tout $t \in [0,1]$

$$f(t) = \exp(L(f))$$

Par conséquent en passant par le module, on en déduit que :

$$|\exp(L(f(t)))| = e^{\Re(L(f(t)))} = 1$$

et donc $L(f(t))$ est un imaginaire pur donc θ est à valeurs dans $\mathbb{R}$.
Il reste donc à montrer que θ vérifie l'équation du relèvement, ce qui est évident.
Maintenant, trouvons l'absurdité.
Puisque $f(0) = f(1)$, on peut calculer le nombre de tours $N_\theta(f)$.

$$N_\theta(f) = \frac{1}{2i\pi}\left(L(f(1)) - L(f(0))\right)$$

Or $f(0) = L(1)$ donc $L(f(0)) = L(f(1))$,ce qui donne :

$$N_\theta(f) = 0$$

On remarque que la fonction $\theta' : t \in [0,1] \mapsto t$ est aussi un argument de f.
Calculons le nombre de tours avec ce relèvement :

$$N_{\theta'}(f) = \theta'(1) - \theta'(0) = 1$$

D'après la question 2, on doit avoir $N_\theta(f) = N_{\theta'}(f)$, on a donc obtenu une absurdité par conséquent il n'existe aucune fonction continue $L : \mathbb{C}^* \to \mathbb{C}$ telle que $\exp \circ L = Id_{C^*}$

XIII.9.3 Equation fonctionnelle de l'exponentielle matricielle ★★★

[Enoncé]

1. On remarque déjà que $\varphi(0) = \varphi(0)^2$ et que $\forall (s,t) \in \mathbb{R}^2,\ \varphi(s)\varphi(t) = \varphi(s+t) = \varphi(t)\varphi(s)$.
   Alors si l'on fixe $s \in \mathbb{R}$ et que l'on dérive par rapport à t en 0 :
   φ est dérivable en s et $\varphi(s)\varphi'(0) = \varphi'(s) = \varphi'(0)\varphi(s)$.
   Notons $C_1(s), \dots, C_n(s)$ les colonnes de $\varphi(s)$, $f : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})^n & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ (C_1, \dots, C_n) & \longmapsto & (C_1 \mid \dots \mid C_n) \end{array} \right.$ et $g : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})^n \\ s & \longmapsto & (C_1(s), \dots, C_n(\end{array} \right.$
   f est linéaire et g est dérivable car toutes ses composantes le sont. Ainsi $\forall s \in \mathbb{R},\ \varphi'(s) = (f \circ g)'(s) = f(g'(s)) = (C_1'(s) \mid \dots \mid C_n'(s))$. Par conséquent,
   $\forall s \in \mathbb{R},\ \varphi'(s) = \varphi'(0)\varphi(s) \implies \forall s \in \mathbb{R},\ \forall k \in [\![1;n]\!],\ C_k'(s) = \varphi'(0)C_k(s) \implies \forall s \in \mathbb{R},\ \forall k \in [\![1;n]\!],\ C_k(s) = e^{s\varphi'(0)}C_k(0) \implies \forall s \in \mathbb{R},\ \varphi(s) = e^{s\varphi'(0)}\varphi(0)$.
   De plus, on montre que comme $\varphi'(0)$ et $\varphi(0)$ commutent, $e^{s\varphi'(0)}$ et $\varphi(0)$ commutent pour tout réel s (par continuité du produit matriciel ou en montrant que $e^{s\varphi'(0)}$ est un polynôme en $\varphi'(0)$ par exemple).
   Réciproquement donnons nous A une matrice de projection ainsi que B une matrice commutant avec A et vérifions que $\varphi : x \mapsto Ae^{xB}$ vérifie : $\forall (s,t) \in \mathbb{R}^2,\ \varphi(s+t) = \varphi(s)\varphi(t)$.
   On sait que A commute avec e^{xB} quel que soit $x \in \mathbb{R}$ et que si M et N commutent, $e^{M+N} = e^M e^N$ d'où :
   $\forall (s,t) \in \mathbb{R}^2,\ \varphi(s)\varphi(t) = Ae^{sB}Ae^{tB} = e^{sB}A^2e^{tB} = e^{sB}Ae^{tB} = Ae^{sB}e^{tB} = Ae^{(s+t)B} = \varphi(s+t)$.
2. φ est un morphisme de groupes donc $\varphi(0) = I_n$. Fixons $T > 0$ et $s \in R$. En intégrant par rapport à t entre 0 et T :
   $\varphi(s)\displaystyle\int_0^T \varphi(t)dt = \int_0^T \varphi(s+t)dt = \int_s^{s+T} \varphi(t)dt$.
   Montrons que $A(T) = \displaystyle\int_0^T \varphi(t)dt$ est inversible pour T assez petit.
   Soit $\varepsilon > 0$.
   D'après le théorème fondamental de l'analyse, A est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et $A(T) \underset{T\to 0}{=} A(0) + TA'(0) + o(T) \underset{T\to 0}{=} TI_n + o(T)$.
   Ainsi $\dfrac{1}{T}A(T) \underset{T\to 0}{\longrightarrow} I_n$ d'où $\dfrac{1}{T^n}\det(A(T)) \underset{T\to 0}{\longrightarrow} 1$ c'est à dire $\det(A(T)) \underset{T\to 0}{\sim} T^n$.
   Or $T^n > 0$ lorsque $T > 0$. Donc $\exists T_1 \in \mathbb{R}_+^*,\ \det(A(T_1)) > 0$.
   Ainsi, pour $T = T_1,\ \varphi(s) = A(T_1)^{-1}(\Phi(s+T_1) - \Phi(s))$. Cette dernière expression est $\mathcal{C}^1$ en s donc φ est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et on se retrouve dans le cas de la question précédente.

XIII.9.4 Formule de Trotter-Kato ★★

[Enoncé]

1. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Par récurrence immédiate, $\forall n \in \mathbb{N},\ \|M^n\| \leq \|M\|^n$.
   Comme toutes les sommes qu'on va écrire convergent, par inégalité triangulaire,
   $\|e^M\| = \left\|\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{M^n}{n!}\right\| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \left\|\frac{M^n}{n!}\right\| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\|M\|^n}{n!} = e^{\|M\|}$.
   Ainsi, $\left\|\exp\left(\dfrac{A}{k}\right)\exp\left(\dfrac{B}{k}\right)\right\| \leq \left\|\exp\left(\dfrac{A}{k}\right)\right\| \left\|\exp\left(\dfrac{B}{k}\right)\right\| \leq \exp\left(\dfrac{\|A\|}{k}\right)\exp\left(\dfrac{\|B\|}{k}\right) = \exp\left(\dfrac{\|A\| + \|B\|}{k}\right)$.
2. D'après le cours, pour tout $M \in \mathcal{M}nK,\ f : t \mapsto e^{tM}$ est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et $\forall t \in \mathbb{R},\ f'(t) = Me^{tM}$.
   Ainsi h est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ par opérations et $\forall t \in \mathbb{R},\ h'(t) = Ae^{tA}e^{tB} + e^{tA}Be^{tB} - (A+B)e^{t(A+B)}$.
   On en déduit le développement limité en 0 de h à l'ordre 1 :
   $h(t) \underset{t\to 0}{=} h(0) + th'(0) + \mathcal{O}\left(t^2\right) \underset{t\to 0}{=} \mathcal{O}\left(t^2\right)$.
   Or $\dfrac{1}{k} \underset{k\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ donc $h\left(\dfrac{1}{k}\right) = X_k - Y_k \underset{k\to+\infty}{=} \mathcal{O}\left(\dfrac{1}{k^2}\right)$.
3. $\displaystyle\sum_{i=0}^{k-1} X_k^i(X_k - Y_k)Y_k^{k-i-1} = \sum_{i=0}^{k-1} X_k^{i+1}Y_k^{k-i-1} - \sum_{i=0}^{k-1} X_k^iY_k^{k-i} = \sum_{i=1}^{k} X_k^iY_k^{k-i} - \sum_{i=0}^{k-1} X_k^iY_k^{k-i} = X_k^k - Y_k^k$.
4. On sait que $\forall k \in \mathbb{N}^*,\ Y_k^k = \exp(A+B)$. Or, $\forall k \in \mathbb{N}^*$.
   $\left\|X_k^k - Y_k^k\right\| \leq \displaystyle\sum_{i=0}^{k-1} \|X_k\|^i \|X_k - Y_k\| \|Y_k\|^{k-i-1} = \|X_k - Y_k\| \sum_{i=0}^{k-1} \exp\left(\frac{\|A\| + \|B\|}{k}\right)^{k-1} = \|X_k - Y_k\|\, k \exp\left(\frac{\|A\| + \|B\|}{k}\right)^{k-1}$.

Et $k\|X_k - Y_k\| \underset{k\to+\infty}{=} \mathcal{O}\left(\frac{1}{k}\right)$ et $\exp\left(\frac{\|A\|+\|B\|}{k}\right)^{k-1} = \exp\left(\frac{k-1}{k}(\|A\|+\|B\|)\right) \underset{k\to+\infty}{\longrightarrow} \exp(\|A\|+\|B\|)$.

Donc $\left\|X_k^k - Y_k^k\right\| \underset{k\to+\infty}{=} \mathcal{O}\left(\frac{1}{k}\right)$ d'où $\lim_{k\to+\infty}\left(\exp\left(\frac{A}{k}\right)\exp\left(\frac{B}{k}\right)\right)^k = \exp(A+B)$.

XIII.9.5 Série entière de matrice ★★

[Enoncé]

On sait que pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\sum_{n\in\mathbb{N}} \frac{M^n}{n!}$ converge absolument vers e^M. Donc d'après le théorème de Fubini :

$$\begin{aligned} e^{iA} + e^{-iA} &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{i^n}{n!}A^n + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-i)^n}{n!}A^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{i^{2n}}{(2n)!}A^{2n} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{i^{2n+1}}{(2n+1)!}A^{2n+1} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-i)^{2n}}{(2n)!}A^{2n} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-i)^{2n+1}}{(2n+1)!}A^{2n+1} \\ &= 2\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{i^{2n}}{(2n)!}A^{2n} = 2\cos(A) \end{aligned}$$

On montre de même que $e^{iA} - e^{-iA} = 2i\sin(A)$. De plus, iA et $-iA$ commutent donc $e^{iA}e^{-iA} = e^{iA-iA} = I_n$

Ainsi, $\cos^2(A) + \sin^2(A) = \left(\frac{e^{iA}+e^{-iA}}{2}\right)^2 + \left(\frac{e^{iA}-e^{-iA}}{2i}\right)^2 = \frac{1}{4}\left[e^{2iA} + 2I_n + e^{-2iA} - \left(e^{2iA} - 2I_n + e^{-2iA}\right)\right] = I_n$.

XIII.9.6 Expression d'un projecteur

[Enoncé]

Puisque $A \in \mathcal{S}_n^{++}$, il existe $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{D}_n(\mathbb{R})$ tel que $A = PDP^\top$. Ainsi, $A^2 + x^2 I_n = P(D^2 + x^2 + I_n)P^\top$, par conséquent :

$$\int_0^{+\infty} A(A^2 + x^2 I_n)^{-1} dx = P\left(\int_0^{+\infty} D(D^2 + x^2 I_n)^{-1}\right)P^{-1}$$

$D(D^2 + x^2 I_n)$ est une matrice diagonale de coefficients $\frac{\lambda_i}{\lambda_i^2 + x^2}$.

Ainsi,

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} A(A^2 + x^2 I_n)^{-1} dx &= P\,\mathrm{diag}\left(\int_0^{+\infty} \frac{\lambda_i}{\lambda_i^2 + x^2} dx\right)_{i\in[\![1;n]\!]} P^\top \\ &= P\,\mathrm{diag}\left(\left[arctan\left(\frac{x}{\lambda_i}\right)\right]_0^{+\infty}\right)P^\top \\ &= P\frac{\pi}{2}I_n P^\top \\ &= \frac{\pi}{2}I_n \end{aligned}$$

Ainsi, l'intégrale existe et

$$\int_0^{+\infty} A(A^2 + x^2 I_n)^{-1} dx = \frac{\pi}{2}I_n$$

XIII.9.7 Une preuve analytique de Cayley-Hamilton

[Enoncé]

XIII.9.8 Exemple de fonctions lipschitzienne

[Enoncé]

XIII.9.9 Condition de continuité sur un espace vectoriel normé

[Enoncé]

XIII.9.10 Application linéaire (2)

[Enoncé]

XIII.9.11 Mouvement à force centrale

[Enoncé]

XIII.9.12 Dérivée d'un produit de deux matrices

[Enoncé]

XIII.9.13 Inégalité des accroissements finis pour un espace euclidien

[Enoncé]

XIII.10 Correction Equation différentielle

XIII.10.1 Equations différentielles du premier ordre

[Enoncé]

XIII.10.2 Equations différentielles du second ordre

[Enoncé]

XIII.10.3 Une autre équation différentielle ★★

[Enoncé]

1. Soit f solution. Alors $x \mapsto f(-x)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ d'où f est de classe $\mathcal{C}^2$.
   En dérivant dans l'équation : $\forall x \in \mathbb{R},\ f''(x) = -f'(-x) = -f(x)$.
   Ainsi f est solution de l'équation différentielle $y'' + y = 0$ sur $\mathbb{R}$.
   L'ensemble des solutions de cette équation est $\text{Vect}(\cos, \sin)$ donc $\exists a, b \in \mathbb{C},\ f = a\cos + b\sin$. Notons $\alpha = f(0)$. On sait que $f'(0) = f(0) = \alpha$.
   Ces conditions donnent $a = b = \alpha$. réciproquement, on vérifie que $\alpha(\cos + \sin)$ est solution du problème.
   L'ensemble des solutions du problème est donc $\text{Vect}(\cos + \sin)$.
2. Soit f solution. $x \mapsto f(\gamma x)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ donc f' aussi i.e f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$. Par récurrence f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.
   On montre alors par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in \mathbb{R},\ f^{(n)}(x) = \gamma^{n(n-1)/2} f(\gamma^n x)$. En particulier $f^{(n)}(0) = \gamma^{n(n-1)/2} f(0)$.
   Comme $|\gamma| \leq 1$, $\forall x \in \mathbb{R}$, $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \left| \frac{\gamma^{n(n-1)/2}}{n!} x^n \right| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|x|^n}{n!} = e^{|x|} < +\infty$.
   Ainsi cette série entière a un rayon de convergence infini et f est égale à sa série de Taylor sur $\mathbb{R}$. Vérifions que

$g : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\gamma^{n(n-1)/2}}{n!} x^n$ est bien solution.
D'après le cours g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et de plus :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ g'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\gamma^{n(n-1)/2}}{(n-1)!} x^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\gamma^{n(n+1)/2}}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\gamma^{n(n-1)/2}}{n!} (\gamma x)^n = g(\gamma x)$$

L'ensemble des solutions du problème est donc $\text{Vect}(g)$.

XIII.10.4 Problèmes de raccordement

[Enoncé]

XIII.10.5 Suite d'équations différentielles

[Enoncé]

XIII.10.6 Solution impaire ★★

[Enoncé]

1. Si y est une solution impaire alors elle satisfait le problème de Cauchy

$$\begin{cases} y' + ay + b = 0 \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

D'après le théorème de Cauchy linéaire, il existe une unique solution y à ce problème de Cauchy. Vérifions que y est impaire.
$x \mapsto -y(-x)$ est solution du même problème de Cauchy donc $\forall x \in \mathbb{R},\ y(-x) = -y(x)$.

2. Supposons que l'équation $y' + ay + b = 0$ admette une solution y impaire. Alors y' est paire, en effet $\forall x \in \mathbb{R},\ -y(-x) = y(x) \implies \forall x \in \mathbb{R},\ y'(-x) = y'(x)$.
Alors $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} (L_1) : y'(x) + a(x)y(x) + b(x) = 0 \\ (L_2) : y'(-x) + a(-x)y(-x)b(-x) = 0 \end{cases}$$

Càd

$$\begin{cases} (L_1) : y'(x) + a(x)y(x) + b(x) = 0 \\ (L_2) : y'(x) - a(-x)y(x) + b(-x) = 0 \end{cases}$$

Ainsi en faisant la différence $(L_1) - (L_2) : (a(x) + a(-x))y(x) + b(x) - b(-x) = 0$.
On rappelle qu'on peut écrire une fonction avec sa partie paire et sa partie impaire $f = f_p + f_i$ où $f_p : x \mapsto \frac{f(x) + f(-x)}{2}$ est paire et $f_i : x \mapsto \frac{f(x) - f(-x)}{2}$ est impaire.
On a donc montré qu'on a la relation $a_p(x)y(x) + b_i(x) = 0$.

XIII.10.7 Un principe des zéros isolés ★★★

[Enoncé]
Soit y non nulle solution. Supposons par l'absurde que y n'a pas ses zéros isolés.
1ère méthode :
Soient $x, x_0 \in I$ tel que $y(x_0) = 0$. On suppose $x > x_0$.
La fonction nulle est solution de l'équation différentielle avec condition initiale $y(0) = y'(0) = \cdots = y^{(n-1)}(0) = 0$. Par unicité de la solution d'un problème de Cauchy, il existe $k \in [\![0; n-1]\!]$ tel que $y^{(k)}(x_0) \neq 0$. Prenons p le plus petit

entier naturel tel que $y^{(p)}(x_0) \neq 0$.
y est de classe $\mathcal{C}^{p+1}$ sur $]x_0, x[$, et $\mathcal{C}^p$ sur $[x_0, x]$. Donc par la formule de Taylor-reste intégral :

$$y(x) = y(x_0) + \sum_{k=1}^{p-1} \frac{y^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + \int_{x_0}^{x} \frac{(t-x_0)^{p-1}}{(p-1)!} y^{(p)}(t)dt = \int_{x_0}^{x} \frac{(t-x_0)^p}{p!} y^{(p)}(t)dt$$

Or $\frac{(t-x_0)^{p-1}}{(p-1)!} y^p(t) \underset{t\to x_0}{\sim} \frac{(t-x_0)^{p-1}}{(p-1)!} y^{(p)}(x_0)$ et l'intégrale $\int_{x_0}^{x} \frac{(t-x_0)^{p-1}}{(p-1)!} y^{(p)}(x_0)dt = \frac{y^{(p)}(x_0)}{p!}(x-x_0)^p$ converge.
donc par intégration de relation de comparaison $y(x) \underset{x\to x_0}{\sim} \frac{y^{(p)}(x_0)}{p!}(x-x_0)^p$.
La fonction $x \mapsto \frac{y^{(p)}(x_0)}{p!}(x-x_0)^p$ ne s'annule pas sur un voisinage épointé de x_0, donc y non plus ce qui conclut.

2nd méthode :
On peut alors trouver une suite de zéros **distincts** $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} = (x_n^{(0)})_{n\in\mathbb{N}}$ de y qui converge vers un zéro de y. On montre (cf. I.18) que quitte à extraire on peut supposer (x_n) strictement monotone. Disons qu'elle est strictement croissante.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, y est dérivable sur $]x_n, x_{n+1}[$, continue sur $[x_n, x_{n+1}]$ donc d'après le théorème de Rolle, $\exists x_n^{(1)} \in]x_n, x_{n+1}[,\ y'\left(x_n^{(1)}\right) = 0$.
Par récurrence sur $j \in [\![1; n]\!]$ on construit en appliquant Rolle à $y^{(j-1)}$ des suites $\left(x_n^{(j)}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ vérifiant $\forall n \in \mathbb{N},\ y^{(j)}\left(x_n^{(j)}\right) = 0$ et $x_n^{(j)} \in]x_n^{(j-1)}, x_n^{(j-1)}[\subset]x_n, x_{n+1}[$.
Ainsi par le théorème des gendarmes $\forall j \in [\![1; n]\!],\ x_n^{(j)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} x$. Et par continuité de $y^{(j)}$ en x, on en déduit que x est un zéro de $y, y', \dots, y^{(n)}$. Par conséquent y est solution du problème de Cauchy :

$$\begin{cases} y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_0 y = 0 \\ y(x) = y'(x) = \cdots = y^{(n-1)}(x) = 0 \end{cases}$$

La fonction nulle est aussi solution de ce problème de Cauchy donc par le théorème de Cauchy linéaire $y = 0$. On peut faire exactement le même raisonnement si $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est strictement décroissante en considérant les intervalles $]x_{n+1}, x_n[$.

XIII.10.8 Equation de Bernoulli (1)

[Enoncé]

XIII.10.9 Equation de Bernoulli (2)

[Enoncé]

XIII.10.10 Etude asymptotique des solutions d'une équation différentielle ★★★★

[Enoncé]

1. f est solution de $(E) : y' + ay = f' + af$ sur $\mathbb{R}_+$.
   Les solutions de (E) sur $\mathbb{R}_+$ sont les fonctions $f_C : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ x & \longmapsto & Ce^{-ax} + e^{-ax}\int_0^x (f'(t) + af(t))e^{at}dt \end{array} \right.$ avec $C \in \mathbb{C}$.
   Soit $C \in \mathbb{C}$ tel que $f = f_C$.
   D'une part, $|Ce^{-ax}| = |C|e^{-\Re(a)x} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ car $-\Re(a) < 0$.
   D'autre part, $(f'(t) + af(t))e^{at} \underset{t\to+\infty}{=} o(e^{at})$ et $\int_0^{+\infty} e^{at}dt$ diverge car $\Re(a) > 0$ donc,
   $\int_0^x (f'(t) + af(t))e^{at}dt \underset{x\to+\infty}{=} o\left(\int_0^x e^{at}dt\right) \underset{x\to+\infty}{=} o(e^{ax})$.
   D'où $\lim\limits_{+\infty} f = \lim\limits_{+\infty} f_C = 0$.

2. Notons $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$ et $g = f' - jf$. Alors $g' - \overline{j}g = f'' + f' + f$ admet une limite nulle en $+\infty$. Comme $\Re(-\overline{j}) > 0$,la question 1 montre que g admet une limite nulle en $+\infty$. et alors, comme $\Re(-j) > 0$, encore d'après la question 1, f admet une limite nulle en $+\infty$.
3. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme dont toutes les racines sont à parties réelles strictement négatives. Notons $n = \deg(P)$ et donnons nous une fonction $f \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R}_+, \mathbb{C})$ telle que $\lim\limits_{+\infty} P(D)(f) = 0$.
Raisonnons par récurrence sur le degré de P.
Si $n = 0$ il n'y a rien à démontrer.
Supposons que $n \geq 1$ et que le résultat est vrai pour les polynômes de degré $n-1$. On se donne une racine a de P pour écrire $P = (X-a)Q$ avec $\deg(Q) = n$. Posons $g = Q(D)(f)$. Alors $g' - ag = D \circ Q(D)(f) - aQ(D)(f) = P(D)(f)$ admet une limite nulle en $+\infty$. Or $\Re(-a) > 0$ donc d'après la question 1, g admet une limite nulle en $+\infty$. Et alors d'après l'hypothèse de récurrence, f admet une limite nulle en $+\infty$.
Par récurrence, le résultat est vrai pour tout $n \in \mathbb{N}$.

XIII.10.11 Inéquation différentielle

[Enoncé]

XIII.10.12 Solution 2π-périodique d'une équation différentielle

[Enoncé]

XIII.10.13 Superposition de solutions

[Enoncé]

XIII.10.14 Fonction de Bessel

[Enoncé]

XIII.10.15 Développement de la cotangente (2)

[Enoncé]

XIII.10.16 Wronskien

[Enoncé]

XIII.10.17 Solution non bornée ★★★

[Enoncé]

1. Si I est un intervalle de $\mathbb{R}$ et $a, b \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ alors le wronskien $W(y_1, y_2)$ de deux solutions de l'équation différentielle $y'' + ay' + b = 0$ est définie par $W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_2 y_1'$.
Le wronskien de y_1, y_2 est nul sur I si et seulement s'il est nul en un point si et seulement si y_1 et y_2 sont liées.
Il vérifie de plus l'équation différentielle $W'(t) = a(t)W(t)$.

2. $\forall t \in \mathbb{R},\ \Phi''(t) = -p(t)\Phi(t)$. En intégrant entre 0 et t, $\forall t \in \mathbb{R},\ \Phi'(t) = \Phi'(0) - \int_0^t p(s)\Phi(s)ds$.
   Or $\int_0^{+\infty} |p(s)\Phi(s)|ds \leq \|\Phi\|_\infty \int_0^{+\infty} |p(s)|ds < +\infty$ donc l'intégrale $\int_0^{+\infty} p(s)\Phi(s)ds$ converge (absolument).
   On en déduit que Φ' a une limite en $+\infty$, $\ell = \Phi'(0) - \int_0^{+\infty} p(s)\Phi(s)ds \in \mathbb{R}$.

3. Supposons que $\ell \neq 0$. Alors $\Phi'(t) \underset{t\to+\infty}{\sim} \ell$. Or $\int_0^{+\infty} \ell dt$ diverge donc d'après les théorèmes d'intégration de relation de comparaison $\Phi(t) - \Phi(0) \underset{t\to+\infty}{\sim} t\ell$.
   Ceci contredit le fait que Φ est bornée donc $\ell = 0$.

4. Supposons que toutes les solutions de (E) sont bornées. Donnons nous (y_1, y_2) une base de l'espace des solutions de (E).
   Comme (E) n'a pas de terme en y', $W(y_1, y_2)' = 0$, càd $W(y_1, y_2)$ est constant.
   Pourtant $|W(y_1, y_2)(t)| \leq \|y_1\|_\infty |y_2'(t)| + \|y_2\|_\infty |y_1'(t)| \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ par les questions précédentes.
   On en déduit $W(y_1, y_2) = 0$ ce qui contredit le fait que (y_1, y_2) est libre. Ainsi (E) admet une solution non bornée.

XIII.10.18 Principe d'entrelacement des zéros de Sturm

[Enoncé]

XIII.10.19 Solution qui s'annule

[Enoncé]

XIII.10.20 Solution qui s'annule une infinité de fois

[Enoncé]

XIII.10.21 Lemme de Grönwall

[Enoncé]

Application du lemme de Grönwall

XIII.10.22 Théorème de Floquet

[Enoncé]

XIII.10.23 Méthode de Lagrange (1) ★★★

[Enoncé]

1. Toute solution de (E) étant continue sur $]0, +\infty[$, l'équation reste vraie en $x = 0$.

Soit une solution $\varphi : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ définie sur un intervalle d'intérieur non vide $I \subset \mathbb{R}_+$ contenant 0. Fixons $x \in I$.

$$\begin{aligned}0 &= x\varphi''(x) + 3\varphi'(x) - 4x^3\varphi(x)\\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} n(n-1)a_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{+\infty} 3na_n x^{n-1} - \sum_{n=0}^{+\infty} 4a_n x^{n+3}\\ &= 3a_1 + 8a_2 x + 15a_3 x^2 + \sum_{n=3}^{+\infty}[(n+1)(n+3)a_{n+1} - 4a_{n-3}]x^n\end{aligned}$$

Donc par unicité du développement en série entière on obtient :
$\begin{cases} a_1 = a_2 = a_3 = 0 \\ \forall n \geq 0,\ (n+4)(n+6)a_{n+4} - 4a_n = 0 \end{cases}$
Par récurrence immédiate on remarque que $\forall n \in \mathbb{N},\ a_{4n+1} = a_{4n+2} = a_{4n+3} = 0$. De plus la suite de terme général $u_n = a_{4n}$ vérifie :
$\forall n \in \mathbb{N},\ (4n+4)(4n+6)u_{n+1} = 4u_n$ i.e $u_{n+1} = \dfrac{1}{2(n+1)(2n+3)}u_n$.
On suppose φ non nulle donc $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ n'est pas nulle d'où $u_0 \neq 0$ puis par récurrence immédiate $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n \neq 0$.
Ainsi $\forall n \in \mathbb{N},\ \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{1}{2(n+1)(2n+3)}$. On en déduit par produit que $\dfrac{u_n}{u_0} = \dfrac{1}{2^n n!}\prod_{k=0}^{n-1}\dfrac{1}{(2k+3)}$.

On calcule $\prod_{k=0}^{n-1}(2k+3) = \prod_{\substack{3\leq k\leq 2n+1\\ k \text{ impair}}} k = \dfrac{\prod_{k=3}^{2n+1} k}{\prod_{k=2}^{n} 2k} = \dfrac{(2n+1)!}{2^n n!}$.
Ainsi $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = \dfrac{u_0}{(2n+1)!}$.
Autrement dit $\forall x \in I\backslash\{0\},\ \varphi(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_{4n}x^{4n} = \sum_{n=0}^{+\infty}\dfrac{a_0}{(2n+1)!}x^{4n} = \dfrac{a_0}{x^2}\sum_{n=0}^{+\infty}\dfrac{(x^2)^{2n+1}}{(2n+1)!} = a_0\dfrac{\mathrm{sh}(x^2)}{x^2}$.
On vérifie que $x \mapsto \dfrac{\mathrm{sh}(x^2)}{x^2}$ est solution de (E) sur $]0,+\infty[$.

2. On cherche y solution de (E) sous la forme $y = \varphi \times z$ où $z \in \mathcal{C}^1(]0,+\infty[,\mathbb{R})$.
$\forall x > 0,\ y'(x) = \varphi'(x)z(x) + \varphi(x)z'(x)$ puis $y''(x) = \varphi''(x)z(x) + 2\varphi'(x)z'(x) + \varphi(x)z''(x)$. Donc :

$$\begin{aligned}0 &= xy'' + 3y' - 4x^3 y\\ &= (x\varphi''(x) + 3\varphi'(x) - 4x^3\varphi(x))z + (2x\varphi'(x) + 3\varphi(x))z' + x\varphi(x)z''\\ &= (2x\varphi'(x) + 3\varphi(x))z' + x\varphi(x)z'' \qquad \text{car } \varphi \text{ est solution de } (E)\end{aligned}$$

Or $x \mapsto x\varphi(x)$ ne s'annule pas sur $]0,+\infty[$ donc y est solution de (E) sur $]0,+\infty[$ si et seulement si z' est solution sur $]0,+\infty[$ de l'équation

$$(E') : u' + \left(2\frac{\varphi'(x)}{\varphi(x)} + \frac{3}{x}\right)u = 0$$

$\forall x > 0,\ \int_1^x \left(2\dfrac{\varphi'(t)}{\varphi(t)} + \dfrac{3}{t}\right)dt = [2\ln(|\varphi(t)|) + 3\ln(t)]_1^x = 2\ln(\varphi(x)) + 3\ln(x) - 2\ln(\varphi(1))$.
Ainsi $u : x \mapsto \exp(2\ln(\varphi(1)) - 2\ln(\varphi(x)) - 3\ln(x)) = \dfrac{\varphi(1)^2}{x^3\varphi(x)^2} = \dfrac{\mathrm{sh}(1)^2 x}{\mathrm{sh}(x^2)^2}$ est solution de (E') sur $]0,+\infty[$.
Finalement l'ensemble des solutions de (E) est $\mathrm{Vect}\left(x \mapsto \dfrac{\mathrm{sh}(x^2)}{x^2}, x \mapsto \dfrac{\mathrm{sh}(x^2)}{x^2}\int_1^x \dfrac{t}{\mathrm{sh}(t^2)^2}dt\right)$.

XIII.10.24 Méthode de Lagrange (2)

[Enoncé]

XIII.10.25 Solution de norme constante ★★★

[Enoncé]
Supposons que $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.
Soit X une solution du système différentiel $Y' = AY$. On sait que $\forall t \in \mathbb{R},\ X(t) = e^{tA}X(0)$.
Or $\forall t \in \mathbb{R},\ e^{tA} \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. En effet, par continuité de la transposition, $\forall t \in \mathbb{R},\ \left(e^{tA}\right)^\top = e^{tA^\top} = e^{-tA} = \left(e^{tA}\right)^{-1}$.
Ainsi, $\forall t \in \mathbb{R},\ \|X(t)\| = \|X(0)\|$.

Réciproquement, supposons que $X' = AX \implies \forall t \in \mathbb{R},\ \|X(t)\| = \|X(0)\|$.
Donnons nous une solution X du système différentiel.
En notant $X_0 = X(0)$, $\forall t \in \mathbb{R},\ \|X(t)\|^2 = \|X_0\|^2 \iff X(t)^\top X(t) = X_0^\top X_0 \iff X_0^\top e^{tA^\top} e^{tA} X_0 = X_0^\top X_0$.
On fait un développement à l'ordre 1 en 0 :
$X_0^\top (I_n + tA^\top + o(t))(I_n + tA + o(t))X_0 \underset{t\to 0}{=} X_0^\top X_0$ c'est à dire $X_0^\top X_0 \underset{t\to 0}{=} X_0^\top X_0 + tX_0^\top (A^\top + A)X_0 + t^2 X_0^\top A^\top A X_0 + o(t) \underset{t\to 0}{=} X_0^\top X_0 + tX_0^\top (A + A^\top)X_0 + o(t)$.
Ainsi $tX_0^\top (A^\top + A)X_0 + o(t) \underset{t\to 0}{=} 0$ puis $X_0^\top (A^\top + A)X_0 = 0$ par unicité du développement limité.
Ceci est vrai pour tout $X_0 \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ puisque $t \mapsto e^{tA}X_0$ est solution du système différentiel quel que soit $X_0 \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.
Or $A^\top + A$ est symétrique réelle donc d'après le théorème spectral elle est diagonalisable. Donnons nous $\lambda \in \mathrm{Sp}(A^\top + A)$ et X_λ un vecteur propre associé.
$X_\lambda^\top (A^\top + A)X_\lambda = 0 \implies X_\lambda^\top (\lambda X_\lambda) = \lambda \|X_\lambda\|^2 = 0 \implies \lambda = 0$.
Ainsi $A^\top + A$ est semblable à la matrice nulle et est donc nulle, c'est à dire $A = -A^\top$ ou encore $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

XIII.10.26 Préservation d'un sous-espace ★★

[Enoncé]
D'après le cours $\forall t \in \mathbb{R},\ x(t) = e^{(t-t_0)u}(x(t_0))$.
Or il est classique de montrer que e^u est un polynôme en u :
$\forall n \in \mathbb{N},\ \sum_{k=0}^{n} \frac{u^k}{k!} \in \mathbb{K}[u]$. Or $\mathbb{K}[u]$ est fermé en tant que sous-espace de dimension finie (égale au degré du polynôme minimal de u) de $\mathcal{L}(E)$. Donc $e^u = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{u^k}{k!} \in \mathbb{K}[u]$.
On en déduit que $\forall t \in \mathbb{R},\ e^{(t-t_0)u} \in \mathbb{K}[u]$. En particulier $e^{(t-t_0)u}(F) \subset F$ d'où $x(\mathbb{R}) \subset F$.

XIII.10.27 Equation différentielle matricielle non linéaire

[Enoncé]

XIII.10.28 Système de Lax ★★★★

[Enoncé]

1. Posons $\Phi_B : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mapsto MB - BM$. Φ_B est clairement linéaire.
   On remarque que $\forall t \in \mathbb{R},\ A'(t) = A(t)B - BA(t) = \Phi_B(A(t))$.
   Posons ensuite $\tilde{A} : t \mapsto e^{-tB}A(0)e^{tB}$. L'application $f : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^3 & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \\ (M,N,P) & \longmapsto & MNP \end{cases}$ est trilinéaire donc $\tilde{A}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et $\forall t \in \mathbb{R},\ \tilde{A}'(t) = -Be^{-tB}A(0)e^{tB} + e^{-tB}A(0)e^{tB}B = \Phi_B(\tilde{A}(t))$.
   En outre, $\tilde{A}(0) = A(0)$ donc d'après le théorème de Cauchy linéaire $A = \tilde{A}$ càd $\forall t \in \mathbb{R},\ A(t) = e^{-tB}A(0)e^{tB}$. Or $\forall t \in \mathbb{R},\ (e^{tB})^{-1} = e^{-tB}$. On a donc montré que $A(t)$ et $A(0)$ sont semblables pour tout $t \in \mathbb{R}$. En particulier elles ont même polynôme spectre.
2. Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Notons $g_k : t \mapsto \mathrm{Tr}(A(t)^k)$.

Tr est linéaire, $(M_1,\dots,M_k)\mapsto M_1\dots M_k$ est k-linéaire et A est dérivable donc g_k est dérivable et

$$\forall t\in\mathbb{R},\ g_k'(t)=\mathrm{Tr}\left(\sum_{j=0}^{k-1}A(t)^jA'(t)A(t)^{k-j-1}\right)$$

Fixons $t\in\mathbb{R}$.
$g_k'(t)=\sum_{j=0}^{k-1}\mathrm{Tr}(A(t)^jA'(t)A(t)^{k-j-1})=\sum_{j=0}^{k-1}\mathrm{Tr}(A'(t)A(t)^{k-1})=\mathrm{Tr}(kA'(t)A(t)^{k-1})$.
Enfin $A'(t)=A(t)B(t)-B(t)A(t)$ donc $g_k'(t)=k[\mathrm{Tr}(A(t)B(t)A(t)^{k-1})-\mathrm{Tr}(B(t)A(t)^k)]=0$.
On en déduit que g_k est constante. En particulier, $\forall k\in\mathbb{N}^*,\ \mathrm{Tr}(A(t)^k)=\mathrm{Tr}(A(0)^k)$.
On rappelle que comme $A(t)$ est trigonalisable dans $\mathbb{C}$ alors si on note $\lambda_{t,1},\dots,\lambda_{t,n}$ ses valeurs propres on a la relation $\mathrm{Tr}(A(t)^k)=\sum_{i=1}^n\lambda_{t,i}^k:=T_k$.
Considérons le développement

$$\frac{1}{1-\lambda_{t,i}z}=\sum_{k=0}^{+\infty}\lambda_{t,i}^kz^k$$

valable pour $|z|<\alpha:=\min_{1\leq i\leq n}\left\{\frac{1}{|\lambda|},\ \lambda\in\mathrm{Sp}(A(t))\backslash\{0\}\right\}$.
Alors $\forall z\in\mathbb{C},\ |z|<\alpha\implies-\sum_{i=1}^n\frac{\lambda_{t,i}}{1-\lambda_{t,i}z}=-\sum_{k=0}^{+\infty}T_{k+1}z^k$. On reconnaît la décomposition de $\frac{P_t'}{P_t}$ dans le membre de gauche pour $P_t=\prod_{i=1}^n(1-\lambda_{t,i}X)$. On en déduit que P_t ne dépend pas de t.
Ainsi ses racines ne dépendent pas de t, càd $\mathrm{Sp}(A(t))$ ne dépend pas de t.

Remarque : En faisant intervenir des résultats sur les sommes de Newton on peut montrer que $\chi_{A(t)}$ ne dépend pas de t.
Remarque bis : On verra dans un exercice ultérieur que $A(t)$ est en fait toujours semblable à $A(0)$ pour tout t

XIII.10.29 Exponentielles de matrices qui commutent ★★

[Enoncé]

1. On sait d'après le cours que f_M est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ quel que soit $M\in\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\forall t\in\mathbb{R},\ f_M'(t)=Me^{tM}=e^{tM}M$. De plus l'application $h:(M,N)\in\mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2\mapsto AB$ est bilinéaire. Ainsi $g=t\in\mathbb{R}\mapsto h(f_{A+B}(t),f_{-B}(t))$ est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et,
$\forall t\in\mathbb{R},\ g'(t)=h(f_{A+B}'(t),f_{-B}(t))+h(f_{A+B}(t),f_{-B}'(t))=(A+B)e^{t(A+B)}e^{-tB}+e^{t(A+B)}(-B)e^{-tB}$.
Montrons que si deux matrices M et N commutent alors M et e^N commutent. On pose pour tout $p\in\mathbb{N}$, $S_p=\sum_{k=0}^p\frac{N^k}{k!}$. Fixons $p\in\mathbb{N}$.
Comme S_p est un polynôme en N on a $h(M,S_p)=MS_p=S_pM=h(S_p,M)$. Or l'application h est bilinéaire et donc continue car $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est de dimension finie.
Ainsi comme $S_p\underset{p\to+\infty}{\longrightarrow}e^N$, on a $h(M,e^N)=h(e^N,M)$ c'est à dire $Me^N=e^NM$.
On en déduit comme $-B$ et $A+B$ commutent que $\forall t\in\mathbb{R},\ h'(t)=(A+B)e^{t(A+B)}e^{-tB}-Be^{t(A+B)}e^{-tB}=Ae^{t(A+B)}e^{-tB}$.
Ainsi f_A et g vérifient le problème de Cauchy $\begin{cases}y'=Ay\\y(0)=I_n\end{cases}$.
Par unicité de la solution d'un problème de Cauchy $g=f_A$.
Donc en sachant que $\forall t\in\mathbb{R},\ e^{-tB}=\left(e^{tB}\right)^{-1}$,

$$\forall t\in\mathbb{R},\quad e^{t(A+B)}=e^{tA}e^{tB}$$

2. Supposons que $\forall t\in\mathbb{R},\ e^{t(A+B)}=e^{tA}e^{tB}$.
On sait que quel que soit $M\in\mathcal{M}_n(\mathbb{R}),\ f_M$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$. Alors en dérivant deux fois,

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad (A+B)e^{t(A+B)} = e^{tA}Ae^{tB} + e^{tA}Be^{tB} = e^{tA}(A+B)e^{tB}$$

Puis,

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad (A+B)^2e^{t(A+B)} = e^{tA}A(A+B)e^{tB} + e^{tA}(A+B)Be^{tB}$$

En particulier pour $t = 0$:

$$(A+B)^2 = A(A+B) + (A+B)B$$

C'est à dire :

$$A^2 + AB + BA + B^2 = A^2 + AB + AB + B^2$$

Ou encore :

$$BA = AB$$

XIII.10.30 Exponentielles de matrices qui commutent avec leur commutateur

[Enoncé]

XIII.11 Correction Calcul différentiel

XIII.11.1 Calcul de dérivées partielles

[Enoncé]

1. $$\frac{\partial g}{\partial x}(x,y) = \frac{\partial f}{\partial y}(y,x), \quad \frac{\partial g}{\partial y}(x,y) = \frac{\partial f}{\partial x}(y,x)$$
2. On pose $h : x \mapsto (x,x)$. On a : $g = f \circ h$.
$$g'(x) = \frac{\partial f}{\partial x}(x,x) + \frac{\partial f}{\partial x}(x,x)$$
3. On pose $h : (x,y) \mapsto (y, f(x,y))$. On a : $g = f \circ h$.
$$\frac{\partial g}{\partial x}(x,y) = \frac{\partial f}{\partial y}(y,f(x,y))\left(\frac{\partial f}{\partial x}(x,x) + \frac{\partial f}{\partial y}(x,x)\right) \quad \frac{\partial g}{\partial y}(x,y) = \frac{\partial f}{\partial x}(y,f(x,y))$$
4. On pose $h : x \to (x, f(x,x))$. On a $g = f \circ h$.
$$g'(x) = \frac{\partial f}{\partial x}(x,x) + \frac{\partial f}{\partial y}(x,f(x,x))\left(\frac{\partial f}{\partial x}(x,x) + \frac{\partial f}{\partial y}(x,x)\right)$$

XIII.11.2 Existence de dérivées partielles

[Enoncé]

XIII.11.3 Etude d'une fonction

[Enoncé]

1. La fonction $(x,y) \mapsto \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$ ne s'annule pas sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ donc par opérations usuelles f est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.
   De plus, pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, $|f(x,y)| \leq |x^2+y^2| = \|(x,y)\|_2$ donc $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0$.
   Par conséquent, f est continue sur $\mathbb{R}^2$.
2. a. Les théorèmes classiques de dérivabilité de fonctions à variables réelles nous donnent que f est dérivable sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. De plus :
$$\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0} = x\sin\left(\frac{1}{|x|}\right) \underset{x\to 0}{\to} 0$$
   et
$$\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y-0} = x\sin\left(\frac{1}{|y|}\right) \underset{x\to 0}{\to} 0$$
   Finalement, f admet des dérivées partielles en tout point de $\mathbb{R}^2$.
   b.
$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 2x\sin\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right) - \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\cos\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right)$$
   et
$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 2y\sin\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right) - \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\cos\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right)$$
   Les dérivées partielles sont continues sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. Cependant, elles ne sont pas continues au voisinage de $(0,0)$. En effet,
$$\frac{\partial f}{\partial x}\left(\frac{1}{\sqrt{2n\pi}},0\right) = -1 \quad \frac{\partial f}{\partial x}\left(\frac{1}{\sqrt{2n\pi+\frac{\pi}{2}}},0\right) \underset{n\to+\infty}{\to} 0$$
   c. Ainsi, f ne peut être de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.

XIII.11.4 Intégrales de Hardy (2)

[Enoncé]

XIII.11.5 Une équation fonctionnelle ★★

[Enoncé]

1. Soit f une fonction constante égale à c solution (1). On a donc $2c = 2c^2$ donc $c = 0$ ou $c = 1$. Ainsi $f : x \to 0$ et $f : x \to 1$.
2. a. Pour $x = 0$ et $y = 0$, on a : $2f(0) = 2f(0)^2$ donc $f(0) = 1$ ou $f(0) = 0$.
   Supposons que $f(0) = 0$. $\forall x \in \mathbb{R}, \quad 2f(x) = 2f(0)F(x) = 0$. On obtient donc que f est constamment nulle sur $\mathbb{R}$, ce qui est absurde.
   Donc $f(0) = 1$.
   Soit $x \in \mathbb{R}$,
   $$\forall y \in \mathbb{R}, f'(x+y) - f'(x-y) = 2f(x)f'(y)$$
   En particulier, pour $x = 0, y = 0$, $2f'(0) = 0$.
   b. Pour $x = 0$, pour tout $y \in \mathbb{R}$, $f(y) + f(-y) = 2f(y)$.
   On en déduit bien que f est paire.
3. a. Les fonctions $(x, y) \mapsto x + y$ et $(x, y) \mapsto x - y$ sont de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$.Et f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$.
   Donc F est de classe $\mathcal{C}^2$
   b. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, :
   $$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2} = f''(x+y) + f''(x-y), \\ \dfrac{\partial^2 F}{\partial y^2} = f''(x+y) + f''(x-y), \\ \dfrac{\partial^2 F}{\partial x \partial xy} = \dfrac{\partial^2 F}{\partial y \partial x} = f''(x+y) - f''(x-y) \end{cases}$$
   c. On remarque que $\dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2} = \dfrac{\partial^2 F}{\partial y^2}$. On a également :
   $$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \begin{cases} \dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2}(x, y) = 2f'(x)f(y), \\ \dfrac{\partial^2 F}{\partial y^2}(x, y) = 2f(x)f'(y) \end{cases}$$
   Donc
   $$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f''(x)f(y) = f(x)f''(y),$$
   donc pour $y = 0$, $f''(x) - \alpha f(x) = 0$ avec $\alpha = f''(0)$.
   d. Si $\alpha > 0$, alors $f = x \mapsto \text{ch}(\sqrt{\alpha}x)$.
   Si $\alpha = 0$, alors $f = x \mapsto 1$
   Si $\alpha < 0$, alors $f = x \mapsto \cos(\sqrt{|\alpha|}x)$.
4. On vérifie que tous ses solutions trouvées conviennes.

XIII.11.6 Application linéaire

[Enoncé]
On remarque que $f(0) = 0$. f est différentiable en 0 donc il existe ℓ une application linéaire telle que pour tout $h \in E$:

$$f(h) = f(0) + \ell(h) + o(h) = \ell(h) + o(h)$$

Ainsi pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ et tout $x \in E$:

$$\lambda f(x) = f(\lambda x) = \lambda \ell(x) + o(\lambda x)$$

Donc

$$f(x) = \ell(x) + \|x\| \frac{\mathcal{O}(\lambda \|x\|)}{\lambda \|x\|}$$

Par conséquent, quand λ tend vers 0^+, on a

$$\frac{\mathcal{O}(\lambda \|x\|)}{\lambda \|x\|} \to 0$$

Ainsi, $f(x) = \ell(x)$ pour tout $x \in E$.
Donc, f est linéaire (et égale à sa différentielle en 0.)

XIII.11.7 Opérateurs vectoriels

[Enoncé]

XIII.11.8 Laplacien en polaires

[Enoncé]

XIII.11.9 Fonction harmonique

[Enoncé]

XIII.11.10 Mines ponts MP 2016

[Enoncé]

XIII.11.11 Différentielle de l'exponentielle matricielle

[Enoncé]

XIII.11.12 Différentielle de la norme euclidienne

[Enoncé]

XIII.11.13 Différentielle de l'inversion matricielle

[Enoncé]

XIII.11.14 Gradient et différentielle du déterminant

[Enoncé]

XIII.11.15 Espace tangent aux matrices orthogonales en l'identité

[Enoncé]
Soit $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. On pose $f : t \in \mathbb{R} \mapsto e^{tA}$.
Par continuité de la transposition, qui est linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, un espace vectoriel normé de dimension finie,
$\forall t \in \mathbb{R},\ \left(e^{tA}\right)^\top = e^{(tA)^\top} = e^{-tA} = \left(e^{tA}\right)^{-1}$.
Ainsi f est à valeurs dans $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.
De plus f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall t \in \mathbb{R},\ f'(t) = Ae^{tA}$.

On a donc $f(0) = I_n$ et $f'(0) = A$ d'où $f \in T_{I_n}(\mathcal{O}_n(\mathbb{R}))$.

Réciproquement, donnons nous $A \in T_{I_n}(\mathcal{O}_n(\mathbb{R}))$.
Il existe $\varepsilon > 0$ et $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\to \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ dérivable en 0 telle que $\gamma(0) = I_n$ et $\gamma'(0) = A$.
$(*) : \forall t \in]-\varepsilon, \varepsilon[,\ \gamma(t)^\top \gamma(t) = I_n$.
Par linéarité de la transposition, $\psi : t \mapsto \gamma(t)^\top$ est dérivable en 0 et $\psi'(0) = \gamma'(0)^\top = A^\top$.
On peut alors dériver la relation $(*)$ en 0 :

$$\gamma'(0)\gamma(0)^\top + \gamma(0)\gamma'(0)^\top = A^\top + A = 0$$

Ainsi $A^\top = -A$ c'est à dire $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

XIII.11.16 Vecteur propre d'un endomorphisme auto-adjoint

[Enoncé]

XIII.11.17 Quotient de Rayleigh

[Enoncé]

XIII.11.18 Différentielle du déterminant

[Enoncé]

XIII.11.19 Equation de d'Alembert

[Enoncé]

XIII.11.20 Utilisation des extrémas liés (1)

[Enoncé]

XIII.11.21 Utilisation des extrémas liés (2)

[Enoncé]

XIII.11.22 Utilisation des extrémas liés (3)

[Enoncé]

XIII.11.23 Sinus complexe

[Enoncé]

XIII.11.24 Entropie

[Enoncé]

XIII.11.25 Fonction convexe sur $\mathbb{R}^n$

[Enoncé]

XIII.11.26 Chemin le plus court entre deux points

[Enoncé]

XIII.11.27 Fonction homogène

[Enoncé]

XIII.11.28 Problème de Dirichlet et principe du maximum

[Enoncé]

XIII.11.29 La méthode des moindres carrés

[Enoncé]

XIII.11.30 Equation de la chaleur

[Enoncé]

XIII.12 Correction Divers

XIII.12.1 Développement décimal propre d'un réel

[Enoncé]

Une caractérisation des rationnels

[Enoncé]

XIII.12.2 Distribution du premier chiffre des puissances de 2

[Enoncé]

XIII.12.3 Série de Engel

[Enoncé]

XIII.12.4 Lemme d'Hadamard ★★★★

[Enoncé]

1. Supposons qu'il existe $g \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R})$ telle que $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = x^n g(x)$.

   Alors d'après la formule de Leibniz, $\forall x \in \mathbb{R},\ \forall k \in [\![0; n-1]\!],\ f^{(k)}(x) = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} \frac{n!}{(n-j)!} x^{n-j} g^{(k-j)}(x)$.

   $(\forall j \in [\![0;k]\!],\ n-j>0) \implies f^{(k)}(0) = \sum_{j=0}^{k} 0 = 0$.

   Réciproquement, supposons que $f(0) = f'(0) = \cdots = f^{(n-1)}(0) = 0$.
   f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}$ donc d'après la formule de Taylor avec reste intégral :

   $$\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \int_0^x \frac{(t-x)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n)}(t)dt = \int_0^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n)}(t)dt$$

   Si $x \neq 0$ on effectue le changement de variable $u = \dfrac{t}{x}$:
   $f(x) = \displaystyle\int_0^1 \frac{(x-xu)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n)}(xu)(xdu) = x^n \int_0^1 \frac{(1-u)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n)}(xu)du.$
   Posons alors $g : x \mapsto \displaystyle\int_0^1 \frac{(1-u)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n)}(xu)du$. On sait que $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = x^n g(x)$.

   En outre, pour tout $u \in [0,1]$ la fonction $x \mapsto \dfrac{(1-u)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n)}(xu)$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$. Ainsi d'après le théorème de transfert de classe $\mathcal{C}^\infty$, g est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ (on peut dominer sur tout segment $[-a,a]$ de $\mathbb{R}$ par $\sup_{[-a,a]} |f^{(n)}|$ par exemple) donc ceci conclut.

2. On rappelle que pour une fonction $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, $\forall x, h \in \mathbb{R}^n,\ df(x)\cdot h = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) h_i$.

   Supposons qu'il existe $(g_{i,j})_{1\leq i,j\leq n} \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n,\mathbb{R})$ telles que $\forall x \in \mathbb{R}^n,\ f(x) = \sum_{1\leq i,j\leq n} x_i x_j g_{ij}(x)$.

   Evidemment $f(0) = 0$. Pour montrer que $df(0) = 0$ il suffit de montrer que toutes les dérivées partielles de f sont nulles en 0.

$\forall k \in [\![1;n]\!],\ \forall x \in \mathbb{R}^n,\ \dfrac{\partial f}{\partial x_k}(x) = \displaystyle\sum_{1\le i,j\le n} x_i x_j \frac{g_{ij}}{\partial x_k}(x) + 2\sum_{i=1}^{n} x_i g_{ij}(x)$. Donc $\forall k \in [\![1;n]\!],\ \dfrac{\partial f}{\partial x_k}(0) = 0$.

réciproquement, supposons que $f(0) = 0$ et $df(0) = 0$. Fixons $x \in \mathbb{R}^n$.

$g : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ t & \longmapsto & f(tx) \end{cases}$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ donc par la formule de Taylor reste intégral :

$$\forall t \in \mathbb{R},\ g(t) = g(0) + g'(0)t + \int_0^t (t-u)g''(u)du$$

$g(0) = f(0) = 0$. Calculons g' et g''. On note $\gamma : t \mapsto tx$.

$g = f \circ \gamma$ donc $\forall t \in \mathbb{R},\ g'(t) = df(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) = df(tx) \cdot x = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(tx)x_i$.

Donc $g'(0) = df(0) \cdot x = 0$. Puis pour tout i, $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ donc par le même calcul, $\forall t \in \mathbb{R},\ g''(t) = \displaystyle\sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_j \partial x_i}(tx)x_j\right)x_i = \sum_{1\le i,j\le n} x_i x_j \frac{\partial f}{\partial x_j \partial x_i}(tx)$.

Ainsi en évaluant en $t = 1$:

$$f(x) = \sum_{1\le i,j\le n} x_i x_j \int_0^1 (1-u)\frac{\partial f}{\partial x_j \partial x_i}(ux)du$$

On pose alors $g_{ij} : x \mapsto \displaystyle\int_0^1 (1-u)\frac{\partial f}{\partial x_j \partial x_i}(ux)du$. Ces fonctions sont $\mathcal{C}^\infty$ par le théorème de transfert $\mathcal{C}^\infty$ des intégrales à paramètre.

XIII.12.5 Intégrale des puissances d'une fonction ★★★

[Enoncé]

1. Le rayon de convergence R d'une série entière $\displaystyle\sum_{n\in\mathbb{N}} a_n x^n$ est défini par

$$R = \sup\{\rho \ge 0,\ (a_n\rho^n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ est bornée}\} (= \inf\{\rho \ge 0,\ \sum_{n\in\mathbb{N}} a_n\rho^n \text{ diverge grossièrement}\})$$

2. f étant continue sur un segment elle est bornée. On note $\|f\|_\infty = \sup_{[0,1]} |f| > 0$.

   On remarque que $\forall n \in \mathbb{N},\ \left|I_n \cdot \|f\|_\infty^{-n}\right| \le \displaystyle\int_0^1 \left(\frac{|f(t)|}{\|f\|_\infty}\right)^n dt \le 1$. Donc $R \ge \|f\|_\infty^{-1}$.

   Ensuite fixons $\rho > \|f\|_\infty^{-1}$. Comme f est continue et positive, par le théorème des bornes atteintes il existe $x \in [0,1]$ tel que $f(x) = \|f\|_\infty$.

   Alors $f(x)\rho > 1$ et, toujours par continuité de f, il existe $\varepsilon > 0$ et un intervalle $J \subset [0,1]$ de longueur ε contenant x tel que $\forall t \in J,\ f(t)\rho \ge \dfrac{1+f(x)\rho}{2} := \alpha > 1$. (prendre $J = \left]x - \dfrac{\varepsilon}{2}, x + \dfrac{\varepsilon}{2}\right[$ pose problème si $x \in \{0,1\}$)

   Ainsi $|I_n\rho^n| = \displaystyle\int_0^1 (f(t)\rho)^n dt \ge \int_J (f(t)\rho)^n dt \ge \int_J \alpha^n dt = \varepsilon\alpha^n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$.

   Donc $(I_n\rho^n)_{n\in\mathbb{N}}$ n'est par bornée.

   Ainsi $R = \|f\|_\infty^{-1}$.

3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On sait que $\langle f, g\rangle = \displaystyle\int_0^1 f(t)g(t)dt$ définit un produit scalaire sur $\mathcal{C}^0([0,1],\mathbb{R})$.

   On rappelle que f est positive donc par l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$I_n^2 = \left(\int_0^1 f(t)^n dt\right)^2 \le \left(\int_0^1 f(t)^{\frac{n-1}{2}} f(t)^{\frac{n+1}{2}} dt\right)^2 \le \int_0^1 f(t)^{n-1}dt \int_0^1 f(t)^{n+1}dt = I_{n-1}I_{n+1}$$

4. f^n étant continue et positive pour tout $n \in \mathbb{N}$, par stricte positivité de l'intégrale $I_n \ge 0$ et $I_n = 0 \implies f^n = 0 \implies f = 0$. Donc $I_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Par conséquent en divisant par I_nI_{n-1} dans l'inégalité de la question précédente on obtient la croissance de la suite $\left(\frac{I_n}{I_{n-1}}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$.

En outre cette suite est bornée puisque $\forall n\in\mathbb{N},\ I_{n+1}=\displaystyle\int_0^1 f(t)^n f(t)dt \leq \|f\|_\infty I_n$. d'après le théorème de convergence monotone cette suite converge donc vers un réel ℓ.

Or d'après le critère de d'Alembert, on sait que si la suite de terme général $\left|\frac{I_{n+1}}{I_n}\right| = \frac{I_{n+1}}{I_n}$ converge vers une limite L alors le rayon de convergence de S vaut $\frac{1}{L}$.

On en déduit d'après la question 2 que $\ell = \|f\|_\infty$.

Ainsi $I_{n+1} \underset{n\to+\infty}{\sim} \|f\|_\infty I_n$.

5. Appliquons le théorème d'intégration terme à terme pour des fonctions positives. On pose pour $x\in]-R,R[$ et $n\in\mathbb{N},\ h_{n,x}: t\in[0,1]\mapsto f(t)^n x^n$.
   - $\forall n\in\mathbb{N},\ h_{n,x}$ est continue par morceaux et intégrable sur $[0,1]$.
   - Comme $|x|<R$, $\displaystyle\sum_{n\in\mathbb{N}} h_{n,x}$ converge simplement vers la fonction $s_x: t\mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} f(t)^n x^n$ sur $[0,1]$.
   - $\forall t\in[0,1],\ |f(t)x|<\|f\|_\infty R<1$ donc $\forall t\in[0,1],\ s_x(t)=\frac{1}{1-xf(t)}$. Donc s_x est continue par morceaux sur $[0,1]$.

   On en déduit l'égalité $\displaystyle\int_0^1 s_x(t)dt = \sum_{n=0}^{+\infty}\int_0^1 h_{n,x}(t)dt$. Ainsi $S(x)=\displaystyle\int_0^1\sum_{n=0}^{+\infty} f(t)^n x^n dt = \int_0^1 \frac{dt}{1-xf(t)}$.

6. Posons $g: t\mapsto \sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)$ ainsi que $W_n=\displaystyle\int_0^1 g(t)^n dt$. $\forall n\in\mathbb{N},\ W_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2}\sin(t)^n dt$. g est continue, positive et non identiquement nulle sur $[0,1]$. $\|g\|_\infty=1$.

   D'après les questions précédentes le rayon de convergence de $\displaystyle\sum_{n\in\mathbb{N}} W_n x^n$ est 1 et

$$\forall x\in]-1,1[,\ W(x):=\sum_{n=0}^{+\infty} W_n x^n = \int_0^1 \frac{dt}{1-x\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)} = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2}\frac{dt}{1-x\sin t}$$

   Le rayon de convergence de $\displaystyle\sum_{n\in\mathbb{N}}(-1)^n W_n x^n$ est aussi 1 et sa somme est $W(-x)$. On va lui appliquer le théorème de convergence radiale d'Abel.

   Il faut vérifier que $\displaystyle\sum_{n\in\mathbb{N}}(-1)^n W_n$ converge. Appliquons le CSSA :
   - $\forall n\in\mathbb{N},\ W_{n+1}=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2}\sin(t)^n\sin(t)dt \leq \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2}\sin(t)^n dt = W_n$;
   - La suite de fonction $(\sin^n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement sur $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ vers $\mathbb{1}_{\{\pi/2\}}$ qui est continue par morceaux. C'est une suite de fonctions continues par morceaux et dominées par $t\mapsto 1$ qui est continue par morceaux et intégrable sur $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$.

     Par le TCD $W_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2}\mathbb{1}_{\{\pi/2\}}dt = 0$.

   Donc par le CSSA $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n W_n\in\mathbb{R}$.

   Ainsi par le théorème de convergence radiale d'Abel $x\mapsto W(-x)$ admet une limite en 1^- et $\lim\limits_{x\to1^-} W(-x) = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n W_n$.

   D'autre part, $\lim\limits_{x\to1^-} W(-x)=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2}\frac{dt}{1+\sin t}$. Puis par le changement de variable $u=\frac{\pi}{2}-t$,

$$\int_0^{\pi/2}\frac{dt}{1+\sin t}=\int_0^{\pi/2}\frac{du}{1+\cos u}=\int_0^{\pi/2}\frac{du}{2\cos\left(\frac{u}{2}\right)^2}=\left[\tan\left(\frac{u}{2}\right)\right]_0^{\pi/2}=1$$

Ainsi on calcule $\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n \int_0^{\pi/2} \sin^n(t)dt = \frac{\pi}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n W_n = \frac{\pi}{2}$.

XIII.12.6 Lemme de Hochshild ★★★★★

[Enoncé]
On va faire deux preuves de ce résultat. Dans les deux on aura besoin du lemme suivant (cf. I-4 tome Algèbre) :
Soit $(f_1,\dots,f_p)$ une famille libre de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$. Alors il existe $x_1,\dots,x_n \in \mathbb{R}$ tels que la matrice $M := (f_j(x_i))_{1\leq i,j\leq p}$ soit inversible.
Supposons que V_f est de dimension finie et donnons nous en une base $(f_1,\dots,f_p)$.
Montrons que V_f est stable par dérivation.
On note pour $a\in\mathbb{R}$, $\tau_a : x \mapsto x+a$.
1ère méthode :

$\forall a\in\mathbb{R},\ g_a : x\mapsto f\circ\tau_a(x) = f(x+a) \in V_f$. Il existe donc des réels $\lambda_1(a),\dots,\lambda_p(a)$ tels que $g_a = \sum_{i=1}^{p}\lambda_i(a)f_i$.
En évaluant en les réels $x_1,\dots,x_p$ du lemme on obtient $G(a) = M\Lambda(a)$ avec $G(a) = (g_a(x_1),\dots,g_a(x_p))^\top$ et $\Lambda(a) = (\lambda_1(a),\dots,\lambda_p(a))^\top$ i.e $\Lambda(a) = M^{-1}G(a)$.
Or l'application $a\mapsto M^{-1}G(a)$ est dérivable car les composantes de $G(a)$ le sont et $N\in\mathcal{M}_p(\mathbb{R}) \mapsto M^{-1}N$ est linéaire.
Ainsi pour tous $1\leq i\leq p$ les applications $\lambda_i : a\mapsto\lambda_i(a)$ sont dérivables.
On en déduit en dérivant par rapport à a : $\forall x\in\mathbb{R},\ \forall a\in\mathbb{R},\ f'(x+a) = \sum_{i=1}^{p}\lambda_i'(a)f_i(x)$. On a montré que

$$(f\circ\tau_a)' = \sum_{i=1}^{p}\lambda_i'(a)f_i \in V_f$$

En particulier $f'\in V_f$ puis par récurrence immédiate, $(f^{(n)})_{n\in\mathbb{N}}\in V_f^{\mathbb{N}}$.
On en déduit que la famille $(f,f',\dots,f^{(p)})$ est liée, càd :

$$\exists (a_0,\dots,a_p)\in\mathbb{R}^{p+1}\backslash\{(0,\dots,0)\},\ a_pf^{(p)}+\dots+a_0f = 0$$

Autrement dit f est solution d'une équation différentielle homogène à coefficients constants.
Réciproquement supposons que f est solution d'une équation différentielle homogène à coefficients constants de la forme :

$$a_pf^{(p)} + a_{p-1}f^{(p-1)} + \dots + a_0f = 0$$

avec $a_0,\dots,a_p$ des réels non tous nuls. Alors pour tout $a\in\mathbb{R}$, $t\mapsto f(t+a)$ est solution de la même équation différentielle sur $\mathbb{R}$. Or on sait que l'ensemble des solutions de cette équation différentielle est un sous-espace vectoriel de E de dimension finie. Donc V_f est de dimension finie.

2nd méthode :
Lemme : Si V_f est de dimension finie alors il existe un segment I de $\mathbb{R}$ tel que $\|\cdot\|_I : f\mapsto \sup_{x\in I}|f(x)|$ définisse une norme sur V_f.
Soit I un segment de $\mathbb{R}$. Comme les fonctions de E sont continues $\|\cdot\|_I$ est bien définie sur V_f. On vérifie aisément l'homogénéité et l'inégalité triangulaire. Il s'agit de choisir I pour que $\|\cdot\|_I$ vérifie l'axiome de séparation.
On se donne des réels $x_1,\dots,x_p$ comme dans le lemme et on pose $I = \left[\min_{1\leq j\leq n}x_j, \max_{1\leq j\leq n}x_j\right]$.
Alors pour tout $f = \sum_{i=1}^{p}a_if_i\in V_f$, $\|f\|_I = 0 \implies \forall j\in[\![1;p]\!],\ \sum_{i=1}^{p}a_if_i(x_j) = 0$.
Ou encore $M\begin{pmatrix}a_1\\ \vdots\\ a_p\end{pmatrix} = 0$ d'où $a_1=\dots=a_p=0$ càd $f=0$. Ainsi $(V_f,\|\cdot\|_I)$ est un espace vectoriel normé.
On sait que $\forall x\in\mathbb{R},\ f'(x) = \lim_{h\to0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{n\to+\infty} n\left[f\left(x+\frac{1}{n}\right)-f(x)\right]$.
On pose pour $n\in\mathbb{N}^*$, $h_n : x\mapsto n\left[f\left(x+\frac{1}{n}\right)-f(x)\right]$.

$(h_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est à valeurs dans V_f.
On va montrer que $(h_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge vers f' dans $(V_f, \|\cdot\|_I)$.
Ici on pourrait être tenté, comme je l'ai été, d'utiliser la propriété qui dit qu'un sous-espace vectoriel de dimension finie d'un espace vectoriel normé est fermé. Cependant il n'est pas évident de poser une norme sur E... et surtout la norme $\|\cdot\|_I$ n'est pas une norme sur E. Cela nous empêche d'utiliser la propriété. On peut tout de même contourner ce problème avec un résultat de complétude mais qui est donc hors programme. (cf.I.19)
Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in I$. Comme I est un segment, d'après l'inégalité de Taylor-Lagrange :

$$\frac{1}{n}|h_n(x) - f'(x)| = \left|f\left(x+\frac{1}{n}\right) - f(x) - \frac{1}{n}f'(x)\right| \leq \frac{\|f''\|_I}{2n^2}$$

D'où $\|h_n - f'\|_I \leq \dfrac{\|f''\|_I}{2n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.
On en déduit que la suite $(h_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est de Cauchy. Or un $\mathbb{R}$-espace vectoriel normé de dimension finie est complet. Elle admet donc une limite dans V_f que l'on note h. A ce stade on sait seulement que h coïncide avec f sur I puisque $\|h - f'\|_I \leq \|h - h_n\|_I + \|h_n - f'\|_I \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. Mais si $x \in \mathbb{R}$, alors en posant K un segment qui contient I et x, $\|\cdot\|_K$ est une norme sur V_f. En effet $\forall g \in V_f$, $\|g\|_K = 0 \implies \|g\|_I = 0 \implies g = 0$. Donc par le même argument $h(x) = f'(x)$. Ceci étant vrai pour tout $x \in \mathbb{R}$, $h = f'$ et puis $f' \in V_f$. Quitte à remplacer f par $f \circ \tau_a$ on obtient $(f \circ \tau_a)' \in V_f$.
On conclut comme dans la première preuve.
Le résultat hors programme n'est pas dur à montrer. Il s'agit de montrer que $\mathbb{R}$ est complet, c'est-à-dire que toutes les suites de Cauchy converge dans $\mathbb{R}$ (on montre qu'une suite de Cauchy est bornée et a au plus une valeur d'adhérence), puis pour les suites de Cauchy d'un evn de dimension finie, on montre que les suites de coordonnées sont de Cauchy.

XIII.12.7 Théorème de Müntz

[Enoncé]