PELVIS · PE-02

# Masse annexielle · O-RADS

**O-RADS US v2022 · O-RADS MRI**
échographie puis IRM de caractérisation

## O-RADS ÉCHOGRAPHIE V2022 · SCORE ET CONDUITE

| SCORE | LÉSIONS TYPES | CONDUITE |
|---|---|---|
| **0** incomplet | Lésion non caractérisable (technique, gaz, patiente) | Nouvelle échographie ou IRM |
| **1** normal | Follicule ≤ 3 cm, corps jaune ≤ 3 cm (préménopause) | Aucune |
| **2** < 1 % | Kyste simple < 10 cm ; kyste uniloculaire lisse non simple ou **biloculaire** lisse < 10 cm ; lésion bénigne classique < 10 cm (kyste hémorragique, endométriome, kyste dermoïde, kyste paraovarien, kyste d'inclusion péritonéal, hydrosalpinx) | Selon taille et statut ménopausique : rien, ou échographie à 6–12 mois (ex. kyste simple > 5 cm, uniloculaire non simple > 3 cm) |
| **3** 1–10 % | Kyste uni- ou biloculaire **≥ 10 cm** ; lésion bénigne classique ≥ 10 cm ; uniloculaire à paroi irrégulière (< 3 mm) ; multiloculaire lisse < 10 cm, score couleur 1–3 ; solide lisse score couleur 1 ; solide lisse **avec cône d'ombre** score couleur 2–3 | Si non opérée : échographie à 6 mois ; si solide : expert ou **IRM (O-RADS MRI)** ; gynécologue |
| **4** 10–50 % | Multiloculaire sans composante solide ≥ 10 cm ou score couleur 4, ou à paroi/cloison irrégulière ; uniloculaire avec composante solide (1–3 végétations ou composante non papillaire) ; bi- ou multiloculaire avec composante solide score couleur 1–2 ; solide lisse sans cône d'ombre score couleur 2–3 | Échographiste expert ou **IRM** ; gynécologue avec avis oncogynécologique |
| **5** ≥ 50 % | Uniloculaire avec **≥ 4 végétations** ; bi- ou multiloculaire avec composante solide score couleur 3–4 ; solide lisse score couleur 4 ; **solide irrégulier** ; **ascite et/ou nodules péritonéaux** | **Oncogynécologue** |

Score couleur (CS) : 1 aucun flux · 2 flux minime · 3 modéré · 4 intense. Végétation papillaire = composante solide ≥ 3 mm de hauteur faisant saillie dans le kyste. Le seuil de malignité retenu est O-RADS 4.

## LEXIQUE ET PIÈGES ÉCHOGRAPHIQUES

### Lésions bénignes classiques

- **Kyste hémorragique** : réseau réticulaire, caillot rétractile, pas de flux interne
- **Endométriome** : échos homogènes en verre dépoli, uni- ou biloculaire
- **Dermoïde** : hyperéchogénicité avec cône d'ombre, lignes et points, boules flottantes

### Kystes et trompes

- **Hydrosalpinx** : tubulaire, plis endosalpingiens, septa incomplets
- **Kyste d'inclusion péritonéal** : épouse les contours, ovaire au bord ou dedans
- **Paraovarien** : simple, séparé de l'ovaire

### Pièges

- Un caillot ou un tissu sans flux n'est pas une composante solide
- Composante solide sans flux : toujours considérée comme solide si certaine
- Ménopause : seuils plus bas pour le suivi

# Masse annexielle · O-RADS (suite)



## O-RADS IRM · SCORE DE RISQUE

| SCORE | CRITÈRES |
|---|---|
| 1 pas de lésion | Ovaires normaux ; follicule, corps jaune ou kyste hémorragique < 3 cm en préménopause |
| 2 < 0,5 % | Kyste uniloculaire sans paroi rehaussée ni tissu solide (liquide simple, endométriome, contenu graisseux) ; hydrosalpinx, kyste d'inclusion péritonéal typique ; tératome mature sans tissu solide ; **tissu solide homogène très hypo-intense en T2 et en diffusion** (« sombre / sombre ») |
| 3 ≈ 5 % | Kyste uniloculaire à liquide non graisseux avec paroi rehaussée lisse ; kyste multiloculaire sans tissu solide ; tissu solide (sauf sombre/sombre) avec **courbe de bas risque** |
| 4 ≈ 50 % | Tissu solide (sauf sombre/sombre) avec **courbe de risque intermédiaire**, ou rehaussement ≤ myomètre à 30–40 s sans DCE ; lésion graisseuse avec **volume important de tissu solide rehaussé** |
| 5 ≈ 90 % | Tissu solide avec **courbe de haut risque**, ou rehaussement **> myomètre externe à 30–40 s** sans DCE ; **nodules ou épaississement péritonéal, mésentérique ou épiploïque** |

## COURBES DE REHAUSSEMENT (DCE)

**Bas risque**
Ascension progressive **sans plateau**

**Intermédiaire**
Ascension initiale **moins raide** que le myomètre externe, **puis plateau**

**Haut risque**
Ascension initiale **plus raide** que le myomètre externe

## PROTOCOLE IRM ET LECTURE

### Protocole

- T2 dans 3 plans (dont un sans saturation de graisse), T1 en phase / opposition de phase, T1 avec saturation de graisse
- Diffusion (b ≈ 1 000) avec ADC
- T1 dynamique avec injection (résolution temporelle ≤ 15 s) puis tardif
- Antispasmodique ; vessie peu remplie

### Lecture

- Définir d'abord : origine annexielle ? contenu (liquide, graisse, sang) ? **tissu solide** ?
- Tissu solide = papille, nodule mural, septum irrégulier ou portion solide qui se rehausse ; pas un caillot
- Comparer au **myomètre externe**, sur une région d'intérêt dans la partie la plus rehaussée

**Quand l'IRM ?**
O-RADS US 3–4 avec composante solide, lésion indéterminée en échographie

**Sombre / sombre**
tissu solide très hypo T2 et diffusion = fibrome ovarien, Brenner : bénin

**Toujours décrire**
ascite, carcinose, ganglions, ovaire controlatéral

# Masse annexielle · O-RADS (suite)




## ATLAS VISUEL

### Lésions types en échographie et score O-RADS




**Kyste simple**
anéchogène, paroi fine



**Endométriome**
échos homogènes




**Kyste hémorragique**
réticulaire, sans flux



**Kyste dermoïde**
hyperéchogène + cône d'ombre



**Multiloculaire lisse**
O-RADS 3 (< 10 cm, CS 1–3)



**1–3 végétations**
O-RADS 4



**≥ 4 végétations**
O-RADS 5



**Solide irrégulier**
O-RADS 5 (tout CS)

Schémas simplifiés, non à l'échelle · CS = score couleur (rouge = flux)

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**O-RADS US**
Radiopaedia · lexique et scores
radiopaedia.org/articles/ovarian-adnexal-reporti

**O-RADS IRM**
Radiopaedia · score de risque
radiopaedia.org/articles/ovarian-adnexal-reporti

**Endométriome**
Radiopaedia · échographie et IRM
radiopaedia.org/articles/endometrioma?lang=us

**Tératome kystique mature**
Radiopaedia · signes typiques
radiopaedia.org/articles/mature-cystic-ovarian-t

**ACR O-RADS IRM**
Documents officiels
www.acr.org/Clinical-Resources/Clinical-Tools-an

**Sources :** O-RADS US v2022 (Radiology 2023) – divisionofresearch.kaiserpermanente.org/publications/o-rads-... · O-RADS US v2022 – tableau – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12849974/table/CD015717-tbl... · O-RADS MRI risk score – geiselmed.dartmouth.edu/radiology/wp-content/uploads/sites/4... · O-RADS MRI (JMRI) – onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmri.28947 · ACR O-RADS MRI – www.acr.org/Clinical-Resources/Clinical-Tools-and-Reference/...