OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-02

# Traumatologie · règles et classifications

**Ottawa · Salter-Harris · Garden**
indications de radiographie et classifications courantes

## RÈGLES D'OTTAWA · INDICATION DE RADIOGRAPHIE

### Cheville

Douleur de la région malléolaire **et** au moins 1 critère :

- Douleur à la palpation du bord postérieur (6 cm distaux) ou de la pointe de la **malléole latérale**
- Idem pour la **malléole médiale**
- Incapacité à faire **4 pas** immédiatement et aux urgences

### Pied (médiopied)

Douleur du médiopied **et** au moins 1 critère :

- Douleur à la palpation de la **base du 5e métatarsien**
- Douleur à la palpation de l'**os naviculaire**
- Incapacité à faire 4 pas

### Genou

Au moins 1 critère :

- Âge ≥ 55 ans
- Douleur isolée de la rotule
- Douleur de la tête de la fibula
- Flexion impossible à 90°
- Incapacité à faire 4 pas immédiatement et aux urgences

## SALTER-HARRIS · FRACTURES DU CARTILAGE DE CROISSANCE

| TYPE | MOYEN MNÉMOTECHNIQUE | TRAIT | FRÉQUENCE | PRONOSTIC |
|---|---|---|---|---|
| I | S – « slipped » | Uniquement à travers la physe (décollement épiphysaire) | 5–7 % | Bon |
| II | A – « above » | Physe + **métaphyse** (fragment de Thurston-Holland) | **≈ 75 %** | Bon |
| III | L – « lower » | Physe + **épiphyse**, articulaire | 7–10 % | Plus réservé, réduction anatomique |
| IV | T – « through » | Traverse métaphyse, physe et épiphyse | ≈ 10 % | Risque de pont d'épiphysiodèse |
| V | R – « rammed » | Écrasement de la physe, souvent invisible initialement | < 1 % | Mauvais (arrêt de croissance) |

## GARDEN · FRACTURES DU COL FÉMORAL (SOUS-CAPITALES)

**Garden I**
Incomplète ou **impactée en valgus**

**Garden II**
Complète, **non déplacée**

**Garden III**
Complète, **partiellement déplacée** (varus), travées non alignées

**Garden IV**
Complète, **totalement déplacée**, travées réalignées

En pratique : **non déplacée (I–II)** → ostéosynthèse le plus souvent ; **déplacée (III–IV)** → arthroplastie chez le sujet âgé. Classification sur la radiographie de face ; le scanner reclasse souvent. Fracture occulte suspectée : **IRM** (ou scanner si IRM indisponible).

## REPÈRES DE LECTURE EN TRAUMATOLOGIE

**Deux incidences**
orthogonales au minimum ; articulations sus- et sous-jacentes pour les os longs

**Signes indirects**
épanchement (coussinet graisseux du coude), lipohémarthrose, œdème

**Fractures occultes**
scaphoïde, col fémoral, plateau tibial : IRM ou scanner


**Enfant**
penser à la maltraitance : fractures métaphysaires, côtes postérieures, âges différents

# Traumatologie · règles et classifications (suite)



## ATLAS VISUEL

### Salter-Harris (moyen mnémotechnique SALTR)



**I · S** — physe seule

**II · A** — physe + métaphyse (75 %)

**III · L** — physe + épiphyse

**IV · T** — traverse les trois

**V · R** — écrasement de la physe

Schémas simplifiés, non à l'échelle · bleu = cartilage de croissance, rouge = trait

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Salter-Harris**
Radiopaedia · types I à V
radiopaedia.org/articles/salter-harris-classific

**Garden**
Radiopaedia · col fémoral
radiopaedia.org/articles/garden-classification-o

**Règles d'Ottawa (cheville)**
Radiopaedia · critères
radiopaedia.org/articles/ottawa-ankle-rules-1?la

**Fracture occulte du scaphoïde (cas)**
Radiopaedia · IRM ou scanner
radiopaedia.org/cases/occult-scaphoid-fracture-2

**Sources :** Ottawa ankle rules (NSW ACI) – aci.health.nsw.gov.au/ecat/appendices/ottawa-ankle-adult · Ottawa rules (UMEM) – www.medschool.umaryland.edu/em/cme/umem-educational-pearls/?... · Radiopaedia – Salter-Harris – radiopaedia.org/articles/salter-harris-classification · Radiopaedia – Garden – radiopaedia.org/articles/garden-classification-of-subcapital... · Garden classification (PMC) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6259691/