TUBE DIGESTIF · DI-02

# Diverticulite · classification WSES

**WSES 2020**
scanner · stades et prise en charge

**Imagerie : scanner abdomino-pelvien avec injection** en 1re intention (confirme le diagnostic, classe la gravité, guide le drainage).
L'échographie par un opérateur entraîné est une alternative en 1re intention ; scanner si doute ou suspicion de complication. Pas de lavement opaque ni de coloscopie en phase aiguë.

## CLASSIFICATION SCANOGRAPHIQUE WSES 2020

| STADE | ASPECT AU SCANNER | PRISE EN CHARGE HABITUELLE |
|---|---|---|
| 0 non compliquée | Diverticules, épaississement pariétal, densification de la graisse péricolique | Traitement ambulatoire possible ; antibiotiques non systématiques chez l'immunocompétent |
| 1A | Bulles d'air péricoliques ou petite quantité de liquide péricolique, sans abcès (à moins de 5 cm du segment inflammatoire) | Antibiothérapie |
| 1B | **Abcès ≤ 4 cm** | Antibiothérapie seule |
| 2A | **Abcès > 4 cm** | **Drainage percutané** + antibiothérapie |
| 2B | Air à distance (> 5 cm du segment inflammatoire) | Antibiothérapie ± traitement non opératoire chez des patients sélectionnés ; chirurgie si échec |
| 3 | Liquide diffus sans air libre à distance | **Chirurgie** (péritonite purulente) |
| 4 | Liquide diffus **avec air libre à distance** | **Chirurgie** (péritonite stercorale) |

Les décisions intègrent l'état clinique (sepsis, immunodépression, comorbidités) ; la classification ne remplace pas l'avis chirurgical.

## CORRESPONDANCE AVEC HINCHEY MODIFIÉ

**Hinchey I**
Abcès péricolique (≈ WSES 1B)

**Hinchey II**
Abcès pelvien ou à distance (≈ WSES 2A)

**Hinchey III**
Péritonite purulente (≈ WSES 3)

**Hinchey IV**
Péritonite stercorale (≈ WSES 4)

## PIÈGES ET DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS

### Cancer colique

- Épaississement court, asymétrique, à contours nets, épaulement
- Ganglions mésocoliques, absence de diverticules dans le segment
- Coloscopie à distance après une diverticulite compliquée ou un aspect douteux

### Autres

- Appendagite épiploïque : petite masse graisseuse ovalaire cerclée, « point central »
- Colite infectieuse ou ischémique : atteinte plus étendue
- Fistule colo-vésicale : air dans la vessie, épaississement de la paroi vésicale

## COMPTE RENDU

**Segment**
siège, longueur de l'atteinte

**Complications**
air (péricolique ou à distance), abcès (taille, accessibilité au drainage), liquide

**Stade**
WSES 2020


**Autres**
fistule, occlusion, thrombose veineuse mésentérique

# Diverticulite · classification WSES (suite)




## ATLAS VISUEL


### Stades scanographiques WSES




**0**
épaississement, densification




**1A**
bulles péricoliques



**1B**
abcès ≤ 4 cm



**2A**
abcès > 4 cm → drainage



**2B**
air à distance



**3**
liquide diffus



**4**
liquide + air libre

Schémas simplifiés, non à l'échelle · noir = air

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Classification de Hinchey**
Radiopaedia · stades
radiopaedia.org/articles/hinchey-classification-

**Diverticulite colique**
Radiopaedia · signes au scanner
radiopaedia.org/articles/colonic-diverticulitis-

**Diverticulite perforée (cas)**
Radiopaedia · stade IV
radiopaedia.org/cases/perforated-diverticulitis-

**Appendagite épiploïque**
Radiopaedia · diagnostic différentiel
radiopaedia.org/articles/epiploic-appendagitis?l

**Sources :** WSES 2020 – acute left colonic diverticulitis – www.wses.org.uk/wp-content/uploads/2020/05/update-acute-dive... · Medscape – synthèse WSES 2020 – reference.medscape.com/viewarticle/934760