TRANSVERSAL · TR-03

# Ganglions · Node-RADS

**Node-RADS v1.0 (2021)**
scanner et IRM · taille puis configuration

**Principe :** score de 1 à 5 exprimant la probabilité d'atteinte ganglionnaire maligne, en deux étapes : **1 · taille** (petit axe), puis **2 · configuration** (texture + contours + forme). On note le ganglion le plus suspect par station. Applicable au scanner et à l'IRM, pour toutes les localisations.

## ÉTAPE 1 · TAILLE

**Normal**

- Petit axe **< 10 mm** (règle générale)
- Inguinal : **< 15 mm**
- **< 5 mm** pour : facial, parotidien, rétro-auriculaire, occipital, rétropharyngé, jugulaire antérieur, rétrocrural, cardiophrénique, mésentérique, obturateur, **mésorectal**

**Augmenté**

- Ni « normal » ni « bulky »
- 10–15 mm de petit axe (non mesurable au sens RECIST)
- Ou augmentation du petit axe **≥ 2 mm** par rapport à un examen antérieur

**Bulky**

- Plus grand diamètre **≥ 30 mm** dans n'importe quel plan
- Ou conglomérat ganglionnaire

## ÉTAPE 2 · CONFIGURATION (0 À 5 POINTS)

| TEXTURE | POINTS | CONTOURS | POINTS | FORME | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Homogène | 0 | Lisses | 0 | Toute forme avec **hile graisseux conservé** | 0 |
| Hétérogène | 1 | **Irréguliers ou flous** | 1 | Réniforme ou ovale sans hile graisseux | 0 |
| Nécrose focale | 2 | | | **Sphérique sans hile graisseux** | 1 |
| **Nécrose étendue** ou nouvelle nécrose | 3 | | | | |
| Signe spécifique de l'entité : aspect kystique (carcinome épidermoïde HPV+, thyroïde, tumeur germinale non séminomateuse), calcifications (thyroïde), texture mucineuse | 3 | | | | |

Score du ganglion : **calculateur interactif Node-RADS** ↗.

## SCORE FINAL

| TAILLE | CONFIGURATION 0 | 1 | 2 | 3 | ≥ 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Normale** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Augmentée** | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| **Bulky** | 5 quelle que soit la configuration | | | | |

Signification : 1 très faible · 2 faible · 3 équivoque · 4 élevée · 5 très élevée probabilité d'atteinte. Un ganglion augmenté de taille sans anomalie morphologique reste Node-RADS 2. Grille reconstituée à partir de l'algorithme d'Elsholtz et al. (2021) : vérifier la figure 1 de l'article original pour les cas limites.

## PIÈGES

**Réactionnel**
infection ou inflammation locale : ganglions augmentés mais homogènes, hile conservé

**Mesure**
petit axe sur coupe axiale ; même phase et même plan au suivi

**Nécrose**
ne pas confondre avec un hile graisseux ou un artefact de volume partiel

**Localisation**
indiquer la station selon la classification propre à l'organe (cou, médiastin, pelvis)

TRANSVERSAL · TR-03

# Ganglions · Node-RADS (suite)

**Node-RADS v1.0 (2021)**
scanner et IRM · taille puis configuration

## ATLAS VISUEL

### Configuration ganglionnaire (Node-RADS)



**Hile graisseux**
réniforme · 0 point

**Sphérique**
sans hile · 1 point

**Hétérogène**
1 point

**Nécrose focale**
2 points

**Nécrose étendue**
3 points

**Contours irréguliers**
1 point

Schémas simplifiés, non à l'échelle

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Ganglions kystiques ou nécrotiques**
Radiopaedia · causes et aspects
radiopaedia.org/articles/cystic-necrotic-lymph-n

**Ganglions cervicaux : critères**
Radiopaedia · critères radiologiques
radiopaedia.org/articles/cervical-lymph-node-met

**Node-RADS 1.0 (article original)**
Eur Radiol 2021 · algorithme complet
link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00330-020

**Sources :** Elsholtz et al., Eur Radiol 2021 – Node-RADS 1.0 – link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00330-020-07572-4.pdf