เคมีบำบัดคืออะไร

เคมีบำบัด คือ การรักษาด้วยการใช้ยาเคมีเพื่อควบคุม หรือทำลายเซลล์มะเร็งไม่ให้มีการกระจายหรือลุกลามมากขึ้น การบริหารยาเคมีบำบัดสามารถทำได้หลายวิธี เช่นในรูปแบบ ของ ยาฉีด ยารับประทาน เป็นต้น

ยาเคมีบำบัดที่ท่านได้รับครั้งนี้ประกอบด้วย

1. Cisplatin (ซิสพลาติน).....มก. จำนวน......มก.

รอบที่	วันที่รับยาเคมีบำบัด
1	
2	
3	
4	
5	
6	

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับยา

- กดการทำงานของไขกระดูก/ ภูมิต้านทานต่ำ
- อ่อนเพลีย/ มีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว
- คลื่นไส้/ อาเจียน/ เบื่ออาหาร
- ผมร่วง/ บางลง
- ผื่นแดง ผื่นคันบริเวณผิวหนัง
- เยื่อบุปากอักเสบ เกิดแผลร้อนในในปาก
- ท้องเสีย
- 🕨 ไตวาย

การดูแลตนเองทั่วไปในช่วงที่ได้รับยาเคมีบำบัด

- พักผ่อนให้เพียงพอ 6-8 ชั่วโมงต่อวัน, รับประทานอาหาร ให้ครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำมากๆ 2-3 ลิตร หรือ 8-12 แก้วต่อวัน ตลอดช่วงที่ได้รับการรักษา ช่วยให้รังสีทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยขับของเสียที่เกิดจาก การฉายรังสีและการรับยาเคมีบำบัดออกจากร่างกาย
- งด!!! รับประทานของหมักดอง อาหารสุกๆ ดิบๆ ยาต้ม ยาหม้อ ยาจีน และสมุนไพรทุกชนิด
- สังเกตผิวหนังบริเวณที่ฉีดยา ถ้ารู้สึกปวด บวม แดง หรือ สงสัยว่ามียารั่วซึมออกนอกหลอดเลือด ต้องแจ้งแพทย์หรือ พยาบาลทันที
- ผู้ป่วยทุกรายทั้งชายและหญิงควรคุมกำเนิดและป้องกัน
 ไม่ให้มีการตั้งครรภ์ในระหว่างรับการรักษาด้วยยาเคมี
 บำบัด เพราะยาเคมีบำบัดอาจส่งผลทำให้ทารกมีความ
 ผิดปกติหรือพิการได้ หากสงสัยตั้งครรภ์ให้แจ้งแพทย์ทันที

การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอาการข้างเคียงต่าง ๆ

- ภู<u>มิต้านทานต่ำ</u> จากการที่เม็ดเลือดขาวลดลง ทำให้เกิด การติดเชื้อได้ง่าย ภูมิต้านทานจะต่ำที่สุดหลังจากได้รับ ยาเคมีบำบัดไปแล้ว 10-14 วัน
 - ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย ปากและฟัน
 - ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร
 และหลังจากเข้าห้องน้ำทุกครั้ง
 - หลีกเลี่ยงการพบปะบุคคลที่เป็นไข้หวัด หัด อีสุกอีใส วัณโรค รวมถึงโรคติดเชื้ออื่นๆ
 - หลีกเลี่ยงการไปในชุมชนที่แออัด หากจำเป็นต้องไป
 ให้ใส่หน้ากากอนามัยด้วยทุกครั้ง
 - รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง ได้แก่ นม เนื้อสัตว์ ไข่ ที่ปรุงสุกและสะอาด

*** สังเกตการติดเชื้อ เช่น มีไข้สูง เจ็บคอ ปัสสาวะแสบขัดให้ ผู้ป่วยมาพบแพทย์ก่อนนัด หรือไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

2. ผมร่วงหรือบางลง

- ควรใช้หวีซี่ห่างๆ หวีผม เวลาหวีอย่ากระตุก ให้หวีเบาๆ
- ไม่ควรย้อมหรือดัดผมเพราะอาจทำให้ผมร่วงมากขึ้น
- ควรให้ใช้แชมพูสระผมชนิดอ่อน
- 3. <u>โลหิตจาง</u> ทำให้รู้สึกเหนื่อยและอ่อนเพลียได้ง่าย
 - รับประทานนม เนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์และไข่
 รวมถึงอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงต่างๆ
 - ดื่มน้ำผลไม้หรือรับประทานผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง
 เช่น ส้ม ฝรั่ง เพราะวิตามินซีจะช่วยทำให้ร่างกาย
 ดูดซึมธาตุเหล็กได้ดี
- 4. คลื่นไส้/ อาเจียน อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่หลังได้รับยาเคมีบำบัด และอาจมีอาการนานได้ถึง 48 ชั่วโมงหรือนานเป็นสัปดาห์
 - รับประทานอาหารครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง
 - หลีกเลี่ยงอาหารหวานจัด มันจัด กลิ่นฉุน
 - ควรดื่มน้ำอุ่น น้ำขิง น้ำส้ม น้ำมะนาว น้ำผลไม้
 หรือรับประทานผลไม้รสเปรี้ยว
 - บ้วนปากด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำเกลือเจือจางหลังอาเจียน หรือหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง
 - ใช้เทคนิคผ่อนคลาย เพื่อลดความวิตกกังวลต่างๆ
 - รับประทานยาแก้อาเจียนที่แพทย์จ่ายให้
 ในช่วง 3-7 วันแรกหลังจากได้รับยาเคมีบำบัด

การปฏิบัติตัวเมื่อได้รับการฉายรังสี

การฉายรังสีบริเวณอุ้งเชิงกราน ส่วนของลำไส้จะถูกรังสีด้วย
 จึงอาจทำให้เกิดการท้องเสีย ท้องอืด จุกเสียดได้ง่าย มักพบ
 จากฉายรังสีได้ประมาณ 10 – 15 ครั้ง ผู้ป่วยควรรับประทาน
 อาหารที่ย่อยง่าย หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด ของหมักดองต่างๆ

- กระเพาะปัสสาวะ ได้รับรังสีด้วย จึงอาจมีอาการของกระเพาะ ปัสสาวะอักเสบ มักพบหลังจากฉายรังสีได้ 20-25 ครั้ง ควรดื่มน้ำ อย่างน้อย 10-15 แก้วต่อวัน และไม่ควรกลั้นปัสสาวะ ส่วนมาก จะกลับมาเป็นปกติภายหลังจากฉายรังสีครบแล้ว 4-6 สัปดาห์
- ▶ ผิวหนังบริเวณอวัยวะเพศและร่องกัน อาจมีแผลผุพองจากการฉาย รังสีได้ง่าย เนื่องจากการมีสารคัดหลั่งจากช่องคลอด จากอาการ ท้องเสีย อีกทั้งการใช้ผ้าอนามัยอาจทำให้เกิดการอับชื้น ผู้ป่วยจึง ควรทำความสะอาดอวัยวะเพศทุกครั้ง หลังการขับถ่ายควรซับเบาๆ ให้แห้ง, ผึ่งพดลม,ควรเปลี่ยนผ้าอนามัยทุก 2-4 ชม.,ใช้ยาทาบริเวณ ที่เกิดแผลตามแพทย์สั่ง และควรสวมเสื้อผ้าหลวมๆ โปร่ง สบาย
- ในระหว่างการรักษา อาจมีสารคัดหลั่งหรือเลือดออกได้ แต่จะค่อยๆ
 ลดลงภายใน 2-4 สัปดาห์หลังจากได้รับรังสีครบ
- > ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ในช่วงนี้ เพราะจะติดเชื้อและเลือดออกง่าย
- สวนล้างช่องคลอดได้ ยกเว้นในช่วงที่มีเลือดออกหรือมีการอักเสบ ภายในช่องคลอด

อาการผิดปกติที่ต้องรีบมาพบแพทย์

- ปัสสาวะแสบขัด/ น้อยลง/ ไม่ออก/ มีเลือดปน
- > มีอาการบวมที่ใบหน้า/ เท้า/ ขาช่วงล่าง
- 🕨 หูอื้อ/ หูดับ/ การได้ยินเสียงผิดปกติไป
- > อาเจียน/ ท้องเสียอย่างรุนแรง
- ≽มีใช้

*** หากบ้านไกลสามารถไปพบแพทย์โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ และให้โทรมาแจ้งที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีในแผนกที่ท่าน รักษาตัวอยู่ ถึงอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น

"อาการข้างเคียงทั้งหมดที่กล่าวมานั้น เกิดขึ้นในผู้ป่วยบางรายและ เกิดมากน้อยแตกต่างกันไป ผู้ป่วยอาจไม่มีอาการข้างเคียงดังกล่าว เลยก็ได้ การให้ยาเคมีบำบัดไม่น่ากลัวอย่างที่คิด และสามารถ ป้องกันหรือบรรเทาอาการข้างเคียงต่างๆ ได้"

ตัวอย่างรายการอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด (อาหารธรรมดา) พลังงาน 1,800 - 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวัน

รายการ ที่	มื้อเช้า	มื้อกลางวัน	มื้อเย็น
1	- ข้าวต้มปลา - โอวัลติน / นม ขนมปัง	- ข้าวผัดทะเล - กล้วยบวดชี	ข้าวสวยแกงเขียวหวานไก่ผัดวุ้นเส้นผลไม้ตามฤดูกาล
2	- ข้าวต้ม - หมูหยอง - ผัดกะหล่ำปลี ไก่	 ข้าวสวย ผัดกะเพราหมู/ ไก่ / กุ้ง ต้มจืดหัวไชเท้า มันต้มน้ำตาล 	ข้าวสวยต้มโคล้งปลาใส่เห็ดผัดผักรวมผลไม้ตามฤดูกาล
3	- ข้าวต้มตับหมู เลือดหมู - น้ำเต้าหู้/ นม	- บะหมี่เกี้ยว หมูแดง - ฟักทอง แกงบวด	ข้าวสวยต้มข่าไกใส่เห็ดนางฟ้าปลาทอดผักพริกหวานผลไม้ตามฤดูกาล
4	- ข้าวต้ม- ผัดผักบุ้ง- ไข่ตุ๋น- โอวัลติน/ นม	 ข้าวสวย แกงจืดเต้าหู้ใช่ หมูสับ กุ้งผัดพริกแกง ถั่วเชียวต้ม น้ำตาล 	ข้าวสวยแกงส้มผักรวมหมูรวนเค็มผลไม้ตามฤดูกาล
5	ข้าวต้มกุ้งน้ำเต้าหู้/ นมขนมปังสังขยา	 ก๋วยเตี๋ยวหมู ลูกชิ้น ลอดช่อง น้ำกะทิ 	ข้าวสวยแกงจืดมะระยัดไส้ปลานิลนึ่งมะนาวผลไม้ตามฤดูกาล
6	 ก๋วยจั๊บ หมูสับ เลือดหมู ตับหมู ผลไม้ตาม ฤดูกาล 	- สุกี้หมู - แกงบวดมัน	- ข้าวสวย - ต้มจืดเต้าหู้ไข่ ผักกาดขาว - ผัดพริกอ่อนตับหมู
7	- ข้าวต้มขาว - ผัดกะหล่ำปลี หมูชิ้น	- ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น - ขนมบัวลอย	- ข้าวสวย - แกงส้มผักรวม - หมู/ ไก่ทอด - ผลไม้ตามฤดูกาล

***ผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนรายการอาหารตามความต้องการและ สามารถเสริมนม/ น้ำเต้าหู้/ น้ำผลไม้ต่างๆ ได้ระหว่างมื้ออาหาร

Cis CCRT

การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับ ยาเคมีบำบัดสูตร: ซิสพลาติน ร่วมกับการฉายรังสืบริเวณอุ้งเชิงกราน



มีปัญหาเกี่ยวกับการรักษาปรึกษาเรา

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โทร: 038-455632-6

ต่อ 191, 173 (เคมีบำบัด)

ต่อ 169, 174 (รังสีรักษา)

ต่อ 109, 102 (เภสัชกรรม)

ต่อ 180 (โภชนาการ)

ในวันและเวลาราชการ: 8.00 – 16.00 น.

www.ccc.in.th

Version 1/2561