

เคมีบำบัดคืออะไร

เคมีบำบัด คือ การรักษาด้วยการใช้ยาเคมีเพื่อควบคุมหรือทำลายเซลล์มะเร็งไม่ให้มีการกระจายหรือลุกลามมากขึ้น การบริหารยาเคมีบำบัดสามารถทำได้หลายวิธี เช่นในรูปแบบของ ยาฉีด ยารับประทาน เป็นต้น

ยาเคมีบำบัดที่ท่านได้รับครั้งนี้ประกอบด้วย

- 1. Paclitaxel (แพคลิแทกเซล).....มก.
- 2. Carboplatin (คาร์โบพลาติน).....มก.

จำนวน.....รอบ

รอบที่	วันที่รับยาเคมีบำบัด
1	
2	
3	
4	
5	
6	

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับยา

- กัดการทำงานของไขกระดูก/ ภูมิคุ้มกันต่ำ
- อ่อนเพลีย/ ครั่นเนื้อครั่นตัว
- ผม่ว/ บางลง
- อาจมีอาการแพ้ยา
- ชา/ เจ็บแปล็บตามปลายมือ/ ปลายเท้า
- คลื่นไส้/ อาเจียน/ เบื่ออาหาร
- ปวดกล้ามเนื้อ/ ปวดตามข้อ
- ท้องเสีย
- ภาวะแพ้ปัสสาวะอักเสบ
- บวมหน้า

การดูแลตนเองทั่วไปในช่วงที่ได้รับยาเคมีบำบัด

- พักผ่อนให้เพียงพอ 6-8 ชั่วโมงต่อวัน, รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่, ดื่มน้ำมาก ๆ 2-3 ลิตร หรือ 8-12 แก้วต่อวัน
- งด!!! รับประทานของหมักดอง อาหารสุกๆ ดิบๆ ยาต้ม ยาหม้อ ยาจีน และสมุนไพรทุกชนิด
- สังเกตอาการร้อนวูบวาบ แ่นหน้าอก อาการหายใจลำบาก เหงื่อออกมากผิดปกติ ให้รีบแจ้งพยาบาลทันที
- สังเกตผิวหนังบริเวณที่ฉีดยา ถ้ารู้สึกปวด บวม แดง หรือสงสัยว่ามียารั่วซึมออกนอกหลอดเลือด ต้องแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที
- ผู้ป่วยทุกรายทั้งชายและหญิงควรคุมกำเนิดและป้องกันไม่ให้มีการตั้งครรภ์ในระหว่างรับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด เพราะยาเคมีบำบัดอาจส่งผลทำให้ทารกมีความผิดปกติหรือพิการได้ หากสงสัยตั้งครรภ์ให้แจ้งแพทย์ทันที

การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอาการข้างเคียงต่าง ๆ

- 1. ภูมิคุ้มกันต่ำ จากการที่เม็ดเลือดขาวลดลง ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย ภูมิคุ้มกันต่ำจะต่ำที่สุดหลังจากได้รับยาเคมีบำบัดไปแล้ว 7-14 วัน
 - ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย ปากและฟัน
 - ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากเข้าห้องน้ำทุกครั้ง
 - หลีกเลี่ยงการพบปะบุคคลที่เป็นไข้หวัด หัด อีสุกอีใส วัณโรค รวมทั้งโรคติดเชื้ออื่นๆ
 - หลีกเลี่ยงการไปในชุมชนที่แออัด หากจำเป็นต้องไปให้ใส่หน้ากากอนามัยด้วยทุกครั้ง
 - รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง ได้แก่ นม เนื้อสัตว์ ไข่ ที่ปรุงสุกและสะอาด

*** สังเกตการติดเชื้อ เช่น มีไข้สูง เจ็บคอ ปัสสาวะแสบขัด ให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ก่อนนัด หรือไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

- 2. การแพ้และการเกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกินต่อยาอย่างรุนแรง อาจพบขณะเริ่มได้รับยาประมาณ 30 นาทีแรก หากเกิดอาการร้อนวูบวาบ แ่นหน้าอก หายใจลำบาก เหงื่อออกมากผิดปกติ ให้รีบแจ้งพยาบาลทันที
- 3. เกล็ดเลือดต่ำ ทำให้เลือดออกง่ายแต่หยุดยาก
 - ฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุ ถ้ามีบาดแผลให้กดบาดแผลเป็นเวลานานอย่างน้อย 5 นาที
 - ฝ้าระวังเลือดออกตามไรฟัน ใช้แปรงสีฟันขนอ่อนนุ่ม
 - ระวังไม่ให้มีอาการท้องผูก
- *** หากเลือดไหลไม่หยุดให้รีบไปพบแพทย์โรงพยาบาลใกล้บ้าน
- 4. คลื่นไส้/ อาเจียน อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่หลังได้รับยาเคมีบำบัด และอาจมีอาการนานได้ถึง 48 ชั่วโมงหรือนานเป็นสัปดาห์
 - รับประทานอาหารครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง
 - หลีกเลี่ยงอาหารหวานจัด มันจัด กลิ่นฉุน
 - ควรดื่มน้ำอุ่น น้ำขิง น้ำส้ม น้ำมะนาว น้ำผลไม้ หรือรับประทานผลไม้รสเปรี้ยว
 - บ้วนปากด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำเกลือเจือจางหลังอาเจียน หรือหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง
 - ใช้เทคนิคผ่อนคลาย เพื่อลดความวิตกกังวลต่างๆ
 - รับประทานยาแก้อาเจียนที่แพทย์จ่ายให้ ในช่วง 3-7 วันแรก หลังจากได้รับยาเคมีบำบัด
- 5. ปวดกล้ามเนื้อ/ ปวดตามข้อ มักเกิดอาการประมาณ 3-5 วันหลังได้รับยาเคมีบำบัดและอาการจะค่อยๆ ลดลง หากมีอาการปวดมากสามารถรับประทานยาแก้ปวดได้ตามแพทย์สั่ง
- 6. ผม่ว/ บางลง
 - ควรใช้วิธีชี้ห่างๆ หวีผม เวลาหวีอย่ากระตุก ให้หวีเบาๆ
 - ไม่ควรย้อมหรือตัดผมเพราะอาจทำให้ผม่วมากขึ้น
 - ให้ใช้แชมพูสระผมชนิดอ่อน

7. **ขามือ/ ขาเท้า** อาจมีอาการชา/ เจ็บแปล็บๆ ตามปลายมือ/ ปลายเท้า

- ถ้านิ้วมือมีอาการชา ระวังระยะเวลาใช้ของมีคมของแหลมและการสัมผัสของร้อน
- ถ้าเป็นไปได้ ควรสวมรองเท้าที่เป็นยาง เพื่อป้องกันของแหลมที่คมตำ
- ควรบริหารมือและเท้าอย่างสม่ำเสมอ

อาการผิดปกติที่ต้องรีบมาพบแพทย์

- แขนหน้าอก/ หายใจเร็ว/ ใจสั่น/ หน้าบวม/ ปากบวม ลิ้นบวม/ เหงื่อออกมากผิดปกติ
- ผิวหนังมีผื่น/ ลมพิษ/ คันหรือแดงผิดปกติ
- มีไข้ตามตัว/ เลือดออกผิดปกติ
- หูอื้อ/ หูดับ/ การได้ยินเสียงผิดปกติไป
- อาเจียน/ ท้องเสียอย่างรุนแรง
- มีไข้

*** หากบ้านไกลสามารถไปพบแพทย์โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ และให้โทรมาแจ้งที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีในแผนกที่ท่านรักษาตัวอยู่ ถึงอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น

ผอ.

“อาการข้างเคียงทั้งหมดที่กล่าวมานั้น เกิดขึ้นใน ผู้ป่วยบางรายและเกิดมาน้อยแตกต่างกันไป ผู้ป่วยอาจไม่มี อาการข้างเคียงดังกล่าวเลยก็ได้ การให้ยาเคมีบำบัดไม่น่ากลัวอย่างที่คิด และสามารถป้องกันหรือบรรเทาอาการข้างเคียงต่างๆ ได้”

ผอ.


ตัวอย่างรายการอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด (อาหารธรรมดา) พลังงาน 1,800 - 2,000 กิโลแคลอรีต่อวัน

รายการที่	มือเช้า	มือกลางวัน	มือเย็น
1	- ข้าวต้มปลา - โอวัลติน / นม ขนมปัง	- ข้าวผัดทะเล - ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ	- ข้าวสวย - แกงเขียวหวานไก่ - ผัดขี้เหล็ก - ผลไม้ตามฤดูกาล
2	- ข้าวต้ม - หมูหยอง - ผัดกะหล่ำปลี ไก่	- ข้าวสวย - ผัดกะเพราหมู/ไก่ / กุ้ง - ต้มจืดหัวไชเท้า - มันต้มน้ำตาล	- ข้าวสวย - ต้มโคล้งปลาใส่เห็ด - ผัดผักรวม - ผลไม้ตามฤดูกาล
3	- ข้าวต้มต้บหมู - เลือดหมู - น้ำเต้าหู้/ นม	- บะหมี่เกี๊ยว - หมูแดง - ฟักทอง - แกงบวด	- ข้าวสวย - ต้มข้าวไก่ใส่เห็ดนางฟ้า - ปลาทอดผัดพริกหวาน - ผลไม้ตามฤดูกาล
4	- ข้าวต้ม - ผัดผักรวม - ไข่ตุ๋น - โอวัลติน/ นม	- ข้าวสวย - แกงจืดเต้าหู้ไข่ - หมูสับ - กุ้งผัดพริกแกง - ถั่วเขียวต้มน้ำตาล	- ข้าวสวย - แกงส้มผักรวม - หมูรวนเค็ม - ผลไม้ตามฤดูกาล
5	- ข้าวต้มกุ้ง - น้ำเต้าหู้/นม - ขนมปังสังขยา	- ก๋วยเตี๋ยวหมู - ลูกชิ้น - ลอดช่อง - น้ำกะทิ	- ข้าวสวย - แกงจืดมะระยัดไส้ - ปลานิลนึ่งมะนาว - ผลไม้ตามฤดูกาล
6	- ก๋วยจั๊บ หมูสับ - เลือดหมู ตับหมู - ผลไม้ตามฤดูกาล	- สุกี้หมู - แกงบวดมัน	- ข้าวสวย - ต้มจืดเต้าหู้ไข่ - ผักกาดขาว - ผัดพริกอ่อนต้บหมู
7	- ข้าวต้มขาว - ผัดกะหล่ำปลี - หมูชิ้น	- ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น - ขนมบัวลอย	- ข้าวสวย - แกงส้มผักรวม - หมู/ ไก่ทอด - ผลไม้ตามฤดูกาล

***ผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนรายการอาหารตามความต้องการและสามารถเสริมนม/ น้ำเต้าหู้/ น้ำผลไม้ต่างๆ ได้ระหว่างมื้ออาหาร

Pac/Carbo

การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับ
ยาเคมีบำบัดสูตร: แพค/คาร์โบ



มีปัญหากับการรักษาปรึกษาเรา

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โทร: 038-455632-6

ต่อ 191, 173 (เคมีบำบัด)

ต่อ 169, 174 (รังสีรักษา)

ต่อ 109, 102 (เภสัชกรรม)

ต่อ 180 (โภชนาการ)

ในวันและเวลาราชการ: 8.00 – 16.00 น.

www.ccc.in.th

Version 1/2561