

ใบบันทึกการเตรียมยาเคมีบำบัด

วันที่เตรียมยา 17 ก.ค. 2569 14:33

ผู้เตรียมยา Paramee Pookhaow

HN. 6666

ชื่อ-สกุล นายtest

อายุ 50

ปี เพศ

ชาย

น้ำหนัก 70

kg

ส่วนสูง 170

cm.

BSA =

1.8181

m²

Working formula

1. Drug 5-FU

Dose formular 1.82 m2 x 500 mg/m2

Dose 1000 mg

สารละลายและปริมาตรที่ใช้ละลายผงยา (Reconstitution) เจือจางใน NSS หรือ D5W

ปริมาตรยาที่เตรียม 20

ml (ใช้ 4 ขวด)

(Add ลงใน Diluent D5W

ปริมาตร 100

ml)

การตรวจสอบคุณภาพยาเคมีบำบัดที่ผสมเสร็จ

☐

เตรียมยาและสารนำถูกชนิด

☐

เตรียมยาถูกขนาด

☐

ปราศจากตะกอนหรือฝุ่นผง

☐

ภาชนะบรรจุยาไม่รั่วซึม

☐

ติดฉลากถูกต้อง

เภสัชกรผู้ตรวจสอบ _____

2. Drug DOXORUBICIN

Dose formular 1.82 m2 x 60 mg/m2

Dose 100 mg

สารละลายและปริมาตรที่ใช้ละลายผงยา (Reconstitution) Reconstitute ด้วย NSS 5 ml สำหรับยา 10 mg (ความเข้มข้น 2 mg/ml) *ห้ามผสมกับ Heparin หรือ 5-FU

ปริมาตรยาที่เตรียม 50

ml (ใช้ 2 ขวด)

(Add ลงใน Diluent D5W

ปริมาตร 100

ml)

การตรวจสอบคุณภาพยาเคมีบำบัดที่ผสมเสร็จ

☐

เตรียมยาและสารนำถูกชนิด

☐

เตรียมยาถูกขนาด

☐

ปราศจากตะกอนหรือฝุ่นผง

☐

ภาชนะบรรจุยาไม่รั่วซึม

☐

ติดฉลากถูกต้อง

เภสัชกรผู้ตรวจสอบ _____

3. Drug CYCLOPHOSPHAMIDE

Dose formular 1.82 m2 x 600 mg/m2

Dose 1000 mg

สารละลายและปริมาตรที่ใช้ละลายผงยา (Reconstitution) Reconstitute ด้วย NSS เจือจางต่อด้วย NSS, D5W, หรือ D5S

ปริมาตรยาที่เตรียม 50

ml (ใช้ 5 ขวด)

(Add ลงใน Diluent D5W

ปริมาตร 100

ml)

การตรวจสอบคุณภาพยาเคมีบำบัดที่ผสมเสร็จ

☐

เตรียมยาและสารนำถูกชนิด

☐

เตรียมยาถูกขนาด

☐

ปราศจากตะกอนหรือฝุ่นผง

☐

ภาชนะบรรจุยาไม่รั่วซึม

☐

ติดฉลากถูกต้อง

เภสัชกรผู้ตรวจสอบ _____